

161 de 3005006 270 1791

Francesco Cipiani

161 de 3005006 270 1791





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by permission of The Wellcome Trust, London.  
E00220 v01.2









Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1702/D Vol. 2





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1702/D Vol. 2







Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
110210, Vol. 2




1701<sup>(2)</sup>  
/D/2  
vol 2




















# 1650

# HISTORIAE

GENERALIS

PLANTARVM;



PARS ALTERA,

Continens reliquos nouem libros,

*Eodem in hac parte studio, quo in superiore ample  
Plantarum descriptiones digesta.*



*Ex Bibliotheca H<sup>is</sup> Regis (qui Reg. Anno 1713)*

LUGDUNI,

APVD GVLIELMVM ROVILLIVM,

SVE SCYTO VENETO.

M. D. LXXVI.

Cum Privilegio Pont. Max. Caesaris Maiest. & Christian. Galliarum Regis.



MISS TORIE

GENERAL

1774



# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

### LIBER DECIMVS,

*In quo describuntur & ad viuum depinguntur plantæ omnes, quæ in asperis, saxosis, sabulosis & apricis nascuntur.*

BURSA PASTORIS,

CAP. I.



à theculis siue folliculis semen cōcludentibus, marsupiioli siue crumenę aut cordis

BURSA Pastoris.



ONTRARIAM nunc viam ingredimur. In vndis enim & aquaticis locis stirpes, quanta potuimus diligentia, vestigauimus: nunc in aridis & sitientibus indagamus, & inter saxa rimamur, hic natura non minus quàm illic vires & diuitias suas ostēdante, in quibus explicandis à vulgarioribus & notioribus ad rariores & minus notas progrediemur. Et cui non notissima recentiorum & planta & nomenclatura Bursa pastoria, siue pera & Bursa pastoris, Gallicè *Tabouret*, & *bourse de berger*, Germanicè *Deschelkraut*, sic dicta

Nomina

effigiem referentibus? nullum enim aliud ei nomen Græcum Latinumve à veteribus positum fuisse sciunt herbarij. Caules habet rotundos, lentos, pedales aut maiores, folia longa, altius incisa, irionis, aut erucæ: flores albicantes thlaspi non dissimiles, cui etiam congener est, & folliculos siue marsupiola latiuscula, in quibus semen cōcluditur exiguum, nigrum: radicem longam singularem, & cādīdam. Vbiuis copiosissima est, secus vias, vrbium areas, locis incultis, asperis & saxosis. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida est & sicca tertio ordine. Sanguinem efficacissimè sistit: Nec ideo refrigerare putandum, vt recentiorum quidam non rectè tradiderunt. Nam flores gustanti acrimoniæ non nihil inurunt. Quare non refrigerādo, sed siccādo cogendoq; sanguinis fluxiones cohibet. Huius herbæ decoctum potum alui fluores, dysenterias, sanguinis excreationes reprimat, & eiusdem sanguinis ex vtero, renibus, deniq; quauis ex parte profluua inhihet, quouis modo sumpta, ita vt scripserint quidam manu

Form

Locu

Temp

Dod. I

cap. 14

Temp

U



foliū, aut quavis alia corporis parte delatam posse sanguinem sistere. Prodest, inquit Matthiolus, attrita & emplastri modo imposita, inflammationibus, & sacris ignibus. Decoquitur pluuiā aqua cum plantagine, & armenia gleba, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & cruentas excreationes. Herba succus recentiora vulnera glutinat, & auribus purulentis medetur. Sistit mensium abundantiam, si eius & persicariæ decocto insideant mulieres, esturque ad idem. Denique contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, tenui pulcra circumlita, & in oleo frixa. Additur emplastris quæ ad capitis vulnera componuntur, & unguentis multis.

## PILOSELLA,

## CAP. II.

Nomina

Genera

Forma.

**N** Ec etiam huius notissimæ herbae meminisse, nec nomen vllum ei indidisse veteres, aiunt herbarij, quam recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur, Galli *Piloselle*. Eius genera duo reperiuntur. Est enim Pilosella maior, Germanis proprie *Nigelkraut* nominata, & Pilosella minor, Germanis *Menszerlein*, vel *Hänselstein* peculiariter dicta. Pilosella maior foliis est per terram graminis modo

PILOSELLA Maior,  
Matthioli.PILOSELLA Minor,  
Fuchsig.

sparsis candicantibus, hirsutis, oblongis, aliquantum supernè concavis, & aurem murinam referentibus: cauliculis villosis, gracilibus, palmaribus, & sesquipalmaribus: floribus luteis, aut pallidiusculis, duplici foliorum ordine: radice digitum longa, multum fibrata. Huic Pilosella altera similis est, nisi multò minor esset foliis parvis, hirsutis, altera parte candidis. In summis cauliculis flores congesti modo lutei sunt, modo rubri, modo fusci, modo varij: radix parua, fibrata. Hanc prognaphalio montano describunt alij & depingunt. Et si quidam Pilosellam dixerint esse Myosotidem, id est, muris auriculam, tamen longè alia est à Myosotide Dioscoridis: nam, vt reliquas dissimiles notas taceam, neq; maior Pilosella, neque minor florem



florem cæruleum velut anagallis obtinet. Pilosellam aliam maximam spectandam nobis dedit Lobellius, quam habuit Syria missam, foliis maioribus, carnosiss, dense ab imo stipatis, candore & lanugine sericeove vellere, Holocericis attrectatu, hilari & specioso aspectu, incanis. Caules ternos quaternosve, quadrangulos, geniculatos, pedales emittit : radicē duriorem, lignosam,

*PILOSELLA Maxima,*  
*Syriaca, Lobelij.*



*TVBERARIA Maior,*  
*Myconi.*



fibratam, flores videre non contigit. Hæc Lobellius. Pilosella maior montosis locis, & collibus terrenis nascitur, & agrorum herbidis limitibus: minor in aridis montibus, & locis aliis asperis, & incultis, Maio & Iunio mensibus potissimum flo-  
*Tempus.*  
rēt. Calidas & siccas esse Pilosellas gustus demon-  
*Temper.*  
strat. Habēt enim adstrictionē cum exigua qua-  
*& Vires*  
dam acrimonia coniunctam, vt hoc nomine ad  
*Fuch. c. 230.*  
purificanda & glutinanda vulnera mirē sint vti-  
les. Ferunt enim foliorū farinam id strenuē effi-  
cere. Herbarū recentis succū exprimunt ad cohi-  
bendos quartanæ febris horrores. Eodē tingunt  
gladiorum aciem, vt omne ferrum aliud domet,  
secētque. Ferrum enim quod eius succo comman-  
duat, tantam contrahit duriatiam, vt chalybis acie  
respuat. Sunt qui huius herbarū radicē Maio men-  
se effossam, siccata, & in puluerem redactam  
ac potam, aut in cibo datam, efficacissimum esse  
aduersus ramicem remedium tradunt. Pilosellæ  
vis est præsentissima ad calcalum. Huic plantas  
duas & forma & facultate affines misit Myco-  
nus ex Hispania. Prior & minor passim in pra-

*TVBERARIA Minor,*  
*Myconi.*



*Tuberaria. Rad. durior  
ubi illa. sicut Tuberaria  
frequentissime reperitur*







Δη γὰρ οὗτ' ἀγγέλλει θριδακινίδα λαζέο χοίτην.

Id est, sumito Anchusæ similem lactucæ comā hirsuta, aspera, nigra, multa (additur in veteri codice *μεγάλη*, id est, magna, & ita Oribasius habet) quoquoersum à radice per terrā sparsa (*προσπεπλεγμένα τῇ γῇ* dixit Dioscorides folia anchusæ, quam similiter Theophrastus in iis numerat, quæ *ἐπιγείφυλλα* vocat, id est, folia per terram spargentia, Gaza ab radice foliata conuertit) spinosa. Radix est digiti crassitudine, quæ æstate provenit, ac manus inficit sanguineo colore (Ruellius sic interpretatus est Græca, ut leguntur in vulgatis codicibus, *τὴν χεῖρα ὑφαίματος ἐν τῷ θέρετι γενομένην, καὶ βάπτουσα τοὺς χεῖρας*. legendum, ἐν τῷ θέρετι γενομένην: Plinius legisse videtur siue apud Crateuam, siue apud Dioscoridem: *ἢ ὅτι δὲ δασύλας ὁ πάχος τὴν χεῖρα ὑφαίματος, ὡς πάπυρος, καὶ βάπτουσα τοὺς χεῖρας*. quæ in veteri codice And. Lacu. sic legi affirmat, *τὴν χεῖρα ὑφαίματος ἐν τῷ θέρετι γενομένην, καὶ βάπτουσα τοὺς χεῖρας* Quod est, quæ per æstatem gustata colore sanguineo suffunditur manûsque tingit, &c. Quæ lectio, inquit, ille, alteri præstat. Nam dicere Anchusæ radicem provenire tantum æstate, videtur ineptum, cum omnes omnium plantarum radices proveniant quavis tempestate. Marcellus ex antiquissimi codicis fide, pro *γενομένην* instauravit *γενοσκομένην*, ut intelligat Dioscorides non toto anno, sed æstate tantum hanc radicem eo colore esse, tuncque dignosci & deprehendi certò posse. Sed & vulgata lectio Latine sic reddi potest, sanguinei coloris æstate fit, & manus inficit.) Nascitur in pinguibus locis. Eam ex Matthiolo sic expressimus. Anchusæ altera quam aliqui Alcibiadion, vel Onochiles vocarunt, à priore distat, quod minora folia habeat, sed aspera similiter: ramulos tenues, in quibus flos purpureus in puniceum vergens (sic interpretatur Ruellius *ἀνθος πορφύρεος ὑποποινικίζων*, id est, flos purpureus subpuniceus. Oribasius legit, *ἢ χοινικίζων*, id est, aut puniceus) radices rubras, benè lōgas, quæ circa messes sanguineum succum habent. Gignitur in arenosis locis. Est etiam ex Matthiolo hic appicta. Item tertia quæ secunda similis est, nisi quod florem minùs puniceum habeat. Plinius de tribus Anchusæ generibus diversis in locis scribit. De prima hæc. Et Anchusæ radix in usu est, digitali crassitudine. Finditur papyri modo, manûsq; inficit sanguineo colore. De altera verò sic tradit. Est & alia herba proprio nomine Onochiles, quam aliqui Anchusam vocant, alij Architelion, alij Onocleam, alij rhexiam, multi Anchusam, parvo frutice, flore purpureo, asperis foliis & ramis, radice melsibus sanguinea, cæterò nigra, in sabulosis nascens. Et mox addit etiam de tertia. Est & alia huic similis, flore rubro, minor, & ipsa ad eisdem usus. Pseudanchusam verò primæ Anchusæ subiunxit. Est & alia similis, Pseudanchusæ ob id appellata, à quibusdam verò Enchusæ, aut Doris, &c. Cum Anchusæ primæ florem cæruleum in puniceum vergentem tribuant herbarij, secunda

Lib. hist.  
cap. 9.

ANCHUSA II. Math.



& tertia huic simili florem purpureum, aut subpuniceum, lycopsidi, quæ etiam Anchusæ generibus adnumeratur, purpurascens, id quod hic ex Dalechampio proponimus, ab omnibus his generibus floris luteo colore diversum statuentum est. Nascitur in sabulosis propè Lugdunum, & qua Lugduno itur Va-

Lib. 22. c. 20.

Ibid. ca. 21.

Ibidem.

Lib. 22. c. 20.



Locus,

ANCHUSA III. Maub.

Forma,

Vires &  
Temper.  
Lib. 4. c. 23.

lentiam Allobrogum, in aridis campis circa D. Ramberti pagum, radice longa, crassa, sanguineo succo manus tingente, foliis Onocleæ, hirsutis, circa radicem multis, caule pede altiore, lanuginoso: flore oblongo, cauo, luteo, digitalis simili. Describitur etiam à Pena Anchusa lignosior, angustifolia, omnium minima, & vix Anchusa habenda, inquit, ut cuius radix nihil aut parum sit purpurea, fundens cauliculos sesquipalmares, lignosos, satureiæ: foliola oblonga, Alcibiadij Anchusæ minora, minusq; hirsuta: flores non multum absimiles, pusillos, cæruleos. Hæc radix lignea est, ex fusco rufescens parum aut nihil inficiens. Marginibus agri Frontignani, & Valenæ silvæ hæc interdum occurrit. Non omnes Anchusæ iisdem facultatibus viribusve præditæ sunt. Primæ radix adstringendi vim habet, inquit Dioscorides, faciens ad ambusta & vetera vlcera cum oleo & cera cocta: erysipelata cum polenta imposta sanat, & vitilignes & lepras cum aceto admota. Eadem apposita fœtus detrahit.

ANCHUSA Lutea,  
Dalechamp.



ANCHUSA Lignosior,  
Pena.



Li. 22. c. 20. Ad decoctum ipsius datur ictericis nephriticis, splenicis, febrientibus quidem cum aqua mulsâ. Folia aluum sistunt cum vino pota. Utuntur vnguentarij radice ad spissanda vnguenta. De eadem hæc Plinius. Sanat vlcera in cerato, præcipue



QVÆ IN ASPERIS NASCVNTVR, LIB. X.

cipue senum, item adusta. Liguari non potest in aqua, oleo dissolvitur, idq; sincere experimentum est. Datur & ad renum dolores drachma eius potui in vino: aut si febris sit, in decocto balsam. Item iocinorum vitis & lienis, & bile suffutis. Lepris & lentigini illinitur ex aceto. Folia trita cum melle & farina luxatis imponuntur, & pota drachmis duabus in mulso aluum sistunt. Pulices necare radix in aqua decocta traditur. In quibus Plinius vlcera senū dixit, quæ Dioscorides παλαιοί *ἐλκη*, idest, vlcera antiqua: deinde balsami decoctum pro aqua multa: mox lentigini vox supposita est pro vitiligini. Dioscorides enim habet *ἐλκυσ* ἢ *λέπρας*, idest, vitilignes & lepras: postremo cum mulso dixit, pro vino. Cæterum quod Dioscorides dixit vnguentarios radice Anchusæ uti ad spissanda vnguenta, Plinius de vnguentis tractans ad colorem retulit his verbis. Tertius inter hæc est colos à multis neglectus: huius causa adduntur cinnabari & Anchusæ, &c. Secundæ Anchusæ vis foliorumq; ipsius est, eodem Dioscoride auctore, ut demorsis à serpentibus, & maximè à viperis auxilietur, siue edantur, siue bibantur, siue adalligentur: & si quis manducata in os serpentis inspuat, ipsum occidet. Eadem Plinius, atque alia quæ Dioscorides non habet, tradidit. Efficax, inquit, contra serpentes, maximèq; viperas, & radice, & foliis, æquè cibo ac potu. Vires habet melsibus. Folia trita odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus vulua procedente. Pellit & tinea cum hyssopo: & in dolore renum aut iocinoris ex aqua multa, si febris sit: sin aliter, ex vino bibitur. Lentigini ac lepris radix illinitur: habentes eam à serpentibus feriri negantur. Tertiæ Anchusæ semen manducatum, ut Dioscorides tradit, si quis in os serpentis expuerit, ipsum necabit: radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota latos lumbricos expellit. Plinius, est alia, inquit, huic (secundæ Anchusæ sub.) similis, flore rubro, minor, & ipsa ad eosdem usus: traduntque conimanducata ea, si inspuatur, mori serpentem. Galenus verò enucleatius & magis distinctè, ut solet, vires omnium sic declarat. Onoclea radicem habet simul adstringentem & subamaram, corporibus condensandis, & modicè extenuandis idoneam, tum abstergēdis quoq; & ablendis biliosis & salis succis. Dictum est enim supra, quod qualitas acerbæ mixta amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurigini, & lienosis, & renum affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polenta illita iuvat erysipelata, & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitilignes & lepras sanat cum aceto. Ac radice quidem hæc opera sunt, & operum facultates, quas diximus. At folia ipsius herbæ radice quidem sunt imbecilliora, non tamē aliena sunt à resiccatione, & adstrictione: itaque etiam profluuium sanant pota cum vino. At Onochili & Alcibiadij cognominatæ vis magis est medicata. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis morfi sunt, admodum iuvat, tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua verò quæ parua est, & ferè nomine caret, ferè ex illis sola Alcibiadio quidem persimilis est, verum & amarior, & magis medicamentosa, ac proinde ad latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura, cum hyssopo, & nasturtio pota.

Cornar.  
Embl. 21.  
lib. 4.

Lib. 13. ca. 1.

Ibidem.

Li. 22. c. 20.

Ibidem.

Li. 22. c. 20.

Li. 6. simpl.

LYCOP



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
LYCOPSIS, CAP. IIII.

Nomina  
Li. 6. simpl.  
Li. 4. ca. 24.

**L**YCOPSIS Galeno anchusa quarta species. Hanc etiam anchusam vocari testatur Dioscorides. Dicta autem est Lycopsis ob radicis fuscum ex purpureo colorem, quasi fuscedo, seu obscuritas quædam, qualis est summi diluculi, & primæ lucis, quæ ortum solis præcedit, vel vespertini crepusculi, vulgo nostro, *Entre chien & loup*, nominata: Græcis λυκόψος à lupo, cuius color cinereus est, nigrorem præferens, sed non intensiorem: nisi si quis ab hispida caulis, foliorum, & florum, impexaq; hirsutie, pedem lupinum referente, herbam Lycopsin nuncupatam fuisse malit. Multi, inquit Ruellius, Lycopsin hanc esse putant, nec abs re, quam vulgus herbariorum appellat Linguam canis, Horum sententiam refellit Matthiolus, quod Lycopsis, ut describit Dioscorides, folia habeat lactuæ similia, longiora, asperiora, crassa & latiora, circa radicis caput prolapsa, caulem longum, rectum, asperum, propagines multas emittentem, cubitales, asperas, & in iis flores paruos, purpurascens, radicem rubram, Linguæ

Lib. 3. c. 89.


Ca. 24. li. 4.

Li. 4. ca. 24.

Forma.

*Uxos aqua tinctos  
Liquor. orbis.  
cauli. et asperius  
ante asperius lupo*

LYCOPSIS Loniceri.



Pet. Pen. in  
Ad.

Lib. de pl.  
que in vmbros.  
&c.  
cap. 27.  
Li. 27. ca. 11.

Li. 6. simpl.

posita vulnera sanat: cum polenta verò erysipelata. At si cum oleo trita illinatur, sudores mouet. Plinius, Lycopsis, inquit, longioribus quàm lactuca est foliis, crassioribusq; caule longo, hirsuto, adnatis multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo. Nascitur in campestribus. Illinitur cum farina hordeacea igni sacro: sudorem in febribus mouet, succo aquæ calidæ admixto. Hæc Plinius ferè ex Dioscoridis sententia. Galenus verò, Lycopsis, inquit, refrigerat & desiccatur, magisque quàm onoclea adstringit.

ECHIVM,

CAP. V.

Nomina



**E**XION, ἀλκιβιάδιον, & ἀλκιβιον Græcis, Apuleio γνησιόφιζον, & ἐχιδνιον, Latinis Echium, Alcibiadium, & Alcibion, Serpentaria, & Viperina. Vulgus herbariorum siluestre Buglossum vocat, quod sequentes Germani *Vuildochsenzungen* appellant, Galli *Borrache saunage*, l'herbe aux vipères,



*Viperæ, l'herbe aux serpens.* Dictum est Echium teste Dioscoride, quod semina habeat viperino capiti similia, quo indicio sagacissima natura homines commonefaceret herbam hanc aduersus viperarum & cæterarum venenatarum bestiarum mor-  
sus salutarem esse. Alcibiadion autem siue Alcibium ab inuatore Alcibio, vt scribit Nicander. Is enim cum dormiens in extremo inguine à vipera ictus esset, ex-  
citatus à somno succum huius herbe commanducando, palato & dentibus expres-  
sit, hausitque in corpus, mansæ verò herbe reliquum vulneri imposuit contra  
dolorem: quo medicamento sanus euasit. Sed quum Dioscorides Echium vocari  
Alcibiadion scripserit, Nicander etiam Alcibium, mirum est Plinium dixisse Al-  
cibiadum, qualis esset herba apud auctores non reperi. Sed radicem eius & folia  
trita ad serpentis morsus imponi & bibi iubent, &c. Echij vnus duntaxat memi-  
nit Dioscorides, Plinius duorum eius generum his verbis. Echios vtriusque gene-  
ris Pulegio similis, foliis coronata, drachmis duabus ex vini cyathis quatuor datur.  
Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt:  
hæc ex vino & aceto. Hæc Plinius Nicandrum fortasse imitatus, qui Echium  
vnum facit spinoso folio, simili Anchusæ, parua & modicè in terram descen-  
dente radice. Alterum foliis & semine viride, & alterum, modico circum hoscu-  
lo, purpurea specie: cui semen est viperæ forma, durumque supernè caput. Quo  
loco Nicandri Scholiastes Numenium citat, qui in Theriaco duo etiam Echij  
genera fecerit: vnum minus, Ocimoides nomine, quod folia ei sint Ocimo simi-  
lia. Sunt etiam herbarij qui Echij plura statuunt  
genera, vt dicemus. Echium Dioscoridis folia  
habet oblonga, aspera, aliquantum tenuia,  
Anchusæ proxima, minora tamen, subrubra &  
pinguia, spinulas tenues incumbentes, quæ  
etiam folia exasperant: cauliculos tenues, mul-  
tos, & ab his vtrinque foliola minuta, expansa,  
nigra, in summo caule proportionè minora:  
flores iuxta folia purpureos, in quibus semina  
capiti viperarum similia insunt. Radix digito  
tenuior est, & subnigra. Hæc herba Plinij Pseu-  
danchusæ videtur esse. Sic enim is de ea scribit.  
Est & alia similis (Anchusæ) Pseudanchusæ ob  
id appellata, à quibusdam verò Anchusæ, aut  
Doris, & multis aliis nominibus, lanuginosior,  
& minus pinguis, tenuioribus foliis & langu-  
dioribus, &c. Echium hîc ex Matthiolo depi-  
ctum vbique ferè prouenit, in aridis præsertim  
& asperis locis, secundæ Dioscoridis Anchusæ  
non absimile. Flores profert in rubrum purpu-  
rascentes inter minuta folia, ab medio caule ad  
summum, è quibus semen prodit nigrum, hir-  
sutis, spinosisque inuolucris inclusum, vipera-  
rum capitibus simile. Lonicerus vulgare Bu-  
glossum, quo officinæ vtuntur, Echium Dioscoridis esse putat, describitque his  
verbis. Folia circa terram nascuntur, oblonga, tenuia, asperaque, cuiusmodi  
etiam in Anchusæ conspiciuntur, aliquanto tamen minora, & crassa: caules vtrin-  
que à terra foliis tenuibus, pennatis, linguæ similitudine in acutum exeuntibus,  
versus caulis summitatem minoribus sunt vestiti. Flores habet purpureos, stella-  
tos, qui in cæruleos tandem mutantur. Semen flore decidente inuenitur rugosum  
& longius

In Theria.

Lib. 17. c. 5.

Lib. 4. c. 25.

Li. 25. c. 9.

Genera.

In Theria.

Li. 1. c. 25.

Forma.

EX 15. EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

EX 105.

ECHIVM Matthioli.



Li. 22. c. 20.

Locus.

Tomus 2.

ca. 73.





*ECHIVM montanum*  
Dalechampi.



Cap. 102.

Locus.



Vires.  
Lib. 4. c. 25.

Lib. 5. sim.  
cap. 20.

& longiusculum, cuiusmodi in symphyto, sed maius forma caput serpentis referens, gustu dulce. Porro alias duas Echij species idem addit, quibus forma ferè similis est, ac folia Echij superioris similitudinem referunt, in altero tamen minus hirsuta: flore cæruleo, quas Echij silvestris nomine appellat. Id cuius folia sunt magis hirsuta, Echium est à Fuchsjio descriptum, & depictum. Hic quoque depictam plantam herbarij Echium montanum vocant, alij Alopecurum montanum. In montium vdis recessibus gignitur, radice crassa, sensim gracilescente, nonnihil furculosa: caule singulari, terete, rubro, tenero, pedali: foliis Echij, sed non ita asperis, hinc inde è caule prodeuntibus, & cum circumuestientibus, in vertice densius confertis ac stipatis caudæ instar: flore pallido, oblongo, vasculi instar, in caulis cacumine è mediis foliis sese proferente, tenuibus filis geminis præpilato. Rara quidem certè & aspectu pulcherrima hæc est planta. Echij radix, auctore Dioscoride, non modò morbis à serpentibus cum vino pota auxiliatur, sed etiam eos qui præbiberunt conseruat ne feriantur. Idem præstant folia & semen. Sedat dolores lumborum, & cum vino aut sorbitione sumpta lac attrahit. Hæc Dioscorides. Ex quibus colligere licet Echium calidum esse, citra tamen insignem siccitatem, quod lactis procreatricem facultatem habeat. Medicamenta enim Galeno auctore, quia pituitosos humores calfacientia in sanguine



in sanguinem vertunt, lac gignere solent. Galenus in libris simpl. medicamentorū Echij nō meminit, sed Paulus ex Dioscoride his verbis. Echium spinosa herba est, quæ non modò à serpente demorsis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur. Plinius Pseudanchusæ, quam Echium Dioscoridis videri diximus, easdem ferè vires tribuit. Radix, inquit, oleum nō fundit, sed rubentem succum, (Cornarius ex vetere codice emendat, Radix in oleum non fundit rubentem succum: cuius contrarium paulò antè de vera anchusæ dixi, sanguineum scilicet fundere succum, & oleo dissolui, aqua verò non posse liquari. Quidam legunt: Radix illius non fundit rubetem succum, &c.) Et hoc ab anchusæ discernitur. Contra serpentes efficacissima, potu foliorum, vel seminis. Folia ictibus imponuntur: virus serpentium fugat. Bibitur & propter spinam. Cornarius ex veteri codice legit, Virus serpentes fugat: quòd de odore eius dum suffitur, intelligit. Quod vero dicit, Bibitur & propter spinam, videtur id esse quod Dioscorides ait, Πάυλ' ἔχει ἀσφύος ἀλγύμια. Sedat & lumborum dolorem.

Lib. 7.

Embl. 23.  
lib. 4.

Ibidem.

ONOSMA,

CAP. VI.



NOSMA Græcis Latinisq; dicitur, & Galeno teste Osmas, vel Phlomit, vel Ononis. Folia habet, inquit Dioscorides, similia anchusæ foliis, longitudine quatuor digitorum, latitudine vnus, per terram instrata, similimo anchusæ modo. Est autem sine caule, sine flore, sine semine. Radix subest oblonga, infirma, tenuis, modicè rubra. Nascitur in asperis

Nomina

Li. 8. simpl.

Lib. 3. c. 130.

Forma.

Locus.

Li. 27. ca. 12.

*Onosma est planta sine caule, sine flore, sine semine, quæ in asperis locis nascitur, & radix eius est oblonga, tenuis, modicè rubra.*

Vires.

Ibidem.

Li. 26. ca. 12.

Li. 8. simpl.

ONOSMA, Matthioli.



locis. Eadem ferè Plinius habet. Onosma longa folia habet ferè ad tres digitos, in terra iacentia, tria, ad similitudinè anchusæ incisa, sine caule, sine semine, sine flore. Ex qua delineatione nullus est rei herbariæ peritus qui nō coniciat Onosma in anchusis habendum esse, & Lycopsidi, cognatum, quemadmodum & pictura ipsa demonstrat. Folia eius, inquit Dioscorides, in vino pota foetus extrahunt: pragnans si supergrediatur abortum illi facere dicitur. Eadè Plinius tradit. Pragnans si edat eam aut supergrediatur, abortum facere dicitur. Constat enim, vt scribit Galenus, ex acri & amara substantia: quare creditur foetus necare, & eiicere, foliis eius in vino potis.

SCABIOSA MONTANA,

CAP. VII.



OMEN Scabiosa de multis plantis dici sciunt herbarij, vt & de iis quæ hîc depinguntur, vt de ea quam montanam & capitatam cognominant. In terrenis collibus alpinis prouenit, radice crassa, nigra, valde fibrata, sic se crassiori aduoluentibus radiculis aliis, vt in mali figuram quandoque rotundentur: foliis centaurij minoris aut erucæ, crassis, asperis, laciniatis, caule cubitali, interdum proceriore: capitulis cyano aut centaury magno similibus, squamosis: flore puniceo purpurascens: semine oblongo, papporum molli lanugine obuoluto. Scabiosam aliam maiorem vulgarem pinxit Lobellius, Pena descripsit verbenæ Dioscoridis similem, sed latioribus foliis, pullis, hirsutis, in terram procumbentibus, & altioribus incisuris, nec tam Verbenam quàm maiore Valerianam experimentibus. Radix simplex, longior caulem sæpius singularem,

Nomen.

Locus.

Forma.

BBb



*SCABIOSA Montana,*  
*Dalechampi.*



Scabiosa  
peregrina,  
Lobellij.

Pena in  
Aduet.

quantum ferrata: flores Globulariæ aut Scabiosæ. Non omittenda hæc pictura à Lobellio posita Scabiosæ raræ & peregrinæ elegantia, quæ hæcenus incognita non nisi in hortis quibusdam Belgicis spectatur, facie & virgultis Valerianæ rubræ, sed floribus & semine Scabiosæ Hispanicæ. His adiecit Pena Scabiosam omnium mi-

*SCABIOSA Peregrina,*  
*Lobellij.*



*Scabiosa quibusd. p. a  
scabiosa hinc hinc  
typis quæ scabiosa mediet.*

*SCABIOSA Maior vulgaris,*  
*Pena, & Lobellij.*



nimam



SCABIOSA Montana, omnium minima; Pena.



nimam, quæ in montibus cretaceis & incultis  
prouenit, cauliculos habens paucos, tesq; pal-  
mum pedemve altos, foliis in imo sæpius dona-  
tos, angustioribus, floribus dilute purpuræ è  
squamosis capitulis. Alias plantas hic adscri-  
bemus, quas Clusius ad Scabiosas seu laceas re-  
ferendas putat: quarum primam & secundam  
Salmanticensis Stæbes nomine donarunt. Pri-  
ma laceæ nigrae similis folia per terram expan-  
sa habet, Scabiosa, laceæq; foliis latiora, ad ci-  
chorij folia accedentia, mollia, lanuginosa, &  
interdum candicantia: aliquot ex eadem radice  
caules, cubitales aut ampliores, multis alis bra-  
chiatos, quibus inhaerent minora minusq; dif-  
fecta, & mucrone quodammodo spinoso, spi-  
nosa folia: flores in summis ramis villosos, pur-  
pureos, è calicibus squammosis, semen subru-  
fum, cætaurij maioris æmulum, sed minus. Radix  
est longa, candida, digiti interdum crassitudine.  
Huius generis aliam inueniri tradit omnibus  
foliis mollibus & lanuginosis, & erucæ modo  
laciniatis, caule infirmo, ramoso, & in terram  
procumbente, cuius flores superioribus maio-  
res, barbulis exterioribus cyani æmulis, sed purpureis, villi quibusdā luteis inter-  
mixtis, medium florem occupantibus: semen superiori simile, vel cyano: radix digi-  
talis, candida. Secunda numerosa promit folia, secundum radicem, humi sparsa, in-  
cana, oblonga, magnis & profundis incisuris, vt in nonnullis Scabiosarum generibus

Lib. 2. stirp.  
Hist. ca. 38.

res, barbulis exterioribus cyani æmulis, sed purpureis, villi quibusdā luteis inter-  
mixtis, medium florem occupantibus: semen superiori simile, vel cyano: radix digi-  
talis, candida. Secunda numerosa promit folia, secundum radicem, humi sparsa, in-  
cana, oblonga, magnis & profundis incisuris, vt in nonnullis Scabiosarum generibus

SCABIOSA, Seu Stæbe  
Salmantica prior, Clus.



STOEBE Salmantica  
altera, Clus.



STOEBE altera, Clus.  
caule, et in monte STOEBE, a  
Stæbe Salmantica, quod d  
et alius foliis, quod d  
et in monte STOEBE, a  
Stæbe Salmantica, quod d  
quod d



*SCABIOSA Hispanica,  
Clusij maior.*



et extrema folia utcumq; acuminata sint: sed & altera prioris generis ad cyanos referēbāt, altera etiā pro Scabiosa utebātur. His addit Clusius Scabiosā Hispanicā, quæ vulgaris Scabiosæ folia similia habet, laciniata, & altè incisa, mollia, lanuginosaq; caules rotundos, nodosos interdum cubitales, è quorum geniculis folia bina

aut erua: caules plerumq; cubitales, locis autē frigidioribus & humidioribus bicubitales, aut maiores, in frequentes ramos diuisos, folia per ramos sparsa, altè quidem incisa, ut ea quæ ad radicem nascuntur, sed minora multò & breuiora, & in molles quosdam aculeos desinentia: ramorū fastigio insident caliculi argenteis velut squamis cōpacti, unde flos exilit cyani forma, sed purpuræ dilutioris, & medio villosus: semen lanugine quadam includitur ut in lacearū generibus, exiguum, nigricans, summo capite villosum: radix singularis, crassa, & nonnūquam fibrata. Alia autem in hortis Belgicis alitur semine è Gallia misso, huic adeò similis, ut ab ea, nisi à peritioribus vix dignosci possit: etenim folis caliculis, qui tam eleganti argenteo colore non splendent, secernitur. Nascuntur omnes præter postremam, Salmanticē si agro frequentes in aruorū & vinetorū marginibus. Postretum in Gallia, tum in Viennensi agro copiosè. Florent omnes Iunio, Iulio, Augusto: deinde semen proferunt. Salmanticenses, ut diximus, priorem & alteram Stœbes nomine appellabāt,

*SCABIOSA Montana calidarum  
regionum, Lobell. & Pen.*



*SCABIOSA Media,  
Lobellij.*



inter



inter se opposita: summis ramis capitula insidēt ex multis caliculis membranceis & paleaceis cōposita, qui singulos flores continēt candidātes, quibus deciduis, in medio quasi singulorū caliculorū vmbilico, exigua quædā stella subnigra cōspicitur, quatuor, quinq; aut sex radiolis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expaduntur, donec semen hirsutū & crassum (quo caliculi sustinētur) maturefcere incipiat: radix cādida, crassā, vulgari similis. Alia inuenitur, inquit Clusius, huic persimilis, & sola magnitudine distās: est enim per omnia minor, foliisq; tenuiū incisis: caliculi & flores minores, & ex ceruleo colore purpurascētes. Crescit vtrāq; iuxta vinearū margines & semitas, locisq; incultis agro Salmanticensi & per reliquā Hispaniam. Florent mense Iunio. Amara sunt, ideoq; caloris & siccitatis participes.

SAXIFRAGA, CAP. VIII.



VLTI plantis Herbarij Saxifragæ, Officinis Saxifragæ dictæ, nomina imponerunt, à mirifica in comminuendis frangendisq; calculis vi & efficacia. In quibus quædam sunt veteribus Græcis, Latinisq; fortassis incognitæ. Sed de Dioscoridis Saxifraga primū tractabimus. Saxiphagō, inquit, aliqui Sarxiphagō, vel, vt in vulgatis Græcis legitur, Sarxiphragon, aliqui Sarxiphrangon, alij Empetrum, Romani Saxifragam vocant, frutex est furculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino mopotus febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singultum sedat, calculos velicæ frangit, & vrinam ciet. Huic tum facie tum viribus tam apte cōuenit, quæ hic

SAXIFRAGA Vera, Diosc.



ex Matthiolo appicta est, vt genuinā esse nemo nunc dubitet. Nam in aridis, montosis, saxosis, sterilibus & sabulosis Italia, Delphinatus, Gallia, Angliæ locis, vbi Polium montanū & Thymum, prouenit: ramulis in summo sparsis, pedē altis, multis, crebris, exilibus, serpilli, in imo cōtortis vnā & implicatis, geniculatis, in quibus foliola bina ex geniculis, in summo lōgiora & angustiora, Tunica: in singulis singuli flosculi, oblongi, quadātenus Tunica, summa ora simbrati, vel apiculis tenuibus crenati, vbi semen subrubrum, rotundū, exiguum. Radix est parua, non multis fibris huc illuc sparsis capillata, albicans. Huic magna est cum epithymo similitudo: Matthiolus tamen non τὸ ἐπιθυμῶν, sed τὸ θυμῶν in quibusdam codicibus legi ait: quam lectionem magis probat, & Saxifragam thymoadē similem esse scribit, vt nisi gustata ab eo discerni possit. In quibusdam codicibus neutrum legitur. Sed nec totum caput Dioscoridis esse multi putant, idq; inter notha reiecerunt. Aliis non videtur esse adscititium, cū in omnibus

ferè exemplaribus Græcis habeatur. Eandem Saxifragam copiosam nasci, ait Pena, Iulio & Augusto, in accliu, cretaceo, & arido monte inter Chipnam & Malburgū Angliæ, Bristolienfi à Londino via, sed variare floribus, qui longè sunt minores, albidī, non secus ac tota planta. Aliud Saxifragæ genus tradit Matthiolus, quod folia in caulibus per interualla habet, parua, longiuscula, vtrique singula, comitātibus aliis longè minoribus, multis simul ex eadem origine prodeuntibus, quæ in cacumine numerosiora sunt, & breuioribus interuallis distincta. Flores promit in summis caulibus purpureos, odoris nō iniucūdi. Præter has duas Saxifragas, alia tria ge-

Nomina

Forma


Pet. Pen. in Ad.



*SAXIFRAGA Anglica, Pen.*

nera Matth pinxit, quæ ad frangēdos educendosq; renū calculos plurimū valēt. Primū illud est quod in prima Latinorū Commētariorum editione Dioscoridis Saxifragā esse suspicabatur. Nascitur inter magnos ac durissimos lapides, aut sicco & admodum extenuato solo, foliis capillaceis fœniculi modo, sed longioribus, tenuioribus, rarioribus: caule similiter fœniculaceo, tenui, umbella in summitate: semine vulgaris petroselinī, sed longiusculo, odorato: radice albicante, pastinacæ sapore. Tota planta, subacris & subdulcis. Secundum genus est Saxifraga alba seu maior, de qua paulò post ex Fuchσιο & Dodonæo dicemus. Tertium genus, tum à forma, tum ab affectu Saxifragam maiorem appellat à Colzolario pharmacopœo missam. In monte Baldo nascitur, ex viuo ac durissimo lapidē exiliens. Frutex est furculosus caule lignoso, contorto, digiti crassitudine, duris, dentis, ac rimosis furculis stipato, subalbicante exteriorē libro. Folia habet parua, oblonga, in acutū definentia: flosculos albos, & caliculos pallidos, oci-

moidis modo, crenatis oris, in coronæ modum, admodū pusillos, in quibus semen rubrum, papauere minus. Radix altiùs petris inhæret, vt auelli nequeat. Miris laudibus plantā hanc cōmendabat Calzolarius ad calculos è renibus educendos. Saxifragia verò maior seu alba, cuius paulò antè meminimus, à floribus albis, quibusdā Chelidonioides dicta, Gallicè *Romptepierre*, vel *Saxifrage blanche*, Germanicè *Habenstem brech*. Folia fert è petiolis pilosis, rotunda, plurima, humi iacentia, in extremitatibus

*SAXIFRAGIA Altera, Matth.**SAXIFRAGIA III. Matth.*

incisa,



*SAXIFRAGIA Mægra,*  
*Mæthioli.**SAXIFRAGA Alba, Fuch.*  
*seu Saxifraga quarta, Mach.*

incisa, ac veluti cristata, mollia, asarinæ aut hederæ terrestres, minora tamē, & magis  
ex luteo virentia: caules rotundos, villosos, pedales, & sesquipedales in summitate  
flores albicantes, nasturtij colore & effigie, aut crucæ: radicem nigricantem, fi-

*SAXIFRAGA Aurea,*  
*Dodonæi.*

bris multis stipatâ, ex quibus pendent quasi granu-  
la quædam qualia chelidoni minoris, aut semini  
coriandri paria, vel paulo maiora, fusca & obscura  
purpurea, acria, amara, à vulgo semina huius her-  
bæ falsò credita, quorû in medicina vñs est. Mon-  
tibus aridis, saxosisq; locis & arenosis provenit.  
Maio mense floret, deinde statim evanescit. Huc  
inferenda est Saxifraga Alpina, sic dicta quòd fo-  
liis Saxifragiam albam imitetur, & in Alpium ex-  
celsis, niuosis, opacis montibus, sub fagis, abietibus,  
piceis in putri & vliginoso solo nascatur, nec vñ-  
quàm alibi. Crescit ad palmi altitudinem, radice  
breui, in tenuissimas fibras diuisa, subnigra: foliis  
circa radicem tribus aut quatuor, rotundis per am-  
bitû incisis, venosis, longo pediculo subuectis, gu-  
stus amari: caule tereti, in ramulos aliquot diuiso,  
& aliquot folia proferente: flore parvulo, quinque  
foliolis constante, colore è luteo pallescente, & pro-

pemodû herbaceo: semine paruo, rotundo, duro. Temporaria est herba ad primû  
veris teporē: Aprili mense exoritur, statimque interit. Albæ Saxifragiæ flores, folia,  
& præsertim radix, cum gustanti amara sint, calidâ & siccam esse ordine tertio ve-  
risumile est. Radicis cum granulis decoctum ex vino, potu vrinam mouet, calculos  
frangit, & conterit. Stranguriæ itaq; confert: abstergit enim expurgatq; & quæ in  
venis est crassitië, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit, mēses quoq; cit, crassaq;

*Forma.*  
Fuch. c. 285.  
Pena in  
Adu.

*Locus.*

*Tempus.*

*Temper.*

*Vires.*



Dod.lib.2.  
cap.89.  
Pena in  
Adu.

*SAXIFRAGA, Alpina.*

*Locus.*

*Vires.*

cis ferè in maceris, ac veterū ædificiorū ruinis, altitudine cubitali, radice lōgiuscula, digiti crassitudine, fibrata: foliis multis, circa radicē humi iacētibus, figura sonchi, sapore acri, caulibus multis, in quibus folia supradictis minora, atripli marīe similia, subobscurè virētia: flores pusilli, copiosi, è ramulorū pediculis prodeuntes, ex albo herbacei: semen rufum, minutissimum in siliquis gracilibus & longis, feruidi gustus, quod drachmæ pondere sumptum ex decocto radicis graminis, calculum efficacissimè exterit ac expellit.

*SAXIFRAGA Romanorū, Lob.**SAXIFRAGA Aurea, Lob.*

GNA



GNAPHALIVM, CAP. IX.

**M**

VLTA plantae gnaphalia herbarij nuncuparunt, quod molli lanugine seu lana vel tomento essent obuoluta. Est enim Græcis γνάφαλον, vellere, carperéve lanas, aut pannum, seu vellicando & deradendo expolire, unde γνάφαλον, tomentum quod culcitris infarcitur, & quorū natura mollis, candida, & omnino lanea est, γνάφαλον appellatur, cuiusmodi sunt

GNAPHALIVM

vulgare, Fuch.



GNAPHALIVM, Match.



dictāni folia, quæ Dioscorides γνάφαλον vocat, id est, tomentosa seu tomentitia, tomento quodam pubescentia, siue mollia tomenti modo. Gnaphalium igitur herba dicta, quod foliis eius mollibus & candidis pro tomento vterentur, auctoribus Dioscoride & Galeno, à Latinis Centunculus & Centularis herba, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio, & Tomentaria seu Tomentitia. Aliquot gnaphalia iam exposuimus in maritimis plantis, de aliis hic dicemus, ac primum de vulgari, quod filago nominatur, Gallis *Herbe à cotton*, Germanis *Rhunkraut*, ab eius facultate aduersus dysenteriam.

Filago multos profert cauliculos ex vna radice, rotundos, graciles, cinericios, lanugine seu molli lana reftos, reftos, sapius sine furculis, in quibus folia crebra, longiuscula, angusta, mollia, villosa, stæchadis citrinæ foliis similia, nisi q̃ longiora sunt, latiora, & paulo viridiora. Flores glomeratim oriuntur in summis furculis, cauliculisve, non tam lutei quàm stæchadis citrinæ, sed sublutei & pallentes. Duūm videtur esse

generum, inquit Fuchsius. Vnum enim paulo latioribus ac candidioribus foliis constat, alterum tenuioribus, & minus candidis. Illud flores fert partim mediis furculorum diuarcationibus, partim extremis furculis: hoc in cacumine tantum. Dodonæus tria eiusdem genera facit,

primum genus Impiam herbam esse Plinij censet, sic dictam quoniam liberi super parètes excellant, id est, postremo geniti flores prius genitos superant. In eadem sententia est Matthioli. Tragus amaranthi lutei, seu Tineatæ, seu Elichrysi Theophrasti syluestris genus facit. Alij filaginem ad stæchadem citrinam potius referendam censent. Aridis & sterilibus locis potissimum prouenit. Iunio & Iulio mensibus floret. Adstringit & exsiccatur Gnaphalium. Bibuntur, auctore Dioscoride, efficaciter eius folia in vino austero ad dysenteriam. Et Galenus, Gnaphalij folia, inquit, modicè adstringunt, ac proinde quidam exhibent ex austero- rum vinorum quopiam ad dysenterias. Item Plinius. Datur in vino austero ad dysenteriam

ventris

Nomina γνάφαλον

seu γνάφαλον est

flores stæchadis

caulis fulonis ac

panne seu toment

Lib. 3. c. 31.

seu stæchadis

seu stæchadis

seu stæchadis

Lib. 3. c. 31.

Lib. 6. l. 11.

q̃ in stæchadis

caulis fulonis

seu stæchadis

seu stæchadis

seu stæchadis

Dodo. lib.

1 cap. 60.

Penain

Ad.

Cap. 8.

Genera.

Ibid.

Lib. 24. c. 19

In cap. 115.

lib 3.

Lib. 1. c. 109

Pena in

Ad.

Locu.

Tempus.

Temper.

Vires.

Lib. 6. l. 11.

Lib. 27. c. 10



## GNAPHALIVM

Montanum, Dalech.

Locus.

Forma.

Lib. a. c. 40.

Cap. 22.  
Pet. Pe. in  
Ad.

ventris solutiones, mensesque mulierum sistit. Infunditur autem tenebrio. Illinitur & putrescentibus vlcerum. Similiter Filago dysentericis, & profluuiis immoderatis non parum utilis est. His Gnaphalii generibus cognatum est, quod Montanum vocant docti herbarij, quia in excelsorum & frigidorum montium summis verticibus prouenit, radice subnigra, breui, fibrata, multisq; villis tenuibus & prolixis capillata, foliis propè radicem densius congestis, in caule paucis, oblongis, albis, tomento lanuginosis: caule dodrantali, rotundo: flore in summo eius vertice nunc luteo, nunc ex albo rubescente, in orbem umbellæ instar conformato. Quidam pilosellæ genus esse volunt. A superioribus Gnaphaliis hæc discrepat floris colore, qualem diximus, in illis luteo: folio latiore, in illis angusto: & quod humilis sit, caulèque singulari, nec furculoso: illæ verò proceriores, fruticosæ, caulèque in furculos supernè diuiso. Tragus aliud Dioscoridis Gnaphalium esse censet, videlicet Linum pratense, & Lanam pratensem herbarijs dictam, Germanis *Matthenfleischs*. Est autem iuncea graminis genus, de quo inter palustres diximus. Iuncum bombycinum alij vocant.

## SONCHVS LANATVS, CAP. X.

Nomina

Locus.

Forma.



OMENTITIIS coniungi debet Sonchus lanatus, sic dictus à candore, & mollitie ad tactum manus suavi, in tota planta, præsertim in capitulis florem promētibus. Gignitur in saxosis & apricis, radice dimidio pede longiore, candida, fibrata, foliis sonchi, rugosis, laciniatis, sed magnis ex interuallis, multis, costa candida supernè diuisis, per totum caulem nascentibus, lanugine pubescentibus, ad quorum radices cauliculi exoriuntur, caule est cubitali, anguloso, in ramulos supernè diuicato, in quorum verticibus capitula eminent, suavi tomento villosa, Soncho similia, quæ in aureum florem explicantur. Tota planta lacteo succo turget cichoriæ dum more, gustuque amaro prædita est, sed minùs quàm reliqua cichoriæ, quorum & facultatem obtinet, licet imbecilliorum. Quidam hanc Molluginem ob causam supradictam appellant, quamuis à Plinij Mollugine diuersa sit. Floret Iunio mense.

SIDE



**S**IDERITIS Græcis, Latinis quoque Sideritis, sic dicitur à ferro, quasi ferruminatrix, quòd vulneribus ferro factis perutilis sit, vel quoniam glutinandis vulneribus apta, præcipuum in bello habeat vsum, quod sæpe ab eo metallo in Græcis scriptoribus indicatur. Sed cum permultæ sint plantæ, diuersi etiam generis, earumque insignes, quæ ferro fauciatis partibus, vel vulneribus in bello acceptis opem polliceantur, ac ob id Sideritides, & Stratiotides, id est, militares, meritò nuncupandæ, de omnibus hæc minimè dicendum. Satis enim benè studiofis consultum fore putamus, si ea, quæ à Dioscoride descriptæ sunt, & pauca quædam aliæ illis possint innotescere. Is tria facit sideritidis genera. Prima est Sideritis heraclea, siue ferruminatrix herculeæ, fortassè à viribus efficacissimis, & planè herculeis, quæ folia marrubio similia habet, inquit, sed oblongiora, ad saluicæ aut quercus folia accedentia, minora tamen & aspera: caules edit quadrangulos, palmares, aut etiam maiores, gustu non insuaues, & quodammodo subabstringentes, in quibus per interualla verticilli rotundi velut in marrubio, & in ipsis semen nigrum. Nascitur in petrosis locis. Altera Sideritis ramos habet bicubitales, tenues, folia in pediculis longis similia foliis filicis, multa, vtrinque in summo fissa, ex superioribus alis propagines longas, tenues, in summo globi speciem referentes, capitulum habentes asperum, in quibus semen betæ semini simile, sed rotundius & durius. Sideritis tertia, quam Crateuas etiam heracleam vocat, nascentem in parietinis & vineis, folia habet multa ab vna radice, coriandro similia, circum cauliculos palmares, laues, teneros, subcandidos: flores puniceos, paruos, gustanti amaros, lentos. Plinius de achillea, quæ etiam sideritis nominatur, agens, mox ob cognationem de Sideritidis generibus subiungit hæc verba. Aliqui & hanc (Achillea subaud.) Panacem heracleam, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quam sceniculi foliis vestitam ab imo. Alij fatentur quidem illam vulneribus vtilem, sed veram achilleam esse scapo caruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Alij quadrato caule, capitibus marrubij, folio quercus. Hanc etiam præcisos neruos glutinare ferunt. Alij Sideritim in maceris nascentem cum teritur, fædi odoris: Etiamnum aliam similem huic, sed candidioribus foliis, & pinguioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Aliam verò binum cubitorum, ramulis exilibus, triangulis, folio filicis, pediculo longo, betæ semine, omnes vulneribus præcipuas. Nostri eam, quæ est latissimo folio, scopas regias vocant. Medetur anginis suum. Hæc Plinius satis indistinctè, vt tamen agnosci & intelligi possit, primam Achileon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam, Achilleon veram, scapo caruleo, &c. esse Myriophyllum Dioscoridis. Tertiã quadrato caule, &c. esse Sideritin Heracleam primam Dioscoridis. Quartam in maceris nascentem, &c. esse Heracleam Crateuæ, apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed foliis candidioribus, &c. esse tertiam Sideritin Dioscoridis.

Nomina

Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 29.

Locus.

Lib. 25. c. 5.

SIDERITIS Prima,  
Matthioli.






Lib. 8. sim.  
In cap. 29.  
Lib. 4.

scoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam. Galenus vnus duntaxat Sideritidis meminit. Matthiolo prima Sideritis videtur esse ea quæ hîc primo loco expressa est, quod notis omnibus, vt ait, eam referat: nec aliud ob stare putat, quàm quòd ea frequentius nascatur humidis quàm siccis locis: quamquam sepè eandem virentem in locis quoq; siccis se inuenisse affirmet. Huic tandem sententiæ, veri

*SIDERITIS Secunda,  
Matthioli.*



*SIDERITIS Tertia,  
Matthioli.*



*SIDERITIS Quarta,  
Matthioli.*



Lib. 3. c. 92.  
Cap. 294.

incertus aliam substituit, his verbis: Id itaq; tantum in causa est, vt hanc non ausim omnino legitimum facere Sideritim, præsertim cum aliam nunc repperim plantam in Viennensi agro, ac aliis Austriæ locis, arido in solo, quæ sideritim primam perbellè refert. Exit enim quadrato caule, ipsoq; dodrantali, aut maiore, ramosoque, foliis marrubio longioribus, & ad saluix faciem accedentibus, crispis & albicantibus, per ambitum laciniatis, sapore haud ingrato: floribus verticillatim in caule prodeuntibus marrubij modo, vt ex appicta imagine perspicere licet. Deinde Ruellium & Fuchsiu viros de re herbaria benemeritos erroris insimulat, quòd primam sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbariis & Officinis barbaro nomine Tetrahit, aliis Herba Iudaica nominatur. Postremo duas alias sideritides depinxit tantum, nulla prorsus aut figuræ, aut virium facta mentione, quas hîc quoq; expressimus. At periti & exercitati herbarij, tum Ruellio Fuchsioq; ætate superiores, tum inferiores multis rationibus inducti Tetrahit siue Iudaicam herbam, primam, siue heracleam



TETRAHIT, Herba Iudaica  
Sideritis prima, Fuch.



TETRAHIT, Sideritis Hera-  
clea Dioscoridis.



cleam Sideritidem esse censuerunt. Primum om-  
nes delineationis Dioscoridis notæ respondent.  
Nam folia habet marrubij cretici, sed longiora,  
& angustiora, incana, scabra & crispa, ambitu la-  
ciniato, vt chamædrydrys, aliquando laciniosa di-  
uisura obscurius apparente in quibusdam fo-  
liis, quæ fortassè causa fuit cur Dioscorides illa  
modò cum quercus, modò cum saluar aut mar-  
rubij foliis contulerit. Caules fundit modò de-  
pressos, modò surrectos, palmum sæpius exce-  
dentes, & pedales, quadratos, duriusculos, ter-  
nos aut quaternos, asperos & pungentes, non  
iniucundi gustus, aliquantum adstringentes,  
quos verticilla per intervalla coronant, vt in  
marrubio Cretico videre licet: flores sunt albi-  
cantes ex diluta purpura, vel lutei: semen nigrum,  
radix lignosa, marrubij. Ad hæc arida, petrosa,  
fabulosa, & inculta loca perpetuò amat. Iunio &  
Iulio mensibus floret, nec desinit nisi autumnii  
fine. Præterea vehementer exsiccat & adstrin-  
git, ad vulnera curanda planè nata, magnoque  
multorum còmodo cognita practicis quibusdã  
Iudæis, qui hac enterocelas, & alba menstrua cu-  
rant, inde Iudaicæ nomen adepta, quæ cum Dio-  
scoride cògruunt, scribente folia imposita vim  
habere glutinandi vulnera, & arcendi inflam-  
mationes. His Galenus adstipulatus, Sideritis,  
inquit, phlegmonem sedat, & glutinat. Item Pli-  
nius, Sideritis tantam vim habet, vt quamvis re-  
centi gladiatoris vulnere alligata sanguinè clau-  
dat. Quare hæc prima Sideritis Dioscoridis fue-  
rit, non herba illa Iudaica, cuius meminit Aui-  
cenna, quæ nihil aliud est quam eruum. Mat-  
thioli verò Sideritis prima, minimè Sideritis di-  
cenda, quòd notæ eius multæ ei planè refragen-  
tur, sed Penæ sententia marrubij potius aut ver-  
benæ species, quam ob id herbarij marrubium  
palustre, siue aquaticum vocant, de quo in palu-  
stribus diximus. Altera autem quam illi substi-  
tuit, cannabis silvestris est herbariorum, neutra  
ad vulnerum curationem commendata. Dodo-  
næus sideritidem primam herbam eam esse pu-  
tat, quæ Cardiaca ab herbariis nominatur. Side-  
ritis secunda Dioscoridis multorum doctorum  
iudicio nostra est Pimpinella, cuius partes om-  
nes, qui cum Dioscoridis descriptione conferre  
voluerit, has ei prorsus còuenire perspiciet, vt ex Sideritidis delineatiõe superiore,  
& iis quæ de Pimpinella alio in libro diximus, intelligere licet, etiã suffragante in  
Chio insula eius vernacula appellatione, in qua etiam hodie Sideritis appellatur.  
Iam verò curandis vulneribus perutilis est, vnde ei sanguisorbæ nomē. Sic secunda

*Sideritis prima*  
*Herba Iudaica*  
*Sideritis prima*  
*Herba Iudaica*

Locus.  
Tempus.  
Temper.  
Vires

Lib. 8. sim.  
Lib. 26. c. 13

Lib. 2. c. 329

Cap. 47.

Lib. 1. c. 187.

Pena in  
Aduer.

De palu.  
cap. 73.



Lib. 4. c. 30.  
In cap. 31.  
lib. 4.

Pen. in Ad.

Lib. de iis  
quæ in vm  
bro. cap. 33.

And. Lac.

Locus.

Sideritidis feminis foliorūq; vis, inquit Dioscorides, ad vulnera præcipua est. Qui verò sint illi nescio quos Matthiolus reprehendit, quòd hanc tertiam Sideritidem faciant, eum ei folia coriandri non sint, nec eadem circa caules oriantur, sed pinnata ex longo vtrinq; pediculo exeant: præterea quòd caules præduros habeant, non teneros, ac etiam quòd flores capitulaq; non amaro, nec lento gustu sint, sed astingenti, & austero. Nullus enim est tam ignarus, qui nō perspicue videat Pimpinellā cum secunda, non cum tertia Sideritide prorsus conuenire. Quæ tertia Sideritis, Cratææ herculeæ, in maceris & vineis nascitur eorundem peritissimorum herbariorum sententia, nostras est herba Roberti notissima, foliis coriandri, inter gerania à nobis descripta, non solum vulneribus & sanguinis eruptionibus, verum etiam vulneribus, & potionibus vulnerariis vtilissima, quod & de Cratææ herculeæ tradidit Dioscorides, eam nimirum huius esse vim, vt quamuis recenti vulnere imposita sanguinem supprimat, interprete Ruellio, cum Græcè legatur, καὶ ταύτης ἡ δύναμις ἐπιτίθμεναι κολλητικὴ ἐναιμίων, καὶ νεοτρώτων. Id est, Hæc etiam imposita vim habet glutinandi cruenta, & recentia vulnera. In veteri tamen codice legitur, ἐναιμίων καὶ νεοτρώτων, id est, cruenta, & vulneratos neruos, sed prior lectio melior. Sideritides alias viri in re herbaria exercitati approbarunt, quas hîc apposui. Primùm eam quam Monspeliensium Schola præter herbam iudaicam nouit, in agro Monspeliensi frequentè, locis nimirum pinguibus, & triticeæ messis fertilibus, radice crassa, valde fibrata, caulibus multis, cubitalibus, angulosis, tactu asperis, furculosis: foliis saluæ longioribus, latioribus, per oras diuisis, scabris, geminis semper, caulem & furculos per interualla amplectentibus, ex quorum veluti sinu flos emicat, verticillato ambitu, densus, puniceus: semen in hirsutis vasculis, vt in marrubio. Hanc Pharmacopœi Monspelienses Herbam venti vocant, quòd eius folia tota pertusa & vento peruia cernantur, vt mox dicetur. Itali Verbasci siluestris speciem, periti quidam Othonnam Dioscoridis, quòd arefcenti herbæ folia non defluant, sed per hyemē in planta ipsa remanentia, siue à tuncis, siue ab aëris frigidi occurfu sic eroduntur,

*SIDERITIS, Monspeliensium.*



*HERBA Venti, Parietaria Cordi, Sideritis genus.*



*Forma.* liensi frequentè, locis nimirum pinguibus, & triticeæ messis fertilibus, radice crassa, valde fibrata, caulibus multis, cubitalibus, angulosis, tactu asperis, furculosis: foliis saluæ longioribus, latioribus, per oras diuisis, scabris, geminis semper, caulem & furculos per interualla amplectentibus, ex quorum veluti sinu flos emicat, verticillato ambitu, densus, puniceus: semen in hirsutis vasculis, vt in marrubio. Hanc Pharmacopœi Monspelienses Herbam venti vocant, quòd eius folia tota pertusa & vento peruia cernantur, vt mox dicetur. Itali Verbasci siluestris speciem, periti quidam Othonnam Dioscoridis, quòd arefcenti herbæ folia non defluant, sed per hyemē in planta ipsa remanentia, siue à tuncis, siue ab aëris frigidi occurfu sic eroduntur,

*var. rhynchospora*



*SIDERITIS, Querno folio, Dalechampij.*



duntur, vt absumpto reliquo eorum corpore durantibus, venosis, neruosisq; fibris, eo textu quo à natura reticulatim sunt implexæ, cribri modo pertusa appareant, & quasi à blattis exelæ, quod apud Dioscoridẽ othonnẽ poscit historia. Alia herbariorum vulgò sideritis pratenfis rubra nominatur, ob exiguâ quendam cum Tetrahite officinarum foliis similitudinẽ, quam sideritidem appellari diximus. In pratis & humidis locis prouenit. Radicem mittit lignosam, breuem, nigrâ, in multas radículas diuisam: caules multos, quadratos furculosos: folia multa, parua, in ambitu nonnihil diuisa, gustu perquàm amara: florem copiosum, obscure purpurascens, luteis apicibus è medio prodeuntibus: semen minutulum in latis caliculis alines modo. Est & iisdem sideritis pratenfis lutea dicta, quæ in siccaneis pratis nascitur, flore, furculis, fructu, gustu, superiori similis, nisi quòd flos omnino luteus est: foliis autem distat, quæ longè minora sunt & angustiora, nec per margines incisa. Item aliud hîc etiam pictum Sideritidis genus statuunt herbarij, quòd recentia vulnera ferro illata solidet: quòd folia quernis affinia sint, minora tamen, in ambitu dissecta, subaspera: quòd caules per inter-

stitia rotundæ vertebræ, vt in prassio coronent, quæ omnia in Sideritide prima Dioscor. requirit. Aliam hîc quoq; appositam Sideritidis generibus adnumerant, quæ in umbrosis reperitur, inter saxa, & muscosos lapides, radice breui, nigra, fibra-

*SIDERITIS, Pratenfis rubra.*



*SIDERITIS, Pratenfis lutea.*





*ALIA, Sideritis.*

nec ingrata, vfu nullo explorata.

ta: caulibus multis, nunc surrectis, nunc pervicina  
repentibus: folio marrubij, longiore, in ambitu  
valde inciso: flore luteo, aut pallido, verticillatim  
caulis superiora ad foliorum exortum circumdante,  
marrubio simili. Sideritidem Monspeliensem Pena  
depinxit & descripsit palmum & sesquipalmum al-  
tam, viticulis angulosis, rectis, multis, aridis, ligno-  
sis, coma & verticillis hyssopi, foliis, facie, colore  
scordij Dioscoridis, sed minoribus, magis rugosis,  
rigidis, crispis, pilosis quàm tetrahit Iudaicum, nec  
minùs laciniosis, sed hirsutioribus, flosculis saturciæ  
vulgaris ad foliorum articulos, gustu amaricante  
& exsiccante, nonnihil aromatici suavisque spiran-  
tibus, quod Chamædryn aut betonicam refertat.  
Aliam ex Sabaudia Alpina pictam exhibuit, quam  
Sideritidum vnam esse opinatur, & satis quadrare  
heracleæ sideritidi, ni folia angustiora multò essent,  
vique efficaciore carerent: alioqui verticillatos cir-  
ros habet, asperiusculos, pallidos, marrubij aut tetra-  
hit, viticulas multas, tenues, lignosas, nec quadratas,  
binum palmorum: radicem flexuosam, prolixam,  
lignosam, pullam, amaricantem gustu, præficcam,


*SIDERITIS Monspeliensis, Pena.**SIDERITIS Montana, Pena.*

POLY



**P**OLYGONON ἀππεν Græcè, Latine etiam Polygonum mas, Seminalis, Sanguinalis, & Sanguinaria, Proserpinaca, Arabibus *Bastirahagi*, Officinis Corrigiola, & Centinodia, Gallis *Renouee malle*, & *Corrigiole*, Italis *Poligono majo*, & *Corrigiola*, Germanis *Vuegrasz*. Polygonum à geniculorum frequentia & multitudine dicitur, seminalis à seminis multitudine, sanguinalis à cohibendo sanguine, proserpinaca à serpendo. Polygoni duo genera facit Dioscorides, marem & fœminam. De hoc in palustribus, de illo nunc dicemus, & de aliis generibus quæ recentiores herbarij adinuenerunt, de marino agemus in maritimis. Polygonum mas, ut describit Dioscorides, herba est ramos habens tenues, teneros, multos, geniculis cinctos, repentes per terram velut gramen, folia rutæ similia, sed longiora & molliora (impressi codices habent ἐπιτεκτέρα, cum legendum sit ἐπιμηκέτερα, id est, longiora, adde etiam μαλακώτερα, id est, molliora: sic enim Oribasius legit, quem secuti sunt interpretes:) fructū iuxta singula folia fert, unde mas vocatur: florem candidum, aut puniceum. Breuius sic Plinius; Polygonum Græci vocant, quam nos sanguinariam. Non attolitur à terra, foliis rutæ, semine graminis. Nascitur passim, quotidieq; pedibus conculcatur in aggeribus & semitis, item secus arces, & compita. Aestate floret. Vis epti succi est spissare, ac refrigerare. Prodest cruentæ excreationi. Sic Ruellius Græca exemplaria secutus, quæ sic habent. Δύναμιν δὲ ἔχει τρυπλικὴν, ψυκτικὴν ὁ χυλὸς πινόμενος, ἀρμόζει δὲ, &c. In aliis verò legitur, Δύναμιν δὲ ἔχει τρυπλικὴν καὶ ψυκτικὴν, ὁ δὲ χυλὸς πινόμενος ἀρμόζει, &c. id est, Vim adstringentem habet & refrigerantem: succus verò potus prodest sanguinē spuētibus, alui fluxionibus, cholericis & vrinæ stillicidio, vrinam enim euidenter ducit. Cum vino potus venenatorum moribus auxiliatur. Valet etiam ad febrium circuitus hora vna antè accessiōnem sumptus, muliebri profluuium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum vino decoctus, melle adiecto, eximie ad genitalium vlcera facit, folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectionem, herpetas, erysipelata, inflammationes, & demata, & vulnera recentia illinuntur. Eadem ferè Plinius habet. Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum vino cuiuslibet partis profluuium, excreationesque purulentas inhibet. Vis eius est spissare, ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatismos cohibet, qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur, vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiōnes, duobus cyathis in tertianis, quartanisve præcipue: item cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi. Polygonum, inquit Galenus, ut adstrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicamentorum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exsiccatorium. Quare quibus stomachus æstu feruet, extrinsecus illitum auxiliatur, veluti etiam erysipelata, & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones re-

POLYGONVM MAS.



*Nomina* ὀνυ γενόμενος  
proles, poma, poma, poma  
ἡ ὀνυς ἡνὶ πάλυ  
vor, poma, poma, poma  
Lib. 4. c. 4.  
Genera  
Cap. 13.

Ibidem.  
Forma

Lib. 27. c. 12

Locus.  
Tempus.

Lib. 27. c. 12

Lib. 8. m.



primis, & hac ratione videtur exsiccatorium esse. Quare cum herpetum tum vlc-  
rum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione & flu-  
xione laborantium partium. Est & cruentorum vulnorum glutinatorium. Sed &  
animum vlcerebus prodest: ut vel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Eadē  
ob facultates, & muliebri profluuiū & dysenteriam, & sanguinis eiectiones, & vn-  
decumque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & vri-  
nam prouocet exhibitum stillicidio affectis, non tamen affectum accuratē distin-  
guat, quo dari ipsum expedit: quamuis probabile sit vring subtillo cōuenire, quod  
accidit renibus impacto lapillo, arenosave, aut crassa quadam materia, quoniam vim  
habet calculum frangendi, vt & Herniaria, proculdubio eius species. Pena alia Po-

*POLYGONVM Montanum*  
*niueum, Pena.*



*POLYGONVM Alterum*  
*Serpylli folio, Pena.*



*POLYGONVM*  
*Herniariae folio.*



Lib. 2. stir.  
Hlspa. c. 92  
91.

lygoni genera pingenda curauit. Primum mōta-  
nam minimum, niueum & sericeum, herbula est  
vix vnciam & semūciam aquans, densis confer-  
tisq; ramusculis, sarmentosis, duriusculis, densis-  
simis geniculis, & foliorum quasi denticellis, her-  
niaria aut thymi tenuifolij foliolis minoribus,  
per parua interstitia visu vix discernēda. Eximio  
vellere sericeo, & niueo candore lucentibus glo-  
merulis foliaceis, delicatissimis, tenuissimisque  
membranulis contexti flores vniuersam superne  
plantam ornant & occulunt: exilis radix, lignea,  
& quā cauliculi longior: semina paruula, acero-  
sa, erythrodani marini vix visu capi queunt prae  
exilitate. Alterum rarum & haecenus indictum,  
ramulis & cauliculis est furculosis, prolixis, gra-  
cilibus, Serpylli, humi sparsis. E' geniculis foliola  
prodeunt pusilla, teretia, succulenta, thymo par-  
uo nostrati aequalia & similia, radix praelonga  
lignosa, sapore amaricante, calidiusculo. In colli-  
bus maritimis Galloprovincia non secus ac her-  
niaria luxuriat. Tertium non minus rarum quā  
superius



POLYGOINI Hispanici genus Clusij.



superius. Est perpusilla herbula & humi accumbens, cespite tenuibruta, ramulis creberrimè geniculatis: foliolis & seminibus parvis, albidis, prorsum herniaria: tota incana, flore muscolo, valde exiguo: radice amphiore quàm pro plantæ modo, dura, furculosa,

implexa, & in se reticulatim conuoluta, auulsu difficili, gustu præsiccò, calidiuscula. In amplissima Creta Salonensis Galloprovinciæ planitie, media via inter Arelatem & Salonam prouenit ad diuersorium D. Martini. Eandem plantam Clusius Polygoni maris genus esse arbitratur, eamque graphicè depinxit his serè verbis. Multis viticulis per terram sternitur, dodrantalibus magna ex parte, sed interdum etiam pedalibus, aut longioribus, geniculatis, foliis Polygoni maris, minoribus, & in nouella planta virentibus, deinde temporis spatio confertissima & numerosa admodum adnascuntur foliola acerosa & membranæa, omnino alba, sic ut tota argenteis squamis constare videatur gratissimo spectaculo: flos candidus Polygoni, sed adeò parvus & inter membranulas istas latens, ut vix conspicitur: semen Polygoni: radix candicans, oblòga & tenuis. Nusquàm abundantius prouenire ait, quàm in collibus petrosis & siccis Salmanticæ vicinis, trans flumen Thormi: item circa Valentiam & Murciã: se etiã vidisse in eodè quo Pena loco, nepe lapidoso illo campo supra Arelatè, nò procul à D. Martini diuersorio, qua Massiliã

Lib. 8. Hist. Hæp. ca. 9.

CHRYSOCOME

Lanuginosa. Dalich.



iter est, sed multò minorè, & vnciã vix excedentem. Floret Maio & Junio, deinde semen profert. Marciani vulgò Asprilla vocant, à foliorum exsuccorum fortasse asperitate. Salmanticenses & Valentini Paronychiam vocat, cum tamen etiam Clusij indicio nihil aliud sit quàm Polygoni maris genus peculiare, ut diximus. Etenim cum primùm è semine prodit, à sanguinaria vulgari nihil differt, & commendata eodem gustu deprehenditur.

CHRYSOCOME LANUGINOSA, χρυσόμορος λανυγινώσα

CAP. XIII.

**H**ÆC à florum colore & foliorum lanugine, Chrysocome lanuginosa herbariis dicta, in aridis collibus Alpium, & sabulosis cliuis gignitur: radice nigra, crassiuscula, plurimis exilibus fibris capillata, Ellebori nigri modo: caulibus multis, palmum altis, foliis hyssopi vulgaris longioribus, canis, villosis: flore aureo, ad foliorum exortu, quæ superiora caulibus parte prodeunt, in pappos abeunte. Quidam imitè à Plinio memorata genus esse putant, quod doctis herbariis iudicandum relinquimus.

χρυσόμορος λανυγινώσα

Nomen.

Locus.

Forma.



## HERNIARIA,

## CAP. XIII.

Nomina

sive Herba Turca.

Lib. 1. c. 187.

Locus.

Forma.

Vires.



VERBASCVLVS

Alpinus.

u. d. Don.

Nomen.

Locus.

Forma.



**V**IDAM plantam istam Lithontribon ab effectu, vt & Herniosam, siue Herniarium vocant, nonnulli Herbam Turcam, Cordus Millegranam, Itali *Centogranam*. Tragus Empetrum, Anguillara Epipactida, alij Elleborinè Dioscoridis esse censent. Sunt qui nec sine ratione Polygoni speciem faciunt. Matthiolus Polygoni minoris nomine, depinxit. Crescit in sabulosis, aridis & perflatis, in aruis & oliuetis Narbonensis Gallia, vt circa Monspelium, radice quatuor, aut quinque digitos longa, sensim gracilescēte, modicè fibrata: ramos edit teneros, numerosos, densos, surculosos, exiles, per terram repentes, folia lentis, valde parua, albescentes minimæ minora, crebra, semina numerosissima, inter foliola & sub singulis cōgesta, triplicis & Polygoni minora, flosculi luteoli, multi, tribuli terrestris multò minores, nec dissimiles. Tota ex herbaceo flauet. Experimentis multis certisque constat herbæ huius succum vino albo expressum, & potum, efficacissimè renum calculos comminuere, & exterrere: item eximiè valere ad ramices & hernias, vel si trita, imponatur extrinsecus: vel si bibatur succus: vel si arida & tusa cochlear detur. Prodesse etiam dysentericis aiunt, & sanguinis eruptionibus, & aduersus viperarum & cæterarum venenatarum animantium venena, tum sumptam, tum foris impositam. Stillatitia eius aqua octo dierum spatio hausta, hepatis obstructiones, & icterum persanare proditur.

VERBASCVLVS ALPINVS,  
CAP. XV.



**A**B herbariis verbasculus Alpinus, siue Caruleus dicitur, proueniens in asperis & opacis Alpium tractibus, radice breui, fibrata, candicante, foliis circa ipsam densis, humi procumbentibus, oblongis, læuibus, tribus aut quatuor cauliculis, pedalis, minimè foliosis: flore caruleo in caulium cacumine, ferè instar umbellæ coaceruato, speciosissimo, ac pulcherrimo.

VALE





**V** H v Montanum siue Valerianam Montanam herbarij plantam istā vocant, quòd odore, sapore, flore Phu vulgare æmuletur. Gignitur in opacis & vdis montium saxis, radice è nigro subrufa, dura, lignosa, parùm fibrata: foliis propè radicem multis, longiusculo pediculo nixis, asine aut perdicio fere similibus, in caulibus paucis, & iis semper geminis, caulem ima sui parte amplectentibus: flore Phu simili, purpurascēte, odoris perquàm iucundi. Pena Valerianam aliam minimam pinxit, flore & umbella ex candido purpurascēte, thlaspi, & foliorum diuisura Valerianæ siluestri minori similem, sed illa adeò sunt exigua, vt minoris Aiugæ folia æquent. Radix candida, exilis, & nardi penè infinitis fibris similis, odore Valerianæ silvestris minoris. Interdum montosis locis è saxorum rimis erumpit, interdum in segetibus, vt propè Monspelium. Lobellius Phu minimum alterum exhibuit, Gallobelgis *Sallade de chanoine*.

*Nomina a valendo  
dicuntur quia multa  
sunt virtutis  
Locus.*


*Forma.*

ne, Belgis *Beltropen*, quasi dicas lactucam campestrem, quia folia primo pullulatu habet lactucis aut feridis adhuc tenellis similia, & in Quadragesima cibo & acetariis experatur lactucarum modo. Frequentissima in agro Antuerpiano. Flos & radix Monspeliacam æmuletur, folia minùs laciniata.

PHV Minimum.



PHV Minimum alterum, Lobel.



*Phu a fuci it quia  
imitatur flos quia  
it fa.*

AIZO







*AIZOON Maius, siue Semperuium minus, Dodon*



similem circumscribentia. Aizoon minus cauliculos habet ab vna radice multos, plenos: foliolis rotundis, pinguibus, paruis, in summo acutis. Emittere & e medio caulem, umbellam & flores pallidos seu luteos sustinentem. Sic enim interpretari  $\chi\lambda\omega\rho\alpha$  oportet, non herbidos, vt Ruellius vertit.  $\chi\lambda\omega\rho\alpha$  enim hoc loco, vt alias sæpè, pro  $\alpha\chi\rho\alpha$  accipitur, id quod etiam ex Serapione constare potest, qui locum hunc Dioscoridis sic traduxit Et habet virgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Videtur, inquit Dioscorides, tertium Semperuii genus esse, quod foliola habet crassiora, ad portulacæ folia accedentia, densa. In qua Diosc. descriptione nihil ambiguum, nihil obscurum dici potest, nisi in dictione  $\delta\lambda\alpha\upsilon$ , quæ hîc, vt plurimis aliis in locis, non pilosum neque hirsutum, sed densum, rigidum & compactum significat. Ex aliis verò descriptionibus perspicuum vera hîc Dioscoridis Aizoa depicta esse. Ac primum quidem, omnes Aizoon maius fatentur esse. Secundum, siue minus, id esse, quod Do-


*ἡ αὖ ἀπὸ τῶν ἐλ.  
μῖν αἰῶν ἐλ. μῖν  
ἀεὶ ἐστὶν ἀδυνάτου  
περὶ τοῦ, ἡνίκα  
ἀεὶ ἡ αἰῶν ἐλ. ἐστὶν  
ἐμφανέως*

Cap. 350.

donæus Semperuium minus, Fuchsius Sedum minus mare vocat, clarè demonstrant ramuli à radice tenui graciles, edentes foliola angustiora, rotundiora, minor, carnosa, acuta, salicorniæ colore & modo: flosculis aureis, stellatis. Præterea iidē

Cap. 10.

*AIZOON Minus, siue Semperuium, Dodonæi.*



*AIZOON Minus, Matth.  
idem cum proximo.*



sunt



*AIZOON Minus femina, Fuchf.*  
*Crassula minor seu vermicularis.*

Pen in Ad.

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires.

Lib. 4. c. 84.



sunt natales, eadem vires, ut dicemus. Alterum item minus, quod idem Fuchsius Aizoon minus feminam appellat, pro secundo siue minore sedo depinxit Matthiolus. Sapissimè colligentes id fallit propter natales eosdè, faciemq; adeò minoris sedi similem, ut mirum magis sit contraria pollere facultate. Discernitur tamen foliolis rotundis, teretibus, oblongis, magis carnosiss, supernè retusis, mucronatis instar vermium, è totis ramis pendulis, stoculisq; pallidis, vel albidis. Eius species est minimum repens, hìc quoq; appictum tertium Sedi genus Fuchsi, Illecebra Latinis, Gallis *Pain d'oiseau*, Germanis *Rotzentreuble*, pusillis ramulis parietes, saxosalsq; moles & colles aridos amplexantibus, gracilibus, repentibus, foliolis valde parvis & brevibus, carnosiss, confertis: floribus aureis, stellatis. Semperuium maius nascitur in montosis & rectaceis, supra domicilia etiam reperitur. Minus in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis. Tertium nascitur in saxis, sicut & minimum repens. Aizoon Maius Iulio & Augusto mensibus floret, reliqua genera

*AIZOON Minimum repens, tertium Dioscoridis.*



Lib. 15. c. 13.

gia fuerit illitum. Eadem vi prædita est eius species repens, siue illecebra minor, gustu quasi ari aut flammulæ. Plinius cū de Aizois, quæ suprà citauimus, scripsisset, subiungit. Omnium harum vis eadem perfrigerare & adstringere. Medentur epiphoris folia imposita vel succus inunctus: purgant enim vlcera oculorum, explentq; & ad cicatricem perducunt, palpebras deglutinant. Eadem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Aduersantur phalangiorum ictibus: aconito verò maius Aizoon præcipuè. A scorpionibus quoque, habentem id, feriri negant: Medetur & aurium dolori. Quæ magna ex parte cum Dioscoride consentiunt,



consentiunt, nisi cū omniū vim refrigerantem & adstringentē faciat, eandē etiā tertio generi tribuat, quod cōtraria præditū esse facultate Dioscorides scripsit. Galenus maioris & minoris duntaxat Aizoi meminit, vt diximus, & utrūque scribit desiccare quidem leuiter, quandoquidē & mediocriter adstringit, omnis alterius

Lib. simp.

AIZOON Telephium, Dalech.



vehementis qualitatis experts. Quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea: cæterum non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpetas, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. Herbarij quidam aliud Aizoon Telephium hîc quoque depictum nuncupant, quod in saxosis & lapidosis gignitur, radice parua, candida, modicè fibrata, foliis humi circa radicem iacentibus, & eam in orbem circūdantibus, vt in Semperuino maiore, oblongis, nonnihil incis, crassis, hirtis, portulacæ similibus, in caule paucis. caule nunc singulari, nūc multiplici, dodrantali, flore violæ, candido, semine in siliquis exilibus, sinapi modo. Plantæ sapor initio fatuus, deinde acris vt in Nasturtio. Item aliud, quod montanum cognominant, in editissimis Alpibus proueniens, foliis multis, exiguis, circa radicem humi stratis, paucis, in caule alternatim dispositis, caule tres digitos alto, flore odorato, in medio luteo, rubris & radiatis foliolis stellato, quorū infima pars capitulo luteo vicina, alba linea notatur. Matthioli

a telephium  
in caule

AIZOON Montanum.



AIZOON Arborescens, Matth.



DDd



duas arborecentis Aizoi species exhibuit, alteram ex Constantinopoli, alteram ex Corcyra. Pena multas eiusdem plantas se vidisse asserit Veronæ, Patavij, Venetiis, & in Hetruriæ hortis. Postea pascim in maritimis Sciauroniæ seu Illyrij circa Dyrachium nasci ex amico intellexit. Demum se in sinus Bristoiensis Anglici Oceani

*SEMPERVIVVM* Arbo-  
rescens alterum, *Marth.*



*SEDVM* Minimum  
arborescens. *Lobellij.*



*VERMICVLATVS* Frutex  
maior, *Lobellij.*



*Vermicularis*, Sive *Illecebra* maior, *Lob.*  
sive *Sempervivum* minus alterum, *Dod.*



*insulis*

*Vermicularis* 9. quia  
folia acutiusculis, acutius

*Illecebra* vero dicitur quia  
nos illucinat et decipit  
sua in calida cuncta  
conspicienda natura hi-  
sperior esse frigida



infulis vocatis Homs se copiosum auulisse ait, sed in saxosis, nec perinde carnosum aut ramosum, tamen stipite ramisq; fruticans lignosis, duris, multis, lentis: foliis paribus & similibus, vulgare maius Sedum situ & ortu æmulatibus, minus crassis, inter vulgare Sedum maius, laureolam & tithymalum ambigentibus. Græcum verò, quod & Illyricum, maius multò & speciosius, ramis & cortice, foliorum circinato per summa positu magis laureolam imitantibus, crassioribus, tenerioribus, brevioribus, succulentis, cubitum longis in scapo pedali, & cubitali, laureolæ crassiore. Adiungam hîc ex Dalechamptio Aizoon Dafyphyllum, idest, Densifolium, quod in parietibus & muris Viennæ Allobrogum nasci observauit, radice breui, capillata, pallida, gracili, in exigua terra & parietum cemento hærescente: ramulis plurimis, quatuor digitos altis, perquam spissè congestis, foliis numerosissimis, crassis,

*SEDVM Minimum  
tertium, Lobellij.*



*AIZOON Dafyphyllum,  
Dalechampi.*



*Æoris densus  
pallidus  
Dalechampi  
hîc.*

teretibus, albicantibus, confertissimè stipatis, gustu fatuis cum leui quadam adstri-  
ctione: flore in virgulis tenuibus, candido, copioso, semperuiuo medio simili. In  
Gallia nusquam alibi quàm in eo tractu à se visam & repertam meminit. Aliud Se-  
dum minimum tertium depinxit Lobellius, & huic, inquit, omnium logè minimo  
ex Syria asportato, folia quàm Sedi minoris minora: cauliculi sesquiunciam æquât,  
in quibus luteoli flores maiores pro plantæ exilitate, saxifragiæ albæ: radix impli-  
cata, fibrata. Idem Semperuiuum paruum graphicè depinxit, Crassulam minorem  
Dodon. Sedum fœminam Fuchsi: tum Semperuiuum minus æstiuû, Semperuiuum  
minus Dodon. Sedum minus marem Fuchsi: præterea Vermicularem, siue Illece-  
bram maiorem, qualem hîc expressimus, & semperuiuum minimum seu Illecebrâ.  
Adhæc Sedum arborescens maius, candidis flosculis, & Sedum minimum arbore-  
scens vermiculatum, plantulam quam iisdem Syriæ natalibus habuit, fruticosam &  
densè geniculatam, cœfertifq; foliis & ramulis: flores luteoli, vermicularis acris, uti  
tota facies. Postremò Vermiculatum fruticem maiore, fortassè Chamapitym al-  
teram Dioscoridis: cuius est aliqua varietas. Vtrique densi confortiq; ramuli: sed



*Erucæ d. quod uellendo  
lingua quæ nodat*

*ERVCA Muralis.*

quæ maior, foliis est albis densissimè conferta, denticulatis vermicularis acris, maioribus. Exilior totaq; minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & flosculis herbaceis Polygoni.

*ERVCA MURALIS,*

## CAP. XVIII.

Nomen.  
Locus.  
Forma.



**Q**UAE Erucamuralis ab herbariis nominata est, in parietinis, murorumq; rimis & inter saxa nascitur, radice parua, breui, candida, foliis propè radicem multis, circa eam sparsis, & vndique ambientibus, oblongis, ambitu laciniato, in caule paucis, caule pedali, tereti: flore in surculis gracilibus & breuibus, albo, violæ simili: semine minuto in tenuibus & longis siliquis, sapore principio fatuo, tandem subacri & mordaci.

*тапов е. уроно mundo hinc  
е. тапов non manduca neque  
quædam hinc Asaron  
herba quæ. Nomen.  
ad caudæ caule folia  
hinc neque hinc strata  
x. humiliter. Locus.  
Forma.  
et quia a тапов est  
nominata quia ornamentis  
non perit*

*ASARVM MURI,*

## CAP. XIX.



Locus.

**A**SARVM muri hanc plantam herbarij vocant, quòd Asarum foliis imitetur, & quòd nusquam alibi quàm in muris gignatur. Ex parietum fissuris profilit, radice crassiuscula, nodosa, è ruto nigrescente, polypodij ferè colore, in plurimos fibrarum tenuissimos villos diuisa: foliis paucis, Asaro similibus, venosis, longo pediculo subnixis: nec semen, nec florem vidi.


*ASTER MONTANVS,*

## CAP. XX.

**A**STER montanus luteus in excelsis montibus gignitur, radicibus multis, è candido flauescens, odoratis: caulibus multis, cubitalibus, villosis: foliis circa radicem densis, in caulibus paucis, longis, venosis, in ambitu laciniatis, hirsutis: flore in summis caulibus luteo, anthemidis capitulo simili: foliolis stellatim radiato, in pappos abeunte. Est & Asteris lutei genus, herba hinc depicta, Oculus Christi minor herbariis dicta, in sabulosis tumulis & aridis nascens, quæ Lugduno itur Viennam, radice crassiuscula, nigra fibrata, dimidium



ASTER Montanus  
Luteus.



ASTER Luteus, sine oculus  
Christi minor.

*Aster dicitur propter  
foliula hinc modo  
fiori morosa*



ASTER Luteus, alter oculus  
Christi minor.



ASTER Montanus  
Hirsutus Pena.



*hæc forma auctoris  
fig. 1349.*

dimidium pedem longa: foliis propè radicem multis, per terram sparsis, canis,  
lanuginosis, saluix similimis, gustu valde amaris, caulibus tribus aut quatuor, vil-  
losis, vix pedem altis, in quibus folia pauca supradictis minora, capitulo



Chamæmeli chrysanthemum; sed paulò ampliore. Pena etiam Asterem hirsutum pinxit, caule & foliis hirsutis, longioribus, Cynoglossi parui nostri paribus & similibus, radice minùs fibrata.

## MYAGRVM,

## CAP. XXI.

Nomina  
Lib. 7.



MYAGRVM Græcis, & μελαμπερον, velut & Latinis Myagrū & Melampyrum nominatur. In Paulo duæ plantæ habentur, nomine & oleoso succo affines, Myaron, scilicet, & Myagron: μιαρον quidem

impurum significat, & sordidum, cuiusmodi est Melampyrum. Μιαρον autem muscipulam porius, siue muscariam, quæ insidentes, siue præteruolantes muscas glutine suo implicat. At Cornarius hoc Pauli loco Myagron ubique legendum censet, & non Miaron, quòd alia non sit herba à Myagro, ordinemq; lectionis hic perturbatum esse, ut primùm habeatur Myagri semen, deinde interpositis mitulis sequatur Miaros, &c. quæ eadem sit cum Myagro: quare sic restituendum esse ordinem. Myagros, quam alij vocant Melampyrum, herba est farmentitia ac pinguis: pinguedo ipsius corporis asperitates explanare videtur. Semen Myagri pingue est, & quod in ipso est oleosum, meatu obducendi facultate habet. Præterea hoc loco, Myagros quā alij Melampycnum, falsò legi in Græcis codicibus μελαμπικνον pro μελαμπερον putat, ut ex Dioscoride liquet. Est & hic obseruandum, Melampyrum istud ab eo diuersum esse de quo alibi diximus. Id autem triticum vaccinum, siue bouinum vulgò dicitur, quod fortassè μελαμπερον Theophrasti & Galeni esse diximus. Est autem Myagrū siue Melampyrum, auctore Dioscoride, herba furculacea, bicubitalis, folia habens rubiæ similia,

Li. 4. c. 111.  
Forma.

MYAGRVM, Dodon.

Li. 27. ca. 12.

Li. 3. ca. 127.  
Li. 4. ca. 35.



pallida, semen scæno-græco simile, pingue, quo vtuntur ad lucernas, torrefactum ipsum tundentes, & virgis oblinentes. Non eadem omnino Plinius tradit. Myagros herba ferulacea est, foliis similis rubiæ, tripédanea, semen oleosum, quod & fit ex eo. Dioscorides herbam esse φρυγανώδη dixit, id est, furculaceam, Plinius varθηκώδη, id est, ferulaceā. Id Dioscoridis Myagrū Ruellius, & eum secuti Dodonæus, atque alij docti herbarij, eam herbam esse putant, quæ Gallis *Cameline* & *Camemine* dicitur, Germanis *Flachdotter*, & *Leindotter*, nec eam Matthioli sine ratione intrusit. Cauliculos emittit illa rectos, rotundos, sesquicubitales aut maiores, in multos furculos fissos, folia longa, angusta ferè rubiæ, denticulis in ambitu eminentibus. In furculorum summitatibus flosculi sunt lutei, deinde caliculi lini, sed magis compressi, in quibus semen fuluum sesamo aut scæno-græco simile, sed duplò minus & oblongum. Legitur tamen in vulgatis Dioscoridis exemplaribus semen τραχύλω έοικός, id est, collo simile, quod Ruellius emendauit, legitq; τραχύ έοικός, id est, scæno-græco simile, quod & de toto caliculo accipi potest. Hanc plantam rustici in Angliæ, Bataniæ, Zelandiæ, Lotharingiæ, Leodij artus ferunt, quamuis & suæ spontis inter fegetes inueniatur, melampyrum Græcis, id est, triticum




MYAGRVM Alterum  
minus, Dalecham.

PSEUDOMYAGRVM,  
Matthioli.



MYAGRVM Aliud Thlaspi  
effigie, Lobelij.



triticum nigrum ideo dicta. Semen in areis pa-  
uitis rura flagris decutiunt, & vannis in auram  
vento silentem iactant, dum siliquarum rec e-  
menta vanescant: tum trusarilibus molis subiti-  
ciunt, versandoque subinde oleum exprimunt,  
quo non ad lumina tantum lucernarum, sed &  
ciborum quoque condimenta pauperes vtun-  
tur, magno huius olei proventu. Hanc ob cau-  
sam quidam minus tetanum putant. Hoc oleo,  
inquit Dioscorides, corporis scabritias kuui-  
gari, atque expoliri constat. Galenus scribit  
myagri semen pingue esse: nam, si candatur,  
oleosum quid effundere, quod emplasticam  
vim habet. Diuersam ab his facultatem tribuit  
Plinius huic oleo, nempe quod medecina oris  
vulneribus eo perunctis. Sunt qui plantam quam  
ex Matthiolo hic ostendimus, legitimum Mya-  
grum esse contendunt, sed cum folia rubra non  
habeat, sed glasti potius, & semen ei sit nastur-  
tij, non fenogreci, ab eis dissentit Matthiolus,  
& non Myagrum sed Pseudomyagrum appel-  
lat. Nascitur passim inter linum & segetes, &  
eius semen auidissime ab auiculis expetitur: est  
enim dulce & gustui gratum. Myagrum alterum & minus hic depictum exhibent  
herbarij quidam, quod in agris, & nonnunquam in hortis gignitur, radiculis mul-  
tis, candidis, tenuibus, foliis erythrodani, minoribus, pallentibus: cauliculis multis,  
pede altioribus, flore in summo cauliculorum vertice copioso, pusillo, purpura-

Lib. 27. C. 22



scente, semine minutulo, pingui & oleoso. Aliud Myagrū ex Lobellio hīc pingendum curauimus, quod iisdem quibus Camelina oritur locis, Anglis & Belgis hortense, folio paruo, Narbonensis Thlaspi parui vel leucoij marini minimi. Flosculi confertim stipati vmbellam exprimunt, stellati, lutei, erysimi vel thlaspeos.

*FILIPENDULA ALPINA,*  
*CAP. XXII.*

**Nomen.** *FILIPENDULAM* Alpinam vocant herbarij, quam gignunt summa Alpium iuga pascuis, pratis, & vberimo fœni prouentu greges innumeros atque armenta saginantia, atque inde rusticos ditantia. Harer illa radice crassa, nigra, multifida. Folia ex radice profert longo pediculo nixa, quæ foliolis multis constant, toto ambitu minutissimè incisis, ex aduerso sitis vt in Filipendula, quæ causā nominis fuit. Caulis pede altior, flores

*nomen habet i numerosis  
lis & rotundis in radice  
signis. qui quæ ex  
lo quodam pender videntur!*

*Pediculis n. minor  
emittit pediculos*

*FILIPENDULA*  
*Alpina.*



*PEDICULARIS Maior,*  
*Alpina.*



luteos spicatum ferè congestos in vertice sustinet, quibus dilapsis vascula succedunt oblonga, antirrhini oculis similia, minuto semine plena. Huic affinis est quæ à quibusdam Pedicularis maior vocatur, & in vertice Montis aurei, Gergobia Aruernorum propinqui gignitur, radice foris nigra, napi modo gracilescente, rugosa, nonnihil furculosa: caule ferè cubitali, virgato, unico: foliis filicis, in longo pediculo ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: flore pallido, spicatum in summo caule congesto: semine copioso, in latis corticosis vasculis concluso, alyssi modo.

*GALE*






**A** FOLIORVM Galegæ similitudi- *Nomina*  
ne, herbâ hanc Galegam herba-  
rij vocarunt, montanam autem  
vt à Galega vulgari discernent  
natalium differentia. Nascitur hæc in asperis *Locus.*  
montibus, non in eorum quidem salebris aut  
præcipitiis, sed in ipsis culminibus, si qua vda  
planities illic occurrat. Radice nititur crassa, ni- *Forma.*  
gra, fibris longissimis & tenuissimis capillata,  
per summa terræ huc illuc oblique vagis. Cau-  
les multos edit pedales, teretes, folia galegæ,  
latiora, eminente costa per medium diuisa, mi-  
nimè in ambitu dissecta, densius congesta: flo-  
rem in summis caulibus pisi vel genistæ, lu-  
teum: siliquas nigras seminibus plenas, lenti- *Vires.*  
culæ similibus. Efficacem esse aiunt contra ve-  
nena, lumbricos, morbum caducum & pestem,  
non minùs quàm Galegam alteram.

DENTELLARIA, CAP. XXIIII.

**Q**UIDAM Dentellariam hanc vocant, quæ in agri Monspeliaci locis *Nomen.*  
aridis gignitur, radice nigra, supernè crassa, paulatim gracilescente, *Locus.*  
ima parte fibrata, caulibus multis, pedalibus, foliis longis, propè cau- *Forma.*  
lem angustis, in summitate latoribus, media costa diuisis, calendulæ  
ferè similibus, acerrimi gustus & caustici, in singulis caulibus septenis ferè, aut no-

DENTELLARIA.



DENTELLARIA Altera, Dod.



*Dentellaria, et Dentaria  
nominata à forma  
radicis quæ ex plurib.  
squamis quæ dentic.  
componitur.*

uenis,



uenis, quamobrem Enneaphyllum Plinij quidam esse putarunt: flore pusillo, copioso, valerianæ penè modo, purpureo, in summis ramis. Dentiam doloribus medentur folia trita & carpis admota, pustulis enim inde excitatis, veluti in ambustis, humor dolorem efficiens reuellit, unde Dentellariæ nomen ei positum fuit. Eodem modo febris quartanæ paroxysmis incipientibus tusam agrorum carpis admouent, ut rigores citius desinant, & natura sensu doloris irritata humorem noxium aut vomitionibus, aut sudoribus valentiùs expellat. Vlceratis quoq; eius imposito corporis aliquot partibus, forasque euocato pustulis ruptis seroso humore, pestis contagium vitari posse quidam affirmant: nempe venenatis succis pestilenti lue corpora nostra afficientibus, ab internis & principibus partibus, corde potissimum, ad exteriora & ignobiliora reuocatis. Huic iungemus Dentariâ alteram Dodonæi & Herbariorum, siue Alabastritem alteram (prima Alabastrites explicata est in Libro, De iis quæ flore placent. Cap. De Anemone, trifoliæ Anemones Dodonæi nomine) Coralloidem alteram Cordi, quæ folia habet non Pentaphylli, quemadmodum Dentaria minor Matthioli, in lib. de Umbrosis explicata, sed fraxim modo digesta, mediæ costæ annexa, oblonga, lata per margines crenata, crebrò ad vnam costam septena: flores candidos, & filiquas Dentariæ minoris Matthioli similes: radices asperas & squamosas.

## POLYRRHISOS, CAP. XXV.

Nomina

Locus.

Forma.

Polyrrhiza trifolia.

Locus.

Forma.



RADICVM multitudinem herbæ huic nomen datum. Polyrrhizon inquit Plinius, folia habere myrti & radices multas, cui hanc congruere herbarij autumant, quæ asperis gaudet. Radice est multiplici, nigra, caulibus multis, angulosis, palmum altis: foliis myrti paulò obtusioribus, per intervalla geminis: flore pallido, semine in oblongis vasculis. Radices tusæ, inquit Plin. dantur in vino contra serpentes: profunt & quadrupedibus. Polyrrhizon aliam latifoliam vocant herbarij in Alpium obscuris riguisq; vallibus pro-

POLYRRHISOS Plin.  
Dalechampij.POLYRRHISOS Latifolia,  
Dalechampij.

uenientem,

piža, pižus radix  
KONU est malva







duplicis scuti figura, in quo semen quadantenus latum. Nascitur in montibus, & asperis locis. Huic Dioscoridis Alyſſo nulla planta melius quadrare videtur, quam Lib. 1. c. 70, quæ hic ex Dodonæo pro alyſſo descripta & depicta est, à recentioribus quibusdā Lunaria maior appellata. Est enim caule recto, rotundo, cubitum alto, supernè

*ALYSSVM, Matth.*

Pet. Pr. in  
Ad.

Alyſſum  
minus.

Locus.

Forma.



*ALYSSVM Minus,  
Dalechampij.*

Alyſſ. triglo.

Locus.

Forma.

Lib. 3. c. 89.




in tres quatuorve furculos sese findente: foliis primùm rotundis, deinde longis, incanis, ac nonnihil tomentosis, asperiusculis, radice exili. In furculorum fastigiis flosculi multi lutei nitent, deinde folliculi asperi, candicantes, compressi, in rotunditate oblongi, clypeolorum effigie, quos duplicatos facit membranula diuidens vtrinque seminum seriem duplicem, quæ sunt compressa, leucoij similia, sed maiora. In hortis colitur ab herbariis. Lunio floret, Iulio semen maturum est. Luculentior figura sic expressimus. Plantam aliam Itali fecerunt Alyſſum, vel Alyſſi genus, quos secutus Matthiolus libro tertio omiſſam tadem depinxit. At doctiorum omnium Monſpelienſium, apud quos frequens oritur, sententia, thlaspeos generibus adnumeranda est, non Alyſſi, cui multò aptius cõuenit, à Dodonæo depicta. Alyſſa alia herbarij depingunt, minus videlicet, quod in fabulosis crescit, radice candida, parùm fibrata, satis longa, cauliculis multis, rotundis, lanuginosis, supra terram parùm extantibus: foliis multis albicantibus, & tanquam cinere conspersis, aizoo minori similibus, si rotunda & non lata forent, gustu fatuis cum paucula adstrictione: flore in summis virgis copioso, luteo, semine lini, minuto, rufo, in loculis scuto similibus, duplicibus, membrana tenui & pellucida distinctis. Alyſſum aliud trigonum ob loculorum seminis triquetram figuram nominant, quod nascitur in asperis, lapidosis, & solis diuturna mora æstuosis locis: radice breui, lignosa, parùm fibrata, caulibus tribus aut quatuor palmum altis, foliis oblongis, angustis, in ambitu minimè diuisis, per interualla prodeuntibus, flore Aprili emicante: semine rotundo, minuto, papaueri simili in conceptaculis triangularibus, scuto figura similibus, vt & in Alyſſo. Aliud Alyſſum ostendit Lobellius, Germanicū Echiodes, siue facie Molluginis, Aparine Plinij creditum. Est radice geniculata, bicubitalibus, cauliculis asperis, Aparines ritu vicina quæuis arripit: folia bina & terna ex atro virentia, Echij modo hispida, Rubiæ paria, & aliquando maiora, flosculi purpurei violacei, Echij minores verticillatim Cruciata modo à medio caule summe tenus dispositi. Semen inuolucris



uolucris foliaceis sinuosis sesamo simile aut Thlaspi, fuscum, gustanti dulcè clauditur. Vniuersa planta gustu Echium æmulatur. Eximias Alyssi vires tradit Dioscorides, his verbis. Alyssi decoctum, inquit, singultus sine febris potu discutit, idem efficit si quis teneat, aut odoretur. Cum melle tritum lentigines, & maculas

ALYSSVM Trigonum,  
Dalechampij.



ALYSSVM Germanicum  
Echioides, Lobel.



sole contractas purgat. Putatur & rabiem canis sanare contusum in edulio, & exhibitum (sunt enim hæc Dioscoridis verba, *δοκεῖ δὲ καὶ λύσαν κυνὸς ἰατρὰ συμπτὸν ἐδίστασθαι καὶ διογῆν*, quibus significare videtur, Alyssum ipsius canis rabiem sanare, nisi λύσαν κυνὸς eam rabiem, quæ ex cane homini inducta sit accipere velimus, vel legatur locus is vt in veteri codice, *δοκεῖ δὲ καὶ λυσσοδληκλούς* And.Lac. *ἰατρὰ*, &c. id est, contusum in cibis exhibitumque, iis, quos rabidus canis momordit, mederi videtur.) Sed & in domo suspensum salutare esse creditur, tum hominibus, tum aliis animalibus, ne à fascino lædantur. Quin & puniceo panniculo alligatum, pecorum morbos abigit. Quod verò de singultu ille, idem Plutarchus scripsit, *τὴν δὲ ἀλυσσὸν χαλκωμένην βοτάνην καὶ λαβόντες εἰς τὴν χεῖρα μόνον, οἱ δὲ καὶ προσβλέψαντες, ἀπαλλάσσονται λυγμοῖς*. Id est, Alyssum herbam manu tenentes solum, alij verò intuentes, singultu liberantur. Galenus dilucidius eius facultates declarat. Nuncupata est Alyssum herba, quòd mirificè iuuat morfos à cane rabido: sed & rabienti quoque data sæpè in totum sanauit, atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit, dictumque priùs est talem facultatem sola percipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiatur, cognoscet facultatem habere mediocriter siccantem & digerentem, cum hoc vt absterforium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & vitiliginem & ephelim purgat. Lib. 3. Sym. Lib. 6. sim.



Nomina

Forma.

ratio etymologia



ΣΚΛΗΠΙΑΣ Græcis, Asclepias Latinis, quibusdam κισσόν, id est, hederula, & κισσοφυλλον, hederæ folium, Herbariis Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis Schuualbennurtz appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio, qui Ασκληπιός Græcis dicitur, antiquo medicinæ auctore, nominata est: hirundinaria verò à siliquis quas producit, quæ dehiscen-  
tes plumosum semen ostendunt, atq; adeo hirundinis effigiem referunt. Vincetoxicum, vel rectius νικηφόρον, quod illi insignis aduersus venena vis inest. Asclepias, ut describit Dioscorides, ramulos profert longos, in quibus folia longa, hederæ similia, radices multas, tenues, odoratas, flores grauitè olentès, semen securidacæ. Nascitur in montibus. Eadem prorsus Plinius habet. Asclepias folia hederæ habet, ramos longos, radices numerosas, tenues, odoratas, floris virus graue, semen securidacæ. Nascitur in montibus. Ex qua descriptione perspicuum est Fuchsum & Dodonæum rectè Vincetoxicū pro Asclepiadè depinxisse; illumq; à Matthiolo minùs rectè reprehensum. Nam caules fert laues, rotundos, tenues, flexiles, fractu contu-

Lib. 3. c. 90.

Lib. 27. c. 5.

Cap. 45.

Lib. 3. c. 4.

In cap. 90.

lib. 3.

## VINCETOXICVM

sive Asclepias, Fuch.



## VINCETOXICVM,

Matthioli.



maces, cubito altiores, in his folia quidem hederæ, rigida, ex atro virentia, sed aliquantò longiora, & quasi supernè mucronata: flores in petiolis exiguos, candicantes, odoris grauis, & ingrati, herba virente, quibus succrescunt siliquæ teretes, oblongæ, quæ dehiscen-  
tes semen cohibent securidacæ simile, id est, rufum & latum, lanugine obuolutum. Radices longæ sunt, rotundæ, innumeris ferè capillamentis fibratæ, odoratæ. His accedit locus natalis, prouenit enim in montibus asperis, altis & arenosis, aut aridis collibus, præsertim Narbonæ, & apud Ligures Taurinos. Prætereà vires consentiunt. Radices cum vino potæ, inquit Diosco. torminibus & venenatorum mor-  
bis auxiliantur, folia imposita ad mammarum & vteri maligna vlcera faciunt. Sic Plinius. Radices torminibus medentur, & cōtra serpentium ictus non solùm potu, sed etiam illitu. Galenus ait Dioscoridem de Asclepiadè scripsisse se verò

Lib. 3. c. 90.

Lib. 27. c. 5.



se verò nondum eius periculum fecisse. At Paulus scribit calidam siccamq; esse, & tenuis substantiæ: torminibus in vino potam competere, illitam verò venenatorum moribus, & malignis mammarum ac vteri vitiis succurrere. Sic vincetoxicum amarum est, parum glutinosâ eius radix. Folia aliquam præferunt adstrictionem. Recentiores eius radice vli, primum cum aduersus venena, tum ad vlcera, magnū sibi

Lib. 7.

Fuch. ibid.  
Penain  
Ad.

ASCLEPIAS Nigra,  
Dalechampi.



& plantæ nomen pepererūt, neq; posterī potuerunt postea adduci, quin pro Asclepiade agnoscerent & vterentur. Adhæc eiusdem radice vtuntur magna efficaciam ad mensium prouocationem, & ad rabidi canis morsum, eandem in vino maceratam & coctam hydropicis mirè auxiliari tradunt: flores præterea foliaque siccata, mox trita vulneribus vtiliter inspergi aiunt, sordida etiam vlcera purgare, & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitiis & rupturis egregiè mederi docent. Ob superioris asclepiadis similitudinem, herbarij hic appictam Asclepiada nigram vocant, à floris colore. Est enim antedicta toto plantæ habitu similis, viribusque iisdem prædita, solo floris atro colore discrepans. Eadem prorsus, opinor Lobelij est Asclepias altera flore nigro, siue aliud Vincetoxicum, in agri Mospeliensis collibus. Frontignani vicinis, & Belgij hortis, quod à floris pullo colore, non nihil purpurante, minimè albo, vt alterius, nigrum vocatur, cauliculis flexuosis ternum & quaternum cubitorum, proxima quæuis fulcra Periplocæ modo, quam etiam quia refert, Periplocam fecerunt, scandendo ambit: cætera priori similia, succo pallido turget.

CERINTHE PLINII. CAP. XXVIII.



**P**LINIUS Cerinthen scribit esse folio candido, incuruo, cubitalem, capite concauo, mellis succum habente, horum floris audissimas esse apes. Quam herbam conieciarunt docti herbarij esse eam quæ hic depingitur, in aridis & apricis prouenientem, radice longa & crassa, caulibus multis, rotundis, pedalibus, foliis longis in acutum desinentibus, superne candidis, punctis quasi de industria notatis, inferne villosis, caulem ima sui parte sic ambientibus, vt per rimam in iis diuulsis caulis traicere videatur. In furculos caules diuiduntur, qui florem oblongum dactylidi similem, sed minorem, luteum, in cacumine fundunt, quo delapso in vasculis minutum semen continetur, per ambitum crenatis, exstante in medio apice tenuissimo. Pulmonariam & alias plurimas plantas videmus maculis insignes, sed quæ tam crebris & densis, atq; ita distinctis conspersa sit, nullam hæctenus vidi. Parisienses in hortis alunt, ac nominis huius ignari telephium vocant.

Lib. 21. c. 12

Locus.

Forma. avers. c. floris

scipos, ceras, quod fisco

scipos, et scipos

quæ purpurea

telos

colpua sic papula

scipos



Nomina

Locus.

Forma.



FLORIS puniceo siue ferrugineo colore, & foliorum cum Elleboro albo similitudine, hanc Elleborinem ferrugineam siue puniceam nominarunt herbarij, quam ab Elleborine Dioscoridis plurimum differre non ignorant. Est, inquit Pena & Lobellius, recentiorum calceolus Mariæ, Damafonium nothum Dodonæi de florib. In asperis, sitientibus, & confragolis montium iugis nascitur, radice obliqua polygonati modo carnosâ, subrufa, in quam plurimas fibras, huc illuc vagantes diuaticata: foliis Ellebori albi, septem aut octo, latis, venosis, ima sui parte caulem amplexantibus, nec ab eo separatis: caule pedali, flore in caulis vertice unico, in quatuor foliola, radiis similia extrinsecus diuiso, quorum duo latiora sunt, duo angustiora, ferruginei coloris. Hæc cauum quidpiam galero aut calathio simile circundant luteum, intrinsecus lineis rubris virgatum. Ex radiorum medio velut ex aperto hiantēque rictu lingua duplex porrigitur, candicans, canaliculata, extrorsum altera, altera introrsum, exili breuique fulta pediculo, eleganti & planè admiranda floris specie. Maio mense floret. Amari gustus est, & odoris nonnihil grauis. Vulnerariam herbam esse, plagasque recenter illatas sanare aiunt.

ELLEBORINÆ Ferrugineæ,  
Dalechampij.

*Calceolus a figura quæ  
sui reperiatur.*



Tempus.  
Vires.

THALICTRVM, Dodon.

CAP. XXX.

Nomina

Lib. 4. c. 93.

Forma.

Lib. 27. c. 13

Lib. 6. sim.

Forma.  
Dodo. lib.  
1 cap. 77.  
Pena in  
Aduer.



**Q**UOD Græcis θαλίτρον & θαλίτρον nominatur, similiter Latinis Thaliætrum & Thaliætrum. Id sic descripsit Dioscor. Thaliætrum folia coriandro similia habet, sed pinguiora, caulem rutæ crassitudine, in quo folia. Plinius iisdem ferè verbis depinxit. Thaliætrū folia coriandri habet, pinguiora paulò, caulem papaueris, nascitur vbiq; præcipuè in campestribus. In quibus *μυκάνος* legisse videtur, id est, papaueris, pro *ταρράγος*, id est, rutæ. Dioscoridem secutus est Galenus scribens. Thaliætrum folia habet coriandro similia, caulem crassitudine rutæ. Sed tam succincta delineatio facit, vt alij aliam herbam pro Thaliætro exhibeant. Doctiores tamen eam quæ hodie à Chirurgis Sophia dicitur, Germanis *Vuelfomen*, Thaliætrum esse asserunt, tum propter figuram aptè congruentem, tum propter eximias sanandi ylcera maligna vires. Est enim foliis minutissimè incisis, coriandri, sed tenuioribus,



tenuioribus, aut absinthij Romani albicantibus, caulibus sesquicubitalibus, rotundis, rectis, lignosis, rutaceis, pallidos vel luteos flores in summo proferentibus crucæ, vel sinapi silvestris, nec dissimiles siliquas, sed exiliores, semen exile, rubellum cohibentes. Secus vias, incultis locis, maceriusq; frequens est. Iunio mense floret in Septembri usq; Talictrum, inquit Dioscorides, vlcera antiqua ad cicatricem perducit. Scribit Galenus vim ei inesse exsiccatioriã citra morsum, quare vlcera inueterata cicatrice obducere. Plinius folia mederi vlceribus ait cum inelle. Sic Sophiam tradiderunt Chirurghi practici, qui atate Guidonis, & Petri Argelate vixerunt vlcerata antiquata & maligna sanare & glutinare, semen eius cum vino aut aqua chalybeata potum dysenteriam, alui & sanguinis fluxiones cohibere. Fuchsius, Tragus, Cordus, perperam Seriphium Germanicum fecere.

Locus.

Tempus.

Ibidem.

Vires.

Temper.

Lib. 6. sim.

Ibid.

Cap. 1.

ATHANASIA LEVCANTHEMOS, CAP. XXXI.



**A**THANASIA leucanthemos in nemoribus & dumetis aridis provenit, radice plurimis fibris capillata, caule cubitali, & nonnunquam altiore, ramis multis brachiato, foliis Athanasie chrysanthemi, paulò magis dissectis, coriandri ferè incisuris, gustu principio subdulcibus, sed cum diu mansa fuerint, os & fauces incenduntibus, pyrethri ferè modo, sed imbecillius: flore in ramorum fastigio radiato, per ambitum candido, intus melino. Hanc plantam Vchnam albam esse Auicennae quidam volunt: vel, ut legit Bellunensis, Achnam, citrinam verò Athanasiam chrysanthemum, licet interpretes Vchnam conuertat matricariam, quam vnus tantum generis & non duplicem agnoscimus, ut propterea interpreti fides minùs habenda sit. Caterum huic nostrae plantae conuenit quod Auicenna scripsit, Vchnam candidam lutea valentiorè esse. Hæc enim ut Athanasie luteæ sapore perquam amarum feruida acrimonia sua longè vincit, sic ab ea odoris gratia superatur. Quare hæc videtur esse Tanacetum nō odorum silvestre Lobellij & Penæ, sponte in Delphinatu propè Valentiam frequens, nullo odore præditum.

Locus.

Lib. 2. c. 73.

AMBROSIA, CAP. XXXII.



**Q**UÆMADMODVM *Ἀμβροσία* veteribus Græcis τὸ τῶν θεῶν βρώσιμα, id est, deorum cibus dicitur, quod mortales eam non edant, vel quod qui eam ederint immortales euadant, ita eximia fragrantia gratia etiam diuis expetita, ne dum coronamentis, plantæ Ambrosiæ nomen dedit, vel quod eius in cibis vsus longæuos faciat homines. Hæc, ut scribit Dioscorides, frutex exiguus est, tres palmos altus, ramosus, folia habens circa caulis exortum parua, ut rutæ. At cauliculi seminibus referti sunt, similibus racemulis, qui nunquā florent, odor est vinosus, iucundus, radix tenuis, longitudinis duorum palmorum. Nectitur in Cappadocia in coronas. Plinius eadem tradit. Ambrosia vagi nominis est, & circa alias herbas fluctuantis, fruticem vnū habet, densum, ramosum, tenuem, trium ferè palmorum, tertia parte radice breuiore, foliis rutæ. Circa imum caulem in ramulis semen est, vis dependentibus, odore vinoso, qua de causa Borrys à qui-

Nomina

Lib. 3. c. 112.

Forma

Lib. 27. c. 4.




In cap. 112.  
lib. 3.


busdam vocatur, ab aliis Artemisia. Coronatur ea Cappadoces. Matthiolus genuinam Ambrosiam quam hic depinximus, esse credit, eadem quæ Ambrosia spontanea strigosior Lobellij: alteram tamen quam prima Latinorum commentariorum editione pro vera expresserat, etiam Ambrosiam facit, ut altera mas, altera femina dici possit, aut certe congeneres plantæ ut ambæ censeantur. Verum posterior non

Ambrosia  
tenuifolia.


AMBROSIA Prima, Matth.



AMBROSIA Altera, Matth.

AMBROSIA Hortensis  
procerior, Lobellij.

AMBROSIA, Montana.



Ambrosia,



Ambrosia, sed Artemisia tenuifolia multis videtur esse. Saxosis locis sponte nascitur Ambrosia, nunc non nisi in hortis colitur, in quibus si procerior quàm quæ sponte oritur, fuit, non est quod quis ob id Ambrosiam esse neget, cum planta aridis vel saxosis locis nata, si in hortis colatur, facile incrementum capere, & habitior atque vegetior reddi possit, qualem pictura hæc ostendit, quæ est Ambrosiæ hortensis campestris & sponte enatam foliorum magnitudine, longè superantis, odore, sapore, habitu non diuersis. Vires Ambrosiæ à veteribus assignata tam egregiæ appellationi haud respondent. Vim habet, inquit Dioscorides, sistendi ac reprimendi, & illitu adstringendi humores, qui in aliquam partem illabuntur. Plinius, usus eius ad ea quæ discuti opus est. Verù his verbis Plinius vim repellendi ἀπορροιστικὴν Dioscoridi dictam, in vim discutiendi διαρροιστικὴν appellatam commutauit. Nam & Galenus scribit Ambrosiam illitam vim habere adstringentem & repellentem. His subiungemas plantam quam Ambrosiam montanam Herbarij vocant. Quæ ex obseruatione Dalechampij, in Allobrogum monte Gratianopoli vicino quem Diui Enardi vocant, in alta & opaca silua gignitur, fruticosa, exili radice, proluxa admodum, lignosa, nigricante: quatuor aut quinque cauliculis, dodrantalibus erectis: foliis Idææ viti aut pruno siluestri similibus, venosis, subrotundis, in ambitu nonnihil serratis, quatuor aut quinque ferè simul ex eodem in caulibus loco prodeuntibus: bullis multis absque flore, in caulium summis virgulis racemetim coherentibus, angulosis, subrotundis, prominente è singulis apice, muscarum rostro siue proboscidi simili, saporis acerbis.

Locus.

Forma.

Ibidem.

Li. 6. simpl.

Locus.

Forma.

ANTHYLLIS,

CAP. XXXIII.



ANTHYLLIDES aliquot explicauimus in libro de maritimis plantis, quasdam alasi hoc aptiore loco declarabimus. Primum eam quam Anthyllidem secundam vocant herbarij, Monspelientes luam muscatam, in agro Monspelienti ubique nascentem, radice crassiuscula, modicè

ANTHYLLIS,  
II. Herbariorum.



fibrata, non admodum longa, candicante, tribus aut quatuor cauliculis, dodrantalibus, minimè furculosis, ex eadem radice surgentibus: foliis Chamæpityos tertiæ circum caules densis, in vertice potissimum, oblongis, in ambitu dissectis, sed non Chamæpityeos modo in tria foliola fissis: flore purpureo ad foliorum exortum ex interstitiis prodeunte, odorato: semine in vasculis exiguo. Eandem agnouit Pena, & Anthyllidem Chamæpityoidem vocat, quæ in oliuetis, inquit, & aridis aruorum marginibus Narbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, nec alibi remare nota. Moschata autem vulgò vocata fuit, quod odora quidem sit, sed olfactu minimè grata, nec pinum redoleat, veræ & odoratæ chamæpityi cognata, sed rigidioribus furculis, sarmentosis, lignosis, breuioribus, foliis latioribus, longioribus, leuiter incis, copiosis, lanugine obductis: floribus inter hæc maioribus, purpureis, semine hirsuto: radice lignea, gustu amaro, ingrata tota, & nonnihil styptica. Clusius Anthyllidis alterius nomine depinxit. Alia est Anthyllis montana, quæ in vmbrosis montibus nascitur, radice breui, contorta, alba, modicè fibrata, caulibus




## ANTHYLLIS

Montana.

## ANTHYLLIS Altera

Italarum, Lobellij.



multis, palmum altis, rotundis, foliis densis, per caules alternatim dispositis, longis, linariæ modo, propè caulem trifidis, gustu subsalsis, è quorum medio, flos exit, deinde semen minutulum in rotundis oculis lino similibus, quibus herbaceus apex veluti præfixus insidet. Lobellius pinxit Anthyllidem alteram Italarum Camphoratæ congenerem (de qua in fine libri huius dicemus) stirpem tenuifoliâ, humilem pinum exprimentem, quam Dioscoridis alterum Anthyllidem Aiugæ foliis & ramulis putabant Itali docti. Sed quum minus olida sit, Monspelienfium Iuam Moschatam pro secunda Anthyllide retinendam censet. Surculis, foliis, ortu & facie Camphoratam adumbrat: sed exilior tota & summis virgultis, tomentosis, mucosis flosculis, luteo pallentibus, gustatu præcicis.

## LINARIÆ,

## CAP. XXXIIII.

Locus.  
Forma.

Linar. cæ-  
rulea.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

**M**ULTAS Linariæ species herbarij obseruarunt, quarum aliquot hîc depinximus. Prima est Linaria tenuifolia cognominata, quæ in aridis, macris, & perflatis nascitur: radice valde capillata, nigra: caulibus multis, dodrantalibus, rotundis: folio lini, tenuissimo & subtilissimo: saporis subauster: flore copioso: priusquam hiet, rubente: cum apertus est, ex rubro albicante: semine minutulo: in oblongis & corticosis vasculis. Linaria cærulea radicem mittit duram, lignosam, albam: folia proximè radicem multa, burse pastoris similia, laciniata, rariusculè venosa: caulem cubito proceriorem, foliis vestitum, longis, Linariæ similibus, angustioribus, nigrioribus, per ambitum minimè incisis, quinque senisve ex vno pediculo in caule extante simul prodeuntibus, capillacea tenuitate: ramulis multis, gracilibus: flore copioso, ex cæruleo albicante, in thyrsi modum congesto, quo decedente vascula subsequuntur infernè valde compressa, supernè latiora, bifida, vt in Elatine. Gignitur in aridis, squallètibz & apricis. Floret Maio desinente. Totius plantæ sapor amarus est. Vlcera sordida purgat, lumbricos interficit,



*LINARIA Tenuifolia.*



*LINARIA Carulea, Dalech.*



*LINARIA Odorata, Dod.*



*LINARIA Minor, Dalech.*



interficat, obstructions expedit. Linariam odoratam profert ager Lugduno vicinus foliis similem vulgari. Ceterum huius flos ex caruleo candicat, vulgaris subluteus est, & corniculata cauda terminatus, ille minimè: præterea suavisimè olet, quam obrem odoratam vocauerunt, cum vulgaris flos gravem odorem spiret. Linariam odoratam etiam pinxerunt Dodonæus & Clusius, quæ singulari est caule, nonnunquam cubitali, in multos tenues ramulos supernè diuiso, quos oblonga folia,



folia, lino similia ambiunt, quæ tamen iuxta radicem sunt humi sparsa, longè maiora latioraque, bellidis foliis similia, sed per ambitum ferrata, nonnulla etiam per caulem sparsa, aliàs incisa: flos exiguus, copiosus virgulis seu ramulis spicatum insidet, caruleus, lauandulæ ferè æmulus extrema parte hamuli instar incuruus

*LINOSTYRIS* Recentiorum, Lobell.



*LINARIA* Aurea, Tragi.



(quem pictor non satis accuratè expressit) aliquantulum odoratus: semen exiguum, rufum, in valvulis, linariæ similibus, sed minoribus continetur. Radice est singulari, candicante, minimi interdum digiti crassitudine. Sponte provenit montosis Castellæ locis, lapidoso & arido solo, ubi Aprili floret, & Maio, Iunioq; semen profert. Linaria minor in saxosis & asperis Arbæ fluuij propè Geneuam ripis gignitur: radice breui, nigricante, capillata: cauliculis multis, dodrantalibus: folio lini, numerofo: flore purpureo, corniculo simili, phœniceum verticem amplectente, & contegente: semine paruo, in rotundis vasculis, lino similibus, præfixo pilo tenuissimo insignibus, capreolo simili. His addenda ex Lobellio Linofyris recentiorum, quæ sic vocarunt propter similitudinem cum Linariis & Scopariis. Est enim virgis rigidis & foliis Scopariæ aut Osyridis vulgaris: sed flores in summitatibus luteo fuluo languent, Asteris montani angustifolij vel Cnithmi Chrysanthemi situ & positu: parilitate & effigie conyzæ maioris aut minoris. Cauliculi pedem & cubi-

*PASSERINA*, Linaria folio, Lobelij.



tum



tum æquant. Hanc in collibus Narbonensis Gallie non procul à mari erutam meminit Lobellius: qua ad Balnea propè Frontignanum itur. Est acris gustati, glutinosa, amaricans, Senæ amulo sapore, ad Thymelæam accedente. Tum Linaria aurea Tragi, Hyssopus umbellifera Dioscor. Guilandino, Helichrysi genus. Prorsus genere eadem Linosyridi videtur: facie siquidem, iisdem foliis & cubitalibus summis alis multifidis cauliculis neutiquam diuersa: sed extrema florum bullata capitula copiosis aureis villis referta, fulgent: radix lignosa, fibrata, semen exiguum. Præterea Passerina Linariæ folio, Linariis ob similem effigiem reddeda: folia etenim Linariæ similia, sed acruatim in capitulis coriandrinis seminibus paribus, summis Chrysocomes similibus, pallidioribus, furculosis pediculis lini flosculi pallentes. Ex agro Monspelienfi oriunda. Hæc Lobellius.

HYPERICVM CAP. XXXV.

**Q**VÆ planta Græcis ὑπερίδι, ἀνδροῦμιον & χαμαίπυτος, Latinis similiter Hypericum, Androsæmum, & Chamæpitys nominatur, Mauritania Reiofricon, & Reiofaricon, Italis Hyperico, & Perforata, Germanis S. Iohanskraut, Hispanis Coraconcillo, Gallis Millepertuis. Androsæmum ob florem, qui digitis confricatus sanguineum emittit liquorem, dixerunt: Chamæpityn verò ab odore seminis resinaceo: Perforatam, & Millepertuis, quòd folia soli obuersa innumeris foraminibus scatere, & omni ex parte punctis quibusdam pertusa esse videantur, quod neque à Dioscoride, neque à Plinio annotatum fuit. Hypericum, ut descripsit Dioscorides, frutex est furculosus, palmi altitudine, folia

Nomina

Lib. 3. c. 10. Formæ.

HYPERICVM, Math.



habens rutæ similia, florem luteum, (in vulgatis Græcis exemplaribus Leucoij mentio nulla, in Oribasio tamen legitur, ἄνθος ἔχον μίλανον, λευκοῖο ὅμοιον, idest, florem habens luteum, Leucoio similem, quam lectionem Matthiolus approbat. Nam Hypericum floris colore violam luteam proximè refert, vtendumq; voce Græca Leucoij cæset, ne ex albo aliqua suboritur difficultas, quod fortasse Marcel. Florentiaio imposuit, qui florem Hyperici album interpretatus est,) qui inter digitos tritus sanguineum succum remittit, ramulos subhirsutos, in rotundo oblongos, magnitudine hordei (inemendati sunt hoc loco vulgati codices Græci, κλωνία ὑποδάσσεια, πορμήκη, ἐν τῷ περὶ περὶ, μέγας κελθῆς, ἐν ᾧ σπέρμα, &c. in quibus necessario deest vox, locū quo semen cõtineatur significans. Quare hanc lectionem minimè secutus Ruellius legisse videtur, περὶ κλωνία ὑποδάσσεια, vertit enim subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine, semine intus nigro, &c. Cornarius verò sic legit, κλωνία ὑποδάσσεια, χαρπὶον πορμήκη, &c. Idest, ramulos subhirsutos, fractum in

rotundo oblongum, hordei magnitudine, &c.) in quo semen nigrum, resinâ olens. Nascitur in locis cultis, & asperis. Ex hac Græci codicis emendatione, & præcipuum huius plantæ notarum declaratione, neminem latere potest, cam Hypericum Dioscoridis esse, quæ hodie à Medicis & Chirurgis maximè celebratur, & vñ quotidiano vsurpatur. Sunt autem notæ maximè duæ, quæ id certò demonstrant:

Locus.

nempe



nempe cruentus florum contritorum succus, qui odori sunt, pingues, glutinoso cōtactu harentes, & seminis odor resinaceus, in pericarpis copiosi, amari & ingrati gustanti. Plinius non omnino Discoridi consentit, etiam si de eadem herba agat, his verbis. Eadem præstat Hypericum, quam alij Chamæpityn, alij Conon appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali, rubente, folio rutæ, odore acri, semine in siliqua nigro, maturescente cum hordeo. Hæc Plinius. Hypericum æstate floret, Iulio potissimum & Augusto mensibus. Vim habet ciendi urinā, auctore Dioscoride, & ducendi menses appositum. A tertianis quartanisque cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta. Natura semini Hyperici spissandi, inquit Plinius, aluum sistit, urinam ciet. Ad calculos vesicæ cum vino bibitur. Galenus verò scribit calefacere & siccare, essentiaque tenuis esse, adeo ut & menses & urinas prouocet. Sed adhæc totum sumendum esse fructum, non tantum semen. Porro cum foliis viridem illitam ad cicatricem ducere cum alia, tum omnia ambusta. Caterum si sicca contusa inspergas, humida & putredinosa vlcera sanare. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant. Hyperico, ut scribit Matthiolum, vis inest referendi, resoluendi, agglutinandi, atque etiam cohibendi. Eporum semen ex vino calculos eiicit, & venenis aduersatur, venenatorumque moribus resistit, tum idem potum, tum herba ipsa deuorata haustave, tum moribus illita. Aqua stillatitia florecentis herbe maximè prodesse dicitur comitialibus & resolutis, si iis potanda detur. Datur seminis farina comode cum Polygoni succo ad sanguinis reiectiones. Inest floribus & semini mira facultas ad vulnera omnia sananda, præter ea quæ in capite sunt. Ideoque oleum in quo diu flores & semine prægnantes siliquæ maceratæ fuerint, diuque insolatæ, mirifice

recentia vulnera sanant: sed id efficacius præstat, si cum laticæ, aut abiegna lacrymæ oleo misceatur. Idem per se ventri illitum dysentericos iuuat, potum verò cochlearis mensura lubricos necat. Clusius Hyperici genus ostendit, quod multis constat ramulis per terram stratis, numerosis, confertisque foliis eos ambientibus, alteri Hyperico similibus, sed planè tomentosis & incanis: flores sunt secundum ramulos lutei, aliquantulum tamen pallidiores & minores quàm in vulgari, quibus succedunt capitula vulgari similia: radix lignosa

## HYPERICVM Humi stratum, Clusij.




Li. 2. Stirp.  
Hisp. c. 70.

## HYPERICVM Tomentosum, Lobelij.





*HYPERICVM Syria-  
cum, Lobellij.*



lignosa & dura: rami etiam ipsi per terram strati radices & fibras agunt. In conuallibus quibusdam non procul à Salamantica crescit, vbi Iulio florent plantæ latè sese diffundentes: item in Valentini regni maritimis, vbi Martio florent. Proculdubio hæc inter Hyperici genera referenda est, cum plurimum illi respondeat: imbecillior tamen, & vulgari magis odora. Lobellius adiecit aliud Hypericum tomentosum, quod prouenit in locis agri Monspelienfis natura vlginosi, sed feruidiore sole exustis, palmo non maius, & humi stratum, foliis item minoribus, & per interualla rarioribus: flore & semine luteolis, pallidioribus. Tota planta cana est & hirsuta, minus odorata, Hyperici sapore, sed imbecilliore. Præterea Hypericum Syriacum & Alexandrinum, cuius folia quadruplò minora sunt quàm nostri Europæi, quæ summis cubitalibus virgultis confertim tanquam in verticulis exeunt. Flores lutei nostrati per-similes.

*ASCYRVM,*

*CAP. XXXVI.*



ΣΚΥΡΟΝ & ἀσκυροειδές, atque etiam Ἀνδρόσμου, Latinis similiter Ascyron & Ascyroides. Hæc Hyperici species est, inquit Dioscorides, magnitudine differens, maiores ramos habens, surculosiores, puniceosq; folia tenuia, flores luteos, fructu Hyperico similem, resinacei

*ASCYRVM, Matth.*



odoris, qui cum digitis teritur, ipsos ferè cruentat: qua de causa Androsæmum vocauère. Plinius parùm à Dioscoride discrepans, scribit, Ascyrum & Ascyroides similia sunt inter se & Hyperico, sed maiores habet ramos quod Ascyroides vocatur, ferulaceos, omninò rubentes, capitulis paruis, luteis: semen in caliculis, pusillum, nigrum, resinofum. Comæ trita velut cruentant, qua de causa quidam hanc Androsæmum vocauère. Galenus Ascyron Androsæmi genus facit, vt dicitur. Verùm id Ascyrū est à Matthiolo cum Hyperico affabrè in commentariis expressum, quale & hic depinximus, iam notissimum, amnium & riguum, riuulorumq; pratensum amans valde, quadratos & rectos viticulos è radice multum fibris sparsa exiles erigens, Hyperici foliis, paulò maioribus, venosis, poros peruios habentibus, & floribus itidem luteis, coccineum cruorem affricanti illinentibus: seminis odore resinaceo sui indice, nares feriente, haud disparis, sed infrequentioris vsus. Facit huius fructus, inquit

FFF

oxipos oxipos oxipos  
ἐξ ὧν αὐτὸν ἵκεν ἡ φύσις  
ἀσχυροῦ ἐκ τοῦ ἀνδρῶς  
Nomina ἢ ἁπλῶς  
Li. 3. ca. 150. πολλοὶ αὐτὸν  
Forma. can.

Lib. 27. c. 5.

Li. 6. simpl.

Pena in  
Aduers.



Lib. 3. c. 54.

Vires.

Lib. 27. c. 5.

Dioscorides, cum hydromelitis heminis duabus potus, ad ischiadas ducit enim recrementa multa. Sed assidue dare oportet donec sanitati restituantur. Idem impostus ambustis prodest. Plinius, usus seminis, inquit, ad ischiadicos, poti duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluū soluit, bilē detrahīt. Illinitur & ambustis.

*ἀνδρὸς αἰμὴν* *La gnis*  
*ἀνδρὸς αἰμὴν* *ex humani*  
*ita est de* **Nomina**  
*de sua huius plantae*  
*dicuntur quod humani*  
*non quod humani*  
Lib. 3. c. 155.

Forma.

Li. 26. ca. 4.

Locus.

Ca. 155. li. 3.

## ANDROSÆMVM,


## CAP. XXXVII.



ΝΑΡΟΣΑΙΜΟΝ quibusdam Dionysias & Ascyrum, Latinis etiam Androsæmum nominatur, quasi humanum sanguinem dixeris, quod sanguineum succum emittat. Ab hyperico ascyroq; differt, ita tradente Dioscoride, quod fruticet ramulis surculosis ac tenuibus, virgis punicei coloris, folia habens triplo aut quadruplo maiora quam rutæ, quæ trita vinosum succum remittūt: alas in cacumine pinnatas, circa quas flosculi parui, lutei: semen in calice simile semini papaveris nigri, velut lineis notatum. Coma contrita resinofum odorem reddit. Plinius, Androsæmum, inquit, siue vt alij appellauere, Ascyrū non absimile est Hyperico, de quo diximus, cauliculis maioribus, densioribusq; & magis rubentibus: folia alba, rutæ figura: semē papaveris nigri. Coma trita sanguineo succo manant: odor resinofus. Gignitur in vineis medio Autumno effoditur, suspenditurq;. Androsæmum ex Matthiolo hīc pictū damus, quod etiam Lobellius & Pena approbant, in opacis & siluosis proueniens, non modò floribus, sed etiam foliis tritis & expressis muriceum succū reddēs, quo vno

ANDROSÆMVM,  
Matthioli.

ANDROSÆMVM, Dod.  
II. Fuchf.



præ cæteris Androsæmum hoc agnoscendum, & discernendum. Procerius est maiusq; Hyperico, & altero tanto maiora folia habet, sed pauciora, eidem etiam similis flore, & semine procerioribus, cubitalibus, gracilibus, rotundis, rubentibus ramis. Androsæmum aliud ostendunt Dodonæus & Fuchsius, quod Itali Clymenum putant, pleriq; Sicilianā appellant, quod in Sicilia tantū reperiri falsò credūt, quidam Clymenū Plinij, Galli *Toutesaine*, quasi Panaces, idest, omniū morborum remedium

*Sicilianæ*



ANDROSÆMVM  
Alud, Dodon.



ANDROSÆMVM  
Album, Dalechampi.



Cæterum in vino austero decocta, vinum ipsum vulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

remedium. Hæc plâta semper virēs virgas producit vimineas, vt describit Pena, sanguineas, nitentes, rectas, flexiles, nonnihil angulosas, aut secundū longitudinē striatas, Periclymeno similes & eiusdē coloris: folia bina ex interuallis, infernē cassia, supernē saturatē virētia, etiā Periclymeno similia, nisi q̄ ex geniculis erūpant, nec vti illa à virgis traiciuntur, quæ non tam sanguineum cruorem vel fundunt, vel affricta illinunt, vt diximus de Androsæmo vero: flores lutei sunt: deinde bacca parua, primū rubra, deinde nigra, cruore purpureo, & seminibus fuscis, minutis turgida. Radix foris fusca, intus alba, lignosa, fragilis, pedem & sesquipedē longa, gustanti resinosa, lentoris expers: nec tota planta ingrata, nonnihil gummi Elemni, aut trifolij odorati sapit. Moderatē adstringit digerendo, & desiccatur, parua admodū, aut nulla calfactione. Vulnerariis remediis, balsamis, oleis, potionibus commodissima, & vsu multō laudatissima. Auctor est Pena in Angliæ siluis, lucis & nemoribus frequentem esse, Flandris hortensem. Androsæmi semen, vt scribit Dio-

Vires.

scorides, tritum, duabus drachmis potum, biliosa alui excrementa pellit. Ischiadicos maximē sanat, verū post purgationem aquam exorbere oportet. Sed & herba ambusta sanat imposita, & sanguinem sistit. Vulgati codices habent, *καὶ αἷμα ἐπέχῃ*, cum in veteri legatur, *καὶ νομῶς ἐπέχῃ*, id est, vlcera carnem exedentia compescit. Qua de re fusiū hæc Plinius. Vfus ad purgandam aluum tusa cum semine, potaq; matutino, vel à cœna, duabus drachmis, in aqua mulsâ, vel vino, vel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prodest ischiadicis maximē. Sed proxima die capparidis radicem resinâ permixtâ deuorare oportet drachmæ pondere, iterūque quatrīdū interuallo eadem facere. A purgatione autem ipsa robustiores vinum bibere, infirmiores aquam. Imponitur & podagris & ambustis, & vulneribus, cohibens sanguinem. Androsæmum, inquit Galenus, planta fruticosa, natura duplex. Vnum enim Ascyrum & Ascyroides nuncupatum est species hyperici: alterum verò à quibusdā Dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium, florum verò facultas modicē extergens, & desiccans, vt & ambusta curare credantur.

Li. 26. ca. 4.

Li. 6. simpl.



## CORIS,

## CAP. XXXVIII.

Nomina

Forma.

Li. 26. ca. 8.



## CORIS, Matthioli.



## CORIS Monspelienfis.

Li. ca. 156.  
Vnes.

Li. 26. ca. 8.

YPERICO & congeneribus plantis Coris subiunxit Dioscorides, tanquam similem, atque etiam congenerem, ideòq; ab aliquibus Hypericum nominari scripsit, foliumq; habere Erica simile, minus tamen, pinguius ac rubrum. Est autem frutex palmi altitudine, ori gra-

tus, acris & odoratus. Plinius quoq; Corin hyperici genus facit, & similiter fere describit, his verbis. Est aliud Hypericum, quod alij Corin appellat, folio Tamaricis, & sub ea nascitur, sed pinguioribus foliis & minoribus ac rubetibus, odoratum, palmo altius, leniter suave, aculeatū. Hic Tamaricis folio dixit, pro Erica folio. Matthiolus pro Cori plantam hic pictam exhibuit, scripsitq; Corin non ita Hypericum referre, quemadmodum Ascyro & Androsamum: itq; nudam tantum Dioscoridis historiam subdidit, eamq; plantam saepius ad se ab herbariis allatam, nasciq; frequentissimam in Italia, nulla adscripta aut figuræ aut virium declaratione. Eam Lobellius descripsit. Matthioli Cori, inquit, flores stellati Ornithogali minores, ex rubore candicantes, quorum apicali flauent. E lignosa radice multos spithameos cauliculos & foliola kali aut spergulæ stellatim ex geniculis profert. Gaudet pratis in afflatu maritimo. Aliā Pena Corin pulchram & valde hilari aspectu depinxit, quam Monspelicam cognominat, quia nusquam nisi Monspelij & Frontignani

ad radices Cetij montis, & propè Magalonem reperit. Fruticat hæc ramulis multis, densis, duriusculis, surrectis, rotundis, palmum & sesquipalmum altis, lignosis, cuius foliola densè stipata Erica maiori similia sunt, & similiter disposita: flores in summis ramulis purpurei, aut ex purpurea cærulei, elegantissimi spectantur: semen utriculis, mollioribusve alabastris paruis conclusum, rotundum, Tamarici par, glaucum vel pullum, tenuissimis glumis inuolutum, quasi oculi pupilla tutior inde foret. Radix multò sanè maior, longior & crassior, quàm pro plantæ modo, Anchusæ minoris par & concolor. Tota enim planta rubella visitur, & succo purpureo radices pannos imbuendo commendatur: amaricat, gustu subacri, non inodora. Huius semen potum, inquit Dioscorides, urinas & menses ducit, auxiliatur commorsis à phalangiis: ischiadicis item & opisthotonicis cum vino potum: ad rigores verò cum pipere. At in opisthotonicis etiam commodè cum oleo illinitur. Plinius aliter de eius viribus scripsit. Vis semini excalfactoria, & ideo inflationem facit enterocelis, sed stomacho non inutile, præcipuum



præcipuum ad stranguriam, si exulcerata non sit vesica. Medetur & pleuriticis ex vino potum. In quibus cum hæc sensum rectum non habeant. Et ideo inflationem facit, &c. sic emendat Cornarius ex veteri codice. Et ideo ad inflationem facit, sed stomacho inutile, &c. Eandem Monspeliensem Corin depinxit & descripsit Clusius, florereq; ait mense Maio, nonnunquam etiam Martio, siccis quibusdam circa Salamanticam & Monspelium locis, & maritimis Valentia & Gallia Narbonensis. Eandem dudum depingendam curauerat, & breuiter descripserat Dalechampsius. Radice multiplici, lignosa, rubra, caulibus multis, dodratalibus, rubentibus, surculosis: foliis multis, exiguis, Erica specie, gustu amaris. Flores in caulium fastigiis veluti spicati congesti sunt, ex caliculis siue alabastris paruis exeuntes purpurei, venustissimi.

Li. 2. Stirp.  
Hisp. c. 94.

CHAMÆPITYS,

CAP. XXXIX.

**C**HAMÆPITYS, VAE Græcis χαμαίπυτος, Latinis quoque Chamæpitys, Aiuga, seu Abiga, Plinio auctore, nominatur: inuenitur & Ibiga vocari, quod nomē Hermolao teste, ferè seruāt hodie. Hinc abiectis duabus literis i, & g, Iba, & ab Aiuga abiectioe duarū literarū, a, & g, Iua manauit in vulgi appellationem. Officina Iuā muscatā appellant, & Iuā arthetica, Arabes Hamifuros, seu Chamafithius, Itali Chamepitio & Iua, Hispani Pinilho, & Iua arthetica, Germani Ye lenger, ye lieber, Galli Iue muscate, & Arterique. Cæterū Chamæpitys dicta est, idest, humilis siue pumila picea, q̄ eius folia piceā oleant: Abiga verò propter abortus, Plinio & Dioscor. auctoribus, quos, educēdis iis quæ in vtero sunt, excitare solet: vt & Arthetica, siue potiùs Arthritica, quod ischiadicis, & cæteris articulo- rum doloribus opem ferat. Dioscorides tria Chamæpityos genera ponit. Primam repentem, foliis sedi, alteram maiorem, tertiam marem. Plinius totidem, sed inuer- so ordine. Primam maiorem, alteram breuiorem, tertiam marem. Chamæpitys, vt

Nomina  
Li. 24. ca. 6.

In Coro.  
176. lib. 3.

*Abiga ab abigere  
scilicet abortum  
Abiga et Ibiga  
sed Ibiga hinc  
A et I. de Iua  
χάμας humilis πύτος  
picea hinc hinc g  
Genera. cæ.*

Lib. 3. c. 157.  
Forma.

Cap. 179.  
simpl.

Li. 24. ca. 6.

CHAMÆPITYS Prior,  
Matthioli.



describit Dioscorides, herba est per terram serpens, subcurua, folia minori Aizoo similia habens, multò tamen tenuiora & pinguiora, hoc est, Serapione interprete, quæ habent super se humiditatem tenacem, hirsuta, circa ramos frequentia, odore piceæ: flores exiguos, luteos, aut candidos: radicem cichorij. Altera cubitalibus est ramis: anchoræ modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semine nigro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ mas appellatur, herbula est foliis tenuibus, candidis & hirsutis: caule aspero, candido, flosculis luteis: semine secus alas pusillo: piceam & hæc olet. Plinius non adeò cum Dioscoride cōsentiens, hæc scribit. Chamæpitys, Latine Abiga appellatur, diciturq; propter abortus, ab aliis Thus terræ, cubitalibus ramis, flore pinus & odore. Altera breuior & incurua similis. Tertia eodem odore, & ideo nomine quoque, paruulo cauliculo, crassitudine digitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris nascens. Prima Dioscoridis Chamæpitys à Matthiolo depicta, ea est quàm hic primo loco expressimus: tertia, quam secundo:



In Aduers.

Locus.

mediam maiorem se non nosse fatetur. At Lobellius & Pena primam Matthioli, & Dodonæi non primam, sed marem, siue tertiam Dioscoridis esse statuunt, eam nimirum, quæ comperta vilitatis & vulgaris cognitionis vbique prouenit. Sabuleta, arida, lapidosaq; vineta & oliueta amat Narbonensis Gallia, vbi perquã odorascentis gracilibus, hirsutis, inflexis, numerosis: pini foliis, vel psyllij, minoribus, incanis, cōsertis, resinosis, exiguis interfertis secus flosculos, melinos, veronicae femina, sed semine oblongo, tereti, fusco, Germania Gallia & Angliæ agris sponte peruia, sed paucis in locis: eoque in hortis tantum colitur, ad medicos tamen vsus odore & viribus cultura ignauior: radix fibris duriusculis, lignosis, amaro sapore, medicato, subacri, neutiquam dulci, sed resinaceo, diuq; faucibus harente, quæ idcirco nonnullis Germanis *Vergiftenymicht*, idest, ne mei obliuiscare, forte dicta fuit, quod etymum dum Matthiolus à Germano Pharmacopœo & Brasauola adductum reprehendit, immeritò facit, nam ipsemet fallitur, cum aliam vocatam

CHAMAEPITYS Tertia,  
siue altera Matth.



CHAMAEPITYS Prima,  
Dioscor. Pena & Lobel.



*ye lenger ye leber*, id sonantem, quò diutius eò amantius, aut gratius (hoc autem amaræ dulci siue circeæ meritò quadrare diximus) in hanc transfert. Altera Chamaepitys siue tertia Matthioli, & tertia Dodonæi luteolis floribus iisdem Lobellio & Pena auctoribus, prima est Dioscoridis, pinum redolens, minus nota, & paucis obuia locis, tamen odoratior, collibus aridis & aruis editioribus Nicæ Sabaudorum, & Genuæ Ligustrum fruticat. Quinetiam eandem vireta nonnulla Belgij studiosè colunt: radice fibrata, sonchi, aut dentis leonis, minore. Ramulos ea profert palmum altos, humistratos, foliolis septos, semperuiui minoris, aut potius vermicularis, minus carnosus, sed incanis, & hirsutis, in quibus flosculi in medio albidii. Suauiore spirat hæc odorem, interdum vliginosum, quemadmodum muscus quernus aut cedrinus. Secunda verò Dioscoridis Chamaepitys fortassè est vermiculatus frutex maior, de quo diximus capite de Aizoo. Chamaepitys altera etiam multis dicitur quæ capite proximo Chamædrys altera, & Chamædrys femina nominatur




nominatur. Ad harum genus refert Dodonæus plantam, quæ quod foliorum  
folam formam cui imitetur, odore verò destituta sit, Pseudochamaepitym appellat.  
Primæ Dodonæi procumbentibus ac tenuibus pediculis foliisque similis est, sed  
floresculis differt, qui in hac candidi sunt, & inuersos Lamij flores satis referunt,  
ipsis tamen & longiores & patentiores. Quaterna inde coherent semina: radix  
mediocris crassitudinis. Ex Hispaniis anonymum missam fuisse ait Dodonæus.  
Scribit Clusius se in Hispaniis inuenisse pusillam quandam plantam Aiuga ad-  
modum similem, tum cauliculis, tum foliorum trifidorum forma, hirsutam totam  
subaslo gustu, & inodoram, nisi quiddam herbaceum & ingratum redoleret. Flo-  
res extremis ramis ex alis prodeunt, Aiuga similes, sed maiores & albi: semina quæ-  
terna in singulis caliculis cinerei coloris, maiuscula & rotunda ferè: radix crassiu-  
scula, subalbida. Prouenit locis incultis, & æstate floret. Eadem esse videtur quæ  
Pseudochamaepitys Dodonæi, aut cerè simillima. Chamaepithyos primæ folia, au-

PSEUDOCHEMAEPITYS,

Dodonæi.

AIUGA ADULTERINA

Clusij.



lore Dioscoride, septem diebus in vino pota regio morbo medentur: quadraginta  
verò, ex hydromelite ischiadicos sanant. Dantur peculiariter iocinorosis, vrine dif-  
ficultatibus, & renum vitiis, prosunt etiam torminosi. Ea apud Heracleam Ponti-  
cam, perinde atque antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad an-  
tedicta illinitur cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis  
data aluum emollit. Excepta melle, squama æris, & resina, purgat. Apposita cum  
melle ducit quæ ab vtero duci solent. (legitur enim Græcè, αἰγὴ δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς ἐπὶ  
τῆς σπλάγνης οὐ μὲν ἴσως, significant enim τὸ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῆς σπλάγνης non solum menses, sed etiam  
fœtus & secundas, quare Abiga ab abigendo partu, & procurando abortu nuncupa-  
ta est). Manimarū duritias discutit, vulnera glutinat, herpetas cum melle illita co-  
hibet. Secūda & tertia eandem vim obtinent, non tamen adeo efficacem. Eadem fe-  
rè Plinius de vsu medico tradit. Prosunt aduersus scorpionum ictus. Item iocinori,  
illita cum palmis, aut cotoneis. Renibus & vrinæ decoctum earum cum farina hor-  
deacea. Morbo quoq; regio, & vrine difficultatibus ex aqua decocta bibuntur. No-

Ibid.

Viresc.

Temper.

Lib. 24. c. 6.



uisissima contra serpentes valet cum melle. Sic & apposita vulvas purgat. Sanguinē densatum extrahit pota. Sudores facit perunctis ea, peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulæ cum ficu aluum trahētes. Lumborū quoq; dolorē victoriati pondere in vino finit, & tulsim recentem. Mortuos fœtus ex aceto cocta potaq; eiicere prinus dicitur. Galenus verò multò distinctiùs, Chamæpitys, inquit, amarū quidem gustu saporē validiorē acri obtinet: effectū verò purgat, abstergitq; viscera, plus quam calefacit. Proinde regio morbo corréptis, & omninò quibus faciliè iecur obstruitur, bonum est remedium. Quin & menses ducit, tum pota, tum apposita cum melle. Sed & vrinæ mouendæ aptum est medicamentum. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis, decoctam cum melicrato. Herba porro ipsa viridis magna vulnera conglutinat, & vlcera putrescentia sanat mammarum præterea du ritias discutit. Est enim in siccando ordinis tertij, in calfaciendo verò secundi.

## CHAMÆDRTS,

## CAP. XL.

## Nomina



ΑΜΑΙΔΡΥΣ & χαμαίδρυς Græcè, Latine Trixago siue Triflago dicitur. Officinæ Græcum nomen retinent, vulgò Quercula minor, & à serratis foliis Serratula appellatur, Arabicè Damedrios, Chamadrios, seu Kemadrius, Italicè Chamedrio, Quercuola & Calamandrina, Germanicè Gamander, lessen Bathengel, Gallicè Germandree, vel Chesnette. Chamædryes autem Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quòd scilicet, folia quercus habeat. Dioscorides & alij veteres vnicam faciunt Chamædryn: recentiores verò herbarij plura eius genera. Fuchsius quatuor depinxit: primū veram Chamædryn, eamque duūm generum, marem scilicet, & fœminam. Deinde Chamædryn vulgarem duūm item generum, marem scilicet, & fœminam. Alij aliter eius genera distinguunt. Chamædryes, vt describit Dioscorides, frutex est paruus palmi altitudine. Chamædryes, vt describit Dioscorides, frutex est paruus palmi altitudine, folia habens parua, & figura & diuisuris quercui similia, amara, florem subpurpleum, paruum (in veteri codice legitur ἀνθος ὑποπόρφυρον, μικρὸν, καὶ ποικίλον, id est,

## Genera.

## Cap. 33.

## Lib. 4. c. 96.

## Forma

CHAMÆDRTS,  
Matthioli.CHAMÆDRTS Vulgaris,  
mas Fuchsj.

florem

hec figura est ead. cum  
Hic chorace femina pag. 1337.




florem purpurem, pusillum, amarum. Oribasius legit *ὑπόπυρρον*, id est, subru-  
fum. Ruellius Plinium secutus, verum, flore parvo, penè purpureo). Nascitur in aspe-  
ris & petrosis locis. Colligere ipsam oportet semine pregnantem. Breuiter sic Pli-  
nius. Chamædrys herba est quæ Latinè Triflago dicitur: aliqui eam Chamædro-

*Locus.*

Lib. 24. C. 15

*CHAMAEDRYſ* *fœmina*,  
*Dodonæi.*



pem, alij Tœuriū appellauêre. Folia habet ma-  
 gnitudine mentha, colore & diuisura quercus.  
 Alij ferratam, & ab ea ferram inuentam esse di-  
 xêre: flore penè purpureo. Hâc faciè vèrè refert,  
 quæ hîc piêta est, radice exigua, fureulosa, virgul-  
 tis numerosis, pedem altis, foliis in ambitu fer-  
 ratis, binis, numerosis, vt quercus, sed profundè  
 minis incisîs: floribus purpureis. I-hâc Chamæ-  
 dry, minor appellari potest. Nam quæ Antuer-  
 piæ atque alibi in hortis visitur, maior: quod foli-  
 is sit maioribus, candidioribus, flore cæso, pal-  
 lescente, vbi etiam niues imbrêsque spernit, illa  
 cōtrâ breui marcescit. His addêda minima, quæ  
 à quibusdam femina dicitur, & hoc nomine à  
 Dodonœo pingitur humilis herbula, multis cau-  
 liculis, lanuginosis, foliis hirsutis, profundius &  
 ferè decussatim infectis: aësculis purpurascen-  
 tibus, circum cauliculis emicantibus: femine  
 in rotundis capsulis, nigro, & rotundo: radice  
 crassa, plurimis fibris capillata. Eadem est quæ à  
 Matthiolo pro Chamædry altera piêta exhibe-  
 tur. Quibusdam Chamæpithys altera piêta videtur  
 esse, quam floribus & odore quadatenus refert,

Pet. Pe. in  
Ad.

Lib. 1. c. 16.

CHAMÆDRYS Altera,  
Matthioli.



*CHAMAEDRYS Vulgaris,*  
*femina Fuchſij.*



aliis

See figure of cat on  
Kewbore map Vol. IV. p. 1137.



aliis Ocimastrum. Dodonæus in Libro Purgant. Chamæpitym tertiam facit, Lobelius Chamædrym aliam laciniatis foliis, vel potius Chamæpitym alteram, Tragus Chamætyparissum agrestem. Aliam hîc quoque appositam herbarij Chamædryn montanâ vocant, à foliorum cum chamædry similitudine, & à natalibus, aliis Leucadem Dioscoridis, ob foliorum eximium candorem. Frutex, aut potius suffrutex

**CHAMÆDRYS** *Montana,*  
*Dalechampij.*



Lib. 4. c. 69.  
Viresc.  
Temper.

est in editissimorum montium saxosis, cōfrago-  
silq; locis proueniens, pedis aut sesquipedis lon-  
gitudine, radice nigra, longa, huc illuc sparsa,  
lignosa, caules multos gignente, è nigro rufesce-  
tes, rotundos, humi sparsos, folia quercui aut  
Chamedryj similia, marginibus valde incisa, su-  
perne nigrius virētia, inferne candicantia, den-  
sius congesta: flos longo nititur petiolo, albus,  
rosæ siluestri aut cistho similis, quinque foliolis  
constans, luteis in medio staminibus, eleganti  
formosq; aspectu. Lobellius etiā Chamædryn  
montanam duriores pinxit, Ceruicariam Gef-  
neri, quorundam Italarum *Chioma di Ioue*, sic di-  
ctam à floris similitudine, qui è foliolis sericeo  
vellere in latam cæsariem tortilibus crinibus  
explicatur, in cæteris omnibus huic nostræ pla-  
næ similem. Tota planta valde adstringit, vt gu-  
stus demonstrat. Chamædrys prima, auctore Dio-  
scoride, recens ac viridis in aqua decocta & po-  
ta, conuulsis, tussientibus, lienî indurato, vrinæ  
difficultatibus, hydropicis inter principia auxi-  
liatur. Cit menses, fœtusque extrahit, lienem ex  
aceto pota minuit. Aduersus venenata cum vi-

no pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur, cum melle ve-  
tera vlcera purgat, cum oleo trita inuncta & illita oculorū caliginem discutit. Eadē  
Lib. 24. c. 15 magna ex parte Plinius tradidit. Aduersus serpentium venena pota illitaq; effica-  
cissima. Itē stomacho, tussi vetusta, pituitæ in gula cohærescenti, ruptis, conuulsis,  
lateris doloribus. Lienē consumit. Vrinam & menses cit, ob id incipientibus hydro-  
pici efficax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquę decoctis vsq; ad tertias.  
Sanat & vomicas, & sordida vlcera cum melle, fit & vinū ex ea pectoris vitiis, folio-  
rum succus cum oleo caliginem oculorū discutit. Ad splenē ex aceto sumitur. Ga-  
Lib. 8. sim. lenus qualitates eius & effectus enucleatē declarat, his verbis. Chamædrys vincen-  
tem habet qualitatē amarā. Est & quodāmodo acris: quare meritō lienes colliquat  
& vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstru-  
ctiones purgat. Ponatq; eam quispiā in tertio ordine excalfacientium & desiccant-  
rium, plus tamē calefacit quàm discutit. Theophrastus aliā vim foliis, aliam semini  
Lib. 9. hist. tribuit, his verbis, τῆς ὅ χαμαῖδρυος ἡ μὲν φύλλα πρὸς τὰ ρήγματα, ἡ πρὸς τραύματα ἐν  
cap. 10. ἐλαίῳ τελεωμένα, πρὸς τε τὰ νεύμενα ἔλκει. τὸν ὃ καρπὸν καὶ αἶρεῖν χολὴν, ἀγχαθὸν ὃ ἐν ὀφθαλ-  
μοῖς. πρὸς ὃ τὰ ἀργεῖμαλα προσάγειν ὃ φύλλον ζεῖσαντα ἐν ἐλαίῳ, ἔχει ὃ τὰ φύλλα οἷά περ  
δρυὸς. τὸ ὃ ἀνάστημα τῆς ὅλης ὅσον σπιγαιμαῖον, ἐν ὅσμον ὃ καὶ ἡδύ. Id est, Trislaginis folia ad  
rupta vulneraq; in oleo trita valēt, & ad depascētia vlcera, semē bilem trahit, & ocu-  
lis quoq; vtile est, foliū ad albugines tritum in oleo prodest. Hęc Theophra. Chame-  
dryn montanâ ad vëtris profusiones, mensiū abundantia, sanguinis effluxiones, vo-  
mitiones immodicas Alpini cōmendant, sed ad dysenterias præcipuē, huiusq; fron-  
dē damas auidissimē carpere narrāt in locis huius plātæ feracibus degere cōsuetas.

VERO



VERONICA MAXIMA, CAP. XLI.



**V**N SEQVANIS gignitur quæ maxima Veronica dicitur à nonnullis, ad montium confragosa præcipitia inter ipsa saxa, radice nigra, plurimis fibris capillata, caulibus multis fruticosa, cubitalibus, foliis quercus, multum crenatis, semper geminis, caulem Chamædryos instar amplexantibus, quam ob causam Chamædryos genus esse quidam volunt, surculis multis ex alarum sinu prodeuntibus, minimè foliosis: flore denso, puniceo, Veronica, exiguo, specioso: semine in loculis latis, duobus simul iunctis, Elatine non dissimilibus.

TEUCRIVM, CAP. XLII.

**T**EYKPION vel *teucrios* à Teucro inventore, quibusdam ob similitudinem Chamædryos dicta, Latine etiam Teucrium nominatur. Herba, inquit Dioscor. virgata, similis chamædryj, tenuifolia, & ciceri

Nomina

Lib. 3. c. 95.

Forma.

simile folium habens. Ex qua breui & fortasse mutila descriptione, quamvis minùs certa Teucrij notio sit, tamen Chamædryos cognitio ad consimilem herbam accommodata, fecit ut Teucrium legitimum innotesceret, quod ob similitudinem, Galli *Grosse Germandree* vocant, Germani *Groschatengel*, id est, grandem Chamædryn. Locis montosis & aridis fruticat, virgultis multis, rectis, lignosis, foliis planè Chamædryos, sed crassioribus, aliquantò minùs incanis, rugosis & asperis: flores item Chamædryj consimiles sunt, sed purpureæ magis saturæ. De Teucro sic Plinius. Inuenit & Teucer eadem

Locus.

TEUCRIVM Primum, Matthioli.



atate Teucrion, quam quidam hemionitin vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore. Nunquàm floret: neq; semen gignit. Medetur lienibus, constatq; sic inuentam. Quum extra super eam projecta essent, adhæsisse lienì, eumque exinanisse: ob id à quibusdam Asplenon vocatur. Narrant siue, qui radicem eius edunt, sine splene inueniri. Et mox addit. Quidam ramis hyssopi (Chamædryos Diosco.) turculosam, folio fabæ (Ciceris Diosco.) eodem nomine appellant, & colligi florentem adhuc iubent, adeò florere non dubitant, maximeq; ex Ciliciis, & Pisidiæ montibus laudant (iuxta Gentiadem & Cissadè. Diosc.) In quibus Plinius Hemionitin Dioscoridis priore loco Teucrij nomine describit: & mox Teucrii verum. Viridis cum posca, inquit Dioscorides, aut arida feruefacta pota, vim habet lienè potenter absumendi. Splenicis cum ficibus

Lib. 25. c. 5.

Vires &


Temper.

Lib. 3. c. 9.



ficubus & aceto illinitur : item serpenſium morſibus cum aceto ſolo ſine ficubus.  
 Lib. 26. c. 8. Eadē ſerē Plinius tradit, his verbis. Lienī medetur Teucra, præcipuē pota arida, &  
 decocta, quātum manus capit, in aceti heminis tribus ad heminam. Illinitur eadem  
 Lib. 8. ſim. cum aceto, aut ſi tolerari non poſſit, ex ficu vel aqua. Teucrium, inquit Galenus, in-

TEVCRIVM Alterum,  
*Matthioli.*



TEVCRIVM Baticum,  
*Clusij.*



cidendi & tenuium partium facultatis eſt, quare lienes ſanat. Ponátque ipſum quiſ-  
 piam in tertio exſiccantium, ſecundo verò excaſſacientium ordine. Aliud Teucriū  
 Cluſius pinxit, quod Baticum nominat. Interdū ad hominis altitudinem aſſurgit  
 inquit, interdū humilius eſt, vñico ſtolone, minimi digiti craſſitie, cortice candi-  
 cante obducto, in ramos non admodū frequentes diuiſo, ordine quodam ita di-  
 geſtos, vt bini perpetuò ſint inter ſeſe oppoſiti, incani : folia vulgaris Teucrij ſerē,  
 maiora, per ambitum non nihil ſinuoſa ( quod pictor malè expreſſit ) prona parte  
 omninò incana, ſupina verò ex atro virentia, guſtu perquā amaro : flos candidus,  
 labris infernè prominētibus, nulla galea ſuperiùs imminente, aliquot oblongis ſta-  
 minibus ſeu villis ex medio flore exilientibus. Perpetuò viret. Montibus Calpe vi-  
 cinis, & Baticę maritimis, in ſepibus, & inter frutices alios ſe inueniſſe ait Cluſius :  
 tum etiam Gadibus ea parte, qua nunc inſula continenti eſt coniuncta ponte ad-  
 mirabili. Floret Februario.

EVFRASIA,

CAP. XLIII.

Nomina



VM Eufraſiæ nomen Græcam teſtetur originem, videtur ſanè à bu-  
 gloſſo veterum deſumptum eſſe. Vt enim id in vinum deiectum, vt  
 loquitur Plinius, animi augeſt voluptates, vnde *εὐφροσύνη*, ita etiam il-  
 la quia oculos iuuat & delectat, *εὐφροσύνη* appellata eſſe videtur, quam  
 vocem imperiti linguæ Græcæ deprauantes, in Eufraſiam verterunt, eamq; ſic cor-  
 ruptam Officinæ, vt in plurimis aliis, retinuerunt. Etſi autem Græco & eleganti  
 nomine donata ſit hæc herbulā, nihil tamen de ea, quod ſciam, apud veteres Græ-  
 cos &



EVFRASIA, *Matth.*



EVFRASIA *Secunda*,  
*Dodonai & Lobelij.*



cos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum, Plinium, adde etiam recentiores Aëtium, Paulum, & Aëtuarium scriptum reperitur: sed à ducentis tantum vel paulò plus annis posteritati Eufrasia nomine innotuit, ad oculorum caligines, & morbos pituitosos peruagata commendationis. Vnde Germanis *Angentrost*, id est, oculorum solatium, dicta fuit: nonnullis hac quoque ratione motis, Ophthalmica, id est, ocularia. Galli, *Eufrase* vocant, Itali *Eufrasia*. Est igitur Eufrasia herba parua, palmi vnus altitudine, cauliculis purpureis, furculosa, foliis multis, exiguis, crispatis, per ambitum serratis, flosculis exiguis, candidis, intus purpureo & luteo colore maculatis: radice parua, tenui, fibrata. Apricis collibus & pratis strigosis potissimum gaudet. Iulio & Augusto mensibus floret, tunc colligenda & siccanda. Sapor amaricans calidam & siccam esse perspicue docet. Vtuntur ea tam recente quam exsiccata aduersus omnia mala quæ oculorum claritati officiant. Quare trita & oculis imposita, aut succus eius cum vino instillatus caligines delet, & visus acie restituit. Idem præstat eius exsiccata farina, si tribus eius partibus cum vna parte macis commixtis, quotidie manè cochlearis mensura sumatur perse, aut cum saccharo, aut cum vino. Nec solum oculorum aciem, sed etiam memoriâ mirifice roborat, amissamque reparat. Arnaldus vinum Eufrasiatum valde commendat, his verbis. Eufrasie vinum fit ad oculos, ponendo herbam in musto, donec fiat vinum. Cuius vsu oculi senum reiuuenescunt. Aufert hoc impedimenta eorum, & defectum visus in quocunque cuiusvis ætatis homine, præsertim vbi pinguedo & pituita redundant. Est & qui permanet nihil videns per longum tempus, & infra annum eius vsu restitutus est ad visum. Ipsa enim herba calida est & sicca, & habet hoc à proprietate, quod quando pulvis eius comeditur cum ouorum vitellis, idem mirifice præstat, vel quando pulvis idem recipitur cum vino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in seipsis, & qui non poterant legere sine oculariis, & legerunt postmodum absque ipsis etiam literam subtiliorem. Et vsus vini Eufrasiatum non habet par in proficiendo visui. Si autem vinum esset nimis forte, temperetur cum aqua fœniculi, & si opus est addatur saccharum necessarium. Hæc Arnaldus. Cui non omnino assentitur Pena, nec ei vino prorsus fidendum suadet, ut cuius potu tantum trimestri in Heluetia vsu socium & sodalem suum asserat penè ambobus orbatum oculis, & fluxionibus modo non oppressum: cum duntaxat antea leui cathaphora, & lacrymationibus

*Forma.*

*Locus.*

*Temper.*

*& Vires.*

*In lib. de Vinis.*

*In Aduers.*



culis laboraret. Quare puluere aut decocto citra vinum tutius vtendum. Alia est planta quam nonnulli Euphragiam vocant, minimè tamen Euphragia vera existimanda, pedalis & altior, cauliculis rotundis, furculosis, in quibus folia parua, angusta, longiuscula, sæpius deorsum vergentia: flores rubentes: radicem exigua superiori similem. Hac verè Euphragiæ vice minimè vtendum. Descripsit Dodo. pinxit Lobellius, qui Cratægonum secundum quorundam vocat.

## SINAPI ALBUM, CAP. XLIIII.

Locus.  
Forma.



Nomina

Cap. 249.  
hist.

Lib. 3. c. 20.

Lib. 1. c. 156.

Forma.



PTARMICA, Fuchsi.

**I**N ASPERIS & saxosis hoc sinapi adolescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbè sparsis, multis, infectis cichorij modo, adulto caule pereuntibus, & exarcescentibus, in caule numerosis, laevibus, crassis & carnosis, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnumquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diffusos, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, minuto semine gravida, acris & feruidi gustas, eleganti specie silicarum tanquam vallo quodam circa caulem & furculos erectarum. Floret Maio mensè. Quidā thlaspeos alij Drabæ genus esse volunt.

## PTARMICA, CAP. XLV.

**E**T si multis plâis olfactu sternutamentum cientibus ptarmices, id est, sternutatoria siue sternutamentaria nomen competere possit, tamè quæ hîc primo loco depicta cernitur, Fuchsi & multorum herbariorum sententia id nomen adepta est, quod acris suo odore nares feriens sternutamenta irriter. Pyrethrum silvestre à Dodonæo appellata ab acris & feruida facultate, diuq; linguam vellicante Pyrethri modo, quamquam moderatius, à Germanis *Vuilderbertram* vocata. Alij ptarmicas alias proponunt. Sed ptarmica descriptionem audiamus ex Dioscoride. Ptarmica, inquit, frutex est parvis ramulis parvis (vetus codex habet non μικρούς, id est, paruos: sed λεπτοὺς, id est, tenues) multis, rotundis, abrotono similibus, circa quos folia multa, oblonga, oleæ similia, in summo veluti chamameli capitulum, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, vnde & nomen inuenit. Quæ delineatio plantæ cuius pictura hîc datur, aptè quadrat: nam surculis fruticat exiguis, multis, rotundis, abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui foliis frequentibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, vtriusque leuiter serratis ambiuntur flore in cacumine Anthemidis propè ad umbellæ modum qui



dum, qui acri suo odore nares feriens sternutamenta elicit. Inuenitur sæpiùs in al-  
 tis montibus, & saxosis locis sæpè & in pratis. Floret æstate, radix extremo effodi-  
 tur autumno. Eadem planè est quam Matthiolus Parmicæ nomine depinxit, & in  
 Bohemiæ hortis passim feri scripsit, è montibus, in quibus nascitur, illuc transla-  
 tam: eadem enim eius delineatio ab eo ponitur, quæ modò à nobis exposita est,  
 iidem natales. Hanc quòd acri sit sapore, quidam Pyrethrum vocant, quos secutus  
 Dodonæus, Pyrethri siluestris nomine pinxit & descripsit. Eadem etiam videtur,  
 quæ pro menthæ Sarracenicæ specie, ex Myconi sententia, à nobis in Horto inter  
 menthæ genera explicata est. Plantam aliam Parmicam Matthiolus appellare vo-  
 luit, quæ caules tenues habet, folia oleæ, flores umbellatos in cacumine, & capitula  
 quæ naribus immissa sternutamenta cient. Verùm Dioscoridis Parmicam esse ne-

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 20.

PTARMICA Altera,  
Matthioli.

PTARMICA Montana,  
Dalechampi.



gat. Parmicā montanam herbarij vocant aliud plāta genus in altissimis & asper-  
 rimis Allobrogum montibus, sed tamē herbis profrutens, radice nigra, in multos  
 furculos fissā, longa, valde fibrata, odorata, gustu principio amara, deinde acri, cauli-  
 bus multis fruticatis, teretibus, lignosis, abrotano similibus, cubitalibus: foliis in cau-  
 libus, oblongis, oleæ similibus, propè radicē latioribus, plantaginis ferè specie, humi-  
 stratis, capitulis in summo cauliū vertice chamemelo similib⁹, odorē validū & acré  
 spirantibus, qui sternutamenta excitat, flore in ambitu luteo. Parmices folia, inquit  
 Dioscorides, cum floribus illita, sugillata possunt tollere. Flores sternutamēta effi-  
 cacissimè mouent. Galenus verò, Parmices flores, inquit, ciēdæ sternutationis vim  
 obtinent vnde ei herbæ nomen. Totus autem frutex si contundatur viridis, sugil-  
 lata, & reliquas ecchymoses digerit. Est enim temperies eius calida & sicca, viridis  
 etiamnum ordine secundo, siccata tertio. Montanæ Parmices radicem muliercu-  
 læ Alpinae ad vteri suffocationes, mensium suppressiones, virginum pallores, ma-  
 ciem & cachexiam summopere commendant.

Lib. 2. c. 176

Vires.

Lib. 8. sim.





## PYRETHRVM FLORE ANTHEMIDIS, CAP. XLVI.

Nomina


Lib. 3. c. 71.



Vic plantæ Germanicè *Bertram*, Gallicè *Pirethre*, aut *Pied d'alexandre* dicta, ob radicis eius feruorem igneum pyrethri nomē dederunt Officina, suffragante etiam Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Pyrethrum folia caulemque emitit vt daucum siluestre, & fœniculum,

PYRETRVM *Alterum, Matt.*PYRETRVM, *Gesneri.*

umbellamque anethi, circinata rotunditatis, radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. A qua descriptione solis floribus distat hæc planta, quos non in umbellis Anethi circinatis, sed in medio luteos, foliolis candidis circundatos, planè chamæmeli, aut bellidis, magnitudine buphthalmi: cauliculos multos, sesquipalmum altos, crassiusculos, foliis multum incis, fœniculi vel anthemidis, stipatos, crassioribus, longioribus: radicē lōgam, rectam, digiti crassitudine, linguam vrentem. Est enim calida siccaque ad tertium vsque ordinem. Quare eadem præstat quæ Pyrethro Dioscorides & Galenus tribuunt, imò maiore efficacia quam nonnullæ aliæ, quibus Pyrethri nomen dederunt quidam herbarij. Huius igitur radix cum melle sumpta, aduersus epilepsiam, apoplexiam, omnes inueteratos & frigidos cerebri morbos valet. Communsa pituitæ copiam ex cerebro elicit, unde Saliuaris à Latinis dicta. Dentium immanes cruciatus sedat, si acetococta colluatur. Oleum ex recenti radice eductum mirificū est.

PYRETRVM *Verum Matth.*

Plantam



Plantam aliam hîc appictam Pyrethri veri nomine ad Dalechampium ex horto suo misit Conradus Gesnerus vir doctissimus & cãdidissimus. Radice nititur longa, simplici, modicè fibrata, pallente, digiti crassitudine, feruidi & vrentis gustus: folia anetho similia prodeunt, caulis fœniculaceus, flos in umbella circinata rotunditatis, vt omninò in nostris Dioscoridis exemplaribus legendum sit, σκιάδιον τροχόειδές, non τριχόειδές, id est, capillacea umbella. Quare nullam prorsus notam desse ad veram Pyrethri delineationem putabat ille. Marthiolus verò, Guilandinus & alij, plantam hîc expressam Pyrethri veri nomine donarunt, cui radices sunt & folia cotulae fœtidæ, umbellæ ab vno quasi centro multis petiolis innixæ, pectinis veneris ritu, aut Anethi, candidi flosculi, feruido & amaricante gustu. Non tam efficaces vires habet quàm Pyrethrum Officinarum.

FLAMMVLA, CAP. XLVII.

**A** HERBARIIS dicta est flammula, quòd non secus ac flamma cuti appressa vesicas, crustas, vlceraq; inurat. Huius species duas assignant Herbarij. Prior adminiculis eget quibus fulciatur: altera recta assurgit sine adminiculis. Illa sårmentosos emittit cauliculos, lentos & valde obsequiosos, cortice virente vestitos, folia minora quàm Vitalba incondita, ex vno pediculo còplura, qui capreoli vice vicinis sese alligat. Flores candidi sunt: semina, Nomina

FLAMMVLA, Dodonæi.

FLAMMVLA, Matth.



exigua, cohærentia, canescètibz quoq; plumis, sed minoribus & breuioribus exornata: pro radicibus multæ sunt & tenues fibræ. Hanc vulgi Flåmulam, Lobellius & Pena Clematidem alterã vrentem appellant. Nullam esse scribit Pena, quæ tam benè quadret facie & viribus Clematidi alteri Diosco. acri & exulcerati. Cuti enim affricta non secus ac Flamma vrit. Quin tantæ tenuitatis est eius feruor, vt dum digitis fricantur folia, spiritum vrètem eminùs præsertim in nares iaculetur, cerebrumq; & sensus repente magnoperè percellat: quia feruor ille non in centro intimisque Vires.



terreis partibus, sed in leuioribus extimis residet. Quare succus & stillatitius liquor primum quasi è vino Flāmeus est. In Narbonēsi & Gallica Prouincia sponte in pratis maritimis humi sparsa, tenera & humilis visitur, nisi fruticibus & sepibus innitatur, & aliis pedamentis si quæ nacta sit. In frigidioribus regionibus hortenſis est.


**Forma.** Flammula altera foliis est amplioribus maioribusque, vitalbæ similioribus, quam & candidissimis flosculis, & semine plumaceam cristam gerente, in fastigio cauliculorum eminentibus refert. Cauliculi cubito altiores, sine adminiculis stant, sursumque eriguntur. Vere noua promit folia & cauliculos, æstate flores. Scribit Matthiolus, Flammulæ stillaticiam aquam in morbis frigidissimis efficacissimam esse, Sunt, inquit, qui Flammulam quartanariis edendam præbeant, magno, vt ferunt, commodo. Alij eius oleum commendant ischiadicis, articularum, iliumque doloribus, vrinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autē præparant hoc modo. Flāmulæ folia tenuissimè concisa, in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, tum per æstatem inſolant obturato vase. Datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. De Flammula aquatica, lib. de palustribus, diximus.

## PSYLLIVM,

## CAP. XLVIII.

**Nomina**

RACCE Ψύλλιον, Latine Pulicaris herba dicitur. Nomen græcum in Officinis seruatum, Arabicè *Bazara Chatona*, seu *Bezercothume*, Italicè *Psillio*, Germanicè *Psillenkraut*, Gallicè *L'herbe aux puces*, Hispanicè *Zargatona*. Tam græcam quam Latinam appellationem à pulice, cuius effigiem semen eius refert, sortita est herba, vel, vt nonnullis videtur, quia si viridis in domum inferatur, generari in ea pulices prohibeat. Duo Psyllij genera exhibuit Matthiolus. Vnum vulgare & communis vtus, alterum sarmentosius prolixiusque, fortè Plinianum. Psylliū, auctore Dioscoride, folia coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantales. Tota herba ad sæni graminisve formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut ternà in summo, contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durumque. In aruis & incultis nascitur. Plinius, Psyllium, inquit, alij cynoides, alij crystallion, alij sicelion, alij cynomyian appellant, radice tenui, superuacua, sarmentosum, fabæ granis in cacuminibus, foliis canino capiti (cynopi herbe) non dissimilibus, semine autem pulicis, vnde ei nomen: hoc in baccis. Ipsa herba in vineis inuenitur. Quæ omnia vnà cum nomenclatura vtrique generi aptè conueniunt. Prius enim folia fert incana, hirsuta, longa, angusta, scopariæ vel coronopi æmula, nō tamen corniculata: ramulos rotundos, teneros, crebros in cacuminibus gerentes globulos, compactos, rotundos, oblongos, squamosos, florem ex viridi albicantem: semen nigrum, nitidum, pulicis effigie, colore, & magnitudine: radix est dodrantalis, subalbicans, multis stipata fibris. Alterum multò sarmentosius est, & copiosioribus refertum foliis, longioribus, angustioribus, densioribus, similiter hirsutis & incanis, atque inter sese implicatis capitula huic sunt alteri similia,

**In cap. 63. lib. 4.****Genera**  
**Lib. 4. c. 65.****Forma.**PSYLLIVM, *Math.***Locus.****Lib. 25. c. 11.**





similia, sed paulò minora, & numerosiora, in quibus semen alteri simile: radicem habet multifidam, & numerosis scatentem fibris. Nascitur in campestribus, sed in maritimis frequentius. Flores tota fere æstate ex capitulis eius spicatis erumpentes dependent, canino capiti haud dissimiles. Semen verò Autumno profert. Vires nunc accuratius expendæ. Vis Psyllio refrigeratoria, inquit Dioscorides, cum rosaceo, aceto, aut aqua illitum, articulorum doloribus, parotidibus, tuberculis, œdematis, luxatis, capitibusque doloribus prodest. Enterocelas paerorum & umbilicos procidentes cum aceto illitum sanat. Oportet autem acetabuli mensuratum in aqua heminis duabus madere, & ubi aqua concreuerit, illinere: egregie siquidem refrigerat, & deiectum in feruentem aquam, calorem eius reprimat. Prodest erysipelatis. Aiunt si viridis domum importetur, prohibere ne pulices in ea generentur. Tusa cum adipe, sordida & maligna ulcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas & vermiculosas conducit.

Locus.  
 Tempus.

Vires &  
 Temper.  
 Li. 4. ca. 65.

Plinius, Vis ei, inquit, ad refrigerandum & discutiendum ingens: semen in usu. Fronti imponitur in dolore, & temporibus ex aceto, aut rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura sextario aquæ: densat ac contrahit: tunc terere & crassitudinem illinere oportet cuiuscumque dolori & collectioni, inflammationique. In quibus Plinij verbis id primum obseruandum quod Psyllio vim discutiendi inesse scribit, quæ cum percalida fiat, videtur ἀπορροή, id est, vim repellendi, quæ per frigida fit, vim discutiendi conuertisse, quæ est διαρροή. Deinde vulgata lectio: ad cætera illinitur acetabuli mensura, &c. nullam sententiam exhibet: quare eam sic restituit Cornarius ex Dioscoride. Ad cætera illinitur. Acetabuli mensura in sextario aquæ densat se ac contrahit: tunc terere, &c. Est enim hic fere modus, quo etiam vtuntur Officina ad extrahendam muccaginem seminis Psyllij & fenigraci. Legunt alij, & fortassis rectius, Ad cætera cum illinitur, acetabuli mensura sextario aquæ maceratum densatur, ac contrahitur. Tunc terere, &c. Et alibi Plinius, Tenefmo in aqua cum radicibus decoctum medetur. Omnibus articulorum morbis salutare est huius semen madefactum in aqua, admistis in heminam feminis, duobus resinæ colophonix cochlearibus, thuris vno. Galenus Psyllij qualitates ita definit, Psyllium semen habet admodum vtile, ex secundo refrigerantium ordine, in desiccando verò & humectando medium quodammodo, & symmetrum. Quod Mesues de medulla, seu substantia interiore, calida, sicca ordine quarto, acri admodum scribit, commentitium esse arbitrantur viri docti. Quod verò aqua frigida maceratum, & agitarum, esse cholagogum, ac ob id febribus biliosis conuenire & inflammationibus thoracis, thoracem quoque lenire, & sitim extinguere ait, id mucoso admodum & refrigeranti lubricantique semini attribuunt.

Lib. 25. c. 11.

Embl. 60.  
 lib. 4.

Li. 26. c. 10.

Li. 8. simpl.



Cap. 9. li. 4.  
Nomina  
Lib. 4. ca. 9.  
Forma.



REDIDIT Matthiolus plantam hîc pictam σύμφυτον πέτρων esse Dioscoridis, Latinis similiter Symphytum petræum, quod nascatur in petris, vocatur & Alum. Ramulos habet, inquit Dioscor. origano similes, tenues, capitula velut thymum (sic enim quædam exemplaria habent, κλώνια δὲ ἔχει ὁμοίαι δελγάνω, λεπία, κεφάλια δὲ ὡς θυμύς, alia κλώνια δὲ ἔχει δελγάνω ἑμπερή, λεπία φύλλα, κεφαλὴν δὲ ὡς θυμύς. Id est, ramulos habet origano similes, folia tenuia, caput thymi: quam lectionem secutus est Plinius. Alij priorem secuti λεπία κεφάλια coniungunt, nulla foliorum facta mentione:) totum lignosum est & odoratum, gustu dulce, saluam ciens: radicem habet longam, subpurpuream, digiti crassitudine. Plinius, Alum, inquit, nos vocamus, Græci Symphytum petræum, simile cunilæ bubulæ, foliis paruis, ramis tribus aut quatuor à radice, cacuminibus thymi, furculosum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens, radice longa, tutila.

Lib. 27. c. 6.

SYMPHYTVM Petræum,  
Matthioli.




SYMPHYTVM Petræum,  
Lobellj.



Nascitur in petris, ideo petræum cognominatum. Huic descriptioni plantam appictam nullis prorsus deficientibus notis conuenire Matthiolus ait, quas nec declarat, nec vires, nec aliud quippiam præter natales, & eius pulchritudinem, quæ præsertim cum florēt, maxima cum voluptate ad se contemplandam viatorum oculos allicit. At Pena qui eam vidit in Pœninis alpihus, hodie diui Bernardi, scribit esse floribus purpureis, confertis, speciosis, ericæ maioris spicatis: foliis pusillis chamæpityos, breuioribus, aliquantum hirsutis pilosellæ modo, in furculis pedalibus, lignosis, sed inodoram, radice lignea, non purpurea: dulcem non esse gustum plantæ, nec saluam elicere, quæ à Symphyto petræo Dioscoridis multum absunt. Quare alij aliud, atque aliud Symphytum petræum exhibuerunt, ob vim In Aduers. glutinandi & coniungendi potius quam ob figuram & similitudinem. Pena tradit Prunellam



**CHAMAEMYRSINE**  
*Quorundam, Dalechampij.*



Prunellâ, de qua in libro de iis quæ in vmbrosis  
proueniūt diximus, vulgò à Monspeliensibus Cap. 46.  
Symphytū petræū vocari. Aliud est Lob. Sym-  
phytum petræū, Veronica recta Herbariorū.  
Folia Teucris similia profert, aut Lyfimachia  
cærulea, cui congener etiâ cū folio, tum flore.


**CHAMAEMYRSINE** *Quorundam,*  
**CAP. L.**

**A**LI Chamæmyrsinen, alij Ocimū  
montanum plantam hanc à folio-  
rum similitudine vocant, quæ in  
altissimorum montium superciliis  
crescit, radice exigua, candida, inutili: ramulis  
multis, in orbem humi sparsis, dodrantalibus,  
rotundis, foliosis: folio myrti, sed minùs acumi-  
nato: vel, vt alij volunt, ocimi, pa. uo: flore in-  
aquali serie per summos caules exoriente, co-  
piofo, purpureo, sex foliolis cōstare, nitidissimi  
venustissimiq; coloris: semine in loculis minutu  
lo. Pulcherrima hæc plāta floris sui purpura sic  
viatorū oculos recreat, vt ad colligendū inuitet.

**TORMENTILLA CANDIDA,** **CAP. LI.**

**A**NC plantam Tormentillam candidam herbarij vocant, ob radicem Nomen.  
Tormentillæ æmulam, & ob foliorū in aduersa parte candorē. Ad Penta-  
phylli genera pertinere verisimile est, vt ex eius descriptione perspicuum

**TORMENTILLA**  
*Candida, Dalechampij.*



fiet. In gelidissimorū & altissimorum montiū  
pratis herbidiq; locis prouenit, radicibus mul-  
tis, nodosis, implicatis, è rufo nigrescentibus,  
fibrosis, multas alas huc illuc sparsas ad nouā  
caulium & foliorum procreationem ex sese  
gignentibus: foliis loti pratensis, minimè disse-  
ctis, interdum quinis, interdum septenis, inter-  
dum nouenis, tenui longoque pediculo ap-  
pensis, supina parte virentibus, prona cādidis,  
albæ populi modo: iunceis cauliculis, flore  
herbaceo, copioso, muscarij ritu congesto, qua-  
le visitur in pede leonis, siue Alchimilla, siue  
stellaria vulgò dicta: semine minuto ex luteo  
viridi, siliquis aut vaginis exiguis incluso. Ad  
sanguinis eruptiones vndecumq; profluat, hu-  
ius radicem tritam & potam multum laudant  
Alpini, narrāntque eam, si quis vel collo-  
tantum gesserit, sanguinem è naribus pro-  
fluentem cohibere. Eadem siccata & in fa-  
rinam tusa, iusculisq; inspersa dysenteria  
medetur. Locus.



Nomina



ΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ Græcis, Lithospermum Latinis, Officinis & medicis hodie omnibus Milium Solis, Arabibus Kulb, Cult, Colt, siue Calab, Italis Lithospermo, Germanis Meerhirsz, & Steinsomen, Gallis Gremil, & l'herbe aux perles. Nomen à lapidea seminis duritia accepit.

LITHOSPERMVM

Maius, Matth.

Genera.

Li.2.ca.90.

Li.3.ca.141.

Forma.




LITHOSPERMVM

Minus, Matth.

Locus.

Li.27.ca.11.




Ca.147.li.3.

Neque enim Lithospermum aliud sonat Græcis quàm Lapideum semen. Quum itaque semina tanquam calculos ferat, duritia lapidea, cādore & rotunditate margaritarum, cōmodissima voce Lithospermum dictum est, & Gallis l'herbe aux perles, recentioribus verò non Milium solis, quòd semen id candore & lucis splendore fulgeat nominandum fuit, sed Miliū Soler, auctore Serapione, quod auctoritate *Aben Iuliel*, nascatur in mōtibus Soler. Dioscorides & Plinius vnus duntaxat Lithospermi meminerunt, recentiores duo assignarunt genera, maius & minus. Alij alia addiderunt. Dodonæus tradit Lithospermum aliud esse horrense, aliud agreste. Hortense aliud maius, aliud minus. Lithospermū, auctore Dioscoride, folia habet oleæ similia, longiora tamen, latiora ac molliora: quæ in ima parte sunt, humi iacent: ramulos rectos, tēnes, crassitudine iunci acuti solidos, lignofos, in quorum cacuminibus bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent, foliis longis, inter quæ paruum semen, rotundum, &c. (Sic Ruellius ex vulgari codice, cū in antiquo legatur, *ἐχὼ φύλλα μικρά, παρ' οἷς σπέρμα λιθώδες, τροχύλον, λεπτόν, ὁρόβου μικρῶ ἴσον*. Id est, folia habentes parua, inter quæ semen lapideum, rotundū, tenue, orobos; exiguo æquale.) Nascitur in asperis & sublimibus locis. Plinius idem graphicè depinxit his verbis. Inter omnes herbas Lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui *Ægonychon* vocāt, alij *Diospyron*, alij *Heraclēā*. Herba quincuncialis ferè, foliis duplò maioribus quàm rutæ, ramulis furculosis, crassitudine iunci: gerit iuxta folia singulas veluti barbular, & earum in cacuminibus lapillos cādore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia verò lapidea Ipsi qua pediculis adhærent, cauernulas habent, & intus semen. Nascitur in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquā inter herbas maiore quidem miraculo aspexi. Tantus est decor velut aurificum arte, alternis inter folia candidantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Iacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vullam non hærentem vidi. *Matthiolus legitimum Dioscoridis*  
Lithosper



Lithospermum id esse putat quod maius est hic pictum, Fuchsumq; reprehendit quod pro vero Lithospermo, illud quod Officina Lithospermum minus vocant, depinxit. Dodonæus Lithospermū maius depinxit cauliculis, longis, gracilibus, hirsutis, magna ex parte humi instratis, quos longiuscula cingunt folia, nigricantia, Lib. 2. c. 90.

**LITHOSPERMUM**  
*Maius, Dodon.*



hirsuta, inter quæ & cauliculos caliculi sunt hirsuti, primum ferentes florem caruleum, deinde semen rotundum, durum, lapideum, maiusculū. Lithospermū verò minus cauliculis rectis, rotundis, lignosis, furculosis, foliis longis, angustis, acuminatis, nigricantibus, minoribus quam Lithospermi superioris. Inter quæ & cauliculos flosculi oriuntur candidi, tandē semen producēs aspectu pulchrū, rotundū, candidū, durū, lapideū, vnioni simile, minus supradictō. Maximus huius ubiq; in Officinis vñs, maioris rarior, quia minū frequens, minorq; suppetit copia, nec perinde seminis est ferax: verū calculo exterendo, lorioq; mouēdo efficacius multō. Floret Iunio & Iulio mēsis, eoque tēpore semē etiam profert. Id semen cuius maximus vñs est calidū siccūq; esse ex eius facultatibus coniicitur. Omnia etenim vrinam cientia, Galeno teste, calida & sicca sunt. Vim habet semen, inquit Dioscorides, atterēdi calculos, & ducendi vrinā, si cum vino albo bibatur. Plinius, his lapillis, inquit, drachmæ pondere potis in vino albo, calculos frangi pelliq; cōstat, & stranguriā discuti.

*Temper.*

*Li. 5. simpl. Li. 3. ca. 141.*


*Vires.*

*Li. 27. ca. 11.*

**LITHOSPERMUM Fuch.**  
*Minus Dodon.*



**LITHOSPERMUM**  
*Nigrum, Dalech.*




Matthioli



In cap. 147.  
lib. 3.

Matthioli tradit dari vtriusque semen potandum vtiliter diebus multis sesquidrachmæ pondere, addita aspleni semidrachma, & succini scrupulis duobus ex succo plantaginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhœam. Item dari magno sanè auxilio minoris Lithospermi feminis drachmas duas ex lacte muliebri potandas, fœminis ægrè parturientibus. Quidam herbarij Lithospermum nigrum vocant plantam hic appositam, quæ radices habet breues ac inutiles, caules bicubitales, nodosos, teretes, furculosos, aridos: folia rubiæ, tactu aspera: semen rotundum, nigrum, oleosum & pingue, quod in areis cum tritico simul exeritur, simulq; molitur, & estur nulla capitis offensa. Hoc alij Myagrum Dioscoridis, alij Melampyrum Theophrasti esse autumant. Est præterea aliud Lithospermi genus, quod arundinaceum vocant. Id Monspelij in hortis provenit ad nihil aliud vtile, quàm quod ex eius lapidosi seminibus coloris varietate formosis, neuntur mulieribus corollæ ad numerandas preces, quibusdam & monilia. Incolæ vocant lacrymas, herbariorum vulgus Lacrymam Iob: quòd rotunditate & nitido splendentēque lacuore ex oculis manantes lacrymas vtrumque imitentur. Gaudet hæc planta solo

*LITHOSPERMVM**Arundinaceum, Dalech.**LITHOSPERMVM**Anchusæ facie, Lobelij.**Forma.*

madido & irrigari solito. Quamobrè ad puteos in hortis effossos feritur, vt aquam situlis dum hauriunt, effusam, vel dum olera lauant, radicibus excipiat. Assurgit ad sesquicubiti proceritatem, radice milio simili, foliis arundinaceis, latis, nervosis, tactu rigidis, ad singulos caulium articulos exeuntibus, vt tenuia stamina fructui præfixa, fructumque ipsum inuolucris vice protegant. Quod dictu audirūque mirum est, & huic plantæ ferè proprium, ante floris exortū fructus formatur & grandescit, absolutusque florem quasi intra se delitescens & occultum summo vertice promit, candicantem, spicatum congestum. Fructus color per initia herbaceus: cum maturuit, è cinereo purpurascens, iucunda quadam & oculis grata varietate, figura non omnino globosus, sed infernè latiusculus, supernè tantillum cōpressus & fastigiatus, filicis dūritia, & lineis quasi virgatus. Semen intus milio Indico simile,



simile, rufum, gustu cæreale, non iniucundo, tunicis multis albis obuolutū, ex quo verisimile est & farinā & panē confici posse, non aliter quā ex milio & panico Indicis. Raræ huius plantæ nullus in medicina traditur vsus ab herbariis. Quidam esse putant Coicem Theophrasti, Arundinis foliis insignem, memoratum cap. 16. lib. 1. Histor. Item aliud Lobellius Lithospermum habet Anchusæ facie, in decliuis faxosis vallis Ostensis Pedemontium nascens, fruticosus pedalibus ramulis hirtis: foliis Lithospermi & floribus Anchusæ aut Echij aut Buglosi facie, purpurescentibus, radice lignosa.

CHAMÆPEUCE PLINII, CAP. LIII.

**C**AMPHORATA minor hæc planta vulgò ab herbariis nominatur, quæ Chamæpeuce Plinij à quibusdam esse creditur. In squallidis & arenosis locis gignitur, radice subnigra, longa, crassa, furculosa: ramis multis, humi circa radicem iacentibus: foliis numerosissimis per cauliculos ex interuallis confertim prodeuntibus, larici similibus, nullo flore, nullo fructu. Chamæpeuce, inquit Plinius, laricis foliis similis lumborum & spinæ doloribus propria est. Chamæpeuce frutex est plurimis à terra assurgens virgis in summitate rubente lanugine obsitis, folia habet sexquiuunciali longitudine, angusta, gracilia, retroflexis vtrimque laterum extremitatibus & à tergo modicè

Nomina. *ab alme*  
Locus. *campore*  
Forma.

CHAMÆPEUCE Plinij,  
Camphorata minor, Dalech.



CHAMÆPEUCE,  
Cordi.



hirsuta, flaua hyeme virentia: flores veris exitu in summis virgis producit paruos, candidos & foliaceos, corymborum modo coaceruatos, his singuli succedunt parui, aridiq; fructus hordeo minores, in quibus tantillum clauditur semen, radicibus nititur longis, obliquis & fibratis, foris in flauo rubentibus: odorem folia, flores, & fructus grauissimum habent: saporem verò acrem & vehemēter tenuem. Nascitur macris, putridis, vliginosiq; locis sub Tedis arboribus. Dioscorides verò flores rosæ ei tribuit, quod fortè perperam legitur. Plinius florum non meminit.

HHh



**T**HORTENSIBVS plantis acri facultate præditis aliquot genera Thlaspeos adiunximus: quædam alia à recentioribus obseruata hoc commodiore loco exponemus. Primum, id genus quod à Dalechampsio obseruatum est propè Arcem pini in Sequanis, haud procul à Lugduno Salinario. In aridis nascitur, radice parua, breui, candida, superuacua, in exiles fibras diuisa: foliis octo, nouem, decem paruis, ocimo ferè similibus, nonnihil lacinia-  
tis, humi iacentibus, exorientem caulem ambientibus, qui rotundus est, ima parte ruber, supernè viridis, dimidium pedem altus, sæpius vnicus & singularis, nonnunquam in ramulos brachiatus, foliis tribus vel quatuor ex interuallis perfoliata modo cum singulis vestientibus, non binis simul, vt in aliis multis plantis, eo spatio quod inter caulem & folia est, tanquam ex ala prodeuntibus aliis foliolis & flosculis: floribus violæ minutis, albis, quos capillacei pediculi sustinent: semine in vasculis bifidis, cordis figura, extrosum velut in umbonem prominentibus, introrsum velut in alueolum cauatis, numerofo, lato, velut compresso, acri: foliorum & caulis sapore fatuo principio, mox subamaro, tandem fauces vrent: quare eadem ei vis, quæ & cæteribus Thlaspeos generibus. Huius pictura desideratur. Alterum eiusdem Thlaspi montanum candidum, ad vicum quem incolæ vocant D. Guilielmum deserti, haud procul ab Agnania cœnobio gignitur, in præruptissimo saxo, ramosa furculosaq; planta, radicibus multis, huc illud disperfis, caule procerò, in multos ramos diuiso, cortice scabro, è fusco nigrescente: foliis densis, leucoio similibus, sed brevioribus, candicantibus, gustu acris: flore in summis ramis copioso, pusillo, candido: semine minutulo in latis vasculis Thlaspeos vulgaris modo, acrimonia sua linguam pungente. Tertium Dalechampsij Thlaspi montanum minimum in umbrosis montium recessibus gignitur, radice quatuor digitos longa,

THLASPI Montanum  
Candidum.



THLASPI Montanum,  
Minimum, Dalech.



tereti,



tereti, candida: ramulis permultis ferè humi iacentibus, quibusdam erectis, do-  
drantalibus, foliosis: folio minimo, oblongo, ordine disposito vt in Aphaca, gustu  
aeri: flore candido, minutulo, in caulicorum vertice copioso: semine perquam  
exiguo, in latis valculis, acris saporis. Dodonaus quatuor Thlaspeos genera po-  
suit. Primum quod à Lobellio quoque depi-  
ctum & à Pena descriptum est, foliis longiori-  
bus, angustis, mollioribus leuiter laciniatis,  
Drabæ, caule multis alis diuiso, gracilibus, len-  
tis, obsequiosis, flores Iunio ferentibus, pusillos:  
deinde foliacea inuolucra, multa, compressa,  
perfectè circinata, supernè fissa, quæ semen  
continent pusillum, rotundum, oblongum, ni-  
gricans, acre, gustu feruens, & quemdam allij,  
sinapi aut cepæ saporem exhibens. In maceriis  
vetustioribus, & aruis Galliæ, Germaniæ, An-  
gliæ frequens. Alterum id quod à Matthiolo  
primo loco positum est. Tertium cum Fuchsio  
minus & angustifoliū, Germanorū *Bysenkraut*.  
Foliis est & caulibus minoribus quàm Thlaspi  
primum, ramulis multis & gracilibus fruticat,  
in quibus flores, fructus, & semina sicut in pri-  
mo genere, sed omnia hæc minora habet.  
Quartum est Creticum umbellatum, Iberidis  
folio, pictum etiam à Lobellio, cuius folia ser-  
rata sunt, inquit Pena, vulgaris Iberidis, sed ma-  
iora: caulis cubitalis, multos ramulos fundens,  
in quorum extremo umbellæ & flores, sambuci

*THLASPI Angustifolium,*  
*Dodonæi & Fuchsij.*



*THLASPI Incanum Mechl-*  
*ienense, Lobellij.*




*THLASPI Fruticosum, foliis*  
*Leucoij marini minoris.*





palustris similes, ex candido purpurascens Iulio & Augusto, deinde semen in corniculis Thlaspeos minoris similibus, acre & gustu feruens. Dodonaus Drabam etiam esse censet, de qua in horto diximus. His addenda quædam alia à Lobellio expressa. Primum Thlaspi incanum Mechliniense, quod finitimo Mechliniæ ruri fructuat, oleæ foliis, multilq; summo diuisis, hirtis ramulis, pedem & sesquipedem longis. Flos albus, & in pericarpis quadamtenus rotundis, summum caulem ambientibus, semē exiguum, minus cæteris acre. Alterum eius Thlaspi fruticosum est, foliis Leucoij marini minoris. Virgæ numerosæ, sparsæ, crebris Leucoij minoribus foliis: flores candidi, copiosi, & semen compressum Thlaspi parui. Radix lignosa, fibrata, in Belgij hortis. Aliud fruticosum spinosum Narbonense, quod non nisi sterilibus cautibus rupibusve propè Nemausum & Monspelium fructuat, dodrantalibus ramulis, multis alis diuisis, nonnihil spinosis & sinuosis Poterij ritu: folia oleæ, pusilla, albida, flores candicant. Semen acre glumis includitur. Item aliud folio est thymbræ, hirsuto, rigido: cauliculos emittit multos, pedales, fruticis specie. è quorum summis flores, albi, & semina in compressis folliculis. Huc adducenda etiam alia à Pena prodita. Ac id primum quod nusquam se

*THLASPI Fruticosum  
spinosum Narbonense, Lob.*



*THLASPI Fruticosum  
Alterum, Lobellij.*



*THLASPI Narbonense,  
Pena.*



vidisse



*THLASPI* Minus Cly-  
peatum, *Pena.*



*THLASPI* Aliud umbel-  
latum, *Pena.*



vidisse ait, nisi in agro Narbonensi & Monspelienſi, locis squallidis, ſabuloſis, propè puſillas anchuſas proueniens. Folia, flores, ſeminaq; ex luteo pallent, & peltæ ſuperioris ſunt, ſed penè pergamenæ chartæ inſtar pellucida, tenuia, ſimilitudine, ſapore Leucoij: vnde quidam Leucoium marinū putarunt: ramuli ſunt exiles, pal-  
mares, nitidi, foliolis albicantibus thymi, non  
ita numeroſis. Aliud eiſdem puſillum Thlaſ-  
pi propè Monſpel. ad Caſtrum nouum cis La-  
dum amnem naſcitur, aridis viarum crepidini-  
bus, ramulos multos ſpargens, rectos, vimineos,  
palmares & ſeſquipalmares, albidos: foliola po-  
lygonati, minora, aut centunculi, aut lauandulæ:  
floſculos albidos, Iberidis aut Thlaſpi Cretici:  
Clypeolos non diſſimiles fert, ſed duplò mino-  
res. Tota planta albicat, guſtuq; Thlaſpi aut na-  
ſturtium indicat. Hoc Itali Alyſſon fecère, ſed  
doctiorum iudicio Thlaſpis potiùs adnume-  
randum quàm Alyſſo, cui aptior alia ſtirps in-  
uenta eſt à ſedulis herbariis, quàm in hortis  
alunt. Item aliud eiſdem Thlaſpi eſt id, quod  
montoſis ſatis Narbonæ ad Lupi montis radi-  
ces oritur, Maio & Iunio flores muſcoſos, um-  
belliſque confertos, ſuperioris non abſimiles  
edens, ſed albidos, ſemenq; minus multò, ſed  
admodum acre, foliola exiliora, diuiſura na-  
ſturtij hortenſis, per totos cauliculos numero-  
ſos, grandes, è radice non profunda, nec multū  
fibroſa, ſapore acerrimo, Thlaſpeos poſtremam

*SINAPI* Et *Thlaſpi media*  
*Prouincialis planta, Pena.*





addo ex eodem Pena nouam plantam, propter communes inter sinapi, buniadem, & Thlaspi figuram ac vires. Prouenit non procul à Magdalene fano, in excellissimis illis cauitibus Gallicæ prouinciæ, floresq; Augusto promit luteos erysimi, nec siliquas dispares, in gracilibus ramis ad summum & imum, vna è radice digitum crassa, densa, pedem longa: capistrum folia, Thlaspi, aut draba, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore erysimi aut buniadis barbareæ.

## AGERATVM,

## CAP. LV.

Locus.

Forma.



AGERATVM secundum & ferulaceum Plinij in pinetis gignitur, ac fruticat, arido macroq; solo, radice nigra, rugosa, contorta, lignosa, dimidij pedis longitudine: folio ferulæ aut fœniculi, statim ab radice copioso, per caulem impari exortu disposito: caulibus multis, angulosis, cubitalibus, ferulaceis: flore aureo, inodoro, senecioni simili, in umbellæ rotunditatem formato, licet ramuli flosculos sustinentes, & in umbellæ orbē coeuntes diuersis caulibus partibus attollantur: pertinaci in floribus aurei coloris fulgore, & gratia, vnde Agerati, idest, non senescentis nomen, gustu subamaris. Odor foliorum, dum teruntur, artemisiæ leptophyllon vulgarem refert. Floret Iunio mēse. Ageratum purpureum, herbariis quibusdam dictū, in nudis ferē cauitibus gignitur,

## AGERATVM Ferulaceum.

## AGERATVM Purpureum.



vbi putris saxi puluisculus subest, vel riuius aliquis illabitur, aut scaturientis aquæ guttis, vel aspergine rupes madescit: radice breui, capillata, subflaua: foliis paruis, numerosis, circa radicem sparsis, Agerato similibus, gustu subamaris, antrorsum obtusis: ob quam similitudinem Ageratum vocant: cauliculis plurimis per saxi crepidines pendulis, saxumq; auleorum instar ornantibus, & contegentibus: flore violæ, purpureo, copiosissimo, suauissimè olente, vt vel ea sola dote mirū in modum placeat, tanta scilicet odoris gratia violis non postponenda: semine minuto, in oblongis vasculis. Germani quidam Moschatellam caruleam vocant. De Agerato multò plura diximus in libro de Umbelliferis.

SYNAN



SYNANCHICA, CAP. LVI.

**S**YNANCHICA ERBA hæc in fabuletis & macris locis puenit, radice nigra, lignosa, *Locus.* sex digitos longa, fibrata, tenuissimis villis capillata: ramis multis, pedalis, quadratis, inferne rubentibus, geniculatis: foliis multis, lino vel galio similibus, ad geniculorum interstitia nodosque exorientibus, quinis, senisve: flore in summis caulibus, cauliumque ramulis copioso, principio rubro, post candicante: nullus in ea gustanti sapor deprehenditur. Siccat absque morfu. Ad anginas vtilissima est sumpta, & admota, quædecusâ Synanchi-

SYNANCHICA.

SYNANCHICÆ Species, *Iuncaria Salmanticensis, Clusij.*



cam nominarunt. Synanchicæ species videtur planta, quam Clusius ait à Salmanticensibus Iuncariam vocari, à iunceorum cauliculorum forma & gracilitate. Tota enim iuncea est, inquit, sed equiseti modo aspera, & geniculata, foliis utrinque lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & paleaceos, candicantesque flores proferentibus, semen deinde exiguum, nigricans: radix tenuis & candida. Tota herba subdulcis est. Prouenit locis arenosis inter vineta secundo à Salmantica lapide. Floret Iulio, semen fert Augusto.

LONGCHITIS, CAP. LVII.

**L**ONCHITIS in iis quoque est quæ in asperis & siccis locis prouenit, *Lib. 3. c. 144* foliis valde porri similibus, inquit Dioscorides, latioribus, subrubris, plurimis, ad radicem circumfractis, velut terram versus paucis in caule, in quo flores seu pileoli, figura verò commicis. perfortis hiantibus similes, nigri quidem, sed album quidpiam ab ipsis eminet, ex hiatu ad inferius labrum velut ligula: semē simile est lanceæ, triangulare, inuolucris clausum, vnde nomen accepit. Radix similis est dauco. *Lib. 25. c. 22.* Plinius, Lonchitis, inquit, non, ut plerique existimauerunt, eadem est quæ xiphion, aut phasganion, quamquam cuspidi simi-



lis semine. Habet enim folia porri, rubentia ad radicem, & plura quam in caule, capitula comicis personis similia, paruum exerentibus linguam, radicibus prælongis. Nascitur in sitientibus. Sed galericulata ista herba herbariis ignota est, quantumvis diu multumque in montibus & aridis locis eam vestigarint. Herbariorum quidam Lonchitin esse volunt Helleborinen Dodonæi: descriptam cap. 25. lib. 3. à nobis libro de plâis. Quæ in umbrosis, &c. Alij, Helleborinen nostram ferrugineam, descriptam supra, cap. 30. Vtriusque flos, sed præcipue Ferrugineæ, comicæ personæ simile quidpiam ostendit, de altera lonchitidis specie diximus, libro modo citato.

## POLEMONIVM, CAP. LVIII.

**Nomina**  
Lib. 4. c. 8.



POLEMONIVM Græcis & φιλέταιρον, siue φιλέταιρα, & χιλιόδυναμος à Cappadocibus, auctore Dioscoride, vocatur. Latinis Polemonium, & Polemonia, & Philætaria. Polemonium quidem, quasi in bellis vtile dicas,

Lib. 4. c. 8.

**Forma.**

adeo vt de eius inuentione sibi vendicanda certatum inter reges sit, quod herba esset chiliodynamis, id est, mille viribus prædita. Ramulos habet, inquit Dioscorides, tenues, pinnatos: folia paulò maiora quam rutæ, sed oblongiora, ad polygoni aut calaminthæ folia accendentia: In summo velut corymbi sunt, in quibus semen nigrum, radix cubitalis est (πηχυσα: alij παχιστα legunt, id est, crassa,) subalbida, similis struthio. Nascitur in montibus, & asperis locis. Plinius ita depinxit. Polemoniam alij philetariam, à certamine regum inuentionis appellant, Cappadoces autem chiliodynamin: radice crassa, exilibus ramis, quibus in summis corymbi dependent, nigro semine, cæterò rutæ similis. Nascitur in montosis. Sed quænam planta

**Locus.**  
Lib. 4. c. 6.

POLEMONIVM,  
Dodonæi.

Lib. 4. c. 12.



non ambia. Cap. 223.

men cum Behen Serapionis minimè conuenire videntur. Sic enim scribit, Aben Mesuai. Species Behen sunt duæ, scilicet rubri & albi, & sunt ambæ venæ in magnitudine radice pastinacæ paruæ, quarum quædam sunt tortuosæ, deferuntur ab Armenia, odor eius est bonus, & eis viscositas quædam: & ambæ species sunt calidæ humidæ, & augmentum faciunt in spermate. Polemonium aliud accuratè pingèdum curauit



POLEMONII, Altera  
figura.



vnâ circinatim collectis, plenis, paribus, ligultri, aut corni fœminæ, succo ianthino vel atro, purpureo inficiente prægnantibus: radice prolixa, lignea, implexa & vario flexu sparsa, intus alba, saporis nonnihil acris & amari, euulsu difficili. In Mompeliensi agro ad castrî noui aridos colles, & æstuosas margines oliuetorum,

curauit Dalechampius, dudûmque descripsit, quod sponte vbiuis in agro Mompeliensi gignitur, Lugduni verò in hortis solûm, pergulis vestiendis, & hortorum sepibus contegendis, ab olitoribus dicitur lasminum luteum, quod albi iasmini modo in vicina scandat: fruticat hæc planta flagellis multis, longis, lentis, rotundis, in adminicula propinqua reptantibus foliis: folio rutæ, sed obscurius virente: flore luteo, iasmino simili, specioso: baccis postquam defloruit, nigris, purpureo succo tingentibus, si quid imbuatur. Pena non aliam polemoniam exhibet, non multis ab hinc annis Academia Mompeliensi notam ac vires experientia compertas. Frutex, inquit, ipse vndeque exquisitè quadrat delineationi Dioscoridis. Virgultis enim multis fruticat, lignosis, rectis, rotundis, gracilibus, cortice in pullo viridi, ternos & quaternos cubitos altis, in quibus adusq; summum hærent vtrîque pinnatim ramuli, & folia ternâ, citius aut rutæ, maiora, saturè virentia, crassiuscula, & rigida. Flores Maio & Iunio emicât lutei, pusilli, vt iasmini, qui cedût baccis nigris,

POLEMONII Species,  
Dodonæi.



POLEMONIA Mompel.  
Iasminum luteum.



& in



Ibid. & in luci Gramuntij cāpestribus saxosis, quàm plurima. Polemonij radix, teste Dio  
 Vires. scoride, bibitur in vino contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vrinę  
 difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmę pondere lienosis.  
 Eadem scorpionis plagę alligatur. Tradunt eum qui radicem gestauerit, (non vt  
 Lib. 8. sim. legitur, qui gustauerit, τὸν ἐχόντα,) à scorpione non feriri, cūque si ictus sit, nihil  
 molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat. Polemonium, inquit Galenus,  
 tenuium partium est, & desiccandi vim habet: quamobrem quidam radicem eius  
 cum vino ad ischiadicos, dysenteriam, lienemque induratum potui exhibent.

## HOLOSTIVM,

## CAP. LIX.

Nomen.

Lib. 4. c. 10.

Forma



Locus.

Lib. 27. c. 10

In cap. 10.  
lib. 4.In cap. 123.  
lib. 2.Pena in  
Adu.

ῬΟΣΤΙΟΝ herba, id est, tota ossea dicta est per antiphrasin, quòd  
 nihil duri ossēve habeat: tota enim tenella & graminea est. Parua  
 est herba, inquit Dioscorides, tribus aut quatuor digitis eminens su-  
 pra terrā, foliis & viticulis coronopo aut gramine proximis, adstrin-  
 gentibus, radice valde tenui pili instar, alba (vulgares codices habent λευκὴν τῶς  
 ἑλκῆς, quod est albam speciem, qui sensus videtur friuolus. At in veteri legitur, λευκὴν,  
 ἰώδην, id est, albam, fibrosam,) longitudine quatuor digitorum. Nascitur in editioris  
 terrę locis. Plinius, holosteon, inquit, sine duritia est herba, ex aduerso appellata à  
 Græcis, sicut fel dulce, tenuis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor  
 digitorum, ceu gramen foliis angustis, astringens gustu. Nascitur in collibus terre-  
 nis. Pro qua molli herbula aliam atque aliam herbarij depingunt. Mathiolus etsi  
 genuinum Holostium nulli dum in Italia notum esse putet, tamen nullam plātam  
 se reperisse ait, quæ verum referat, quàm ea quę vulgò à Goritensibus Serpentina  
 vocatur, de qua in Horto egimus, Capite De Coronopo. Est enim herba exigua hu-  
 mi procumbens, quæ foliis cauliculisque coronopi modo exit, gustu adstringenti-  
 bus, radice tenui lignosâque. Nascitur quoque in collibus & sabulosis locis. At hoc  
 Matthioli holostiū à multis improbat, quodeius radix minimè capilli tenuitate

HOLOSTIVM,  
Matthioli.HOLOSTIVM,  
Quorumdam.

sit



fit, quod vult Dioscorides, imò crassitie lignosa, fusca, minimi digiti crassitudine: reliquæque planta capitulis & femine plantaginis, non mollis aut tenera, sed durius rigidiôrque, quàm vt holostio datum sit, folia illi iunceæ, angusta, crebra, in terram procumbentia. Matthiolus ipse mutata sententia in postrema commentariorum editione Holostium aliud pictum exhibuit, nulla adiecta aut figura aut virium declaratione. Longè diuersam pro legitimo holostio proponit Pena, quæ multò breuioribus & crebrioribus gramineis, vix palmaribus viticulis, & foliis exit, coronopi diuisura, in superiore ambitu ex fusco virentibus, delicatoribus, fermè vt capillarium, sparsis: radix tenuissimis cirris, & capillis pluribus adianti veri, ternos vel quaternos digitos proluxa, pulla, & albicans fuscedine. In Narbonensi prouincia ad Veganium, & propè Lugdunum, etiàmque in Alsatia Germania se vidisse ait, saxosis & incultis, sterilibusque collibus. Gustu exsiccat & adstringit, grata satis, & cuiusdam sortoris non immunis. Eisdem facultates Dioscorides holostio tribuit. Potest, inquit, si simul coquatur, carnes compingere: bibitur & adrupta cum vino potæ. Vñus eius ad vñsa, rupta in vino potæ. Vñlnera quoque conglutinat. Nam & carnes coguntur addita. Quæ ex veteri codice sic legit Cornarius. Nam & carnes, cum coquantur

**HOLOSTION,**  
*Loniceri.*



**HOLOSTIVM Salmanticensæ, Clusij.**



cauliculi nudi exiliunt, palmum alti, qui à medio ferè ad summum vñque, multis & sese mutuo contingentibus flosculis ex herbaceo candicantibus ornati sunt, vt in coronopo, quibus deinde semen plantaginis succedit theculis inclusum: radix est longa

In Aduers.

Ibidem.

Vires.

Lib. 27. c. 10.

Embl. 9.

lib. 4.

Lib. 8. sim.



longa tenuis, lignosa. Collibus aridis Salmanticae vicinis provenit, maior & candidior iuxta Valentiam Hispaniae secus vias. Floret illic Maio. Valentiae verò Martio & Aprilis initio. Salmanticenses Holoftium vocant.

CATANANCE *Quorundam,*


## CAP. LX.

Nomina

Locus.

Forma.

Vires.



lib. de maritimis plantis.



ERBAM hinc adpictam Catanancem priorem herbarij quidam esse volunt, coniectura quidem non aspernanda moti, quod multæ in historia Diotcoridis commemorata notæ illi conveniant. Gignitur in aridis & sabulosis locis, radice tenui, iuncea, nigra, non altè descendente, foliis crebris, albicantibus, coronopo similibus, cauliculis gracilibus capitula sustinentur quina senave, cyano ferè similia, latiusculis & acerosis laminulis compacta, albicantibus. Flos est puniceus, semen minutulum. Herbae totius gustus adstringens. Quare vtilem esse aiunt ad cohibendas sanguinis, aliorumque humorum ex quavis corporis parte, eruptiones, ad gargareonis inflammationes, & aphthas, si eius decocto os colluatur, ad maligna tibiæ ulcera. Hanc itaque plantam si pro Catanance agnoscamus, haud verum fuerit ad amatoria tantum expecti, cum experientia docuerit variis hanc morbis prodesse. Catanance alia descripta est à nobis in

## STATICE,

## CAP. LXI.

Nomen.

Locus.

Forma.



STATICE à præsentissima vi qua pollet, sistendæ sanguineæ & cutis fluxionis nominata est hæc herba, à Statice Plinij diuersa, perperam etiam cantabrica eiusdè, Caryophyllus montanus alter nonnullorum. In aridis & petrosis nascitur, quinetiam ex lapidum saxorumque rimis emergit, vt integram euellere volentibus saxum diffringendum sit. Catanances alterum genus Parisienses herbarij esse putant. Radices agit solidas, crassas, flexiles, nigras, in vetusta planta proximè folia multas, rugosas, nodosas, in vnam grandiore & ampliorem ex variis partibus coeuntes, folia fert multa, humistrata, lanceolata vulgari similia, angustiora, venosa, crassa, in cauliculis nulla, quos multos emittit, iuncea, rotundos, plerumque cubitales, glabros, in quorum fastigio capitulum insidet rotundum, alveolis multis pertusum, fauorum cauernis similibus, in quibus flosculi è phœniceo candicantes nitent, quibus delapsis, capitulum velut



QVÆ IN ASPERIS NASCVNTVR, LIB. X.

1191

lum velut tomento lanuginosum cernitur, & in cellulis illis minutum & exile semen coërcetur. Sapor totius plantæ adstringens, facultas ei ad miraculum vsque deficcâdi, & erumpentium humorum impetum cohibendi siue trita admoueat, siue succus eius bibatur. Dysenterijs succurrit, mensium abundantiam, sanguinis è naribus profluium sistit, sanguinem excreantibus opitulatur. Denique vulneraria est, & maligna vlcera ad cicatricem perducit.

Vires.

Locus.

SCORPIOIDES MONTANVM,

CAP. LXII.



CORPIOIDES montanum herbarijs quibusdam dictum in altis & asperis montibus nascitur, radice principio crassiuscula, nigra, in fibras multas & breues se diducente: folijs multis, longis, angustis, lanuginosis, leucoio purpureo similibus, sed margine non incis, caule palmum alto, foliola pauca mittente, flosculis tribus vel quatuor, cæruleis, in exiguum, rotundum, virgatũque capitulum siue corymbum conglobatis. Rara hæc planta est, montiumque solitudinibus inaccessis tantum familiaris.

Forma.

Locus.

TVNICA MINIMA,

CAP. LXIII.



IN SABVLETIS, aridis locis & murorum suggrundiis Tunica minima nascitur, radice candida, in multas partes fissa, valde fibrata, cauliculis quamplurimis, dodrante non altioribus, geniculatis, furculosis, flexilibus: flore paruulo, quinque foliolis constante, ex albo puniceis, ex paruo allabastro, vt in caryophyllo nostrate prodeuntibus, gustu austero. Holostium quidam esse putant.

Locus.

Forma.



Locus.

Forma.




ACEA montana in apricis & glareosis montium locis gignitur: radice ferè rotunda, veluti ex foliis in sese coëuntibus coagmentata, fibris multis capillata: foliis statim ab radice multis, erucæ modo diuisis, sed laciniis maioribus & latioribus, incanis lanuginosis: caule pedali, capite in eius fastigio, Acano simili, pro reliquo plantæ habitu, crasso, corticosis laminis & vnguibus substruëto, Cinaræ instar, sed minimè pungentibus: flore albo: semine oblongo. Floret Aprili mense. Semen Iunio maturefcit. Quidam Iaceam Acanophoram vocant. Iacea alba in lapidosis & saxosis profilit: radice ferè pedali, contorta, lignosa, extrinsecus propè nigricante, fibrata: foliis paruis, minutim infectis, absinthio marino non dissimilibus, exilioribus, & magis incis: caule cubitali, anguloso, lanuginoso, in multos ramos supernè diuiso, quorum in vertice capitellum exiguis laminulis compactum extat, laceræ nigræ modo, ex quo flos ruber prodit. Sapor in tota planta perquàm amarus est. Floret Iunio mense. Ad affectus ventriculi frigidos commendatur, ad hepatis & lienis obstructions, & ad menses prouocandos. Iaceas alias demonstrant Lobellius & Pena. Maiorem folio multùm laciniato, in segetibus Galliar & Angliæ potiùs quàm in pratis nascentem, caules cubito & sesquicubito altiores proferentē, circa quem folia multa multùmque laciniata Hieracii modo

IACEA, Montana.



Vires.

IACEA, Alba.



IACEA Maior, Lobel.



sunt,



sunt, globulos duplò maiores, turbinatos, ex squamulis compactos gerit, apicibus  
florum purpureorum obductos Cyani maioris. Radix digitum æquat, lignosa: se-  
men cnici, minus. Cyani floris est congener. Nonnunquam Mechliniæ in hortis,  
floribus albis & capitulis spinosis visitur, auctore Lobellio. Huic nouam subdit

*IACEA, Montana*  
*Narbonensis, Lobell.*



*IACEA, Maior*  
*Lutea Pena.*



*IACEA, Incana folio*  
*oleæ, Lobell.*



*IACEA Humilis, hieracij*  
*folio Pena.*





## IACEA, Incana.



idem Lobellius Iaceam montanam Narbonensem propter aliquam inter se similitudinem. Cauribus & collibus Caltri noui conterminis agri Montpelienſis ab eo reperta cauliculo riget dodrantali & pedem alto, rotundo, folia laceæ luteæ & chamæleonis læuis Theophrasti media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta: flores Iaceæ aut cirſij, ſed minores: radicem ſeſquipalmarem, gracilem, minus fibratam, guſtu cyani amaricat. Addit Lobellius Iaceam puſillam incanam folio oleæ, ptarmicæ ſpecie. Eſt alteri Scæbe Salamanticæ Cluſij per omnia ſimilis capitulis & floribus exoticæ Syriacæ plantula: ſed cauliculus minus diuiſus, palmaris & ſeſquipalmaris: folia maiora oleæ, magiſque incana, minimè ſerrata: capitula item habitiora, nitidis argenteis ſquamis, guſtu inſipido, minimè amaro. Iaceas aliàs tradidit Pena. Iaceam lutea maiore, quæ in ſegetibus Montpeliacis reperitur, floribus luteis, venuſtis, à cartamo ſilueſtri nullo modo diſtans capitulis, foliis, caulibus, niſi quòd tota aſperiuſcula eſt. Altera minor eſt, ſerpens, rarior, & ſe-

re Narbonenſium eſt, in marginibus ſatorum naſcitur, ad pontem à Monſpelio miliari diſſitum, via qua Frontignanum itur, foliis paruis, hieracij modo laciniatis, minoribus, reſuſioribus, vnà cum cauliculis dodrantalibus humi ſtratis: capitula gerit prorſus cyani, cærulea, minus obſoleta: flores purpuſcentes, vel albidos: radix eſt craſſior: ſemen cæteris non diſſimile. Tertia propior eſt cyano quàm Iaceæ, vtrique tamen non abſimilis. Lobellius Ptarmicam vulgarem Herbariorum vocat, propter ſaporem acriorem, amarum, halitumque tetrum, ſternutamenta crebrò extorquentem. A radice duriore multos caules emittit, folia crebra, gnaphalij triplò maiora, leuiter ſerrata, ab imo multa, ad ſumma uſque, oblongiora, acutiora, graciliora: capitula ex ſquamulis albidis compacta, cyani aut laceæ, apices villoſos, ex purpuſcente colore in pallidum langueſcentes. Tota piloſa eſt, & hirtutis incana. In Narbonenſibus vineris, & non procul à Monſpelio naſcitur. In hortos etiam tranſlata eſt.

## PHYLLVM,

## CAP. LXV.

## Nomina

Lib. 3. c. 123.

## Genera

## Locus.

## Forma.

## And. Lac.



VM φύλλον nihil aliud quàm folium ſignificet, vix vllam herbæ notionem in animis informat. At ἐλαόφυλλον, id eſt, oleæ folium, herbam foliis oleæ ſimilem designat, quæ & vel foliorum eruptionis argumento vel à Muſci ſimilitudine, Bryonia dicitur, auctore Dioſcoride, qui duo eius genera aſſignat. Thelygonum, id eſt, Fœminiparum, & Arrhenogonum, id eſt, Mariparum, & vtrumque deſcribit his verbis. Phyllum, quod Elæophyllum vocant, alij bryoniam (ſunt qui βρύον legant, quod muſci modo exeat qui βρύον Græcis dicitur) naſcitur in petris. Eſt autem quod thelygonum dicitur, veluti muſcus, oleæ folio, viridiore: caule tenui, breui: flore albo: ſemine papaueris, maiore (vulgares enim codices habent, καρπὸν μετρίον, ὡς περ μέλιωνος, cum legatur in exemplari veteri, καρπὸν λεπτόν, μικρόν, id eſt, fructu tenui atque puſillo.) Arrheno



PHYLLVM *Thelygonum*,  
*Dalechamp.*



Arrhenogonum verò in cæteris quidem prædicto simile est, sed fructu differt. Habet enim fructum racemosum, similem flori oleæ quæ defloruit. Dicitur Arrhenogonum potum masculos partus facere, Thelygonum femininos. Hæc de illis narrat Crateuas, sed eorum historiam hæcenus mihi produxisse visum est. Quibus verbis Dioscorides, inquit Pena, non plan-  
tas quin sint, qualésve sint in dubium reuocat, sed duntaxat ambigit num sexus optionis compotem quempiam facere possit earum vtrius, nempe maris aut feminae, quod Crateuas prodidit, & fabulæ affine esse Theophrastus monuit. Dioscoridis igitur sunt descriptiones non Crateuæ, aut saltem non solius, sed ex aliis quos legerat Dioscorides auctoribus. Plinius ex iisdem mutuatus eadem ferè prodidit his verbis. Phyl-  
lum à Græcis vocatur herba in saxosis montibus nascens: femina magis herbacei coloris: caule tenui: radice parua: semine rotundo, papaueri simili. Hæc sui sexus facit partus. Mas autem semine tantum differens, quod est incipientis oliuæ. Vtrumque bibitur in vino. Plinius alio in loco, Arsenogonum & Thelygonum herbae sunt, inquit, habentes  
vvas oleæ floribus similes, pallidiores tamen, semen album papaueris modo. Thelygoni potu feminam concipi narrant. Arsenogonum ab eo semine oleæ, nec alio distat. Huius potu mares generari perhibentur, si credimus. Alij vtrumque ocimo simile tradunt. Arsenogoni autem semen geminum esse, testibus simile. Quibus verbis Plinius partim eadem quæ supra ex Dioscoride, partim diuersa ex Theophrasto genera designare videtur. Sic enim Theophrastus. *Διὸ καὶ χαλῶσι φύλλον, τὸ μὲν ἀρρενόνγονον, τὸ δὲ θηλυόνγονον, ὁμοία δὲ ἄμφω, καὶ μὲν φησὶ ἔχοντα ἀκίμους. ὁ δὲ χαρπὸς τῶ μὲν θηλυγόνου, κατὰ περὶ ἐλαίας βρύον: ὡς χεῖρότερος ὃ τῶ ἀρρενόνγονου, διὸν περὶ ἐλαίας ὅταν ἀρτί φύηται ἐκ τῶ βρύου, διέκριον δὲ ὥσπερ ὄρχας ἀνθρώπων.* Id est, Quare Phyl-  
lum aliud mariparum, aliud feminiparum vocant, similia ambo, & speciem habentia ocimi, fructus feminipari est instar oleæ florentis musci, tamen pallidior: Maripari verò instar oleæ iam primum ex muscoso flore emergentis, & geminus, testiculorum hominis modo. Hinc suspicantur quidam duarum herbarum eandem & repetitam esse deliriationem, quare Dioscoridis caput de phyllo irreptitium esse, alij minimè, sed vtroque phyllo vtramque mercurialem marem & feminam exprimi. Alij ex diligenti peruestigatione & descriptionum collatione alia phylla adinuenerunt, Phyllumque thelygonum Dioscoridis esse, quod in saxis & rupibus apricis Allobrogum & Sequanorum, non aliter quàm muscus quidam innascitur, per aridam terræ squallidæ crustam: radicibus exilibus, breuib, & atris, serpendo huc illuc sespargens, magnùmque tandem spatium occupans: folia densissimè congesta, procul intuentibus nonnihil aizoum æmulantur similiter crassa, non tamen similiter acuminata, sed tanquam in summo re-  
tusa, oleæ similia, magis tamen virentia, in ambitu crenata, & notis candidis ad singulas incisuras signata, quæ humi iacent, & largè terram operiunt: caulis tenuis & plerumque humilis, nonnumquam procerior, vt terram nactus est, vel

In Adu.

Lib. 27. c. 12

Lib. 26. c. 15.

Lib. 5. hist. cap. 19.



ficciolem, vel humoris illapsu madidiorem, in tenuibus furculis: florem album, copiosum, violæ similem edit, suauiter olentem. Sapor totius plantæ aquosus est ac dulcis. Sunt qui semperuium montanum appellant. Quidam Lichenem primum Plinij esse arbitrantur, descriptum cap. 4.26. foliis imis ad radicem latis:


*PHYLLUM Thelygonum,*  
*Matthioli.*



*PHYLLUM Arrhenogonum,*  
*Dalechampij.*



*PHYLLUM Arrhenogonum*  
*maius, Dalechampij.*



caule vno; paruo: longis foliis dependentibus: qui cum melle tritus delet stigmata. Aliud Phyllum Thelygonum ostendit Matthiolus à Cortufo mistum, quod genuinum esse putat ad stipulanti- bus notis omnibus. Quibus in locis Thelygo- num, in iisdem reperitur & arrhenogonum, musci modo saxi hærens: radice pro plantæ ha- bitu crassiuscula: foliis numerosis, minimis, in ea exiguitate oleæ similibus: flore luteo: fructu simili oleæ, quæ flore euanescente formari tan- tum incipit, & adhuc minutula est, in summo ferè gemino instar testiculorum hominis. Alter- um Arrhenogonum hic appictum est, quod quidam maius vocant, vt à superiore discerna- tur, in Sequanis ad Sillij fluuij originem, haud procul à cœnobio Balmensi, in exigua & tenui terræ crusta proueniens, quæ nudos alioqui sco- pulos contegit: radice longiuscula, candida, paulatim gracilescante, fibrata: virgulas præte- nues huc illuc in orbem mittente, e quibus aizoï modo, folia radiatim ex quibusdam veluti glo- bosis



PHYLLVM Arrhenogonum  
Thelygonon, Theophrasti.



bosis capitulis prodeuntia, stellæ au oculi figuram referunt, oblonga, carnosâ & crassiuscula, rigidis villis eorum margines ambientibus, & in circuitu præfixis, qui tractantium manus blandè pungunt ac vellicant: cauliculis dodrantalibus, nudis, teretibus: flore albo, fructu oleæ nascenti simili, ferè semper gemino, instar testiculorum hominis, semine minutulo. Sapor qualis Aizoi fatuus & subausterus. Phyllum Theophrasti in aridis Monspelio vicinis agris frequens nascitur, notis ab eo traditis prorsus conuenientibus: fruticosa planta: radicibus multis, fibratis: caulibus cubitalibus, hirsutis: foliis ocimi, lanuginosis, tactu mollibus: semine vel in racemosum pediculum congesto, vel gemino, testiculorum modo, non aliter quàm in mercurialis vtroque genere: grauis tetèrque odor in tota planta nares offendit.

PHYTEUMA,

CAP. LXVI.



T *φύττωμα* Græci, sic etiam Latini Phyteuma vocant, fortassè quòd ad amorem, gignendàmque prolem aptum sit, quod ad amatoria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt, vt tradit Dioscorides, atque ita describit: Folia habet struthij, minora: copiosum semen,

Li. 4. cap. 5.  
Forma.

PHYTHEUMA, Matth.



perforatum: radicem parua, tenuem, per summa terræ nitentem. Ex qua breui descriptione difficile est certi aliquid de vero Phyteumate discernere. Matthiolus scribit quibusdam Herbarijs visum fuisse plantam hinc appictam Phyteuma esse: quæ nihil aliud est, quorundam sententia, quàm Campanula siue Ceruicaria Fuchsi, Thrachelium maius, siue Vuularia Dodonæi, de quo & Trachelio minori diximus in libro de plantis, Quæ flore placent. Dodonæus, libro de Floribus, putat Campanulam hortensem à Matthiolo pingi pro Phyteumate. Sunt qui Phyteuma esse volunt plantam tenui radice, gracilibus fibris capillata, saporis & odoris, si teratur, acris & vehementis, caulibus multis, palmum altis: foliis propè radicem in orbem per humum sparsis, betæ primùm nascenti similibus, longioribus, per caules impari situ dispositis, priuatim singulis, non multis in vno pediculo hinc inde ordinatis, vt in Resedis: flore herbaceo, luteis apicibus decoro, in spicam

Cap. 163.  
hist.  
Li. 2. ca. 20.



densam non coaceruato, sed ex superiore caulium parte exeunte, longis pediculis subnixo: semine in membranosis conceptaculis, amplis, quibus herbacea foliola sex, stellatim diuisa substernuntur: floret Maio. Aliud Phyteuma visitur

*PHYTEUMA Quorundam,  
Dalechampij.*



*PHYTEUMA Narbonen-  
sium, Pena.*



hodie, inquit Pena, in Gallorum provinciæ & Narbonæ oliuetis propè Monspe-  
lium, effigie Valerianæ minimæ: verum folia illi in imo infectoria luteolæ sunt,  
superiora autem diuisura & magnitudine pusillæ Valerianæ: plusculi sunt flores  
muscosi, albi, oleæ: semina pusilla, & instar vnionum rotunda. sed paululum  
compressa, vestigium parui foraminis impressum habentia, inclusa folliculo Pli-  
nianæ Resedæ, in cauliculis palmaribus & sesquipalmaribus, reptantibus. Radix  
exigua Valerianæ minimæ.

*RESEDA*



RESEDA,

CAP. LVII.


**P**LINIUS Reseda herbae meminit his verbis. Circa Ariminum nota est herba, quam Resedam vocant. Discutit collectiones, inflammationesq; omnes. Hanc nonnulli Herbarij esse opinati sunt quæ hic picta est, & Resedam luteam vocant. Radice est fibrata, minimi digiti crassitudine, intus lignosa, cortice crasso vestita, & saporis, & odoris, cum teritur, acris & validi, nasturtij aut raphani modo: caulibus multis, pedalis, angulosis: foliis erucæ fere instar diuisis: flore spicato, luteo, per quæ exiguo: semine minutulo, copioso in membranosis folliculis, angulosis, in extremo rufis, oclulis & coniuuentibus, non vt in phyteumate radiatim diductis. Hanc Resedam Pycnocomon quidam esse putauerunt, conueniente profecto & historia & facultate, si radix raphano similis, exiguum malum figura imitaretur cyclamini modo. Alia est Herbarijs quibusdam Reseda candida, quam etiam nostro sæculo propè Ariminum rustici

Li. 27. c. 12.

RESEDA Lutea.



RESEDA Candida.



Resedam vocant. Radicis figura, odore, sapore superiori est similis, item caulium multitudine: folia simpliciora sunt, & simplicius diuisa, in vnoquoque pediculo plurima: flos in spica densissime congestus, exiguus, è cinereo candicans: semen minutulum in vasculis oblongis, pariter vt & alterius angulosis, summo vertice non compressis, sed velut hiantibus & multifidis. Sponte nascitur in agris propè Ariminum: apud nos in hortis satum semine. Plinius de hac ita scribit. Qui curantea addunt hæc verba. Reseda morbos Reseda, scisne scisne, quis hic pullos egerit radices, nec pedes, nec caput habeant. Hæc ter dicunt, totiesque despuunt. Hæc Plinius. Quæ plena sunt plusquam anili superstitione.

SVCV



**M**YCONVS medicus perdoctus plantam hanc misit ex Hispania, & Sugudum Auicennæ appellauit, tum quod Mauritani Valentini, qui Gandiæ oppidum incolunt, nomen id ad hæc vsque tempora seruant, Sugudum nominantes, tum quod Gentilis Sucudum, filicem interpretatur, quæ interpretatio huic plantæ maximè conuenit, cuius folia filici mari per similia sint. Planta est cubiti altitudine, multos & rectos ex radice proferens caules, quadratos, lignosos, geniculatos, qui in ramulos etiam geniculatos & quadratos sparguntur, aliquantulum hirsutos. Ex geniculis folia prodeunt, propè radicem maiora, caulium summitati propiora, minora, serrata, filicis maris æmula.

SVCVDVS Auicennæ,

Myconi.

Li. 1. Stalp.  
Hisp. c. 60.

In caulium fastigiis capitula sunt, ex purpureo carulea, odorata, stœchadis Arabicæ capitula representantia. Radices ei multæ sunt, candidæ, lignosæ: semen minutum, candidum, planum, acerosum, inspidum. Nascitur in incultis, aridis, montosisq; locis. In hortis etiam colitur. Diu floret & in hortis præsertim toto anno. Herba est odorata, sapore cum acrimonia amaro, Græcis fortassè ignota, aut si nota fuerit, altera fuerit stœchadis species, id quod sapor, odor, vires eadem quæ stœchadis, demonstrant. Quam sententiam secutus Clusius Stœchadis alterius nomine pinxit & descripsit. Sucudus calefacit, auctore Auicenna, datur succus eius in potu aduersus dolores. Alphis illinitur, vlcerà vetera ad cicatricem perducit, excrescentem carnem puluis eius absumit, cum aceto podagræ imponitur, ex eo dulcibus, admistis fiunt eclegmata ad tussim, drachmi, duobus cum hydromelite bibitur ad cardiogmum: item duæ drachmæ cum hydromelite valent ad dysenteriam & difficultatem urinæ: in pello subditus menstrua ciet. Hæc Auicenna. Quæ omnia plantam hanc appictam præstare posse manifestæ eius qualitates satis probant.

SELAGO PLINII, SIVE CAMPHORATA,

CAP. L XIX.

Li. 24. c. 12.



Lib. 1. c. 189.

**S**IMILIS herbæ Sabine est Selago appellata, inquit Plinius. Hanc contra omnem perniciem habendam prodidèrè Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia fumum eius prodesse. Hanc Plinij Selaginem quidam esse volunt Ericæ prius genus, alij Hyssopum nemorensem, alij Chamæpeucen, alij Musci terrestres genus descriptum à Trago, nomine Sabine siluestris, de quo tractauimus, libro De plantis quæ in vmbrosis, &c. maior pars herbariorum plantam hanc depictam, quam Monspelienfes Camphoratam vocant, ob similem caphuræ odorem, quem trita vibrat, Selaginem vocat.

Locus.

Forma.

Arenosis & macris locis gaudet, in pinguibus tamen & humidis procerior fit. Radice est crassa, subnigra, caule cubitali, nonnunquam altiore, tereti: ramis multis, propè



SELAGO, Sive Camphorata.



propè radicē longioribus, quā propiores fastigio sunt, breuioribus opertis foliis, longis, angustis, Sabinæ aut Tamaricis æmulis: odore cū herba digitis friatur ac rumpitur, Camphoram referente: quam ob causam Camphoratam vocarunt, Officinis non prorsus neglectam, quòd in Martiati operosissimi medicamenti confectiōem à Nicolao Myrepso descriptam admittatur: licet Græcorum Arabūve nullus, quod sciam, vires eius facultatēque tradiderit. Quidam Cneorum nigrum esse volunt.

CONYZA MONTANA,  
CAP. LXX.



**M**YCONVS peritus Medicus & rei herbariæ studiosus, plantam hīc pictam à foliorum florūque forma, odore, sapore Conyza speciem esse iudicauit, & à natalibus montanam cognominauit. Nascitur enim in saxosis, præruptis & montosis, præsertim inter saxorum rimas, radice lignosa, solida, intus candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantum aditringente, exsucca non minùs quàm suberis cortex. Ex hac stolones multi prodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales, in quibus folia tenuia, hyssopi vulgaris, sed glutinosa Ledi modo, odore graui & viroso, & hircinum quid olente. In summo cauliculorum sunt flosculi, soncho similes, luteoli, in pappos abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, caput tentans. Flores Augusto maximè.

TRACHE





**D**E Trachelii aliis in libro de Plantis, Quæ flore placet, tractauimus. Nunc de Trachelio montano, quod in asperrimis montibus gignitur, radice nigra, supernè crassa, in furculos infernè diuisa, fibris paucis capillata: foliis circa radicem multis, eam vndique cingentibus, longis anchusæ modo, hirsutis, caule vnico, paucis foliis vestito, alternatim dispositis: flore & semine reliquis Trachelii, figura colorèque similibus.

## DORONICVM, CAP. LXXII.

**D**ORONICVM Arabibus *Haronigi*, *Doronigi*, siue *Durungi*, dicitur. De Doronico vulgari siue Officinarum hîc tractamus. Huius triplex differentia, nō ita magna, imò potius varietas quædam à Pena assignatur, tribus Iconibus à Lobellio expressa. Primæ pusillæ caules teneri, folia molliuscula, oblonga vti plantaginis, nonnihil ex virente flauentia, perspicuè hirsuta pilosellæ modo, siue cucumeris agrestis, sed attractanti leuia, ambitu rotundo, nonnihil laciniato, & supernè angusto, cucumeri agresti quàm Cyclamino similiore, terna vel quaterna in pediculis enatis ex radice exigua terete, orbiculata, & sensim in angustum desinente, subtus & transuersim quasi squamularum torulis articulata, scorpionis cadauer & caudam exprimente, multum fibrata. Color illi candidus, sapor dulcis amaricat, & lentorem multum cum pauxilla adstrictione coniunctum præfert. Caulis sesquipalmum altus: flores in summo fert luteolos, aut pallidos, radiatos, buphtalmi aut mediæ Consolidæ. Frequens nunc hæc in hortis Belgij, & prorsus eadem cum Doronico vulgari & minori Officinarum, quod in montibus reperitur, & collibus Pedemontanis, nonnullis etiam Franciæ. Secunda maiorem & multò longiorem radicem profert, multis corticosis squamulis nitentibus, candidis, marmoreis, per transuersum cinctam alam vtrinque vnam squillæ marinæ cancellivæ forcipulis non dissimilem, subdulcem gustanti: folia, flores, & caulis maiora paulò & rotundiora. Umbrosis montibus gaudet, non solum Alpinis ad meridiem, sed etiam frigidis ad Septentrionem. Huic similis tertia, magnitudine tantum distans à Lobellio ex Dodonæo picta, dudum à nobis & picta & descripta. In umbrosis montium locis gignitur inter saxa & cautes, radice parua, candida,

DORONICVM Minus  
officinarum, Pena & Lob.



**DORONICVM** *Brachiata*  
radice, *Aconitum Pardalian-*  
*ches, Plinij, & Matth.*



**DORONICVM** *Radice*  
*Scorpij figura, Dalech.*



plantæ nomina diuerſa putat, nec genere differre, ſed Cyperorum ritu, magnitudi-  
ne tantum, ſitu, & numeroſa radicum propagine, vt ſuprà declarauimus: alioqui  
facies, ſapor, odor omnibus idem, iidemque fermè natales. Doronico verò vim

candida, geniculis velut articulata, fibris multis  
vtrinque donata ſerpentibus, Scorpium opti-  
mè referente, ex cuius inferiore parte alia ſub-  
naſcitur, quæ aliam ſimilem procreat, tanta ra-  
dicum in aliis procreandis ſecunditate, vt in-  
terdum plures duodecim cohæreant: foliis tri-  
bus aut quatuor Melanio non diſſimilibus, hir-  
ſutis, tactu mollibus, caule pedali, aliquot folio-  
lis veſtito: flore Chryſanthemi amulo, & me-  
dio velut diſco, & orbiculato ambitu luteo. Ra-  
dix tuſa & cum axungia ſuilla mixta, ſcabiem  
ſanat, notiſſimo ruſticis remedio. Dodonæus  
Aconitum Pardalianches eſſe cenſet. Pena &  
Lobellius, vt diximus, & multi alij Herbarij  
Doronicum, Officinæ quoque paſſim Doron-  
ici vice, huius radicibus in compoſitionibus  
vtuntur. Quod autem Arabes Doronicum di-  
cunt, ab illo ſiue Aconito Pardalianche differt.  
Nam Auicenna Doronigi calidum & ſiccum  
in tertio gradu eſſe ſcribit, cui etiam aſſentitur  
Serapio, Doronicum calidum & ſiccum in eo-  
dem gradu conſtituens, a quo temperamento  
Doronici vulgaris, ſiue Aconiti Pardalianchis  
radices multum abſunt: nulla enim acrimonia,  
nulla amaritudo tanta, aut alia qualitas in iis  
percipitur, quæ tam calidas eſſe & ſiccas de-  
monſtret, ſed dulcis tantum ſapor ignauior &  
emplasticus, qui eas temperie media, aut ei pro-  
ximas eſſe oſtendit: quam ob cauſam medica-  
mentis oculorum anodynis admixcet. Idem  
Auicenna Aconito Pardalianchi, quod Stran-  
gulatorem Leopardi vocat, ſeorſum alio in lo-  
co ſuas vires ex Dioſcoride & Theophrasto ad-  
ſcribit. Matthiolus Doronicum ſecundo loco  
pictum Aconitum Pardalianches Plinij facit.  
Tertium verò Doronicum vulgare à Cortuſo  
miſſum Aconitum Pardalianches minus, falſo  
Doronicum, ab eodem Cortuſo admonitus  
Doronicum inter Aconita eſſe recensendum,  
quod certo ſciret ſapius facto à ſe periculo fa-  
cilè extingui canes, qui huius radices deuora-  
uerint: id quod etiam Matthiolus ipſe expertus,  
confirmat. Quare Doronicum iſtud tanquam  
venenum execratur, & ex Officinis & Pharma-  
copoliis omnibus eiciendum cenſet. At Pena  
Theophrasti, Dioſcoridis, Plinij Thelypho-  
num, Pardalianchen, Cammorum vnus huius


*hec figura eſt  
in Aconito Rad.  
Plinij pag 1737*

*Li. 2. c. 209.  
Cap. 325.  
ſimpl.*

*Li. 2. c. 68.*

*Ca. 73. li. 4.*



*GLASTVM Montanum,*  
*Dalechampij.*

Locus.  
Forma.

inesse canes interficiendi non negat, sed respondet Aloë saluberrima, & amygdalis amaris vulpes necari etiam Plutarcho auctore: & nulli vnquam pernicioſa fuerunt quæ Doronicum recipiunt Electaria de Gemmis, de Aromaticis, Confectio de moscho dulcis, quibus frequētissimè vtuntur Medici. Qua de re & de Aconito fusiùs differemus in lib. de venenatis.

*GLASTVM MONTANVM,*  
*CAP. LXXIII.*

**G**LASTVM montanum in niuosis verticibus montium gignitur, radice crassa, nigra, fibris multis capillata: foliis circa radicem multis, longo, crassoq; pediculo subnixis, venosis, Glasto similibus, sed in summo magis obtusis: caulibus multis, pede altioribus, in quibus folia supradictis angustiora, & acutiora: flos copiosus in caulium vertice luteus nitet, oblongi vasculi figura, supernè in cuspidem diuisus, prominente ex eius medio sinu, tenui pilo.

*MELANIVM MONTANVM,* *CAP. LXXIIII.*

Locus.  
Forma.



**M**ELANIVM montanum in algidis montium verticibus prouenit, cauliculis multis, exilibus: foliolis multis, humi iacentibus: flore cæruleo, duplo ampliore & maiore quàm in Melanio vulgari, rara quadà & eximia specie, si foliorum exiguitatè cū inusitata floris magnitudine cõferas.

*IASME Montana,* *CAP. LXXV.*

Locus.  
Forma.



**I**ASME hanc Iasmen montanam vocant ob eximiam odoris suauitatem, quæ Iasmini nostri flores æmulatur. In montium excelsorum iugis apud Rhætos crescit, radiculis breuibus, subul-  
teis, caule tres digitos

alto, hirsuto, nudo, simplici: foliis propè radicem multis, Aizoo ferè similibus, in orbem humi stratis, villosis: summum caulem foliola quatuor vel quinque coronant, è quorum medio flores emicant partim albi, partim puniceï, gratissimum odorem spirantes. Candidum principio florem astate rubescere compertum est.



PERSI



QVÆ IN ASPERIS NASCVNTVR, LIB. X. 1205  
 PERSICARIA SILIQVATA,  
 CAP. LXXVI.



N montibus & collibus asperioribus Germaniæ & Sabaudiaë gignitur, à Belgis in hortis colitur herba, quam Germani *Sprinckkraut* vocant, quasi erupticem siue salientem, aut subfilientem herbam dicas, propter siliquam quæ teres, gracilis, longa, pendula, chelidonij, semina parua, rotunda, balsamina scemina claudit, quibus turget, simul ac tantillum tangitur, in vultum proximi cuiusque quasi impetu vindicabunda, & se tangi queribunda, excludit. Idcirco, Noli me tangere vulgus Herbariorum vocat. Qua nota & nomine iam diu notissima est. Virgulta, folia, faciesque ipsa Balsaminem, Mercurialem & Amaranthum exprimunt. Quare cauendum ne quis Mercurialem putet, neque eam in eisdem vsus colligat.

Locus.

Forma.

OSTEOCOLLVN HIEROCLIS ET ABSTRTI,  
 CAP. LXXVII.



OSTEOCOLLON in mœnibus & faxis propè Sedunum Valesiorum caput nascitur, ac dependet, radice candicante, graminis instar geniculata, tenuibus fibris capillata, è geniculis & internodiis exorientibus ramulis permultis, pensilibus, iunci modo læuibus, teretibus, sed geniculis distinctis, cirrosis, tenuiori proceriorique sparto similibus, perpetuò virentibus, nullo folio vestitis: flore in acervum spicatum cògesto, è fusco nigricante, ex cauliculorum articulis prodeunte, petiolo subnixo. Quidam Polygonium, alij Talcution, alij Symphytum vocant. Osteocollon quidem, quòd fracta ossa ferruminat: Symphytum, quòd dissectas carnes coalescere: vulgus credat, si coquatur vnà, efficacissima enim glutinandi facultate partium diuortia committere, & separata cogere. Viridem eruunt, vino coquunt, dum supersit liquoris pars tertia. Decocto veterina salinant Hispani, eo medicamine morbos arcentes, & à vitis quæ imminet, asserentes: tum etiam si quid intus ruptum esse suspicatur, ab hac auxilium petentes. Hæc Abstertus & Hierocles memoriæ prodiderunt.

KKk 2





VCVLLATA, seu, vt quidam volunt, Crias Apuleij, altissimis & niuosis montibus gaudet: è saxis profilit, riuulo quopiam præterfluente madentibus, radiculis multis, perquam tenuibus, nigris, breuib; foliis propè radicem multis, læuib; crassis, in ambitu minimè crenatis, nec venosis, betæ nascenti similibus, gustu amaris, priusquàm sese explicent alabastrimodo candicantibus, cum sese explicuerunt, lætius & nitidiùs virentibus: cauliculis quinque aut sex, teretibus, nudis, subrubentibus, præsertim superiore parte: flore nunc albo, nunc purpureo, vertici caulium velut affixo, in singulis cauliculis vnico, figura quadam rara & eximia, colorisq; iucundissimi: semine minutulo in capitulis paruis, fastigiatis, angulosis. Floret Iunio, etiam antequàm niuib; liquatis montium cacumina detecta appareant. De Criade hæc prodidit Apuleius. Crias nascitur in Lucania: marmoris albi colorem habet, quatuor rubicundis

ornata cauliculis. Radix pista & promalagmate imposita, tertio die curat ischiadicus: eadem trita & imposita locis dolore affectis, quosuis dolores sanat.

## Nomina



IRCI barbæ congener est herba, quam *Scorzoneram*, aut *Scurzoneram* appellat Hispania, quod Latine Viperinam siue Viperariam, aut Serpentariam sonat: sic dicta, quòd contra venena viperarum ac serpentum efficax habeatur: nam Hispani Viperam *Scurzo* vocant. Noua

## Ca. 17. li. 2.

hæc est planta, vt refert Matthi. inuenta primùm in Catalonia Hispaniæ à quodam seruo Aphro, à Ceruero Leridano pretio empro. Cum enim quidam messores in agro à viperis demorsi fuissent, is qui in Africa plantam istam nouerat, propinato eius succo incolumes seruabat omnes, quòtque demorsi fuissent. Sed nemini plantam ostendebat, ne lucro fraudaretur. Tandem cum vafri homines locum obseruassent ex quo plantâ deferebat, illuc profecticam nacti sunt, inuentis nuper rescissæ herbæ reliquiis. Ea eruta, factòq; ipsius periculo euulgata res est, & Scorzoneram appellarunt. Hanc siccam primùm ad se missam fuisse, ait Matthiolus à Ioanne Odorico Medico paulò pòst viridem, viuentemque se vidisse ad Cæsarem Ferdinandum ex Hispania delatam: non multò pòst tempore copiosam quoque in Bohemia se comperisse Doctoris Riberæ Medici diligentia, in monte quodam siluoso vliginosoq; non longè à Poggebrot. Folia edit spithamæ longitudine, succisæ amula, sed longiora, subcandida, carnosâ, acuminata, quæ solo propiora longo pressòq; pediculo à radice prodeunt, humiq; accubant, quorum nonnulla leuiter sinuata spectantur. Caulem fert sesquidodrantalem sæpè maiorem, rotundum, geniculatum, in quo folia breuiora angustioraq;: flores aureos, hirci barbæ proximos, vterum ab altero vix dignoscas. Hi flaccescentes in papposum mutantur orbem, in quo semen continetur album, longum, hirci barbæ femini

## Forma.



femini simile. Radix subest sesquidrantalis, pollicari crassitudine, raris adnatis  
fibris, cortice subnigricante, vegeta, tenera, fractu facilis, succosa, alba intus pul-  
pa, lacteo succo pragnans, dulcis, & gustatu iucunda. Nasçitur in silvis & vligi-  
nolis locis atque obscuris Hispania. Nasçitur & in Germania, Thuringia, ac

SCORZONERA

Hispanica, Matth.



SCORZONERA

Boemica, Matth.



Bohemia in silvis ac montibus humentibus. Flos in Hispania Maio mense pro-  
dit, in Germania seriùs, Junio, videlicet ac Iulio mensibus. Foliorum aut radicis *Tempus.*  
succus datur præsentaneo remedio potandus aduersus viperarum, cæterorumq;  
venenatorum animalium ictus: quinetiam ad quoscunque pestiferos morbos:

Deuorata radix quotidie pestilentia contagia arcet, & venenis quibus-  
cumque resistit. Datur eadem aut eius succus vtiliter quoque comi-  
tialibus. Item cardiacis, vertiginosis, & animi deliquiis cordisq;  
tremori obnoxiiis. Commanducata per se radix tristitiam  
discutit, hilaritatẽque conciliat. Lacteus eius  
succus oculorum aciem acuit. Denique  
tota planta magni est ad  
omnia vñs.

*Vires.*

KKk 3







# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

### LIBER VNDECIMVS,

(643)

*Qui plantas omnes, quæ in Umbrosis, vdis, vliginosis & pinguibus locis proueniunt, exactè & ad vnum representat.*

#### ADIANTVM, CAP. I.



*Capillus veneris quæ  
reddat pulchrum capi-  
tus quæ veneris pulchra  
Sunt veneris & c.  
pulcherrima.*

*Diapoco medifera  
vini adstantes &  
Nomen  
aque ad medifera &  
et & folio in aqua  
mery & c. & c.  
ad pndi  
Spirita*

Lib. 7. c. 13.  
Li. 22. c. 21.

In Theria.



Ca. 28. hist.

T FIDEM nostram liberemus, stirpium quæ locis palustribus lacustribusq; proximis gignuntur, nempe vdis vliginosisq; ac pinguibus, item umbrosis, natura hîc explicanda. Sunt autem quàm plurimæ: quare iis in locis paulò diutius immorari necesse fuerit. Quod si quædam libro superiore reperientur, quæ aptius hîc collocari possent, aut contrâ, id nemini absurdum, aut mirū videri debet: quod non solum nataliū, sed foliorum aut cuiusvis alterius partis, aut virium, aut quaruis alia similitudo, atq; affinitas proximas quasq; sibi adiungat atq; adsciscat. Hîc verò ut in aliis, ab iis quæ notiores sunt, & magis vulgares exordiemur. Primū à celeberrimo illo, & omnibus Officinis nomine potius quàm re, præterquā in Narbonensi regione, notissimo Capillo veneris, sic etiam à Latinis, Apuleio teste, nominato: qui à Græcis vocatur ἀδιδάσιον, quod & δαϊνέ, idest, quod in aqua non madescat, vel, ut Theophrastus ait, & δὲ ὑγρομένη & φύλλον βρεχόμενον, & δὲ ἐπίδηλον ἐστὶ δαϊά & τὴν νοτίαν ἐπιμαρύν. ὅθεν καὶ ἡ προσωποποιεῖται. Quæ Plinius sic reddidit. Aliud Adianto miraculum: æstate viret, bruma non marcescit: aquas respuit, perfusum mersumve sicco simile est. Tanta dissociatio deprehenditur: vnde & nomen à Græcis. Nicander non ἀδιδάσιον dictum significat, quod in aqua mersum ac irrigatum, immadidum non permaneat, quasi verò longiore mora in aqua æquæ ac aliæ herbæ non madescat: sed quod imbris è cælo descendens stillicidia foliis eius non infideant.

Ἀρχαῖος τὸ ἀδιδάσιον, ὃ καὶ ὑμῶ ποιο παργένιος

ἀπαλάνη τὸ πρὸς τὰς νότις πρὸς τὰς νότις ἐστὶ δαϊά.

Impollutū Adiantū, quod denso imbre cadete. Destillans tenuis foliis non insidet humor. Vel quod Fuchfio magis placet, ab interioribus puteorum



puteorum parietibus, & fontium marginibus, quas coronat, dictū est Adiantum, quod nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respuit, quærat. Polytrichon autem, quasi multicomum, quod capillos multos ac densos faciat, eorumque defluvia expleat. Callitrichon verò, quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchriorésque reddat. Nec alia ratione capillus veneris hæc herba dicta est, quam à speciosis reddendis capillis nec alio nomine Veneris vox adiecta est, quam quod hæc pulchricoma pingatur. Plinius, Adianton quidam Callitrichon vocant, alij polytrichon, utrumque ab effectu, tingit enim capillum: & ad hoc decoquitur in vino cum semine apij, adiecto oleo copiosè, ut crispum densumque faciat: defluere autem prohibet. Hæc Plinius. Latine Cincinalis, Terræ capillus, Supercilium terræ, Crinita, Arabibus *Berscegnaſcen*, seu *Bersausan*, Culbare albur, Gallicè *Cheveux de Venus*, Germanicè *fräumenbar*, Hispanicè *Cullantrillo de pozor*. Theophrastus scribit esse γένη ἀνθού ἀδινάνθου διὰ τὸ μὲν λακόν, τὸ δὲ μέλαν. χηρσμοι δὲ ἀμφότερα πρὸς ἑκφυσιν κεφαλῆς ῥιζῶν, ἐν ἐλαφί τειχόμενα. φύεα δὲ μάλιστα πρὸς αἰὲν ὑδρην. Id est, Gaza interprete. Genera adianti duo, candidum, atque nigrum. Ambo ad defluum capillum vtilia, oleo trita. Nascuntur maximè locis humidis. Quæ Plinius conuere voluisse, sed Theophrasti sensum assecutus non fuisse videtur. Duo, inquit, eius (adianti) genera candidius, & nigrum, breuiusque. Id quod maius est polytrichon: aliud trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, foliis filicis, ex quibus inferiora aspera ac fusca sunt, omnia autem contrariis pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla. Umbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maximè specus sequitur, & saxa manantia, quod miremur, cum aquas non sentiat. Quibus verbis perspicue declarat Plinius se trichomanes alterum facere adianti genus, scilicet candidum. At Theophrastus cum de utroque Adianti genere dixisset, eo quem modò citauimus loco, subiicit de trichomane, diuersa planta quæ sequuntur. ὡς δ' ὁιονταί τινες, καὶ πρὸς τρεγγυρεῖαν τὸ τευχόμενα ποιεῖ. ἔχει δὲ τὸν καυλὸν ὁμοίον ἀδινάνθῳ τῷ μέλανι, φύλλα δὲ μικρὰ σφόδρα, καὶ πυκνά, καὶ πεφυκότα κατανικρῶ ἀλλήλων. ρίζα δὲ ἔκ ὑπέστη. χωρεῖα δὲ φιλεῖ σκιερὰ. Id est, Trichomanes urinæ stillicidiis confert, caulem similem habet adianto nigro: folia parua admodum & densa, & ex aduerso opposita, radix nulla subest. Opacis locis gaudet. Hic Theophrasto trichomanes Adianti genus non est, sed sui generis planta, præterea cum dicit cauliculos habere adianto nigro similes, aperte demonstrat trichomanes Adiantum candidum non esse. Maerthiolus credidit aliquando, Adiantum candidum eam esse plantam, quæ vulgò felidia vita, & ruta muraria vocatur, quæ cum trichomane in petris, parietum ac fontium asperginibus nascitur. Deinde mutata sententia eam paronychiam Dioscori fecit, de qua re paulò post dicemus. Alij, quorum potior sententia, Adiantum nigrum & album Theophrasti siue Plinij, putant esse duas hæc Adianti differentias, quibus omnes Belgij, Germaniæ, Burgundiæ, Franciæ & Sabaudia Officiinæ, non solum hoc tempore, sed omni ferè hominum memoria semper nigri & albi Adianti nomine vsi sunt. Iis radix pusilla, capillamentis densis compacta, nigris, rectis: cauliculi iuncea, paulò crassiores & prolixiores quàm trichomani, ex herbido pallentes, aut albicantes: foliola vtriusque & altrinsecus plumatim disita, filicis maris diuisura, & situ, sed multò minora, altera facie virentia, altera in glauco punctulis rubescentibus notata, series geminas habent, sesquipalmum, aut paulò magis alta, quæ nihil planè differunt, nisi quod nigro adianto cauliculi nigricant politiore nitore, foliaque sunt saturatiore virore, albo minùs. Vires prorsus eadem, à doctis quam plurimis multis annis exploratæ ad quotidianas & consuetas poriones, magno commodo, nullo detrimento, ut eos errare hinc perspicuum sit, qui filicis maris species, aut dryopteris esse autumant, cum nihil calidi, aut acris, nedum septicici hæc temperatæ & innoxia capillares habeant. Sed ut

Adiantum

καλλιτρίχον ὁ γένος  
pulchricomum ἵππε  
fauet pulchricomum cap.  
fauet καλλιτρίχον  
Lib. 22. c. 21

Adiantum nigrum ὁ γένος  
χρὺς ἢ ὁ capillus, πρὸς  
καλλιτρίχον

Lib. 7. hist.  
cap. 13.

Genera.

Lib. 22. c. 21

In cap. 13.  
lib. 4.

Pet. Pe. in  
Ad.

Adianti  
alb. & nig.  
Forma.



Adian.  
Verum.

Forma.

ad verum Dioscoridis Adiantum redeat oratio, id, eodem auctore, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa, cauliculi quibus exoriuntur, nigro colore nirent, prætenues, palmum alti: radice superuacua, neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Umbrosis & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur. Ex qua descriptione liquet, neque saluam vitam, neque Adiantum nigrum, aut album. Officinatum, verum esse Dioscoridis Adiantum, sed id quod hic pinximus. Fibris prætenuibus, capillaribus, nigris nititur, compactis, vnde prodeunt numerosi cauliculi, iuncea, valde tenues, veluti cincinnati, palmum aut sesquipalmum alti, sericeo colore & nigro nitentes. Folia anisi vel coriandri diuisura, latiuscula, alterno situ tenuissimis pediculis appensa, tenella, vtrinque lateribus rectis clausa, trianguli specie, sed superiore ambitu laciniato & circinato. Hoc est verum Dioscoridis Adiantum, nullibi quàm Narbonensi regioni frequentius: saxis riguis, umbrosis, petrosisque locis in cemenis illic montibus finitimis, ac rupium, fontium & puteorum labris vel asperginibus Monspelij, Nemausi, raro alibi in Gallia, Germania, Belgio, Anglia, aut nusquam prouenit, quin ne Italiae quidem multis locis. Quare ex supradictis locis Lugdunum, Lutetiam, Antuerpiam, & in alia celebriora emporia asportatur, caroque à seplasiariis emitur ad Syrupi capilli veneris dicti apparatus. Eundem syrupum Gallia ditiores & aulici quotannis Monspelij sibi conficiendum curant, indeque adferendum,

Locus.

Vires.

Lib. 4. c. 71.

Lib. 22. c. 21

Lib. 6. sim.


quo recentiore ac præsentiore vtantur. Mirum enim quantum thoracis affectus, hepatis, renumque iuuat, quas vires cum pluribus aliis insignibus, Dioscorides assignat his verbis. Decoctum herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili; calculos frangit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est, contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua, sanguinis reiectiones inhihet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures & manantia capitis vlcerum ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet cum ladano & myrino, & susino aut hyssopo (sic enim vulgata habent exemplaria, καὶ σσίνω ἢ καὶ ὑσσώπω, vt & Ruellius conuertit, sed in vetere rectius legitur, σσίνω ἢ καὶ ὑσσώπω, quod est, susino, aut celypo) vinoque. Decoctum eius cum lixiuio & vino infusum idem præstat. Coturnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia vtilitatis pecorum circa ouilia. Eadem ferè de Adiantis suis scripsit Plinius. Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtique nigrum. Qua de causa potius quàm quod in saxis nasceretur, à nostris saxifragum appellatum crediderim. Bibitur è vino quantum terni decerpere digiti. Vrinam ciet. Serpentium & araneorum venenis resistunt. In vino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex his sedat. Contra scolopendræ morsus illinuntur, crebro auferendi, ne pereant: hoc & in alopeciis. Strumas discutiunt, furfuresque in facie, & capitis manantia vlcerum. Decoctum ex his prodest suspiriosis & iocinori, & lieni, & felle suffusis, & hydropicis. Stranguriæ illinuntur, & renibus cum absinthio. Secundas ciet & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut rubi succo poti. Infantes quoque exulcerati perunguntur ex iis cum rosaceo & vino prius. Folium in vrina pueri impubis, tritum quidem cum aphronitro, & illitum ventri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse vtilissimos. Sed breuius & distinctius de his Galenus. Adiantum in caliditate symmetrum est. Verum desiccatur & extenuatur, & digeritur. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum, & viscosorum crassorumque è pectore pulmonumque excreationibus non mediocriter confert, & ventris profluuium sistit: non tamen vllam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispian



quæpiam secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medio. Mesues etiam adianti temperiem & vires insignes recenset, inter quas & vim purgatoriam ei tribuit, Græci verò & Plinius nullam. Illius hæc sunt verba. Capillus veneris temperatus est, aut temperato proximus. Constat substantia aquea & terrea, sed tenui modicè, eaque styptica, altera verò superficialia, calida tenui admodum, ob quam virtus eius facillè resolvitur: quia virtus imbecilla à subiecto imbecillo promptè dissipatur. Hæc autem tenuant, obstructa aperiunt, digerunt, ventrem solvunt, præsertim recentes: sicci enim constringendo fluxum sistunt, bilem verò flavam & pituitam ventris toto & hepate, humoresque crassos quamvis imbibitos etiam ex thorace & pulmone creatu educunt, respirationem ob id liberam efficiunt, sanguinem clarum reddunt, & inde colorem commendant, & partium prædictarum dolorem leniunt, obstructions hepatis ac lienis tollunt. Ob id ictero & morbis omnibus obstructionem sequentibus infusi, præsertim in aqua apij & intybi, aut decocto cicerum nigrorum, aut semiquatuor, aut sero lactis. Cum oleo autem chamæmelino strumas delent. Syrupus ex his pleuritidi, peripneumoniæ prodest. Urinam movet: decoctum eorum calculum frangit: purgat utrumque à partu. Parte verò styptica fluxiones colibet, sanguinem sistit, ventriculum & ventrem roborat, ne excrementa promptè recipiant, roborat etiam capillorum radices, ob id eorum defluuium sistit: quinetiam partem pilis replet, præsertim cum oleo myrtino, aut oleo ladani, & vino styptico. Idem præstat pulvis eorum vstorum: cinis ipsorum vel decoctum ex vino fursures lotionem abigit, fistulas lacrymantes sanat. Imbecillitatem eorum in purgando corrigunt violæ, cassia fistula, manna, serum lactis, partem sustinent decoctionem. Meliores benè habiti, foliis virentibus: strigosi enim & foliis flavescentibus inutiles. Datur decocti ad aluum subducendam libra vna.

Lib. simp.  
purg.

TRICHOMANES, CAP. II.



**T**RICHOMANES Græcè, Latine etiam trichomanes dicitur, & capillaris, à Gaza filicula, Officinis Polytrichum, quod nomen est adianti herbæ Dioscoridis, & veterum aliorum testimonio, Gallicè Polytric, Germanicè Wilderrot, & Abham. Trichomanes autem Græci à vi sua vocauerunt, quòd rara cute fluentem capillū explet, & subnasci facit. *παιδον* enim illi rarum vocant, & *τεχνα* capillum. Hoc etiam nomine capillarem Latini dixerunt. Nascitur, inquit Dioscorides, iisdem in locis quibus adiantum, filici simile, sed exilius: foliis lenticula, tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus.

Nomina

ab officina  
vntibus capillis  
explet.

Lib. 4. c. 132

Locus.

Forma.

Quæ descriptio apertè demonstrat herbam hodiè Officinis vbique omnibus polytrichi nomine non minùs vsitatam quàm cognitam, verum esse Dioscoridis & veterum trichomanes, radice parua, fibris nigricantibus comante, à qua penè statim foliati cauliculi iuncea prodeunt, nigri, nitidi, rigidiusculi, gemina utrinque foliorum serie, quæ rotunda sunt, & lenticula figura, ex atro aduersa parte virentia, aversa maculis ferrugineis notata, rutæ murariæ ritu, sine flore, sine semine. Palustribus & vmbrosis locis vberimum, humentibus muris & saxis, & fontium specubus

Locus.

specubus



*POLYTRICHUM Aureum*  
maius & minus.

Polytr. Au.  
reū. Fuch.  
cap. 240.  
Dodo. lib.  
3. cap. 71.

**Nomina**

**Genera.**

**Forma.**



**Locus.** in summo capitula lentis aquaticæ ferè forma, eiusdem cum cauliculis coloris. Minus superiori prorsus simile, nisi quod omnibus partibus est minoribus. Maius nascitur in pratis humidis, & vliginosis, minus in petris ac muris humidis. Mense Iulio vtrumque reperitur. In caliditate & frigiditate symmetra sunt: desiccant tamen, extenuant & digerunt. Decoctum vtriusque in aqua aut lixiuio, capillorum radices firmat, ideoque in alopecia caput glabrum capillis vestit, potum viscosorum crassorumque è thorace pulmoneque excreationibus non mediocriter confert, lapides frangit & vrinas ducit, morbo regio correptis, & lienosis auxiliatur: strumas discutit, denique eadem quæ adiantum præstat. Recentiores vana superstitione ducti multa & incredibilia illis tribuunt. His ob magnam cum capillaribus

*ROS SOLIS, Dodon.*

Dodo. lib.  
3. cap. 71.  
Pet. Pen.  
in Ad.  
**Nomina**



affinitatem adiungenda herbula, admirandis viribus, multis plantis apud antiquos celeberrimis proculdubio præferenda, quibus fortassè ignota fuit. Ros solis & Rorella herbariis dicitur, Germanis *Sondau*, Gallis *Roufee de soleil*, à mirabili natura nomen adepta, quantumvis diu sol feruidus æstate eam illustret, eius tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumque lanugo guttulis aspersa manet. Et quantò sol feruidior, tantò magis humiditatem eius augere & fouere videtur, tantum abest vt exhaustiat. Radice est fibrata, foliis rubescentibus, in rotunditate oblongis, hirsutis, cauis, pusilli cochlearis, aut auriscalpij instar, inter quæ proueniunt cauliculi, ternos, quaternosve digitos longi, rubescentes, in summitate inflexi, candidos flosculos gerentes. Sabulosus & vdis scrobibus gaudet, aliquando umbrosis siluis. Totius gustus acris est, subadstringens, nonnihil acidus, & acerbus, admodum resiccās. Herbulæ hæc corpus tabescens roborat, ad saluam pituitæ decubitus in pulmones efficacissima. Quare eorum vlcera sanat. Aqua ex foliis & flosculis destillata, quæ fulua aurea; est, propinatur phthisicis, asthmaticis, tussiculosis, aut quouis alio pulmonū vitio laborantibus.

RUTA



RUTA MVRARIA, Paronychia, CAP. III.

**A** MEDICIS & pharmacopœis exercitatoribus in capillarium numero, & iure quidem habetur, quæ vulgò Salvia vita dicitur, peritioribus muralis siue muraria Ruta, ob quandam foliorum similitudinē, & quod albicet pallido colore Rutaceo, Gallicè *Rue de mur*, & *Sauue* vie Germanicè *Maurauten*, & *Steinrauten*, Belgicè *Stenrruyte*, id est, petraea Ruta.

**SALVIA VITA.**



suppetit. Gustum consulentibus eodem quo ceteræ capillares temperamento esse videbitur, qua re moti periti viri in veri adianti inopia, ad pectoris & pulmonum

**PARONYCHIA** Altera, Matthioli,



Quibus enim locis verus capillus veneris, aut ceteræ capillares defunt, aut aliunde asportata, victæ redditæ sunt, Salvia vita vtuntur, certissimo felicissimoq; euentu. Sunt qui ab effectu inter saxifragas recenseant, & ob natales empetron vocent. Radice est nigra, tenera capillata, superuacua: cauliculis siue iuncis tenuibus, non ita dissimilibus adianti, nisi quod atro colore non nitent, tenuibus & breuib; pediculis foliola hærent, quadantenus ruta hortensis similia, minora tamen & parùm crenata, aduersâ partē læuia, auersâ punctis quibusdam notata. Hæc etiam folia adianti nō parùm referunt, sed minora huic, crassiora, & incisuris pluribus atque altioribus: sine caule, sine flore sine semine, vti ceteræ capillares. Vetusitis parietibus, humentibus, & inter ceterach, polytrichum, ceterasq; capillares, locis saxeis lubens prouenit: nec solum Vere & æstate, sed etiam autumnō & hyeme eius copia

*Nomina*

*Forma.*

*Locus.*

*Temper.*

Matthioli  
Cap. 49.  
lib. 4.

Ibid.  
Paronych.

Lib. 4. c. 49

Ibid.  
*Forma.*

vitia, ad hydropes, atque alia ad quæ adiantum valet, vsum eius feliciter accommodarunt. Præterea vrinam ciet, arenulas & calculos renum pellit, quapropter in saxifragorum generibus habetur. Peculiariter autē valere hanc comperitum est ad puerorum enterocelas. Assueuat enim Matthiolus nonnullos esse sanatos, hausto tantum huiusce plantæ puluere, continuis quadraginta diebus, quibus collapsa in scrotum intestina apertè cernebantur. Eandem plantam qua de hîc agitur, idem Matthiolus paronychiam Dioscoridis esse credit, à quo multi dissentiant. Paronychia, inquit Dioscorides, exiguus frutex, in petris nascens, peplus similis, minor longitudine, maioribus foliis. Sic, inquit Matthiolus, planta ista in saxis gignitur, atque etiam in veterum ædificiorum parietibus, foliis Rutæ adeò similibus, vt Ruta muralis inde nūcupetur: peplus autem, cui Paronychiæ folia comparat Dioscorides, eodem teste, foliis Rutæ paulo altioribus prouenit. Aliam plātam exhibet hîc quoque pictam, quam quidam legitimā Dioscorides Paronychiā faciunt, quorum sententiam



Forma.

*PARONYCHIA Alfine-  
folia, Lobellij.*Paronych.  
Lonic.To.  
2.cap.74.

Nomina

Forma.



Vires.

nuntur, succulenta, pallida, subrubra: flores albi: semina parua in folliculis Scorpioi-  
dis myosotidis non disparibus. Vtraq; exeunte hyeme, Verè primo flosculos edunt:  
deinde minimo æstu marcescunt, vt nusquã toto anno cõpareant. Hæc Pena. Paro-

*PARONYCHIA Altera, rutaceo  
folio, Lobellij.**MEDICA SYLVESTRIS  
Altera, Luneta.*

Lib. 8. sim.



nychia, inquit  
Dioscorides, il-  
lita Paronychiis  
atq; fauis reme-  
dio est. Similiter  
Galen⁹ Parony-  
chia, inquit, ab  
effectu nomi-  
nata est, sanat  
enim Parony-  
chias, & vt re-  
fert Dioscor. fa-  
uos quoque. Vis  
eius est tenuium

partium, & exsiccatoria morfu vacans: talia enim  
sint oportet, quæ Paronychias sanant. Porrò satis  
constat tale esse idoneum ad digerendos affectus  
omnes qui digeri postulant: talia enim sunt  
quæ cum ex tertio sint ordine excalfacientium  
& desiccantium, velut & hoc, essentia insuper  
subtilis sint.



ASPLE







- plenum vel scolopendrium pro hemionitide vsurpauerit, cum præsertim hæc vi lienem absumendi prædita sit, vt paulò post dicetur. Ceterach quibus locis nascatur diximus. Præstantissimum in Creta, & ibi repertum Vitruuius affirmat, circa Potereum amnem, qui duas vrbes Gnoson & Cortynam interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat pecoribus sine liene inuentis, quia herbam eam roderent. Ex altera parte quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi herba illa non appareat.
- Vires.* Tota hyeme viret. Vim habent folia, auctore Dioscoride, in aceto feruefacta, vt per dies quadraginta pota lienem absument: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguria & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu silente luna, huius rei gratia effodiendam. Eadè sic breuiter Plinius, tradit. Huius foliorum iure in aceto decoctorum per dies quadraginta pota, lienem absumi aiunt. Et, illinuntur autem, eadem sedante singultus (sic in vulgatis legitur, emendatiùs in veteribus. Et illinuntur eadem, sedant & singultus). Nò danda fœminis, quoniam sterilitatem facit. Theophrastus. τῆς δὲ ἡμίωνος τὸ φύλλον τῶν γυναικῶν εἰς τὸ ἀγονεῖν (ποῦν φασὶ τῆς ὀπλῆς τῆς ἡμίωνος, καὶ τῆς δὲ ἡμίωνος) (alij σπέρματος legunt) χαίρειν ὃ σφόδρα καὶ τὴν ἡμίωνον ἀνδρῶν. καὶ τῆς δὲ καὶ πρὸς τῆς ἀσθῆνης, ὥσπερ τὰς κλυμένω. Id est, Hemionij folium mulieribus sterilitatem adferre aiunt. Miscendum autem esse aliquid vngulæ muli, & pellis eius, siue seminis. Mulas hac herba plurimū delectari. Vfus eius ad lienes, vt clymeni. Hic Theophrastus an ad conceptionem impediendam folium hemionij alligari, an potari velit cum vngula, aut pelle, aut semine muli, non distinxit. Et quod eius rei gratia tradit Diosco. silente luna effodere oportere, Serapio aliter expressit, nempe oportere ipsum suspendi die aliquo in cuius nocte luna non apparuit. Galenus breuibus aspleni vires perstrinxit, his verbis. Asplenum tenuium est partium non tamè calida est herba. Hac itaque ratione & lapides frangit, & lienes liquat. Aureus pulvis, inquit Matthiolus, qui in Aspleni auersa foliorum parte inuenitur, drachmæ pondere cum albi succini pulueris semi drachma ex succo portulacæ aut plantaginis potus gonorrhœa laborantes mirificè iuuat. Herba totius decoctum datur vtiliter potandū ad omnes melancholicos affectus, præsertim ad eos qui ex Hispanica lue prouenerint. Alterum asplenum siue scolopendrium exhibet Tragus, & siluestre appellat, quod in vmbrosis & humidioribus siluis nascitur, radice nigra, villosa, compacta, ac cespitis instar contexta, è qua supra sexaginta aliquando folia, primo exortu linguæ ceruinæ modo recurua, postea cū se explicarint, non tam lata quàm illius, sed adstrictiora, vtrinque profundis, mediàmque venam, quæ punicea est coloris, & vicem caulis tenet, attingentibus incisuris diuisa, nequaquam in altum erecta, sed humi procumbentia, vermèmq; per omnia longum imitantia, exeunt. Iunio mense appetente alia multa longè angustiora prioribus foliis subnascuntur, polypodij instar incisa, in altum se attollentia, longissimis gallinaceorum pennis simillima, altera parte exiguis & luteis punctulis notata, sicut & polypodij. Autumno accedente hæc, quæ iam diximus, folia, protinus

## ASPLENVM, Siluestre.

Aspl. siluestre.  
Lib. 1. c. 88.  
Locus.  
Forma





protinus pereunt, reliqua verò quæ subinde noua erumpunt, humi per totam hyemem illa procumbunt. Elegantissima sanè planta, sed quæ non passim occurrit. Vbi tamen inuenitur, ibi magna copia prouenire solet. Dodonæus, vt paulò post indicabimus, Lonchitin asperam esse iudicauit.

HEMIONITIS,

CAP. V.

**H**EMIONITIS & σπλην Græcis, Latinis similiter Hemionitis, *Nomina* quasi mulariam dicas, & Splenium dicitur, ac rectè, vt quidam volunt, quòd eius folium, sicut & Phyllitidis, medicorum Splenia, nimirum oblongas plagulas figura imitetur, folium, inquit Dioscorides, dracunculi emittit, lunatum: radicibus multis cohæret, tenuibus: numquam flores, neque semen, neque caulem gignit, in petrosis nascitur, austero sapore. *Lib. 3. c. 135. Forma. Locu.*

HEMIONITIS, *Math.*



Quam descriptionem Leoniceus, Manardus, Ruellius, & eos secutus Fuchsius, ad eam accommodarunt, quæ vulgò lingua ceruina, de qua proximè dicemus, falsò scolopendria dicitur. Verà enim scolopendriam, siue scolopendrium asplenium esse diximus. Aiunt enim illi folia esse dracunculi, seu ari, instar lunæ corniculantis falcata: etsi enim interdum in altum surgunt, tamen inter initia potissimum incurua, & lunæ crescentis modo falcata sunt: radicibus etiam cohæret multis, exilibus, nunquam florens, neque semen, neque caulem proferens. At recentiores quidam, in quibus sunt Matthiolum, Dodonæus, Anguillara, aliam Hemionitim, eamque veram sese reperisse asserunt, à Dioscoridis historia nihil prorsus dissidètem, quæ Romæ nascitur in quibusdam rudibus, adificiorumque ruinis propè magnum amphitheatrum, vnde herbarij eam in suos hortos transtulerunt. Pena tamen atque alij recentiores etiam dubitant adhuc, num ea quæ ex Matthiolo hîc pingitur Hemionitis, sit specie diuersa à lingua ceruina *Fuch. c. 11. In cap. 135. lib. 3. Lib. 3. c. 65. Pena in Adu.*

vulgò dicta, quod ei perquam affinis & germana videatur: quique in quibusdam Italiæ hortis eandem hanc, sed aliquantum loco lætorem, diuersam cum iudicent, frustra Romæ in rudibus collapsorum adificiorum vnà cum multis etiam quæsiisse: tamen Anguillaræ sedulo herbario nihil refragari, qui monuerat plâtam indidem se habuisse, sed adeò obscuris notis distantem, vt perparum aut nihil prorsus differre videretur à vulgari lingua ceruina. Nec enim minùs fibrosam radicem nigricantibus villis, summo cespite hærentibus huic inesse, folia autem auersis exarata decliuibus lineolis, seu obliquis liris, vt in lingua ceruina, basim tamen latiorrem habere, & circum pediculum falcatam arcuatamve volubilis modo. Hæc Anguillara. Idem Pena in Anglia occidua ad rupes antrosasque cautes. D. Vincentij vno aut altero miliari ab vrbe Bristoia, vberimè luxuriantem quandam facie lingue ceruinæ plantam inuenisse se scribit, cui terna quaternave sunt folia, minora multò, vix enim maxima tres digitos longitudine excedunt, minimè crassa aut rigida, sed mollicella, inter quem & alias plantas capillares, alioqui lætas & benè adultas ita exilis nascitur, nec vllis à tergo lituris asperata, ad mucronem lateribus



*HEMIONITIS,  
Minor Penæ.**Locus.**Vires.*Lib. 3. c. 135.  
Lib. 6. sim.Ruell. lib. 3.  
cap. 68.  
Lib. 25. c. 5.

utrinque ad medium sinuatis & reductis, basi latiore sinuata, segmento quasi utrinque interius recuruo, gustu à lingua ceruina non diuerso. Cladius Hemionitidem peregrinam ostendit, peregrina elegantiâ, quæ natuæ luxu foliis duplicatis ad basim latioribus falcatas apophyses utrinque, lateribus mucronatas exerit. Modus, ortus & parilitas superioris Hemionitidis hic picta in umbrosis, vdis, saxosis & gelidis crescit. Ex aceto pota, auctore Dioscoride, lienem absumit. Galeno verò Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem habet, quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est. Nec rectè quibusdam Hemionitis videtur esse quam Plinius Teucrion, quod eam Teucer inuenerit, quidam Hemionium vocant, spargentem iuncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore: numquam floret, neque semen gignit. Medetur lienibus, &c. Eadem, inquiunt, Hemionitidi ferè à Dioscoride tributa sunt. Nam quod Plinius iuncos tenues spargentem describit, Dioscorides multiplici & exili radice demonstrat, quod ille foliis curuis, is foliis dracunculi lunæ modo incuruis delineauit, id est, *μυνοειδὴς*. At si integri sunt hoc loco Plinij codices, teucrium cum Hemionio siue Hemionitide perperam confudit: sunt enim prorsus diuersæ plantæ, vt in teucrio demonstrabitur. Ex vetustis exemplaribus quidam legunt, Inuenit & Teucer eadem ætate Teucrion, & quam quidam Hemionion vocant, &c. Læctione facili & perquam comoda. Alij non Hemionium illic, sed Hermion ex veteribus & emendationibus libris legendum esse affirmant. Ex quorundam herbariorum sententiâ aliam Hemionitidem hic pingendam curauimus, quæ in Ilua provenit, radicibus multis capillacea tenuitate, breuibus, subnigris: cauliculis pedalem altitudinem vix attingentibus, in folia septem ferè aut nouem diuisis: quorum quaterna vel sena utrinque caulem pari ordine vestiunt, terna verò in summo caule extantia inferiorum foliorum versum claudunt. Sunt autem ea omnia longa, angusta, in ambitu nonnihil crenata, obliquis incisuris vtraque parte distincta, quas per medium folium procedens & eminens costa separat.

*HEMIONITIS Altera,  
Dalechampi.**Vires.*

Vis ei eadem quæ alteri hemionitidi: flos nullus, nullum semen, atque adeò ne auersam quidem foliorum partem subflauus puluisculus contegit, qui in alijs id genus plantis cernitur.

## PHYLLITIS,

## CAP. VI.

*Nomina*


Lib. 3. c. 104.

*Forma.*

VAE GRÆCè *φυλλίτις* quasi foliosam dicas, vt quæ caulis, floris, seminis expers, nihil nisi folia aut foliosus cespes appareat, Latine quoque Phyllitis nominatur. Officinis Lingua ceruina, perperam scolopendria, vt proximè diximus, Gallicè *Langue de cerf*, Germanicè *Hwſz-vng.* Phyllitidem describit Dioscorides foliis esse rumici similibus, longioribus, & viridioribus,



PHYLLITIS.



PHYLLITIS, Laciniata,  
Clusij.



brata prodeuntia, eiusdem læuoris & vioris interna parte, at externa nullis aut rarissimis transuersis lineis norata, & extrema parte multipliciter dissecta. Hanc in Cantabria non procul à monte D. Adriani nuncupato, qua per eius specum & fornicem transitus est in Hispaniam, locis vmbrosis in rupibus se obseruasse ait, raram tamen inter plerasque alias vulgares, Folia Phyllitidis, inquit Dioscorides, in vino

dioribus, senis aut septenis, rectis, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem penfiles quasi vermiculos ostendunt. In vmbrosis & opacis hortorū locis emicat, gustu acerbo, neque caulem, neque florem, neque semen profert. Quas notas omnes, qui propius inspexerit, minimè ambiget Phyllitida eam esse quæ lingua ceruina & scolopèdria vulgò nuncupatur. Primum vmbrosis, opacis, humentibusque locis

Locus.

Matth in  
Cap. 104.  
lib. 3.

procijs, fontium & puteorum parietibus, vterum aliorum parietum & siluarum vdis, deinde foliis est vulgaris lapathi, maioribus, longioribus, viridioribus, rectis, senis, septenis, aliquando pluribus, è radice multis capillamentis fibrata, nigricante, adiantū simili, anteriore parte læuibis & virentibus, à tergo multas transversas lineolas seu liras extantes, subrubentes habentibus, ab ima & latiore parte secus mediū neruum digestas, ad summum vsque quā in mucronem desinūt, lapathi vulgaris aut linguae similem, vnde ei linguae ceruinæ nomen Officinæ indiderunt, quæ lineolæ, vt Dioscorides ait, penfiles vermiculos referunt. Adhæc gustu est acerbo, subastringente, exsiccante, non ingrato. Denique caule, flore, semine caret. Quod si eiusmodi plantæ quædam reperiantur, quæ multò plura senis septenisve folia emittant, ne id quidem Dioscoridi repugnat. Nam ab yna radice non multò plura quàm Dioscorides ait, folia eriguntur, sed à multis coniunctis, quas si separe non plura senis septenisve prodire conspicias. Quare à Leoniceni, Manardi, Ruellij, Fuchsj sententia, qui Phyllitida linguam ceruinā non esse, sed hemionitida cōtendunt, plerique omnes docti herbarij dissentiūt. Hemionitis enim etsi caule, flore, semine careat: folia tamen lapathi minimè habet, sed dracunculi, curua, & lunæ crescentis ritu falcata. Deinde alia reperta est Hemionitis, legitimā ac veram notis omnibus referens, vt superiore capite declarauimus. Non omittenda hic est propter elegantiam Phyllitis Clusij, quæ sola foliorum forma à vulgari differt, alioqui per omnia similis: sunt verò ea palmari longitudine, sena aut septena, ex radice multis nigris capillamentis fi-

Lib. 3, c. 104  
Vires.



lib. 3. 6m. & si dysenteria aut resoluta alius excercet, potui datur. Eadem breuiter sic Galenus. Phyllitis cū qualitatē sit acerbæ, non absurdè diarrhœas & dysenterias potui iuuat. Phyllitida vulgus vsurpauit ad lienis affectus, quibus prodesse experimento constat. Nec desunt qui eiusdem stillatitia aqua vtantur ad cordis affectus, & contra singultum. Eandem gargarisandam quoque præbent ad prolapsam columellam. Refrigerat iocinoris & ventriculi ardore siccorum foliorum farina eadem aqua excepta & illita. Eadem quoque aqua os colluendum præcipiunt ad palati desquamations, & cruentas gingiuas.

Matthiol.  
in cap. 104  
lib. 3.

Λόγχη Lancea Λόγχιτις, quæ fort. Λόγχη, seu Λόγχιτις, hinc in eam dicitur Λόγχιτις, quoniam  
ἐν πύριχαρπίδις σπέρμα ἔχει LONCHITIS, CAP. VII.

Nomina

Genera.

Lonchitis  
asper.

Incap. 145  
lib. 3.

Forma.



ONCHITIS Latine dicitur vt Græcè Λόγχιτις à seminis triangula figura cuspidi lanceola'ue mucroni simili, id nomen sortita. Dioscoridi duplex est. De priore, in libro de Plantis quæ in asperis, & c. tractabimus. Altera verò Lonchitis τραχὺς, id est, aspera dicta, quam Dioscorides tradit foliis esse scolopendrij, sed asperioribus, maioribusque, ac multò magis diuisis, ex Matthiolo hic proponitur, quòd folio sit scolopendrij proximo, longiore tamen & magis diuiso, & ad polypodij formam potius accedente, spithamæ longitudine, vtrinque disparibus incisuris dissecto, re-

LONCHITIS Aspera

maior, Matthioli.



LONCHITIS Aspera

minor, Matthioli.



Locus.

Genera.


Ibid

nuibus aculeatisque denticulis ferrato, & vbiq; aspero, vnde illi nomen. Caulem nullum profert, neque flores, neque semen, polypodij & aspleni ritu, quorum imaginem refert. Radice nititur multiplici, tenui, subrubente sicuti Phyllitis. In Italia locis quibusdam nascitur humectis & vlginis. Duo eius genera depinxit Matthiolus. Vnum maius, quòd à Luca Ghino, minus quòd à Iacob.



PSEVDOLONCHITIS Aspera,  
Matth. Lonchitis aspera, Marantha.

LONCHITIS Aspera,  
Dodonæi.



LONCHITIS Aspera Illuensis.



Iacob. Anto. Cortuso nactus est. Præterea Pseudolonchitin asperam, quæ est Lonchitis aspera Maranthæ. Cauliculus est spithameis, nitidis, fuscis, rigidis, foliis Adianti Pliniani, sed gemino situ, filicis femina: ritu, crassioribus multò, altera parte virentibus, altera Aspleni modo rubiginis. Radix pusilla, capillamentis crebris fibrata. Aliam Lonchitin asperam exhibet Dodon. & à quibusdam Longinam & Calabrinam nominari ait, ab aliis recentioribus Asplenium magnum & silvestre, Germanicè *Spicaut*, & *Milckkraut*, filicibus similem, memoratam supra ex Trago, & luculentè descriptam, cap. De Aspleno. Lonchitis aspera alia in Illua crescit, radice numerosa, foliis multis, dimidio pede longioribus, è rufo subnigris, in alia foliola diuisis, nostrati Aspleno similia, supernè viridia, infernè rufa & puluerulèta lanugine obducta, saporis austeri, qualis in aspleno deprehèditur: quapropter ea iuuari lienosos quidam affirmant. Lõchitidis primæ radix, auctore Diosc. ex vino pota urinã ciet. Lõchitis aspera

*Calabrinæ fructus in  
aspleno calabro fructus*

Lõchi. alp.  
Dod. lib. 3.  
cap. 66.

**Nomina**  
**Forma.**

**Locus.**  
Lõchi. Illuë.  
**Forma.**

**Vires.**  
Lib. 3. cap. 145.

Li. 7. simpl.

vulneribus mirū in modū prodest, in eisq; inflamationes excitari nō paritur. Pota ex aceto lienē absūmit. De vtraq; etiā sic scribit Gale. Lõchitidis eius videlicet quæ semē habet triāgulare, figura lanceæ simile, radix potissimū quodāmodo similis est radici dauci: proinde urinã ciet. Porrò eius q̄ scolopèdrij similia habet folia, ea ad glutināda vulnera vtilia sunt viridia: sed sicca cū aceto pota lienes induratos sanāt.







quidam legunt, subgravi odore, hanc marem existimant. Alterum genus Theophrasin Græci vocant, alij Nymphæam Pterin. Est autem non singularis atque fruticosa (deprauata hîc sunt exemplaria, in quibus legitur, Est autem singularis, atque non fruticosa) breuior, molliorque & densior, foliis ad radicem canaliculata. Vtriusque radice sues pinguescunt. Folia vtriusque lateribus pinnata. Vnde nomen Græci imposuere. Radices vtrique longæ in obliquum, nigrae. Dioscoridi fœminæ radix è nigro flauescit, & interdum rubra est) præcipue cum inaruer. Siccari autem eas sole oportet. Nascuntur vbiq; sed maxime frigidis solo. Hæ descriptiones Filices nostras adamusim delineant, atque euidenter distinguunt. Mas enim statim ab radice multis compacta appendicibus, crebros emittit & prolixos bicubitales, vel proceriores non caules, sed pediculos, pennatim foliosos. Fœmina verò sæpius vnum, interdum aliquot promit caules, ferè à medio in multos diuisum, pennatim etiam foliosos ramos, & radice est minore: quod discrimen Theophrastus expresse his verbis. Διαφέρει δὲ τῆς πτερίδος ἡ νύμφης, τὴν μὲν φύλλον ἔχει μονόκωλον (fortasse μονόμοχον, vt in Dioscoride legitur) ῥίζαν δὲ μεγάλην, καὶ μακράν, καὶ μέλειον. Id est, Differt fœmina Filix à mascula, quod folium hæc habeat ex vno membro siue pediculo, & radicem magnam, & longam, & nigram. Sed de semine Filicis ambigitur. Quamuis enim Theophrastus, Dioscor. Galenus, Plinius eam ἀγερπὸν esse affirmauerint, id est, sterilem & sine semine: quinetiam medici Arabes & Persæ ad magicas vanitates nati, huius seminis non meminerint, tamen non solum Agyrtæ vulgi ignoratiæ ad questum impudenter illudentes, sed etiam neoterici quidam, qui se naturalium rerum indagatores profitentur, Filicem semen ferè assueuerant, auersis foliis inhaerens, sed adeo minutum, vt visum ferè fallat: legiq; abscisis propè radicem foliis, & in domo suspensis, substrato linteolo, aut papyro, circa finem Iunij: hoc enim ferè tempore maturefcere. Alij vna solstitiali nocte florere, eademq; hora cum defloruit, maturum semen in terram cadere: ideoq; nisi quispiam tunc affuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse. Agyrtæ cuncta illa fieri & obseruari natali nocte D. Ioannis Baptiste nugantur. Quæ commentitia sunt & superstitiosa. Verumtamen rudimentum quoddam seminis edunt puluerulentæ foliorum Filicis simbræ & rugosæ: ac istas atomos admodum exiles tenuissimis veluti araneorum filis de summo earum ramo pendentes, passim Filicis fœminæ semen esse dicunt, & plebi persuadere conantur. Filicem locis asperis nimis frequentem, & humentibus locis, atque in agrorum marginibus videmus. Fœminam in siluis & montibus. Aprilis mense folia erumpunt, Septembri marcescunt. Filicis radix, auctore Dioscor. latus lubricos excutit sumpta drachmis quatuor ex aqua mulla: melius si cum scammonia, aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia præsumpsisse debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & pota & illita cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis est auxilio: cuius rei probatio talis est. Peribit Filix quam per ambitum sata copiosior arundo coronet: contra euancescens abibit arundo, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Qui postremus locus in vulgatis Græcis ita mutilus est, vt verba aliquot desiderentur, ita restituenda, ἐνθ' ἐστὶ πολλὸς κήλημος δ' ἐλάχων τεφανῶν, ἀφανίζονται ἐλάχων: καὶ ἐνθα πολλὸν ἐλάχων τὸν κήλημον τεφανῶν ἀφανίζονται κήλημος. Filicis fœminæ radices latum lumbricum expellunt, cum melle in eclegmate sumptæ: potæ cum vino drachmis tribus rotundum lumbricum eiiciunt: datæ fœminis sterilitatem faciunt, & pręgnantibus abortum, si supergradientur (sic enim conuertenda Græca, καὶ ἔγκυος διαβῇ, ἐκ τῆς πρώτης). Lacuna tamen legit ex vetere codice, καὶ ἔγκυος λαβῇ, ἐκ τῆς πρώτης: id est, & si pręgnans sumpsit abortum facit) farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur. lumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, vt ventrem emolliant. Plinius eadem

Lib. 9. hist. cap. 20.

Pet. Pen. in Ad.

Locus.

Tempus.

Li. 4. c. 18.

Vires.

Li. 27. c. 1. 9.

magna



- magna ex parte habet. Vfus radice in trimatu tantum neque ante, neque postea: pellunt interaneorum animalia, ex his tæniæ cum melle (sic rectè vetus codex habet, vulgati falsò tineas) cetera ex vino dulci triduo potæ: vtraque stomacho inutilissima: Aluum soluit, primò bilem trahens, mox aquam: melius tæniæ cum scammonij pari pondere. Radix eius duorum obolorum pondere ex aqua, post vnius diei abstinentiam bibitur, melle prægustato contra rheumatismos. Neutra danda fœminis: quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit: farina earum vlceribus tetræ inspargitur, iumentorum quoque ceruicibus: folia cimicem necant, serpentem non recipiunt. Ideò substerni vtile est in locis suspectis: vltæ etiam fugant nidore. Hæc Plinius: quorum nonnulla partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto mutuatus est sic scribente: ἡ ὁ γηλυπτερος χηρὸς μὲν πρὸς τὰς ἐλμυθας, τὰς τε παλαιοτάτας, καὶ τὰς λεπτάς πρὸς μὲν τὰς παλαιότας ἀναδεδουμένη μέλιτι. πρὸς δὲ τὰς λεπτάς ἐν οἶνῳ γλυκεῖ μετ' ἀλφίτων διδομένη. γυναικὶ δὲ εἰάν γε δοθῇ, ἐὰν μὲν ἐγκύμονι, ἐκβάλλειν φασὶν. ἐὰν δὲ μὴ, τὸ ὄλον ἀτεκνον γίνασθαι. Id est, vtilis Filix fœmina contra latos ventris lumbricos, & contra tenues: contra latos quidem cum melle, contra tenues verò ex vino dulci cum polenta. Quinetiam si mulieri detur, grauidis quidem abortum, simpliciter autem fœminis sterilitatem facere dicitur. Theophrastus & Plinius Filicis fœminæ cibo potu fœminas sterilefcere, grauidas abortum facere tradunt: neuter autem si grauida supergrediatur abortum fieri tradit. Quorum auctoritas locum Dioscoridis supra citatum, rectè à Lacuna emendatum esse confirmat. Scribit item Theophrastus: ἡ ὁ τῆς περὶ τοὺς ῥίζας μόνον, τῶν χηλῶν γλυκεῖς ρυφνός. ἐλμυθὰ δὲ παλαιότας ἐκβάλλει, ἀπὲρ μὲν δὲ ἐκ χηλῶν, ὅδε ὁ πόνος. (nempe lacteum succum medicatum, & catharticum, vulnere & incisura stillantem, qualem mittit scammonium, cuius proximè antea meminerat, & cum quo Filicem aliqua ex parte confert.) τέμνεσθαι δὲ ὁρῶσαν μελοπύργου φασὶν. Id est, filicis radix succo dulci & acerbulo simul est. Latum lumbricum pellit: semen non habet, neque lacteum succum: ferunt rempestiuam Autumno secari: Quod verò de dissidio inter filicem & arundinem Dioscorides tradit, legitur etiam apud Plinium his verbis. Filix biennio moritur, si frondem agere non patiaris. Id efficacissimè contingit germinantis ramis baculo decussis. Succus enim ex ipsa defluens necat radices. Aiunt & circa solstitium euulsas, non renasci, nec arundine sectas, aut exaratas arundine vomeri imposita. Similiter & arundinem exarari filice vomeri imposita. Repetit idem alio in loco. Arundinis radix contrita & imposita filicis stirpem corpore extrahit: item arundinem filicis radix. Sed hoc prior ipso Celsus tradidit. Pessima ex furculis, inquit, arundo est, quia aspera est, eademq; offensa etiam in filice est. Sed vsu cognitum est vtramque aduersus alteram medicamentum esse, si contrita superimposita est. Extirpandæ verò & prorsus abolendæ filicis rationem aliam Theophrastus docet, his verbis: καὶ ἡ κόπρος χηρὸς μὲν πρὸς τοῖς περὶ τὸν σῆτον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις, πολλὴν πλεονεξία. τὰ δὲ ἡν δὲ φθέρειν φασὶν ἐπιβαλλομένην ἀπόλλυσι δὲ καὶ ἡ περὶ τὴν ἐπικκοιμωμένην τῶν πορσελίων. Id est, stercoratio vtilis non solum frumentis, verum etiam aliis herbis, præterquam filici est: hanc enim simo superiniecto interire affirmant: interit & pecore incumbente. Galenus breuiter Filicum vires sic declarat. Filix radicem habet maximè vtilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis cum melicrato ebibat. Ad eundem modum partum viuum quidem necare, mortuum autem eiicere mirum non est. Est enim amara paulum habens adstrictionis. Quamobrem vlceribus imposita vim habet valenter desiccandi, non tamen mordax est. Similem ei vim habet thelypteris. Armoricos, & Neustriorum vltimos, qui vastas siluas colunt, in frugum inopia, è radice Filicis panem conficere notum est, eiusdemque cineribus nitri loco iniectis, saxa liquare, & vitrea vasa fingere, colore viridi, & subobscurò, quibus vinum album, dulce turbidum potare

Andes,



Andes, Vnelli, Cenomani gratissimum habent. Recentiores herbarij plantas alias filicis nomine donarunt. Imprimis eam quæ Filix aquatica, & Osmunda, siue Osmunda regalis, à regijs & præclaris viribus nuncupatur, à nonnullis filiquastrum, à Chemistis Lunaria maior, à Gallis *Osmunde*, siue *Feugiere aquatique*, à Germanis *Vatter-vorn*. Filicibus supradictis similis est, nisi quod folia crenata non habet:

*FILIX Aquatica, Dodon.*



caulem emittit triangulum, rectum, tenuem, cubitalem, interdum bicubitalem, quem folia vtrinque æquis intervallis alarum ritu expansa stipant, sicuti in polypodio incisâ. In caulium, & ramulorum, ex caulium lateribus prodeuntium vertice, granula rotunda, aspera, seminum speciem ostendentia. Radix magna, crassa, ex multis radiculis implexis compacta, in cuius medio albū quidpiam inest, quod cor Osmundæ vocant. Hanc Pseudolonchitidem asperam vocat Matthiolus, eoque nomine depingit. Locis humidis, vmbrosis, & nemoribus gaudet. Aprili mense folia sicut aliarum filicum erumpunt, hyeme ineunte pereunt, viuari tamen radice in terra manente. Calidâ primo gradu, sicca secundo, non nihil acris, odoris non ingrati. Radices ad contusâ, rupta, luxata: item ad hernias peritiles esse constat experientia certissima. Quinetiam colicis & spleneticis plurimum conferunt. Tragus aliud Filicis maioris genus exhibet, quæ & forma & colore reliquas omnes antecellit. Osmundâ vocat Lobellius, cum

*Forma.*  
Dod. lib. 3.  
cap. 61.

In cap. 145.  
lib. 3.

*Locus.*


*Tempus.*

*Temper.*

*Vires.*

Pet. Penin.  
Aduers.

*FILIX Florescens, Tragi.*



*FILIX Arborea, Tragi.*



tamen



tamen ab *Osmunda* superiore differat. Habet enim caules longos, viri proceritate attingentes, virides planè: radicè crassam, nigram & pilosam. Folia in utroque caulis latere pinnata, & incisuris distincta instar foliorum polypodij: florem fert in vertice candidum, copiosum, qui circa diem sacrum D. Ioannis Baptistæ nullo post se relicto semine decedit. Raro, inquit *Tragus*, hoc filicis genus reperitur, nec multis cognitum est. In *Vuasgoiæ* altissimis siluis propè *Circulum* arcem ducis *Bipontini* prouenit. Ea fortasse *Dryophonon* *Plinij* fuerit. *Dryophonon*, inquit, similis *dryopteridi* herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdati vtrinque foliis, pollicari amplitudine, qualia *oxymyrsines*, sed candidioribus mollioribusque, flore candido sambuci. Idem *Tragus* duo alia *Filicis* genera exhibet. Vnum quod in veterum & cæsarum roborum caudicibus nascitur, folio *Filicis*, multò tamen minore incisura diuisum, caule non altiore polypodio; sed multò tenuiore. Passim non occurrit, sed in altissimis tantum montibus. Alterum est *Filix* nuda seu saxatilis, folio orbata, caulem proferens digitum longum, multiplicem & copiosum, vnaè radice, eaque capillata, sicut & *ruta muraria*, in cacumine binis vel

Locus.

Li. 27. ca. 9.

Li. 1. ca. 18.

Forma.

Li. 1. ca. 18.

*FILIX Saxatilis,*  
*Tragi.*



*CHAMÆFILIX Marina*  
*Anglica, Lobellij.*



ternis corniculis, aut si mauis incuruis quasi setis, quæ purpureis aliquando notantur punctis, cōspicuum. Gustu & odore cum filice vulgari cōuenit: è saxis prorumpit. Capilli veneris, seu polytrichi *Apuleij* genus esse existimat *Tragus*, nempe eius quod ramusculos habet quasi setas porcinas. Hic *Chamæfilicem* marinam *Anglicam* ponemus, quam non nisi saxorum rupiumve interueniis aut petrosis asperginibus *Cornubiæ* innatam reperit ad maris alluiones. E' pusilla multis implexa cirris pullis & compacta radice, foliola emittit binum ternumve vnciarum numerosa, tigida, carnosæ, ex atro virentia, lucida, filicis maris diuisura, ortu, positu, & gustu, lituris etiam aduersa parte extantibus, ferrugineis, quorum pediculi & medius neruus sericeo nitore ex fusco lucent. Hæc *Lobellius*.

*DRYOP*



**H**æc Filicis species à foliorum figura & loco natali *Ἀπορρής* Græcis dicitur, Latinis Filix quærna, & Filix quercus, Gallis *Feugère de chesne*, Germanis *Eichensarn*. Dryopteris, vt describit Dioscorides, filici similis est, multò minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Nascitur in veterù quercuum musco. Ex hac descriptione hanc protulit Dryopterida Matthioli, quæ filicem

Nomine


Li. 4. ca. 81.

Forma.

Locus.

Ca. 81. li. 4.

DRYOPTERIS, Matth.



DRYOPTERIS Alba,  
 Dodonæi.



foliis optimè refert. Nascitur etiam, inquit, in humenti solo inter vepres circa quercuum caudices, seq; in Goritiensi agro multis locis inuenisse extra quercuum caudices affirmat, nullis repugnantibus notis. Sunt qui aliam Dryopterid, eamq; veram sic pingunt ac describunt. Folia huic polypodij protus, aut filicis femina, minora tamen multò, non minoribus laciniis, tenuiora, & teneriora, in iuncis exilibus pedem altis, pennatim & aduerso situ exorientia, auersa parte notulis aspersa, non extantibus, rubiginosis, sed candidis appictis, serie gemina secus foliorum nervulorum medium. Radix longa, variè inflexa, humi decurrens, fusca, subhirsuta, & villis fibrata, polypodij (nisi multò gracilior esset) ita similis, vt aliquando minus peritos pharmacopœos in periculosum errorem induxerit, miscentes hanc decoctis polypodij radicis vice. Dodonæus Lib. 3. c. 63. Dryopterides duas pinxit ac descripsit, hanc candidam, illam nigram. Candida filici mari haud absimilis, sed multò minor, palmum non excedens, caule, flore, semine orbara: folia candida, tenera, multum scissa, crenis toto ambitu densioribus & minutioribus quàm in filice mare, à tergo punctis notata: radix spissa, nigricans, ex radiculis multis & implexis compacta. Nigra Dryopteridi foliorum pediculi nigricant, item folia, superioris minora & breuiora, non tam crebris incisuris, cætera similia, & auersa parte notis paruis signata, tota hyeme virentia. Vtraq; Adiantum est officinarum album & nigrum, quibus adianto vero destituta, innoxie, saltem nigra vtuntur, ac fortassè adiantum album & nigrum Plinij, vt in vero adiãto diximus. Umbrosi viis circa quercuum radices, non tamè ubiq; proueniunt. Dalechampius verà hanc Dryopterida exhibet, quæ in editissimis montibus nascitur ad quercuum muscosas radices, foris per terram vagantes, radice capillata fibris densis, valde tenuibus, inter sese implexis, subatris, gustu adstringentibus cum paucula dulcedine,

Lib. 3. c. 63.

Forma.

Locus.

MMm



## DRYOPTERIS

Nigra, Dodon.

Li. 4. c. 181.  
Vires.

## DRYOPTERIS, Dalech.

Lib. 27. c. 9.



ἀποσῶν, quod huic loco optimè conuenit, quoniam efficacior est vis psilothri profundius subeantis auulso pilo, ut potè via magis patefacta, & postremo recentem Dryopteridem, non radicem solum, sed cum ea herbam ipsam cataplasmat, aut emplatri modo imponendam. Sic igitur Dioscoridis locus conuertendus. Dryopteris cum radicibus trita & imposita pilos abolet. Oportet autem cum pars pilosa aqua humectata fuerit, primum eam deradere, vel pilum auellere, deinde recentem Dryopteridem cataplasmat, modo imponere. Quibus verbis

Dioscorides

quæ cum aliqu andiu mensæ fuerint, percipitur: foliis multis, obliquis, virentibus, & herbaceum virorem constantè seruantibus, etiam dudum collecta planta, vnico pediculo adnexis, alijs incis, pennarum ritu explicatis, supernè læuibus & glabris, infernè exiguis & subluteis punctis, & quasi vermiculis paluerulentis & asperis maculata: sine caule, sine flore, sine semine, nisi quis (ut vulgò multi de filice nugatur) sessiles & pensiles in aduersa foliorum parte quasi vermiculos, dum flauī adhuc hærent florem esse putet, cum nigricantes decidunt, fructum ac semen. Dioscorides Dryopteridis facultates tradit, his verbis. Ἀσὴ ἐπιπλεσθεῖς λασσὸν τὰς πλάγας, τεχνὰς ψιδῶν. Δεῖ δὲ ἀποσῶν (alij ἀποσῶν legunt) τὸ πρῶτον μετὰ δὲ ἐκιδῶν τὸν χυμὸν, καὶ νεαρὸν ἐπιπλεσθῆναι. Hæc interpretes Plinium potius secuti, quàm verba & sensum Dioscoridis, malè conuertunt. Sic enim Ruellius. Psilothrum est cum radicibus trita illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur. Sic verò Cornarius. Hæc vnà cum radicibus trita imposita pilos abolet. Oportet autem postquā corpus exudauit, priorem deradere, & rursus recentem imponere. Plinius verò hoc modo. Dryopteris filici similis, in arboribus nascitur, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta: vis ei caustica est, ideò psilothrum est radix tusa. Illinitur enim vsque dum sudores euocet: iterumque & tertio, ut ne sudor abluatur. Primum folijs dulcedinem quandam is tribuit, Dioscorides verò non folia, sed radices in dulcedinem vergere scribit: deinde πλάσας δασύτας, idest, densas & crebras, Plinius hirsutas dixit, præterea radicem tusam psilothrum esse, Dioscorides verò herbam ipsam cum radice tusam. Adhæc adhibendi psilothri modum videtur nō rectè expressisse, vertit enim, ἐκιδῶν, sudorem euocare, cum scribit, illinendam esse radicem, vsque dum sudores euocet, &c. cum ἐκιδῶν sit humectare & mollire, ut Dioscorides intelligat corporis partem depilandam aqua tepida fotu prius humectandam esse, quod est ἐκιδῶν, deinde pilum deradendum, si ἀποσῶν legas, vel auellendum, si



Dioscorides, id quod plerumque facit, non solum Dryopteridis depilatoriam vim, sed vtendi quoque modum declarare voluit. Siue enim psilothrum, id est, medicamentum quod pilos detrahit, caustica & septica vi id efficiat, quod prius est psilothri genus: siue insigniter & extremè frigida, aut à totius substantiæ proprietate, quod alterum genus est, capillum renasci prohibens, primum oportet vt cutis tepentis aqua: fotu rareseat, & relaxetur, deinde pili auellantur, vel deradantur nouacula, aut septico causticove aliquo detrahantur: quod hodie Turcæ illitæ sui Rhufina faciunt, tum alterum psilothrum parti imponatur, ne pili renascantur, quem ordinem hic docet Dioscorides. Vult enim prius *ῥοῦφα ἰκμάζειν*, deinde pilos *ἀποφύειν*, postremo *νεαπὲν δὲ πύοντες ἰδαίνειν* *ῥοῦφον*. Galen. item scribit Li. 6. simpl. Dryopteridem gustu mixtam qualitatem præ se ferre, dulcem, acrem, amaram, in radice verò etiam acerbam: facultatem habere septicam, proinde etiam pilis glabram cutem efficere. Dantur, inquit Matthiolus, Dryopteridis radices in puluerem contritæ, & cum furfuribus mixtæ, addito falis & fursuris momento equis deuorandæ aduersus intestinorum vermes: namque potenter illos expellunt & interimunt. Ca. 18. li. 4.

POLYPODIUM, CAP. X.

**P**ΟΛΥΠΟΔΙΟΝ Græcè, Polypodium & Filicula Latine, Catoni felicula, nisi mendosi sint codices, Gallicè *Polipode*, Germanicè *Engelsus*, & *Baunfarn*, Italis *Polipodio*, Arabibus *Bisberg*, *Aibeig*, *Bessaigi*, Officinæ Græcum nomen retinuerunt. Polypodij nomen à radice quæ cirròs & acetabula polyporum modo habet, inditum est, filiculæ verò à foliorum cum filice similitudine. Polypodium palmi est altitudine, simile filici, subhirsutum, incisum, non tamen adeo tenui diuisuræ: radix subest pilosa, cirròs veluti Polypus habens, crassitudine minimi digiti, derasæ intus viridis est, austera gustu & subdulcis. Nascitur in muscosis petris, & in vetustis caudicibus quercuum. Hæc Dioscorides. Eadem ferè Plinius tradit. Polypodium, quod nostri filiculam vocant, similis est filici. Radix est in vsu, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri, subdulcis, in petris nascens, aut sub arboribus vetustis. Hic altera radices qualitas à Plinio omiſſa est, nempe adstringēs. Adde etiam folia auersa parte fuluis maculis notata esse. Ex his notius est quàm vt probatione egeat, Polypodium nostrum, id esse de quo veteres scripsere, quo frequentissimè hodie, præsertim querno, in dilutis & decoctis medici vtuntur. Matthiolus duo eius assignat genera. Vnum id de quo disseruimus, quod omnibus notum est, & quod ubiq; frequens provenit. Alterum non nisi paucis cognitum, inquit, folio aspleni, sed longiore, viridiorè, magisq; per ambitum laciniato, radice priori simili, sed paulò graciliore. Hoc plurimum nascitur in montium siluis. Sed dissimilitudo ista ex loci non speciei diuersitate pender: loco enim macilen-


Nomina  
Cap. 18.

Forma.

Locus.

Li. 4. c. 180.  
Li. 26. ca. 8.

Genera.  
In cap. 180.  
lib. 4.






tiore natum, gracilius & strigofolius, latiore amplius & vegetum magis. Sic etiam quibusdam opacis nemoribus folio est adultiore. Non sunt tamen ista specie diuersa. Sic & *Ilua thyrrheni* maris insula *Polypodium* gignit ab aliis diuersum, sicut & alias quasdam raras plantas veluti *Lonchitum asperum*, & *hemionitum*, de

POLYPODIVM Secundum,

*Matthioli.*



POLYPODIUM

*Ilwense.*



*Forma.* quibus diximus. Polypodium illuc in faxis nascitur, radice vel in aliis generibus velut polypodium cirris nodosa, fibrata: caulibus pedalis, è rufo nigrescentibus, lamibus, internè hirsutis: foliis oblongis, pinnatis, inæquali situ in caule dispositis, altera parte virentibus, altera pulvisculo obsitis, gustu subdulcibus, & nonnihil austers, nullo flore, nullo semine. Ad eadem valere aiunt, ad quæ alterum Polypodium, nisi quod magis siccet, ob natalium ariditatem, tum soli natura, tum maris afflatu, maiorem. Quid autem Polypodium præstare possit, declarat Dioscorides, his verbis. Radix purgandi vim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut betæ, aut malua ad purgationem. Aridæ farina aqua mullæ insparsa detrahit bilem & pituitam. Trita efficaciter luxatis illinitur, & aduersus rimas, quæ inter digitos fiunt. Plinius eadem, sed paulò plura tradit. Exprimitur succus aqua madesactæ: & ipsa minuta concisa inspergitur oleri, vel betæ, vel maluæ, vel falammento, vel cum pulicula: coquitur ad aluum, vel in febris leuiter soluendam. Detrahit bilem & pituitam: stomachum offendit. Aridæ farina indita naribus, polypum consumit. Florem & semen non fert. Quæ autem hoc loco non habet, alibi recenset. Radix Polypodij illita luxatis medetur. Et alio in loco. Digitorum in pedibus rimis Polypodij radix prodest. Sic enim ex vetere codice emendat Cornarius, cum in vulgatis legatur, cubitorum ac pedum rimis, &c. In Dioscoride tamen rimæ ἐν μεσοδίοις, & ad pedum & ad manuum digitorum referri possunt. Theophrastus, ἡ δὲ πολυπόδιος ἀκροῖα, καὶ ἡ χαλὰ κολυμῆδνας, ὥστερ αἱ τῆς πολυπόδος πολυπόδια. καὶ θωραὶ δὲ κάτω, καὶ περὶ ἀνὰ τίς, ὡς φασὶν, ἐμπύεσθαι πολυπόδιν, ἕχθ' δὲ φύλον.

*Vires.*  
Li. 4. c. 180.

Lib.26.c.8.

Li.26. c.12.  
Cap.11.  
Embl. 164.  
lib.4.

Lib. 9. hiñ  
cap. 14.



φύλλον ὁμοιον πτερίδι τῇ μεγάλῃ, καὶ φύλλον ἐν ταῖς πτέραις, Id est, Gaza interprete, Filicula  
 verò hirsuta, & acetabulis cauernosa, ceu polyporum cirri: purgare inferius apta  
 est: vbi quis eam contigerit polypum innasce affirmant. Folium filicis magnæ  
 proximum est. Sententia vna in tanto auctore tam absurda necessariò efficit vt Cornar.  
Embl. 164.  
 locum deprauatum esse dicamus. Quid enim à ratione magis alienum quàm con-  
 tingere Polypodium, vt polypus, id est, morbus narium, siue polypus piscis inna-  
 scatur. Quare legendum τὸ φασὶν ἐκ ἐμψύεως, & πτερίδων, hic non significat con-  
 tingere, sed pro amuleto appendere, adalligare, vt sit is verborum Theophrasti  
 sensus. Polypodij radix hirsuta est, & acetabula habet, veluti polyporum cirri.  
 Purgat deorsum: & si quis adalliget aut appendat, polypum innasce negant. Fo-  
 lium habet simile filici magnæ. In petris nascitur. Galenus breuiter Polypodij Li. 8. simpl.  
 facultates sic declarat. Polypodium dulcem simul & austeram habet vincentem  
 qualitatem, vt facultatis sit admodum quidem desiccantis, citra morsum tamen.  
 Mesues eisdem fusiùs explicat. Polypodium quòd lapidibus innasceitur humidi-  
 tate excrementosa, cruda, flatulenta, ventriculum ad nauseam euertere abundat: Li. 2. medi.  
purg.  
 præstantius quòd arboribus, præsertim glandiferis innasceitur, præcipuè quòd  
 magnum est, recens, solidum, nodosum, foris ex nigro rubescens, colore intus  
 herbaceo, vt pistacium, sapore dulci, austero, tandem subamaro, nonnihil aroma-  
 tico. Dioscoridi calidum est tertio gradu, siccum secundo. Humores crassos, len-  
 tos terget, digerit, siccatur, bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam purgat,  
 etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodest, vt quartanis, præser-  
 tim cum mulsâ, epithymo, sale indo: colico etiam dolori, & splenis duritiei quo-  
 uis modo vsurpatum. Contra rimas quæ inter digitos sunt tritum illinitur: cor-  
 pora enim extenuat & siccatur. Ne verò ventriculum ad nauseam euertat, vtque ci-  
 tiùs vacuet, datur ex mulsâ vel aqua hordei, vel decocto vuarum passerum, vel ex  
 iusculo gallorum & gallinarum, vt suasit Hamech, coctum, vel sero lactis. Bibitur  
 vtilissimè mixtis feminibus odoribus, vel aliis aromaticis, vt Dauco, aniso fœni-  
 culo, zingibere, vel simili, animam & facultatem ventriculi naturalem corrobo-  
 rante. Longam satis coctionem sustinet. Datur à drachmis duabus ad aureos  
 quatuor. Quod Mesues Polypodium magnum alij præfert, Dioscorides & Plinius  
 crassitudine minimi digiti esse aiunt. Quod scribit Dioscoridi calidum esse ter-  
 tio gradu, siccum secundo, id falsum est. Bilem enim, inquit ille, & pituitam tra-  
 hit sine graduum mentione, quorum nec meminit Galenus. Auicennæ calidum Li. 2. c. 542.  
 est secundo gradu, siccum tertio. Paulo Ægin. Polypodij radix læuis mulsæ in-  
 sperfa, aut cum ea contrita, eundem quem colocynthis effectum præstat. Præterea  
 quod ille ait Polypodium corpora extenuare, & ventriculum ad nauseam euer-  
 tere, item Plinio stomachum ab eo offendi, negat Auerroës, qui censet Polypo-  
 dium securum esse medicamentum, & epithymo præstantius, cui assentitur Ma-  
 nardus asserens Polypodium imbecilliter & leniter purgare: quare corpora exte-  
 nuare non posse, idemq; per se exhibitum nullam stomacho inferre iniuriam. In  
 eadem est sententia Actuarius. Filicula bilem & maximè atram, ac pituitam du- Li. 5. meth.  
 cit. Dantur purgatæ radicis semi scrupuli affusa aqua mulsâ: purgat quoque me-  
 diocriter & citra molestiam, in gallinaceo iure, & in ptissanæ cremore cocta ra-  
 dix. Hæc Actuarius. Quantum ad dosim attinet, vncia vna nostratis vacuat pa-  
 rum & sine molestia.



## ALSINE,

## CAP. XI.

## Nomina

ἄλσιν ὡς αὐτὸς  
ἐκ τῆς λέξης αὐτῆς  
ἐκ τῆς λέξης αὐτῆς  
ἐκ τῆς λέξης αὐτῆς



ΑΣΙΝΗ Græcè & μυοσωτίς, Latine etiam Alfine, & auricula muris, & recentioribus quibusdam Hippia dicitur, vulgò Morfus gallinae, inde Gallis Morgeline, quòd gallinis & auiculis cibo grata sit, eaq; caueis inclusa, ac cibum fastidientes herba ista recreentur, Germanis

ALSINE, Matthioli.

Vogelkraut, Italis Centone, Pizzagallina, & Panarina, quòd iunioribus anseribus gratum sit pabulum. Alfine autem quòd lucos, quæ Græci ἄλσιν vocāt, vmbrosaq; loca & nemorosa amet. Auricula muris, quòd muris auribus folia similia habeat, siue ob magnam admodum cum vera Myosotide foliorū similitudinem. Quāuis Dioscorides, Galenus, Plinius vnus tantum Alfine mentionem fecerint, tamen recentiores multò plura eius adinuenerunt genera. Dodonæus quatuor, maiorem scilicet Alfinem, mediam, minorem, & marinam. Fuchsius tria, maiorem mediam & minorem. Alij maximam seu maiorem aliam addiderunt: Præterea vernam, nodosam, muscosam. Alfine, vt breuiter describit Dioscor. herba est similis helxinæ, sed humilior, foliis longioribus, vel, vt quidam, nō absque ratione, legunt, minoribus, (μικροφυλλέτρα non μικροφυλλοστέρα,) & non hirsuta, quod Plinius ostendit, cū minorem esse testatur. Cū teritur odorē cucumeris reddit. Vmbrosis locis, lucisque gaudet: vnde illi nomen. Ita


Genera.

Lib. i. c. 34.

Cap. 7. hist.

Forma.

Locus.

ALSINE Maior,  
Dodonæi.ALSINE Media, siue minor  
Dodon. maior Fuchsy.

See figure of ed. in  
Chêne d'Alen pag. 1239.


Plinius



*ALSINE Minor siue minima, Dodon.*



*ALSINE, Maxima.*



Plinius, planè ex Dioscoridis sententia. *Alfine* Lib. 27. c. 4.  
quam quidam *myosotida* appellant, nascitur in  
lucis, vnde & *Alfine* dicta est. Incipit à media  
hyeme, arescit æstate media: cum prorepat,  
musculorum aures imitatur foliis. Sed aliam  
docebimus esse, quæ iustius *myosotis* vocetur.  
Hæc eadem erat quæ *helxine*, nisi minor nihil  
que hirsuta esset. Nascitur in hortis & maxime  
in parietibus, cum teritur, odorem cucumeris  
reddit. Quæ primo loco hæc picta datur, *Mat-*  
*thioli* sententia *Alfine* est Dioscoridis, & alio-  
rum veterum. Cauliculis serpit rotundis, genicula-  
tis: foliis circa singula genicula ex aduerso col-  
locatis, *helxines*, multo minoribus, non hirsutis,  
cum teruntur herbaceum cucumeris odorem,  
non illam *peponis* maturi iucunditatem subo-  
lentibus: flore exiguo, candido, foris herbaceo,  
stellato: femine exiguo in siliquulis rotundis,  
oblongis. Hæc *Alfine* est media Dodon. maior  
*Fuchsi*, cuius folia cum videret multo minora  
*helxines*, id est, *parietariae* foliis, Dioscoridem  
(non rectè) censet illa *helxines*, quæ *cissampelo*  
alio nomine dicitur, foliis comparasse. *Alsi-*  
*ne* maior Dodon. plurimos ramulos rotundos,  
geniculatos, rectos, non humi repêtes, vt prior,  
edit, ex singulis geniculis bina folia sibiipsis ad-  
uerfa, satis ampla, aliquando duorum digitorum  
ferè latitudine, *helxines*, id est, *parietariae* foliis  
haud dissimilia, longiora, minus hirsuta. In cau-  
liculorum fastigio inter folia exeunt petioli cum  
capitulis exiguis, quæ in flosculos exiguos, & in-  
cisos dehiscunt, quibus dilapsis reperias siliquu-  
las longiusculas & rotundas, in quibus semen.  
Tota herba ad *parietariae* faciem satis accedit.  
Sunt enim in ista cauliculi æquè pellucidi, cir-  
ca genicula rubescences, folia eiusdem ferè am-  
plitudinis. Ex quibus effici vult Dodon. genui-  
nam hanc esse Dioscoridis *Alsinen*, scribentis  
eam *helxinem* ferè, ni humilior esset, foliis lon-  
gioribus & non hirsuta. Tertia Dodon. *Alfine*  
quæ minor est, & dicitur, ab ea quæ primo loco descripta depictaque est, quam  
mediam Dodonæ esse diximus, parum differt, sed omnibus suis partibus mul-  
to minor est, ita vt cauliculi capillari sint tenuitate, folia haud maiora foliis  
thymi, cætera supradictæ similis. In umbrosis & humidis locis proueniunt, & in se-  
pibus & dumeris cum cæteris herbis. Aliorum herbariorum *Alfine* maior, sine ma-  
xima, radice est supernè crassiuscula, paulatim gracilescente innumeris fibris capil-  
lata: caulibus multis, pedalis, foliis *Alfines* primæ, per interualla sæpè quaternis,  
interdum singulis, interdum binis, ramulis multis, breuibibus, copiosum florem pro-  
ducentibus, antequam hiet oblongo & acuminato capitulo inclusum, cum apertus  
est, candidum, exiguum, radiatum, sex foliolis constantem, ac totidem filis tenuissi-

In cap. 82.  
lib. 4.

Lib. i. c. 34.  
Cap. 7. hist.

*Alsin. ma-*  
*ior. Dodon.*  
*Forma.*

*Alsin. mi-*  
*nor Dod.*

*Forma.*



**Locus.** mis. In opacis gignitur. Alfine verna appellata in agris humentibus & vitibus cre-  
**Alfin. ver-** scit, radícula breui, exili, candida: foliis cæterarum Alfinarum similibus, læuibus, è  
**na.** viridi pallentibus, circa radicem multis, terræ instratis, cauliculis multis, tres digi-

*ALSINE, Verna.*

Alfin. nod.

*Forma.*Alfin. Mus-  
cosa.*ALSINE, Nodosa.*Alfin. vil-  
losa.

caulibus multis humi iacentibus, rotundis, ima parte subrubentibus: foliis Alfine  
 vulgari similibus, crassioribus, lætiùs virentibus, ordine dispositis, gustu amaris: flo-  
 re pusillo, luteo, ex quinque foliolis composito: semine minutulo, in caliculis ro-  
 tundis: florer Iunio. Aliam tradit Alfinem Clusius, quam Corniculatam nominat.  
 Palmaris herbula est, vnico caule, in ramulos aliquot fisso, geniculato, tenero, hir-  
 suto vt in Alfine vulgari: folia alfinis paulò oblongiora, hirsuta etiam, inter sese  
 opposita, & ex interuallis gemina: alarum cauis insident pusilli flores candicantes,  
 quibus

tos altis nodosis, foliis binis ex singulis articulis  
 prodeuntibus, cauliculum amplectentibus, in-  
 terdum quaternis, interdum senis in singulis  
 cauliculis: flosculis albis, quinque foliolis con-  
 stantibus, Alfinis reliquis similibus, saporis  
 aquosi & fatui. Nondum prorsus exacta hyeme  
 Februario mense floret, appetete Vere, alia me-  
 dia æstate, quamobrem Alfinem vernam herba-  
 rij nuncuparunt. Alfine nodosa in agro Mon-  
 pelienfi plurima gignitur, radice simplici, lon-  
 ga, parum capillata, ex candido flauescente: fo-  
 liis propè terram multis, longiusculis, angustis,  
 Alfines haud multum dissimilibus: caulibus  
 multis, pedalibus: flore albo, ex quinque folio-  
 lis composito: semine in nodosis striatisq; glo-  
 bulis multis, sese ordine consequentibus, & quasi  
 verucula transfixis, peculiari omnino figura.  
 Alfine muscosa in truncis putrium arborum  
 muscosis, in vdis aspergine parietibus, & aliis  
 opacis humidisque locis profilit, radice tenui,  
 breui, capillata, ramulis multis, per humum spar-  
 sis, à terra modicè sese attollentibus: foliis par-  
 uulis, exilibus, capillari tenuitate, densis: flore  
 albo, semine in loculis oblongis. Alfine villosa  
 in lapidosis gignitur, radice parua, breui, can-  
 dida, in fibras tenues fissa: foliis Alfines, caulem  
 per interualla æquis spatiis alarum modo am-  
 plectentibus, hirsutis, vnde ei cognomen: cauli-  
 bus multis, pedalibus, lanugine quadam  
 obductis: flore albo, decem foliolis constante,  
 Bellidi non absimili. Floret maio mense. Alfine  
 purpurea in agris pinguibus propè Monspelium  
 nascitur, radice tenui sublutea: caulibus multis:  
 foliis Alfines, paulò amplioribus, læuibus, pari  
 ordine caulem vtrinque amplectentibus: flore  
 purpureo, quinque foliolis constante: semine  
 in caliculis membranosis, oblongis, infernè gra-  
 cilibus, supernè crassioribus. Alfine lutea in um-  
 brosis abietum siluis, & niuosis montium cacu-  
 minibus nascitur, radice multis fibris capillata,



ALSINE, Muscosa.



quibus succedūt cornicula membranæ & transparentia, gallinaceorum calcarum forma, quæ lento quodam conserpſa humore tangētibus deprehenduntur: ſemen in illis exiguum, cum maturuit nigrum: radix inutilis & annua. Tota inſipida eſt. Inter ſegetes agro Salmanticensi frequens, ubi Maio floret, & ſemen perficit, fortallē Nigellaſtri genus. Alſine, auctore Dioſcoride, refrigerandi aſtringendique vim habet, oculorum inflammationibus cum polenta illita conuenit. Succus eius aurium doloribus inſtillatus prodeſt. In vniuerſum eadem quæ helxine poteſt. Vſus eius, inquit Plinius, ad collectiones inflammationēſque, & ad eadem omnia quæ helxine, ſed infirmius Epiphoris peculiariter illinitur: item verendis, vlceribūſque cum farina hordeacea. Succus eius auribus inſunditur. De quibus apertius Galenus. Alſine aut myo-

Lib. 4. c. 82.  
Vires.


Lib. 27. c. 41.

Lib. 6. ſim.

ALSINE, Purpurea.



ALSINE, Lutea.



ſota facultatem helxines obtinet, nempe refrigerantem & humectantem. Eſt enim eſſentiæ aqueæ, frigidæ: quare & citra adſtrictionem refrigerat. Quocirca ad ſeruantes phlegmonas & mediocria eryſipelata competit. In quibus Galenus apertè Dioſcoridi contradicit ſcribenti Alſinem *δυνάμειον ἔχει ψυχρὸν, & σπινθινόν*, id eſt, vim habere refrigerantem & adſtringentem. Sed vocem *σπινθινόν* pro qua non abſurdè quidam legunt *ἐφελμινόν*, temerè, & præter Dioſcoridis mentem in contextum inſertam fuiſſe, perſpicuum eſt ex iis, qui ex Dioſcoride & Galeno plantarum hiftoriam & facultates exciſerunt, qui eam vocem non habent.

Sic



Lib. 15.

ALSINE Corniculata,

Lib. 7.

Clusij.

Cap. 7. hist.

Dodo. lib.

I. cap. 34.

Nomina

in Actum  
pag. 144

ron à fleurs rouges & bleues, Germanis *Gauch hegil*, quasi salus fatuorum: quod nomen forte à Germanis inditum est, quod Anagallis in limine vestibuli suspensa contra maleficiorum introitum pollere credita sit. Plinius corchoron à quibusdam appellari tradidit: Et corchori vox habetur etiam inter nothas Dioscoridi adiectas. Sed an id de corchoro Theophrasti sit accipiendum iure dubitari potest, & an is corchorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ cruda coctæ eduntur recenset his

Lib. 25. cap. 33.

ANAGALLIS, Mas.

Lib. 7. hist.  
cap. 7.

Lib. c. 215.

Lib. c. 174.

Genera

Forma.

Ibidem.

Lib. 25. c. 13.

Sic enim Oribasius. Alsiue essentia est aquæ & frigida, quare citra adstrictionem refrigerat. Paul. Alsiue vim habet helxinæ similem, quæ refrigerat humectatque, &c. Eisdem facultates Aëtius assignat. Eisdem quoque herbis, quas Morfus gallinæ vulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuunt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, ut dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est, inquit Fuchsius, quod minorem aliqui Germanorum *sieberkraut* vocent, quia scilicet febribus accommoda & utilis sit. Alsiue præsertim mediæ & minoris decoctum in aqua cum sale scabiosarum manuum singulare est remedium, si frequenter eo proluantur.

ANAGALLIS, CAP. XII.



ΝΑΓΑΛΛΙΣ Græcè, ut & Anagallis Latine, Officinis inusitata, non morfus gallinæ, ut vult Matthiolus, qui est alsiue, Gallis *Mou-* choron à fleurs rouges & bleues, Germanis *Gauch hegil*, quasi salus fatuorum: quod nomen forte à Germanis inditum est, quod Anagallis in limine vestibuli suspensa contra maleficiorum introitum pollere credita sit. Plinius corchoron à quibusdam appellari tradidit: Et corchori vox habetur etiam inter nothas Dioscoridi adiectas. Sed an id de corchoro Theophrasti sit accipiendum iure dubitari potest, & an is corchorus sit Anagallis. Is enim corchorum inter olera quæ cruda coctæ eduntur recenset his verbis. ἐν οἷς καὶ παρρησιαζόμενος ἐστὶ διὰ τὴν πικρὴν καὶ χόρπον, ἔχων τὸ φύλλον ἀκραιφνές. Id est, In quibus & corchorus est, ob amaritudinem in pro- uerbium translatus, folio ocimi figura. Est & apud Græcos frequens prouerbium, καὶ χόρπος ἐν λαχοῖς. Id est, Etiam corchorus inter olera, dici solitum in homines nullius pretij, qui tamen in numero aliquo studeant haberi, ut corchorus genus oleris vilissimi habeatur, quod Plinius inter herbas in cibis vulgares numerat, supra citatum Theophrasti locum exprimens. Dioscorides duo anagallidis genera esse tradit, quæ tantum flore distant. Nam quæ cæruleo flore est, femina dicitur, mas quæ phœniceo. Totidem genera herbarij omnes constituunt, & norunt ex Dioscoridis descriptione, quæ est huiusmodi. Anagallides frutices sunt parui, in terra iacentes, folia in quadrangulis cauliculis pusilla habentes, & subrotunda, ad helxines folia accedentia: iemen rotundum. Eadem Plinius



ANAGALLIS, *Femina.*ANAGALLIS *Lutea,*  
*Lobellij.*

nus scribit. Anagallida aliqui corchoron vocāt.

Duo genera eius. Mas, flore phœniceo: femina cæruleo, non altiores palmo, frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus. Nascentur in hortis & aquosis. Prior floret cærulea. Hic vtrique Anagallis nostra passim fruticat teneris cauliculis, quadrangulis, geniculatis, per humum sparsis, & foliis Allines media, rotundioribus, supernè viridibus, & minutis punctis nigricantibus signatis: floribus copiosis, in hac phœniceis, in illa cæruleis: semine pusillo, circinato in pericarpis. Viginosis locis

*Locus.*

*Tempus.*

*Li 2. c. 174*

*Vires.*

lætior provenit. In arvis tamen, vineis, & secus vias etiam reperitur. Floret mense Maio usque in Autumnum, & per ætatem vtriusque provenit maximus, potissimum mense Augusto. Penaluteam Anagallidè esse scripsit, visu pulchram & raram transmarinis regionibus, crebram in Angliæ nemoribus, locisque opacis. Mense Iunio & Iulio flores promit luteos: umbrosis gaudet, cætera mari & femina similis. Vtrique Anagallis Dioscoridis, vim habet mitigandi, inflammatione arcet, furculos extrahit, ulcera serpentia compescit. Succus earum gargarizatus pituitam capitis purgat, & naribus infusus, dentium dolores sedat, si in contrariam aurem iniiciatur. Argema cum melle Attico purgat, & oculorum caligines iuvat. Prodest & a vipera commorsis cum vino potus: item nephriticis & hepaticis. Additur in vetere codice *ἡδὲ ὑδροπικῶς*, id est, & hydropicis. Postremo, Dioscorides ex aliorum historiis recenset, Anagallidem quæ cæruleum habet florem, prolapsam sedem reprimere, quæ verò phœniceum illitu euocare: Quorum sententia Anagallides non solum flore, sed & effectu differrent. Eundem usum medicum docet Plinius, his verbis. Vtrinque succus caliginem oculorum discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema, rubetis magis, cum Attico melle inunctus. Pupillas dilatat: & ideo hoc inungitur ante, quibus paracentesis fit. Iumentorum quoque oculis medetur. Succus caput purgat per nares infusus, ita ut deinde vino colluantur. Bibitur & contra angues succi drach-

*Lib. 25. c. 15.*

ma in vino. Mirum quod pecora feminam vitant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauere, statim eam quæ *Asyla* appellatur, in remedio quaerunt: ea à nostris ferus oculus vocatur. Et, locinori Anagallides mirè profunt. Et, Aluum purgat Anagallis ex aqua mulsâ. Rursus, Anagallis cærulea procidentia sedis retroagit, è diuerso rubens prorritat. Sed de his multò clariùs & distinctiùs Galenus locutus est. Anagallis vtrique tam ea quæ cæruleum habet florem, quàm

*Lib. 26. c. 7.*

*Ibid. cap. 8.*

*Lib. 6. sim.*

ea quæ



eaquæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent verò quendam etiam calorem attractorium, ita ut & infixos corpori aculeos extrahant. Succus earum ex naribus purgat eadem de causa. In summa autem desiccandi vim habent citra mordacitatem, quamobrem & vulnera glutinant, & putrida adiuuant. Hæc Galenus, ex quibus colligere licet errare eos, qui anagallidas frigidas & humidās esse statuunt, cum sint calidæ siccæq; ac detergentis facultatis, ita ut mulieres quæ asperiores ac decolores à natura cutem acceperint, ad læuorem nitoremq; vultus harum succo utantur. Paulus in compositionem ex corallio podagricam, recipit anagallidis russeum florem habentis, quam vocant corallium, vnciam. S. his verbis. *Αναγάλλιδος τῆς τὸ ρύσιον ἄνθος ἔχουσας, ἣν καλεῖται κοράλλιον Γο.* S. Hic russeum Latina voce puniceum vocat colorē, & anagallidem corallium ex colore floris puniceo. Sunt tamen qui ex vetustissimorum exemplarium fide *κολλάριον* legendum esse censent, & ipsam compositionem *διὰ κολλάριου* inscriptam esse, non *κοράλλης*, ut nomen collarij ex glutinandi vi anagallidum accepisse intelligatur. Minimè tamen absurda fuerit vulgata lectio.

Lib. 7. c. 11.  
Cor. Emend.  
168. lib. 2.

## ELATINE,

## CAP. XIII.

Nomina  
Lib. 1. c. 36.  
Forma.



Li. 27. ca. 9.

Lib. 11.

In cap. 36.  
lib. 4.

Ἐλατίνη, ita Latinis Elatine, Arabibus Athin, quam describit Dioscorides foliis esse helxines, minoribus, rotundioribus, pilosis, vel, ut alij, densissimis & dodrantalibus ramulis, quinis senisve, à radice foliolis: vel, ut alij, à radice prodeuntibus, foliorum plenis, gustu acerbis. Nascitur in segetibus & cultis. Eadem Plinius habet. Elatine folia habet helxinæ, pusilla, rotunda, semipedalibus ramulis quinis senisve, à radice statim foliosis. Nascitur in segetibus. Oribasius in Dioscoride φύλλα μακρότερα pro μικρότερα legit. Scribit enim, Elatine folia habet helxinæ similia, sed longiora, rotundiora, hirsuta: ramos tenuēs, &c. Quenam verò ex tot nostratibus plantis pro genuina Elatine habenda sit, inter herbarios controuersia est. Matthiolus eos reprehendit, qui

ELATINE Prior, Dodon.

ELATINE, Matthioli.



numulariam



nummulariā quam vocant, item eos qui pimpinellam Elatinen esse cōsent. Etenim nummulariæ folia pilosa non sunt, neque in segetibus, neque in cultis prouenit, sed in scrobium marginibus, præsertim vlgine madentibus. Pimpinella verò multo plures senis ramulos edit, in terram procumbentes, folia toto ambitu laciniata.

ELATINE Altera,  
Dodon.



ELATINE Polyschides,  
Dalechampij.



Ruellius Elatinem vulgò campestre rapistrum Lib. 3. c. 94.

vocari scribit, cuius sententia Matthiolo minime placet. Idem Ruellius eorum refellit opinionem, qui pilosellam, Elatinen esse putant, reclamantibus aperte natalibus, totaque facie. Matthiolus penultima editione ingenuè fatetur se plantam, quæ veram Elatinen referat non vidisse, picturam tamen exhibet plantæ hirsutæ, cuius folia notulis signata sunt, & ad foliorum helxines cissampeli figuram accedunt. Postrema editione eandem depinxit Parauio, à Jacob. Anto. Cortuso ad se missam, cui nihil deesse ait, quod desiderari possit. Eam tamen nec describit, nec vires explicat. Hic oritur quaestio, cum folia elatines foliis helxines comparat Dioscorides, helxine cissampelos accipienda, an helxine parietaria vulgò dicta? Serapio Elatinem volubilis minoris speciem constituens, eiusque foliis Elatines folia similia esse scribens, helxinen cissampelon intelligere videtur. Pauli interpretes helxinen parietariam. Elatine, inquit, herba est parietaria similis. At verò probabile est Dioscoridæ similes plantas similibus coniungere solitum, & Elatinen helxinæ cissampelo subiicientem, huic illius folia comparasse. Dodonæus Elatines genera duo describit & depingit. Vnā quæ à quibusdam Morfus gallinæ nuncupatur, similiter à Germanis *Hunerbsz*, & à Belgis *Hænderbeet*, id est, morfus gallinæ. Alteram quæ à Germanis *Hunerferb*, à Belgis *Hændererne*, id est, hereditas gallinæ. Prior elatine cauliculis multis fructicat, hirsutis, auriculæ muris modo: foliis subrotundis, asperis & hirsutis, sæpius parum incisiss: cætera alsinæ non multum dissimilibus, flores cæruleos aut purpureos edit, deinde parua capitula, in quibus semen includitur. Hanc Fuchsius nomine Alsines mediæ depinxit. Morsum Gallinæ folio hederula vocat Lobellius. Altera Elatine similes priori cauliculos edit, sed longiora folia, angustiora, toto ambitu crenata: flores cæruleos semen in binis folliculis iunctis: radicem fibratam. Vtraque locis umbrosis, incultis, secus vias & in agrorum marginibus frequēs. Maio mensi & Iunio florent. Recentiorum quidam, iidemque periti, & admodum in hac scientia exercitati, veram ac legitimam antiquorum Elatinen viribus & figura consentientibus eam esse credunt, quæ à Germanis præsertim à Fuchσιο Veronica formi-

*See figure of Elatine media p. 1230*

Cap. 47.

Lib. 7.

Lib. 1. c. 37.

Genera.

Forma.

Lib. 7. hist.

Locus.

Tempus.

Pena in Aduer.



ELATINE, Triphyllus.

LAPPVLA Rusti. *Elatine Tragi.*VERONICA *Femina*,  
*Fuchsij.**Elatine tri  
phyl.*Lib. I. c. 64.  
Lappula  
Rusti. *elati  
ne Tragi.*

agris frumentariis nascitur, surculosus, senecioni non dissimilis, folio non profus  
rotundo, at minori, foliis parietariae exiguis, aspero, ita ut vestibus facile adhære  
scat, lanuginoso, caerulei coloris, lithospermi instar, flosculos gerit caeruleos, qui  
tandem in echinos lappaceos vestibus adherentes abeunt, quod & semen eius est,  
coriandrum

na vocitatur, mirificè ad cruenta, ac vetera vul  
nera & vlcera sananda, scabiem deniq; , & om  
nia cutis vitia commendata, de qua diximus li  
bro de Palustribus, cap. 35. Neutram verò illa  
rum quas proposuit Dodonæus, Elatine Dio  
scoridis esse contēdunt, quod prior, figura plu  
rimū distat ab helxine: posterior, nec foliis sit  
villosis, nec helxinæ similibus: veriùs Elatine  
dici posse, quàm is pro myosotide secunda de  
pinxit, de qua hoc libro tractauimus. Ceterū  
secundæ Dodonæi Elatine herba hīc depicta  
congener est: foliis tamen discrepat maioribus,  
crebrius, profundiusque incisis, vnde ei cogno  
mentum, circa caules densioribus. Nascitur in  
aridis & sabulosis. Habetur & alia Elatine à  
quibusdam herbariis, quæ dicitur triphyllus,  
squallidis & sabulosis gaudens, radice gracili,  
quatuor digitos longa, candicante, modicè fi  
brata, foliis paruis, simul ternis, ut in loco: quam  
ob causam triphyllon cognominarunt: flore  
pusillo caeruleo, per ramulos sparso: semine mi  
nuto in oculis Elatarum modo, tãquam ge  
minis. Trago Elatine est frutex exiguus qui in

*hæc figura est. est  
ut Veronice  
pag. 1303.  
et ut Veronice  
sem pag. 1050.*



coriandrum magnitudine æquantes. Qua ex causa Germani quidam *Klettenkraut*, id est, lappaceam herbam nominant. Vim habent Elatines folia, auctore Dioscoride, cum polenta illata, inflammatos, & fluxione infestatos oculos iuuandi. Ipsa herba cocta & absorpta dysenteriam sistit. Plinius eadem prorsus tradidit. Elatine gustu acerbæ, & ideo oculorum fluxionibus efficax, foliis cum polenta tritis & impositis, subdito linteolo. Eadem cum lini semine cocta sorbitionis vsu dysenteria liberat, quorum effectuum rationem breuiter docet Galenus, cum scribit. Elatine modicè tum refrigerat, tum adstringit.

Ibidem.  
*Vires.*  
Li. 17. ca. 9.  
Lib. 6. sim.

HELXINE, CAP. XIII.

**H**ÆLXINE & περσικιον Græcè, Latine etiam Helxine, Perdicium, Vrceolaris, herba muralis, & Partheniū Celsō dicitur, aliis fideritis, aliis heraclea, Officinis parietaria, Gallis *Paritoire* & *Parietaire*, Germanis *Tag-undnacht*, *Glaszkraut*, Italis *Parietaria* & *Vitriola*, Hispanis *yerua del muro*. Dicta autem est Helxine, quod aspera foliorum hirsutis, asperoq; semine tenaci nexu vestimentis obuiis adhæreat. Perdicium, quod perdices ea libenter vescantur. Vrceolaris, quod detergendis vrceolis vasiliq; vitreis efficax sit. Muralis & Parietaria, quod muros ac parietes natales locos sibi elegerit. Nominari autem parthenium non solum Celsus verumetiam Galenus & Plinius ex Celsō testantur. Sed animaduertendum est Plinium huius nominis homonymia deceptum, duas herbas diuersissimas in vnam confundere, nimirum parthenium Dioscoridis, & Helxinen hanc nostram siue parietariam. Sic enim ille Celsum citans. Parthenium alij leucanthemum, alij amaracon vocant. Celsus apud nos perdicium & muralium, &c. Quæ de parthenio Dioscō intelligenda. Nam herba muralis, siue perdicium à Celsō quidem parthenium dicitur, sed nō hoc de quo hîc Plinius, & Dioscorides lib. 3. tractant: verum id de quo infra Dioscorides, & Plinius ipse his verbis. Helxinē aliqui perdicium vocant: quoniam perdices ea præcipue vescantur, alij fideritim, nonnulli parthenium, &c. Helxinen depingit Dioscorides cauliculis esse tenuibus, subrubris: foliis similibus mercuriali, hirsutis: circa caules velut seminibus paruis, asperis, vestes apprehendenti- bus, nascique in sepibus & parietibus. Plinius. Helxine folia habet mistæ similitudinis plantagini & marrubio: cauliculos densos, leuiter rubentes: semina in capitibus lappaceis adhærentia vestibus: vnde & Helxinen dictam volunt. Hæc Dioscoridis descriptioni planè respondent, nisi quod marrubio non mercuriali, vt Dioscorides, folia comparat, quamquam facili lapsu vox vna alteri substitui potuit. Hæc Helxine nostra est parietaria, vsu frequentissima, notissimæque omnibus tum facie, tum natalibus, tum foliis & semine vestibus adhærente, fruticosa enim est, cubitalis, cauliculis tenuibus, leuiter rubescentibus, teneris, succulentis, foliis mercurialis herbæ, aut amaranthi, hirsutis, non crenatis: flosculis minutissimis, pallentibus, aut purpureis: semine perquam exili, nigro, tunica aspera operto, obuias quasque vestes arripiente, radice subrubra, fibris capillata. Nascitur in sepibus, muris, maceriis, parietibus & vinetis. In hortis etiam plantata ita prouenit, vt inde vix exigi possit.

*Nomina*  
Lib. 2. c. 35.

HELXINE.



Lib. 3. c. 138.

Lib. 21. c. 30.

Lib. 4. c. 81.

Lib. 22. c. 17.

Ibid.

*Forma.*

Lib. 22. c. 17.

*Locus.*



- Tempus.* Iulio mense potissimum floret: folia vim habent refrigerantem, & adstringentem, auctore Dioscoride, quare imposita sanant ignes sacros, condylomata, am-  
*Vires.* busta, panos incipientes, omnem inflammationem ac tumores. Succus eius ce-  
 Lib.4. c.81. russa admixta illitus erysipelata & herpetas sanat, & podagras cerato cyprino, aut adipe hircino exceptus, prodest & tussi diurnæ succus cyathi mensura haustus. Tonsillis quoque inflammatis vtiliter gargarizatur & illinitur, aurium dolori cum rosaceo instillatus prodest. Helxine inficit lanas, inquit Plinius, sanat ignes sacros & tumores collectionesque omnes. Adusta & panos succus eius cum plim-  
 Lib.22. c.17 mythio, ignes sacros & vlceras quæ serpunt (in vulgaris exemplaribus verba hæc, (& tumores collectionesque) perperam leguntur ex priore versu repetita) & gut- tura insipientia turgescere. Item veterem tussim cyatho hausto, & omnia (in ore tumida, sic enim legendum,) sicut tonsillas: Et aurium dolores cum rosaceo (eadem exemplaria habent varices cum rosaceo, nullo sensu. Helxine enim cum rosaceo in varices nihil agere potest, nec eius facultatis meminerunt Dioscori- des, neque Galenus. Vetus codex arietes vocem habet, sed itidem corruptam, & nihil indicantem. Quare locum sic ut posuimus Cornarius emendauit ex Dio- scoride sic scribente. καὶ ἀταλγίαν τοῦ ῥοδίνου ἐγγερόμενον ἀφέλξει.) Imponitur & po- dagris cum caprino seuo, (hircino Dioscorides,) ceræque cypria. Hic cera cy-  
 Lib.6. sim. pria more suo dixit Plinius, pro cerato cyprino. Galenus. Helxine, inquit, quam alij perdicium nominant, alij parthenium, alij sideritin, alij heracleam, vim habet abstergendi, & leuiter adstringendi cum subfrigida humiditate. Quam- obrem phlegmonas omnes in initio & vsque ad vigorem, maximè calidas sanat. Quinetiam incipientibus phygetlis cataplasmatibus ritu illinitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonosos succus eius mediocriter profuerit. Gargarizan- dum nonnulli exhibent ad paristhmian. Sunt verò medici qui diuturna tussi ve- xatis exhibuerunt. Certè euident exstergendi experimentum præbet in vasis vi- treis. Aëtius. Facit ad alopecias & impetigines herba ipsa per se assidue affricata. Aperiit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit cum modico sa-  
 Lib.1. le trita, & cataplasmatibus modo imposita. Ex his intelligere licet multos helxine abuti, qui eam in frigidis vitiis pro fomento vsurpant, cum refrigerandi con- stringendique vi prædita sit. Caterum cum adstringendi facultas ei quoque in- sit (est enim gustu nitroso, bliteo, & superficie abstergente) potest etiam cal- culosis, & iis qui difficultate vrinæ laborant exhiberi. Succus enim eius trium vnciarum pondere haustus, auctore Matthiolo, suppressam vrinam mirè pro-  
 In cap.82. uocat, eadèque super regula calefacta, vinòque cretico irrorata, & pubi illita, lib.4. calculosis & vrinæ difficultate laborantibus mirè auxiliatur, potissimum, inquit Fuchsius, si aliquid quod maiorem abstergendi vim habeat, admisceatur. Sic Aëtius hæmorrhoidas aperire tradit, si cum sale cui detergendi vis inest, trita apponatur. Multi hodie vsus est in enematibus ad ventris & vteri dolores pa-  
 ratis, & ad balnea absterfioni accommoda. Eiusdem vis magna est ad recen- tia vulnera sananda. Si enim recens semicontusa vulneri alligetur, tertioque die soluatur, non erit opus alo. vti medicamento. Succus in ore detentus densum dolores mulcet. Stillatitia eius aqua faciem abstergit, & nitorem addit.

VRTI



VRTICA, CAP. XV.



ΚΑΛΥΦΗ & κνίδιον Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur, Arabibus *Nomina*  
Humire, Vraichlatum, Angiara, Gallis Ortie, Italis Ortica, Hispanis Ortiga,  
Germanis Nessel. Officinæ latino nomine vtuntur. Acalyphe, auctore  
Athenæo, καὶ ἐνφημισμὸν τῆς ἀντιφράσεως ἀνδραγαθῶν. ἔγερ πρᾶξι ἐστὶ, καὶ  
ἀπαλὴ τῇ ἀφ᾽ ἑαχέστα δὲ καὶ ἀνδρῶν. Id est, acalyphe bo-  
no omine per antiphrasim nominata est, neq; enim  
tactu suavis & mollis, sed aspera & iniucunda, vel ἔτι  
ἔργον ἀνδρῶν ἀπὸ τῆς ἀπλότητος, id est, quod iniucundo sit tactu:  
pruriginē enim ciet. Cnide autē, quod vellicet, pun-  
gat, & suo morſu sensum laceſſet, à verbo κνίσειν,  
quod pungere ac vellicare significat. Vrtica ab vren-  
do, quod pruritum pustulâsque igni similes excitet.  
Dioscorides duo Vrticæ genera esse ait. Vnam, quæ  
siluestrior est, asperior, latioribus & nigrioribus fo-  
liis, semine lini semini simili, sed minore. Alteram  
non æquē asperam minuto semine. Plinio differen-  
tiæ plures. Ex omnibus his generibus, inquit, Vrtica  
maximē noscitur, acetabulis in flore purpuream la-  
nuginem fundentibus, sæpē altior binis cubitis. Plu-  
res eius differentiæ, siluestris, quam fœminam vo-  
cant, minor. Et in siluestri quæ dicitur Cania (Cór-  
narius legit canina,) acrior, caule quoque mordaci,  
fimbriatis foliis. Quæ verò etiam odorem fundit  
herculanea vocatur. Semen omnibus copiosum, ni-  
grum. Mirum sine vllis spinarum aculeis lanuginem  
ipsam esse noxiam, & tactu tantum leui pruritum  
pustulâsque confestim adusto similes existere.  
Notum est & remedium olei. Sed mordacitas  
non protinùs cum herba ipsa gignitur: nec nisi  
solibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci  
vere, non ingrato, multis etiam religioso in ci-  
bo est, ad pellendos totius anni morbos. Silue-  
strium quoque radix omnem carnem tenerio-  
rem facit simul cocta. Recentiores alia adiece-  
runt genera, de quibus ordine dicetur. Vrtica  
prima Dioscoridis est quæ siluestris & mas, &  
Romana dicitur, non ob natales: est enim ca-  
lidioribus regionibus vt Hispaniæ, Narbonæ,  
Italiæ frequentior & vulgatio, sed propter se-  
minis maioris maiorem efficaciam, caulibus ro-  
tundis, cauis, flexuosis, asperis & hirsutis: foliis  
longis, asperis, mordacibus, vrentibusque, altiùs  
quàm cæteræ Vrticæ incisis, inter quæ & cau-  
lem è petiolis paruis pendent pilulæ villosæ echi-  
num referentes, plenę semine fusco, compresso,  
lubrico, lini, sed rotundiore & minore. Rara in  
septentrionalibus regionibus, nisi ab herbariis  
in hortis colatur. Secūda Vrtica communis,

VRTICA I. Matth.



VRTICA II. Matth.



Lib. 3. dip.

Lib. 4. c. 89.  
Genera.

Lib. 21. c. 15.

Embl. 79.  
lib. 4.

Forma

Vrtica. 1.  
canina.





VRTICA, Oligophylla.



Locus.

Vrtica.  
Hercu.

Forma.

Lib. cap. 1.  
Vrtica oli-  
goph.  
Ibid.

Forma.

vtica femina, Vrtica maior, supradictæ æqualis caulium proceritate atque asperitate, interdum etiam procerior, foliis hirsutis, punctoriæ vstionis dolorem inurentibus, nigrioribus, interdum rubescentibus, non tam altè serratis: semine in filamentis racemosis deorsum vergentibus, milio simili, sed minore, subrufo: radice longa, gracili, lutea, huc illic serpente. Maximo importunoque prouentu hac cõmuni vrtica tota scætet Europa. Vrtica tertia minor, Canina Plinij, acrior, similis planè maiori cõmuni, sed minoribus foliis, & viridioribus, & caule breuiore, rotundo, hirsuto, magis mordaci & vrente vi: semine crassiusculo: radice breuiore. Formosissima ea est Vrtica, quæ in siluis ac dumetis nascitur, caule & herba vulgari cõsimilis, grauissimi odoris, attamen grati quemadmodum & melissa, purpureis floribus circa caulem vsque ad summum vestita, instar spicæ vel ocimi. Semen huius quoque in folliculis continetur teres, nigrum, minutius semine rapi, per omnia ocimi semen referens. Herculeam Vrticam Plinij Tragus esse arbitrat. Inter magnas & vrentes Vrticas ponitur à Trago ea quæ à foliorum paucitate meritò oligophylla dicenda est, radicibus longis, in sese contortis & implicatis, humi serpentibus, coloris crocei. Aduentante Vere quotannis nouas cymas emittit, vnde nonnunquam vna de radice quini, feni, aliquandò plures, interim & pauciores asperrimi, lanuginosi ac quadrati caules prodeunt, quorum alij asperrimis & spadiceis, alij nigrioribus, & vndiq; instar serræ incisis foliis vestiuntur. Semen cauli inter folia expansis fibris adnascitur, quod vbi autumni tempore



tempore maturuerit, & extritum fuerit albidum esse, & ad figuram milij (licet minus illo sit) accedere apparet. Hæc Vrtica vehementer adurit, sua sponte affatim luxurians, agricolis vt & cetera omnes vrentes maximè inuisa. Sed Vrtica id vnicum vitium multis aliis commodis pensant. Folia enim imposita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gangrenas, carcinomata, sordida vlcera & cacoethe: item luxata, tubei cula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciant & ad sanguinis è naribus eruptiones folia cum succo trita indita. Menses cient trita cum myrrha subdita. Vterum prolapsum restitunt folia recentia admota. Semen ex passo potum ad venerem concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctu orthopnoæ, pleuritidi & peripneumoniz prodest. Educit & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodentibus medicamentis. At folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinam mouent, inflationes discutiunt. Verum cum prisana cocta quæ in thorace hærent educit. Decoctum foliorum cum modica myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vnam inflammationem reprimat. Sic enim conuertenda hæc Græca: ὁ δὲ χυλὸς ἀναγαργαρεῖσθαι, ὁ δὲ χυλὸς ἀναγαργαρεῖσθαι: non quemadmodum vertit Ruellius, Inflammatione turgentem gargarizatus succus exprimit. Nam reprimere est vnam ipsam, humoresque illapsos repellere ad loca vnde fluxere, id quod expedit in partis illius inflammatione. At exprimere contra est ad externa premere, quod est maximè noxium partibus inflammatione tentatis. Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit planè ex Dioscoridis sententia, sed fusiùs, vt Dioscoridi intelligendo non parum lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisus potest? At illa præter oleum quod in Ægypto ex ea fieri diximus, vel plurimis scater remediis. Semen eius cicuta contrarium esse Nicander affirmat: item fungis, & argento vivo. Apollodorus & salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduersari hyoscyamo, & serpentibus, & scorpionibus. Tum illa ipsa amaritudo mordax vnas in ore, proci dentesq; vulvas, & infantium sedes tactu resiliere cogit: lethargicos expergiscit factis cruribus, magisque fronte. Eadem canis morsibus addito sale miscetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice carcinomata, & sordida vlcera sale admixto: item luxata sanat & panos, parotidas, carnesq; ab ossibus recedentes. Semen potum cum sapa vulvas strangulantes aperit, & profluvia narium: sistit impositum. Vomitiones in aqua multa sumptum à cæna faciles præstat, duobus obolis: vno autem in vino potu lassitudines recreat. Vulvæ vitiis tostum, acetabuli mensura: potum in sapa resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat, eodem eclegmate. Et lateri medetur cum semine lini: addunt hyssopum & piperis aliquid: illinitur lieni. Difficilem ventrem tostum cibo emollit. Hippocrates vuluam purgari potu eo pronunciat. Dolo leuari tosto acetabuli mensura cum dulci potu, & imposito cum succo malvæ. Intestinorum animalia pellit cum hydromelice & sale. Defluuia capitis semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum vrsino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto non minùs utilis: item lieni. Et cocta in vino discutit panos, cum axungia vetere, salsa: eadem psilothrum est sicca. Condedit laudes eius Phanius Physicus, vtilissimam cibus coctam conditamve professus, arteria, tussi, ventris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchyliis ciere aluum, cum prisana pectus purgare, mulierumq; menses: cum sale vlcera quæ ferpunt cohibere. Succus quoque in vfu est. Expressus illitusq; fronti sanguinem narium sistit: potus vrinam ciet, calculos rumpit: vnam gargarizatus reprimat. Semen colligi menses oportet. Alexandrinum maximè laudatur. Ad omnia hæc & mitiores quidem teneraq; efficaces, sed præcipuè siluestris illa in vino pota, quæ &

Vires.  
Li. 4. ca. 89.

And. Lacu.

Li. 22. ca. 13.



amplius, lepras in facie tollit. Si quadrupes initum non admittant, Vrtica naturam  
 Li. 6. simpl. fricandam monstrant. Galenus euidentius & vires & effectus Vrticæ tradit, tan-  
 quam de vno genere loquens. Vrticæ herbæ & semen & folia, (nam hæc potissi-  
 mum sunt vsui) admodum digerentis sunt facultatis, adeò vt & phymata & paro-  
 tidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem extiment,   
 maximè si cum passo semen bibatur. Porro quòd non vehementer exalfaciat,  
 sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque hu-  
 morum ex pectore pulmoneq;eductio, tum quòd partes quas contigerit, pruriant.  
 Porro flatuosum eius cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur.  
 Non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem subducit modicè, ipsa  
 duntaxat abstersione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangrenosa, &  
 cancrofa, & in totum quæ exsiccari citra mordacitatem postulant, ea conuenien-  
 ter sanat, nimirum cum subtilium sit partium, & temperaturæ sicca, non tamen  
 tantum habens caliditatis vt mordicet.

## LAMIVM,

## CAP. XVI.

Nomina  
 Lib. 21. c. 15.  
 & 22. 14.



RTICA iners & mortua, vulgò Archangelica, Plinij Lamium esse  
 putatur. Sic enim ille cum de Vrtica tractasset, quæ innoxia, inquit,  
 morfu carens Lamium vocatur. Gallis *Ortie morte*, Germanis  
*Todtnessel*, siue *Taubnessel*. Iners & mortua cognominata est, quòd foliis  
 sit non mordacibus neque pungentibus, & mitissima. Archangelica ab eximiis  
 viribus. Lamium fortassè à florum figura, veluti cucullo laruatam Lamiam quan-  
 dam representante. Itali *Milzatellam*, & *Herbam de la Milza* vocant, ab insigni

## LAMIVM, Fuchs.

Genera.

Forma.

Locus.

Temper.

Li. 22. c. 14

Vires.



eius aduersus splenis obstructionem & duri-  
 tiem efficacia, qui splen illis *Milza* nominatur.  
 Ea duplex est, florum colore distans: alia enim  
 albo, alia luteo constat. Est & alia Vrtica mor-  
 tua, de qua mòx. Lamium siue Archangelica  
 flore albo, foliis est vrticæ vrentis similibus,  
 fimbriatis, candidioribus, lanugine nequaquã  
 mordaci: caule quadrato: floribus oblongiori-  
 bus, maioribus, fabæ, per foliorum interualla  
 quasi cucullis, aut galeis apertis, siue ansis in-  
 flexis, caules amplexantibus, minùs graueolen-  
 tibus, albidis, seu pallentibus, radice fibrata.  
 Passim circa sepes & semitas nascitur. Est Lo-  
 bellio Galeopsis Matthioli proximo capiti ap-  
 picta. Lamium luteum à superiore differre non  
 videtur, nisi proceriore caule, numerosiore,  
 hirsutior folio: flore pereleganti luteo, non  
 dissimili. In siluosis & opacis potiùs reperitur.  
 Dalechampio est Galeopsis lutea proximo ca-  
 pite picta. Maio potissimum mense floribus  
 abundant, & tota ferè æstare. Calidum sic-  
 cùmque est Lamium, vt & cætera vrticæ gene-  
 ra, id quod ex gustu & facultatibus eius depre-  
 henditur. Plinius cum vires & facultates vrticæ fusiùs exposuisset, subiungit. Ea  
 quoque quam Lamium inter genera earum appellauimus, mitissima, & foliis  
 non mordentibus, medetur cum mica salis contulis, incusisq; inustis & strumis,  
 tumoribus



tumoribus, podagris, vulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus facris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis radice alligata in tertianis, ita vt ægri nuncupentur, cum eruitur illa radix, & dicatur quæ, & cui, & quorum filiq; eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas pollere. Idem radice vrticæ addito sale infixa corpori extrahi: foliis cum axungia strumas discuti, vel si suppurauerint, erodi, compleriq;. Recentiores vrtica mortua vtuntur sistendo ruentis à naribus sanguinis impetu, imæ ceruici vel scapulis alligando: nam inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlcerebus denique, putredinibus, & fistulis mirificè conferre ac mederi tradunt: & vtrumq; Lamium non dissimilibus viribus, sed luteum multò efficacioribus esse ad vulnera, vlcera, & tumores.

GALIOPSIS, CAP. XVII.

**ΓΑΛΙΟΥΡΙΣ** vel γαλιόψις, & γαλεόδολος Græcis, Latinis etiam Galio-  
liopsis, vel Galeopsis, vrtica labeo, Vrtica fœtida, Gallis *Ortie puante*. *Nomina*  
Dicitur autem Galioopsis si cum, & scribatur à florum effigie Galeata, quod eius flores galeæ aspectum referant. At quoniam inusitatum fuit Græcis præsertim veteribus, Latina nomina cum Græcis componere, γαλιόψις potius per scribendum erit, vt & multa exemplaria habent, & Plinius ita legendum testatur, qui galeopsin hanc herbam nominat: à florum figura mustellæ faciem & rictum quadamtenus exprimente. Id quod etiam videtur innuere τῆς γαλεόδολας nomen, id est, mustellæ fœtidæ: quo & quæ nam sit herba indicatur, nulla videlicet descriptioni aptiore quàm vrtica mortua fœtida.

**G A L E O P S I S,**  
*Matthioli.*



Nam Galeopsis, vt scribit Dioscorides, quam aliqui *Lib. 4. c. 90.*  
Galebdolon nominant. Totus frutex cum caule & *Forma.*  
foliis vrticæ similis est, sed folia lauiora sunt, & dum-  
teruntur valdè grauem odorem reddunt: flores te-  
nues, purpurei coloris. Nascitur in sepibus & circa *Locus.*  
vias, & ædificiorum areas vbique. Sic Plinius, ita vt *Li. 27. ca. 9.*  
ex Dioscoride transcripsisse videatur. Galeopsis, aut  
vt alij Galebdolon, vel galion, caulem & folia habet  
vrticæ, lauiora, & quæ grauem odorem trita reddunt:  
flore purpureo. Nascitur circa sepes ac semitas vbique.  
Sic vrtica fœtida, vrticam aut fœtidum marrubium fo-  
liis ac caule refert. Floribus ea purpureis, exilibus, ob-  
longis galericulis, aliquantùm mustellina effigie ex-  
pressis visitur. Deinde iuxta sepes, rudera & vias oritur  
passim. Hæc à Lobellio sic picta est Galeopsis siue  
Vrtica non mordax Lamium Anguillaræ, Purpurea  
Galeopsis, Heraclea Plinij Tragi: quamquam ab Hera-  
clea Tragi hæc prorsus differre videatur. Quæ verò  
perperam Herbariis, Matthiolo, Lacunæ Galeopsis  
dicitur, Lobellio est Lamium siue Archangelica flore  
albo superiori capite explicata. Scrophularia verò  
maior, quæ opinione Fuchij & Dodonæi galio-  
psis, & ab ædificiis multùm disitis nascitur. Radicem habet magnam, albam,  
strumofam, adeò notatu dignam, vt hanc indictam minimè præterisset Diosco-  
rides. Præterea galio-  
psis folia, caules, succus, & semen vim habent dissipandi *Vires.*  
duritias



duritias, carcinomata, strumas, parotidas, panos. Oportet autem cum aceto bis die imponere, & cataplasma tepidum facere. Sed & decoctum ipsius vtiliter in fomentum affunditur: facit etiam ad nomas, gangrænas & putredines cum sale imposita. Quas insignes facultates non solum antiqui, sed etiam posteriores & docti medici experti sunt, & literis mandarunt, qui vrticæ mortuæ & fœtidæ nomen indiderunt, quæ nota facillè dignoscitur à congeneri lamio & perquã simili.

GALEOPSIS *Purpurea*,

Lobellij.

GALEOPSIS *Lutea*,

Dalechamp.



Lib. 27. c. 9.

Easdem vires Plinius ex Dioscoride videtur descripsisse, his verbis. Folia cauleq; duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos, & parotidas discutiunt. Ex vsu est & decoctæ succo fouere. Putrescentia quoque & gangrænas sanat cum sale. Hic minimè prætermittenda Galeopsis lutea herbariorum, quam descripsit & depinxit Dalechampius. In asperrimis montibus provenit, radice fibrata, nigricante, inutiles, caulibus multis, cubitalibus, angulosis: foliis vrticæ, amplis, imò caule minoribus, medio latioribus, graue quidpiam sublentibus, tactu minimè asperis, villosis, flore in caulis vertice interuallis paribus exeunte, luteo, duobus foliis constante, quorum inferius falcato sinu in capacem aluum extuberat, superius autem operculi modo impositum cõteggit, pallidis staminibus in medio subrectis: semen, flore delapso, in herbaceis calicibus veluti fixum hæret. Inuenitur frequens hæc planta in montis Æguebellerij summo iugo, quâ Lugduno Cameriacum itur. Est & copiosa Galeopsis rubra in dumeris nostris opacis, huic cætera similis, flore tantum rubro diuersa. Vtrumque hoc genus à Lamio Plinij & inodoro & fœtido plurimum distat. Pena & Lobellius Lamium fecere à Lamio siue Archangelica specie non differens, flore albo, ut superiore capite delaratum est.

CARDIA



**R**ECENTIORES rei herbariæ studiosi, huic herbæ (vetere eius nomine nondum comperto) Cardiacæ nomen dederunt, ab eximiis viribus aduersus cordis affectus. Galli *Agripaume* vocant, & *Crenulæ*, à crenatis foliis, Germani *Hertz-gespan*, siue *Hertz-gesper*. Dodonæus Sideritis primam speciem esse existimat. Alij marrubij genus. Caulem emittit quadratum, geniculatum, nigrum, folia ferè vrticæ, aut marrubij, latiora, nigriora, longioribus, crebrioribus, & altioribus multò incifuris, per interualla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores purpureos, vrticæ fœtidæ non dissimiles, sed minores, verticillatim caulem ambientes, odore quadâtenus marrubium referentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam. Pæssim in ruderibus, circa sepes nascitur. Cùm amara admodum sit, calidam secundo ordine, siccam tertio esse constat. Recentiores rectè contra cordis palpitationem, conuulsionem & resolutionem conducere tradunt. Decoctis cordi amicis vtiliter miscent. Potest enim cùm amara sit, sua caliditate & siccitate crallos humores qui in venis & alijs partibus, neruosis potissimum sunt, incidere, extenuare, discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, vrinas mouet, menstrua educit, pectus à pituita detergit, obstructions aperit, quas frigida causa induxerit, lumbicos necat: in puluerem contrita, & cochlearis mensura ex vino hausta difficilè parientibus mirum in modum opitulatur. Imposita vulnera ferruminat.

CARDIACA, Matth.



Nomina  
*Cardiaea*, *Cardiaca*

Lib. 1. c. 87.

Pet. Pen. in  
Aduers.

Forma.

Locus.

Temper.

Fuchl. cap.  
148. histor.  
Matthi. in  
ca. 30. li. 4.

CHELIDONIUM MAIUS, CAP. XIX.

**C**HELIDONION <sup>μαῖον</sup> Græcis, Chelidonium maius, & Hirundinaria maior Latinis, Officinis Celidonia, Arabibus *Kawroch*, *Callidunium*, *Chilodomontoma*, & *Memiram*, Gallis *Chelidoine*, & *grande Esclaire*, Italis *Celidonia*, Germanis *Scheluurtz*, & *Schlekraut*, Hispanis *Celiduenha*, & *Ierna de las golandrinas*. Chelidonio autem siue Hirundinariæ auis hirundo, quæ Græcis *Χελιδών* dicitur, nomen dedit, vel, vt auctor est Plinius, quod hanc primùm auis illa monstrauit, & ea oculis pullorum in nido restituit visum, vt quidam volunt, etiam erutis oculis: vel quod florer aduentu hirundinum, discessu marcescit, quod de minore verè dicitur. Quam Græci nominis vim ignorantes imperiti quidam, præsertim Chymistæ, non Chelidonium, sed cæli donum vocitant. Ac ea falsa nominis præstantia freti, ex hac herba quandam quintam esse fieri prædicant, non modo ad vanas illas chymicas metallorum medicationes accommodatam, sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosque plurimos profligandos vtilem. Genera eius duo. Chelidonium maius & minus: de minore diximus. Maius caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata, folijs plena habentem: folia ranunculo similia, teneriora tamen, & colore sub cæso, iuxtaq; singula folia florem leucoio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine, & odoris grauitate: radix supernè singularis, infernè

Nomina  
*Chelidonium*, *Chelidonia*

Lib. 25. c. 8.

Genera.

Forma.



## CHELIDONIVM

*Mainus, Matth.**Locus.**Tempus.**Temper.**Li.2. c.176.*

fernè autem plures. Fructus cornuti papaveris instar tenuis, longus veluti comis, hæc tamen verba duo, tanquam superuacua, quidã delent: in quo exigua semina sunt, papaveris semine maiora. Hæc Dioscoridis delineatio Chelidonio huic nostro planè conuenit. Est enim fruticosa herba cubitali altitudine: cauliculis rotundis, lanuginosis, teneris, furculosis: foliis rannunculi, siue aquilegiæ tenuioribus, magis incisis, & magis angulosis, aduersa parte cæsis, auersa incanis: floribus in furculorũ summitate venustis, luteis, leucoio similibus: semine papaveris exiguo, pallido, quod in corniculis seu siliquis longis, exilibus includitur. Vulnerata succũ croceum emittit, gustum vellicantem: radix superiore parte vna, inferiore multis luteis fibris capillata. In locis opacis, parietinis, hortorum scrobiumque marginibus passim obuia. Mense Aprili florere incipit, atque adeo toto deinceps Vere & estate floret. Tertij ordinis est in calcaciendo & desiccando. Succus eius mixtus melli, inquit Dioscorides, & in æneo vase prunis decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Exprimitur succus ex foliis, radicibus, & floribus ineunte æstate, siccatũque in vmbra, & in pastillos conformatur. Radix cum aniso & vino albo pota, impositaq; etiam cum vino, regio morbo, serpentibũque vlceribus medetur: manducata autem dentium dolorem sedat. Eadem Plinius tradit. Florentibus succus exprimitur, & in æneo vase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur. Galenus enucleatius eadem docet.

*Li.25. ca.8.**Li.8. simpl.**In cap.176. lib.2.**Li.& ca.6.*

Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est: sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, vtique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atque disculsiõem indigens. Vsi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione iocinoris proficiscentem, in vino albo potui exhibentes cum aniso. Similiter mansa confert dentium doloribus. Herba in calceis delata, inquit Matthiolus, si nudis pedibus contingatur, ictericos sanare creditur. Eadem mammis mulierum admota mensium abundantiam sistit. Tusa herba vnà cum radice & oleo chamæmelino feruefacta, & vmbilico illita, tormina ventris, & vteri dolores tollit. Totius plantæ pulvis vulnera vlceraq; sanat. Succus ad oculorum maculas, argema, nubeculas, & cicatrices plurimum præstat: verum cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. Idem cauis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Cadunt quoque verrucæ & arefcunt, si frequenter eo illinantur. Quod Plinius & Dioscorides in capitis calce scripserunt hirundines pullis Chelidonio visum restituere, etiam erutis oculis, Celsus fabulosum esse scribit: id enim sponte naturæ per se fieri. Eius hæc sunt verba. Extrinsecus verò interdum si oculum ictus lædit, vt sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est quàm sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causâ fit, quum horum acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui,



restitui, quod per se sanescit. Id quod ab Aristotele Celsus mutuatus est, qui lib. de animal. ortu, inter aues quæ cæcos pullos excludunt, recenset etiam hirundines, quarum si quis, dum adhuc iuvenes sunt, oculos pungat, rursus sanantur: dum enim fiunt, nondum perfecti sic corrumpuntur: quare rursus nascuntur, & producantur. Id enim significant Aristotelis ipsius verba: Τῶν χειρὶ δόντων ἐάν τις ἐτι νέων ὄντων ἐκκενθήσῃ τὰ ὀφθαλμοὺς, πάλιν ὑγιαίνει. γινώσκουσιν γὰρ, ἀλλ' ὁ γεγεννημένων φθείρεται. Διόπερ φύνονται, καὶ βλάπτουσιν ἐξ ἀρχῆς.

EUPATORIUM,

CAP. XX.

**E**ΥΠΑΤΟΡΙΟΝ vel ἡπατόριον Græcis, Latinis Eupatoriū, siue Hepatorium, Arabibus *Casal*, *Casil*, seu *Gafel*, Officinis Agrimonia, Gallicis *Eupatoire*, & *Agrimoine*, Germanis *Odermenig*, & *Bruchwurte*. Eupatorium verò ab Eupatore rege, qui illud primus inuenit nominatum esse volunt. Hepatorium autem, quod iecori potissimum medeatur. Eupatorium, describente Dioscoride, herba est fruticosa, (vel melius surculosa, φρυγανώδης: non enim fruticat quæ vno tantum scapo surgit,) vnum efferens scapum, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem: folia ex interuallis filia in partes maximè quinque, aut etiam plures, quinefolij aut cannabis potius folijs similia. Sunt & ipsa subnigra, & ferræ modo in extremitatibus diuisa (legendum Græcè περινοφιδῶς ἐν τῇ ἐκτελει, non περινοφιδῶς, idest, ilicis modo incisa: quamquam, si sic legatur, non mutatur sententia, sunt enim ilicis folia ferræ instar incisa:) semen à medio caule enascitur subhirsutum, deorsum mutans, vt etiam siccatum vestibis inhæreat. Similiter Plinius. Eupatoria quoque, inquit, regiam auctoritatem habet, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, cubitalis, aliquando & amplioris: folijs per interualla quinefolij, aut cannabis, per extremitates incisis quinquepartito, nigris & ipsis, plumosisq; radice superuacua. Ex hac delineatione notisq; omnibus planè cõstat nostratam Agrimoniã, verum esse Dioscoridis Eupatorium. Præterea nomen argemone in agrimoniã detortum idem testatur, quod argemonen errantes quidam Eupatorium esse arbitrabantur, vt in fine capituli scribit Dioscorides: quo loco tamen codices Græci corrupti sunt: ἐνιοὶ τὴν ἀργεμισίαν, ἐκάλουν, περινοφιδῶς: non enim legendum est ἀργεμισίαν, sed ἀργεμισίαν. Hanc enim aliam esse quàm Eupatorium iam dixerat. ἐνιοὶ περινοφιδῶς τὴν ἀργεμισίαν ὡς πατόριον ὀνομάζουσιν. Idest, Sunt qui errore ducti argemonen Eupatorium nominant. Vires etiam agrimoniæ cõsentiunt multò magis, & multò plures quàm quas Dioscorides enarrauit. Verum tamen attentiores Herbarij in Dioscoridis & Plinij historia non abs re dubitant, & hærent quoniam pacto in Agrimonia folium obseruari possit, vt monstrat historia, Cannabi vel Pentaphyllo simile, & pariter vt in vtraq; illa planta, in quinque partes, vel etiam plures diffusum, cum Agrimoniæ folium vnicum sit, & porrectum simpliciter, nisi fortè existimandum sit, in Græcia plantam hanc folia mittere illo modo diuisa, vt multarū speciẽ figuramq;

Nomina

quæ argemone  
quæ argemone  
quæ argemone

Lib. 4. c. 37.

Forma.

Li. 25. ca. 6.

Li. 2. c. 172.

EUPATORIUM  
Verum, Matth.





Pena in  
Aduers.

videmus loci diuersitate mutari. Planta hæc est vulgaris notitia, frequentissimi vsus & commodi, fruticosa, cubitum & sesquicubitum alta, caulem producens sæpissimè vnicum, durum, lignosum, tenuem, rectum, striatum, angulosum, hirsutum, subpurpureum, cuius ramulis folia quasi pediculo innixa foliorum vlmariæ, aut potentillæ, aut rosæ effigie, hirsuta, nonnihil incana: flores à medio caule ad summum vsque exigui, lutei, stellati, pentaphylli minores, vbi seminum series lapposa hirsutæque pannis hærens, quos vel tactos mordicus tenet: medulla intus alba, sapore non ingrata, vti nec tota planta: radix crassa, satis longa, fusco rubore, dura. Huius legitimi Eupatorii vice pharmacopœi ferè omnes in decoctis suis, & medicamentorum cõpositionibus Eupatorium illud cannabinum suè potius pseudoeupatorium vsurpant: de quo iam diximus. Alij quòd plantas istas distinguere non norint, alij vel quòd pseudoeupatorio suo maiores inesse vires experientia compererint, vel quòd etsi agrimoniam verum Dioscorides Eupatorium esse non ignorent, tamen à consueto errore deduci nolint. Agrimonia in satorum & viarum marginibus, & circa sepes, & in pratis prouenit. Æstate floret, Autumno semen maturum est. Maio mense colligenda est & siccanda, quæ in medicos vsus asseruatur. Huius folia, auctore Dioscoride, cum adipe suillo veteri trita & imposita vlcera difficilè, cicatricem contrahentia sanant. Herba & semen in vino pota dysentericis, iocinorosis, serpētium moribus auxiliatur. Idem de semine Plinius. Semen dysentericis in vino potum auxiliatur vnicè. Galenus μεθοδιον εἶπερ easdem facultates exponit. Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi, extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quare obstructions iecoris expurgat. Inest itidem ei & adstrictio quædam, per quã robur visceri addit. Radix exsiccat, & moderatè adstringit: quare externis & internis affectibus perutilis: pota enim viscerum, hepatis præsertim tonum restituit, intemperiem ferè omnem corrigit, obstructions aperit. Praterèa decoctum dilutumve eius colore limpido vini gilui placet. Serapio in iis recenset, quæ primo ordine calida siccæque sunt.

Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 37.

Vires.

Li. 25. ca. 6.

Li. 6. simpl.

Pet. Pen. in  
Ad.

Cap. 77.

## BALLOTE,

## CAP. XXI.

Nomina



ΑΛΛΩΤΗ & μέλαν παράσιον Græcis, Latinis Ballote, Officinis Marrubium nigrum, Marrubiastrum, Prasium foetidum, Gallis Marrube noir, & Marrube puant, Italis Marrobiastro, & Marrobio bastardo, Germanis Schuuartz Andorn, Hispanis Marroio negro. Marrubium à foliorum similitudine, nigrum à colore, qui ad colorem fuscum magis vergit quàm in Marrubio, dicta est Ballote: Prasium foetidum ab odore graui, & foetore. Ballote caules edit quadrāgulos, nigros, subhirsutos, ex vna radice plures: folia marrubio similia, sed maiora, rotundiora, hirsuta, vel, vt alij, densa, (Oribasius addit μέλανα, idest, nigra: nec abs re, quod alteri eius nomini bellè conueniat, quòdque ita descripserit Plinius, Ballote foliis est marrubij, maioribus, & nigrioribus,) per interualla in caule disposita, similia apiastro, graueolentia, vnde etiam apiastrum vocauerunt. Flores in rotæ speciem caules ambiunt. Plinius similiter depingit. Ballote alio nomine Μέλαν παράσιον Græci vocant, herbam fruticosa, angulosis caulibus, nigris, hirsutis: foliis vestientibus maioribus quàm porri & nigrioribus, graueolentibus. Sed quod μέλαν παράσιον pro μέλαν παράσιον legit, & φύλλοι παρσίον μελίονα foliis maioribus quàm porri conuertit, ita vt Prasium, idest, marrubium in παρσίον, idest, in porrum sæpius commutarit, in hoc, vocum similitudine deceptus, vehementer errat. Ex his veram Balloten hîc depictam esse cõstat, quod illa sit fruticosa herba, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè. Folio marrubij, sed maiore, piloso,

Forma.

Lib. II.

Lib. 27. c. 8.

Ibidem.



QVÆ IN VMBROSIS NASCVNTVR, LIB. XI. 1253

BALLOTE, *Matthioli.*



piloso, cingente caulem per intervalla, odore graui: floribus purpureis, verticillatim caulem circumplectentibus. Nascitur vmbrosis in locis, propè sepēs, cœmeteria, vias & domos. Floret in fine Iulij mensis & initio Iulij, quo tempore commodè carpi potest. Amara & acris est, idè calfacit in secundo ordine iam còpleto, aut tertio remisso: desiccatur autem in tertio.

*Locus.*

*Tempus.*

*Temper.*

Huius folia, inquit Dioscorides cum sale trita canis moribus medètur. Feruenti cinere flaccescunt, vt condylomata reprimat: sordida vlcera cum melle purgant. Quæ Plinius iisdem

*Li. 3. ca. 100.*

*Vires.*

ferè verbis retulit. Vis eius efficax aduersus canis morsus ex sale foliis tritis impositis: item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vlcera cum melle. Galenus Ballotes ne meminit quidè in simpl. medicamen.

*Lib. 27. c. 8.*

*Lib. 7.*

censu. Sed Paulus acrem & absterforia facultatis esse ait. Vnde cum sale impositam ad canis morsus prodesse, non rabiosi, sed eius qui alias momordit, vt idè alibi testatur. Est alia doctis herbariis dicta Ballote minor, seu crispa, circa

*Lib. 5. ca. 4.*

sepēs, ædificiorum areas, semitas, ruderà, nascens: solo gracili & macro: radice candida, fibris quâ plurimis tenuissimis capillata: cauliculis multis fruticans, quadrangulis, palmum altis: foliis subrotundis, priori Ballote similibus, latius virentibus, minus crassis, rugosis, grauiter olentibus, per intervalla in caule dispositis, & orbiculatim eam circundantibus: floribus purpureis, verticillato ambitu caulem coro-

BALLOTE *Crispa.*



BALLOTE *Crispa maior.*









latam, vulgus Lanceolam nominat. Minimam verò, cuius folia, quæ leuiter hirsuta sunt, tres tantum nervos habent, quamobrem *τρίνερυον*, id est, trineruia dici potest. Verumtamen iconibus postremæ editionis Arnoglossa nominibus aliis distincta. Plantaginem enim mediam pinxit septineruiam foliis latissimis, cauliculis

PLANTAGO Minor,  
Longa Matth.



PLANTAGO Minor,  
Dodonai.



longis, à medio floribus spicatis, caudas muriû referentibus. Hæc est Plantago vulgaris latifolia. Deinde Plantaginem maiorem, & septineruiam foliis similiter latis, cauliculis longioribus, in quibus flores vertici propiores. Tertiâ Plantaginem longam, quam quinqueneruiam & Lanceolatam appellari diximus. Dodonæus Arnoglossa exhibet: Maius, medium, de quo in Cynoglossis, minus, & marinum. Alij aliter ex foliorum magnitudine & modo Plantaginum varietates & appellationes, distinxerunt. Plantago maior amplior & latior latis constat foliis, oleracei, generis (Ruellius sic conuertit *λαχανώδες*, quod alij potius vertendum censent betæ similis: sæpè etenim Attici *λαχανον* pro beta vsurpant: quare Dioscor. eo vocabulo maiorem Plantaginem betæ similem esse indicauit, vt reuera illi maximè assimilatur, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui non generatim conueniat.) Caulis in hac est angulosus, subruher, cubitali altitudine, à medio ad summum vsque tenui semine circumdatus, radices subsunt teneræ, hirsutæ, candidæ, digiti crassitudine. Plantago minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora & tenuiora: cauliculos ad terrâ inclinatos, flores pallidos, semen in summis cauliculis. His descriptionibus Plantago nostra major latifolia, & minor pulchrè respondent. Pro minore Matthiolum eam, opinor, pingit, quam longam vocat. Dodonæus quinqueneruiam, cuius folia angustiora, rigidiora, quibusdam raris per ambitum denticulis, mucronata: radix rotundior, breuior, pluribus capillamentis depacta: cauliculi angulosi, iuncea: flores albi, stipati in glomerosis & breuioribus spicis. Est & plantago incana, Lobelij & Penæ, cui folia incana superficie pubet, rigidiora, crassiora, & in ambitum humi, nervulis magis extantibus refracta: radix crassior, longior, minusq; fibrata: rectoribus, altioribus cauliculis, floribus breuioribus, sed magis sparsis & speciosis, albis, caudatis. Iunio & Iulio defluentibus. Præterea Plantago quædam in hortis ad voluptatem colitur, cui omnia Plantaginis maioris similia præterquâ cauliculus summus, eleganti ambitu, foliolis multis, sibi equali

Lib. I. ca. 61.

Forma.

Lib. 2. c. 61.



PLANTAGO Rosea, *Pene.*

Locus.

L. l. ca. 119.  
Vires.PLANTAGO Rosea, *Lob.*

Lib. 25. c. 8.

collo suspensa ad strumas discutiendas vtuntur. Verba Plinij totam hanc rem, & Dioscoridem ipsum declarant. Celebrauit & Themison medicus vulgarem herbam Plantaginem, tanquam inuētor, volumine de ea edito. Duo eius genera, minor angustioribus foliis & nigrioribus, linguæ pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato, in pratis nascens. Altera maior foliis laterū modo inclusa, quæ

serie mutuo incumbētibz, atq; sensim in fastigium cōiūctibz, vbi quasi imbricatim squar-  
matimve sese decussantia folia vmbellam ele-  
gantem, quasi florem constituunt herbū, ut in quadam specie primulæ veris cernere li-  
cet. Semen ē medio foliorum interstitio exilit, sed priori simile. Ab hac Plantago alia à Lo-  
bellio picta, distat sola panicula spicatum spar-  
sa, onusta innumera sœtura he baceorum flos-  
culorum racematim cohærentium, in Belgicis  
hortis. De Plantagine marina alibi dicendum.  
Plantago maior nascitur in cœnosis, sepibus &  
humidis locis. Minor itidem circa aggeres, se-  
pes, prata, & lacunosa loca. Herba & flores æsta-  
tis initio, Maio & Iunio mensibus, semen Au-  
gusto carpitur. Vim habent folia, auctore Dio-  
scoride, exsiccantem atque adstringentem, ideo  
ad omnia vlcera maligna, elephantica, quæ hu-  
more scatent, & sordida conferunt. Eruptio-  
nes sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas,  
epinyctidasq; cohibent. Vlcerā vetera & inæ-  
qualia cicatrice obducunt, chironia sanant, si-  
nus glutinant. Morfibus canis, ambustis, in-  
flammationibus, parotidibus, panis profunt.  
Strumis & ægilopiis cum sale illita conferunt.  
Olus cum aceto coctum & sale dysentericis &  
cœliacis sumptū subuenit. Datur & in locum  
betæ cum lenticula coctum. In leucophlegma-  
tia post aridas epulas in medio herba decocta  
datur. Comitialibus & asthmaticis data profi-  
cit. Foliorum succus oris vlcerā continua col-  
lutione purgat. Cum creta cimolia & cerula  
erysipelatis medetur: fistulas infusus sanat. Au-  
rium doloribus & lippitudinibus succus instil-  
latus, & collyriis additus prodest: gingiuis san-  
guinolentis, & sanguinem reiicientibus potus  
confert: dysentericis clystere infunditur: bibi-  
tur contra tabem. Aduersus vteri strangulatio-  
nes in lana apponitur. Item vuluæ fluxiones &  
sanguinis excreationes sistit. Radix decocta  
collutione & manducata dentium dolores se-  
dat. Eadē cū foliis in passo ad vesicæ renumq;  
vlcerā præbetur. Ferunt tres radices, cū tribus  
vini cyathis, & pari aqua potas, tertianis auxi-  
liari, & quatuor quartanis. Sunt qui radice ē



quæ quia septena sunt, quidam eam heptapleuron vocauêre, sic *ἑπτάφυλον* vertit Plinius, re non satis explicata: aptius erat, folio tanquã costis distincto, quæ quia septene sunt, &c. Huius & caulis cubitalis est, & angulosus (sic ex vetere codice legit Cornarius nō, napi similis, vt in vulgatis habetur) Nascitur in humidis multò efficacior. Vis mira in siccâdo densandoq; corpore, cauterij vicem obtinēs. Nulla res æquẽ sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocât. Alias eius facultates & multò plures idẽ Plinius variis locis tradit. Stomachũ corroborat plâtago per se sumpta in cibo cum lente, alicã ve forbitione. Strumis medetur. Semen eius in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut alica ex succo eius sumpta, dysentericis datur. Lichenis fœdo malo medetur trita. Vitia sedis & attritus celerrimẽ sanat. Ex aqua mullâ duabus horis antè accessionem pota duabus drachmis, tertianas leuiores facit, vel succus radices madefactæ, vel tulsq; vel ipsa radix trita in aqua ferro calefacta. Quidã ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Idẽ in quaternis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo, cum prius panẽ siccum comederint, sine potu: folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagræ rubentis, hoc est, calidẽ conueniunt. Oris vlcera succus emēdat, & folia radiceq; cōmanducata, vel si rheumatismo laboret os. Vicio reiectionis sanguinis idẽ medetur, phthisimi sanat si bibatur, & ipsa decocta in vino cum sale & oleo à somno matutino refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tuls, addito sale modico, fistulis infusus succus auxilio est. Sanguinis profluuiũ sistit semen, si ore reiciatur, siue aluo fluat, siue fœminarum vtero. Succus vomentibus sanguinẽ datur. Contusis, euerfis omnibus modis ipsa sumitur. Medetur omnium generũ vlcerebus, peculiariter fœminarũ, senum & infantium igne mollita, melior & cum cerato. Sed vt eas vires habeat plâtago, quas Dioscor. & Plin. ipsi tribuunt, tẽperamētum eius mixtũ facit, quod declarat Galen. his verbis. Plâtago mixtẽ est tẽperaturẽ, habet enim quiddã aqueum frigidũ, & austerum quiddã, id quod terreũ est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul & desiccatur, & in vtroq; secũdi excessus à mediis est. Porro medicamenta quæ cum hoc quod refrigerant vnã etiã adstringunt ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profluvia sistũt, & si quid aduratur refrigerant: tum sinus quoq; glutinant, & alia vlcera recetia simul & vetera. In omnibus ferẽ id genus medicamētis primas tenet, aut certẽ nulli secunda est plantago idq; tẽperaturẽ symmetria & cōuenientia, siccitatẽ enim obtinet morsus expertẽ, & frigiditatẽ quæ nondũ obstupefaciat: & fructus & radix similis sunt facultatis, nisi q̃ tum siccioris, tum minũs frigidæ. Sed & semẽ subtilium est partium: radices verò crassiorum, atq; herbæ folia exsiccata subtilium partium existunt, & minũs frigidæ facultatis: nẽpe diffilat ex eis ac digesto excremẽto aqueo. Hac ratione & radicibus vtuntur ad dentiũ dolores, tum mandentes, tum collusionibus incoquentes. Præterea ad iocinoris & renum obstructions nō has tantũ adhibet, sed folia quoq; & multò magis semina. Hæc enim omnia quandam in se abstergerendi facultatẽ obtinēt, quam & in tota herba viridi inesse satis conici potest, verũ ab humiditatis copia deuinci. Insignes alias eiusdem facultates neoterici prædicāt, maioris & minoris semen tritum ouoq; exceptum, & calente regula inassatum, dysentericos iuuare frequenter deuoratum. Succus ex rosaceo fronti adhibitus capitis dolores à causa calida ortos mulcet. Datur quoque vtiliter ad cruenta sputa cum armenia bolo, aut hæmatite lapide. Idem eum millefolij succo mixtus cruẽtam vrinam reddentibus mirificẽ medetur potus, præsertim addita philonij perfici drachma. Illinitur quoque rectẽ erysipelatis cum aceto & solani sedique succo. Stillatitia plantaginis aqua cum æquali aceri acerrimi portione sanguinem è naribus fluentem cohibet, si lintheola in eã madefacta pedum plantis, manuum vòlis, & iocinori applicentur.

Embl. 112.  
lib. 2.

Lib. 6. sim.

Marthin  
c. 119. lib. 2.



**Nomina** GENTIANH Græcis, Latinis & Officinis omnibus Gentiana, Germanis *Entzian* & *Bitterwurtz*, Gallis *Gentiane*. Sic à Gentio Illyriorum Rege, qui in bello primus eius vires reperit dictam fuisse testantur Dioscorides & Plinius. Alij, inquit Apuleius, Aloen Gallicam, alij Narcen, alij Chironium, alij Cyminalem vocant, folia Gentianæ iuxta radicem erumpunt, iuglandi aut plantagini similia, subrubentia: quæ verò à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, breviora sunt & angustiora, vno verbo, minora. Est enim apud Dioscoridem legendum: τὰ δὲ ἐν μέσῳ τοῦ καυλῶ καὶ μάστιγα τὰ καὶ ἄκρον ἔχοντα, μικρότερα. Caulis illi magnus, lævis digiti crassitudine, binum cubitorum, interdum hominis altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus interuallis folia proferens. Flores lutei, primum calicibus cōclusi, postea intumescētes explicantur, semen in calicibus habet latum, læue, acerosum, ad spōdylij semē accedens, radicem longam, similem aristolochiæ longæ, crassam, amaram, intus flauam. Plinius Dioscoridis descriptionem non omnino expressit his verbis. Gētianam inuenit Gentius Rex Illyriorum, ubiq; nascentem, in Illyrio tamen præstātissimam, folio fraxini, sed magnitudine lactucæ: caule tenero, pollicis crassitudine, cauo & inani, ex interuallis foliato, triū aliquando cubitorum: radice lenta, subnigra, sine

## GENTIANA.



Lib. 25. c. 7.

**Locus.****Tempus.****Temper.**

Lib. 2. c. 288

Lib. 3. ca. 3.

**Vires.**

Lib. 25. c. 7.

Ibid. cap. 8.

Ibid. cap. 12

Lib. 26. c. 14

odore, aquosis montibus sub alpinis plurima. Vfus in radice & succo. Nascitur in altissimis montium cacuminibus, in locis vmbrosis & aquosis, elleboro albo foliis ac natalibus adeò affinis, vt parum exercitatum eminùs fallat. Floret æstate, Iunio potissimùm mense: dein Iulio semen producit. Auicenna Gentianam calidam esse scribit ordine tertio, siccam secundo. Radix calfacientem & adstringētem vim habet, vt tradit Diosco. Venenatorum moribus succurrit duarum drachmarum potere cum pipere, ruta, & vino pota. Succus drachma laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & conuulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita partus eiicit. Vulneraria est imposita vt lycium: vulneribus sinuatim depascentibus potissimùm succus medetur: oculis inflammatione laborantibus illinitur: cum meconio collyrii acris misceatur succus. Apud Dioscoridem μεζῶ, loco ἀντὶ, legēdum esse res ipsa monstrat. Non enim medicamentum frigidissimi loco substituitur, quod calidum & siccū est: radix vitilignes absterget. Plinius hæc quidem breuiter. Radicis natura est excalfactoria, sed prægnantibus non bibenda. Reliqua verò à Diosco. tradita sparsim idem Plinius habet. Gentiana præcipuè aduersus angues, duabus drachmis cum pipere & ruta, vini cyathis sex, siue viridis, siue sicca. Et, Adiungunt & Gentianæ succum, quem collyriis acrioribus cum meconio miscent. Item, Illinitur autem gentiana vlceribus quæ serpunt, radice tusa vel decocta in aqua ad mellis crassitudinem, vel succo: vulneribus ex ea factum lycium. Sic enim habent vulgati codices, & sic locus intelligi potest. Sicut lycium ex sua planta expressum, ita succus ex Gentiana velut lycium expressus vulneribus imponitur, quod dilucidius Dioscorides expressit. ἐστὶ δὲ καὶ βαμνισμὸς ἐπὶ τὴν μένιν



τὴν αἰσθησὶν ὡς τὸ λυγρὸν. Aliis in locis. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non tufficientibus modo, sed ilia quoque trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota, farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interaneorum vitiis occurrit. Radix trita vel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur. Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ radix, inquit, multū est efficax, cū opus extenuatione, absterfione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirū si hæc possit, cū impenfè amara sit. Hęc Galenus. Gentianæ radix vrinam & menses ciet, aduersus scorpionū ictus cæteris antidotis præstat. Eius aqua stillaritia febres ab infarctu tum viscerū, tum nasorum excitatas mirificè sanat. Alui lumbricos necat, maculas in facie quascunq; deterget, si ea frequētius abluantur. Eadem radix in vinum immissa ad lassitudinem discutiendam, & appetitum excitandum commendatur. Putredinis hostis est infestissima, & veneni mors. Pesti adeò remedium præfens, vt non modò homini, sed etiam brutis incommoditatem tueatur, & amissam instauret.

Lib. 6. sim.

Matth. in cap. 3. lib. 3.

Pet. Pen. in Adu.

CRUCIATA, CAP. XXIIII.

**A**CIÆ & facultatibus adeò affinis est Gentianæ hæc planta, vt docti Gentianæ speciem faciant, quare Gentiana minor à quibusdam dicitur, vulgò Crucjata, prisco nomine nondū comperto. Sic autem nūcupatam quidam existimant, quòd radix secundū longitudinem tripartito aut quadripartito fissā sit, sed foliis cruciatim cauli incumbētib; nominis

Nomina

CRUCIATA siue Gentiana minor, Matth.

CRUCIATA siue Gentiana minima, Matth.



etymum potius debetur, Gallicè *Croifette*, Germanicè *Madelgeer*, nominatur. Caule est rotundo, dodrantali, ac etiam maiore, in summo rubefcente, paribus ferè intervallis ab imò ad summum geniculis intersecto, à quorum singulis alis bina prodeunt folia, crassa, angusta & oblonga, vulgaris saponaria æmula, & gentianæ foliolis in summo caule erumpētibus similia: flores purpurei vel cærulei diluti in summitate circum

Forma.



*Locus.* circum caulem in orbem ex cauliculis herbacei coloris exeunt. Radix alba, longa, amarissima, locis aliquot ab utroque latere crucis instar perforata. Multa & passim  
*Tempus.* oritur locis incultis, sed non ita arduis ut Gentiana: floret Iulio mense. Ex summa  
*Temper.* amaritudine calidam & siccam esse colligere licet, & viribus Gentianæ proximis  
*Vires.* præditam. Recentiores magnum eius contra pestilentia venena usum esse affirmant: item ea quæ in thorace hærent educere posse, hausto foliorum aut radicis decocto, aut sumpta eius siccata farina. Menses mouet, comitialibus prodest. Vino in quo inferbuerit vulnera & vlcera maligna lauasse & fouisse prodest, aut puluerem in ea iniicere: deterget enim & glutinat. Est alia Cruciata, minor cognominata, quæ ad Rubiæ & Aparines similitudinem quadatenus accedit, sed mollis & hirsuta herba, cauliculi tenelli, quadrangulares, geniculati, folia è singulis internodiis quaterna, decussata, breuiora, sed latiora ferè quàm Aparines. Flores exigui verticillatim cauliculos ambiunt, dilutè lutei: radices subsunt perquam tenues. Iuxta fossas, riuulos, & quandoque agrorum margines, inter sentes, à Maio ad finem vsque æstatis reperitur, & cum flore. Matthiolus addit Cruciatam minimam.

## VNIFOLIUM,

## CAP. XXV.

*Nomina**Forma.*

OLIO etiam plantaginis est vnifolium, Germanis *Einblat* dictum, Gallis *Unesueille*. Quare *μονόφυλλον* possumus appellare. Gramen est Parnasi Cordi & Loniceri. Foliū vnum per initia ab imo promit. Deinde semine iam perfecto in cauliculo rotundo & tenero, duo prodeunt

## VNIFOLIUM.

*Locus.**Tempus.**Temper.**Vires.*

folia priori similia, sed minora, plantaginis figura, & nervulis striata, superne acutiora, alterum superiore est loco: flores supereminet albi, galij odori: deinde acini parui, rotundi, pallidi initio, dum maturuerunt rubentes, gustu amaro & ingrato, radix gracilis & geniculata, transuersim euagatur. Umbrosis lucis & nemoribus frequens. Maio mense floret. Temperie est calida siccaque. Recentiorum quorundam sententia vnifolij radix aduersus pestem, & omnè genus veneni singulare est remedium, hausta statim initio pulueris eius. semidrachma cum vino generoso aut aceto, aut utroque, ita ut cum æger hauserit in lecto sudet. Folia cum radice recentibus vulneribus admoouisse prodest, quod ea ab inflammatione & suppuratione tueantur.

## BIFOLIUM SIVE OPHRYS

## Plinij. CAP. XXVI.

*Nomina**eygmon*

Lib. 26. c. 15




R. T. V. folio quoque, plantagini simile est Germanorum *Zuyblat*, id est, bifolium à geminis foliis, Gallicè *Double feuille*, à nonnullis ob foliorum cum plantagine similitudinem, & quod locis humentibus familiaris sit, Damafonium creditum: à quibusdam Gramen Parnasi, à Dodonæo Pseudorchis bifolium, ab aliis perfoliatæ species, ab aliis Elleborine, ab aliis, & rectius quidem, Ophrys Plinij: non quod fucandorum supercilliorum facultate, hanc plantam præditam esse compertum sit, sed à binis foliis. Caule est rotundo, læui, duo duntaxat proferente folia, vtrinque vnum ex aduerso, plantagini

*Forma.*



OPHRYs.



tagini maiori similia, viridantia, secundum longitudinem  
fibris distincta, à medio ferè caule ad summum vsque cali-  
culi vtrinque multi sunt, & in his velut linguæ dissectæ, nu-  
tantes flosculi, ex pallido siue ex flauo herbacei, quos etiam  
muscis, siue paruulis volucris plumis exutis comparare  
possis, nec non testiculorum quorundam floribus. Radix  
subest tenuis, cum adnascantibus radiculis multis, oblon-  
gis & odoratis. In montibus, pratis vdis & frigidioribus  
frequens nascitur. Maio & Iunio mensibus floret, dein  
statim euanesceat, quare hoc potissimum tempore colligen-  
da. Gustanti glutinosa esse apparet, & quodammodo dul-  
cis, ideò calidam & siccam esse coniicere licet. Cum igitur  
facultate non sit adstringente, damasonium esse nequit,  
tamen ad fracturas & vulnera conglutinanda hac herba re-  
centiores vtuntur. Capillum denigrat Ophrys herba, in-  
quit Plinius, denticulato oleri similis, foliis duobus: qui-  
dam hoc loco censent legendum, lenticulato, betam ex-  
ponentes, quam ideò sic dictam volunt, quòd ea sæpissi-  
mè cum lenticula vescerentur olim, cibum eiusmodi τετρα-  
φάειν nominantes.

Locus.

Tempus.

Temper.

Fuch. c. 213.

Pet. Pen.

in Ad.

Lib. 26. c. 15.

CYNOGLOSSVM,

CAP. XXVII.



T arnoglossò ab agnina, ita Cynoglossò à canina lingua nomen de-  
derunt antiqui. Græcis igitur κυνόγλωσσον & κυνόγλωσσος dicitur, La-  
tinis Cynoglossum & canina lingua, Officinis Cynoglossa, & lingua  
canis, Gallis *Langue de chien*, Germanis *Hundszung*. Quamnam autem ex  
aliquot plantis, quas ad caninæ linguæ speciem natura effinxit, verum sit & facie  
& viribus Cynoglossum, magna est inter herbarios contentio, cum ne veteres qui-  
dem in huius herbæ delineatione consentiant.

Nomina

CYNOGLOSSVM,

Quorundam.



Dioscorides enim Cynoglossò caulem adimit,  
quem Plinius eidem tribuit. Sic igitur describit  
Dioscorides. Cynoglossum folia plantagini lati-  
foliæ similia habet, sed angustiora, minora, &  
lanuginosa, caulem non habet, & humi sterni-  
tur. Plinius verò. Iungitur & Cynoglossos cani-  
nas imitans linguas, topiariis operibus gratissi-  
ma. Aiunt, quæ tres thyrsos seminis emittat, eius  
radicem potant ex aqua ad tertianas prodesse,  
quæ quatuor ad quartanas. Est alia similis ei quæ  
fert lappas minutas. Eius radix pota ex aqua ra-  
nis & serpentibus aduersatur. Recentiores ad vi-  
res attenti, & ad eos effectus quos catapotia de  
Cynoglossa inscripta pollicentur, aliud atque  
aliud Cynoglossum ostendunt. Nonnulli plan-  
tam eam, quæ Plantago media à Dodonæo no-  
minatur, ab aliis plantago villosa seu sessilis, quæ  
plantagini maiori seu latifoliæ similis est, nisi  
quòd folia habet angustiora, minora, parum hir-  
suta, caules quoque hirsutos in summo spicas  
proferentes

Li. 4. c. 14.

Li. 25. ca. 8.

Lib. 1. c. 61.

Forma.



proferentes breuiores quàm in maiore plantagine: flores ex albo purpureos: radicem candidam & longiorem. Locis humidis & herbidis, secusque vias nascitur, frigido siccoque est temperamento ad tertium vsque ordinem. Est aliud Monspe-  
*Locus.* liensium vulgare Cynoglossum, cui folia sunt mollia, leuia, lanugine pauca, ad ta-  
*Temper.* tum minimè aspera, mollitie & effigie lingue  
 Cynoglos. canina, vel glasti, nonnihil venosa, albicantia,  
 Monspe. plantagine latifolia arctiora: caulis rotundus,  
 Per. Pen. in incanus, in alas diuisus, quibus flores punicei,  
 Adu. angusti folij buglosi, paruum semen, lappulis  
*Forma.* hirsutis vel clypeolis contentum, vestibus, vt  
 agrimonie & caucalidis pertinaciùs hærens.



*CYNOGLOSSUM* Vulgare floridum  
 Matth. secundum Plinij.



Pinguibus & sabulosis locis prouenit, sed hic pusillum, & vix sesquipalmum aut pedem excedens, alibi pinguibus & humentibus aruis multo procerius. Quantum ad caulem & flores at-  
 tinet, nullos fert nonnullis annis, præcipuè im-  
 bra salinea aut vicinis sepibus opacatum, aliis  
 annis, & aliis in locis caulem & flores & semen  
 promit. Si vires considerentur, nulla est quæ  
 potiores aut conuenientiores habeat, & quæ  
 omnes quos pollicetur certiores quàm hæc ef-  
 fectus præstet. Ambustis siquidem opitulari vel  
 mulierculæ sciunt, refrigerandi scilicet manife-  
 sta qualitate & siccante, dolorémque leniente,  
 & maiorem affluxum prohibente, præsertim cum  
 axungia liquefacta, feruidave instillata: eadem  
 alopeciis, ab acri & erodente humore capillis  
 defluentibus, confert. Præterea emollit aluum  
 visua malactica & mucrosa vino incocta quod  
 eius frigiditatem retundit. Radix symphyti est  
 magnitudine, muccore & colore, odore penè  
 soporifero, maximi hodie vsus ad acres & re-

*CYNOGLOSSUM*,  
 Matthioli.





nues fluxiones: magis tamen spissat quàm refrigerat. Quare catapotis ad acrem & tenuem fluxionem sistendā Trallianus immiscet, quæ recipiunt myrrhæ drach- Lib. 2. c. 4.  
mas septem, hyoscyami, opij singulorum drachmas quatuor, corticis radicis Cy-  
noglossi herbæ drach. quatuor & semiss. Ea similiter descripsit Mesues ad catar-  
rhum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus, addita croci drach. vna &

CYNOGLOSS. *Vulgare Matth.*  
*Lycopsis Lacuna.*



LYCOPSIS *Anglica,*  
*Lobellij.*



femisse. Matthiolas legitimum & Dioscoridis Cynoglossum quod neque cau- In cap. 124.  
lib. 4.  
lem, neque flores, neque semen gignit, se adinuenisse putat, sæpius à se tum visum,  
tum lectum Romæ post Adriani molem in sabulosis quibusdā locis enatum, quod  
à vulgari Cynoglossō quo pāsīm Officinæ vtūtur, longissimè distat: quippe quod  
in radiantis Solis morem folia fert suppinguia, tenui lanugine albicātia, humi stra-  
ta, caule perpetuò viduum. At Penæ & Lobellio hæc planta non Cynoglossum  
sed Lycopsis, vel degener anchusæ Æginetæ esse videtur, non perpetuo caule ca-  
rens, verum toto quidem anno caulem florēmq; nullum edens, sed vno & inter-  
dum altero anno post, æstate caulem sesquicubitalem gignens, rotundum, hirsu-  
tis alis multis diuisum, iuxta quas & folia erumpunt ex interuallis, florēsq; echij  
fimbriati, diluta purpura, exili stamine: semen borraginis, minus nigrum: radix  
crassior digito rufescit lignosa, parum aut nihil attrectantem inficiens. Huic iun-  
git Lobellius Lycopsin alteram Anglicam, quæ via qua Bathonia & Bristolia Lon-  
dinum itur, per messes multa & læta visitur, hilari aspectu, floribus tantum distans,  
quos non secus foliorum & alarum interualla, sed in summis caulibus habet satura-  
tione purpura.

QVINQVEFOLIUM, CAP. XXVIII.

**Π**ΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcis, Quinefolium Latinis & Officinis & *Nomina*  
Pentaphyllum, Gallis *Quintefueille*, Germanis *funffingerkraut*. Nomen à nu-  
mero foliorum habet: in vnoquoque enim pediculo quinque esse depre- Lib. 4. c. 38.  
henduntur. Dioscorides vnicum Quinefolij genus posuit. Ab herbariis aliis *Genera.*

P P P




QUINQUEF. Luteum,  
maius.

Idem.  
Quinque-  
folium  
maius.  
Forma



Lib. 9. hist.  
cap. 14.

QUINQUEF. Luteum,  
minus.

Lib. 25 c. 9.

Quinque-  
folium lu-  
teum minus.  
Forma

quod obscurum est & ambiguum, quæ enim fraga gignit herba, alia à Quinquefo-  
lio est, nec quina in singulis pediculis, sed terna folia habet. Quinquefolium luteu  
minus superiori persimile est foliis, per terram serpendi modo, caulibus, floribus,  
nisi quod multo minus est, nec ita facile cauliculis terræ hærentibus propagatur,  
folia

tria, ab aliis quatuor, vel quinque animaduerſa  
ſunt genera, ſorum colore & ſolis diſtancia.  
Quinquefolium, ita deſcribente Dioſcoride, ra-  
mulos fert feſtucarum ſimilitudine graciles, do-  
drantales, & in iis ſemen: folia menthæ ſimilia,  
in ſingulis pediculis quina, raro plura, in ambi-  
tu ſerrata: ſtorem ex candido pallescentem, au-  
ri amulum: radicem ſubrubiã, oblongam el-  
leboro nigro craſſiorem. Quibus verbis Dio-  
ſcoridem Quinquefolium maius luteum deli-  
neare perſpicuum eſt. Etenim ex vna radice ob-  
longa & ſubruba ramulos emittit tenues & ſe-  
ſtuaceos, ſeſe quã ſolum ſubierint propagan-  
tes; in ſingulis folia quina, in ambitu ſerræ mo-  
do crenata, methæ ſimilia: flores luteos vel au-  
reos, in quina folia diuiſos, qui cum depereunt  
in parua veluti mora vertuntur, fragis ſimilia,  
in quibus ſemen. His accedunt natales, & infi-  
gnis adſtringendi facultas, de quibus mox dice-  
mus. Præterea radix quadrata cum arida facta  
fuerit, quod veriſſimè obſervatum eſt à Theo-  
phraſto ſic ſcribente. ἡ δὲ τῆς πένταφύλλου, ἡ πέν-  
ταπέτης (καλεῖται γὰρ ἀμφοτέρως) ὀρυζομένη ἐρυθρὰ,  
ξηραίνουμένη ὁ μέλαινα γίνεται, καὶ τετραγώνος. ἔχει δὲ  
τὸ μὲν φύλλον ὡς περὶ δινάρον, μικρὸν δὲ καὶ τὴν χροίαν  
ὁμοίαν, καὶ ἀνέεται καὶ φθίνει ὅμοια τῷ ἀμπέλω. πάντα  
δὲ πέντε τὰ φύλλα. διὸ δὲ ἡ προσηγορία. καυλὸς δὲ ἐπὶ  
γῆς ὡς ἰσὶ λεπτοῦς, καὶ κνήμας ἔχει πυκνάς. Id eſt, Ra-  
dix Quinquefolij ſive quinque peti (nam hoc  
etiam nomine appellatur) cum effoditur rubra  
eſt, arida verò nigreſcit, & quadrata fit. Folium  
habet Arbuti δινάρου paruum, colore illi ſimile,  
augetur & deſinit vnà cum vite, folia omnia  
quina, vnde ei nomen, caules emittit ſuper ter-  
ram, tenues, & crebris internodiis conſtat. His  
ſimilia Plinius tradidit. Quinquefolium nulli  
ignotum eſt, quod etiam fraga gignendo com-  
mendetur. Græci vocant Pentapetes, ſive Cha-  
mæcelion, vel, vt alij, chamæmelum, ſive penta-  
phyllum. Quum effoditur rubram radicem ha-  
bet. Hæc inareſcens nigreſcit, & anguloſa fit.  
Nomen à numero foliorum habet. Et ipſa her-  
ba incipit & deſinit cum vite. Adhibetur &  
purgandi domibus. Hæc ex Theophrasto con-  
uerſa eſſe conſtat, præter illud quod Quin-  
quefolium fraga gignendo commendari dicit,






folia ferentibus minora, quâ terram spectant, albicantia. Quinquefoliû candidum  
 magnitudine ferè par Pentaphyllo luteo maiori, cauliculis repentibus, teneris, gra-  
 cilibus, & foliis in quinque diuisis simile, nisi quòd caules hirsuti sunt, folia longa, *Forma.*  
 antèrius duntaxat crenata, flores candidi sunt: radix non simplex, sed adnata & ra-

PENTAPHYLLVM Album,  
 Matthioli.


PENTAPHYLLVM  
 Rubrum, Dodonæi.





diculas multas habens huc illuc vagantes. Quinquefolio rubro Pentaphyllis aliis haud abſimili, præſertim luteo maiori folia quinq; partita, toto ambitu crenata, infernè candicantia, ſupernè nigricantia: caulis palmum vnum aut pedem altus,

*PENTAPHYLLVM Flore*  
*albo & rubro, Lobellij.*



*PENTAPHYLLVM*  
*Supinum, Tormentillæ facie,*  
*Lobellij.*

*Locus.*

*Tempus.*  
*Lib 4. c. 38.*  
*Vires.*



colore fusco aut rubescente, geniculatus, lævis, in cuius summo flores sæpius bini, saturato rubore: deinde veluti mora parua, rotunda, fragorum instar rubescencia, sed duriora, in quibus semen includitur: radix tenera huc illuc dispergitur. Sunt apud Penam & Lobellium duo alia Pentaphylli genera. Maius flore subluteo, interdum albo, & rubro. Caulibus rectis, firmis, pedalibus & cubitalibus, in quibus folia quinq; partita, sed altioribus & crebris incisuris, Geraniij robertiani vel Alceæ modo: floribus candidis, interdum purpureis, radice foris nigricante intus rubescente, digitum lata, palmum longa & sesquipalmū. In Narbonēſis Sauenæ pingui solo, Iunio & Iulio flores edit candidos, in Apennino Italiæ purpureos. Aliud Pentaphylli generi facie cognatum est: medium enim est inter Tormentillam, Pentaphyllum, & Potentillam. Flosculos ex luteo pallentes, summa folia, caducos cauliculos, & radicem Pentaphylli habet, sed folia ima ex atro virentia in longo pediculo aptantur, Argentinx siue potentillæ æmulatione: fructus autem fragariæ sterilis simillimus. Hæc Lobellius. Pentaphyllum nascitur in riguis, inquit Dioscorides, & in aquariis ductibus. Sic Pentaphylla nostra locis opacis & decliuibus proueniunt, & aquis, præcipuè rubrum, quod solum in scrobium marginibus, & scrobibus ipsis, & stagnantibus aquis reperitur. Florent Maio & Iunio potissimum mensibus. Quinquefolium plurimis polere remediis scribit Diosco. Radicis decoctum ad tertias, si ore contineatur dentium dolores sedat: putredines in ore si colluatur sistit: arteriæ asperitates si gargarizetur emendat. Contra alui profluuia & dysenterias auxiliatur: item articulorum & coxendicū dolores potum sanat. Cocta radix in aceto, & illita herpetas cohibet. Strumas discutit, duritias, œdemata, aneurysmata, abscessus, erysipelata, pterygia digitorum, cōdylomata, scabiēsq; sanat. Teneræ radicis succus cōtra iocinoris & pulmonis affēctiones, & venena prodest. Folia cum hydromelite aut vino diluto, aut exiguo pipere contra febrim circuitus bibuntur, in quartana quidem quartanū ramulorum folia, in tertiana verò tertanū, in quotidiana vnus. Tricenis diebus

pota



potu comitialibus auxiliantur. Foliorum succus per dies aliquot trium cyathorum mensura potus celeriter morbum regium sanat. Vulnere quoq; & fistulas cum sale & melle sanant: intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Quinquefoliū sanguinis profluvia sistit potum & illitum. Plinius eadem quæ Dioscorides variis locis tradit. Quinquefolium strumis medetur, inquit, & pectoris vitiis. Idē ischiadicis bibitur & imponitur: panos sanat, impositum articulis vtilissimū, fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle, phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de quinquefolio potus ciathis tribus angina medetur. Idem iocinoris & pulmonis vitiis, sanguinemque reiicientibus, cuicunq; sanguinis vitio intus occurrit. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefoliū decoctis in lacte radicibus & potis. Idem decoctum ad tertias in vino ictericis dari atq; illini vtilissimum est. Eius folia ex aqua comiliales sanant. Item contrita ex vino sumpta triginta diebus in betonica farina pondo denariorum tredecim cum aceti scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimē succus regio morbo medetur tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex aqua mulsā. Galenus Pentaphylli radicem scribit desiccare vehementer, minimum verò acrem esse, ob id multo esse vsui, velut alia quoq; omnia, quæ cū sint tenuium partium, citra morsum desiccant. Est enim hæc radix, inquit, desiccatoria ex tertio ordine minimum habens evidentis caliditatis. Idem Quinquefolij radicem in vino coctam dentium dolores leuare tradit.

Li. 8. simpl.

Lib. 5. med. local. ca. 9.

TORMENTILLA, CAP. XXIX.



ΠΤΑΦΥΛΛΟΝ Græcè, Septifolium Latinè, vulgò Tormentilla **Nomina** nominatur, Gallicè *Tormétille*, Germanicè *Rothelwurtz*, & *tormétill*. Heptaphyllum à septenario foliorum numero, Tormentilla verò quia tormentum cruciatumve dentium sauisimum placat, atq; venenatarum

TORMENTILLA.



quarundam rerum compesci furorem cruciantem. Quinos, senos, octonosve ramulos, graciles, rotundos, humi repentes & subrubentes ex vna radice profert: folia parua, quina, sæpius septena, in singulis pediculis crenata, quinquefolij minoris lutei similia, flosculos luteos, radicem crassam, bistortæ similē, modicè intortā, atq; intus rubrā, foris nigricantē. Ex hac descriptione cōstat falli eos, qui Tormentillam Dioscoridis pentaphyllum esse putant: hoc enim quina tantum, illa septena sæpius folia fert, hoc radicem oblongam, rectam, elleboro nigro crassiorem, illa breuem, cōpactam, intortam, bistortæ ferè instar. Propiùs ad Chrysogonum Dioscoridis accedere videtur, quod densè fruticat, quernis foliis, flore coronarij verbasci: radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Tormetilla nemoribus opacis, montosis etiam, siccis macilentisque locis gaudet. Serò & æstate floret. Desiccatoriā esse tertio ordine, nullatenus tamen manifesta caliditate participare vires effectusque demonstrant: nam vulnera glutinat,

**Forma.**

Lib. 4. c. 51.  
Pena &  
Lobel.

**Locus.**

**Tempus.**



farina herba vel radice cum succo plantaginis pota urinæ incontinentiam supprimit. Eadem insparfa vulnera ad cicatricem perducit, cum qui albo subacta, & figlino decocta datur cholericis, foliorum succus deploratis fistulis instillatur, neque non oculis ad discutiendas maculas. Ad putrescentia oris vlcera herba & radix comanducata, & ore retenta valent. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurysmata sanat. Denique easdem quas quinquifolium facultates habet. Quare venenis resistit, dysenterias & omnes sanguinis eruptiones compescit. Radicum pulvis canis dentium inditus cum aluminis & pyrethri momento, non modò dolorem sedat, sed fluxiones cohibet. Heptaphyllo herba trita, inquit Apuleius, & cum oleo mixta pedes perunges: id tertio die dolorem tollit.

## SANICULA,

## CAP. XXX.

Nomina  
In cap. 38.  
lib. 4.

Genera.

Cap. 260.  
giff.

Forma.



VETERVM nullo descripta, sed à recentioribus inuenta quemadmodum & multæ aliæ vulnerariæ herbae, censetur herba hæc, cui à potiore medici munere, nempe sanandi, nomen saniculæ datum: sanatur enim vulnera. Germanis *Sanniker*, Gallis *Sanicle* dicitur, à nonnullis Diapensia. Matthioli hanc quartum pentaphylli genus facit, minimè ex aliorum

SANICULA, Mas.



etiam peritorum herbariorum sententia. Sed cum herbis aliquot Saniculæ nomen positum sit, hic de duabus duntaxat tractabimus, quarum una est, quæ propriè Sanicula, & Sanicula mas nominatur, altera quæ cum forma & facultate ad veram Saniculam, quæ mas dicitur, proximè accederet, Sanicula femina à Fuchσιο, & aliis herbariis nominata est. Sanicula mas folia fert vitis aut apij, rotunda, in quinque partes dissecta, altiore diuisura, fimbriata, ex atro virentia, leuia, numerosa, singula è singulis pediculis purpurascens, ex radice prodeuntibus, ex qua & caules folia superantes, glabri, teneri, graciles in quorum verticibus rotunda capitula, floribus albis referta, deinde semen hirsutum & asperum: radix fibrata ellebori nigri modo, foris nigra, intus alba. Sanicula femina cauliculos emittit teneros, glabros, flexiles, in quibus folia quinquepartita, parùm crenata, geranij columbini aut saniculæ incisura, aspera, nigricantia, in quibus summis flores in umbella congesti, candidi, aut caerulei diluti: semen striatum, oblongum: radix

Lib. 3. cap. 26.

Locus.

*Amara nigra è  
sanicle femina quæ*

Pena in  
Adu.

Tempus.

Temper.

Vir.

Ibid.

quamplurimis fibris longis, nigris constat, ex vno nexu appensis, ellebori nigri radici planè similis: Quare nonnulli, in quibus est Dodonæus, elleborum nigrum esse voluerunt. Cordus Altrantiam nigram appellat. Sanicula mas nascitur in silvis vdis, & umbrosis locis septentrionalium regionum magis quàm calidiorum, copiosissima & notissima Anglis & Germanis, à quibusdam etiam in hortis colitur. Sanicula femina umbrosis quoque, montosis, sed celsioribus & Alpinis dilectatur. Iunio & Iulio mensibus florent. Sanicula mas adstringit simul & amara est, ut hoc nomine calfactoriam & exsiccatoriam esse nulli dubium sit. Statuunt autem calidam & siccam esse ordine secundo Dodonæus siccam ordine tertio, & adstringentem esse scribit. Saniculam vulneribus conferre mirificè experientia compertum



*SANICVLA Femina, Fuchf.*



compertum est: quare Gallis, inquit Ruellius, <sup>Li. 2. c. 147.</sup> in adagium venit vulgò iactatum, eos non egere chirurgo, qui Saniculam habuerint. Germani chirurgi ad interna vulnera, enterocelas & fistulas maximè vtuntur, eius puluerem vel decoctum potui exhibentes. Vis est eius eximia ad internorum excrementorum commotionem inhibendam, sistendamq; ne in partes, imbecilliores corruant. Tumores enim reprimere decoctam herbam, aut impositam, aut eius succum illitum tam in homine quàm in pecudibus constat: neque aliud præsentius est auxilium, cum ad pulmones vel fauces vitium decumbit, foliis & radice in aqua melle addito coctis, & potui datis, malignis & putridis oris, gingivarum, & faucium vlceribus collutione & gargarizatu medetur. Denique omnia, quæ symphytum, præstat etiam Sanicula potissimum verò sanguinis sputo dysenteria, renumque vitii medetur decocta in aqua vel vino & pota.

*CORTVSA,*

*CAP. XXXI.*



**M**ATTHIOLVS herbam quandam eximiis viribus insignem celebrat, <sup>Ca. 17. li. 4.</sup> quam Cortusam ab inuatore Cortuso Patritio Patauino nominavit. Lobellius Veronensium Caryophyllatum flore Saniculæ vrsinæ. Prouenit hæc foliis ferè vitis, sed minoribus, subrotundis, atque sub-

*CORTVSA, Matthioli.*



asperis, adstringente quadamtenus sapore, in longis pediculis. Caules edit tenues, rectos, foliis nullis vestitos, qui in cacumine magno naturæ artificio flores gerunt extrema parte purpureos, intima aureo fulgore splendentes, aureisq; staminibus intus refertos. Est etiam quæ violaceos, & quæ candidos flores ferat, sed prima frequentior. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, prolixis. <sup>Forma.</sup> Nasctur umbrosis locis, nunquā à Sole illustratis, cretaceo & albicante solo. Nusquam ab inuatore Cortuso visa est præterquam in agro Vincentino, in eo tantum tractu, quem vulgò appellant <sup>Locus.</sup> Valle Stagna. Tota planta dum recens est gratissimum odorem spirat, mellis fauis similem, sed multò gratiorem, qui in sicca euanesceat. <sup>Vires.</sup> Experientia compertum est valere hanc plantam ad mulcendos neruorum & articulorum dolores, à quacumque causa exortos. Nam ipsius floribus in amygdalino oleo recente ac rosaceo, quod completum vocant, pari pondere commixtis ac diu insolatis, fit ad hoc



medicamentum præstantissimum, si egelidum illinatur. Nec dubium quin tota planta adstringere, ac roborare, & vulnera vlceraque sanare possit. Ea recentiores vtuntur pota ad thoracis vulnera interna. Eius succum admixta æruginè cuniculosi contumacibusque vlceribus vtiliter iniiciunt: olfactu spiritus recreat, frigidum cerebrum roborat. Epota prodest celiacis, dysentericis, fœminarumque profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quàm foris illita enterocelis auxilio est. Quæ omnia efficit temperamento excalfacientè & exsiccante, quod radices perspicuè indicant, vtpotè quæ gustu odoratæ adstringentésque sint. His nimirum facultatibus attenuare, discutere & adstringere, atque roborare valet.

CONSOLIDATA SARRACENICA,  
CAP. XXXII.

Nomina



V LGAREM ac tritam Herbariorum nostri temporis appellationem secuti cùm nullum à veteribus huic impositum nomen esse videatur, Consolidam siue Solidaginem Sarracenicam nominamus. Consolidam quidem siue Solidaginem à coniungendis, siue claudendis vulnerum labris (Chirurgi barbari Consolidare dicunt.) Sarracenicam verò quòd Sarraceni & Turcæ quamuis barbari, opinionè magnæ peritiæ in medicamentis, præsertim vulnerariis, apud nos aliquàdo essent assecuti. Dicitur & Herba fortis, Gallicè *Consoulde*, & *Consolide*, Sarrazine, Germanicè *Heidinschundkraut*. Ex radice multis & crassioribus fibris capillata caulem erigit rectum, rotundum, rubescentem, cauum, trium aut quatuor cubitorum altitudine, circa quem folia longa, foliis fœlicis similia, aut amygdali, leuiter crenata: flores in summo pallidi, qui in

Forma.

Locus.

auras euanescent. In locis vdis & depressis, siluis vmbrosis & humentibus, & in

SOLIDAGO Sarracenicæ,  
Fuchsij.



SOLIDAGO Sarracenicæ  
Lobellij.



montosis



mentosis vlginosis fruticat. Siccat tertio propè gradu. Gustu amara est & adstringens. Potui datur cæterarum Consolidarum modo: tam internis vulneribus & vlceribus medetur, quàm externis, imposita cum vnguentis, oleis, emplastris. Decoctum eius in aqua hepatis dissoluto tonum reddit, id ipsum & vesicam fellis obstructione liberat. Quare ad icterum febrileque diuturnitas vtile, & ad incipientem hydropem. Eiusdem decoctum gingivarum, gutturis, & oris vlcera & foetorem sanat. Aliud genus Sarracenica Solidaginis ponit Tragus, quod nascitur in asperis & lapidosis agrorum limitibus, radice, caule, & foliis quæ habet, cinerea Balsamina acuta, idest, methastro per omnia simile. Floret Iulio & Augusto mensibus. Flosculi lutei è rotundis vasculis erumpunt. Mirificè sanandis vulneribus, si decocto herbæ colluatur, prodest. Est etiã Consolida Sarracenica maior ab Herbariis dicta, quæ in locis vdis & umbrosis prouenit, radice valde fibrata: caule bicubitali, terete: foliis per intervalla singulatim è caule prodeuntibus, latis, crassis, per ambitum crenatis, venosis, in acutum desinētibus: flore senecioni ferè simili, luteo, in pappos abeunte, saporis amari & adstringentis. Consolidam aliam auream nemorum protulit Pena ex Aurelia Gallica filuosis densissimis, quæ folia habet betæ nigra aut Limonij, ex atro virentia, carnosa, aliquantum hirsuta, crassa, venosa, herbæ Autæ

Temper.  
& Vires.

Li. 1. ca. 164.

*CONSOLIDA Sarracenica,*  
*tertia Tragi.*



*CONSOLIDA Sarracenica,*  
*maior.*



*CONSOLIDA Aurea*  
*nemorum, Pena.*



Narbonen



Narbonensium similia, cauliculos amplectentia binos aut ternos, in quorū summitate flores sunt radiati, Calendulæ similes & concolores, scitè pectinatim confertis & commissis foliolis antequàm dehiscant, eleganti spectaculo. Radix multis capillamentis sparsa per summum cespitem Bellidis modo, saporis Cōsolidæ mediæ tantillum acrimoniæ prodentis, aut herbæ Auræ, cuius etiā vires, & aromaticum quid æmulatur. Conuenit, inquit Lobellius, cum Alismate Matthioli, & Chrysanthemo latifolio Dodonæi. In Frisia secus Zutphon & Hackfort frequentissima. De Consolidis aliis diximus, in libro de Palustribus.

## VIRGA AVREA,

## CAP. XXXIII.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires &amp;

Temper.

**S**T & hoc nomen recentiorum Herbariorum inuentum, veluti fortasse & herba ipsa, apud vulnerarios tantoperè celebris, Gallicè *Verge d'or*. Initio folia per terram spargit, longa, latiuscula, perfixa foliis latiora, tenuia, tantillum crenata, costi hortensis modo, multò angustiora, inter quæ prodit caulis tenuis, gracilis, leuiter rubescens, cubitalis & semicubitalis, foliis similibus vestitus, sed minoribus, qui circa summum in multos ramulos finditur, confertim floribus luteis siue aureis ornatos, tandem in auras euanescentibus, Consolidæ Sarracenicæ modo: radice fusca, fibrata. Nemorosis & saltuosis opacis Germaniæ, Galliæ, Angliæ copiosissimè prouenit. Augusto mense floret. Vis eius adstringendo efficax, sed siccando multò efficacior. Chirurghi iis feliciter exhibent, quibus inrò inflicta sunt vulnera, & ad fistulas. Est enim glutinandis vulneribus, & vlcerebus tam externis quàm internis, atque sanguini sistendo efficacissima. Arnaldus hanc summoperè laudauit ad vrinam ciendam & ad calculos exterendos. Pota alui fluxiones cohibet, & clysteribus infusa. Eius decocto sanantur oris vlcera, firmanturq; dentes. Item gargarizata anginam & colomellæ inflammationem arcet, & fauciu morbis medetur. Verbasci genus quidam

VIRGA Aurea, Matth.



VIRGA Aurea, Dodon.




elle



HERBA Aurea, Pena  
& Lobellij.

DOREA, Siue herba Aurea  
Narbonensium, Pena.



VIRGA Aurea altera, Lobel.



esse volunt. Aliis est Leucophragis Plinij, & Herba scripta Anguillare, à conspersis quibusdam notulis locis, nonnullis potissimum conspicuis. Huic attexenda Herba Aurea Narbonensium, vulgò l'Herbe doree, foliis Limonij aut Lapathi, flore luteo tripolij. Radix ei parua pro plantæ magnitudine, radici ellebori albi par, capillamentis & fibris, & toto habitu similis: caulis rectus, procerus, circa quem, vt & à radice, numerosa exeunt folia, longa, crassa, rigida in imo angusta, in medio palmæ latitudinem æquantia, intensæ viriditatis, extantibus in eis transversis & purpurascensibus nervis: flores sunt in summo caule in ramulos diuisi fenerionis aut tripolij marini in pappos abeuntes. Sapor, odor radici & foliis aromaticus & medicatus, Angelicæ siluestris, & nonnihil nitroso gustu minimè acri. Plurimū hac vtuntur vulnerarij, & eam plurimi faciunt Medici quidam. Quæ coniectura cæteris congruentibus notis, magis persuadet esse Theophrasti Chironium, Lapatho simile, aut cerè vnum eorum quæ ad Theophrastum Plinius retulit, vt Pharnaceum. Galloprovinciæ & Narbonæ annibus non admodum rapidis, & iisdem natalibus quibus Limoniū gaudet: vnde in hortis Belgij & Angliæ trāsata fuit. Hæc Pena. Priori Virgæ aureæ similis est Virga aurea altera Lobellij serrato foliolo, & tantoperè illi effigie totoq; habitu conuenit, vt neutram ab altera discernere queas, nisi magnitudine & foliorum



& foliorum diuisura: affurgit enim procerioribus duplò caulibus, maioribus, magis ferratis foliis. Belgis hortensis est, Italoq; semine orta putatur.

## HERBA TRINITATIS,

CAP. XXXIIII.

Nomina



RAECIS & Mauritanis incognita videtur fuisse hæc quæ hodie ab Herbariis Hepatica, quòd hepaticos iuuat, & Herba trinitatis à foliorum figura nominata est, & Hepaticū Trifolium, Gallis *Hepatique*.


Forma.

Folia fert ampla, in tria diuisa, trifolij acetosi foliis haud absimilia, sed maiora, longis pediculis appensa, auersa parte Cyclamini modo subpurpurea, aduersa albis quibusdam maculis respersa. Cauliculos emittit tenues, in singulorum verticibus primo statim vere flos emicat cæruleus, è quo capitulum exoritur echinata specie, in quo semen oblongum, subcæruleo colore. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, nigris vel subrubentibus. Locis prouenit viginosis, & inter fruteta: gaudet enim opacis. Probatum maximè à recentioribus medicis ad vulnera glutinanda tam foris illita, quàm intus sumpta: item ad enterocelas, in quem vsum puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant. Totà planta decoquitur in vino eodem ad columellæ fauciumq; inflammationes. Refrigerat enim

Locus.

HERBA Trinitatis,  
Matthioli.

HEPATICA Polyanthes,  
Lobelij.



siccatur & roboratur. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepatis & febrium calores perutilis. Huius flores colore variant, aliàs cærulei purpurei & quandoque niuei. Nonnunquam etiam folia maiora maculis notulæ & variegata spectantur. Alia Hepatica Polyanthes cognominata à Lobellio exhibetur, floribus in purpureo cæruleis multiplicibus stipata peregrina elegantia. Alioqui folia, radix superiori haud absimilia. Hæc Lobellius.

GERA



GERANIVM, CAP. XXXV.

**G**ERANIVM Græcis, Latinis similiter Geranium, Gruina & Gruinalis Nomina aptissima similitudine nominatur, quod in eius vertice fastigia confurgant nutantia capitulis Gruum cum rostellis similia, in quibus semen occluditur. Diuersæ species diuersa sortitæ sunt nomina. Dioscorides duo duntaxat tradit Geranij genera: sed cum multis Europæ regionibus tres quatuorve aliæ differentia, Dioscoridi, & fortasse priscis aliis ignotæ copiose proueniant: quibus ob rostrata semina rostrati capitis gruini referentia effigiem, herbarij merito geranij nomē indiderint, de omnibus hinc dicemus. Ac primum de iis duobus quæ à Dioscoride prodita sunt, non ut reliqua passim obuia. Primum, inquit, folium habet anemonæ simile, fissum, longius, radicem subrotundam (alia exemplaria & Oribasius habent *τρογύλον*, id est, rotundam) dulcem, quæ editur. Li. 3. ca. 14. Genera.

GERANIVM I. Matth.



GERANIVM I. quorundam, Dalechampi.



Geran. I. Dioscor. Forma. Hoc Geranium Ruellius esse putat, quod Acus pastoris, Acus muscata, Rostrum ciconiæ, & Rostrum gruis hodiè Officinis & Herbarijs dicitur, Gallicè *Bec de cicogne*, & *Bec de grue*, Germanicè *Storkenschnabel*. In eadē sunt sententiæ Fuchsi. Ca. 76. hist. Lib. 1. ca. 36. Dodon. Sed cum huic radix mali modo rotunda non sit aut subrotunda, nec folia anemones, alij aliud atque aliud exhibent. Matthiolus In cap. 114. lib. 3. quidem vbiq; Ruellij sententiam infectatur, scribitq; primum Dioscoridis Geranium in Ananiæ vallis agro & passim ferè prouenire, folijs anemones modo laciniatis, floribus in purpura albicantibus, è quibus gruum capitula prodeunt, radice alba, ferè rotunda ac dulci. Verumtamen prima Latinorum commentariorum editione, Geranij primi pictura nullū aliud exprimere videtur, quàm Acum pastoris, siue Muscatam, Ruellij, Fuchsi, Dodonæi Geranium primum. Postremis verò editionibus posita nihilominus superiore Geranij primi descriptione, aliquantò post longè aliud Geranium describit ac depingit his verbis. Primum Dioscoridis Geranium folia gerit anemones, longioribus tamen diuisuris, in vnoquoque folio senis. Caulem mittit ab ipsa radice rectū, tenuem, geniculatum: flores è geniculis in caule prodeunt punicej vnà cum folijs, rosarum ferè figura, sed longè minores, qui quinque tantum folijs constant, è quibus rostella oriuntur, inferna parte lunata. Radice rotunda nititur, nuce pontica maiore, subnigricante, & dulci sapore prædita. Nascitur incultis locis. Copiosum in Dalmatia prouenit. Cui delineationi



GERANIVM II. Diosc.  
III. Matth. Pes Columbinus.



Pena in  
Aduerf.

GERANIVM Tubero-  
sum, Dodon.



Geran. II.  
Diosc.  
Ibidem.  
Pet. Pen. in  
Ad.

Ca. 14. li. 3.

Geranium secundum Dioscoridis eam esse herbam, quæ Pes columbinus vocatur, quod nullis prorsus reclamantibus notis hæc illi respondeat: eamq; pro secundo Geranio, prima commentariorum editione depinxit. Idem in postremis editionibus initio confirmat, deinde hæc subiungit. Aliam ab his (primo scilicet Geranio & Pede

pictura quam apponit, prorsus respondet. Alij id pro Geranio primo Dioscoridis habent quod in maritimis, circa Tolonem & Antipolim Galloprovinciæ oppida nascitur, radice rotunda, pruni aut exigui mali magnitudine, intus candida, cortice crasso vestita, è nigro rufescente, plurimis villis & tenuissimis capillata, ex radice capite prodeuntibus, longiusculis, rufis: foliis aquilegiæ, minoribus, longo & gracili pediculo nixis: caule dodrantedo, foliolis tribus media parte cincto, cætera nudo: flore puniceo, elegantissimo, foliolis multis radiato, apicibus intus nigricantibus. Pena bulbosum & paruum Geranium primum Dioscoridis describit radice pallida, subliuida, rotunda, sapore insipido, insulso & vesco: foliis in longis petiolis ab vno centro quinquepartitis, diuisura Geranii Robertiani: floribus non ita intense purpureis: rostellis multis, Oeniponti à se visum, rarum in Gallia & Italia. Geranium primum radice tuberosa aliter depinxit Dodonæus, & ut opinor, fidelius quam Matthioli. Folia huius uti ranunculi, in multas finduntur lacinias: ad anemones folia accedunt, maiora tamen, & profundioribus incisuris dissecta: cauliculi tennes, ramosi, in quibus flores quinque foliorum, exiguas rosas mentientes, diluti ruboris, oblongum, tenuem, acuminatumq; instar rostri gruis fructum post se relinquentes, unde nomen: radix crassa, rotunda, & tuberosa non absque fibris nonnullis. Geranium alterum Dioscoridis cauliculos habet tennes, lanuginosos duorum palmorum altitudine, folia malvæ similia, & in summis alis eminentias quasdam rursus spectantes, veluti gruum capita vnâ cum rostris, aut dentes caninos. Geranium istud secundum Dioscoridis, Fuchsij, Dodonæi & aliorum sententia, idest quod Geraniū columbinū, & Pedem columbinū vulgus vocat, Galli *Pied de pigeon*. Germani *Tanberfusz*. Nam caules tennes, rubentes, à radice statim lanuginosiq; obtinet, folia malvæ minoris, candidiora, vel faniculæ, circinata, senis octonisve incisuris laciniata, flaccida: flosculos subpurpureos, capitella gruini capitis modo rostrata, radicem tenuem & oblongam. Matthioli non dubitat



GERANIVM Aliud,  
secundum, Matth.



GERANIVM Tertium  
Plinij, Acus muscata.



cigogne. Folia etenim fert myrrhidis aut cicutæ, minoribus tamen diuisuris, hu-  
mi iacencia, quæ senescencia rubescunt: cauliculos multos, breues, rotundos, gra-  
ciles, teneros, subpurpureos, hirsutos, præsertim cum adulti sunt: flosculos in sum-  
mo venustos, purpureos, stellæ figura, deinde capitula gruum aut ciconiarum

& Pede columbino.) Geranij plantam vidimus  
in multis hortis ac viridariis satam, foliis ro-  
tundis, secundi Geranij modo per ambitum  
laciniatis, maluam magnitudine æquantibus,  
fructu gruinis capitulis simili. Hanc herbario-  
rum nonnulli Momordicam nuncupât quem-  
admodum & balsaminam: alij eodem nomine  
vocant, eamque cæteris præferunt in potioni-  
bus ad interna vulnera glutinanda. Hæc mea  
quidem sententia, inquit, magis respondet  
alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ foliis ad  
maluam propiù accedat. Quare & hanc ma-  
gis eandem esse cum illo putauerim. Verumta-  
men haud eam inficias quin Pes columbinus  
idem sit geranium: sed id quis rectiùs fortè ge-  
ranium minus dixerit. Paulò post geranium  
illud secundum aliud à Pede columbino ita  
describit. Secundum foliis est maluæ minori-  
bus, ped culis tenuibus, longis & subrubenti-  
bus appensis: caulibus gracilibus, flexilibus, ro-  
tundis: floribus puniceis, ex quibus acuminati  
apices oriuntur gruinis capitibus similes. Ra-  
dicem habet tenuem, palmarem & fibrosam.  
Nascitur secus itinera, locis incultis, ac etiam in  
hortis. Idq; secundi geranij nomine appinxit,  
quod prima eorumdem commentariorum edi-  
tione pro tertio posuerat. Duobus Græcorum  
geraniis Plinius tertium Latinorum geranium  
videtur addere, his verbis. Geranium aliqui  
Myrrhin, alij Myrrhica appellant, similis est  
cicutæ, foliis minutioribus & caule brevior,  
rotundo, saporis & odoris iucundi. Nostri sic  
eam tradunt. Græci foliis candidioribus paulò  
quàm maluæ, caulibus tenuibus, pilosis, ramo-  
sam ex intervallis, binum cubitorum, & in his  
folia, inter quæ in cacuminibus folia sunt gru-  
u. Alterum genus foliis anemones, diuisuris lon-  
gioribus, radice mali modo rotunda, dulci. Ge-  
ranium Latinorū etsi myrrhis, Plinio auctore,  
à quibusdam nominetur, tamen à Dioscoridis  
myrrhide differt, cuius historiam Plinius etiam  
alio loco tradidit. Sed Matthiolus cum quibus-  
dam aliis rectè cēset esse, id quod à Fuchsio &  
Dodonæo pro primo Dioscoridis geranio po-  
situm fuisse diximus, & rostrum ciconiæ, Acū  
pastoris & Muscatam appellatum, Gallis *Bec de*

Li. 26. ca. 11.  
Geran. 3.  
Plin. j.

Li. 24. c. 16.

Forma.



HERBA Roberti. Geranij  
IIII. genus, Matth.

*Herb. Fuchs. cap. 76.*  
*aut Geranij II. Oude.*  
*pag. 1278.*

Ca. 14. li. 3.  
Gera. IIII.  
Herba Ro-  
berti.

Forma.  
Fuch. cap.  
76. Histor.  
Pet. Pen. in  
Aduers.



GRUINALIS, Dodon.

Geran. V.  
Gruinalis.

Forma.



Gera. VI.  
Hamatod.  
Forma.

Li. 4. ca. 32.

Gera. VII.  
Batrach.

terna quaternave simul cum rostellis, longitudine acus: unde Acus pastoris nomen, & mulcata ab odore iucundo, ut ait Plinius, cicutarie verae aut myrrhydis: radix est digitum longa, rotunda, candida, dulcis. Id pro tercio Geranio pinxit Matthiolus in postremis commentar. editionibus. Huius Geranij species, eodem Matthiolo auctore, est herba geraniis etiam adnumerata, quae à caulium, foliorum & florum rubro colore primum Ruberta dicta est, deinde Herba Roberti, Herba Robertiana, & Geranium Robertianum haud dubie à superstitione aliqua Diui, qua superior aetas mirifice imbuta fuit, Gallicè *l'Herbe Robert*, Germanicè *Ruprechtskraut*. Cauliculos spargit multos, graciles, hirsutos, purpurascens, vel phoeniceos, geniculatos: folia charophylli vulgaris aut coriandri, siue pentaphylli, aut artemisiae diuisura, sed profundiore, subhirsuta: flores multi in summo quinque foliolis constant, purpurei, circinati, qui defluentes rostratos mucrones aut acus ex latiore basi in rectum desinentes relinquunt, in quibus veluti siliquis paruis subhirsutis & subasperis pusillum semen includitur. Radix ex flauo viret. Hanc Matthiolus postremis commentar. editionibus quinti Geranij, Fuchsius & Dodonaeus tertij nomine depinxerunt. Robertianae species est quae gruinalis & geranium gruinalis à Dodonaeo nominatur. Germanicè *Kramchhalz*, cauliculis hirsutis, rubentibus: floribus purpureis, capitellis gruini capitis instar rostratis, superiori similis. Floribus maioribus duntaxat differt, & foliorum altioribus incisuris. Radix eius est intus candida, foris sublutea. Fuchsio & Dodonaeo quartum est geranij genus. Tertia item Robertiana cauliculis multis, teneris, nonnihil hirsutis, foliis altius infectis, floribus purpureis, capitellis gruini capitis formam referentibus, secunda Robertiana similima est, praeterquam quod huius tertiae caules prociores sunt & longiores, folia maiora, flores item maiores, roseo colore & ambitura: radix sanguinea intus & foris colore, à quo geranium hamatodes à quibusdam, & à Germanis *Blutwurz*: radix sanguinea, aut à mirificae eius in sistendo sanguinis profluio facultate. Periti quidam herbarij hanc tertiam censent esse Dioscoridis Achilleam sideritim, tum quia descriptioni quadret, tum quia praeter planè ea quae Dioscorides eidem reddidit. Anguillara Panax Heracleum. Dodonaeus quintum, Fuchsius sextum geranij genus faciunt. Aliud geranij genus quintum Fuchsij, sextum Dodonaei, quartum Matthioli in postremis commentar. editionibus, Batrachoides & magnum à foliorum figura & magni



GERANIVM *Hamatodes.*



GERANIVM *Batrachoides.*



GERANIVM *Fusum,*  
*Lobellij.*



& magnitudine, caruleum à florum colore dicitur, à Germanis *Gottes gnad*, id est, gratia Dei, ab insigni in sanandis vulneribus effectu. Caudex similiter habet longos, rubentes, hirsutos, ramosos, aculeatos, qui copiosi à radice propagantur, & variè inclinantur atque huc & illuc procumbunt: folia cæteris maiora, rotunda, fissa, per amplius, multisq; diuisuris, ex pediculis glabris, pluribus ab vno caulium internodio ortis: flores caruleos vel violaceos, qui cum deciderint gruina, vt in cæteris, prodeunt capitula cum rostellis crassioribus, quàm superiorum, in summitate triplici apice coronæ instar fissis, nonnihil inflexis, cum iam præ ætate marcescenti deorsum nutant flores: radicem cæteris crassiorem, longiorem, robustioremq; multis radiculis fibratam, colore rufescente, lignosa intus materie. Lobellius tradit alterum esse Geranium Batrachoidi cognatum, quod prolixiore serpit radice, flexibus variis in obliquum & cespitem summo sparsa, rufescente, subtus fibrata, geniculata & odorata, digiti parui crassitudine. Folia Saniculæ rotundiora, aut Geranij Batrachoidis, albida, nonnihil incana, pediculi & flosculi purpurei violacei, alterius minores. Angliæ & Belgij hortis inquilina. Huic Geranio longius radicato & Saniculæ figura, simile est geraniū fuscū ab eodē Lobellio descriptū his ferè verbis. Folia illi quæ Geranio supradictō maiora, maculis fuscis pullisve nigricantia. Ineunte æstate pereleganti flore liuido purpurascēte, medio



*GERANIVM* *Batrachoides*  
alterum longius radicum, Lob.



*GERANIVM* VI.  
Matthioli.



ris siue moscata in rudibus, circa sepes, secus itinera, laxo & extenuato solo. Geranium Robertianum in umbrosis locis & dumeris, in rudibus parietinis, & subgrundiis tectorum, denique in segetibus & aruis. Secunda Robertiana in agrorum limitibus & iuxta sepes. Tertia, locis montosis & saxosis. Batrachoides in pratis

*GERANIVM* IIII.  
Matthioli.



candicante, reflexo, cauliculis pedalis, multis, exilibus, alis donatis fruticat, & propagines fundit e radice oblonga. In hortis Belgii viget. Hæc Lobellius. Matthiolus in postremis commentar. editionibus sextum idque novum geranii genus cæteris addidisse se putat, foliis althææ proximis. Sed cum in eodem commentario plantam hanc in hortis sibi visam, & herbariis quibusdam momordicam nuncupatam dixisset, & pro secundo Geranio Dioscoridis pinxisset, ad eiusdem commentarii finem tanquam rerum incertus vel oblitus, eandem, quasi alterius generis planta foret, ut Calzolarij donum, pro sexto Geranio describit & appingit. Folia illi althææ proxima, caules multi, læti, hirsuti, geniculati: flores parvi, rubentes balustij seu cytini figura, e quibus græna prodeunt capita, rostro ut in cæteris acuminato. Radix sesquidodratalis, digiti crassitudine, quæ humo tenus rubescit. Hæc Matthiolus. Geranium hoc vocant Pena & Lobellius *μαλβαχόδες*. Geranium columbinum cultis & incultis passim inodorum provenit. Acus pasto-



in pratis. Acus pastoris inter initia veris Aprili mense floret. Pes columbinus, Robertiana prima, & secunda Maio mense florent. Geranium hæmatodes & Batrachoides Iunio & Iulio mensibus. Geranij primi radix, auctore Dioscoride, pota in vino, vteri inflationes dissolvit. Eadem radix, tradente Plinio, reficientibus se ab imbecillitate vtilissima. Bibitur contra phthisim drachma in vino cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radices auribus medetur. Opisthotonicis semē, drachmis quatuor, cum pipere & myrrha potum. Rursus, Radix è geranio peculiariter secundis, inflationibusque vulvarum conueniens. Geranium secundum inutile esse scribit Dioscorides. Galenus vtrumque omisit. Paulus verò Dioscoridem secutus eadem planè de vtroque tradidit. Sed si secundum Dioscoridis geranium sit pes columbinus, posterior ætas quotidiana experientia in sanandis vulneribus ac fistulis eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit. Quare eas herbas his ipsis in potu mirificè conferre tradunt. Antiquus quoque herbarius prædictorum geraniorum folia, magnam vim obtinere in glutinandis vulneribus, & articulorum doloribus leniendis tradit. Peculiariter pedem columbinum balneis perutilem asserunt practici: ad ventris tormina vtilissimum esse certum est. Acus moschata radicem mouendi vrinam facultatem habere ait herbarius ille: ideòque calculosis, stranguria & difficultate vrinæ laborantibus prodesse. Robertiana vulneribus perefficax, quod docet sapor adstringēs, non ingarti odoris, ad mamillarum, pudendorumque vlcera sananda mirificè conducit. Nullum ad sanguinem vnde cumque emanantem compescendum præstantius Geranij genus, quàm tertia Robertiana, ob id sanguinaria radix dicta. Geraniū batrachoides dictū adeò vulneribus efficax est, vt inde Gratiæ Dei nomē inuenerit.

Tempus.

Lib. 3. c. 114.

Vires.

Lib. 26. c. 11.

Ibid. cap. 15.

Fuch. c. 76.

Pena in Ad.

STELLARIA, CAP. XXXVI.

**H**æc vulgò ab herbariis Leonto podium, id est, Pes leonis, & Planta leonis, à foliis instar leonini pedis latis, & rotundis, nominatur: minime verò est Dioscoridis Leontopodiū, id quod ex descriptione constat. Dicitur & Alchymilla, quòd Alchymistarum præconiis celebrata sit, Drosiū à Cordo, & à Germanis chirurgis Sanicula maior, quod sit illi, tum facie, tum viribus admodum affinis. Stellaria etiam à foliorum expansorum & florum figura, Gallicè *Pied de Lion*, Germanicè *Synauu*, *Louentapen*, & *groß Sanikel*. Folia huic ex pediculis hirsutis qui statim à radice exeunt rotunda, lata, senis pluriusve angulis quasi plicis distincta, serrata, antequam erumpant vnà facta, & conuoluta, diapsisæ haud absimilia, sed multò minus altè incisa, seu maluæ, virentia, polita, duriora, inter quæ cauliculi exeunt, hirsuti, sesquipalmum & pedem alti, albi, rotundi, in quorum verticibus flosculi stellati, ex herbido lutei racematim cōgeruntur: in filiquulis herbidis semen luteum, exile, portulacæ vel papaueris, radix est crassa, digitum longa, foris nigra, fibrata umbrosa, montosa, & rigua editiora, vt prata amat. Maio mense erumpit, Iunij initio floret: folia & radix adstrictione vehementi participant, atque adeò exsiccant, minùs calida quàm sanicula, quare vulneribus, si inflammationis suspitio desit, ad-

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

STELLARIA.





modum opportuna, non solum externis, sed etiam interioribus, atque etiam sinuosis ulceribus. Eam ob causam Germani Chirurghi miris eam laudibus celebrant, & positionibus vulnerariis admiscunt, decocto eius omnia vulnera lauant, linteum quoque in eo madefactum imponunt. Mulierum mammas impense laxas linteum decocto eius intinctum & impositum duras solidasque efficit, praesertim hypocistide, equisetis, alumine, & rosis siccis admixtis. Arida pulvis in suo ipsius decocto aut stillatitia aqua sumptus, ramices intestinorum in pueris potissimum sanat, tanta in glutinando vis est. Datur idem pulvis ex vino, aut iure, cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus iis quibus adempta sit concipiendi facultas, à nimia veteri humiditate, ob quam iniectum semen contineri non potest. Stillatitia aqua pota, tum in vulvam iniecta, alba mulierum profluvia mirifice sistit, adeo ut eius quoque diutina iniectione corrupta ab incorrupta vix dignosci possit constrictis valde locis, quod tum citius, tum efficacius praestatur, si decocto eius foemina infideant.

## BETONICA, CAP. XXXVII.

## Nomina



Εἶςρον Græcè, Betonica, Vetonica & serratula Latinè: Officina Betonica nomen retinuerunt. Dicitur etiam ψυχρόφων, quoniam frigidis in locis reperiatur. Κέσρον autem à floris spicata & mucronata acutius veruculum, seu, ut apud Plinium in vulgatis exemplaribus legitur, viriculum praterente, sic enim ille cestrum interpretatur. Encausto, inquit, pingendi duo fuisse antiquitus genera, cera, & in ebore cestro, id est, viriculo. Et paulo superius dixerat. Penicillo pinxit, & cestro in ebore. Suidas quoque cestron dixit genus esse teli bello persico inuenti. Sophocles etiam cestron dixit pro stimulo siue stylo.

Lib. 35. ca. 11.

Lib. 25. c. 8.

Betonica, eodem Plinio auctore, ab inuentoribus Vetonibus Hispania populis, Arabice Chastara, Gallicè Betoine, & Betoesne, Germanicè Braumbetonik. Galenus vno

Lib. 7. sim.

loco cestrum & Psychotrophon Romanis Betonicā dici scripsit. Alibi tamen cestrum à Betonica distinguere videtur, & cestrum quod apud Gallos nascitur, sarxiphagum vocari ait. Verba eius hæc sunt. ἐπεμβάλλεται δὲ τῷ ὄντι πρὸς τὸν ἄρθρον καὶ τὸν ἀρθρὸν τοῦτο τοῖς ἀρθρῶν καὶ ἐπὶ τῶν λιγνῶν, & τῆς βετονικῆς τὴν πρὸς μὲνεται, καὶ κέσρου τοῦ παρὰ τοῖς κέλοις γενομένου. καὶ δὲ τὴν βοτάνην ταύτην σαρξίφαγον. Id est,

Lib. 5. de fastitut.

Coniicitur autem in vinum petroselinum, atque id solum articularibus satisfaciunt iis verò qui calculo laborant, aliquid Betonica & cestri quod in Galliis nascitur. Vocant autem herbam eam sarxiphagon. Apud Aëtium quoque locus hic trans-

Lib. 4. c. 30.

scriptus ita legitur ἐπὶ τῶν λιγνῶν καὶ βετονικῇ μὲνεται καὶ κέσρου τὴν καὶ λαμάνος σαρξίφαγον. Ex quibus colligitur non solum Latinorum Betonicam, sed etiam Gal-

Lib. 7.

lorum Sarxiphagō, Cestron nominatum fuisse. Paulus perspicue duplicem Betonicam statuit: Vnam ramulis exilibus, pulegio similibus, sed tenuioribus, & prope-

Genera.

modum, si gustes, nullam qualitatem referentibus, nascentem potissimum petroselinis locis, qua in renum medicinis vtuntur. Alteram Romanorum betonicam, quam

Lib. 4. c. 11.

Dioscorides nominat cestrum, alij psychotrophum, eò quod frigidis locis gaudeat, quæ nihil simile cum prædicta habet, præter vires, & facultatem, &c. Hæc Betonica, ut describit Dioscorides, herba est caulem ferens tenuem, cubiti altitudine

Forma.

aut etiam maiorem, quadrangularem: folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum fissâ, odorata, ad radicem maiora. In summis caulibus semen est, thymbræ modo spicatis. nam apud Dioscoridem ἐσαχυμένον. sub. καυλῶν, legendum est, non ἐσαχυμένον. sub. ἀρμυρίδας, radices subsunt tenues velut ellebori. De eadem sic breuiter

Lib. 25. c. 8.

Plinius. Vetones in Hispania (inuenerunt) eam quæ Betonica dicitur in Galliis, in Italia autem serratula, à Græcis Cestrum & psychotrophum, ante cunctas la-

datissima. Exit anguloso caule, cubitorum duum, à radice spargens folia, ferè lapa-

thi,



BETONICA.



thi, serrata, semine in summis caulibus, spicatis, thymbræ modo flore purpureo: sic prorsus legendum. Hæc est omnium consensu Betonica illius omnibus notissima delineatio, frequentissimi hodiè in medicina, & maxime varij vsus foliis longiusculis & latiusculis, ex atro virentibus, serratis, odoratis, inter quæ caulis erigitur, quadrangulus, rectus, pedalis, & cubitalis, asper, in summo ferens breuem spicam, floribus odoratis confertam, elegantibus, purpureis, deinde semen longum, nigrum, angulosum, radix albicat, multas spargens fibras ellebori nigri modo. Nascitur in pratis, siluis, montosis, frigidis & opacis locis. Maio & Iunio mensibus floribus abundat. Calida & sicca est in primo ordine completo, aut in medio secundi, folia, vt tradit Dioscorides, carpuntur & siccantur plurimos ad vsus. Radices cum hydromelite potæ pituitosam vomitionem prouocant, folia dantur ruptis, conuulsis, vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachmæ vnius pòdere, cum hydromelite. Ternæ in vini sextariis duobus

Locus.

Tempus.

Temper.

Lib. 4. c. 1.

Vires.

contra serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatis morsibus prodest, aduersus etiam venena drachma in vino pota conuenit. Hanc si quis præsumpserit, letale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit, aluum subducit, medetur comitialibus, & furiosis cum aqua pota. Iocinoris & lienis vitiis drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionem adiuuat, si quis à cæna eam fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructatibus propinatur, stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere, cum diluti vini egelidi cyatho vno: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, non febrientibus cum mulso. Regio morbo laborantes recreat, menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem potæ cum melle tabidis, purulentis auxiliatur: folia cum inaruerint trita fictili vase recunduntur. Eadem vires, & quasdam alias eidem Plinius assignat, his verbis, folia siccantur in farinam plurimos ad vsus, fit vinum ex ea & acetum stomacho, & claritati oculorum, tantumque gloriæ habet vt domus in qua fata sit, tuta existimetur à piaculis omnibus. Et aliquantò post. Morsibus imponitur Betonica præcipue: cui vis tanta perhibetur, vt inclusa circulo eius serpentes, ipsæ sese interrimant flagellando. Datur & ad ictus semen eius denarij pondere, cum tribus cyathis vini: vel farina drachmis tribus cū sextario aquæ, farina & imponitur. Obolis tribus in aqua contra purulentas, contraq; cruëtas excreationes facit, faciles præstat vomitiones radix eius, ellebori modo, quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spine leuat eiusdè farina ex aqua mulsa. Aluum soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Paraly sin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur. Galenus vim habere incidendi scripsit, vt gustus indicat. Amariuscule enim est, & subacris herba, id quod ostendit particulatim edita eius actio. Nam consistentes in renibus calculos rumpit, pulmonem, pectus, & iecur expurgat, abstergitque: menses quoque ciet,

Lib. 25. c. 8.

Ibidem.

Variis in locis.

Lib. 7. sim.



ciet, & comitialibus prodest, tum rupta conuulſaque curat, & in omnibus bestiarum morſibus vlceri illita auxiliatur, postremò acidum ruſtantibus & ischiadicis pota auxilio est. Multò plures eâſque perexcellentes eius dotes celebrant alij herbarij, vt Apuleius. Scripsit & de iis proprium libellum Antonius Muſa clariffimus Auguſti Caſaris medicus, in quo hæc de ea memoria prodidit. Herba Betonica naſcitur in pratis, & montibus mundis & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficiis, & periculis. Loca ſacra & buſta à viſis metuendis tuetur, & defendit: denique res omnino ſancta est. Ceſtron vocatur, & Pſychotrophon, ſiquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyſſo pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo, folia proferet quercus, odorata: ſemen in ſummitate thyſſi ſpicati thymbræ modo. Pollet vniuerſa planta dotibus ſerè innumeris quandoquidem tuſa, capitîſque vulneribus illita, ea mira celeritate conglutinat. Præſtat id tamen efficaciùs, ſi tertio quoque die iterum atque iterum imponatur. Aiunt prætereà tam valentis eſſe facultatis, vt oſſa quoque fracta extrahat. Radicum ex aqua decoctum ad tertias, fotu, oculorum doloribus medetur, quod item præſtant contrita folia, & fronti ſuperimpofita. Succus à folijs per ſe tritis expreſſus, aut priùs aqua maceratis, aurium dolores mulcet, ſi addito roſaceo in aures egeſidus inſtilletur. Idem drachmæ pondere hauſtus in aquæ calidæ cyathis quatuor ſanguinem illum per inferna trahit, cuius redundantia caligines oculis offundit, quò fit vt etiam viſum acuant comeſa folia. Eadem cum ſalis momento contuſa, naribûſque immiſſa ſanguinem inde fluentem ſiſtit. Betonicæ decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores ſinit, ſi eo oſa ſapiùs colluatur. Herba ipſa ex tepête aqua pota ſuſpirioſis & anhelofis maximè proficit, folia melle excepta tabidos iuuant, præſertim qui purulenta extuſſiunt. Eadem tribus diebus continuis deuorata drach. quatuor pondere, aut ex frigida aquæ cyathis quatuor ebibita ventriculi dolores mulcet, iocinoris verò, ſi ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitis medetur. Sanat & renû vitia ex mulſo bibita duarum drach. pondere: ex vino autè vetere trium drach. pondere, additis piperis granis ſeptem & viginti ad lateris lumborumque dolores vtiliſſimè bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis ſumpta, alui & inteſtinorum tormina remouet, ſi tamen à crudis non fiant ſuccis, foliorum quatuor drachmis in aquæ mulſæ cyathis octo eporis, commodè citatur aluus, ſananturq; iis ex vino ſumptis coli inflammatione vexati. Betonica in eclegmate ex melle ſumpta nouâ dieb<sup>9</sup> tuſſim ſedat. Pota in aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, addita plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamen in acceſſionibus tantum fieri debet. Idem præſtat etiam in tertianis, ſi cum pari pulegio aſſumatur. Sanat ipſo quoque ordine etiam quartanas in quatuor aquæ calidæ cyathis hauſta, quatuor drachmarum pondere: addita mellis vncia calculi franguntur. Betonica ex tepête aqua ſceliciter bibitur hydropicis. Pariendi celeritatem adfert, vterique cruciatus à frigidityate conceptos mulcet, ſi ex calida aqua, aut mulſo duarum drachm. pondere propinetur. Contrita folia & illita præciſos glutinant neruos, & reſolutos iuuant. Eadè trium drachmarum pōdere ex caprillo lacte ſumpta tribus diebus, ſanguinem ore reiectum cohibent: pari vini veteris meſura, medentur ruptis, & ab alto deuolutis. Præſumpta, ebrietatem arcet. Ex vino frequenter hauſta ictericos ſanat: ſuillo adipi admixta carbunculos curat. Pota ex aceto mulſo vnius drachmæ pondere viatoribus longo itinere defatigatis vires mirificè reſcit: ſaſtidia abſtergit, & ſtomachicos recreat. Aduerſatur venenis, & ſerpentium, & venenoſorum, rabidorumq; quorumcumq; animalium morſibus, non modò intus ſumpta, ſed etiam extra emplaſtri modo impoſita. Cuniculoſa ſinuofaque ſanat vlcera cum ſale indita. Ex vino hauſta menſes ciet. Potu dolores podagricos lenit, præſertim radicum decoctum

potum



potum, idemq; præstant cōtrita folia imposita. Hæc Anton. Musa. In hac herba id observandum, radicū facultates longè dispares à foliorum & florum viribus, vt potè quæ multum stomacho orique ingrata, nauseam, rugitus, vomitumq; ciant, folia contrà odora, aromatica, & grato sapore nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica.

BISTORTA, CAP. XXXVIII.

**B**ERBARI & Officinæ Bistortam appellant & Serpentariam, Galli *Nomina*  
Bistorte, Germani *Natterwurtz*. Bistortam quidem, quod radice sit ser-  
pentis iacentis modo in se cōtracta & intorta: serpentaria verò, quod  
vbi primum è terra erumpit, linguæ serpentis tenui pelle vestitæ for-  
mam obtinet. Sed diligenter cauendum ne hæc serpentaria cum Græcorum *Spa-*  
*κισίον*, Latinorum Dracunculo siue serpentaria confundatur, quod hæc ab illa for-  
ma & viribus plurimum discrepet. Quo verò peculiari nomine à veteribus Græcis  
medicis & latinis appellata sit Bistorta, inter herbarios nondum constat. Quidam

BISTORTA, *Math.*



BISTORTA, *Maior.*



Britanicâ Dioscoridis ex foliorum similitudine & viribus iisdem esse contendunt. Lib. 4. c. 2.  
Quod si qui *μελάντερα* καὶ *δασύτερα* folia obiiciant, aiunt illi, *μελάντερα* saturatiore  
esse colore, & quasi purpura nigricante, vt in viola martia, quam idem *μέλανον* vo-  
cat, folia aduersa parte, idq; significari: *δασύτερα* verò non hic pilosiora intelli-  
gere oportere, sed rigidiora, densiora, & firmiora. Quod addunt radicem britanicâ  
esse, respondent alij Dioscoridem aut minoris Bistortæ radicem intellexis-  
se, quæ non admodum crassa est, aut locum hunc à quopiam rei ignaro temerè  
immutatum, qui cum radicem breuem legisset, *παχὴν* in *λεπτήν* mutauit: quia quæ  
sunt breues radices, sæpius sunt etiam tenues, breuem verò esse videre licet cum la-  
patho aut minoribus collatam. Duo sunt herbariis & Officinis Bistortæ genera  
forma non admodum diuersa. Vnum, Bistorta maior, & serpentaria fœmina, qui-  
busdam Colubrina. Alterum Bistorta minor, seu Bistorta mas. Adiciunt quidam  
Bistortam minimam. Bistortæ maiori folia sunt longa, rumicis acuti simillima, aliquantò

*Genera.*

Fuch. cap. 296.

*Forma.*



aliquantò minora, non tam lævia, sed rigidiora & parùm rugata, ambitu paululùm sinuata, auersa parte cæsa, aduersa ex atro virètia: cauliculi teneri, glabri, tenues, pedales aut cubitales, rotundi, in summo spicati cùm floribus purpureis, semine anguloso, fusco: radix longa, intorta, foris nigra & fibrata, intus rufescens, sapore glandis, nimirùm perquã austero, & adstringete. Huic minor & minima planè similis, nisi quòd hęc folia angustiora, læuiora, radix breuior, minorque, ac magis in sese conuoluta, & contorta, sine vllis fibris, foris fusca, intus ex atro rubescens, eodem quo maior sapore. Nascuntur locis montosis, vmbrosis & humidis. Florent mense Maio & Iunio. Omnium radices mirificè adstringunt, vt refrigerandi & exsiccandi facultate præditas esse nemini dubium sit. Antiquus manuscriptus herbarius frigidas & siccas esse in tertio ordine censet. Quare vulnera glutinant, scetum in vtero retinent, vomitum biliosum reprimunt, dysenteriam sanant. Efficacissima ad vlcera serpentina, & ad fungosa polyporum in naribus & palato interiore flagella abluenda aqua earum stillatitia, quæ etiam ad hepaticam sanguineamque resudationem plurimùm pollet epota.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

Fuch. cap.

Pet. Pen. in

Adu.

## CENTAURIVM,

## CAP. XXXIX.

Nomina

Genera.

**K**ENTAYPION Græcè, Latine similiter Centaurium, Arabicè Kanturion, in Officinis Centaurea nominatur. Dioscorides, Galenus, & ceteri, omnes prisci medici centaurij genera duo statuerunt, effigie & natura multùm diuersa. *κενταύριον τὸ μέγα*, Centaurium magnum, ab aliquibus dicitur, teste Apuleio, Maronion, Nesson, Pelethronia, Limnites, Hemeroten, *αἶμα ἡρακλέους*, id est, sanguis Herculis, Polybidion & Vnesira, Arabicè *Kanturion Kibir*, siue *Sacurion habre*, in quibusdam Officinis non sine errore Raponticum, Alterum *κενταύριον τὸ μικρόν*, Latine Centaurium paruum, Limnesion & Limnæum, Libadion Plinio, febrifuga, fel terræ, multiradix, Arabibus *Kanturion sege* & *sege*, seu *kanturion sages*, Officinis Centauria minor, Gallis *petite centauree*, & *fiel de terre*, Germanis *klein Tansend*, Italis *Centaurea minore*, *Hetruscu Biondella*, quòd detergere, & Hauios reddere ex lixiuio mulierum capillos possit. Dicitur est Cetaurium, teste Plinio, quòd eo Chiron Centaurus curatus sit cùm Hercules excepti hospitio tractantur, sagitta excidisset in pedem, quare aliqui Chironium vocant. Limnesium & Limnæum, quòd secundum aquarum scatebras & paludes, quas Græci *λίμνας* vocant, nascatur, sic enim Dioscorides scribit. *κενταύριον τὸ μικρόν* (addit in vetere codice *ἢ λεπτόν*) *ὅστις λευκαῖον καλεῖται, ἐπεὶ τὸ ἐν ἑνὶ κοίτις φιλῇ τὸ πᾶν*. Id est, Centaurium paruum & tenue, quòd nonnulli Limnæum vocant, quoniam humida loca amat. Ruellius, Centaurium limnesium aliqui vocauere, &c. Quæ cùm Plinius conuertisse videtur his verbis. Est alterum Cetaurium cognomine lepton minutis foliis, quòd aliqui libadion vocant, quoniam secundum fontes nascitur, &c. pro limnesium & limnæum (quamquam hæc vox tolerabilior quàm Limnesium) libadion vox in Dioscoride reponenda videtur, quòd circa *λιβάδας*, id est, locos irriguos nascatur. Fel terræ propter summam quam habet amaritudinem: febrifuga, quòd febres pellat corpore. Præterea Plinius Exacon Gallis dici Centaurium minus scribit, quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore exigit per aluum, quæ vox Exacon an rectè legatur dubitari potest, & an Gallica sit, & non supposita ab aliquo ad Græcam formam ab *ἐξάγειν* efficta, his enim verbis sententiam Dioscoridis hanc expressisse videtur. *ἀφ' ἧς ἴσται δὲ καὶ πονομένη ἀγχι καὶ κοιλίαν χαλῶδι καὶ παχέα*. Id est, De cocta autem & pota, biliosa ac crassa per aluum ducit. His Plinius tertiam Centaurij speciem subiungit ex Theophrasto, quæ centauris & triorchis appellatur. Verba eius hæc sunt. Tertia est Centauris cognomine triorchis, qui eam lecat rarum est vt non vulneret sese. Hęc succum sanguineum mittit. Theophrastus defendi eam impugnari.

Ibid.

Cornar.

Embl. 7.

lib 3.

Ibidem.

Lib. 25. c. 6.

Cap. 1. lib. 9.

hist. &amp; cap.

9. lib. eiusdem.



pugnariq; colligētes tradit à triorchē accipitrū genere, à quo & nomē accepit. Imperiti cōfundunt hęc omnia, & primo generi assignāt. Sed Plin. ex suo, ipsius iudicio hanc tertiā speciē excogitavit contra Græcorū omnium sentētiā, qui, vt diximus, maius & minus duntaxat Centauriū, agnoscūt. Et Theophr. de Cētauride nō vt de tertia aliqua specie scripsit, sed simpliciter centauridē nominavit, non triorchē, sic enim ait. φυλάττω δὲ καὶ τὴν κενταυρίδα τέμνοντα, ὅπως ἂν ὥστος ἀπέλθῃ. Quæ malè cōvertisse Gaza videtur his verbis, febrifugā quoq; secātes accipitrē tritigerū nuncupatū cauere, vt sine vulnere possint discedere. Videtur enim cētaurida Centaurium minus accepisse, quod febrifugam appellari diximus, cūm aperte Plinius hanc ab illo distinguat. Postremò Plinius alios reprehendens qui succum sanguineū, & cætera primo generi assignāt, ipsemet errat. Primū enim genus succū sanguineum emittit, subrubente succo plena radice, vt Dioscorides scribit. Herbarij recentiores centaurij minoris duo genera faciunt, quæ foliorum duntaxat incitura differunt. Id quod serratis est foliis Dodonæus depinxit, quo vireta Belgica

Cor. Emb.  
7. lib. 3.

Lib. 9. hist.  
cap. 9.

**CENTAVRIVM, Maius.**



abundant. Præterea centaurij lutei duo alia genera. Centaurium magnum describit Dioscorides foliis iuglandis, oblongis, colore viridibus vt in brassica, in ambitu serratis, caule seu lapathi, duorum aut etiam trium cubitorum, qui à radice multas propagines habet, in quibus capita sunt papaveri similia, in ambitu oblonga, flos est cæruleus, semen cnico simile, ceu laneis quibusdam floribus inuolutum, radix crassa, solida, grauis, bipedalis, succi plena, acris cum quadam adstrictione ac dulcedine, subrubra. Codices quidam vetusti habent, ὁμοίος ὁ καὶ ὁ χυλὸς ἐρυθρὸς, id est, similiter autē & succus rubet. Hanc Dioscoridis descriptionē declarauit Plinius his verbis. Folia sunt lata & oblonga, serrata in ambitu, densa ab radice: caules ternū cubitorum, geniculati. In his capita ceu papauerū. Radix vasta, rubescens, tenera, fragilisq; ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam dulcedine (amaritudo, Cētaurij minoris radici potius cōuenit,) est enim alterius radix ex Diosc. δεικνύται ποσὴς τὴν φέως καὶ γλυκύντητος, id est, acris cum

Forma.  
Lib. 3. c. 6.

Lib. 25. c. 6.

quadam adstrictione & dulcedine. ) Nascitur in collibus pingui solo. Laudatissima in Arcadia, Elide, Messenia, Pholoë, & Lyceo, atq; in Alpibus, pluribūque aliis locis. Dioscorides scribit amare solum pingue & apricum, ac siluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponēso, in Arcadia, Elide & Messenia, pluribūq; locis circa pholoen, Lyciam & smyrnam. Herbarij multi diligēter hodie colūt in hortis. Hoc Centaurium nihil aliud est quā insignis illa planta cuius vastam radicē patres nostri rhaponticum esse crediderunt. Floret Maio & Iunio mensibus, Iulio segetes profert. Alterum Centaurij maioris genus Clusius ostendit, quod folia habet oblonga. Armoraciæ similia, & ad Glaſti foliorum similitudinem accedentia, non in particulas diuisa, vt vulgare maius, sed per ambitum duntaxat serrata, intenso virore & amariuscūlo sapore. Caules inter folia prodeūt cubitales aut ampliores, rotundi, in summo bifidi aut trifidi, scabra capita sustinentes, alterius Centaurij maioris amula, & florem villosū, sed colore candicante, deinde semen Cnico ferè simile, seu potius alterius maioris. Radix crassa admodū, dura & longa, densō cor-

Locus.

Tempus.



CENTAURIVM *Mainus*  
*alterum, Clusij.*

Temper.

Lib. 3. c. 6.  
Vires.

scor. exemplaria non habent. ἐκλήθη δὲ πανάκεια, ἐπεὶ διὰ πάντα τὰ φλεγμαίνοντα παύει, καὶ κρυοσμία πωλεῖν. Id est, Est autem vocata panacea, quod sanet omnes inflammatos affectus, ac vulnerum contusiones. Quibus Ruellius de suo quedam addit. Cognominata est, inquit, & panacea, quoniam medetur omnium morbis, ubi aliqua inflammatio timetur omninoq; multis morbis opifera est. Illita vulnerum labra consolidat. Ἐφαγγεῖας τε παύει ἐν ἐνέμασι, καὶ ληθόντας. σωάγειαι δὲ τοῦτο ἴλις μέλλοντος ἀνατέλλειν ὡρὴ ἀγνὴ, ὅτε πωλεῖται ἅπαντα. Quæ sic Ruellius. Stillicia virinæ calculosq; sanat iniectioe. Legēda præcipitur cum in eo sol est, vt emergat, hora pura, dum luce sideris erumpentis vniuersa complētur. Alij sic interpretati sunt. Legitur matutinis sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia complētur. Sic verò Andr. Lacuna. Colligitur autem hæc ad exortum solis, purissimo vere aduentante, quo tempore vniuersa cōplentur. Plinius centaurij huius maioris facultates eisdem recenset, sed diuersis in locis. Vis in vulneribus tāta, vt cohaerescere carnes etiam tradant, si coquantur simul. In vsu radix tantum duabus drachmis bibenda, quibus dicetur, si febris sit, in aqua trita, cæteris in vino, medetur omnium morbis decoctæ succus. Alij ouium legunt non omnium. Et medetur serpentium iccui centaurij maioris radix drachma in vini albi cyathis tribus. Eadem vuluæ doloribus potu fortisq; prodest. Dersa verò & apposita extrahit partus emortuos: sanguinem reiicientibus medetur, stomacho & dyspnœæ eclegmate, pleuriticis & peripneumonicis bibitur, maiori centaurio tormina discutiuntur. Ruptis conuulsisq; ex alto deiectis datur. Vlcera quæ cacoëthe vocāt sanat in sparsum vel illitum. Oculorum aciem centaurio maiore putant adiuuari, si addita aqua foueantur. Galenus ex Centaurij contrariis in gustu qualitatibus contrarios eiusdem effectus colligit his verbis. Centaurij magni radix sicut gustu cōtrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus præstat. Gustu itaq; acris simul adstringensque apparet cum leuicula dulcedine. At in actionibus, acrimonia quidem caliditatis opera ostendit menses prouocans, & foetum mortuum detrahēs, viuumq; corrumpens atque eiiciens. Adstricchio

tice tegitur, foris nigro, intus flauescente, succumque croceum resudante, qui cum quodam amaro aromatico est. Supra Olyssiponem, lapidosis iuxta Tagum collibus duntaxat inuenit Cladius, ubi Lusitani Tagi accolæ Rapontis vocant. In Belgio peregrinum est. Dodonæus in Historia stirpium Rha, in Purgantium Historia Centaurium alterum magnum vocat. Calidum id siccumq; est ad tertium vsq; ordinem, simul & adstringens. Radix eius conuenit ruptis, inquit Dioscorides, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, tussi antiquæ, sanguinem spuētibus, non febrientibus cum vino, febrientibus cum aqua, ita vt radices duæ drachmæ trita, similiter ad tormina & vteri dolores. Ducit etiam menses & foetus, in collyrij formam dersa, & vtero apposita. Eadē succus præstat. Vulneribus prodest, humida quidem confusa, arida verò prius madefacta, atq; ita confusa coniungit enim ipsa & glutinat. Quin & carnes dum coquantur inter se committit, si quis ipsam confusam si nullo coquat. In Lycia succum ex ipsa exprimunt, quo pro lycio vtuntur. Quæ sequuntur quedā Dioscor.

Lib. 25. c. 6.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 26. c. 15

6. 7. 8. 13. 14.

Lib. 24. c. 12.

Lib. 7. sim.



frictio verò opera crassæ terrenæq; frigiditatis cum vlcera glutinet, & sanguinem reicientibus proffit. Exhibentur autē eius drachmæ duæ febricitantibus quidem cum aqua, non febricitantibus cum vino. Porro secundam omnium simul qualitatum actionem ruptis, conuulsis, dyspnææ inueteratæ tussis cōuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est, oportet, sed partem quoque euacuata roborare. Vacuationi itaq; accommodata est acrimonia, utique cum non sola sit ac purra, sed aut dulcedini iuncta, aut certè non prorsum amaritudini. Siquidem vehementiam hanc atque violentiam mixta illi temperata quædam substantia cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quæ euacuata sunt, roboranda, contrahendaque, adstrictione est opus. Eadem quæ radix & succus ipsius efficit. Arabes, ut Mesues, Auicennas, Alcanzi vires maioris & minoris centaurij ferè contrarias cōfuderunt, ut dicemus. Datur Centaurij maioris radix, auctore Matthiolo, hydropici, icterici, & iocinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem trita. Eiusdem recentis succus vnciæ pondere haustus, ac etiam vulnere illitus auxiliatur à serpente demorsis.

In cōm. c. 6  
lib. 3.

**CENTAVRIVM, Minus.**



Centaurium minus hyperico aut origano simile est, caule anguloso, palmum excedente, flores è puniceo colore ad purpureum inclinantes, ad lychnidis similitudinem: folia parua, prælonga velut ruta: semen simile tritico: radix parua leuis, inutilis, gustu amara. Huic descriptioni multum lucis adfert Plinius his verbis. Est alterum Centaurium cognomine lepton, minutis foliis, quod aliqui libadion vocant quoniam secundum fontes nascitur, origano simile, angustioribus & longioribus foliis: anguloso caule, palmum alto, fruticante: flore lychnidis: radice tenui & superuacua, succo efficax. Hoc Cētaurium nostri fel terre vocant propter amaritudinem summā. Id verum legitimumq; esse quod in Officinis passim vsurpatur, notius est quam ut probatione egeat. Propter lacus & rigua loca crescit auctoribus Diosco. & Plinio. Apuleio verò in solidis & pinguibus quoque locis. Floret æstate & Autumno, quo maximè tempore, quia semine prægnans est, colligitur. Herba recens confusa, inquit Dioscorides, & imposita vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Decocto & potu (legendum enim *πρωμένη* non *καταπρωμένη*, id est, si deuoretur) biliosa ac crassa per aluum ducit. Dococtum ipsius conuenientissime ischiadicis infunditur, sanguinem ducēs & dolorem leuans. Succus ad ocularia medicamenta utilis est, purgans cum melle quæ pupillis tenebras offundunt. Idem subditus menses & foetus extrahit. Epotus autem peculiariter neruorum affectibus prodest. Horum quædam Plinius tradit sparsim. Purgat aluum succus Cētaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis, & aceti, bilēque detrahit. Eiusdem succus potu fortūque menses ciet. Articulis succus ex Cētaurio minore prodest, idem neruis utilissimus. Succo eiusdem cum mel-le culices, nubeculas, obscuritatem discuti, cicatrices extenuari putant. Sed succi exprimendi modum Plinius nec rectè, nec perfectè tradidit. Quidam, inquit, caules concisos madefaciunt diebus xvij. atque ita exprimunt. Dioscorides contra dilucidè & integrè non huius solum, sed omnium succorum extrahendorum rationem exponit. Galenus distinctiùs Centaurij minoris temperamentum & vires persequi-

Forma.

Lib. 25, c. 6.

Locus.

Tempus.

Vires & Temper.

Lib. 3, ca. 7.

Lib. 26, c. 8.

Lib. 25, c. 12.

Lib. 7, sim.



tur his verbis. Centaurij minoris radix planè inefficax est, sed caulis eius extremus & folia potius quæ illic inhaerent, & flores vtiliora sunt. Vincit in eis qualitas amara, pallulum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum, admodum exsiccativum est medicamē, expers mordacitatis. Ulcera itaq; magna herbæ ipsius recentis illitu glutinantur, & vetusta, quæque agrè ad cicatricem perducì queunt, cicatrice eodem modo utentibus obducuntur. Arefacta verò glutinatoriis & desiccatoriis miscetur medicamētis, iis scilicet quæ sinus & fistulas sanare possunt, veteresque duritias emollire, tum vlcera maligna & cacoethe curare. Miscetur etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur. In quibus ea medicamenta præstantissima sunt, quæ vehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullā habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa & crassa ducens: nam & talia purgant, quamquam cum adeò vehemēter operabitur ut cruenta euacuet, tunc plus proderit. Succus porrò eius cum similis sit facultatis, hoc est exsiccativæ & abstersivæ, &c. iam comprehensā pulchrè præstare potest: & cum melle oculis illinitur, mensisq; ac færum euocat. Sunt qui ipsum præbeant & iis quibus nervi affecti sunt, ut euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt: quippe quum iocinoris quoq; obstructions optimè expediat, bonumque sit lienis indurati remedium foris impositum, nec secus si quis bibere sustineat. Extat liber de virtute centaureæ Galeno falsò inscriptus, in quo permultæ & permagnæ eius facultates enarrantur. Mesues, ut diximus, temperamētum vtriusque Centaurij & facultates confundit, & vtrumque purgare pituitam crudam, & bilem scribit, sed minùs magis, cui soli vis hæc à Dioscoride, Galeno Paulo tribuitur, nō etiam magno: sanguinem quidem vacuare, si clystere in ischiade iniicitur, Galenus minori tribuit. Datur Centaurij minoris decoctum vtiliter potādum tertiana febre laborantibus, quod bilem per inferna deiciat, unde febrifugæ nomen. Idem aut succus iocinoris & lienis obstructions ac duritias tollit. Alui lumbricos pellit drachmæ pondere ex melle potus, tum vmbilico illitus. Herbæ comæq; decoctum lentigines, varos, al-

Li. 2. simpl.  
cap. 10.

Matth. in  
cap. 7. lib. 3.

### CENTAVRIVM,

*Luteum prius.*

Forma.

Locus.



phos, & cætera cutis vitia exteriora adhibitu, instillatur succus verniculosis auribus, quinetiam illinitur cõtra papulas, & manantia capitis vlcera. Centaurium luteum radice nititur exigua, fibris crispis, tenuibus, candidis capillata. Caulis ei est sesquipalmm altus, rotundus, viridis, sed albo quodam veluti pulvisculo pubescens, qui digitorum affricu facile deraditur: folia ex interuallis bina, aut potius vnicum binis apicibus vtrinque donatum, crassa, carnosa, centaurij minoris similia, latiora, non ita venosa, concauo alarum sinu lacunosa, & dispaci modo velut alueum efficientia, quo ros imberve contineri possit. Ex alueolorum medio furculi assurgunt nunc plures, nunc pauciores qui florem sustinent aureum, foliolis octo constantem. In asperis & saxosis gignitur. Tota planta gustu est amaro. Huic simile est caulibus foliisq; Centaurium aliud luteum, hoc discrepans quod nullos furculos edat ut superius, quibus flores insideant, sed in summo caulis fastigio florem singularem mittit chrysanthemo similem. Iisdem in locis reperitur, eodemq; est gustu. Est & Centaurium nothum in humidis Alpium vallibus proveniens, radice crassa, nigra, ligulosa, huc illuc sparsa, intus alba, gustu amaro: caulibus multis, cubito altiorib; densa





densa lanugine obfita, angulosis: foliis cannabis, utrinque dissectis, in vno pediculo villosa & ferè cubitali multis, ordine collocatis, numero semper imparibus, ut ferè tredecim aut quindecim singulis sint pediculis, qua pediculi florem sustinentes è caule prodeunt, ipsum caulem utrinque amplectentibus, & illic in longum & angustum diuisis, floris capitulo, scabiosæ vulgari simili, hirsutis erectisque squamis compacto, flore luteo.

FUMARIA,

CAP. XL.

**F**ΑΙΝΟΣ Græcis, καπνιον & καπνιτης, Latinis Fumaria, potest & fumus & fumida dici, Arabibus Scheiteregi, Officinis Fumus terra, Gallis Fumeterre, Germanis Erantrauch. Dicitur Fumaria au ctore Dioscoride, Galeno, Plinio, quod eius succus oculis inditus veluti Fumus lacrymas moueat. Dioscorides vnius duntaxat, Plinius duorum Fumariæ generum meminit. Herbarij recentiores ad Fumariæ genus tres alias species referunt. Fumaria tradente Dioscoride, herbula est fruticosa, coriandro similis, valde tenera, foliis candidioribus, cineracei coloris, vndique numerosis, flore purpureo. Ea est Fumaria hodie multo vsu, & restibili fertilitate omnibus notissima, quadratis furculis, fruticosis, foliis plurimis, mollibus, teneris, ex viridi in cinereum pallorem languentibus, crebris incisuris: flosculis purpurascens, interdum albidis, interdum rubellis: semine minuto admodum, rotundo, virente ex fusco, radice singulari, paucissimis fibris. Nascitur in segetibus, hortis, vineis, sepibus & maceris, aliisque locis inculcis ac pinguib. Plinius duas herbas capni nomine proponit. Capnos prima, inquit, quam pedes gallinaceos vocant, nascens in parietinis & sepibus, ramis tenuissimis sparsisque: flore purpureo, viridis, succo caliginem discutit. Itaque in medicamenta oculorum additur. Similis & nomine & effectu, sed alia est capnos, fruticosa, pratenera, foliis coriandri, cineracei coloris, flore purpureo, nascitur in hortis & segetibus hordeaceis, claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque

Nomina

Genera.

Lib. 4. c. 105

Forma.

Li. 25. ca. 13.



## FUMARIA.

Cap. a. Pli.  
Lib. a. c. 15.  
Forma.

Tempus.

Ibid.

In cap. m.  
lib. 4.

Pena in  
Ad.



FUMARIA Phragmites,  
Dodonai.

Fumaria  
lutea.  
Forma.  
Matth. in  
cap. 105.  
lib. 4.



Locus.

In cap. 105.  
lib. 4.

tatis, quam facultatem Capno vulgari alibi minimè tribuit, suspicatus est aliam capni speciem hic corydalinim intelligi, nimirum Splith Illyricam capno congenerem, quam colicis valde prodesse sese expertum esse affirmat. Sed anceps valde & infirma est hæc ratio. Etenim nostras etiam Fumaria non infrenuè colicis opitulatur, digerendo ac discutiendo viscidam pituitam, eamq; è renibus eliciendo, quæ non

ceu fumus, vnde nomen accepit. Posterior vulgaris nostra & Dioscoridis, Galeni, Pauli, Fumaria est. Prior ex Dodon. sententia hic depingitur quæ multis ramulis fruticat, teneris, in quibus folia numerosa, incisa, colore, sapore, & quadatenus forma alteri fumariæ similia, præterea, viticulis & capreolis herba ipsa sepibus & vicinis plantis pertinaciter adheret: flosculi eius cædidi, caruleo colore nonnihil distincti: in filiquis parvis semen: radix singularis, longitudine digitali. Vere primo vt & nostra vulgaris prodit, Maio & Iunio utrâq; floret & capitur. Hæc capnos, inquit Dodon. Plinij imitatione, *Pied de geline* dici potest. Hermolaus *χένον φραγμιτῶν* nominat. Certe Hermolaus in Corollariis hanc capnon Plinij Chelidonium phragmitem vocari ab Aetio scripsit, ad exanitiones partium in iocinore curuarum vtilem dictam, vt putat: quoniam succo discutit caliginem vt chelidonium, & ob id in medicameta oculorum additur, vt in collyrium Marciani eam Chelidonia capnitida cognominantis. Aliis Fumaria lutea siue môtana, Illyriorum Splith, capnos seu chelidonium phragmites Aetij creditur, quibudâ Galeni Corydalis. Crescit hæc planta foliis chelidonijs maioris, vel Fumariæ bulbosæ, sed minoribus multò, glaucis cineritiis, pluribus, scilicet palmaribus: cauliculis exilibus & pedalis: floribus luteis, stellatis, chelidonijs minoris: radicibus numerosis, tenuibus, latius sparsis, subalcantibus: semine rotundo, depresso, abro virente in corniculis Fumariæ bulbosæ, vel chelidonijs maioris, minoribus multò, cui admodum similis facie & colore est. Vnde rectè conicere videntur nonnulli, vt diximus, esse capnon chelidonium Aetij. In calidiorum regionum montibus Illyriæ, Dalmatiæ, Hetruriæ & Narbone provenit. Serius quàm Fumaria nostra, nempe Iulio & Augusto floret. Matthiolus cum legerit in nothis simplicium appellationib; Dioscoridi ascriptis capnon quibusdam corydalion dici, & cum Galenus de Galerita scribens quæ Corydos Græcè dicta valde colicis cõfert, hæc meminerit quæ corydalis appellatur, magna quoque aduersus colicum dolorem vtili-



FVMARIA Lutea montana  
Corydalis, Matth.

FVMARIA Bulbosa,  
Matthioli.



non rarò colici doloris speciem efficit. Quare aliis potiùs Corydalis videtur esse Fumaria bulbosa, ab effigie alaude auicula, cuius capitis galericulatum verticem emulantur flores cristati, turbinatq; cornicula. Mollis in vniuersum planta est, quæ vere primo vnà cum chelidonio exoritur, & Maio, vel ad summum Iunio contabescit: tenellis subalbidisque foliis coriandro vel ranunculo primi generis proximis, lauore casio & diuisura ad Fumariæ folia accedentibus, maioribus tamen floribus purpureis, & aliquando albis, radice tuberosa, inferiore parte sessili, superiore monticuli instar elata, intus caua, nigro exterius cortice, buxea interiùs pulpa, odore aristolochiæ, gustu amara, semine pellucido in corniculis. In vmbrosis, decliuibus, & nemorosis saltibus frigidioribus nascitur. Martio & Aprili mensis floret. Hanc plantam herbarij quidam aristolochiam rotundam esse prodiderunt, eandemque etiam tanquam veram rotundam vsurparunt. Fuchsius minimè genuinam esse aristolochiam rotundam scribit, sed Plinij pistolochiam, ab illa multum differentem, vt scribit Matthiolus. Nam Plinianæ pistolochiæ radix, tuberosa & inanis non est, sed clematide tenuior, densis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Quare rectius veriùsque, inquit Matthiolus, dicenda Plinij Fumariæ genus alterum, quod his depingitur verbis. Alia est capnos fruticosa, prærenera, &c. At hanc Dioscoridis Fumariam & nostram vulgarem esse testatur hæc Plinij delineatio ex Dioscoride ita expressa, vt eius descriptionis verba totidè Latinis verbis perspicue reddiderit. Addit Matthiolus eandem esse de qua locutus sit Aetius in curatione obstructi iocinoris, vbi chelidoniij capni meminit, quod vna cum chelidonio primùm erumpit, hirundinum aduentu. Contra doctis aliis scriptoribus placere diximus Fumariam luteam siue mōtanam & Splith Illyricam Aetij potiùs esse capnon chelidonium. Diuersum ab his omnis Fumariæ speciem pictam Doct. Myconus misit, & sic ferè delineauit. Eius folia sæpius humi sternuntur cinerea, multum ad Fumariam accedentia, maximè quæ in imo

Pen. in  
Aduers.  
Fumaria  
Bulbosa.  
Forma.  
Matth. in  
cap. 4. lib. 3.

Locus.  
Tempus.

Ca. 31. hist.

Li. 25. ca. 15.

Lib. 19. c. 2.



sunt: nam quæ in caulibus visuntur, tenuiora & fœniculærea sunt. Caulicul<sup>o</sup>s profert multos, quadratos, cauos, geniculatos, surculosos, palmum altos, in quibus folia tenuia admodum, vt diximus. In horum fastigiis flores multi congesti sunt, Fumariæ similes, singulis candido, purpureo, luteo variegatis: radicem tenuem, candidam non profundam. Floret Aprili mense. Totius plantæ sapor subamarus est cum leui acrimonia. Cùm forma & ferè qualitatibus à Fumaria non distet, Fumariæ genus ille putat esse, quamuis ab ea amaritudine vinca tur, & hæc illam acrimonia superet. Vulgus etiam Fumariam vocat. Passim in vinetis segetibusque pullulat. Eandem Clusius depinxit & descripsit Capni tenuifoliæ nomine. Inueniri ait in plerisque Hispaniæ regionibus in agrorum limitibus, & iuxta vias, nonnullisque Narbonensis Galliæ locis, præsertim supra Arelatem. Quidam in Hispania Sideritum tertiam sine ratione facere voluerunt. Vulgò à nonnullis Palomilla, & Palomina dicitur, quemadmodum Fumaria communis. Huc iungen-

Lib. Stirp.  
Hispan. ca.  
46.

FUMARIÆ Species.  
Myconi.



CAPNOS Fabacea radice,  
Pena & Lobellij.



da Capnos alba latifolia, à Lobellio tradita Splith album quorundam. Floribus albis, & latioribus foliis in segetibus Cornubiæ, & siluosis agrorum marginibus Brabantiaë prouenit: capreolis sepes arripit. Nec omittenda Capnos alia fabacea radice, cui singularis radix, & Fumariæ bulbosæ radici Pena par, sed minor, sine vlla cavitare. In Belgio, Germania, Sabaudia, vti Geneuæ, aruorum quorundam margines & sepes hac scatent. Nunc singularum vires declarandæ. Fumariæ succus, auctore Dioscoride, acris est, visum acuit, lacrymas ducit, vnde nomen habet. Illitus cum gummi euulsos palpebrarum pilos renasci non sinit. Herba ipsa cum cibo accepta vrinas ducit biliosas. Eadem planè de posteriore sua Fumaria Plinius habet. Claritatem facit inunctis oculis, delacrymationemque ceu fumus, vnde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras renasci prohibet. Et alio in loco Capnon herbam, inquit, qui edere, bilem per vrinam reddunt. Galenus non alias ei qualita-

Li. 4. c. 105.

Vires &

Temper.

Li. 25. ca. 13.

Lib. 26. c. 7.



CAPNOS *Alba*  
*latifolia, Lobelij.*

ei qualitates viresque assignat his verbis. Acris simul & amarae qualitatibus est particeps, neque tamen plane expers est acerbæ: quamobrem vrinam multam, biliosamque prouocat, sanatque iocinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit non parum trahens lacrymarum, velut ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lubricandum: siquidem herbam primum desiccata condebat: cum vero uti volebat, subductionis quidem gratia, melicrato aspergebat, roborandi vero causa vino diluto. Arabes vero multo plures easque insignes doctes ei tribuerunt. Mesues, Fumaria inquit, in superficie calida est, in profundo frigidior, non absolute frigida cum quibusdam, sicca ordine secundo. Ab illa autem substantia calida (quæ semini maior inest) & amara & subacris, purgatoria, attenuans, obstructa aperiens. A frigida autem styptica constringendo ventriculum, hepar, & cetera viscera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionem nullo externo

Li. 7. simpl.

Li. 2. simpl.  
cap. 14.

eget auxilio, cum per se purget ac roboret. Purgat verò bilem & vstos humores etiam ex venis: clarum ob id & purum efficit sanguinem. Quare mirè prodest morbis omnibus hos humores sequentibus, lepræ, scabiei, pruriti, impetigini, serpigini, & similibus cutis vitiis. Quia autem obstructa liberat, morbos omnes inde natos sanat, ut febres biliosas, putridas. Herba est innocens, quia tamen magna ubique copia luxuriat, vilescit. Flore est nunc subalbo, nunc cinericio, nunc pallido violaceo. Optima est viridis, tenera, foliis teneris, planis, non crispis, flore subviolaceo. Herba & succus eius veris initio sunt efficacissima: semen veris exitu. Quoniam verò imbecillius purgat, fortior euadet cum myrobolanis, senna, sero lactis visus exacinat, & illarum melle. Succus datur ab uncia dimidia ad uncias duas: pulvis à drachmis tribus ad drachmas quinque: decoctum ab uncis decem ad uncias quindecim. Auicenna frigidam esse primo gradu, siccam secundo statuit, & reliqua quæ Mesues attribuit. Fumaria lutea siue Splith sapor ferme qualis vulgaris Fumaria, efficacius tamen ea videtur crassos humores tenuare, & incisos per lotium educere, unde laus magna ad hydropem: robur etiam addit visceribus, reliquæ præstat quæ Mesues de Fumaria vulgari tradit. Aetius, præclare, inquit, obstructione liberat simulque firmitatem tum hepati, tum stomacho addit Capnium, quod & chelidonia nomen inuenit, succo eius expresso & desiccato: reponitur autem in pastillos coactus, & semel quidem exhibitus dolorem omnem tollit, ter autem datus in totum ab affectione liberat, præterquam quod & firmitatem visceribus addit. Decoctum quoque huius herbe potatum similem vim habet, etiam si valde febris citent ægri: aliquando herba ipsa exsiccat, confusaque & cribrata cochlearis mensura exhibetur.

Pct. Pen. in  
Ad.

Lib. 10. c. 2.

DENTI



Nomen.  
Forma.



OCTIS Herbariis Denticulata hæc dicetur à radice velut è dentibus paruis coagmentata, paulatim gracilescente, albicantibus fibris capillata: ab hac cauliculi multi profiliunt dodrantes, in quibus folia apij, siue potius fumarie luteæ, siue bulbosæ, in ambitu minimè

## DENTICVLATA.

Locus.

Cap. 9. li. 4.

DENTARIA Maior,  
Matthioli.

*antiquis obitus hinc fere  
hollan go munitur de hinc  
chris.*

Ibidem.



ferrata. Flos non in folia explicatur ranunculi modo, sed vt in pimpinella, in capitula angulosa conglobatur, ex viridi subluteus: singulis capitulis quini ferè sunt flosculi, siue septeni, gustu amaro & subacri. Ad fontiu scaturigines, riuulosq; prata rigantes, & in vmbrosis sepibus nascitur cū ranunculo nemorensi primo vere, statimq; perit. Sunt qui alabastritem vocent, ob radicis ferè pellucidæ ac nitentis splendorem, & candorem alabaistro similem: alij Moschatellam pratensem. Alia est à nonnullis Dentaria maior appellata, auctore Matthiolo, à quibusdam αφυλλος, quod sine folijs proueniat. Nascitur in opacis siluis aut aliis vmbrosis locis. Germinat primo statim vere. Caules profert dodrantes, teneros, fragiles, succolos, orobanches æmulos, in quibus à medio ad summum flores exeunt in purpura albicantes, & hirsuti, foliolis eiusdem ferè coloris in latere concomitantibus: è floribus caliculi oriuntur, in quibus paruum concluditur semen papaueris modo. Radice nititur albicante, magna, succosa, fragili, ex compactili squamarum congerie, miro sanè naturæ artificio constans, gustu acerbo cum quadam amaritudine. Cordi Amblatum videtur esse. Aliam tradit Matthiolus Dentariam minorem, quæ Germanis Sanicula vocatur, & inter symphyti genera recensetur. Folia habet pentaphylli, maiora, radicem candidam, admirando naturæ artificio ex nodulis quibusdam & incisuris cōstructam, dentium speciem quandam representantibus. Dodonaus easdem plantas aliter depinxit & descripsit. Priori cauliculum dodrantalem tribuit, folia cannabis aut Pentaphylli, quinque vni hærentia pediculo, oblonga, lata, in ambitu serrata: flosculos leucois similes colore, ex puniceo subpurpureos: siliquas etiam quales leucois, in quibus semina: radicem oblongam, inæqualem, multis crassis exasperatâ squamis. Alterius Dentariæ folia non Pentaphylli, sed fraxini modo digesta, costam habentia mediam cui annectuntur. Sunt verò ea oblonga, lata, & in ambitu crenata, crebrò ad vnam costam septena: flores candidos, siliquas prior



priori similes : radices quoque asperas & squamosas , sed quàm prioris minùs. Dodonęus peregrinas esse ait, & ad Leucoij genera referri posse. Matthiolus inter symphyta ac solidagines utràmque reponit. Alia Dentellaria à quibusdam nominata hic exhibetur, à Dalechápío collecta in vertice montis per quem Geneva

*DENTARIA Minor,*  
*Matthioli.*



*DENTELLARIA Rubra,*  
*Dalechampij.*



*DENTELLARIA Rondel.*



*LEPIDIVM Annuum, Lob.*



itur



itur ad Sequanos, proximè Pagum quem Incolæ vocant *Saint Sargue*, quasi Diuum Sergium. Serpit inter saxa & silices, radice sic eminentibus articularum vertebri compacta, vt ex coniunctis dentibus contexta videatur, mirabili naturæ in ea struenda artificio, vnde Dentellariæ nomen: caule læui, pede altiore, foliis eius plantæ quam Saniculam fœminam Fuchsius appellat: flore violæ, copioso, rubente, pulchro aspectu, semen in oblongis siliquis. Dentariam aliam Pena pinxit, Rondeletij & Narbonensium, quæ pæssim, inquit, propè sepes & sata in agro Romano & Mospeliensi fruticat, radice longiuscula: fibrata, caule, bicubitali, surculoso, foliis imis maioribus, cauli incumbentibus. Martidis draba ve ritu: floribus purpureis dilutis, extremo caulis ambitui confertim aggestis, quibus defluentibus semina gemmeis, villosis & hirsutis, & aliquantulum tenacibus folliculis includuntur, nigra. Tota planta gustu est acerrimo, & vrentis facultatis, quantoperè pollet, vt aliquandiu manu detenta, volæ manus vibicem inurat liuidum. Quare viri quidam docti Molibdanam esse Plinij opinati sunt, aut Lepidium Æginetæ. Vulgus studiosorum Dentariam putabat vocatam à Rondeletio: qui hac, vt pyrethris, aut similibus vrentibus utebatur ad sæuos dentium cruciatus mitigandos. Aliam tamen nouimus in agri Mospeliensis aridis locis satis frequentè, quæ etiam vulgò Dentellaria vocabatur, de qua diximus in lib. De plantis, quæ in asperis nascuntur. Herba est alia quæ à simili cum figura tum ortu foliorum, Dentellariæ Mospeliacæ Lepidij cauli incumbentium Herbariis Lepidium dicitur. Caulis bicubitalis, multifidus: flores albi, & semen foliaceis Thlaspi inuolucris clausum, acre gustu: radix fibrata. In Belgio hortensè, hyeme virens, foliis Lepidio maioribus. Hæc Lobellius.

## VERBASCVM,

## CAP. XLII.

## Nomina



ΛΟΜΟΣ Græcis & πῶμος Galeno auctore, Verbascum Latinis dicitur, Officinis Tapsus barbatus, Apuleio Lyncitis & Pyncitis, nonnullis Candelæ regis, Candelaria, & Lanaria, Gallis *Bouillon*, Germanis *Uuilkraut*, Ita-

## VERBASCVM I. Matth.



## Forma.

Li. 4. ca. 99.  
Li. 8. simpl.  
Genera.

Li. 25. ca. 10.

*Verbascum dr. quat.  
herbarum quod dicitur  
candelaria in  
his herbis*

*cur dicitur candelaria  
quia est candelaria.*

*Tapsus barbat. elypus.*

lis *Verbasco*, & vulgò *Tasso Barbasco*. Phlomon autem dixerunt Græci ἀπὸ τῆς φλογὸς à flamma, quod eius foliis & caulibus in laternis pro elychniis vterentur. Candelariam quoque recentiores nominarunt, quod caulibus adipe, seuo, vel pingui aliquo illitis nonnulli pro candelis siue funalibus vtantur, Officinæ *Tapsum*, aut potius *taxu*, quia *toxiacis aduersetur*, *barbatum à densa lanugine*. Dioscorides & Galenus quatuor Verbasci genera assignarunt. Verbascum album marem, *Bouillon blanc melle*, Verbascum album fœminam, *Bouillon blanc femelle*, Verbascum nigrum, *Bouillon noir*, Verbascum siluestre, *Bouillon sauvage*. Plinius à Dioscoride dissentiens tria duntaxat posuit. Verbascum album marem, nigrum fœminam, tertium siluestre, anxiam illam generum distinctionem superuacuum ratus. Distingui genera hæc penè superuacuum est, inquit, cum sint omnia eiusdem effectus. Recentiores herbarij alia repererunt genera, quæ ordine hîc picta sunt. Verbascum album fœmina, folia habet brassicæ



brassicæ similia, hirsutiora, multò latiora, & alba: caulem cubitalem aut etiam ma-  
iorem, album, subhirsutum: flores albos, ἢ ὑπωχέρη, id est, ex luteo pallescentes, siue,  
vt legit Oribasius, ὑπόχλωρα, id est, subuirides: semen nigrum, radicem nigram, gu-  
stu æcerbam, crassitudine digiti. Verbasum mas, ἀνδροκύλλον Græcis dictum à fo-

Diosc. li. 4.  
cap. 99.

VERBASCUM II.

Matthioli.



liorum candore, oblongius est, folia alba & angustiora habet, caulem quoque tenuiorem. Verbasum nigrum, albo prorsus simile est, latiora tamen & nigriora folia habet. Silvestre, virgas producit altas & lignosas, siue arborea specie, folia saluix similia: ramos habet circa virgas, velut marrubium: florem luteum, auri specie. Sic enim exprimenda Dioscoridis verba, vt in vulgatis exemplaribus leguntur: quæ in vetere codice aliter legi affirmat Andr. Lac. Γίνεται δὲ ἢ λεγομένη ἀγρία παλῶς ὑψίως φέρει, καὶ ἀνδροκύλλης: φύλλα δὲ ἐλασιόφρατα ὅμοια ἐχέει, κύκλῳ περὶ τὰς παλῶς, ὥσπερ πρᾶσιον. Quod est, Nascitur etiam & Verbasum agreste, altas ferens virgas & lignosas: folia saluix similia circa ipsas in orbem, vt marrubium: quæ lectio doctis multis summopere placet. De his breuius & indistinctius Plinius scribit his verbis.

Li. 25. ca. 10.

VERBASCUM III.

Matthioli.



VERBASCUM Nigrum  
Salusfolium, Lobell.



SSs



1322 HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
VERBASCUM IIII.

*silvestre, Matth.*



Lib. I. c. 79.  
Verbascum al-  
bum femi-  
nae aureo.

Cap. 36.  
hiflor.

Ibi. fem.  
Verbascum  
nigr. Dod.

lia maiora habeat, flores luteos rosam parvam referentes, erectis è medio stamini-  
bus rubris. Id propter similitudinem cum supradictis non appropinquamus, pro Ver-  
basco nigro Fuchsius descripsit & depinxit: quemadmodum pro silvestri id quod  
Dodonaus pro nigro Verbasco posuit. Folio id est amplo, scabro, nigro, tactu

VERBASCUM Femina,  
Lobellij.



VERBASCUM Album femina,  
flore albo. Dodon. & Fuchf.



aspero



VERBASCVM Album  
mas, Fuchs. & Dod. flore luteo.



aspero, grauis odoris, flore luteo, cæteris simili, sed minore, similibus item caulibus & radice. Siluestre verò Dodonæus tam caulibus quàm foliis saluiam referre scribit, ramulos multos habere quadrangulos, lignosos, binos semper ex aduerso, ex eodem geniculo prodeuntes, folia læuia & candicantia, foliorum saluiæ emula, sed maiora & læuiora: ramulorum fastigia flores lutei verticillatim ambiunt, vt in marrubio. Longe diuersum ab his Verbasum depinxit Matthioli foliis laciniatis: cuius folia, inquit, cornuti papaueris faciem exprimunt. Ideò nihil mirum si Dioscorides eius papaueris folia, Verbasci foliis compararit. Lobellius aliud Verbasum siluestre ostendit, foliis saluiæ tenuifolia: item Verbasum siluestre saluiæ folio, exoticum, foliis rotundioribus, candidioribus, densioribusq; , minùs tamen lanugine canis, sed saluiæ emula concretione, alioqui lignosa fibratâque radice, caule & facie non ita dissimilibus: iisdem gaudet Syriæ natalibus, quibus phlomos Syriaca, de qua mox, flores ille non vidit, quia marcidit. Verbasum album & nigrum

Verbascum siluestris

Ca. 90. 11. 12. Verbasum laciniatum

Locus.

Tempus. Vnes.

in campestribus, aggeribus agrorum, & secus vias prouenit. Siluestre in campestribus potissimum siccis & lapidosis. Verbasca Iulio & Augusto mensibus potissimum florent: siluestre etiam serius. Radix Verbasci albi & nigri, ita tradente Dioscoride, adstringit, vnde alui profluvio laborantibus tali ludicri magnitudine

VERBASCVM Siluestre,  
Dodonæi.



VERBASCVM Siluestre folio  
Saluiæ tenuifolia, Lobel.





*VERBASCUM Silvestre*  
*exoticum, Lobelij.*



Li. 25. ca. 10.

*VERBASCUM Laci-*  
*niatum, Matthioli.*



Li. 8. simpl.

In cap. 99.  
lib. 4.

omnia Verbasci genera omnibus ferè sedis vitiis mirificè subuenire: adstringunt enim & exsiccant. Quamobrem feminis & florù pulvis additis chamæmeli floribus, & laticis refina, procidentem sedem suffitu cohibet, & tinesinum, præsertim dysentericis, tollit. Verbasci feminae folia inter lapides còtusa, si equi claudicantis ex clauorum

cum vino vtiliter bibenda datur. Decoctum ruptis, conuulsis, contusis & antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collatione mitigat. Verbasum cui flos aureus, capillos tingit (sic in vulgaris exemplaribus, ὁ δὲ χρυσοῦς τὰ δὲν, in vetere autem, τὸν δὲ χρυσοῦς τὰ δὲν, idest, aurei Verbasci flores capillos tingunt) & vbiq; positum fuerit, blattas in se colligit. Cocta folia in aqua ad ordemata, & oculorum inflammationes illinuntur, & ad lyderata vlcera cū melle aut vino, cum aceto autem vulnera sanant. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Silvestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt feminae folia caricis interposita à corruptione eas immunes seruare. Plinius multis Verbasorum vires explicat his verbis. Aiunt in foliis eius quam feminam diximus, ficus omnino non putrescere. Contra scorpiones bibitur radix cum ruta ex aqua, magna amaritudine, Galenò tamen acerbata est, sed effectū pari. Et variis in locis. Verbasum priuatim tonsillis in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur Verbasum cuius flos aureus est, contra omnia pectoris vitia, tussim, & purulenta excreantibus. Tanta huic vis est, vt iumentis etiam non tussientibus modo, sed ita trahentibus auxilietur potu. Lateris & pectoris dolores verbasum cum ruta ex aqua sedat. Panos sanat cū sua radice tustum, vino aspersum, & ita cinere calfactum, vt imponatur calidum. Semen ex vino decoctum & còtritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollit. Radicis medulla collyrij tenuitate in fistulam additur. Còtusis, euertis, & si febris sit, potatur in aqua verbasum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in strumis. Semine ac foliis decoctis ac tritis omnia corpori infixa extrahuntur. De quibus breuiter sic Galenus. Radix priorum duorū acerbata gultu est, & fluxionis effectibus prodest, sed & ad dentium dolorem quidam eam colluunt. Attramē folia digerendi vim habent: sic & aliorum folia, maxime eius quod aurei coloris flores habet, qui etiam capillos flauos reddunt. Omnium enim folia siccandi, & modicè detergendi vim habent. Experientia cōstat, inquit Matthiolus,



ex clauorum noxa, vngulæ prius excavatae imponantur, mirum dictu quam breui tempore is liber euadit. Radicis eiusdem succus antequam caulem proferat, duarû drachmarum pondere ex vino cretico haustus ipsa accessionis hora, vt Arnaldus refert, quartanam fugat, cum hoc tamen quod tribus aut quatuor iteratis vicibus

**PHLOMIS** *Lychnitis,*  
*Matthioli.*



**PHLOMIS** *Lychnitis,*  
*Pena.*



hauriatur. Succus tam florum quam foliorum asperis verrucis illitus, eas facile delet, etsi laxi uibus nihil profit. Idem facit sicca radice farina. Dantur flores commodissime in puluerem triti, contra ventris tormina, & colicos dolores. Folia & summitates eius quod minoribus est foliis, in aqua decoctæ vel illite, podagricis auxiliantur. Stillatitia florum aqua oculis iniecta destillationes cohibet, eadem illita faciei ruborem tollit, quam Arabes guttam rosaceam vocant, præsertim addito caphuræ momento. Illinitur eadem ad erysipelata, anabusta igni, serpigines, vitilignes, impetigines, & cætera cutis vitia. Verbasci flores vna cum oui vitello, mica panis & foliis illiti, optimè faciunt ad cohibendas hæmorrhoidas. Idem præstant eiusdem folia sutita ex molari lapide accenso. Phlomis phlomidis, idest, verbasci verbascula subiungit Dioscorides. De duabus alibi dicitur, de tertia hic dicendum, quæ Lychnitis appellatur & thryallis, quod propius ad verbasca accedat. Folia terna aut quaterna, aut etiam plura habet, hirsuta, crassa,

*Lychnitis. Phlomis.*  
*Phlomis. Lychnitis.*  
*Phlomis. Lychnitis.*  
*Phlomis. Lychnitis.*

*Phlomis.*  
*des.*

*Lychnitis.*  
*Folia.*  
*Diol. ibid.*

**VERBASCVLVM**  
*Quorundam.*



*hec figura d. cad.*  
*ca. thymia f. m.*  
*fehij pag. 1040.*  
*et cur thymia f.*  
*math. pag. 1050*



Ca. 99. li. 4. pinguis. Vtilis est ad ellychnia in lucernis: vnde Lychnitidis ei nomen: ex Matthiolo hic pictam damus. Aliam ostendit Pena, quæ plerisq; agri Narbonensis collibus glareosis Monspelio vicinis fruticat, rara alibi in Italia & Gallia, perameno aspectu florum luteorum fabæ, caulem verticillatim ambientium, vt in Marrubio secundum foliorum exortus, pallidis staminibus. Folia sunt scabra, crassa, densa, lanugine, incana, tactu aspera, Saluix angustifolia foliis angustiora, sed longiora, & ad ellychnia valde accommodata. Clusius aliam profert, cui folia sunt scabra, crassa, Saluix tenuifolia similia, oblongiora tamen & angustiora, candicantia, inferiore parte densa, lanugine omnino cana: cauliculi dodrantes, quadranguli, hirsuti & candicantes: e quorum geniculis folia bina, oblonga, superioribus similia, inter sese opposita nascuntur, & in caulis fastigio breviora, & sedelatiuscula: flores lannij circa extremos cauliculos verticillatim ex densa lanugine & veluti villis pallidis prodeunt lutei coloris, coma plerumq; inflexa & nutante: radix nigricans & lignosa. Oritur in collibus siccisq; & petrosis locis per totam Hispaniam, Lusitaniam, Narbonensem Galliam. Floret Maio & Iunio, semine subruustum, verbasco siluestri ferè simile profert. Monspelienfes Verbasco siluestre vocant, Castellani *Candilera*, Granatenses *Menchera*. His interserit Lobellius Lychnitin alteram Syriacam,

*PHLOMIS Lychnitis, Clus.*



*PHLOMOS Lychnitis altera  
Syriaca, Lobelij.*



*VERBASCVLVM  
Minimum.*



nouam



novam plantam nec minus speciosam, à superiore diffidentem florum ortu & modo: sunt enim Lychnidis silvestris, vel Chalcedonica, coloris flavi: foliis item angustis, & virgultis quadratis tomento crasso incanis, & radice lignea. Verbasculis annumerant quidā plantam quam nomine Veronica fœminæ descripsit & depinxit Fuchsius, itē Lonicerus, quæ per terrā serpit caule lanuginoso, foliis rotundis instar herbarum quæ centimorbia & numularia hodie vocatur, in ambitu minimè incis: floribus in luteo purpureis, semine in vasculis rotundis, radice tenui. Dodonæus hanc nomine heliotropij minoris exhibuit. Aliud hic pictū est, quod Minimum dicitur: In sepibus ac dumis provenit, radice nigricante, lignosa, breui, nodosa, fibris albis, crassiusculis capillata, caryophyllatæ modo, gustu adstringente: caule unico, cubito altiore, rotundo, inferne rubente, fungoso, nonnihil villoso: foliis paucis, non pluribus ferè quam septem aut novè in caule alternatim dispositis, violæ propemodū similibus, longioribus, per ambitū crenatis, aversa parte lanuginosis, saporis adstringentis, & subamari: flore in caulis vertice senectionis, luteo, copioso, in pappos auolante. Floret tardissimè Septembri circa æquinoctium ad initium vsque Octobris.

In Epito.

BLATTARIA,

CAP. XLIII.

**H**ÆC herba inquit Plinius, similis verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta Blattas in se contrahit, ideoque Romæ Blattariam vocant.

Lib. 25. c. 9.

Blatta forma

BLATTARIA, Matth.



Hæc Plinius. Eundem verò effectum Dioscorides illi verbasci generi assignavit, quod floribus aureis descripsit. Quæ res multis persuasit Blattariam Plinij & verbascum illud Dioscoridis, cui flores sunt aurei, vnam & eandem plantam esse. Fuchsius & Dodonæus pro Blattaria proponunt eam, quæ hic picta est, quæ Germanis *Schabeukraut*, Gallicis *Herbe aut mites*, *Herbe vermineuse* & *Blattaire* nominatur. Foliis est viridantibus, minimè hirsutis, nec candidis, crenatis, per humum sparsis, ex quorum medio duo trësve emergunt caules venustis floribus, aureis interdum & purpureis, ornati, verbasco simillimis: semen folliculis inclusum, minus quam verbasci: radix brevis & lignosa. Nascitur iuxta aquas & fluminum ripas. Floret Iunio & Iulio mensibus. Vehemens amaritudo eius satis docet calidam & siccam esse, quare qui ea vti voluerit, eadem quæ alia amara in corpore nostro efficiet. Sed cum calida siccaque sit, & vehementer amara gustanti, qua vi nisi arcana & occulta Blattas allicit? num potius abigit?

Lib. 4. c. 99.

Cap. 66. hi.

lib. 1. c. 8.

Blattar.

Fuch. &

& Dodon.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Uires.

AETHIOPIS,

CAP. XLIIII.

**T** Græcè *αἰθίον*, ita Latine Aethiopis dicitur, quod nomen herbarum dedere magicae vanitates, quod ea herba, inquit Plinius, amnes ac stagna siccentur coniectu, tactu clausa omnia aperiantur, tamen verisimilius est quod optima ex Aethiopia adueheretur, sic dictam esse, vel quod fuliginosa & veluti cinere aspersa sit. *αἴθω* enim fuligo est, siue fauilla adusta. Verbasco folia similia habet, sed valde hirsuta, & densa, in orbem circa radicis inum: caulem quadrangulum, crassum, & scabrum, similem apiastro aut arctio, multis aliis

Nomina a loco na

Pena in tal. nomen

adu. Lib. 26. c. 4 habet.

Forma.

Dios. lib. 4.

cap. 100.



## AETHIOPIS.

Locus.

Lib. 27. prae-  
far.

Li. 24. c. 17.

Pena in  
Adu.

Vires.

Li. 4. c. 100.

Lib. 72. c. 4.

Lib. 7.

concauum: semen erui magnitudine geminum in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite multas, longas, crassas, gustu glutinosas. Haec siccata, nigrae ac durae fiunt, cornibus similes. Plurima nascitur in Messenia, ac Ida. Eadem prorsus habet Plinius, ut ex Dioscoride transcripsisse videatur. Aethiopidem herbam, inquit, ab exusto syderibus axe rerum natura ostendit. Et aliquanto post. Aethiopsis, folia habet phlomisimilia, magna & multa, & hirsuta à radice: caulem quadrangulum scabrum, similem arctio, multis concauum alis: semen eruo simile, candidum, geminum: radices numerosas, longas, plenas, molles, glutinosas gustu. Siccae nigrescunt indurescuntque, ut cornua possint videri. Praeter Aethiopiā nascuntur & in Ida monte Troadis, & in Messenia. Rursus alio in loco tradit Aethiopida in Meroe nasci, ob id & Meroida appellari, folio lactuca, hydropicis vtilissimum è mulso potam. Hanc diu ignotam ex Graecis & Illyricis montibus maritimis allatam, iam satis vulgaram alunt horti multi Italiae, Galliae, Ger-

maniae, thapso barbaro admodum similem, magis tamen incanis foliis, mollioribus, delicatiore & longiore lanugine, ut in dictamno. Cretensi, eorumdem vndatim laciniatis oris, circa imum caulem accubantibus, & ipsum ambientibus quadratum, hirsutum, binum pedum, & sesquicubitalem, multas alas habentem, quem verticillatim flores ambiunt, sciares, aut hormini, sed candidi, & semen non dissimile. Radix verbasco cognata. Huius radix, auctore Dioscori. cocta & pota, ischiadicis, pleuriticis, sanguinis sputo, arteriae asperitati auxiliatur, sumitur etiam cum melle in eclegmate. Plinius eadem ferè tradit. Radices medentur vuluis potae in vino albo, ischiadicis, pleuriticis, faucibus scabris decoctae, potui dantur. Sed quae ex Aethiopia veniunt, eximie atque illico profunt. Atque haec recta & veteris codicis lectio est. Hanc herbam Galenus in simplicium catalogum non retulit. Paulus verò ex Dioscoride haec exscripsit. Aethiopsis similia verbasco folia habet. Radicis decoctum, potui datur ischiadicis, pleuriticis, & sanguinem reiicientibus, & arteriae asperitates cum melle lenit.

## ARCTIVM,

## CAP. XLV.

Nomina

Lib. 4. c. 101

Forma.

Lib. 27. c. 5.

Locus.



PKTION siue ἀρκτοῦρον Graecis, Latinis similiter Arctium vocatum, affine etiam est verbasco foliis, ut scribit Dioscorides, nisi quod hirsutiora & rotundiora habet: radicem teneram, dulcem, albam: caulem mollem, longum: semen cumino paruo simile. Quam Dioscoridis descriptionem planè expressit Plinius his verbis. Arctium aliqui arcturum vocant. Similis est verbasco foliis, nisi quod hirsutiora sunt: caule longo, molli: semine cymini. Nascitur in petrosis, radice tenera, alba, dulci. Platan, quae hic depingitur, arctium esse putant docti herbarij, quae nascitur in asperis montibus Allobrogum, radice crassa, longa, tenera, candida: foliis multis verbasco similibus, auersa parte candidis & valde lanuginosis, aduersa viridioribus, & minus villosis, venosis: caule molli, & in hac, quae hic pingitur breui, densa lanugine pubescente: flos luteus in capite



ARCTION, *Quorundam.*



ARCTION *Dodonæx*  
*Codice Casareo.*



capite nitet, crasso, scolymo simili non tamē aculeato, squamis compacto, qui tandem in pappos auolat: semen oblongum cymino non dissimile. Quidam in Dioscoride legunt *καυλού διὰ μαλακίου, μικρόν, καρπὸν δὲ μακρόν κυμίνῳ ὅμοιον*. ut voces *μακρόν* & *μικρόν* locis permutata fuisse videatur, & ita legit Marcellus. Præterea quid paruum cyminum Dioscorides hîc appeller, non satis constat, nisi fortasse sylvestre intelligat. Vulgarum tamen Dioscoridis sectionem secuti sunt Galenus, Plinius, & *Vires.* Oribasius. Verbasco foliis simile est, quod Arctiū dicitur, lanuginosis videlicet ac hirsutis, sed tamen hirsutioribus ac rotundioribus (Plinius hirsutiora tantummodo esse tradit:) caulis longus & mollis: semine ut parui Cymini: radice tenera, alba, dulcique, ut auctor Dioscorides. Et hac quidem forma depingitur Arction in vetusto Casareæ bibliothecæ Codice: foliis videlicet latis, ambitu crenatis: caule tenero erecto: capitulis aliquot in fastigio mollibus ac lanuginosis, ut primi Cymini sylvestris. Nasci ait Plinius in petrosis. *Ἀρκτηὶον* Græcè: Latine similiter Arction: item & *Ἀρκτουῖον* & Arcturon appellant: Ab vîso nomen habet, qui Græcis *αρκτος* dicitur. Allucinantur qui Arction idem cum Arceo siue Personata faciunt, multo verò magis, qui & cum Vngula caballina confundunt. Inter Vngulam enim cabalinam, quæ Græci *Βῆχιον*, & Action Plurimum est descrimini. Facultatis autem Arction est admodum tenuisū partium, ut Gal. ait, & ob id exsiccatis, extergentis tamen modicè. Decoquitur in vino (inquit Plinius lib. 27. cap. 5.) radix ad dentium dolorem, ita ut ore contineatur decoctum. Bibitur & propter Ischiada & Stranguriam è vino. Ambustis & Pernionibus imponitur: fouetur eadem cum radice semine trito in vino. Arctij radix & semen in vino decocta, dentium dolorem mitigant, si decoctum ore contineatur. Ambusta & perniones eodem decocto fouentur. Bibitur item ad coxendicum dolores & stranguriam è vino. Eadē Plinius tradit. Radix decoquitur in vino ad dentium dolorem, ita ut contineatur ore decoctum. Bibitur & propter ischiada & stranguriam è vino. Ambustis imponitur & pernionibus, fouentur eadem cum radice semine trito è vino. Et rursum Ambusta sanantur plantagine, arctio, ita ut cicatrix fallat, folia eius in aqua decocta & contrita illinuntur. Galenus idem confirmat his verbis. Arctium quod verbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, semine cymino simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exsiccantis, extergentisque, tamen modice, quamobrem radix ac semen cocta in vino quadam

Lib. 27. c. 5.

Lib. 26. c. 12.

Lib. 6. sim.



quadantenus dolores dentium mitigant. Porrò ambusta & pernioles non harum modo decoctum affusum, sed & caules teneriores sanare possunt.

## CACALIA,

CAP. XLVI.

## Nomina

Corna.  
Emb. 106.



Lib. 7.

AKAATA & ΛΕΟΝΤΙΚΗ Græcis, similiter Latinis Cacalia & Leontice. Gale. in simpl. medicamentorū numero Cacaliā non recenset, sed Cacanū eam appellare videtur, prætermittit Cacaliæ voce, quod tamē facere nō solet in variis plantarū nomenclaturis, utpote qui vnā atq; alterā semper adiiciat. Quod autē Cacanū, legendum sit in Galeno, & non Cancanū, ut in vulgatis exēplarib⁹ legitur, ex Paulo perspicuū est, qui apertē κακάνον habet, de

Vide Phytog. pag. 370.

## CACALIA.

Lib. 4. c. 46.  
& 7. c. 16.

Lib. 4. c. 118  
Forma.

## Locus.

κακάνον, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει  
κακάλια, λέει



Lib. 25. c. 11.

Lib. 4. c. 118

## Vires.

Lib. 7. sim.

Lib. 7.

Lib. 25. c. 11.

Lib. 26. c. 6.

Ibid. cap. 15

flore copioso, puniceo, in pappos abeunte. In florum umbilico granum rotundum prominet niueum, margaritæ simile, cui rectè Plinius comparauit, quod excusso flore nudum nitidumque dependet. Cacaliæ radix, inquit Dioscorides, in vino macerata ut tragacantha, & per se ipsam delincta, aut manducata, tusses & arteriæ asperitates sanat. At grana quæ postquam defloruit, enascuntur, trita, cerato excepta & illita, faciē extendunt, & à rugis cōseruant. Quibus vide num similia de cacano scripserit Galen. ut eadē dicenda sit planta quæ cacalia. Cacani radix facultatem habet mordacitatis expertem, & modicè exciccantem, essentiam crassam, & emplasticā. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & linctā asperitates arteriæ sanat: nec minus si quis eam mandat, succus eius defluens prodest arteriæ similiter ut glycyrriza, quæ solum transcripsit Paulus. Eadem etiam & quædam alia de Cacalia tradit Plinius. Cacalia siue Leonticē vocatur, semen margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè. Huius grana quindecim in oleo macerantur, atq; ita aduerso capillo caput vngitur. Et rursus. Radix Cacaliæ cōmanducata, & in vino madefacta, nō tussitantum, sed & faucibus prodest. Et alio in loco. Cacaliæ grana mixta ceræ liquide extēdunt cutem in facie erugantq;. Loco verò supra citato non intelligendum semen inter folia grandia folia dependere, hoc enim falsum est, sed caulem in cuius surculis & adnatis semen dependet, ex grandium foliorum congerie sese attollere.

CHAMÆ



**ΧΑΜΑΙΚΙΣΣΟΣ** Latine etiam Chamæcissus, id est, humilis siue pusilla hederæ. Sed quænam sit planta quæ verè Chamæcissus Dioscoridis dici possit, inter herbarios ambigitur. Sunt qui hederam terrestrem Officinis dictam Chamæcissum esse volunt, effigie, viribus, vulgari appellatione consentientibus, quæ de re paulò post dicemus. Alij horum reiecta sententia, Chamæcissum esse contendunt eam quam pro consolida media Matthioli & Fuchsii exhibuere, bene cõuenientibus notis omnibus quæ Dioscorides Chamæcisso assignat. Ea, inquit, folia habet hederis similia, longiora tamen, & tenuiora, multa: ramulos palmi altitudine quinque aut sex, à terra foliis plenos: flores violæ similes, minores tamen, & gustui valde amarus. Radix tenuis, alba, inutilis est. Nascitur in locis cultis. Sic, ut à naturalibus incipiamus, quæ hic picta est. In cultis gignitur, scilicet in agro: um marginibus & aggeribus, radice candida, tenui, inutili, quaternos & interdum plures cauliculos mittit, dodrantales, foliosos: folia circa cauliculorum verticem hederæ folia prorsus referentia, prope radicem longiora, & utrobique tenuiora, subhirsuta, quod Dioscorides non habet flores violæ similes, (sic enim conuertere λευκία, non violæ albæ speciatim: nam etsi leucoij nomine viola alba significetur, tamen pro lutea, & carulea, & purpurea solet usurpari) minores (non candidiores ac tenuiores, ut vertit Ruellius, nam hæc in Grecis non legimus, quæ habent ἀγρη λευκοῖς ὀκμοῖς, μικρότερα καὶ σικκὰ & cætera.) è candido caruleos

CHAMÆCISSES,  
Quorundam.



In c. 9. lib. 4  
c. 146. hist.

Forma.

hec figura d. end  
in Buglo 1075.

quod Dioscorides omisit, amarissimos. Quod si his vires suffragentur, & quemadmodum Chamæcissi Dioscoridis folia ischiadicis utilissima sunt, trium obolorum pondere in tribus cyathis aquæ ad dies quadraginta aut quinquaginta pota, & eadẽ morbum regiũ purgant eodem modo pota sex aut septẽ dies, ita si ea quæ hic exhibetur, facultates habeat ad iocinosos, lienosos, ischiadicos sanandos insignes, magnum fuerit tuenda illorum opinionis argumentum. Plinius aliter de Chamæcisso quam Dioscorides scripsisse videtur, ut hanc cum alia cõfuderit, aut de diuersa herba scripserit. Sic enim ille. Est & rigens hederæ quæ sine adminiculo stat sola omnium generũ, ob id vocata orthocissos. E' diuerso nunquam nisi humi repens Chamæcissos. Rursus. Iisdẽ (Græci) Chamæcissum appellant hederam nõ attollentem se à terra. Et hæc cõtusa in vino acetabuli mēsurā, leni medetur: folia ambustis cū axungia. At hunc Chamæcissi vsum Dioscorides nõ tradit. Et alio in loco. Chamæcissos spirata est tritici modo, ramulis quinis ferè foliosa: quum floret existimari potest alba violæ, radice tenui. Bibunt ischiadici folia tribus obolis in vini cyathis duobus septẽ diebus, admodum amara potione. Quæ non in totum, sed aliqua ex parte tantum cum his quæ Dioscorides tradit, cõsentiunt. Item Plinius alibi etiam tertiã cyclaminon sibi demonstratam esse dicit cognomine Chamæcissum, vno omnino folio, &c. Dioscoridi Galenus assentitur his verbis. Chamæcissi flos cum sit admodum amarus, iecur obstructione liberat, datũque ex coxendice laborantibus.

Vires.  
Diosc lib. 4.  
cap. 121.

Lib. 16. c. 34

Lib. 24. c. 10

Ibid. ca. 15.

Lib. 25. c. 9.

Lib. 8. simi.

PRUNEL







leucoiorum est, vel purpurei. Vbiq̃ ferè, sed præcipuè opacis & vdis locis crescit. *Locus.*  
Martio statim erumpit, & floret in magnam vsq̃ æstatis partem, sæpiùsque toto *Tempus.*  
anno viriditatem suam conseruat Calidam siccamq̃; esse præsertim florum amari-  
tudo insignis demonstrat. Quare ad discutiendas obstructions iocinoris & lienis, *Temper.*  
et *Vires*

**HEDERA TERRESTRIS**  
*Malacocissos, Matth.*



**MALACOCISSOS** Ex  
*piçtura, Dodon.*



& ad purgandũ icterum præcipuè valet, & ad coxendicum, & ad alios arthriticos  
dolores suppressos, menses euocat, vrinam mouet: manibus confricata & contrita, *Fuch. Ibid.*  
auribulq̃; immissa, earum sonitus & obtusum auditum sanat. Contra pestem etiam  
tradunt efficacem esse, id quod equites quoque sciunt, hi enim quoties fibula dicta  
pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur. Fo-  
lia hederæ terrestris, auctore Trago, exulcerationi vitiùq̃; colli & faucium gargarif- *Lib. 2. c. 37.*  
satu conducunt. Idem decoctum scabiei atque oris & muliebrium locorum vitiis,  
medetur. Succus eiusdem fistulis, aliisq̃; id genus malis purgandis maximè prodest.

**ELLEBORINE.**

**CAP. L.**

**ΠΙΠΑΚΤΙΣ** & **ΕΛΛΕΒΟΡΙΝΗ** Græcis, similiter Latinis Epipactis & *Nomina*  
Elleborine dicitur. Dioscorides breuissimè de epipactide tractans, non *Lib. 4. c. 104*  
quia similis esset aut facie aut viribus Elleboro albo vel nigro Ellebo- *Vide Phlegm. pag. 340.*  
rinem dictam fuisse ait, vt quæ nam sit hodie herba quæ genuina Elle-  
borine dici possit iudicare perdifficile sit, sed quia Elleboro albo misceretur, & iis  
dem locis nasceretur, vt etiam Theophrastus auctor est, de Elleboro albo scribens *Lib. 9. hist. cap. 11.*  
his verbis. *μισγεται δὲ πρὸς τὴν πῶσον ὅπως εὐμεσση, τὸ τῆς ἐλλεβορίνης σπέρμα, τοῦτο δὲ*  
*ἐστὶν ποδάρκον.* Id est, Miscetur autem potioni, vt vomitus bene succedat, Elleborines  
semen. Hæc herbula quædam est. Verùm Dioscorides *θαμνίσκον μικρὸν* vocat, id est,  
fruticulus paruum, exigua foliola habentem, sed *θαμνίσκος* voce sæpe is abutitur,  
quemadmodum & Plinius abuti potuit, hanc modo fruticem, modo herbam par-  
uam appellans. In Asia & Græcia, inquit, nascuntur frutices, epipactis quam alij *Lib. 13. c. 40.*



ELLEBORINE, *Marth.*

In cap. 104

lib. 3.



## ELLEBORINE,

*Dodonai.*

Lib. 3, cap. 25.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires.

Lib. 4, cap. 104.

Nomina



Elleborinen vocant, parvis foliis, quæ pota contra venena profunt, sicut erices contra serpentes. Et rursus. Epipactis ab aliis Elleborine vocatur, parua herba, exiguis foliis, iocinoris vitis utilisima, & contra venena pota. Recentiores herbarij nominis similitudine adducti, existimantesque Elleborinen Elleboro facie similem herbam esse, hi Elleboro albo, illi nigro similem herbam commenti sunt. Quare si Epipactis Elleborine dicta est, inquit Matthiæus, quod cum Elleboro nigro similitudinem habeat, ea nobis epipactis erit, quæ nascitur in Goritiensi agro, quam epipactida appellare libuit, non quod Dioscoridis Elleborine sit, sed quod Elleborum nigrum quadantenus representet foliis, floribus, atque etiam radicibus. Alpinam Elleborinen Saniculæ & Ellebori nigri facie vocant Pena & Lobellius. Iisdem montosis, umbrosis, sed altioribus & Alpibus gaudet. Radice est fibris multis, ex vno nexu appensis donata, ex qua eriguntur pediculi teneri, glabri, flexiles, in quorum summitatibus folia quin-

que partita, parum crenata, Geranij columbini, aut Saniculæ diuisura: flores radiati, ex senis foliolis, gultu non ingrato, sed acriore. Quia radicem habet Elleboro nigro simillimam, Elleborum nigrum esse voluerunt. Quæ ex Dodonæo hæc picta est, Elleborum album refert, nisi quod omnibus partibus minor est. Caule est recto, foliis virgatis, Ellebori albi aut plantaginis folia referentibus, sed minoribus, flores ex caule pendent albi, in medio caui, notis luteis & purpureis, miro modo variegati, in siliquis crassiusculis semen veluti fabulum continetur. Radices huc illuc sparsæ, succulentæ, denso, ortice gustu amaro. Præter virginosis, locisque umbrosis & opacis gaudet. Iunio & Iulio mensibus floret. Calida siccaque est temperatura. Elleborine, auctore Dioscoride, iocinoris vitis utilis est, & contra venena pota.

## HERBA PARIS,

## CAP. LI.



ERBA Paris recentiorum, & Vua lupina, siue vua versa, Gallis *Raisin de renard*, Germanis *Vuolfsbeer*, Lobellio & Penæ solanum tetraphyllum dicitur, quod herba sit quaternis foliis, cyclamino aut cucumeri haud absimilibus, credidit Fuchius aconitum esse pardalianches Dioscoridis. At cum notæ sint hodie aliæ & veræ aconiti differentie, nec huic herbæ vlla venenata insit facultas, imo contra venena præstantissima ex ea parentur remedia, certum est à pardalianche longe diuersum esse. Solanum est monococon Gesnero; aconitum monococon Cordo, alternon



HERBA PARIS.



atticus Trago. Caule est vnico, rotundo, laui. gracili, palmum aut sesquipalmum alto, à cuius plusquam medio quaterna exoriantur folia, decussatim aut ex aduerso sita, crucis instar, nigricantia, rotunda, oblonga, tenuia, sanguineæ simillima: totidem in caulis summitate, eodem situ, sed minima & longiuscula circa florem ex luteo herbaceum, è cuius medio purpureus vinosusque extat globulus, acino vix similis, in quo semen album, minutum: radix longa, gracilis huc illuc summo cespitate spargitur. Siluas umbrosas & frigidiusculas septentrionales amat. Aprili mense floret, Maio semen maturat. Baptista Sardus scripsit nouisse se quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficiis semistulti facti erant, hoc tantum Herbæ paridis semine, ad vigesimum vsque diem in puluerem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos fuisse. Refrigerat insigniter, quare arsenici vim reprimat.

Locus.  
Tempus.  
Vires.

LUNARIA MINOR.

CAP. LII.



ETERIBVS ignota, aut certe nullo ab his nomine donata hæc à recentioribus Lunaria & Lunaria minor, & Lunaria racemosa dicta, à foliis lunæ crescentis modo falcatis, Gallis *Petite lunaire*, Germanis *Monkraut*. Serpit humi vnico vtrinque folio profundius diuiso, crassiusculo, vel foliis multis superne rotundis, inferne falcatis, quibus scolopendrium verum refert. è medio cauliculus exit, palmaris, ferens in summo racemosum florem ambrosiæ, aut botridis, & quadantenus ophioglossi similem, radix fibris multis constat. In scrobium marginibus & aggeribus vligine madentibus & secus vias plerumque nascitur. Maio & Iunio mensibus reperitur, deinde deperit. Gustu sicca est admodum & adstringens, quare frigida siccaque est temperatura, ophioglossi vt quodammodo aspectu, ita facultate similis, vel efficaciori, ad vulnera optimè glutinanda, vlcera cicatrice obducenda, luxata coniungenda. Constat etiam experientia ad suppressendos menses, & ad album muliebrem profluvium, mirifice hanc herbam conferre. Quidam Tragium secundum Dioscoridis esse putant, in montibus & præcipitiis nascens, folio Scolopendrij, radice tenui, candida, Rhaphano sylvestri simili, quæ cruda & cocta dysentericis prodest. Constat certe folia grauiter olere inclinante æstate, vnde nomen inditum putat Dioscorides. Alia est ab herbariis Luna-

Nomina  
Vile. *Trago. pag. 144.*  
Forma.

LUNARIA Minor,  
Matth.



Locus.  
Tempus.  
Temper.  
Vires.



*Forma.* ria minor nominata, siue carulea à florum colore, & Lunaria Magorum Arabum, radice multiplici, fibrata, longiuscula, sublutea, amara, odorata, foliis multis parvis, rotundis, crassis, asaro similibus, longiusculo pediculo nixis: cauliculis surrectis, læuibus, nudis: flore violæ in caulis fastigio nirente, caruleo, venusto, in quinque foliola diuiso, quæ extrema parte radiatim velut in exilia stamina finduntur: semine in siliquis oblongis, in tenue filum definen-

*LVNARIA Alia minor*  
*carulea, Dalech.*



*LVNARIA Lutea,*  
*Dalecham.*



*Locus.*  
*Tempus.*

tibus. In niuosis montibus prouenit, etiam sub niue ipsa, ita vt niue liquata, statim exurgat. Floret mense Aprili & Maio. Quibusdam placet hanc esse *Alepiadem* legendum, quæ apud Dioscoridem, *φύλλα μικρά* (non *μακρά*) *αλεπιάδων*: notis reliquis bene conuenientibus. Præterea, alia est Lunaria minor siue lutea, à Monspelienfibus nominata, quæ in pratorum & humidorum agrorum marginibus profilit, radice ferè simplici, modice fibrata, candida: caulibus tribus aut quatuor, sesquipedalibus parum aut nihil foliosis: foliis circa radicem multis, crassis, longis, per oras laciniatis, hirsutis, punctis albicantibus maculosis, gustu valde adstringentibus: flore luteo, tribus tantum foliolis constante: semine exiguo in latis vasculis Lunariæ modo, per caules sparsis, Anaxilii Romanorum non dissimilibus, velut ex rotundis discis duobus compositis, è quorum medio tenuis pilus eminet. Pena thlaspi paruum hieracifolium vocat.

TEL 6



TELEPHIVM, CAP. LIII.



ABARIA, crassula, & crassula maior, & faba crassa vulgo, Germanorū *Nomina*  
*Vundkraut*, Gallorum *Orpin. seu grasse, & seu epaisse*, Telephium Dio-  
 scoridis peritis multis esse videtur, Latinis etiam Telephium dictum.  
 Fabaria & faba crassa, à foliorum fabæ similitudine & crassitudine. Te-

TELEPHIVM Floribus  
 purpureis, Lobellij.



FABARIA Matth. & Fuch.



lephium verò quod vlceribus malignis & de- *ab effectu qui prebeat*  
 ploratis, quibus Telephus Mysie Rex ab Achil- *telephij vlceris. idest*  
 le vulneratus consenuit, quæ ob id etiam tele- *Forma. malignis, et in*  
 phia vocantur, auxiliatur. Cauliculum profert *ueterarij.*  
 rotundum, spissum, fragilem, foliis vestitum  
 crassis, carnosis, sacco plenis, portulacæ hortensii  
 haud absimilibus: flores elegantes in vertice al-  
 bos, vel luteos, vel purpureos in umbellis drabe,  
 radix alba est, carnosæ, tuberosa, compacta. Hanc *Lib. 2. c. 181*  
 plantam Dioscorides etiam delineasse videtur  
 his verbis. Telephium herba & caule & foliis  
 portulacæ similis est, alas binas in singulis folio-  
 rum geniculis inharætes habet, à radice seni se-  
 ptenive ramuli prodeunt, ceruleis, crassis, visco-  
 sis, carnosis foliis referti: flores illi sunt lutei aut  
 albi. Quæ Plinius transmississe videtur. scribens, *Lib. 27. c. 13.*  
 Telephium portulacæ similis est, & caule, & fo-  
 liis. Rami à radice septeni Octonive fruticant,  
 foliis crassis, carnosis. Hæc Plinius. Nasctur, in- *Locus.*  
 quit Dioscorides, in vineis, & locis cultis, vere.  
 Sic crassula in vineis, cultis incultis, humidis, sil-  
 uosis, & passim alibi abundat. Vere statim pro-  
 filit, Iulio & Augusto mensibus floret. Præter *Tempus.*

TELEPHIVM Purpurascens, Fuch.



TTt 3



Telephium, quod flores albos profert & luteos, ex Fuchſio Telephium quod purpurascens floribus emicat, hic pictum damus, quod ad differetiam superioris, Telephium purpurascens appellavit. Præter flores qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascens, foliorum etiam colore differunt, qui in candido viridis &

**TELEPHIUM** *Hispanicum, Clusij.*

Lib. 2. stirp.  
Hisp. c. 25.



Lib. 1. c. 26.  
Temper.  
& Vires.

**TELEPHIUM** *Minus  
semper vivens, Lobell.*

Lib. 8. sim.



Pena in  
Ad.

herbascens est, in purpurascens paulò pallidior. Cætera omnia in his similia apparent folia potissimum, quæ fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora & crassiora. Huic Lobellij Telephium floribus purpureis appinimus. Aliud Telephium Hispanicum Clusius descripsit, quod habet duos aut tres pluresve caules, ex radice prodeuntes, cubitales, succulentos, procumbentes, in quibus folia ex interuallis bina semper inter se opposita, ut in myrto, crassa & succi plena, quemadmodum Crassula maior, sed maiora, & magis carnosæ: flos in extremis ramis quasi umbellatim nascitur, quemadmodum in crassula, pallidus: radices illi plurimæ, glandulosæ, crassulæ radicibus similes. Viuax admodum est, adeo ut rami eius in terram depacti, statim radices agant. Nascentur in Hispania, umbrosis quibusdam, frigidioribusque locis. Telephium vocant Hispani, Clusio crassulæ genus potius videtur, quandoquidem cærulea folia non habet, sed ex herbaceo pallentia, portulacæ satiuæ latioris triplo aut quadruplo maiora. Præterea Lobellius Telephium aliud pinxit minus repens, semper vivens, folio rotundiore, flore rubro, radice fibrola, cauliculis cepæ crassioribus. Dodonaus crassulam refrigerare tertio ordine, & iisdem viribus semperuium præditam esse scripsit. Dioscorides verò folia senis horis illita, albas vitilignes sanare, sed oportere postea hordeacea farina illinere locum. Quinetiam alphas tollere cum aceto in sole inuncta, sed cum inaruerint, absterguntur. Galenus verò Telephium exsiccandi & detergendi facultate esse, non tamen insigniter calida. Verum in hoc forsitan primi esse ordinis, desiccare autem secundo ordine intenso, aut certè principio tertij. Quare ad putrida vlcera conuenire, & leucas & alphas cum aceto sanare. Cum igitur crassula detergentis exsiccantisque facultatis minimè particeps sit, foliaque ferat portulacæ maiora, eorū sententiam reiiciendam esse cæset Matthiolus, qui Telephium esse putant, quamuis illa notis multis Telephium referat. At qui medicamentorum experientiam profitentur, respondent crassulam multis viribus pollere, & plura præstare quàm quæ Dioscorides Telephio tribuit. Præterea caliditas illi non



QVÆ IN VMBROSIS NASCVNTVR, LIB. XI. 1317

non deest, neque siccitas tanta, quantam Galenus & Paulus tradiderunt: nempe caliditas primi ordinis, quæ gustu vix percipiatur: siccitas, cuiusmodi in semperuiuo: absterio, qualis inest farina fabarum & portulacæ, quæ videtur potius lenire glutinoso succo, cum primo appulsu linguam tangit. Adhuc non solum calfacientibus, exsiccantibus & detergentibus, telephia ulcera curantur, sed etiam potientibus, pultibus, fomentis ex crassula paratis, ad acrimoniam saniei erodentis, & opus naturæ impediens rotundendam, ac cacochymiam corrigendam intus & foris. Plinius quantum ad usum contra vitiliginem attinet, à Dioscoride dissentit: scribit enim. Illinitur lentigini, & cum inaruit, deteritur. Illinitur & vitiligini teinis ferè mensibus, senis horis noctis aut diei: postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

Li. 27. ca. 13.

AVRICVLA MVRIS, CAP. LIIII.

**M**ΥΟΣ ὄζα vel μυὸς ὄζης & μυὸς ὄζιον Græcis, Latinis Auricula muris, **Nomina**  
Gallis Oreille de souris, Italis Orecchia di topo Germanis Mänschzinn. Diosc.  
vnius myosotidos meminit. Recetiores plura fecerunt genera, omnia **Genera.**  
à foliorum figura auri murinæ simili. Auricula muris, ita describente  
Diosc. caules emittit ab vna radice plures, infernè subrubetres, cauos: folia oblonga, **Li. 2. c. 179.**  
angusta, dorso elato, nigricantia, ex interuallis gemina, in acutum desinentia: **Forma.**  
nues cauliculi ex alarum sinu enascuntur, in quibus flosculi parui, cærulei, velut  
anagallidis: radix digitali est crassitudine: cum multis adnatis. Similiter descripta  
est à Plinio his verbis. Myosota siue Myosotis lauis herba, caulibus pluribus ab  
vna radice, aliquatenus rubentibus, concauis ab imo: foliis angustis, oblongis, **Li. 27. c. 12.**  
dorso acuto, nigris, per interualla assidue geminatis: & tenuibus cauliculis ex alis  
prodeuntibus, flore cæruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis

AVRICVLA Muris,  
Matthioli.



AVRICVLA Muris,  
altera, Dodon.





In cap. 179.  
lib. 2.

**Locus.**

**Tempus.**

Lib. 1. ca. 35.

Auricula

muris 2.

**Forma.**

fibrata. Quæ omnia aptissimè competunt in eam, quæ hîc ex Matthiolo appin-  
gitur. In pratis, agris, hortis, secus vias, & passim ferè copiosa, mense Maio floret.  
Dodonæus alteram pinxit, quæ plerisque Auricula muris videtur. Est autem hu-  
milis herba, quæq; sæpius per terram serpit, lanugine delicata mollique onusta,  
caterum alfinæ mediæ satis similis: multos enim ab vna radice cauliculos profert,  
ima parte rubescens: folia longa, aspera, & hirsuta, Aures murinas apprimè refe-  
rentia: flosculos albos, filiquas longiusculas velut alsine: radicem fibratam. Hanc  
periti quidam herbarij veram Dioscoridis Elatinen esse suspicantur satis con-  
gruente historia. Nascitur enim in cultis & segetibus, ramulos quinos senove  
emittit è radice dodrantaes, foliis plenos, gustu adstringentibus, helxinæ simili-

Ibidem.

*MYOSOTIS Parua,  
Dalechampi.*



Myosot. par-  
ua, Dalec.  
**Forma.**

**Tempus.**

**Temper.**

Li. 2. c. 179.

Li. 7. simpl.

Li. 27. c. 12.

bus, hirsutis, rotundioribus. His tertiam adii-  
cit, sed non depingit, idem Dodonæus, quæ  
per terram minimè serpit, sed recta inter cate-  
ras herbas accrescit, aliis similis caulibus & fo-  
liis, sed maior & candidior, lanugine operata,  
ad tactû glutinosa, & perinde digitis hærente,  
ac si melle rigata foret. Flores ex capitulis  
prodeunt vt in superiore, semen in filiquulis  
concluditur. Hæc est Ocimoides minus albâ,  
à nobis in Horto descriptum ac depictum.  
Istæ duæ quibusdam vt diximus, Auriculæ mu-  
ris species esse censentur, aliis potius alsines.  
Est præterea Myosotis parua Dalechampia,  
quæ in locis pinguibus, agris, secus vias gigni-  
tur, radiculis paruis, breuibus, inutilibus: foliis  
aizoi modo in orbem humi stratis, oblongis,  
parum laciniatis, nonnihil hirsutis: caule tres  
digitos albo, tenui, flore albo, quatuor foliis  
constante, sed sic diuisus vt octo esse videan-  
tur: semine minutulo in exiguis loculis macu-  
pio similibus, saporis fatui. Floret statim Fe-  
bruario mense, cum alsine verna, & gramine  
minimo. Refrigerat & humectat. Radix Au-  
culæ muris illita ægilopas sanat, auctore Dio-  
scoride, Desiccatur ordine secundo, inquit Galenus, caterum nullam euidentem ca-  
liditatem habet. A quibus dissentit Plinius, qui cum iisdem planè verbis quibus  
Dioscorides Auriculam muris deheasset, vis ei septica, inquit, & exulceratris,  
ideoque ægilopas sanat.

*VERONICA MAS,*

*CAP. LV.*

*Veronica mas, pag. 269.*

**Nomina**



ELÉBERRIMA est apud recentiores herba quæ Veronica mas ab  
illis dicta est, Græcis & Latinis scriptoribus fortassis incognita, Gal-  
lis *Veronique masle*, Germanis *Ereubreis*, & *Grundheyl*, ob mirificam  
sanandi vlcera ac vulnera facultatem. Dodonæus Betonicam Pauli

Lib. 1. c. 17.

**Forma.**

**Locus.**

**Tempus.**

**Temper.**

vocat. Herba est per terram serpens cauliculis dodrantalibus, gracilibus, purpureis  
scensibus, villosis: foliis longiusculis nigricantibus, parum hirsutis, serratis: floscu-  
li in summitate dilati purpurei sunt: semen in loculis minutum: radix tenuis, fi-  
brata, brevis. In marginibus agrorum & siluarum provenit. Iunio & Iulio mensi-  
bus, floribus & semine abundat. Veronicam maiorem Septentrion alium marem  
Fuchs & Dodon. Lobellius vocat. Amaritudinem quandam & vehementem  
adstrictionem





VERONICA Recta  
minima, Lobellij.



les, & densiores comosioresque spicati, corniculis, crebris succedentibus. Hac Lobellius.

adstrictionem gustu præ se fert, vt hinc calidam siccâque esse conicere liceat. Mirificè ad cruenta & vetera vlcera, & vulnera sananda confert. Scabiei & omnibus cutis vitiis medetur. Tumores in quacumque corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recetiores eius vsus summopere commendant in febribus pestilentialibus, propinantes siccæ puluerem drachmarum duarum pondere cum theriace drachma ex vino meraco, ea tamen lege vt statim sudent agri. Eadem datur potanda ex sua ipsius stillatitia aqua vtiliter contra tussim & vitia omnia pectoris & pulmonis: nam tabidos & suppuratos iuuat. Præterea aperit iocinoris & lienis obstructiones, vterum, renes & vesicam expurgat. Lobellius Veronicam marem, Matthioli Veronicam rectam appellat, foliis & flore in surrectis pedilibus cauliculis, aliis non dissimilibus, sed maioribus amœnioribusque. Huic appingit Veronicam rectam minimam, quæ vix vñciâ & sesquiunciam æquat, foliis Veronicæ nostraris, aliquanto minoribus. Flosculi non dissimi-

Vires.

COCHLEA



**Nomina**  
Dod. lib. 1.  
cap. 78.  
**Forma.**



ERMANORVM *Leffelkraut*, & Belgarum *Lepelkraut*, idest, Herba Cochlearis huic herba cochlearia nomen fecit, Gallicè *l'Herbe aux cuilliers*, à foliorum caua rotunditate, cochlearis connexam intimamq; superficiem exprimente. Hæc foliis est latiusculis, crassis, umbilicatis, & nonnihil cauis, parui cochlearis more, ambitu interdum angulosis, oxalidis rotundæ ferè similibus, sed nec tenera sunt, nec

**COCHLEARIA, Dodon.**

**Locus.**  
**Tempus.**  
**Temper.**  
Pena in  
Aduers.



**COCHLEARIA Britanica, Lob.**

Li. 1. ca. 178.  
**Vires.**  
Dod. ibid.



Tamesis fluente, & qua Londinum præterlapsus est, & in Bristoiæ sinu Occidui Oceani prouenit.

candicantia, imo duriuscula, & ex fusco viridantia: cauliculi quadatenus angulosi, palmares aut pedales: flosculi candidi, semen paruum, rubescens in siliquulis: radix tenuis, fibrata, albicans, gustu acri. In Frisia & Holandia, frequentissima secus sepes & in pratis. Aprili & Maio mensibus floret, per æstatem semen fert. Calida siccaque est herba, gustu acri, nasturtij, aut Sij cardamines. Quare sunt hodie eruditissimi herbarij qui Britannicam Plinij esse censent, quod iisdem locis reperiatur, iisdemq; viribus prædita esse comperiatur, quas Cæsaris milites, trans Rhenum promotis castris, aduersus Stomacacenedocti, à Frisiis colonis experti sunt, ut ex eodem Plinio fusiùs alibi diximus. Verum cum hæc Plinianæ descriptioni minimè conueniat, & sint multæ, ut nasturtia, & Sium cardamine eidem persimiles gustu, nec facie multum dissimiles, ad eadem utiles, nullum inde certum sumi potest argumentum, quo Britannicam hanc esse probare quis possit. Quidam, inquit Dodonæus, hanc telephium Græcorum esse putant. Cochlearia in aqua decocta frequenter collutione, contra putrida oris vlcera, & cætera eius vitia summopere efficax est. Singulare etiam remedio est aduersus oris affectum, quem Plinius Stomacacem, Marcellus Oscedinem, Holandi Frisique *Seicerbuych* nominant. Quod cum frequens experientia comprobaret, magno est apud Holados & Frisios in vsu, & commendatione. Isti congener est vel similis, quæ Cochlearia Anglica à Pena & Lobellio dicitur, flore, semine, & sapore, sed foliis non tam umbilicatis, aut in Cochlear efformatis, potius Atriplicem aut Lapathum paruum referentibus, vnciam latis, & in sesquiunciam aut vnciarum duarum longitudinem porrectis, crassis, densis, succulentis, gustu & colore superioris Cochleariæ: radice maiore. Aque ut superior laudatur ad Stomacacem. In anglia ad

PERFO



PERFOLIATA,

CAP. LVII.

**V**ix affirmare quis possit, fueritne veteribus cognita descriptaq; hæc herba, quæ Perfoliatum & Perfoliata hodie vocatur, quod caulis singula eius folia perforet, & penetret, Gallis *Persefeuille*, Germanis *Durchwachs*. Ambigitur hodie à nonnullis sit ne Dioscoridis Cacia. Eiusdem cotyledon à nonnullis crederetur, nisi radix obstaret, quæ oliuæ instar rotunda non est. Perfoliata caulem mittit rotundum, gracilem, ramulis multis & tenuibus fruticantem, folia singula Perforantibus rotunda, in acutum tamen desinentia, caua, tenera, læuia, colore ex glauco virentia: flores in ramulorum fastigiis parui, inter foliola radiatim sita ex aureo pallidi: semen fuscum, radix vnica, candicans, fibrata. Inter segetes, in pratis, agrorum marginibus prouenit, & à Chirurgis in hortis colitur. Iulio & Augusto mēsis florēt, deinde semina producit. Amara modicè est, & adstringens, ex quo intelligere licet, calidam siccamq; esse. Decoctum eius in aqua aut vino, vulneribus medetur: quinetiam herbæ ipsius folia recentia trita, & imposita, cera aut quopiam alio curandis vulneribus vtili vn-

Nomina

Dod. lib. II.

cap. 93.

Fuch. cap.

242.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

& Vires.

PERFOLIATA,

Dodonai.



PERFOLIATA Longifolia,

Dalechampij.



guento excepta, ramices puerorum sanant. Eadem herba trita & cum farina vinoq; admota, prominentias umbilici infantium reprimat. Plurimus huius apud Chirurgos vsus. Perfoliata alia longifolia cognominata, in cōuallibus altissimorum luteo cacuminum densis, vmbrosisq; siluarum solitudinibus, hominis proceritate crescit, radice nigra, crassa, dura, ex quibusdam tuberculis fibras mittente: caule simplici in virgas minimè diuiso, foliis oblongis, caulem amplectentibus, non autem vt in altera & vulgari per medium traducentibus, crassis, gustu amaris, flore è rubro nigrescente, non coronæ modo, vt in altero genere, caulis verticem ambiente, sed ex eius fastigio prodeunte pediculis subuecto.

COTY.



*Acetabulum ē spongia mēsa, et sphaerica, quae calycis et se circum idcirco hinc nunc ubi hinc*  
*conueniunt ut quae sphaerica sunt funduntur.*

1322

# HISTORIAE OMNIUM PLANTARVM, COTYLEDON SECVNDA, CAP. LVIII.

Nomina

Forma.

*vide Physog. pag. 554.  
et 615.*

Matthi. in  
ca. 38. li. 4.  
Dod. lib. 1.  
cap. 25.

## COTYLEDON II.

Matthioli.

Locus.

Vires.

Lib. 4. c. 88.

Li. 25. ca. 13.



## COTYLEDON III.

Dalechampij.



## CYMBALARIA

Matthioli.



astringens



astringentis gustus: & folia fordida dixit, perinde ac si *ῥυπαρά* pro *λίπαρά* legisset. Coryled.  
tertia.  
Herbarij quidam Coryledonem aliam siue Cymbalium diuersum à superiore de- Forma.  
pingunt: radice fibris multis nigrisque capillata, foliis multis, crassis, pinguibus,  
longo pediculo nixis, circa radicem in orbem circumiectis, & tanquam rotundū  
oculi ambitum describentibus, venosis, in ambitu crenatis: caule palmum alto,  
villosa, tenui: flore hyperici, candido. Umbrosis & opacis siluarum recessibus, &  
latebris gaudet. Refrigerat & humectat vt aizoum. Saxifragiæ maiori, seu albæ Locus.  
per similis est, non tamen eadem: differt enim viribus potissimum, & radicibus. Temper.  
Est apud Insu-bres vulgaris herba, quæ cum Cymbalaria vocetur, à Cymbalio vi- Cymbala-  
ria Marth.  
in cap. 88.  
lib. 4.  
Pet. Pen. in  
Ad.  
detur illis nomen duxisse, verusque esse veneris umbilicus alter. Venetiis Patanij, Forma.  
& vicinis pagis passim ex parietinis & maceris comæ modo dependet, cauliculis  
numerosis, tenuibus, lentis, teneris, capillaceis, pedalis & sesquipedalibus, &  
quibus folia prodeunt hederacea, laciniata, mollia, læuia, logis tenuibusque petio-  
lis nixa: flosculi ex luteo virentes, qui è tenuissimis quoque pediculis emergentes,  
clauicularum modo sese implicant. Illic Pharmacopœi veri umbilici Veneris pen- Vires.  
Ibidem.  
nuria & ignoratione hac herba vtuntur, iisdemq; pollere facultatibus existimant.  
Valere eam ad alba vteri profluvia Matthiolus affirmat, si ipsa recens sapius in  
acetariis deuoretur, vt Itali solent, prima mensa.

MUSCVS,

CAP. LIX.

*ὑπνον γὰ ὑπνὸς ἔστιν οὗτος ἐν τῇ  
ἐκ μύσος ὑπνὸς ἰνδὸς ὁνομα-  
στέον.*

**B** PTON & *μύσος* Græcis appellatur, qui Muscus Latinis, Arabibus Nomina  
Lib. 12. c. 13.  
Lib. 1.  
*Asnec*, & *Vnec*, Gallis *Mouffe*, Italis *Mosco*, Germanis *Moose*, Sphagnō  
etiam Plinius vocat, item Ætius Sphagnum & Hypnum. Multiplex  
est Muscus: Arboreus, terrestis, saxatilis, marinus. De arboreo & ter-  
restri hic tractabimus. Est autem Muscus præsertim arboreus, nihil aliud quàm  
villi, seu foliola incana minutius & profundius incisa, nascentia, & pendentia ex  
arboribus sine radice, sine flore, sine semine. In cedro arbore, inquit Dioscorides, Forma.  
Lib. 1. c. 20.  
populo alba & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneū,  
in quo genere candidum & odoratiū præstat,  
nigricans improbatur. Plinius de eadem scri-  
bit his verbis. Sphagnos in Syrenaica prouin- Lib. 12. c. 23.

MUSCVS Arboreus.



MUSCVS 1. Terrestis, Tragi.



VVV

*muscus ita vocat. quia  
habet maximam conuenientiam  
cum musco odorato propter  
odori similitudinem et inueni-  
entiam dicitur à musco et  
regio ex qua extrahitur.  
Sphagn. Sphagnum. materia  
quia muscos ex lapidib.  
et rariis odor. scaturit  
videtur  
muscos fore densiora  
propter odorem vel propter  
odori similitudinem vel propter  
recenter natus propter mu-  
cus exhalat. Sphagnum  
recenter natus.*



cia maximè probatur, alij Bryon vocant: secundum locum obtinet Cyprius, tertium phœnicus. Fertur & in Ægypto nasci: quin & in Gallia non dubitauerint. Sunt enim hoc nomine etiam arborum villi, quales in Græcia videmus, sed odore præstantes. Laus prima candidissimis atque altissimis, secunda rutilis, nulla nigris. Et in insulis petrisque nati improbantur, omnèsque quibus palmarum atque non suus odor inest. Galenus his addit Muscum, qui in picea arbore reperitur. Nascitur etiam in abiete, & aliis arboribus. Caterum in eo genere quod in Italia provenit, inquit Matthiolus, is nobilior & odoratior videtur, qui in larice nascitur: quare & viribus fortasse præstantior erit. Tragus aliud Musci genus facit, idq; vulgarissimum in pratis & hortis nascens, villolum, sed reliquis generibus gracilius & tenuius, ex luteo viride. Idem & recentiores alij, Muscum quoque terrestrem appellat plantam quæ longis viticulis repit, numerosissimis foliis obfita, funiculos esse dices, qui sæpe ad septem & octo vlnarum longitudinem protenduntur: multis vtrinque adnatis ramulis, similibus foliolis obseptis, ut piceæ arboris similitates esse videantur. A Lobellio Muscus clauatus dicitur, Pes leoninus, perpe-

L. 7. simpl.

In cap. 20.  
lib. 1.Lib. 4. ca. 2.  
Musc. ter-  
rest. 1. 1.**Forma.**

Musc. ter-

restris. 2.

Trag. lib. 1.

cap. 189.

**Forma.**

MVSCVS Terrestris 11.



MVSCVS Terrestris 111.



ram Chamæpeuce à Cordo. Tota planta ad tactum sicca est & subaspera, color ex viridi pallescente. Serpit humi & inter saxa Musco scatentia, nititurq; radicibus per intervalla multis, capillaribus quæ ex viticulis obsequiosis prodeunt, ut in hederâ, quibus sese propagat, & gyros necit, spirasq; an fractuosas multas. Iunio verò emittit ex ramusculorum fastigiis iulos ferè corylaceos, subflavo colore. Nascitur in silvis, sabulosis & inuiis locis, præsertim inter muscosos lapides. Terrestri huic Musco Tragus herbulâ subiungit, quæ æstate & hyeme virens omnino sativâ sabinâ refert, odore omni destituta, gustu planè amara, Musci terrestres superioris instar, luteos in cacumine iulos ferès, qui & ipsi nullo post se relicto fructu, protinus pereunt. Quidâ Plinij Selaginè esse voluit Sabine similè, Gallorû Druidis summo perè laudatâ cõtra omnia vitia oculorû, & omnem perniciem. Musco terrestri non absurdè subiungetur herba Græcis Latinisq; veteribus forte ignota, quibusdam

**Locus.**

Musc. ter-

restris.

Lib. 1. c. 189.

**Forma.**

Lycopod.


Dodon.



*MUSCVS Alius terrestris*  
*Lycopodium, Dodon.*



*MUSCVS Feniculaceus.*



*MUSCVS Terrestris denticu-*  
*latus, Lobelij.*



quibusdam Officinis pro spica celtica non sine graui errore vsurpata, vulgi appellatione secutus Dodonæus *λυκοπόδιον* nominat, idest, Pedem lupinum, Gallicè *Pied de loup*, vel *Patte de loup*, Germanicè *Beerlap*, *Gurtelkraut*, & Musci quintum genus facit. Viticulis per humum serpit, foliolis veluti pilis densis admodum vestitis, radiculis in quibusdam partibus terræ infixis, & inhærentibus. Ex his enascuntur alia in tres quatuorve particulas fissæ, in apices candidos desinentes, lupinos vngues satis aptè referentes, producentesque cauliculos rectos, tenues, candicantes, rarioribus pilis hirtos, tenues veluti spicas ferentes, foliolis plenas, quæ flosculis candidis similes sunt. Vdis locis, & siluis umbrosis, crescit. Muscum alium fœniculaceum vocant herbarij, quem gignunt arbores in frigidissimo Allobrogum tractu, locis asperrimis, & maximè saxosis educatæ, præsertim quercus & fagi. Nascitur is non alterius Musci arborei modo, sed sparsim in variis arborum partibus, trunco, ramis furculis, fruticatque singulis priuatim quasi plantis: plurimi ex vna tanquam radice nigra ramuli prodeunt, duos digitos alti, exiles, in tenuissimos villos fœniculo similes diuisi. candidi, iucundum quidpiam olentes, vasculis multis lacunatis, inanibus, ramulorum vertici affixis, in ambitu hirsutis, quæ ad seminis conceptaculum natura formasse videtur, vt in Androsace, licet vacua perpetuo sint. Quasdam alias Musci varietates tradidit Lobellius. Quædam enim denticulis, & viticulis paruis sarmentosis pinnatis, compressis, arguta naturæ solertia elaborata, rependo, serpendoque innumeris flexibus implicatur. Huic alia non dissimilis ortu & modo, sed ramuli toti densissimis foliorum quasi denticulis compressis, vel squamulis. Illecebræ multò minoribus, attractatu sericeis cõferti sunt. Est Clusij Muscus terrestris, repēs, Lusitanicus. Herbula, inquit, dodrantalibus aut interdum pedalis repens, viticulis filo tenuioribus, numerosis, vtrinque adnatis ramulis in obliquum expansis & capillaribus, terræ inhærentibus quibusdam suis fibris. Tota integitur numerosissimis foliolis, siue squamulis potius tenuissimis, pulcherrima serie digestis, dilutior & pallefcete virore, & tactu mollibus quidam, sed veluti siccis, gustu adstringente, cum

Lib. 3. ca. 71.

Locus.

Musc. fœn.

Forma.



# HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,

*MUSCVS Terrestris denticulatus*,  
 aliter *Muscus terrestris repēs*, Clus.



Vires.  
 Lib. I. c. 20.  
 H. d. simpl.

Cap. 99.

*MUSCVS Scoparius*, Lob.



Trog. lib. 1.  
 cap. 139.

quadam tamen grata dulcedine. Nusquam hoc Musci genus se confpexisse ait Clusius, quàm in aggeribus vmbrosis oliuetorum, ad Colibriam urbem Lusitania, trans flumen Mædego, Latinis Munda nuncupatum. Lobellius Sommerfeti Angliæ sterilibus montibus (Mendip vernacule) ubi plumbū effoditur, nonusquam magna provenit copia, in aggeribus & saxis. Est & Lobellij alius Muscus Scoparius cognominatus, Muscudorum & vdorum Belgij & Frisiæ Orientalis sectator, multis dodrantalibus, pedalibus, atque etiam amplioribus ramulis, purpura aurea nitentibus, in numero cirrorum tenuium sobole comosis, è quibus singulis oriuntur capitula Lini, Ericæ aut Selaginis minora. Hac Lobellius. Muscus arboreus vim habet adstringendi, vt tradit Dioscorides. Facit ad vteri affectus in decoctis ad infusus. Sic & Galenus. Vim habet adstringentem, inquit, inualidam: nec enim multum est frigidum, sed propinquum ferè mediis: quia videlicet & digerendi, & emolliendi facultatis est particeps, maximè quòd in cedrinis lignis reperitur. Scribit Serapio, vinum epotum in quo diebus aliquot Muscus is maderit, altum somnum inducere, ventriculum roborare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Muscus, inquit Auicenna, vtiliter cordis medicamentis inferitur, quòd odoris fragrantia defectus animi iuuat. Muscus terrestris ad calculi affectus maximè commendatur: nam si vino incoquatur, eo epoto, renum calculi franguntur, pellunturque certissimo experimento. Nonnulli etiam aquam ex eo destillant ad eandem affectionem. Idem contusus & ex aqua decoctus, inflammationes & dolores, à calida causa exortos, mulcet: quare à multis vsurpatur ad podagram à calore prouenientem. In vinum vappescens pendulus impositus, breni restituit. Tantum autem Musci accipiendum, quantum vas ipsum siue paruum, siue magnum postulare videbitur.

## PVLMONARIA,

## CAP. LX.


*Vide Synonyma.*  
*Genera.*  
*Forma.*  
 March. in  
 c. 23. lib. 4.  
 Deod. lib. 1.  
 c. 17. 77.



Vt pulmonariæ nomen audit, statim aliquā cum pulmonibus similitudinem, vel insignem quādam ad iuuandos pulmones facultatem animo concipit. Plantas tres huius nominis describemus. Prima est quæ Gallis l'Herbe aux pommons, Germanis Lingenkraut nominatur. Liceni herbe quadatenus similis, in quercuum aliarumq; siluestrium arborum caudicibus



PVLMONARIA Fungosa.



PVLMONARIA  
Maior.



dum collium, nonnunquam & in nemoribus, solo pingui, radice longa, nigra, modice fibrata: caulibus multis ex radice ima prodeuntibus, ferè cubitalibus, ro-

caudicibus nascitur opacis præsertim siluis, aridior, ambitu latiore, supernè virescens, infernè pallens, maculis frequentibus ita conspersa, vt effigiem pulmonis præbeat, quæ causâ nominis fuit. Vtuntur hac quidam magis fortasse nomine quàm viriū experientia inducti ad tabem, pulmonum vlcera, & cruenta sputa. Nec defunt qui eam commendent ad vulnera sananda, ad pudendorum vlcera, & ad vtrūque muliebri profluuium. Præterea dysentericis eam exhibent, & biliosa vomentibus. Sunt quoque qui ea vtuntur ad suspiriosos, asthmaticos cum glycyrrhizæ succo, hyssopo, helenij radice, & scillino oxymelite. Valet ad ouium & cæterorū quadrupedum tussim, & respirandi difficultatem: quomobrem pastores eam tidunt, morbosiq; ouibus mane cum sale propinant. Huic

Vires.

*[Handwritten notes in a cursive script, likely a later addition or correction.]*

Pulmon.  
maior.

Nomina  
Forma.

Locus.  
Mauch. in  
ca. 48. li. 4.  
Vires.

Pulmo.  
minor.  
Li. 25. ca. 9.  
Locus.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
 PVLMONARIA Minor,  
 Dalechampij.  
 PVLMONARIA Gallorum,  
 siue Auricula muris maior, Tragi.

figura Pulmonariæ  
 Gallo. d. ed. sub  
 nomine Cochlearis  
 in l. 1. pag. 565.



tundis, hirsutis, & subasperis: foliis per intervalla ex caulibus exortis, longis, mucronatis, senis aut septenis in singulis caulibus, nec ferè pluribus: flore in caulium vertice coaceruato, priusquam recludatur ex cæruleo rubente, cum apertus est prorsus purpureo, pulmonariæ simillimo. Alia est Pulmonaria Gallorum, quamvis eo nomine donata sit, propior tamen videtur in tubaceo generi, inquit Pena, flore luteo Hieracij, in parietibus & dirutis musco obfritis, Lugduni & Montpelij, tenello cauliculo, intubaceo, palmari & sesquipalmari, gracili, è radice exliore, betonice, nonnihil fibrata. Scribit Lobellius esse Auriculam maiorem Tragi. Eius tamen icon villos nullos repræsentat, quos habet pictura Tragi, qui tradit folia huius sparsa iacere, singula Auriculam muris alpini, seu leporis exprimere, pilosa, & leniter per ambitum incisa.

CAUDA MVRIS,

CAP. LXI.

Nomina  
 D. lib. 1.  
 1. 1. 63.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 Aduer.  
 Forma.

cynus.

Locus.  
 Tempus.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.



RECENTIORIBVS perappositè *mousepos* vocatur hæc herba, Latine Cauda muris, Gallice *Queue de souris*, Germanis *Tausent korn*. Humilis est herba, foliis angustis, gramineis, pollicem & sesquipedem altis, rigidis, gustu plantaginis: inter quæ è radice proueniunt cauliculi tenues, flosculis albicantibus, palmariis, breui marcescentibus vestiti, qui in falcatum mucronem desinunt: teretem, oblongum, muris caudæ haud abimilem, in quo semina exigua, nigricantia. Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense florer: Maio semen maturum est. Refrigerat, nec multum à plantagine viribus differt. Gustu plantaginis esse scribit Pena, Lobellius legit gustu hydropiperis.

RVBIA




RUBIA, CAP. LXII.



ΡΥΘΟΔΑΝΟΝ Græcè, quod etiam Erythrodanum & Rubia Nomina  
Latine, *Paul* & *seu alfabagin* Arabicè, *Erythrodano*, & *Rubbia* Italicè,  
*serberroet* Germanicè, *Ruvia* Hispanicè, *Garance* Gallicè, Officinis Rubia  
tinctorum. A rubore radice quo lana & coria tinguntur: factum est

RUBIA SATIVA.



illi Græcum Latinumque nomen. Dioscoridi & Genera.

aliis duo sunt rubia genera. Vna sativa est, altera  
agrestis. Satiæ caules sunt quadranguli, longi,  
asperæ, aparinæ caulibus similes, sed per omnia  
maiores & robustiores, folia per intervalla in  
singulis geniculis stellarum modo in orbem  
circumiacentia: flores in caulium verticibus, ex  
pallido luteo: fructus rotundus per initia viridis,  
mox ruber, postea cum maturuit, niger: radix  
longa, tenuis, rubra. Agrestis illi similis est, sed  
minor, & minus aspera tota, folia minora, numero  
siora, genicula crebriora stellatim ambientia: flosculi  
candicant. Sic Plinius etiam describit. Sunt etiam  
num duo genera, non nisi sordido nota vulgo, quum  
quæstu multo polleant. Imprimis Rubia tingendis  
lanis & coriis necessaria. Laudatissima Italica, &  
maximè suburbana, etsi omnes penè provinciæ  
scateant ea. Sponte provenit, feriturque  
similitudine eruiat. Verum spinosius ei  
caulisque geniculatus est, sic enim legendum  
ex vetusto codice, quinis circa articulos in orbem  
foliis, semen eius rubrum est.

Forma.

*Ερυθρος ruber*  
*Ερυθρος ruber*  
*Ερυθροδανον. Paul*  
*rubore radice,*

Rubia sil-  
vestris.

Lib. 19. c. 3.

RUBIA, Silvestris.



Pingui fertilique solo feritur, multis regionibus,  
magni proventus & quæstus gratia. Silvestris  
vbique ferè provenit sponte in agris, & in sepibus.  
Floret utraq; æstate, eiusque tum etiam  
radix effoditur. Rubiam minimam addit Lobelius,  
quam in rupibus Vincentij non procul Bristolio  
Angliæ enaram legit, foliis est Herniari-  
paribus mucronatis, positi rubia, cauliculis reipentibus,  
sesquiansciam altis, in quibus flosculi luteoli.  
Radix exilis rubra, corallio concolor. Pinxit etiam  
Rubiam laudem Taurinensium, cui Asperula ritu  
summis cauliculis, flores cædidi, stellati, verticillatim  
prodeunt. Folia quaternae decussatim posita, cacubalo  
Plinij paria, Solano tetraphyllo minora, in cauliculis  
sesquipedalibus, & bicubitalibus, ex intervallis  
geniculatis. Frequens hæc in Pedemontium collibus  
Taurino finitimis. Quot in medicina usus habet  
rubia, tradit Dioscorus his verbis. Radix urinam  
ciet, quamobrem morbo regio laborantibus, cum aqua  
mulsâ, auxiliatur. Item ischiadicis, & resolutis.  
Ducit urinam multam & crassam, nonnumquam etiam

Lib. 4. c. 143.

Vires.

V.V.



lib. 24. c. 11 sanguinē, bibentes quidē quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differētiā spectare. Aduersus venenatorū morsus succū cum foliis bibere prodest. Semē exoymelite potū, lienē absumit. Apposita radix fœtus, menses, & secūdas educit. Albas vitilignes ex aceto illita sanat. Plinius his multū lucis adfert de medico eiusdem vsu scribens. Alia res Erythrodanum, quam aliqui Ereuthodanum vocant nos Rubiam, qua tinguntur lanæ, pellēsque perficiuntur. In medicina vrinam ciet, regium morbum sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita, & ischiadicos & paralyticos, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix semēque trahunt menses,

RUBIA Minima,  
Lobellij.

RUBIA Lewis Taurinensium,  
Lobellij.



Lib. 6. sim. alium sistunt, & collectiones discutiunt. Contra serpentes rami cum foliis imponuntur. Folia & capillum inficiunt. Inuenio apud quosdam morbum regium lenari hoc frutice, etiā si adalligatus spectetur tantum. In hoc duntaxat Plinius à Dioscoride diffidet, quod contra serpentes ramos cum foliis imponi scripsit. Dioscorides contra venenatorum morsus succum cum foliis bibi, vt videatur, in Dioscor. non legisse θεωροδανος τε βοιηται ο χυλος με των φυλλων ποτεις, sed θεωροδανος τε βοιηται χυλος με των φυλλων επιτιθεις. Rubiæ radix, inquit Galenus, acerbæ est, & gustu amara. Itaque quæcumque agere dictæ sunt vbi eiusmodi coierint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies: quippe cum & lienem & iecur expurget, & vrinas crassas, multasque moueat. Quin & menses ciet, & mediocriter, quæ extersionem postulant, extergit, quare vitilignes albas, cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

APARINE,

CAP. LXIII.

Nomina



Aparina d. quasi

asperina ab asperis

habet habere si non est latina nec qd a grece uere dicitur ab hinc deest

ἀπαρίνη φρούς ἀπαρίνημα ἔσπερον qd sua asperitate præterentium uerba asperit

ALDE affinis est erythrodano quæ ἀπαρίνη Græcis dicitur & φασκίαν θρωπος, Gallis Grateron, Italis Speronella, Germanis Klebkraut. φασκίαν hominis amans, quod caulium foliorumq; asperitate prætereuntium vestes apprehendat, perinde ac si comitatis & humanitatis gratia retinere uellet. ἀμφιδόκωπος ab umbilici similitudine, quam semē eius in medio caui refert.



APARINE.



refert. Ex quo intelligere licet in Galeni, Pauli, Aetij, Plinij exemplaribus *ομφαλόκαρπον*: mēdo-  
dōse legi, pro *ομφαλόκαρπον*, vt rectē legimus in  
Dioscoride. Aparine, inquit ille, ramos habet  
multos, paruos, quadrangulos asperos: folia ex  
interuallis in orbē circumposita vt in erythro-  
dano: flores albos, semen durum, album, rotun-  
dum, à medio vmbilici modo leuiter concauū.  
Herba ipsa vestibus adhærescit. Ab his diuersa  
non sunt quæ Plinius de eadē prodidit, his ver-  
bis. Aparinen aliqui omphacocarpū ( ompha-  
locarpum legendū esse diximus ) alij philathro-  
pon vocant, ramosam, hirsutam, quinis senisve  
in orbem circa ramos foliis per interualla. Semē  
rotundum, durum, cōcauū, subdulce. Nascitur  
in frumentario agro, aut hortis pratisve, asperi-  
tate etiam vestium tenaci. Hæc est omnium cō-  
sensu nostra Aparine, quæ, vt Theophrastus scri-  
bit, nascitur præsertim inter lentes, nobis passim  
circa sepes, dumos, macerias, & in hortis. Tota  
aestate floret & semen producit. Calida siccæq;  
est temperaturæ. Succus huius, inquit Dioscori-

*omphalocarpus*

Forma.  
Lib. 3. c. 38.

Lib. 27. c. 5.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vir.

Lib. 25. c. 5.

Lib. 6. sim.

In cap. 88.

Lib. 3.

des, ex semine, caulibus & foliis expressus, phalangij & vipere moribus auxiliatur:  
si bibatur cum vino, aurium dolores infusus succus sanat. Herba ipsa axungia trita  
excepta, strumas discutit. Eadem ferè Plinius habet. Efficax cōtra serpentes semine  
ex vino poto drachma, & contra phalangia. Sanguinis abundantiam ex vulneribus  
reprimūt folia imposita. Succus aurib⁹ infunditur. Galeno verò modice extergit &  
desiccatur, habetq; nōnihil subtiliū partiū. Huius succū, inquit Matth. valde cōmen-  
dant aliqui ad recētia vulnera glutinanda, & ad papillarū rimas. Stilla titia eius, aqua  
datur vtiliter potanda dysentericis, sicca farina vulnera glurinat, & vlcera sanat.

S PERGVLA,

CAP. LXIIII.



**A**D DONAEO & aliis Spergula di-  
citur ad imitationē Spurry Belga-  
rum & Anglorū, hanc herbam sic  
nominantium, Officin⁹, & fortas-  
sis antiquis incognitā. Cauliculos edit rotundos,  
graciles, geniculatos, palmum altos, crebrioribus  
quàm in aparine, circa ipsa genicula, foliis angu-  
stioribus, stellæ modo radiatis, galij foliis simili-  
bus, in summis cauliculis flosculi multi candidi  
spectantur, & caliculi siue capitula sicut in lino,  
in quibus semen nigricans continetur, radix gra-  
cilis est, digitum longa. Vmbrosis locis gaudet,  
feritur etiam in agris. Maio & Iunio mensibus  
flore. Saginadis bubus & vaccis vtilissima. Qua-  
de causa Brabanti hac vere agros cōserunt, quod  
eius pabulo mirificè vaccas saginari, lactisq; co-  
piam augeri longa experientia compertum ha-  
beant. Semen vomitu pituitosos humores edu-  
cere

Nomina

Lib. 1. c. 37.

Forma.

Dodo. ibi.

Pena in

Adu.

Locus.

Tempus,

Vfus.



cere plerique referunt, inquit Dodonæus: estur tamen à Gallinis & columbis, & hoc pastu oua plura & citius excludere creduntur.

## LINARIA,

## CAP. LXV.

## Nomina

Fuch. cap.

2. 6 hist.

Dodo. lib.

1 cap 53.

Pet. Pen. in

Adu.

Forma.



INARIA Officinis dicta, quod caule & foliis linum referat, à nonnullis Vrinalis, & Vrinaria, nominatur à vi diuretica, à qua etiam dicta. Vrina enim Græcis est ὀρός, ὀρρός & ὀρός & ὀρρον & ὀρρον traho. quare cum linaria insigni facultate ducendi vrinas prædita quemadmodum Osyris, eique figura maximè similis sit, minimè dubitandum est, quin illa vera sit Dioscoridis Osyris, quæ ut tradit Dioscorides, fruticulus est niger, tenues habens virgas, agrè fragiles, in quibus foliola terna quaternave, aut quina, aut se-

na, ceu lini, nigra initio, deinde mutato colore, sub rubescencia. Plinius Dioscoridi nō omnino consentit, hæc de eadem scribens. Osyris ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in his folia nigra ceu lini, semenq; in ramulis nigrum initio, deinde colore mutato, rubescens. Hic semini coloris mutationem tribuit Plinius, Dioscorides foliis, de semine nullum verbum facit. Quæ si diligenter expendas, nullam delineationis Osyridis notam in Linaria desiderabis. Linaria enim cauliculis fruticat tenuibus, lentis, nigricantibus, in quibus folia numerosa, longiuscula, & angusta lini tacis, siue Esulam minorem adeo aptè referētia, ut herbarij isto versiculo utramque distinxerint alioquin valde affines,

*Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.*

Flores in summis caulibus elegantes, lutei, à fronte latiusculi clausiq;, os ranæ imitantes, cauda angusta & inflexa, ut in consolida regali: semen quoque in siliquis rotundis, inclusum nigricans, tantisper dum maturefcit, postquam maturum rubescit, senescentes quoque ramuli nigrorem in ruborē vertunt. Passim locis incultis, circa sepes,

## Locus.

## Tempus.

## Temper.

## Uires

Lib. 4. c. 138.

Lib. 27. c. 12.

## Cor. Emb.

124. lib. 4.

Lib. 8. sim.

Fuch. cap.

206.

& in agrorum marginibus. Floret potissimum Iunio & Augusto mensibus. Amara est: quare qualida, vim inesse vrinas mouendi scribunt herbarij, & stranguriæ remedium; ac vesicæ obstructionibus, singulari esse remedio, quibus facultatibus prædictam esse Osyridem veteres testantur. Decoctum enim eius potum, inquit Dioscorides, morbo regio laborantibus auxiliatur. Plinius Smegmata mulieribus faciunt ex his radicum decoctum potum sanat arquatos. Eadem, priusquam maturefcit semen, concisæ, & sole siccata, aluum sistunt, post maturitatem verò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis ventris medentur, & per se trita ex aqua caelesti, bibuntur. Dioscorides radicem non meminit, quibus tum alia tum illam attribuit, quod Dioscor. toti frutici. Sed & smegmata mulieribus fieri ex ramulis Dioscorides prorsus omisit. Osyridi herbæ, inquit Galen. ex qua fiunt & coremata amara inest qualitas, & obstructiones impediendi facultas, quare & in iecore consistentes adiuuat obstructiones. Quæ autem hic Galenus, & eum secuti Paulus & Aetius κορημαξ vocant, alij scopas interpretantur, à verbo κορην, quod cum non solum vertere significet, sed etiam κοσμεῖν & χαλωπίζειν, id est, ornare siue pungeret & venustare, alij κορημαξ intelligunt κοσμησα. Suida & Phauorino auctoribus id est



*Vide Phlegm. pag. 400.*  
Lib. 27. c. 12

OSYRIS, Linaria.



id est, comptoria, & venustantia faciē medicamenta, ē quorum sanē numero Osy-  
ris est, quæ cum amara sit, extergere etiam, faciē potissimum maculas potest, vt illi  
scoparia. *scoparia* dixerint, quæ Plinius sinēgmata dixit. Ex eo autem quod ex Osyride *scoparia*  
id est, scopas fieri illi scripserint, colligunt nōnulli reiecta Linaria veram Osy-

*LINARIA Magna, Belueder.*



*SCOPARIA, Belueder.*



*LINARIA Valentina, Clusij.*



ridem Italarum esse *Beluedere*, quod ad verē Formam  
dum sit aptior, quod foliis crescat lini similibus  
amplioribus numerosioribus: caule singulari, an-  
gulofo, cubito maiore, surculis plurimis fructi-  
cante: flore exiguo, rubro, semine minutulo,  
rotundo, ē cinereo nigrescente: radicibus nu-  
merosis, densis, cappillaceis, nigricantibus. Qui  
formosarum plantarum aspectu delectantur,  
hanc serunt, & adultam alunt in adiū fenestris,  
densa eius coma vmbra captantes, & nitido  
viore oculos recreantes, ob foliorum venusta-  
tem Itali *Beluedere* nominarunt. In aridis po-  
tius quā pinguibus luxuriat, tamē voluptatis  
gratia pridem coli cepit etiam in hortis nostris.  
Seritur & à multis ad scopas ex ea cōficiendas,  
vnde Scoparia à quibusdā nominata est. Quod  
si eam propius inspicias, videbis folia esse ion-  
giora quā Linariæ, numerosiora, non amara,  
qualem tamē Galenus & Paulus voluerunt esse  
Osyridem, nec iotericis ac hydropicis perutilē,  
vt est Linaria. Quod si ex Osyride *scoparia* id  
est, scopas fieri voluit Galenus, non protinus  
hæc scopis accommodatissima, Osyris fuerit,  
cum



Lib. stirp.  
Hispa. 2.  
cap. 32.

cum sint plurimi alij frutices, ex quibus scopæ optimæ parari possunt, qui tamen Oxyrides non sunt. A Clusio Linaria alia exhibetur quam Valentinam vocat. Circa Valentiam, inquit, in pratis & locis umbrosis. Lunaria genus crescit, vulgari multò lætius & crassius, ternos quaternosque caules ab vna radice proferens, singulares, pedales, interdum ampliores, quos folia centaurij minoris ambiunt, inferiore parte iuxta terram terno ordine disposita plerumque, superiore verò parte sparsim & nullo ordine: extremis ramis veluti spicam profert, florum luteorum Linariæ vulgari similibus, quibus tamen rictus lanuginosus est, cauda verò seu corniculum purpurascens coloris, hos sequuntur capitula, exiguis loculis similitudine est singulari, alba. Floret Martio. Hanc appellauit Linariam, non à foliorum similitudine, quæ non conueniunt, sed quod eius flores vulgari forma similes, & eiusdem ferè sint temperamenti. Nam præmansa manifestam acrimoniam cum aliquo amore coniunctam exerit.

VERBENACA, CAP. LXVII.

Nomina

**V**ERBENACA, Græcis, Latinis Verbena & Verbenaca, herbasagminalis, Columbaris, Columbina, seu Columbina, ferraria, herbaris & officinis Verbena, Gallis *Veruine*, Italis *Berbenà*, *Vermiacola*, Germanis *Eisenkraut* & *Eisenhart*, id est, ferraria à ferri duritia. Peristereon auctore Dioscoride, quod columbæ in ea libenter versentur. Verbena quasi herbena teste Dorato. vel potius quod ea verrendis iouis aris vterentur, aliisque pacis & bellique ritibus, vnde sagminalis nomen. Plinius. Sagmina in remediis publicis fuere, & in sacris legationibusque Verbenæ, certè utròque nomine idem significatur, hoc est gramen ex arce cum sua terrâ euulsum: hoc semper & legari vti cum ad hostes, clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clare repetitum. Vnus itaque Verbenarius vocabatur. Dioscorides herbas duas *περεσπεύωνος* nomine, quamquadiuersis capitibus comprehendit. Vnam, quæ iam dicta est: alteram quæ *ῥοζώνη* nominatur, Latinè sacra herba, compositæque voce hieraborane, & Verbenaca teste Plinio, sacra quidem herba, quod ea olim apud Romanos domus purgabatur, familiæ lustrabantur, Iouis mensa ad sacrificium & epulas verbebar, & facialis in sacris legationibus illa coronabatur, vel, ut Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspensa & illigata mire utilis sit. Herbarij hanc *περεσπεύωναν*, id est, Verbenacam supinam, quod semper humi supinè procumbat, illam superiorem *περεσπεύωναν ὀρθιον*, id est, Verbenacam rectam nominarunt, quod rectis ramulis semper assurgat, cum contra hæc supina siue strata & humilis potius dicenda sit, illa veriùs recta, quod rectis ramulis & pluribus adolescat. Plinius à se duo genera constituit, marem, rectam, ut aiunt fœminam supinam vocans. Verba eius hæc sunt. Nulla Romanæ nobilitatis plus habet quàm hieraborane, aliqui peristereona, nostri Verbenacam vocant. Hæc est quam legatos ferre ad hostes indicauimus, hac Iouis mensa verritur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt, foliosa, quam fœminam putant: mas, rarioribus foliis. Ramuli vtriusque plures, tenues, cubitales, angulosi: folia minora quàm quercus angustioraque, diuisuris maioribus, colos glaucus, radix longa, tenuis. Nascitur ubique in planis aquis. Quidam non distinguunt, sed vnum omnino genus faciunt: quoniam vtræque eisdem effectus habet. Hæc Plinius. Fuchsius duo Verbenacæ ponit genera, Verbenacam rectam siue marem, Verbenacam supinam siue fœminam. Dodonæus etiam rectam & supinam, sed hanc duplicem, marem scilicet & fœminam. Matthiolus cum duo tridem genera posuisset, supinam, vulgarem Verbenacam, & legitimam Dioscoridis *ἰερὴν ῥοζώνην* esse affirmat, rectam verò quæ peristereon

Cap. 22.  
hist.

Lib. 1. c. 84.

In cap. 55.  
& 56. lib. 4.



ristereon prior est Dioscoridis, quæq; vnico tantum caule, & vnica radice constat: nusquam se vidisse ingenuè fatetur, quæ noris omnibus legitimam referat, etsi nō desint qui eam esse velint quam inter sideritidas primo loco depinxit. At quum hæc ab vna radice plures edat caules, etiam sesquicubitales, folia haud subalbican-

*VERBENACA vulgaris*  
*Matth.*



*VERBENACA Recta*  
*sive mas, Fuchsij.*



tia, flores in caule verticillatim prodeuntes vt in marrubio, denique cum nihil habeat Verbenacis simile, eorum sententiæ minimè subscribit. Idem ait à se obseruasse iis in locis quæ Verbenacæ plurimum sunt feraces, quasdam plantas, quæ caules rectos edere, quasdam humi ferè procumbere, vt hinc fortasse differentiam sumperint ij, qui Verbenacam in rectâ & supinam diuiserunt, Plinio quoque his suffragante, qui à quibusdam hanc non distingui, vnumque omnino genus esse scripsit, quoniam vtrâque eodem effectus habeat, Id quod est à Dioscoridis sententia alienissimum, qui alteram ab altera figura, natalibus, nomenclatura, facultatibus distinxit, vt faciliè perspiciet qui vtriusque historiam diligentius expenderit, his verbis explicatam.

Peristereon siue Verbenaca nascitur in aquosis locis. Ex eo nominata esse videtur, quod columbæ in ea libenter versentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior: folia incisa sub albida è caule prodeunt: singulari plerumque ramo, ac radice reperitur. Sacra herba quam

Dioslib. 4.  
cap. 55.  
Locus.  
Forma.

peristereona vocant, virgas emittit cubitales aut etiam maiores, angulosas, circa quas folia sunt ex interuallis, similia quernis, sed angustiora & minora, per ambitum incisa, subglauca, radicem habet oblongam, tenuem: flores purpureos, tenues. Hæc igitur ramulos multos producit, cubitales aut maiores, folia subglauca. Illi dodrantalis est & vnus è singulari radice caulis, folia *ὑπὸ δὲ λωγ*, natales aquatici. Iam verò si vires ab auctoribus traditas perscruteris, eas diuersas esse comperies. Peristereonis folia cum rosaceo aut adipe suillo recenti imposita, inquit Dioscorides, vteri dolorem eximant. Herba cum aceto imposita erysipelata reprimat, putredines coercet, vulnera glutinat, & vetera cum melle ad cicatricem perducit.

Dioslib. 4.  
cap. 56.

*Virescit*  
*Temper.*  
Lib. 4. c. 55.

Hæc autem efficere siccando & adstringendo auctor est Galenus, scribens, peristereona vim habere adeò desiccantem, vt vulnera glutinet, assentiente etiam Paulo his verbis. Peristereon adeò desiccatur & adstringit, vt vulnera glutinet, & sanguinis profluuium sistat. At communis Verbenacæ siue Sacræ herbæ folia, & radix pota cum vino, aduersus ser-

Lib. 3. sim.

Lib. 7.



pentes valent. Eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris, hemina quadragenis diebus ieiunis bibuntur, contra regium morbum. Veteres tumores & inflammationes imposita mitigant, & fordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarisatū sistit. Aiunt si aqua spargatur triclinium qua maduerit, lactiores compotiores fieri. Datur in tertiana bibendum tertium à terra geniculum cum circumpositis foliis, in quartana quartū. Hæc igitur Verbenaca siue sacra herba non modo cœdemata antiqua & tumores non sistit, vt illa, & mitigat, sed & tonsillarum crustas abrumpit & exsiccat, nimirum calfaciente vi, qua etiam capitis dolores chronicos discutere ex frigidityte & crassis humoribus tradidit Galenus, his verbis. Omnium verò longe maximè discutit, & perfectè corroborat, Verbenaca recta, maximè viridis, imò & arida cum radicibus, & simul cum serpillio oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis, maximè iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se Verbenacam si oleo incoxeris, oleoque inde rigueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigidityte aut ex crassis humoribus oborto medebere.

Lib. 2. com  
poph. loca

HERBA SACRA Quorundam,  
Dalechampij.

VERBENACA Recta,  
Dodonæi.



Sacra herba alia.

Forma.

ris. Herbarij quidam pro Sacra herba aliam exhibent, quæ in nemoribus & silvis prouenit, radice tenui, longa, multifida: caulibus ternis, aut quaternis, angulatis, foliis per intervalla vtrinque æqualiter dispositis, quercui similibus, minoribus pariter incisis, ex quorum alis pediculi nonnumquam exeunt terna gerentes folia minora: flos ruber, candicans, ad tres vel quatuor superiores foliorum sinus emicat ex calice virente oblongior, amœnus, Lamij lutei, semen in oblongo loculo affixum, vt in Ormino. Hanc pro Melissophyllo Fuchsi Lobellius pinxit sed fallitur, opinor, nam Fuchsius pro Melissophyllo ostendit Calamintham moeranæ præstantiorem eiusdem Lobellij, quemadmodum in Libro de Odoratis cap. De Melissa monuimus. Verbenaca recta Dodonæi caule est recto, pedali & maiore, ramulis multis fruticante, in quibus flosculi carulei: folia viridantia, crenata.

Lib. 2. c. 84.

Forma.



crenata, & quadantenus incisa: radix brevis, multum fibrata. Ea videtur esse Verbenaca supina siue fœmina à Fuchſio depicta. Verbenaca supina mas & Hierabotane eiusdem Dodonæi cauliculos fert teneros, hirsutos, angulosos, humi repentes, pedem longos; atque eo longiores: folia quadantenus rotunda, in am-

HIERABOTANE Mas,  
Dodonæi.



HIERABOTANE Fœmina,  
Dodonæi.



*Botany Herb*  
*ἱερός, mas*

*her fœmina*  
*cu. Chirac*  
*vilg. p. 162*

VERBENACA Supina &  
tenuifolia, Clusij.



bitu crenata, quercus aut chamædryos foliis similia, his maiora, illis minora: flores elegantes, caruleos in ramulis: folliculos latiusculos, radicem fibratam. Fuchſius hanc nomine chamædryos vulgaris fœminæ depinxit. Altera Dodonæi Verbenaca supina, siue Hierabotane fœmina, superiorem valde refert cauliculis, foliis, floribus, sed huius cauliculi rotundiores, folia paulò minora, ramuli plures ex vna radice, flores magis coaceruati. Fuchſius pro chamædry vulgari mare depinxit. Clusio alia est ἱερά βοτάνη id est, Sacra herba, & περὶ τρεῖν ὕπλιος id est, Verbenaca supina, cui quaterni aut quini sunt cauliculi, angulosi siue quadranguli, vti in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen, supini & in terram procumbentes: folia vulgari colore similia, & ex viridi caesia, sed magis incisa & multifida: flos in summis virginis vulgari similis ex caruleo purpureus, minor tamen: semen idem: radix tenuis & vulgari similis. Agro Salmaticensi frequens, & quibusdam aliis Castellæ locis, vbi minor & exsucca: & decliuibus fluminumque ripis,

Cap. 33. hi.  
Sacra her.  
fœmina  
Dodon.  
Forma.

ibidem.  
Lib. 2. stir.  
Hispa. c. 45



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

præsertim verò ad flumen Thormini quod Salmanticam, & Albam vrbes alluit, ubi maior & vegetior. Florebat istic Iulio & Augusto: deinde semen ferebat. Eiusdem est cum vulgari, temperamenti, quare ad eadem utilis, & aliquanto forte efficacior.

## CIRCAEA,

## CAP. LXVIII.

Nomina  
Pena in  
Ad.  
Lib. 7. c. 17.  
Forma.



IPKATA & *Supra* Græcis, Circaea & Dircaea Latinis dicitur. Circaea fortasse quadam cum mandragora virium similitudine: nam mandragoras Circaea nominata fuit, & forsan vtriusque ad amatoria vsus, id quod de mandragora Dioscorides scripsit. Circaea, inquit idem, folia habet hortensi folano similia, propagines multas, flores nigros, mul-

### CIRCAEA, Dalech.

Locus.  
Lib. 7. c. 8.

*circaea dicitur a circa  
nereflor. periticia  
inuenitur*



Vera in  
Ad.

### Vires.

Lib. 3. c. 17.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 7.

Lib. 7. sim.

Germanis *Gelenger ioleber*, de quo alio in loco. Circaea radix minarum quatuor potest tusa, inquit Dioscorides, & diem & noctem macerata in vini dulcis heminis sex, & triduum pota verum expurgat. Semen in forbitionibus sumptum lac attrahit. Plinius. Diluitur in vino, bibiturque ad dolorem vulvae, & vultu. Macerari oportet in sextariis tribus quadrantem radice tusa, per noctem & diem. Detrahit eadem potio & secundas. Semen lac minuitur in vino, aut multa aqua potio. Sed in hoc is à Dioscoride dissentit, quod quadrantem radice tusa macerari iubet, Dioscorides quatuor minarum pondus, quod fortasse etiam æquum maius est. Quod verò semen lac minuere dixit, planè contrarium est ei quod Dioscorides habet. *γὰρ καὶ γέννηται*, lac attrahit, hoc est *γὰρ γεννᾷ* ut Paulus ait. Et Galenus ex Dioscoride scribit semen Circaea in forbitione exhibitum ad lactis generationem conducere. Quidam Plinij locum hunc sic legunt, semine lac minuet, vino aut multa aqua pota.

HERBA



HERBA MORA, CAP. LXIX.



**M**ORA plantam istam herbam moram *Forma.* vocant, quæ secus vias nascitur, folio absinthij, tenuiore, nigriore: flore in summis ramis & caulibus exiguo, luteo, copioso, folia trita & imposita ulceribus inueteratis *Vires.* mirificè mederi aiunt.

CHAMAEROPS, CAP. LXX.



**C**HAMAEROPS hæc videtur esse, quæ in *Forma.* siluosis gignitur, radice crassa & multi- *cap. 21. e. singulorum*plici, caulibus multis & cubitalibus, foliis myrti circa caulem geminis: flore *cap. 21. e. singulorum*copioso, & foliorum sinibus nascente, semine in *cap. 21. e. singulorum*oblongis vasculis. Eosdem effectus lateris doloribus habet Chamaerops, inquit Plinius, myrtes circa *Lib. 2. c. 27.*caulem geminis foliis, capitulis Græculæ rosæ ex vino pota.

ANTIRRHINUM, CAP. LXXI.

**A**NTIRRHINUM & Αντίρρινον, Græcis, Theophrasto etiam Αντίρρινον, nisi locus mendosus sit, Latinis similiter Antirrhinum, Cynocephalis Apuleij, Germanis *Orant.* Gallis *Mouron violet*, cuius insignis nota, nempe narium vituli similitudo quam semen refert, fecit ut hæc herba innotuerit. Sed cum aliquot sint plantæ quarum semina aut potius caliculi seu capitula quibus semina includuntur, vitulinam faciem aut quid simile expriment, herbarij diuersa fecerunt antirrhina. Matthiolus scribit se quatuor obseruasse antirrhini genera, quibus omnibus capita nascuntur, quæ semen minus continent, vitulinis admodum similia, quæ non nisi magnitudine differunt: Dodonaus *Lib. 2. c. 27.* duo, vnum maius alterum minus. Et sanè varia est apud veteres antirrhini historia. Theophrastus aparinæ simile facit, Dioscorides anagallidi, quædam eius exēplaria lychnidi, vnde lychnis silvestris nuncupetur, Plinius lino, nisi mendosi sint codices. *Lib. 25. c. 10.* Antirrhinum, inquit Dioscorides, alij anarrhinum, *lib. 4.* quidam lychnida siluestrem vocant. Herba est caule *Forma.* & foliis anagallidi similis, flores sunt purpurei, similes leucoio, minores tamē, ideoque silvestris lychnis nominata est, semen fert vituli naribus simile, rufescum aspectu. Græca enim exemplaria habent *Lib. 7. c. 11.* *ῥόυστον ἰδέν*, quod ab interpretibus omnibus omissum fuit. Est autem *Lib. 25. c. 10.* *ῥόυστον* idem quod rufescum & rufum Latina voce Græcis vsurpata. Sic Paulus anagallidem *ῥόυστον ἄνθος ἔχον* dixit. Plinius, Antirrhinum vocatur siue anarrhinum, *Lib. 25. c. 10.*



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*ANTIRRHINVM*,  
*Math.*

Lib. 9. hist.  
 cap. 12.

Antirrh.  
 mag. Dod.  
 lib. 2. c. 17.

*Forma.*




bina semper ex aduerso vt in Anagallide. Circa summos ramulos flores spectantur longiusculi, & parte anteriore lati oris, ramæ figura, linariæ floribus non multum dissimiles, sed maiores, & pediculos carentes, in pallido lutei, quibus suboriuntur calices longi & rotundi, caput, oculos, nares, denique hiatum oris vitulini expr.

sive lychnis agria, similis lino, radice nulla, flore hyacinthi, semine vituli narium. Ex hoc perunctos venustiores fieri, nec vlllo malo medicamento lædi posse, aut veneno, si quis in brachiali habeat, arbitrantur magi. Similiter ea quam Eupleam vocant, traduntque ea perunctos commendationis esse famæ. Theophrastus, *εὐκλείαν γὰρ φασὶν ἀεὶ ποιεῖν ὁ ἐν ἱππῶνιν χαλκόμενος*. τούτο δὲ ὁμοίον ἐστὶ τῇ ἀπαρῆνι ῥίζα δὲ ἔχει ὕψην. ὁ δὲ καρπὸς ὥσπερ μόχλῃς ῥίνος ἔχει. τὸν δὲ ἀπὸ τέττα ἀλειφόμενον ἐνδοξέειν. Id est, Aiunt Antirrhinum gloriam perpetuo parere, id a parina simile est, radicem non habet: semen vituli narium simile, eo perunctos gloriam consequi. Qui locus à Plinio conuersus est, & corruptus, quoniam mendose Euplea pro Euclea legitur, & *εὐκλείαν* non herbam facit Theophrastus, sed Antirrhinum ad *εὐκλείαν* conducere ait, & eo perunctos *ἐνδοξέειν*, Dioscorides *ἐπιχαριν ποιεῖν*, quod Plinius dixit venustiores fieri. Antirrhinum magnum Dodon. cauliculos fert rectos, rotundos, ramosos, folia nigricantia, longiuscula & latiuscula, à foliis anagallidis non multum distantia.

*ANTIRRHINIMA II.*  
*Math.*



*ANTIRRHINVM III.*  
*Math.*



*mentes*



Matthioli.

ANTIRRHINUM

Mignum, Dodon.



mentes, quibus semen concluditur Est & aliud magnum Antirrhinum, foliis longis & angustis, osyridis ferè similibus, floribus roseis, aliquando candidis, cætera præcedenti simile. Antirrhinum paruum eiusdem, caput simiæ quorundam,

ANTIRRHINUM  
paruum, Dod. siue Orontium.



cauliculos habet tenues, teneros, non ita ramosos: folia longa, angusta: inter hæc & cauliculos flosculi oriuntur rubri, superioris similes, multò tamen minores, deinde capitula rotunda, membranacea, vituli aut simiæ caluariæ prorsus similia, quæ semen continent. Quartum est Antirrhinum Matthioli. Istud Archigenis ὀρόντιον esse multis creditur, cuius meminit Galenus, pharmaca recensens ab Archigene ad ictericos conscripta. Herbam orontium, inquit, coquito, & cum decocto lauato, & decoctum confestim viride reddes. Qui locus Cornario diu suspectus fuit, donec tandem in eam opinionem venerit, orontium herbam nullam aliam esse quàm origanum, & fortasse etiam ὀρύανον pro ὀρόντιον esse legendum. Antirrhinum vtrumque in cultis & incultis nascitur, colitur etiam in hortis. Magnum Iulio & Augusto mensibus, paruum Iulio floret. Narrant id appensum, inquit Dioscorides, veneficiis aduersari. Galenus similis esse cum bubonio facultatis scribit. Auctor est Matthiolus illini Antirrhini folia, flores etiam & semen cum

Antirrhini caput Lini  
paruum, a Lybano.

Dodon. ibid.

Forma.

apoc. e. mors sine  
romani, quæ huius  
montana.

Lib. 9 ph.  
local. ca. 9.

In cõmen.

Locus.

Tempus.

Vires.

Li. 4. c. 128.

Li. 6. simp.

In cap. 128.

lib 4.







LEONTOPODIUM

Loniceri.



rum, foliis angustis, hirsutis, aversa parte canescentibus, iis præsertim quæ circa radicem sunt: capitulis in summo caule quasi foraminibus distinctis, floribus nigricantibus, semine densa, lanugine obuoluto. Ex Baldo monte misit Calzolarius. Idem opinor pinxit Lobellius, nonnihil tamen diuersum videtur, qui paruum Leontopodium adiecit, effigie totoq; habitu superiori simile, singulari dodratali cauliculo, & folio Gnaphalij montani, densa lanugine incauis: flosculis summo caule in luteo pallentibus, Gnaphalij montani, exili ligneaq; radice. Hæc Lobellius.

Vires.

Aiunt hanc ad amatoria philtera commodam esse, inquit Dioscorides. Eam ob causam Cemos Plinij Leontopodium Dioscoridis esse creditur à doctis: sic enim ille. Eadem ex causa & Cemos silebitur nobis. Dixerat autem antea catanancen describi superuacuum esse, quum sit eius vsus ad amatoria tantum. Eadem fortasse de causa neque Galenus, neque posteriores eius meminerunt. Affirmat Marcellus Vergilius vidisse se antiquissimos & optimos Græcorum Codices, in quibus nō Leontopodium, sed Camos

Li. 27. ca. 8.

huius capituli titulus erat. Et habere se vetustissimum Latinum Dioscoridem, in quo pariter non Leontopodium, sed Camos est, eadem vniuersa prorsus historia. Sola in Græcis & Latinis tituli capituli, & plantæ appellationis diuersitas est, magno argumento non

camos.  
καμος, quæ καμος  
a καμος, quæ  
quæ est flosculis eumini  
ne quæ caput quæ  
res. ex philtera hæc  
ita appellatur hæc  
flosculis.

Longobardis literis scriptum

LEONTOPODIUM,

Matthioli,



LEONTOPODIUM

paruum, Lobel.



differre

differt in philtera hæc  
res. ex philtera hæc  
ita appellatur hæc  
flosculis.











febricitantium enematis immiscetur. Cotula foetida vtero prolapsa, aut in alteram partem conuerso mirè succurrit, si eius decocto ægrota pedes lauentur: item vteri præfocationi si aut edenda, aut odoranda præbeatur, in hoc muliebri malo castorij viribus proxima.

CEPÆA,

CAP. LXXIIII.

Nomina

Lib. 3. c. 110.

Forma.

Vires.

*vide Physop. pag. 160.*

Li. 26. ca. 8.


Embl. 14.

lib. 3.

CEPÆA, Matthioli.

Lib. 5. c. 22.

*ΧΗΤΑ hortu  
ΧΗΤΑ hortu*



nera, carnosa, succo pregnantia. Radix exilis. In Belgij viretis luxuriat, Parauio delata. Hæc Lobellius.

ASTRAGALVS,

CAP. LXXV.

Li. 4. ca. 17.

Forma.

Locus.

Vires.

Li. 6. simpl.

**Α**ΣΤΡΑΓΑΛΟΣ Latinè etiā Astragalus: paruus est, inquit Dioscorides, à terra frutex, foliis & ramis ciceri similis: flores sunt purpurei, parui, radix rotunda, raphani modo grandis, propagines habens solidas, nigras, duras veluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in locis ventosis, ymbrosis & niuosis: multa in Phæneo Arcadiæ, (ita legunt Galenus, Paulus, Oribasius, Plinius, vt corrupta sint Dioscoridis exemplaria, in quibus pro ἐν φαινεῷ legitur ἐν μεμριδὶ τῆς ἀρχαίας.) Radix in vino pota aluum sistit, vrinam mouet: facit & ad vetera vlcera, arida inspersa: sanguinem supprimit. Difficile tunditur propter soliditatem. Hæc Dioscorides. Galeno frutex est paruus, radices habens adstrictorias: quamobrem etiam ex numero est non instrenuè desiccantium: vlcera vetera glutinat, aluum fluidam sistit, si quis in vino decoctam radicem bibat. Plurimus huius prouentus est in Phæneo Arcadiæ. Eadem Paulus & Oribasius



& Oribasius habent, Galenum secuti. Plinius aliter quidem describit, sed easdem vires attribuit his verbis. Astragalus folia habet longa, incisuris multis, obliquis circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos: florem hyacinthi, radices villosas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur in petrosis apricis, & iisdem nivalibus, sicut Phæneo Arcadiæ. Vis ei ad spissanda corpora: aluum sistit radix in vino pota, quo fit ut moueat urinam percusso liquore, sicut pleraq; quæ aluum sistunt: sanat & dysentericos in vino rubro tusa. Difficile autem tunditur. Eadem gingivarum suppurationi vtilissima est foris colligitur exitu Autumni, cum folia amiserit. Siccatur in umbra. Pro Astragalo plantam hic appictam Matthiolus olim proposuit, quæ frequens nascitur in agro Tridentino, in vallis

Lib. 26. c. 8.

ASTRAGALVS

Matthioli.



Ananix montibus, folio ciceris maiore, floribus purpureis, radice raphani amula, adnatis appendicibus firmis, nigris, præduris, inter sese implicatis, & gustu adstringentibus. In ultimis verò editionibus planta diligentius inspecta, cum quædam in ea desiderari perspexisset, quæ Astragali sunt propria, sententiam retractauit. Herba ij quidam Astragalum purpureum esse statuunt hic expressum, qui in lura montis saxosis collibus provenit, radice grâdi, crassa, nigra, lignosa, longa, furculosa: caulibus multis, lanuginosis, humi repentibus: foliis ciceris siluestris, in vno pediculo multis ordine collocatis, villosis, gustu adstringentibus: flore ex albo purpurascente, velut in capitulis coaceruato: semine in siliquis. Pena Astragali descriptionem, nisi apud Dioscoridem corrupta foret, videri ait aptissime quadrare ei plantæ quam Germani *Aker*, *Rychel*, & *Grund rychel*, id est, *Balanum terrestrem* vocant, Galli *Gland de terre*, Sequani *Des Tarnotes*. Spargit humi tres quatuorve ramulos in imo rubellos, ciceris aut pisi folio & clauiculis donatos, quibus, si adsint, proximas quasque plantas amplectitur: flores item purpurei pisi sunt, & in siliquis paruis exiguum semen: radices verò oblongæ, oliuarum vel glandium instar, foris nigris, intus albidae, multis quasi traiectæ vel appendæ veluti funiculis, varix inuicem implexis, & latè fuscis. Germaniæ, Angliæ, Normaniæ siluosis opacis iuxta sepes, Narbonæ, Italiæ, cæterisque æstuosis regionibus, non nisi in arduis & niuosis eruitur. Sapor illis subdulcis, glandis, aut castaneæ adstringens. Siccata multum durefcunt. Hanc in libro de Bulbosis pinximus ex Dodonæo Chamæbalani nomine. Primû Dioscoridis descriptionem

In cap. 57. lib. 4.

Astragalus purpur.

Forma.

ASTRAGALVS

Purpureus.



*Astragalus*  
*et talis idem est*  
*culm in fine rivi*  
*huius dec plantæ*  
*notata quod seme*  
*et ratione huius et*  
*duntaxat sic Balan*  
*officiale*



1348 HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
vitiosam esse diximus, quæ in memphi Arcadiæ pro in Phæneo nasci dicitur.  
Deinde Plinius paulum diuersam descriptionem tradit. Adhæc Galenus & Paulus  
scripsere Astragalum paruum esse fruticem *ἔχοντα τὰς ρίζας* adstringentes, quasi  
plures, nec raphani meminere. Quare ubi in Dioscoride habetur *ἡ ἀπὸ τοῦ*  
*ἀπὸ τοῦ πατρὸς*, legendum fortasse *ἀπὸ τοῦ βαλάνου*, id est veluti glans. Clusius plantam  
aliā elegantem & à nemine fortasse ex recentioribus cognitā depinxit, quam  
si facultates non refragarentur, legitimū Astragalum esse cēseter, quod eius descri-  
ptioni plurimis notis conueniat. Cubitales & ampliores sunt illi caules, minimi  
ferè digiti crassitudine, pentagoni siue angulosi, duri, subrubentes, & lanuginosi.  
folia lanuginosa & incana, in longa costa ex aduerso semper inter se opposita, vi  
in vicia & cicere, gustu primū adstringente, deinde feruido: flores copiosi, lu-  
pini aut fabæ, secundum obliquos pediculos ex alarum sinu prodeūtes, ordine di-  
gesti, albi omnino, sed antequam aperiantur: ex luteo foris nigricantes. Fructum  
ferre dicitur in siliquis fælo minori Dodonæi similem, qui gustatus fauces, os, &  
linguam inflammatione torqueat: radix pro stirpis magnitudine amplissima, bra-  
chiali interdum crassitie, palmari longitudine, deinde in duos aut tres ramos scle-

ASTRAGALVS

*Forte, Clusij.*



ASTRAGALVS

*Syriacus, Lobellij.*



findens, foris nigra, rugosa, intus candida, dura & lignosa, ingrato sapore, quare  
facta, cornu duritie superat. Primū eam in collibus quibusdam supra Vlytisponē  
quos Tagus alluit, inter vepres se obseruasse, Clusius ait, deinde frequentiore sit  
uosis locis nō procul Hispali. Lusitani *Alfabeca* vocant, Baëtici *Garauancillos*, quali  
Cicer exiguū dicas. Videtur ea quam Amatus Lusitanus Apocynon facit, & Lu-  
tanis *Atramosos de cani*, hoc est Lupinōs caninos vocari ait. Perelegantē aliam le-  
guminosam plantam Lobellio debemus, quā Astragalis sanē cōgener est. Erenni  
foliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicum proreptantiū Astra-  
galon refert sed florum densō exortu congestorum decore, effigie, elegancia, ma-  
gnitudine & rubore ornatur amœnissimō. Ex Alepo Syriæ hanc plantam primū  
nactus est, postea in Vrceis pensilibus Brancionis ex Italo semine natam vidit.

ASTER

ASTER




QVÆ IN VMBROSIS NASCVNTVR, LIB. XI. 1342  
 ASTER LUTEVS, CAP. LXXVI.



**OCVLVS** Christi dicitur ab herbariis, qui à quibuscūq; lutei asteris ge- *Nomina*  
 nus habetur. In agris pinguibus Monspelici soli prouenit, radice *Forma.*  
 crassa, fibrata: caule sesquipedali, anguloso, ramo so, nigricante: foliis  
 longis, angustis, lapathio hortensi utrumque similibus: flore aureo in  
 squamosis capitulis micante, ramulorum verticem occupantibus, substrata folio-  
 rum nouenūm ferè aut denūm ambientium corona, ut in Astore: quā ob causam

**OCVLVS** Christi.



**BELLIS** Lutea, Dalechamp.



Asterem luteum nuncuparunt. Aliud Asteris lutei genus, pratis, vdisq; locis gau-  
 det. Quorundam sententia hæc est Bellis lutea: alij oculum Christi vo-ant. Radice  
 nititur valde fibrata, nigra: caules multos emittit, cubitales, foliis vestitos paucis,  
 longis, acuminatis, venosis, in ambitu, nec ferratis, nec infectis. Flos caulium verti-  
 cibus insidet aureus, chrysanthemo similis. *Forma.*

**HELIOTROPIVM**, CAP. LXXVII.



**H**TSI multæ sint stirpes quæ Heliotropiæ & Helioscopiæ meritò di- *Nomina*  
 ci possunt, quòd ad Solem semper conuertantur, & cum eo circum-  
 agantur, tamè hîc particulatim de Dioscoridis Heliotropio dicemus, *Lib. 4. c. 186.*  
 quod ut Græcis ἡλιότροπιον, & σκορπίουρον, ita Latinis Heliotropium & *Lib. 7. hist. cap. 14.*  
 Verrucaria nominatur, Gazæ Solaris recentioribus Herba cancri, Gallis *Lib. 4. c. 186.*  
 & l'Herbe au chancre, Germanis *Lib. 7. hist. cap. 14.*  
*Greesterneye*. Heliotropium verò quod, ut Diosco-  
 rides ait, folia vna cum solis inclinatione circumagantur, vel quod auctore Theo-  
 phrasto, solstitio tantum floreat. ὅτι δὲ, inquit, τὰς ἀνθίδας βλέποντες ἀκολουθεῖται  
 τοῖς ἀγχοῖς, οἷον τὸ ἡλιότροπιον καὶ λάρδιον, καὶ ὁ σκόλυμος (ἅμα καὶ τοῖς τροπαῖς καὶ ἔτος) Quæ  
 cum mendosa sint in vulgaris exemplaribus, ex Gazæ conue sione sic emendāda  
 videntur. ὅτι δὲ ἡ ἀνθεῖς, ἢ βλέποντες, ὡς ἀκολουθεῖται τοῖς ἄλλοις. Idest. Quæ verò ita flo-  
 rēt vel germināt, ut alia sequatur, velut Heliotropiū & Carduus, nam id quoq; sol-  
 stitio floreat. Et aliquāto ante Heliotropiū in iis numerat, quæ particulatim & diu



florent his verbis. Τῶτων δὲ ἔνια καὶ μέρος, ὡς περ ἐλχθη καὶ περὶ τῶν ὠκείων. διὸ καὶ πολλὰ  
 χερόν ἀνθεῖ καὶ ὁ ἀπὸ ἄλλὰ τε πολλὰ, καὶ δὲ ἡλιότροπον, καὶ δὲ καχάριον. Id est, Quædam  
 particulatim florent, vt de Ocimo diximus: quare diutius florent sicut alia multa,  
 & Heliotropium & Cichorium. Scorpionon vocarunt à floris effigie: instar caudæ

Genera.

Ibidem.

Li. 22. c. 21.

## HELIOTROPIVM

Maius, Matthioli.

Li. 4. c. 185.

Forma.

Locus.

Heliotro.

minus.

Forma.

Li. 22. c. 21.




## HELIOTROPIVM

Alterum, Matth.



## HELIOTROPIVM

Minus, Matth.



sideris



fideris amor est. Noctu velut desiderio contrahit cæruleum florem. Genera eius duo. Tricoccum & Heliotropium: hoc altius, quamquã vtrũq; semipedalem altitudinem non excedat, ab ima radice ramosum: semen in folliculo melsibus colligitur. Nascitur non nisi in pingui solo, cultoq; maxime, tricoccum ubiq; Et paulo post. Alterum genus quod tricoccum appellauimus, & alio nomine Scorpioron vocatur, foliis non solum minoribus, sed etiam in terram vergentibus. Semen ei est effigie scorpionis caudæ: quare ei nomẽ. Heliotropij magni fasciculus, vt scribit Dioscor. cum aqua coctus ac potus, pituitam & bilem per aluũ ducit. Vtile est & ictis à scorpione cum vino potum & impositum. Ad alligatur ad conceptus arceudos. Tradunt seminis grana quatuor cum vino pota hora vna ante accessione, quartanas finire, tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilesq; & thymos, & epinyctidas exsiccat. Folia podagris & luxatis, & pueris striasi, idest, partium, circa cerebrum & membranas eius inflammatione laborantibus, vtiliter imponuntur. Menses cient, foetus ducunt trita apposita. Minoris verò Heliotropij vires hæ sunt ex eodem. Herba cum semine addito nitro, hyssopo & nasturtio ex aqua pota, latas tineas & teretes expellit. Tollit & pensiles verrucas cum sale illita. Plinius genera confundit, & vni tribuit quod Dioscorides ad alterum refert. Sic enim ille. Si decoquantur, inuenio cibis placere. Et in lacte iucundius aluum molire. Et si decocti succus bibatur, efficacissime exinaniri. Maioris succus excapitur æstate hora sexta: miscetur cum vino, sic firmior. Capitis dolores sedat rosaceo admixto. Verrucas cum sale tollit succus è folio: vnde nostri Verrucariam herbam appellauere, aliis cognominari effectibus digniorem. Et paulo post de tricocco.

Ibidem.  
Vires.

Ibid. c. 186.

Li. 22. c. 21.

**VERRUCARIA** *Alia*  
*Minor.*



Vis ad omnia venenata & phalangia, & cõtra scorpiones præcipuè illita, non feriuntur habentes. Et si terram furculo Heliotropij circumscribat aliquis, negant scorpiones egredi. Imposita verò herba, aut inde omnino respersum protinus mori. Seminis grana quatuor pota quartanis prodesse dicuntur, tria verò tertianis, &c. Galenus Heliotropium in simplicium medicamentorum catalogo præterit. Paulus Heliotropium magnum, inquit, quod & scorpioron vocat, calidam & siccam, & extergentẽ facultatem habet. Deinde cætera ex Dioscoride transcribit. Heliotropiũ aliud minus, siue Verrucaria minor, est quorumdã sententiã quæ hic appicta est. Nascitur in quibusdã pinguibus & humidis locis Mõspeliaci agri, ramulis, folio, flore, fructuque maiori similibus, tametsi minoribus, nisi quod furculorũ supremæ parti, in exiles virgulas attenuatæ, fructus ordine collocatus, insidet. Ad eadẽ valet ad quæ & Myrmecias maior. Clusius Heliotropij maioris genus pinxit, quod *χαμωίη γυλον*, vel *χαμωίη πῆλις* iure dici potest. Heliotropium supinũ ille vocat. Maiori Heliotropio perquam simile est, minus tamen. Etenim ramulos fert graciliores, multis alis concauos, aliquantum lanuginosos, humi stratos: folia maiori cum sapore, tum colore & forma similia, minora tamen, & ocimi foliis proxima: extremi ramuli scorpionis caudæ modo etiam incuruantur, eisque ordine insident, vt in maiore, flosculi candidi, quibus succedit semen, non quadrifariam

Li. 7. simpl.  
Lib. 7.

Forma.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*HELIOTROPIVM Humi sparsum, Clusij.*



duntaxat: radix parua, foris nigricans: hyeme perit, & semine deciduo singulis annis renascitur. In marginibus quorūdam agrorum, præsertim, ubi melopepones feri solent, Salmantica reperitur. Floret sub finem Iulij, & Augusto, quo menſe & interdum Septembri semen perficit. Vt eiusdem cum maiore est temperamētū, ita eidem pollere viribus verisimile est. Idem Clusius Heliotropium minus Tricoccum pictum dedit, quod vnico assurgit caule, pedali, multis ramis brachiato: folia superiori haud similia, sed ad Xanthij nonnihil, solani verò somnitici folia plurimum accedunt, mollia & candicantia: flos exiguus, racematim compactus,

*HELIOTROPIVM*

*Tricoccum, Clusij.*



luteolus, inutilis, quippe qui sine semine perit, vt in quibusdam aliis plantis, quæ non ex floribus semina sua proferunt: ex alarum tamen cauis dependent è longis pediculis, & foliis quasi occultatur sine flore enata: siliquæ triangularæ, vt tithymalorum, sed asperiusculæ, scabrae & nigricantes, in quibus semen cinerei coloris. Hæ siliquæ pannis affricatæ viuaci viridique inficiunt colore, qui mox in ceruleum elegantemque mutetur colorem: radix inutilis & minime viuax. Salmanticenci agro frequentissimam esse hanc plantam ait Clusius, multisque aliis Hispaniæ locis. Nascitur & copiose in Narbonensi Gallia. Iulio & Augusto floret: deinde semē ad maturitatē perducit. Hoc Plinij Heliotropion Tricoccū Galli vernacula lingua *Tournesol* appellant, heliotropiis proculdubio adnumerandū, tametsi à Dioscor. videtur præteritū, inquit Pena, aut minoris heliotropij descriptione cōprehensum, vt diximus. Semina eius Tricocca capsula tithymali aut chamaelææ proxima includuntur, sed scabra, et viridi nigricatē, affricatq; panis aut chartis, virorē viuacē impartiantur, qui mox in ceruleū hilarē & purpureū mutatur: quæ magno quaestū colligunt rustici Lunellæ, Malsiliargues, alijsq; Narbonæ tractibus, in oliuetis, ubi plurima maturoq; sunt septēbri, quæ vendūt insectoribus. Romani agri vinetis etiā familiaria, Belgis, Frācis, Germanis, Anglis in hortis coluntur. Pānolæ lacinie quæ in Officinis nomine *Tournesol* veneunt, ad gelatinas aliq; medicamentā coloranda, pereleganti purpura huius succo vinōque remisto creduntur imbutæ.

SCORP



SCORPIOIDES, CAP. LXXVIII.

**S**ICUT Scorpioides Græcis, ita Scorpioides Latinis dicitur, Plinio Scorpius. Herbula est, inquit Dioscorides, folia habens pauca, semina caudæ scorpionum similia. Ita Plinius. Ex argumento nomen accepit Scorpius herba: semen enim habet ad similitudinē caudæ scorpionis, folia pauca. Quæ brevis apud veteres delineatio fecit, ut aliam atque aliam

*Nomina*

Lib. 22. c. 15

lib. 4. c. 18.

*Forma*

Lib. 22. c. 15.

SCORPIOIDES, Dodonæi.



SCORPIOIDES, Matth.



herbam pro Scorpioide herbarij exhibeant. Dodonæi Scorpioides herbula hæc est humilis, palmi altitudinem non excedens, cauliculis tenuibus, in quibus quina senave folia angusta: flosculi lutei: semina aspera & hirsuta, terna quaternave coherentia, nodis distincta, & inflexa instar caudæ scorpionis. Lobellius Scorpioides repens bupleuri folio vocat. Matthiolus Scorpioides aliud depinxit, quod si liquata fert cornicula, scorpionis caudæ instar reflexa, & articulis distincta: docti quidam telephij genus esse non sine magna ratione suspicantur: est enim folio portulacæ, flore luteo, gustu & facultatibus non multum diuersis. Monspeliensibus cum satis tum viretis Lattenis portæ admodum familiare, non est colutea Scorpioides de qua diximus. Scorpioides, inquit Dioscorides, impositum ictis à scorpione summopere auxiliatur, Plinius. Scorpius valet & aduersus animal nominis sui. Galenus verò exalfacere ordine tertio, deficcare secundo scribit.

Lib. 1. c. 42.

In cap. 187

lib. 4.

Ibidem.

*Vires.*

Lib. 22. c. 15.

Lib. 8. sim.

TRIPHYLLVM,

CAP. LXXIX.

**T**RIPHYLLIS quibusdam in Agro diximus, nunc de aliis quæ vdis locis gaudent, primum de eo quod τριφυλλον ἐν χορδοκοπείοις γέννηται, λεγόν dicitur, Latine Trifolium pratense, Gallicè *Trefle des pres* & *Triolet*, Germanice *Vuyssenkler*. Caulem gerit rotundum, tenerum, ramulos exiles, folia quadantenus rotunda, terna semper in vno pediculo, flores in summo ferè purpureos, velut in breuem spicam coagmentatos, deinde semen rotundum in parvulis siliquis, radicem longam & fibratam. Trifolium pratense alterum, super-

*Nomina*

*Forma.*

Trif. prat.

alterum,

*Forma.*



Locus.

Vires.

Fuch. cap.  
315. hist.

riori proximum est, nisi quod cauliculos paulò asperiores & hirsutiores habet, folia longiora & angustiora, in quorum medio nonnumquam macula alba apparet, cre-  
scentis lunæ figura: flores candidos, cætera superiori similes. Scatent iis prata fere  
omnia. Maio & Iunio mensibus florent. Adstrictoriæ cuiusdam qualitatis sensum

TRIFOLIUM Pratense,  
I. Matth.



TRIFOLIUM Pratense  
alterum, Matth.



TRIFOLIUM Luteum mini-  
mum Pena, & Lobellij.



Forma.

in gustu præ se ferunt, non tamen multum ad-  
modum, ut nihilominus sint tenuium partium  
& exsiccatoria, quâdoquidè etiam exigua quali  
acrimonia prædita videantur. Quare haud du-  
bie mediocriter concoquendi & exsiccati vim  
habent, ut non temerè quidam ex recentiori-  
bus herbariis tradant trifolia hæc albo mulie-  
rum profluio mirificè conferre. Eadem etiam  
inflammationibus imposita, eas cōcoquunt, &  
ad maturationem perducunt. Est Trifolium lu-  
teum omnium minimum, & non ita ubiq; ob-  
uium, inquit Pena, gracilibus pusillis, cauliculis  
reptantibus, iuncis folio terno, aliquatū cre-  
nato, luteolis floribus in orbem compactis. In  
pratis & cultis reperitur. Antuerpiano agro fre-  
quentissimum esse ait Lobellius. Est trifolium  
adnumeranda planta, quæ à vulgaribus herba-  
riis panis cuculi vocatur, vel quod cuculus vo-  
ca velcatur, vel quia hac erumpere, cuculus vo-  
cem suam edere incipiat, & Alleluya, in Offici-  
nis Trifolium acetosum ab acido sapore, à Plin-  
nio Oxys eandem ob causam, Gallicè Pain de  
Cocu, Germanicè Sauerkleer. Cauliculos siue por-  
tios



TRIFOLIUM Pratense  
luteum, Fuchsj.

TRIFOLIUM,  
Acetosum.



tius longos pediculos ab radice fundit per multos, quorum singuli in summitate  
terna folia sustinent perinde atque Trifolium, cordis figura, & in pediculū fungi  
modo plerūque reflexa, mollia, acido gustu. Flores edic albicantes, in quin-  
que diuisos apices, stellæ figura, qui peculiare pediculos habent ex eadem radice  
enatos, singuliq; singulos flores sustinent. Radicem habet subrusam, veluti squa-  
mis contextam, quæ nucamenti speciem referunt. Opacis locis maximè proue-  
nit, & in siluis. Aprili & Maio mensibus floret. Obseruasse autem sese scribit  
Fuchsius, atque adeo multorum experientia cognitum, quod eius herba copiosi  
flores crebras illius anni pluias, & aquarum inundationes certo portendunt,  
pauci contra siccitatem. Tota planta auctore Matthiolo, refrigerat oxalidis  
modo. Quare deuorata, sitim & ventriculi ardore extinguit, iecur refrigerat  
& cor corroborat. Stillaritia huius aqua datur vtiliter potanda acuta febre labo-  
rantibus, sed multò magis præstat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se

Locus.

In cap. 106.

lib. 3.

Viret

Temper.

Oxys est acetum

hinc oxys quæ

acetum

Lib. 27. cap.

Lib. 2. stirp.

Hilpa. cap.

89.

OXY LUTEA CORNICVLATA

Repens, Oxys lutea, Clusj.



erysipelatis & infla-  
matis locis: osque eo  
colluitur, cū lingua,  
palatum, faucēque  
calida fluxione labo-  
rant. De ea hæc Pli-  
nius. Oxys folia ter-  
na habet. Datur ad  
stomachum dissolu-  
tum. Edunt & qui  
euterocelen habent.  
Diuersum ab his Tri-  
folium pratense pro-  
tulit Clusius, quod  
non



# HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM, TRIFOLIUM PRATENSE

*Salamanticum, Clusij.*



prodeunt, sustinentes capitula flosculorum elegantissima purpura rubentium, quibus succedunt membranei folliculi, & in his semen exiguum, subrotundum; radix vti vulgaris trifolij. Tota ætate floret. Hispani *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol* quemadmodum alia omnia Trifolij genera vocant. Oxys alia à superiore & eius veluti genus allusio ostenditur, ramulis dodrantalibus, interdum longioribus gracilibus, rotundis, rubentibus, per terram repentibus, & ad singula internodia pedes proferentibus, novosque inde surculos & ramulos: folia illi Oxys vulgaris terna in singulis petiolis, sed minora & pallidius virentia, sapore acido, quæ sub vesperam aut imminente imbre complicantur, & veluti umbonem quandam faciunt: flores in oblongis petiolis terni aut quaterni simul nascuntur, quinque foliolis stellatim decussatis conspicui, vulgari minores, lutei: oblongiora deinde mucronataque capitula, semine exiguo, rufo plena: radix tenuis & capillata. Umbrosi quibusdam circa Hispalim locis nascitur, atque etiam Monspelij, Hec Clusius.

## BETONICA AQUATICA, CAP. LXXX.

Nomina

Forma.

Locus.



**B**ETONICA Aquatica Septentrionalium, quibusdam Clymenum Dioscoridis, Scrophularia secunda Dodonæi lib. 1. Hist. stirp. non prædicta quidem sed descripta Terebintharia Dilij à Terebinthinæ dote similis Ocimastrum alterum Tragi, Belgis *Breck scuyt cruyt*, & *S. Antonij cruyt*, id est, S. Antonij Herba, Anglis *Water Betony*. Caulem edit quadratum, fuscum, bicubitalem, geniculatum, cauum, rectum & crassum, folia ex viridi nigricantia, ambitu, figura & crenis Betonicæ, aut Scrophulariæ, sed maiora: albis nonnullis in summo, floribus nigricantibus purpureis, pusillis cassides emulancibus: seminibus pusillis in lagenulis pusillis Blattariæ, aut digitalis purpureæ: radice fusca, multum fibrosa & Amat, quemadmodum Betonica, umbrosa & frigida, sed magis humida, ut margines foliorum qui hac scatent in Nortmannia & Anglia. Hanc summopere celebravit Vigonus Chirurgus.



gus: miscetur enim vtiliter medicamentis vulnerariis & rypicis ad sordida vlcera detergenda, & propter insignes dotes quidam Clymenum esse putauerunt. *Vires.*

SERRATVLA, CAP. LXXXI.



ST & alia à Beronica quæ Serratula dicitur, à foliis minutim serratis. Caule constat purpurascēte, tenui, & in multos ramulos diuiso:

*Nomina*

*Forma.*

folia habet antequam in caulem euadat, betonica similia, toto ambitu tenuiter ferrata, sed cum caulem protulit, faciem immutantia: nam exortis multo profundioribus incisuris, maioris Phu similia fiunt: quæ verò in caule sunt, multò minora & breuiora visuntur: flores in ramulorum summitatibus, ex squantosis capitulis purpurei. In siluosis Bohemiæ & pratis nasci scripsit Matthiolus. Pena etiam in nemorosis & decliuis Pedemontis & Septentrionalium Nortmanniæ & Angliæ. Ad vulnera & enterocelas commendatur.

*Locus.*

*Vires.*

CLYMENV M MINVS, CAP. LXXXII.

CLYMENV Minus,  
*Dalechampi.*



LYMENV minus ab Herbariis dicitur planta hæc, quæ in humidis, riguis & opacis gignitur, radice geniculata, modicè crassa, in plures fibras diuisa, caulibus tribus aut quatuor, pede altioribus, quadrangulis, foliis Clymeni maioris, angustioribus, venosis, grauitèr olentibus, austeri saporis: flore in pallido purpurascēte, superne spicato, betonica modo, infra cacumen foliis binis, velut aliis vtrinq̃e erumpentibus.

ALOPECVRVS MONTANA, CAP. LXXXIII.



ANC plantam, Alopecurum montanum vocant herbarij, à fructus villosi quadam similitudine: cum eius animalis cauda. *cauda vulgi* Nascitur in altorum montium opacis cōuallibus, arborum frequentia vmbrosis, & illapsu aquarum vdis: radice nigra, tuberosa, fibrata: caulibus multis, cubitalibus, rotundis, ima parte vestitis, corticis quibusdam extantibus, veluti laciniis, partim viren



CHRYSANTHEMUM  
Latifolium, Dodonæi.

uid p. 4. p. 5. p. 6.  
520.  
alvopius ai ankeny  
ga Alisma ai ankeny  
toller.

tim virentibus, partim è nigro rufis densius congestis, definentibus in cuspidem: foliis betonica, rotundioribus, breuioribus, latioribus, venosis, qua medius neruus protenditur, nigris, ad extremam oram marginè valde crenatis, magnis intervallis per caules prodeuntibus, geminis, et aduerso positis: in caulium vertice ex geminorum foliorum tanquam ala caput exoritur, oblongum, metæ figura, innumeris villis hispidis, densissimè stipatis, candidatibus, eleganti processus huius congeriei figura, emicanti omni et parte illa pilorum casaria: quorum situs, ordo, & densitas, utcumque Vulpinæ caudæ speciem æmulatur, vnde nomen impositum est: qua facultate prædita sit, & ad quas ægritudines valeat, nobis compertum nondum est.

CHRYSANTHEMUM Latifolium,  
CAP. LXXXIII.

**A**TIFOLIUM Chrysanthemum mon à radice folia promit oblonga, la virentia, superiore parte aliquat lum aspera, inferiore verò leuio dilutiùque colorata, inter quæ scapi exeunt: nives, cubitales, aliquantulum hirsuti, duobus aut tribus geniculis articulati, à quorum singulis bina contra se posita folia, atque subinde pediculi exeunt, in quorum fastigiis ampli orbiculati flores, Bupthalmi aut Chrysanthemum multi, sed maiores coloratiorelq; & medio disco, & circumambiētibus foliolis, luteo resplendentes colore, quorum medius discus rariorem in pappos vanescens, oblonga, tenuia, nigricantiaq; semina mittit, radix fibrosa est. In Germania incultis ac syluosis locis frequenter reperitur. Iunio mense in hortis Belgij cum flore conspicui potest: sequenti mense semen cum pappo à vento rapitur. Germanis *Uvaldiblum* dicunt. Sunt qui Alisma Dioscoridis esse velint. Sed vix Plantaginis similia sunt folia, & caulis? Alimatisiquidem, quod Damafonium etiam dicunt. Plantaginis similia sunt folia, & caulis thymosimilis, quæ huic nō adsunt. Chrysanthemum idcirco Latifolium citius appellandum, quam temerè Alismatis nomen ei tribuendum.

HISTO





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DVODECIMVS,

(663)

*In quo omnes plantæ, quæ ad Mare & in ipso Mari  
nascuntur, ad viuum depinguntur.*

## PLANTAGO MARITIMA, CAP. I.



PLANTAGO Maritima.



E PLANTARVM quæ in aquis ipsis proueniunt, ac earum quæ locis aquosis, & sui natura, aut quauis alia de causâ vdis ac vliginosis gaudent, historia, satis multa fortasse dixerimus, si ad illas de quibus iam tractauimus, has quæ ad mare, vel in ipso etiam mari nascuntur adiunxerimus, ab iis more nostro exordientes, quæ frequentius illic sunt obuiæ, atque eam ob causam multis notiores. Maritimas verò plantas omnes nobis cognitæ breui hac tractatione non complectimur, quòd harum quædam aut consecutionis

ordine, aut tanta affinitate aliis minimè maritimis ita coniunctæ sunt, vt ab iis disungi minimè possint, vt cum cathartidis non possumus non empetron, alypon, scammonium, peplium recensere. Inter olera cum brassicis hortensibus & siluestri, brassica, atriplex, portulaca, marinæ sedem occuparunt: umbelliferis crithmum, bulbosis pseudomoly, spinosis, Tragus Matthioli, hippophaes, hippophaestum, eryngium sese sociarunt. De plantagine marina primùm dicam, quæ Græcis Ἀρνόλωσον θαλάσσιον, Gallis *Plantain de mer* nominari potest. Radice est crassiuscula, fibrata, ex qua folia crebra, longa, angusta, spissa proueniunt, porraceis tum colore, tum consistentia similia: cauliculi palmum alti à medio sui floribus & semine spicatis, plantagini vulgarissimæ notionis simillima. Litoris Narbonæ, Angliæ, Zelandiæ frequens.

### Nomina

Dodo. lib.  
I. cap. 61.  
Per. Pen. in  
Adu.

### Forma.

### Locus.

ZZz



Forma.

Leuc.mar.  
minus.

Forma.



LEVCOIVM maritimum maius, in  
litoribus mediterraneis Narbonē  
sis prouincia frequens, folia lon-  
ga, angusta, humi spargit, ad cicho-  
rij vel erucæ modum diuisa, crassa, albida, paria  
hortensis, sed magis lanuginosa, & gustu acio-  
ra, florem puniceum edit leucoiis similem, semē  
minutum in siliquis. Iisdem in locis Leucoium  
multò minus provenit, radice parua, breui, cā-  
dida, foliis multis humi procumbentibus, Leu-  
coio purpureo similibus, minoribus, angustio-  
ribus: caule humilis, flore puniceo: semine paruo  
in siliquis. Niuea lanugine tota planta operta  
est, vehemētiore acrimonia linguam vellican-  
te. Est Hesperis Theophrasti quibusdam. Aliud  
Leucoium marinum latifolium protulit Lobel-  
lius, non ita diuersis foliis, sed latioribus, rigi-  
dioribus, hirsutioribus, flores exæruleo purpu-  
rascent in palmaribus & sesquipalmaribus cat-  
liculis. Semen in siliquis minoribus multo  
Leucoij lutei.

LEVCOIVM Mariti-  
mum, minus.LEVCOIVM Marinum alterum  
latifolium, Lobellij.

CISTVS



## CISTVS MARINVS,

## CAP. III.



LYCHNIS Marina  
Anglica, Pena.



FLORIS specie dicitur Cistus frutex hic, in maritimis proueniens, cubitalis, nonnumquam altior, densis, numerosisque radicibus, caulibus multis, furculosis, cortice ex rufo rubente, foliis longis, in ambitu lacinatis, acuminatis, superne obscurius virentibus, inferne candicantibus, & parum lanuginosis, flore Cisti, rosæve siluestris, albo, vel ex albo purpurascete.

LYCHNIS MARINA,  
CAP. IIII.



LYCHNIDEM marinam Anglicam pictam dedit Pena, in aggeribus maritimis Vectis insulæ Angliæ, totoque illo tractu frequentem. Herbula est ab ima radice multis foliis cincta, crassis, minoribus & angustioribus quam portulacæ marinæ, caules creberrimi, flexiles, humi fusi, cubitales & sesquicubitales, in quorum summo caliculus albus ocimastri aut Lychnidis est, cui herent flosculi candidi, perquam elegantes, ocimastri non dissimiles, apiculis intus nigris. Semen in folliculis fuscum, Lychnidis aut ocimastri. Salso est gustu non tamen insuauis, esu tenera, non nisi inter silices & brallicas marinas qua ferme vendæ alluant, nascitur. Floret mense Iunio, Iulio, Augusto & Septembri.

ANDROSACES, CAP. V.



ATINIS Androsaces ut Græcis *Nomen.* ἀνδρόσακες dicitur, forte, ut putare quis possit ἰδρόσακες, ab vrina & *Libe Phryg. sag. 261.* hydropicorum aquis educendis. *Idem ager* Herba est, inquit Dioscorides, alba (legendum in Dioscoride ἀλκή pro λεπτῇ, Oribasio & Plinio auctoribus) tenui ramulo, amara, sine foliis, folliculum in capite habens, quo semen continetur. Nascitur in Syria in maritimis locis. Plinius accuratius hanc historiam quam quamuis aliam ex Dioscoride, vel alio herbario exscripsisse videtur, his verbis. Androsaces herba est alba, amara, sine foliis, folliculos in cirris habens, & in his semen. Nascitur in maritimis Syriæ maximè. Verum Androsaces Pisis à doctissimo Ghino ad se missum Matthiolus in commentariis depinxit. Ghino doctissimi herbarij assentiuntur. Sed in illis commentariis quadruplo maior

*Libe Phryg. sag. 261.*

*Idem ager*

*Lib. 3. c. 133.*

*Forma.*

*Lib. 11.*

*Lib. 27.*

*c. p. 4.*

*Lib. 27. c. 4.*

*In cap. 133.*

*lib. 3.*

*Pet. Pen. in*

*Adu.*



quam viua planta sit, depicta est, per pusilla etenim & perelegans est planta, umbilicata, è fundo in ipsa aqua, ideo à Dioscoride proximè nymphæas descripta, non in aëre crescens & viuens, sapius chamae conchæ quæ humi obuoluta sit, dorso striato innascens, pediculis, cirrisve glabris, nitidis, exilibus, crebris, rectis, binos pollicis altis, singulis singulos clypeolos medio cætro sustinentibus, circinatum umbilicum vrachis appensis referentibus: quam ob causam Monspelienses umbilicum marinum nominarunt. Viret primum & in aqua exsqualido cinereoque postea eiectione vndis, & litore exceptum, albescit, gustu subsalfo, & amaro. In illis umbilicis quos θαλάσσια vocat Dioscorides, Plinius folliculos, semen vix vnquā reperias, qui

## ANDROSACES.

Forma.



cum petiolorū siue simpliciu & sine villo capitulo summitati inhæreant, videtur Plinius legisse in Dioscoride, vel in eo auctore ex quo vterque transcripsit, θαλάσσια non ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, sed ἐν τῇ κεφαλῇ, id est, folliculum pro capitulo. Vim habet hæc herba, inquit Dioscorides, duarum drachmarum pondere in vino pota, vrinas multas in hydropicis educat, sed & herba decoctum & semen potum

## ANDROSACES Alterum, Matthioli.

Lib. 3. c. 133.

Lib. 6. sim.



idem facit ( legitur tamen in vetere codice, καὶ τὸ ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς πόας, καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ μὲν ὁνὲς πινόμενος, τὸ αὐτὸ ποιεῖ. Id est, ipsius etiam herba decoctum, semenque abunde potum cum, vino eundem effectum præstat. Imponitur etiam vtiliter podagricis. Eadem planè Plinius habet. Datur hydropicis drachmis duabus tusa, aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino: vehementer enim vrinas educit. Datur & podagricis, illiniturque. Idem effectus est & feminis. Galenus, Androsaces, inquit, humida & acris est herba, potest autem siccata & pota tum ipsa tum semine eius vrinas abunde de corpore, & discutere, ac siccare. Sed Paulus & Oribasius pro voce ὑγρὰ, id est, humida, habent πικρὰ, id est, amara, quo modo etiam Dioscor. & Plinius describere, re ipsa etiam comprobante, est enim plantula siccior aqua & tactu quàm calidior, & multum diu ellevit in Galeno πικρὰ quoque legendum intellegatur & non ὑγρὰ, nisi ὑγρὰν recentem intel-

ligat, eamque τῇ ξηρανθείσῃ, id est, siccata opponat. Matthiolus in iisdem commentariis aliam plantam à superiore longè diuersam à Cortuso missam pro Androsace altero exhibuit, quæ minimè androsaces, sed morsus gallinæ, vel alfinæ potius species est, non ex Syria, sed ex vetere quadam macerie decerpta.

CNEORVM



## CNEORVM,

## CAP. VI.

**C**NEORVM de multis dici plantis testis est Plinius, qui thymelæam Cneorum à quibusdam appellari scripsit. Et alio in loco Cneorium casiam ab Hygino vocari, & mox, Cneori duo genera sunt, inquit, nigri atque candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni. Quæ ex Theophrasto trāsata sunt, de Cneoro à thymelæa longè diuerso hæc scribete. *Νύο ὃ ἐῖδον ἔτ' ἀνέώρα, ὃ μὲν γὰρ λευκός, ὃ δὲ μέλας, ἔχ' ἑὶ δὲ ὃ μὲν λευκός, ὃ δὲ φύλλον λευκωδές, τρώμικες, ὁμοόσχημον ὅσον τινὰ τῆ ἐλαίας, ὃ δὲ μέλας οἶον ἢ μυρῖν, σαρκώδες. ἐπὶ γένος ὃ μάλλον ὁ λευκός, ἔτι δὲ ὁ σμῶδης, ὃ δὲ μέλας εὐοσμύς. τὴν ὃ ρίζαν τὴν εἰς βάθος ἀμφω μεγάλην ἔχουσι, καὶ ἀκρέμονας πολλὰς ἔπαχ' εἰς, καὶ ἑυλωδῆς ἀπὸ αὐτῆς τῆς γῆς ἢ μικρὸν ἀνω χιζομένους. ἑυλωδῆς ἄτην ὃ γλιχρον ὃ σφόδρα, διὸ ἔχοντα πρὸς ὃ χεῖρα δέν, καὶ παραμυβάνειν, ὥσπερ τῷ οἴσῳ βλαστάνει δὲ καὶ ἀντὶ μετ' ἰσημερίαν μέστωρ ὡν, καὶ ἀνθῆ πολὺ χροῖον.* Quæ sic cōuertit Gaza, Cneoron casia interpretatus. Casia quoq; duo genera: alia enim cādida, alia nigra. Candidæ folium modo cutis oblongum, figura quodāmodo oleagineo simile: nigra, quale tamarici, carnosum. Cādida magis se humi spargit, odoratq; est: nigra odore caret. Radix ambabus quæ altè descendit, grādis, ramique permulti, crassi, furculosiq; ab ipsa protinus Tellure aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant, quamobrem hisce ad colligandum iunci modo vtuntur. Germinant florētque post æquinoctium autumni, & multum denique temporis florent. Quæ sic emendatiùs legi possunt. Cneori genera duo. Vnum album, alterum nigrum. Albo folium est cutaceum, oblongum, figura oleæ quodāmodo simile, nigro quale tamaricis, carnosum. Album supra terrā minùs se attollit, & parum quid olet, nigrum valde odoratum est (vt legatur, ὃ δὲ μέλας εὐοσμύς, nō vt legit Gaza εὐοσμύς) radix vtriùsque in profundum descendit magna: rami multi, breues & lignosi, qui à terra vel paulò supra diuiduntur, lenti admodū (nam Græcè legendum βραχεῖς καὶ ἑυλωδῆς, ἀπὸ αὐτῆς τῆς γῆς, ἢ μικρὸν ἀνω χιζομένους, γλιχρους σφόδρα, &c. voce ἑυλωδῆς ἄτην expuncta, quam etiam omisit Gaza) Quam ob causam hisce ad colligandum & comprehendendum (προσλαμβάνειν, non παραμυβάνειν, vt in vulgatis legitur) vtuntur vitilium modo ὥσπερ τῷ οἴσῳ, non τῷ χροῖον. Germinant florētq; post æquinoctium autumnale, multòque tempore florent. Hæc à Theophrasto tradita Cneori albi delineatio plāta hīc appictæ quadrat, quo rumdam herbariorum sententia. Locis lapidiosis & saxosis maritimis prouenit, radice grandi in profundū subeunte, folio argenteo, cutis modo crasso, oblongo, angusto, oleæ simili, interdum longiore. In ramos multos, breues, lignosos statim ab ipsa terra diuiditur, eosq; valde flexiles, quamobrem ad ligandum & necēdum iis vti licet, amerinæ modo. Germinat & floret post æquinoctiū autumnale, florīq; prouentū in multos dies prorogat, flos autem in summo ramorū vertice velut in corymbos acruatus emicat, semen nigrū, crassum, in folliculo tāquam gluma reconditū. Matthiolus plantam aliam se obseruasse ait in Bohemiæ siluis, cuius iconem hīc expressimus,

CNEORVM Album,  
Dalechampi.



Nomin.

Lib. 13. c. 1.

Lib. 1. c. 9.

Lib. 6. hist.

cap. 2. 7.

κνεῖον, κινδὸς ὡρ  
tempus et pēgna  
in plāta tempus  
florēt hīc κνεῖον  
quæ casia florēt  
diuidit in sup. loc  
nimia in. meale  
et autumnale utroq;  
n. æquinoctio flae

Locus.

Forma.



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

CNEORVM Album,  
Matthioli.



CNEORVM Nigrum,  
Myconi,



Cneorum  
nigrum.

Nomina

Lib. 24. c. 11.

Lib. 1. c. 89.

restris genus depictū à Trago, cuius alibi meminimus. Lib. quē in Vmbros. cap. 80. & lib. quē in Asperis cap. 71. Frācisus Myconus plantam aliam Pala marina vulgo dictam, à Barcinonensibus ad nos misit pro Cneoro nigro depictam, vt videris, & descriptam his ferē verbis. Frutex est duorum cubitorum altitudine cum multum adoleuit.

quæ omnibus notis Cneorum candidū referat, quia cutaneum illi folium est, oblongum, rami flexiles, lenti, furculosi, ab ipsa protinus terra aut paulò superius emergentes, & per humina sese diffundentes: flores in furculorū cacuminibus purpurei, odorati testiculi odore: radix altè descendens, non tenuis. Sed vere floret. Franciscus Myconus medicus Barcinonensis, rei herbarie studiosissimus, istud Matthioli Cneorum albū fruticem esse ait, quem in Pyrenæis montibus frequētem obseruauit, ab incolis Gauechs nuncupatum, notis omnibus Matthiolus non meminit ei adstipulantibus, dempto fructu, qui in hoc frutice rubet, cuius Cneorū tamen esse non arbitrat, sed Auicennæ alteram oleandri speciem, quam siluestrem vocat. Siluestris, inquit, folia sunt sicut folia portulacæ (vel alcannæ vt Bellunensis) sed sunt strictiora, & eius thyrri sunt longi, expansi super terram, & apud folia sunt spinæ, & nascitur in domibus desertis. Hæc Auicenna. Quæ si quis, inquit Myconus, cum Matthioli Cneoro modo descripto cōferat, oleandrum siluestrem Auicennæ esse comperiet. Præterea nascitur in desertis locis, & summis montium iugis, foliis myrti maioris, acutis, quæ non multum à foliis portulacæ vel alcannæ distant, item per terram frequēter serpit, aut non multum attollitur. Ad hæc flore, forma, colore, odore ad oleandrum vulgarem accedit. Est verò id notatū dignū, quod obseruauit Myconus à multis animatibus, fruticem hunc attingi aut arredi. Et cum mille huiusmodi plantas foliis & herbis onustas viderit, nullam vnquam reperire potuisse asserit, in qua præcisum aut arrosū aliquid fuisset. Sed nigrū Cneorū multo est ignotius. Quidam id non sine probabili coniectura herbam eam esse suspicatur, quæ herbariis præsertim Monspelienisibus Cāphorata maior nominatur, quod radice magna altè descendit, vt à terra prodiit, statim in ramos finditur, viciū modo lentos, folio est carnosio, tamarici simili, validum spirat odorem, qualis ferè est caphura, vnde & Caphurata nomen. Quæ omnia in Cneoro nigro Theophrastus adnotauit. Alij selaginem Plinij esse volunt, alij ericæ prius generis, alij hyssopum nemorensem, alij musci ter-



adoleuit, caule rotundo, flexili, aliquantum aspero, & fere nodoso, qualis in Aizoo foliis detractis cernitur, ramulis multis similiter nodosis brachiato, in quibus folia minuta, perpetuò virentia, quæ quò fruticis summitati propiora, eo minora conspiciuntur, ut quæ in summitate sunt cupressi foliis similia sint, paulò tamen latiora: omnia nonnihil crassa sunt, carnosà, incana, caulem complectentia. Flores in viridi luteæ: radices crassæ, digitales, lignosæ, albo cortice vestitæ, satis in terram descendentes. Totus frutex & maximè cortex manu tritus, grauis est odoris: sed vigente canicula folia, si confricentur, zibeti odorem quadamtenus spirant. Barcinone nascitur locis arenosis, & maritimis, aut non multum à mari distantibus. Floret Autumno, & floris prouentum ad Maium vsque producit, foliis aliis deciduentibus, aliis renascentibus. Foliorum sapor cum lentore subadstringit. Forti huius herbæ hamorrhoidum inflammationem sedari asserunt: quod & suffitu

Li. 24. ca. 11.

CNEORVM Aliud Theophrasti, Matthioli.



præstatur. Hanc plantam Cneori descriptioni à Theophrasto tradita optimè quadrare putat Myconus. Ea esse videtur quam libro de cathartici nomine Selamoidis minoris depinximus. Clusius Sanam vndam secundam fecit. Anguillara Lauandulam vulgò vocatam Cneorum album esse arbitratur: nigrum verò rosmarinum coronarium à Theophrasto nunquam memoratas plantas, quamuis tota Ieloponneso & Hellade, utraq; copiosa gignatur. Eius opinionem pluribus refellit Matthiolus, quod Cneorum vtrumque floret post æquinoctium Autumni, rosmarinum bis anno, nempe post æquinoctium vernum, & ante æquinoctium Autumni. Lauandula æstate tantum. Præterea vtriq; Cneoro Theophrasti radix est grandis, altè descendens, Lauandula & rosmarino minimè, cum per summa ferè cespitum mediocres radices fundant, & ob id frigoris impatientes plantæ. Ad hæc vtriusque Cneori rami lenti flexilesque sunt, & ad ligandum apti, cuiusmodi non sunt lauandulæ, nec rosmarini. Idem Matthiolus in postrema commentariorum Latinorum editione

In comen-  
tariis. lib. 24.In cap. 16.  
lib. 4.

scribit, Cneorum Theophrasti Roma ad se missum nullis deficientibus notis: sed eas nec describit, nec addit sit ne candidum, an nigrum Theophrasti Cneorum, quod hæc expressimus.



*Locus.*

Forma.



Nomina

Lib. 4. c. 49.

Forma.

Na taverney esse  
 videtur amoris ille:  
 ceoia denique eria  
 ab avayney necessi  
 tas hinc avaynea  
 sed ergo ei compello  
 ty: xatavay <sup>Locus.</sup> ~~na~~ <sup>ty</sup> ~~ty~~  
 hinc perbas eiord.  
 minis quia Li. 4. c. 129.  
 d amoris illecebras  
 faciat.

CATANANCE, Dodon.




Li.27.ca.8.

nancem Thessaliam herbam qualis sit, à uobis describi superuacuum est, quum sit  
eius vsus ad amatoria tantum. Illud non abs re est dixisse, ad detegendas magicas  
vanitates, electam ad hunc vsum coniectura, quoniam arefcens contraheret se ad  
speciem vnguium milui exanimati.

TR/BV



 **N** MARITIMIS crescit hoc Co-  
nyzæ genus, quod à foliorū lon-  
gitudine macrophyllū cognomi-  
narunt, radice sicca durāque, cau-  
le dodrantali, surculoso, foliis in eo multis, lon-  
gis instar plantaginis angustifoliæ, aut etiam  
angustioribus, gustu farcis simul & nonni-  
hil amaris: flore luteo in luteis corymbis, sur-  
culorum vertici insidentibus, qui in pappos  
tandem abit.

CATANANCE, DODON.  
CAP. VIII.

**K**ATANAKKH Græcorum, & Latinorum Catanance, quæ contractrici, à vi & necessitate adingi ad amorem, Dodonæi sententia valde attinis hæc est: foliis angustis, longis, gramineis, sed minoribus, quæ crescentia in terram recurvantur: cauliculos fert teneros, graciles, breues, in quibus flosculi & siliquæ rotundæ, tenues, longiusculæ, semine rufescente refertæ. Eiusdem generis est altera, quæ non rotundas siliquas sed compressas & latiusculas habet, cætera superiori simillima. Hæc in litoribus marinis reperitur, illa etiã quâdoque in agris. Videtur, inquit idem Dodonæus, prior esse Catanances species à Dioscoride descripta, quæ folia Coronopi habet longa, radicē iuncto modo prætenuem, capitula sena septenave, in quibus erui semen inest: arescens in terram flectitur, & milui exanimati vnguibus similis euadit. Erui siluestre Dodonæus in frumento. Historia. Lobellius & alij Herbarij faciunt. Vires habeat, hanc nosse minimè necesse est, satiusq; est de hac amatoriis tantum illecebre, dicata silere, quàm diligentius de ea inquirere, sicuti Plinius consuluit, & Dioscorides non vires, sed alienam duntaxat historiam citat, nec Galenus posteriorēque medici de hac quicquid tradiderunt, eadem fortè ratione ducti quæ Plinius, qui de ea hæc literis mandauit. Catanæ quum sit

TRIBV





**T**RIBVLVM Marinam plantam hanc quidam vocant, alij pastinacā marinam, alij Hippophaes Dioscoridis esse contendunt. In sabulosis & maritimis nascitur, radice crassa, molli, cortice rugoso & subatro cōtecta, saporis amari, caulibus multis, angulosis, latē dispersis: foliis longis, olea similibus, verū angustioribus & longioribus, qualia floribus sub-

*Nomina*  
Li. 4. c. 156.  
*Locus.*  
*Forma.*

TRIBVLVS Marinus  
quorundam.



strata cernuntur, albis, spinosis, spinarum aculeis, sicuti & caulis, angulosis: flore corymbis hederæ non dissimili, ac veluti racemoso, minuscule, candido, leuiusculè rubente. Quæ fere omnia Hippophaes historiae respondere videntur: sic enim Dioscorides illud descripsit. Hippophaes nascitur in maritimis & arenosis locis. Frutex est furculosus, densus, vndiq; amplus, folia habens longa, ad olea folia accedentia, sed angustiora, tenuiora, & inter ea spinas siccas candicantes, angulosas, inter se distantes: flores corymbis hederæ similes, & racematim inter se coherentes, sed minores, & molles, & cum candore puniceo ex parte coloris: radix crassa, mollis, succi plena, gultu amara. At huic Dioscorides non folia spinosa, sed præter folia, spinas siccas, albas, angulosas tribuit. Præterea eius succo vim purgandi biliosa, aquosa ac pituitosa deorsum, quod de superioris succo neminem adhuc experientia comprobasse arbitror. Quare sit ne hæc Dioscoridis hippophaes, lectoribus, & maritimis locis vicinis, diligentius disquirendum relinquimus.

Li. 4. c. 156.

MUSCVS MARINVS, CAP. X.



**B**RYON *ῥαδίοσιον*, Latinis Muscus marinus vocatur, *Thahabel*, siue *Thaleb* Arabibus, Gallis *Mouffe de mer*, Germanis *Mermiesz*. Nascitur, inquit Dioscorides, in lapidibus & testis iuxta mare, capillaceus, gracilis, sine caule. Plinius eundem Muscum ita describit, vt in quibusdam a Dioscoride dissentiat. Bryon marinum, inquit, herba sine dubitatione est, lactuce foliis similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab vna radice (nō ab ima, vt in vulgaris codicibus habetur) exeuntibus foliis. Nascitur in scopulis maximè testisq; terra comprehensis. Idem alio in loco. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactuce, rugosiore tantum iam hoc interius nascens. Plinius itaque Muscū herbam & fruticem facit, ipsiq; lactuce folia attribuit. Dioscorides pilos pro foliis: dicit enim esse *ῥαδίοσιον*, quod fortassis Plinius *ῥαδίοσιον* legit, & lactuce folio conuertit, in cæteris notis, præsertim in viribus consentiens, nisi fortè Muscum marinum cum Fuco marino, siue alga Theophrasti confuderit, de qua mox dicemus. Plinio veterè codicem suffragari scribit Andr. Lacuna, in quo *ῥαδίοσιον* legitur, etsi Muscus marinus, inquit Lacuna, capillorum quā lactuce maiorem similitudinem referat. Matthiolus eorum probat sententiam qui Muscum marinum veterum plantam eam esse censent, quæ hodie *Corallina* vocatur, & ab iis frequentius reperitur, qui corallia piscantur, coralliis, sicuti scopulis, & piscium testis,

*Nomina*  
Lib. 4. c. 94.  
*Locus.*  
*Forma.*  
Li. 27. ca. 8.

Lib. 13. c. 25.

Cornar.  
Embl. 34.  
lib. 4.

In cap. 94.  
lib. 4.





Lib. 3. ca. 71.

*MVSCVS Marinus vulga-*  
*tissimus, Muscus marinus can-*  
*dus Coralloides.*

Vires.

Li. 4. ca. 94.



testis eodem modo quo Muscus arboribus in-  
 nascens cæteris ea præfertur quæ corallii: (vnde  
 ei corallina nomen) inhæret: quæ saxis, secur-  
 do loco probatur, colore rubescens: cinerea  
 improbat. In eadē est sententia Dodonæus,  
 qui Corallinam Officinarum pro Musco ma-  
 rino pinxit, & descripsit. Constantinus accu-  
 ratius ista perscrutatus perspicuè demonstravit  
 Bryon thalassion siue Muscum marinum Co-  
 rallinam non esse quam depinxit Matthiolus.  
 Fruticosa enim planta & surculosa est Coralli-  
 na: Muscus verò marinus herbulæ capillacæ,  
 & veluti villosa instar Musci arborum: conge-  
 ner siquidem huic est, & forma non tantum  
 nomine similis: albicante autem colore est aut  
 rufescente, non autem herbaceo, aliquando  
 etiam glaucoscopulis qui mari alluantur con-  
 crecit, radice nulla notabili, & sæpe ostreorū,  
 gammarorum aut mytilorum testis aque  
 operculis cum inueterauerint, adhærescere  
 firmiter obductus conspicitur: cum exaruit, fa-  
 cile confringitur, & friabilis est, quod è diuer-  
 so in fuco marino accidit. Corallina autem  
 frutex est, & genus fuci marini, de quo proxi-  
 mo capite tractabimus. Matthiolus Musci ma-  
 rini à Plinio descripti, effigiem hanc pictam  
 dedit, eique perbellè notis omnibus respon-  
 dere scribit. Dodonæus Βρυον θαλάσσιον Theo-  
 phrasti esse putat, viderique primam speciem  
 esse fuci marini siue Algæ, à Dioscoride de-  
 scriptæ. Lobellius appellat Bryon lactuæ foliis Plinij, Muscum Intybaceum  
 crispum marinum, fuci primam speciem Dioscor. Lactuam marinam herbario-  
 rum. Idem Lobellius Muscum vulgatissimum exhibuit, intybaceum, cristatis oris,  
 fruticosum, surculosum: item Muscum candidam, Coralloidem, squamulis loriceæ-  
 tum. Muscus marinus multum adstringit, ut scribit Dioscorides, facit ad inflan-  
 mationes & podagras quæ adstrictione opus habent: nam in excusis omnibus  
 legitur.



legitur, τὰς τῶν εὐωδίων ἀπομυκνῶν: tamen Ruellius vertit qua refrigerare opus sit: perinde ac si ὑψέως legisset pro τῶν εὐωδίων, ut & Plinius legisse videtur, qui eandem omnino vires hunc Musco tribuit. Præcipua siccandi ei spissandiq; vis, inquit, & collectiones omnes inflammationesq; cohibendi, præcipue podagræ, & quicquid refrigeratio, us sit. Ab eadem sententia minimè alienus est Galenus, scribens Muscum ma. in. ex terrea & aqua essentia compositum esse, utraq; frigidat in gustu enim adstringere, & calidis quibusvis impositum, refrigerare & adiuuare.

## PHYCUS MARINVS, CAP. XI.

**ΦΥΚΟΣ** θαλάσσιον, Latine Fucus siue Phucus marinus & Alga, ut etiam in Theophrasto rectè Gaza vertit, quicquid dicat Plinius non habere lingua alia nomen, quod Græci vocant Phycos, quoniam Alga herbarum magis vocabulum sit, Phycos autem frutex. Nam ipsemet alibi Phycos alga conuerit & Fucum marinum, ut ostendemus. In Oceano Normanico Bray, aut Brac vocatur, à voce Græca βρύον. Dioscorides tria Fuci marini genera ponit. Fucus marinus, inquit, nascitur partim latus, partim oblongus & puniceus, partim albus, qui in Creta ad terram nascitur, valde floridus, & nō putrescens. Plinius de eadem re scribens, tria quoque genera facit. Præcipue verò liberat, eo malo Phycos thalassion, id est Phucus marinus, lactuca similis, qui conchyliis substernitur, nō podagræ modo, sed omnibus articulorum morbis impositis priusquam archiat. Tria autem genera eius, latum: & alterum longius quadamtenus: rubens: tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tingunt: omnia eiusdem usus. Nicander ea & aduersus serpentes in vino dedit. Hæc ita ferè etiam Dioscorides tradit, nisi quod Plinius lactucæ folia huic, veluti etiam musco marino attribuit, & similiter conchyliorū testis insternit dicit. Idem Plinius. Non habet lingua alia nomē, inquit, quod Græci vocant Phycos: quoniam alga herbarum magis vocabulum intelligitur, hic autem est frutex: folia lata, colore viridi gignit, quod quidam Prafon vocant, alij Zosteræ. Alterum genus eiusdem capillaceo folio, simile sceniculo, in saxis nascitur: superius in vadis, haud procul litore: vere vtrūmq; & interit Autumno. Circa Cretam insulam nato in petris, purpuras quoque inficiunt, laudatissimo à parte Aquilonis, aut cum spōgiis. Tertium est gramine simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus fruticum Bryon vocatur, folio lactucæ, rugosiore esse Nicander tradit. Plura eius genera ut diximus, longo folio, & latiore, rubete, aliisque crispo. Laudatissima quæ in Creta insula, iuxta terram in petris nascitur, tingendis etiam lanis ita colorem alligans, ut elui postea non possit: è vino iubet eam dari. Nicander autem quem Dioscorides & Plinius citant, in Theriacis aduersus Trygonis venenum inter cetera remedia Algam marinam rubentem numerat hoc versu.

Ἡ δὲ καὶ φονίασιν διὰ καὶ τὰ κάλλος φύκος.

sed ad Plinium reuertamur. Is indistinctè & inconstanter Fuci marini genera tradidit, ut faciliè perspiciet qui locos supra citatos, item eum quem capite de Musco marino protulimus, inter se conferet. Præterea aperte Phycos thalassion algam vertit, quod tamen alibi in alia lingua nomen habere negat, modoq; herbam vocat, modo fruticem. Adde quod βρύον, id est Muscum, & φύκος cōfundit. Quæ omnia ex Theophrasto transcripsit, qui tamen multò clarius & diffusius eadem explicauit, non tria duntaxat, sed quinque Fuci marini genera assignans, his verbis.

Τὸ δὲ φύκος τὸ μὲν ἐστὶ πᾶσι φυλλόν, τέλειαν δὲ, χλωμα ποῶδες ἔχον, ὃ δὲ καὶ πρὸς τὸν καὶ λίσσιν πᾶσι, οἱ δὲ ζωστῆρα. ῥίζαν δὲ ἔχει διαστέταν ἔχον, ἀνωθεν δὲ λεπτεῖαν (legendum ex conuersione Gaza ἔσθον, siue ἐνδωθεν δὲ λεπτεῖαν) μακρὰν δὲ ἐπιφάνειαν καὶ ἀπαχύν, παρὰ

Nominā

Lib. 13. c. 25.

Alga ab algone  
qui latet.

Lib. 4. c. 95.

Forma:

Lib. 12. c. 10.

Φύκος genus herbe  
unde lana in gignit

et quæ multas non

runt. quoniam facit

ux seducta fereat

Lib. 13. c. 25. gigno sed in p

fente latet πεφυκ

exponeit fereat et adhe

qua vñ fereat et adhe

perasone adheut e

fente per fereat. ad

repat

Lib. 32. c. 6.

Lib. 12. c. 10.

Lib. 4. h. 12.

cap. 7.



παρόμοιαν τοῖς κρομμυγνήθοις. τὸ δὲ πειχόφυλλον ὡς περὶ μάραθρον, ἔστω ὡδὲς, ἔστω ἔχον χαλκόν, ἀλλ' ὁρθὸν ὡς ἐν ἀνίσῳ. φύε' δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ὄσφρακων, καὶ ἐπὶ τῶν λιθῶν, ἔστω ὡς περὶ γάτερον πρὸς τῇ γῇ (mendose pro ἐπὶ τῆς γῆς) πρὸς γὰρ ὁ ἀμφω, καὶ τὸ μὲν περὶ χόφυλλον πρὸς αὐτῇ γῇ, πολλὰ καὶ δὲ ὡς περὶ ἐκλυζέ' μόνον ὑπὸ τῆς γαλῆτης. γάτερον δὲ ἀνωτέρω, γινέ' δὲ ἐν μὲν τῇ ἔξω, τῇ περὶ ἡρακλῆας σήλας, γαυματὸν τιτὸ μέγεθος, ὡς φασί, τὸ πλάτος μείζον ὡς πάλαισι. φέρεται δὲ τὸ ἐπὶ τὴν ἔσω γάλατταν τῷ ῥῶ τῇ ἔξω. χαλκοὶ δὲ αὐτὸ πρᾶτον ἐν ταύτῃ δὲ, ἐν τισὶ τόποις ὡς ἐπ' ἀνά τῶ ὁμοφασί. λέγε' δὲ ἐπὶ τῇ εἴσοι, καὶ φύε' μὲν τῷ ἡρος λήγοντος, ἀκμαίαν δὲ τῷ θέρους, τῷ μελιπώρῳ δὲ φθίνῃ. καὶ τὸν χαλκὸν ἀπολλυμένον ἐκ πύργου. ἀπὸ τῆς καὶ ἄλλῃ φύσιν καὶ ἀμεινότερα γινέσθαι τῷ χαλκῷ. ταύτῃ μὲν ὅσον πρὸς γὰρ, περὶ τὴν γάλατταν. τὸ δὲ πόντιον φύκος ὁ οἱ ἀνακαλυψέσθαι πελάγιον, καὶ ἐν κρήτῃ δὲ φύε', πρὸς τῇ γῇ ἐπὶ τῶν πείτρων, πάλαισι, καὶ χάλκισον. ἡ βράσις αὖ μόνον τὰς παινίας, ἀλλὰ καὶ ἑλμα καὶ ἱμάτια, καὶ ὡς ἡ αὖ πρὸς φύκος ἡ βαφὴ, πολὺ χάλκισον ἢ χρῶμα τῆς πορφύρας. γινέ' δὲ ἐν τῇ πορφυρῇ καὶ πάλαισι τὸ χρῶμα. ἄλλο γὰρ ἐστὶν ὅμιον τῇ ἀγρωστῇ (perperam codices vulgati habent, ἀλλὰ γὰρ ἐστὶν ὅμιον) τῷ φύλλῳ παραπλήσιον ἔχει, τὴν ῥίζαν γοναίωδῃ, τὴν περικύαν πλεοναίαν ὡς περὶ (non τῇ) τῆς ἀγρωστίδος. ἔχει δὲ τὸ χαλκὸν χαλκωδὴ καὶ ὡς περὶ, μεγέθει δὲ ἑλμα, ὡς περὶ τῷ φύκῳ. ἄλλο δὲ βρύον (sic Plinius & Gaza legunt: quare mendosa sunt exemplaria quæ βότρυν habent.) ὁ φύλλον ἔχει ὡς περὶ τῇ χρῶμα, πάλαισι δὲ ἐν ἀνόμοιον ταῖς γερμασίαις, πλεοναίαν ὡς περὶ, καὶ ὡς περὶ σπινθάρια. χαλκὸν δὲ ἐκ ἔχει, ἀλλ' ἀπὸ μὲν ἀγρωστῆς, πλεοναίαν τὰ τοιαῦτα, καὶ πάλαισι ἀπ' ἄλλης. φύε' δὲ ἐπὶ τῶν λιθῶν τὰ τοιαῦτα πρὸς τῇ γῇ, καὶ τῶν ὄσφρακων, καὶ τὰ μὲν ἐλάττω χεῖδὸς ταῦτ' ἐστὶν. Id est Gaza interprete. Nam Alga quoddam genus folio lato (addendum ex Græco τετρακτύς, id est distento, pro quo fortasse legendum τετρακτύς, id est tæniæ modo exporrectum) colore herbido est, quod (πρᾶτον) porrum quidam appellant, alij (ζωστήρα) cingulum, radice hirta extrinsecus, squamata intrinsecus, longa admodum crassâ; plene, cepigerthis non absimili (melius, longa modice & bene crassâ, crommygethis, &c.) Aliud folio crinito, terræ ipsi adhærens, fereq; à mari tantum alluitur, alterum altius degit. Hæc multa omisit Gaza ex Græco sic reponenda. Aliud folio capillaceo sceniculi modo, colore nec herbaceo, nec valde pallido, caule caret, sed per seipsum quodammodo subrigitur: ostreorum testis innascitur & saxi, non quemadmodum alterum, zoster scilicet, in terra ipsa defixum. Terræ quidem siue litori vicinū vtrumque, sed capillaceum terræ siue litori ita propinquum est, ut à mari alluatur tantum, alterum à litore longius distat. Sic pergit Gaza. Nascitur quidem in mari ex tero circa Herculis columnas, mira magnitudine, latitudineq; ut ferunt, amplius quam ut manu apprehendi possit. Fertur hoc ad mare internum fluxu extingui. Nascitur quidem fucus sceniculaceus circa Herculis columnas in externo Oceano, mira proceritate, maioræque latitudine quàm palmæ vnius: ad internum verò siue mediterraneum mare externi siue Oceani influxu deferretur: porrum id vocant, vtrumque & aliis quibusdam in locis tam altè surgit, ut hominum umbilicum magnitudine superet. Annum esse aiunt (vertit Gaza,) & nasci vere desinente, viginti ætate, minui (languescere fortè melius) Autumno, interire atque decidere Hyeme. Quin & reliqua omnia nascentia deteriora, obscurioraq; (flaccidiora melius) hyeme fieri. Hæc itaque ceu terrena circa mare deprehenduntur (vel potius, Hæc igitur circa mare propelitus seu terram crescunt) Alga verò proueniens in alto, quam spongiarum pelagicam deferunt, in Creta insula iuxta terram super saxa, plerumque optimaq; prouenit, qua non solum vittas, sed etiam lanas vestesq; inficiunt, & quâdiu recens infectio sit, color longè purpuræ præstat. Gignitur parte Aquæ Ioniam tum copiosior, tum melior, ut etiam spongiæ, reliquæque similia. Sunt etiam grammæ.



graminibus proxima, &c. Dilucidius sic reddi possunt. Alga verò marina quam spongiarj vrinantes referunt ex alto, in Creta quoque iuxta terram, super saxa, plurima optimaq; prouenit, qua non solum vittas, sed etiam lanas vestisq; insciunt, & quamdiu recens tinctura sit, color longè est præstantior purpura. Gignitur parte Aquilonia tum copiosior, tum melior, vt etiam spongiæ, reliquæque similia. Est alius fucus graminis similis, quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adhærente modo graminis, & caule calamaceo (arundinaceo) vt gramen, magnitudine alga multò minora (minor.) Est aliud Bryon dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec lactucis dissimili, rugosiore tamen, & velut contracto, caret

*FVCVS Capillaceus. siue  
Corallina.*



*CORALLINA Britan-  
nica, Pens.*



*hec fima conuincit  
conspicua igitur ad alia  
aquarum differt.*

caule: sed ab vno initio plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio. Nascitur super lapides scitiliæque iuxta terrâ. Et minora quidem hæc ferme traduntur. Hac oratione, vt diximus, luculenter Theophrastus quinque Fuci marini genera declarauit: Zostera siue Proson capillaceum, siue fœniculaceum, Tinctorium spongiariorum, siue Pelagicum, Gramineum, Lactuca- ceum. Præterea ex eodem facili est intelligere

*Li. 13. ca. 25.*

Plinium non rectè scripsisse Fucum zostera & capillaceum vere nasci, & inter ire Autumno, cum de capillaceo solo scribat Theophrastus, vere desinente prodire, & non Autumno, sed hyeme perire. Zoster idem quod ζώνη, id est cingulum, siue baltheus, vbi vis in litore maris

*Fucus Zo-  
ster.*

*Locus.*

*Forma.*

Normannici visitur, longitudine vlnæ, aut etiâ maiore, quamuis abruptus, digiti crassitudine, & trium digitorum latitudine, coriaceis mulionum baltheis similis, ambitu, præsertim cū inario, sic crispus, vt lacinia tus videatur. Normannici Oteani litus hac algæ specie virosūm grauēque odorem spirante etiam si longius absis, confratum fere est. Fucum capillaceum siue fœniculaceum qui saxi & ostreorum testis innascitur, nostram Corallinam esse doctiores censent: vt enim ille, ita hæc frutex est, folio capillaceo, fœniculo simili, similiter saxi & ostreorum testis innascitur. Longe aliam Corallinam Britannicam exhibuit Pena, scribēs se in Angliæ litore mediterraneo insulæ Portlandiæ, ex aduerso Normanniæ inter fluitantes Algas reperisse plantæ quoddam rudimētum, cuius si spectes & attrectes furculos palmares, & sesquipalmares, pustulatos, molles, flexiles, spongiam prorsus dicas, cui etiam cōcolor est, & viuere putes: sin habitum & ortū ramis brachiatum, corallinis affiniorem dicas: vnde quidam coniecerūt esse Plocamon Isidos, de quo sic Plinius. Circa Troglodytarum insulas fruticem vocari in alto Isidos Plocamon, Corallio similem, sine foliis, præcisum, mutato colore in

*Fucus ca-  
pillaceus.*

*Locus.*

*Forma.*

*Li. 13. c. 24.*

A A A



## CONFERTAE Marinae genus, Lobel.

Fucus tinctor.  
Locus.

nigrum, durescere, cum cadat frangi. Hæc Plinius. Ea tamē, inquit Lobellius, videtur esse Antipathes Dioscoridis, de quo capite proximo. Fucus quem Lobellius vocat Theophrastus, quem etiam Tinctorium nominare possumus, in scopulis & petris nascitur, unde avulsū vrinantes spongiarij referunt, foliis etiā est tenuibus, sceniculo similibus, rubris, sic tamen ut quædam intermixta spectentur adhuc albicantia. Huic similis est, fortasse idem Muscus marinus, foliis Abrotoni maris, Lobellij, folliculis non dissimilibus, sed nonnunquā triplo maioribus, radicem Asphodeli æquantibus, colore quadatenus rubentibus, vel ferrugineis. Fucus alius gramineus

dici potest, quod folio sit graminis siue arundinis minoris, sed aequaliter lato, ac molliore, nec mucronato, vel acuto, quale est agrostis, pollicari latitudine, vna longitudine, vnde innatæ, figura ligulæ, aut taniæ vittæ. In vadis nascitur, ut & Zoster. Hæc est alga quā rustici litoribus eiectam & dispersam æstate, ut scenileces (hoc enim scenū est marinum, & Monspeliciū vulgus Paleam marinam vocat) rastellis accumulāt, & in cāpo expositā furcillis versant quoad perare scar. deinde probe siccata sceni instar in metas construunt, aut important in scenilia vel palearia: eaq; sunt quæ tum præparant pecorum & boum hybernæ stabulationi stumenta. Ex eo qui hinc cōicitur fimo, agros nimia defrugatione emaciatis, & exinanitis stercorant, lato segetū proventu. Hæc pocula & cætera vasa vitrea qui procul asportare volunt, inuoluunt & circūtegunt, ne mutuo collisu confringantur. Eadem siccata rustici tomenti loco culcitra suas infarciunt: Quæ olim consumm-

Lib. 1. c. 2.

Lib. 5. c. 97.

liter cognita ipsius comoditas in farciendis centonibus in castris locum habuit, quod intelligitur ex Vitruui de testudinis constructione hæc scribente. Circūbulata collocentur crates ex tenuibus virgis creberrimè textis, maximeq; recentibus percrudis coriis duplicibus confutis, farctis Alga, aut paleis in aceto maceratis circa tegatur machina tota. Hæc Algula est, cui Dioscorides in odore corallia comparat, ut mox dicemus, cum ait: ἐτι δὲ ὁσμὴν βρωδὴν, καὶ φυκίοις ἐμπερὶ ἔχει, de qua etiam intelligit Nicander cum scribit: βρύα λεπτὰ πολυφθαλμοῦ θαλάσσης.

F V C V S, siue Alga  
Tinctoria.

Fucus lact.

Forma.

In cap. 94.

Lib. 4.

Lib. 1. c. 71.


Lib. 1. c. 95.




scitè admodū dixit φυκιδίας ἐμπερὶ ἔχει, algosias vna id est litora. Huic iungendus Fucus ferulaceus Lobellij, sic dictus ob folia ferulacea, minutius diuisa. Scapum emittit pedalem, in quo Corallina candida sæpius innascitur. Hæc Lobellius. Quintum Alga siue Fuci marini genus Lactucaceū, in litore aut vadis sicuti superiora prouenit, sed scopulis & saxi inhaeret, foliis lactucæ latis, crispis, siue rugosis, virentibus, ex vno principio multis, nullo caule. Hanc Algam pro Mulco altero pictam esse à Matthiolo postremis Commentar. editionibus supra diximus, à Dodonæo βρύον θαλάσσιον Theophrasti appellari viderique primam speciem esse Fuci marini siue Alga à Dioscorida descriptæ. Aetius Lactucam marinam vocat de curatione eorum scribens, qui obtineum fluxionem articulari morbo laborant. Et quoque, inquit, quæ in mari nascuntur plerūque talia sunt, ut potè quæ Lactucæ appellantur. Sunt autem germina lata, & oblonga, ac viridiora, tenuia, & subrugosa, ac



MARITIMARVM,  
FVCVS, siue Alga marina  
graminea.



LIB. XII. 1373  
FVCVS, seu Alga marina,  
Lobellij.




*Alga forse nonna sua  
per obalgore aqua  
vel per aligis pedes*

FVCVS Ferulaceus, Lobellij.



veluti cōduplicata,  
ad litora maris per  
fluctus eiecta: prae-  
statiores autē sunt  
cum posca decocta.  
Viridia itē, quae in  
Fuco siue Alga tin-  
ctoria ad radices si-  
ta sunt. Hae de Fu-  
ci marini generi-  
bus. Nūc vires eorū  
explicandae. Omnia  
vires. Lib. 4. c. 95.

FVCVS, Siue Alga  
Intybacea.



gerandi, inquit Dioscorides, vtilem in cataplasmatibus  
non podagra modo, sed etiam inflammationibus: ve-  
rūm iis humidis vti oportet priusquam siccentur.  
Nicanor Puniceum aduersus bestias venenatas vale-  
re dicit, eo versu quem supra citauimus. Et Galenus,  
Fucus, inquit, humens adhuc & virens ex mari exem-  
ptus, desiccatur & refrigerat ordine secundo: habet enim  
quiddam modicè acerbum. And. Lacuna scribit in  
veteri Dioscoridis codice pro *ψυδρον* legi *ψυδρον*, id  
est adstringentem pro refrigerantem, eamque lectio-  
nem rationi esse consentaneam, quod herbae omnes  
marinae ob saluginem insitam, non tam refrigerare  
quàm adstringere cogerentur videantur. Fucum



capillaceum siue fœniculaceum, id est, Officinarum Corallinam recentiores ad necandos lumbricos maximopere commendant, cæterisque medicamentis præferunt, quod eos non modo interficiat, sed etiam eodem die expellat, magna spectantium admiratione: qua virtute muscum aut Fucum marinum pollere verum nullus, quod sciam, memorie prodidit.

## CORALLII FRUTEX, CAP. XII.

Nomina

Lib. 5. c. 97.

Genera.

Lib. 5. c. 97.

Forma.

Lib. 5. c. 97.

Embl. 103.

Lib. 5.

**K**ΟΡΑΛΛΙΟΝ, Latine Corallium similiter, dicitur frutex marinus, cuius natura non ita omnibus est perspecta, ut ipsum vulgò est notissimum. Aliqui *Μαγδεδρον* vocant, inquit Dioscor. quasi lapideam arborem dixeris, Arabes *Bassad*, *Mergen*, *Besd*, siue *Morgian*, Galli *Corall*, Itali & Hispani *Corallo*, Germani *Coraln*. Genera eius rubens, candidum, nigrum. Candidi tamen neque Dioscorides, neque Plinius meminere, nisi hoc fuerit quod Dioscorides ex quorundam interpretatione colore pallidum dixit, & ut vitiosum improbauit. Corallium, inquit idem Dioscor. planta marina videtur esse, durari autem cum ex alto extracta fuerit, extra mare posita, & tingitur, siue compingitur tanquam à circumfuso nobis aëre: quibus verbis expressa sunt hæc Dioscoridis Græca. *Κοραλλιον δλεσθι μὲν εἰναι φύλον ἐνάλιον. τερπρον ποιεῖται δὲ ὅταν ἐκπῶν βυθῷ ἐκείνῳ θύξῃται γινώσκον, καὶ βαπτύμενον ἢ τοι παγγνώμενον ὡς περ ὑπὸ τῆς περιεμεχυμένης ἡμῶν ἀέρος.* In quibus voces duas deesse putat Cornarius, *ὑδαλι σίδηρος*, ut sit legendum, *ἐξ ὑδαλι γινώσκον & βαπτύμενον, ἢ τοι παγγνώμενον ὡς περ ὑδαλι σίδηρος ὑπὸ τῆς περιεμεχυμένης*, &c.

## CORALLII Frutex.



Ibidem.

quæ sic conuertit, & extra mare posita, ut quæ à circumfuso nobis aëre velut ferrum ab aqua tingitur, siue compingitur. Cuius emendationis occasionem illi dedit, opinor, vox *Βαπτύμενον*. Cum enim *Βαπτύειν* tingere, intingere, immergere significet, inde suspicatus est Dioscoridem intelligere Corallium in aquis molle, inde extractum, ab ambiente aëre statim solidari, quemadmodum ferrum igni emollicuit, in aquam immersum, statim durescere. Et certe vox *Βαπτύμενον* à Ruellio omissa est, qui sic locum hunc conuertit. Corallium marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atque emergit, tanquam offuso aëre protinus cōcreseat. Idem Dioscorides locum delectum, odorem & effigiem Corallij sic describit. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio, cui pachyno nomen est. Optimum est, colore rubēs, & colore simile antherico, aut sandyci saturatæ, quodq; facile retinetur, æquabileque est toto concremento: præterea quod odore est musci marini, & similitudinis siue Fuci marini. Ad hæc quod ramulosissimum est, & forma cinnamomum fruticem refert: quod verò concremento lapidosum est, scrupulosum (sic Ruellius interpretatur *τῇ χροῇ ψωρὸν*, id est scabrum, Plinium opinor imitatus, qui scabrosum conuertisse videtur. Cornarius legit *ἀχρὸν*, cum nullus color, inquit, *ψωρὸς* dictus, vertitq; colore pallidum) cauteriosumq; ac inane vitiosum esse putandum est, Plinius de eodē ita tractat. Quantum apud nos Indicis margaritis precium est, tantum apud Indos Corallio: namq; ista persuasio

Lib. 32. c. 2.



CORALLIVM Album  
(t) rufum, Lobel.



limum appellat, à radendo, scilicet. Certe Corallium in mari ex succo lapidescente concrefcere, & priusquam extrahatur sub aquis, molle efse, ac virescere, cum extractum est, alias rubere aliàs niueo candore albescere, aliàs atrum esse constat. Iisdem in locis candidū reperitur, non tam cōpactum, neque tam ponderosum, quàm rubrum, sed leuius ac raram, & spōgiarum modo inane, sub iisdem Thyrrheni maris vndis euellitur. Appingitur etiam à Lobellio Coraloides, siue Corallij albi varietas, stipte longè crassiore, brachium æquante, & materia magis fungosa, multis acetabulis insculpta, aut inscripta. Vniuersa planta pedem vnum longa est, vixque curbitum proceritate superat. Is verò Corallij frutex quem depictum proponimus saxo adhuc inhaerentem, altera sui parte & furculosiore candicabat, minutisq; foraminibus pertusus erat, altera in pauciores virgulas diuisa rubebat, & tubercula quædam, veluti baccas tuberosas ferebat, cornis satius non dissimiles. Quare immerito reprehenditur Plinius, quòd huic frutici baccas tribuerit, vt alijs arboribus

Κοράμιον φωνή κ' ὕ-  
κτιον, κ' ὕρα εἰς τὸν  
ἡσυχίαν ἀνεῖν κ' εἰς  
τὸν ἀνέμω ἀνέμω φωνή  
πᾶσι φωνή φωνή  
φωνή φωνή φωνή  
φωνή φωνή φωνή  
φωνή φωνή φωνή  
φωνή φωνή φωνή







## KALI,

## CAP. XIII.



AVRITANI plantas quasdam Kali & Alkali vocant, ex quibus vltis sal fit, Salkali ab iisdem dictum. Tres huiusmodi cōgeneres & maritimas recenset Pena, quæ crithimum, inquit, representare quibusdam videri possent, nulla tamen antiquis videtur nota fuisse aut descripta:

KALI Magnum, Pena.



KALI Maius, Pena.



tātum abest vt Salkali, quod vocāt, ex vna istarum vsta, & quod magis mirum est, fusa fieri nouerint, vix tacituri si sciuisent. Quare vt nomen, sic & plātam ipsam, & modum salis istius parandi videmur Græcis recētoribus, aut philosophis Arabicis, Chymistis & Hyalurgis debere. Prima species hic picta notior est in maritimis Gallia Narbonensis, vbi tum sponte, tum sata campos maritimos frequenti caulium rubentium operit purpura, fruticat caule cubitali & sesquicubitali, carnosio, portulacæ concolori, foliis densis, angustis, semperuiui medijs siue minoris, teretifolij duplo lōgioribus, acutioribus, inter quæ semina limacæ pusillum vel spiram imitantia, colore fusca, folliculis maluæ seminis ritu oclusa. Hanc dudum sic depinximus. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imo nuspiam ferè. Istius copia per initia Autumnii coaceruatur metæ instar, super scrobe cui ligna insunt decussatim instructa, quibus accēsis herba vritur, & biquatur, & in profundum scrobis defluit, vbi cogitur in glebam coloris nigricantis vel cinerei, quod Kali & Alkali sicuti & herbam nominant, Galli Soude, ad vitrum conflandum, quod in Italiam & Septentrionem ex Gallia Narbonensi & Aquitania defertur. Vrit non secus ac Cauticum. Eosdē ad vsus sedulo colligunt maritimi coloni Narbonenses secundam hic pictam, iisdem natalibus, sed foliis & caulibus minoribus multo, minusque carnosis, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo *blanchette* quasi Kali album vocatur. Semen exiguum, nigrum, vrticæ aut acetosæ. Non solum calidioribus regionibus, sed etiam ad Septentrionem, Angliæ, Normanniæ, Belgio familiaris. Multo frequentissima est in quibuscumque maritimis oris tū Oceani tum mediterranei maris, quæ Salicornia vulgo vocatur, siue Kali geniculatum, sed effigie multum diuersa, & cuius folia videntur esse teneri turiones ramulorum. Sunt enim è radice fibrosiore permulti cauliculi cubitales, recti, densius geniculati, extremis quasi foliis crassis, pinguibus, carnosis, teretibus, rubentibus, per



KALI, Geniculatum Pana.

KALI, Dalech.



Vide Hyssop. pag. 566.

SALICORNIA, siue  
Kali, Matthioli.

Lib. 1. c. 76.

Enarr. 150.  
in lib. 3.  
Diosco.In cap. 112.  
lib. 2.

nus, contra. Ex horum cinerum lixiuio sal Alkali cōfici, & ex vitri materia fluit & cogitur, axungia vitri hodie nuncupatur, Gallicè *Sein de verre*. Matthiolus dicit Kali species tum sua deliniatione, tum pictura, in vnam cōfundit, scilicet Kali nigrum sedi minoris folio, Gallis *Soude* nuncupatum, & id quo de hīc agitur, quod salicornia vel Kali geniculatum nominatur. Pictura hīc videtur, delineatio eius est

crebra genicula insertis, & pyxidatim quasi puerorum alabastrorum instrar, quadā equiseti similitudine, & cornua recta, obtusius mucronata imitantibus, gustu non insulso, nec temperamento aut vsu a ceteris dispari, sed vbique neglecta. Semen nullum proferit. Dodonæus tria Kali assignat genera. Primum est, secunda Anthyllis, secundū, Tragus Dioscoridis, Tertium, Salicornia, cuius picturam dat ab ea quam hīc ex Pena expressimus, plurimum distantem. Amatus Lusitanus scribit omnem cinerem qui ex Syria aduehitur ad conficiendum saponem, & vitrum, ex herba anthyllide combusta fieri, hodiēque multos ignorare cinerem istum Alkali esse: omnes istas herbas abstergendi vires habere, ac stigmata & maculas faciei delere. Quod ex istis dum vruntur, liquatur & tāquam plumbum fluit, cum refrigeratum est, concreta, & veluti cineres conglobatos esse, quo etiam Alumen Catinum vocant, ex quo vitra conficiuntur. Hos si quis an veri sint experire voluerit, in ignem coniiciat: quod si eliquantur ac ebullierint, verum Kali esse dicet, sin minus



eiusmodi. Cum primum, inquit, è terra emergit, folium est tereti forma, minori se-  
de non absumile, atque deinde crescens caule erecto, geniculato, non multo post  
tempore in digitalem ferme longitudinem attollitur, cum verò amplius adoleue-  
rit, è geniculis folia mittit pingua ac crassa, in medio caua, & ex lata origine mu-  
cronata, vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longe  
minora exilioraque conspiciuntur colore rufo: ex quorum ortu pilula prodeunt  
rotunda ac parua, quibus exile semen includitur. Caules habet pingues & rufos.  
Hæc Matthiolus.

## CRITHMI SPECIES, Matthioli. CAP. XIII.

**L** L I S subiungenda tertia Crithmi species à Matthiolo tradita, quæ  
in maritimis prouenit, & ab vna radice multos emittit caules rectos,  
circa quos folia habentur, per interualla tamen plura ex vna origine  
acervatim prodeuntia, longiuscula, crassa, & salso etiam gustu, sub ho-  
rum exortu peculiare quoddam erumpit folium, cæteris duplo longius, vnde pro-  
pe caulis cavitatem pediculus exit, è quo sex, septemve folia breuiora prodeunt, vt  
eius appicta effigies ostendit, flores fert in cacumine orbiculatos villososque, colo-  
re pallido. Radice nititur longa, tereti, non sine adnatis. Hæc est ex Matthiolo  
huius herbe delineatio, quæ nihil prorsus cum Dioscoridis Crithmo similitudi-  
nis habet. Crithmum enim foliis fruticat pinguibus, longioribus & latioribus

In cap. 122.

lib. 2.

Forma

Vide Phlegm. cap. 22.

CRITHMI SPECIES  
Tertia, Matth.CRITHMVM Chrysanthemum,  
Dodonæi.

quam portulacæ, salis, floribus candidis, &c. Quare alij herbarij minimè Crith-  
mum esse censent. Lobellius litoreum Chrysanthemum appellat, Asterem Atti-  
cum maritimum. Crithmum Chrysanthemum Dodonæus exhibet huic simile, si  
non idem, sed flore quantum ex Micone perspicere licet, differens: habet enim in  
cacumine ramulorum florem Chrysanthemi æmulum, & medio videlicet disco,  
& orbiculato ambitu luteum, & Crithmum verò tertium Matthiolus scribit habe-  
re orbiculatum, villosumque, colore pallido.

ANTHYL



## Nomina

## Genera.

Dios. lib. 3.  
cap. 136.

## Forma.

Lib. 11. c. 19

Lib. 1. c. 7.



Ἄνθυλλον Græcis dicitur, & Latinis Anthyllis, Plinio Anthyllion quam alij Anticellion vocant, inquit. Videtur autem ἀνθυλλίς ἀπὸ τῆς ἀνθίσιν dicta, nempe à florescendo, quasi florida, à lanugine cana qua pubet: vel à flosculorum elegantium copia.

Anthyllidis genera duo sunt Dioscoridi, Plinio, Galeno. Quidam enim folia lenti similia habet, ramulos palmi altitudine, rectos, folia mollia, radicem tenuem, & parvam. Nascitur in saluginosis locis & apricis, gustanti subsalsuginosa. Altera foliis & ramulis chamæpithyi similis est, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus, flos est purpureus, vehementer grauis odoris, radix velut cichorij. Plinius in paucis à Dioscoride dissentit. Est & herba anthyllion, inquit, quam alij anticellion vocant, duorum generum, foliis & ramis lenticulæ similis, palmi altitudine, sabulosis, apricis nascens, subsalsa gustanti. Altera chamæpithyi similis breuior & hirsutior, purpurei floris, odoris grauis. Hic sabulosus dixit, quod Dioscorides ὑφαλιμύρις, id est, saluginosus. Anthyllidem priorem hic depictam Dodonæus esse putat, à lente foliis & caule parum distantem, nisi candidior, mollior, & minor esset. Caulis est pedis altitudine, albus, tangenti suavis, folia explicata, mollia & alba, minora & densiora quam in lente flosculi: in caulis summitate congesti, palliduli aut lutei: semen in paruis siliquis: radix tenuis & lignosa. Perquam affinis est aut eadem hic appicta Medica

ANTHYLLIS Prior,  
Dodonæi.ANTHYLLIS Altera,  
Dodonæi.

marina à quibusdā dicta. Anthyllis altera Dodonæi à recetioribus quibusdā Boreali dicta Kali species, vt multi existimant, quinos, senos, pluresve ramulos emittit, ciles, per humū repentes, foliolis vestitos, angustis, densis, inter quæ & ramulos flosculi emergunt purpurei, deinde semen, radix gracilis est, digitali lōgitudine. Tota succo plena est, eoq; salso. Salsuginosis sabulosiq; locis & litoribus marinis Zelandiæ frequens. Iunio mēse fleret: Iulio semen maturum est. Desiccatur, & vulneribus glutinandis

Locus.

Boreali



glutinandis est utilis. Anthyllides alias Pena exhibuit: primam quæ in Angliæ insulis australibus, ea præsertim quæ Portlandia vocatur, litore Nortmanniæ obuerso plurima & pusilla prouenit in sabuletis & arenosis vadis depressis & apricis, ramulis palmum trësve vncias longis, angulosis, pallentibus, foliis lenticulam vel alfinem minorem referentibus, flosculi cauliculis summis insunt ex buxæ herbacei, dentatim stellati sed minoris Iunio & Iulio: semen tithymali in perexiguis & triqueris thecis alit, radix prolixior est, exilis, geniculata, sabulo altè infossa soldanel-la modo. Tota salâ est, gustanti amaricat, & parum quiddam calfacientis indicat. Alteram quæ in maritimis agri Nitrobrigum ad vicum Peraus dictum, & Latera passim reptat vti superior, ramulis compluribus, sesquipalmaribus, foliolis al-

ANTHYLLIS Portlandia  
lentifolia, Pena.



ANTHYLLIS Marina Narbonens.  
Alfines folio, Pena.



ANTHYLLIS Valentina, Clusij.



finæ, aut potius lenticulæ, sed per intervalla quadam, quasi circû genicula exortis, numerosis: copiosisimis item flosculis, in summo aggregatis, muscosis, albidis, floridum quasi nomen Anthyllidis ostendantibus & testatibus, seminis etiâ pusilli feracissimis, gustu amaricante, subfalso, nitroso, calidiusculo. Tertiam quæ iisdem locis maritimis reperit, cæteris multo falsior, foliis & facie est herniariæ aut chamæfycæ, flosculis pusillis subter foliola ex albo purpurascētibus: semina in florum calyculis quàm clinopodij



clinopodij min oribus multò occluduntur. Tota gustu salso, acidulo, lactei succi expers & exucca, nec proinde Chamæfyca statuenda, ut quidam prodiderunt. Ad hanc accedit, aut eadem est Anthyllis Valentina à Clusio descripta & picta, quæ cauliculos multos ex vna radice profert, dodrantes, ramosos, humi stratos, subrubentes: foliola Lentis exigua, seu potius Chamæfyces, salso gustu, & plerumq; cum suis ramis veluti quadam salugine respersa: flores inter ipsa folia pusilli, quatuor foliolis constantes, ex albo purpurascens: radix singularis, nigricans. Tota chamæfyca adeò similis est, ut primo aspectu Chamæfyce putarit, lacte tamen caret. Hanc nusquam se vidisse meminit, quàm ad fossas urbis Valentia in Hispania. Illic Anthyllidem D. Placa vocabat, & ad primum genus à Dioscoride descriptum referebat: cui Clusius non assentitur. Etsi enim reuera inter Anthyllidas recensenda sit, prima tamen esse non potest quæ rectis ramulis assurgit, cum hæc repentes habeat ramulos, totaque facie Chamæfyce propensum referat. Hæc auctore Lobellio, consimili facie cum Herniaria & Chamæfyce in ventis & oliuetis Boutonetum versus, & Caltrun nouum fuscè humi spargitur, cauliculis palmatibus & dodrantalibus, flosculi ex albo purpurascunt, quatuor foliis constati. Hanc olim cum aliis Chamæfyce alteram putauit, sed non lactescit, gustu salso, præficcò. Anthyllides, ut scribit Dioscorides, potæ drachmis quatuor urinæ difficultati, & nephriticis plurimum auxiliantur. Tritæ vuluæ pituitas emolliunt cum rosaceo & lacte impositæ (Sic Ruellius ex mendoso codice vertit. Legendum verò ἐκμαλθίσσας φλεγμονὰς ἐν ὑστέρα λεταί, id est, tussæ emolliunt vteri phlegmonas, &c. Qualitudo rationi magis consentanea est, nam pituitæ expurgantur, phlegmonæ emolliuntur) vulneribus medentur. Quæ chamæpityi similis est, præter alia etiam comitiales sanat cum aceto mulso pota. Plinius ampliorem eius vilius medicum descripsit, & nonnihil à Dioscoride dissentit. Prior Anthyllis, inquit, vuluis aptissima, & ex rosaceo & lacte imposita etiam vulneribus. Bibitur in stranguria, renumq; doloribus tribus drachmis. Altera bibitur in duritia vuluarum, & in torminibus, & in comitiali morbo, cum medula le & aceto quatuor drachmis. Repetit eadem alio in loco. Anthyllion est lenius simillima, quæ in vino vesicas vitiis liberat, sanguinem sistit. Altera est Anthyllis chamæpityos similis, &c. Scribit & idem Anthyllides duas esse vuluis vtilissimas, torminibus, & more secundarum in vino potas. Dioscoridi Galenus assentitur. Anthyllis, inquit, duplex est, sed utrâque modice desiccata, ut & vlcera glutinet. Ceterum altera chamæpityi similis quadantenus subtiliorum est partium, adeò ut & comitialibus competat. Quin & ipsa magis quam altera extergere potest.

ANTHYLLIS Marina  
altera Narbonens. Pena.



Lid. 3. c. 136.

Lacum.

Lib. 21. c. 29

Li. 26. c. 8.

Lib. 26. vlt.

Lib. 6. sim.

de dissentit. Prior Anthyllis, inquit, vuluis aptissima, & ex rosaceo & lacte imposita etiam vulneribus. Bibitur in stranguria, renumq; doloribus tribus drachmis. Altera bibitur in duritia vuluarum, & in torminibus, & in comitiali morbo, cum medula le & aceto quatuor drachmis. Repetit eadem alio in loco. Anthyllion est lenius simillima, quæ in vino vesicas vitiis liberat, sanguinem sistit. Altera est Anthyllis chamæpityos similis, &c. Scribit & idem Anthyllides duas esse vuluis vtilissimas, torminibus, & more secundarum in vino potas. Dioscoridi Galenus assentitur. Anthyllis, inquit, duplex est, sed utrâque modice desiccata, ut & vlcera glutinet. Ceterum altera chamæpityi similis quadantenus subtiliorum est partium, adeò ut & comitialibus competat. Quin & ipsa magis quam altera extergere potest.

ERPCA





**A** FOLIORVM similitudine & odore hæc ab herbariis Eruca vel Artemisia cinerea nuncupata est, quæ in maritimis Corcicæ prope Aiacæam gignitur, radice modicè fibrata, crassa, caule sesquipedali, anguloso, lanugine candida, & molli contexto: foliis Erucæ siluestris, aut Artemisiæ minoris profundius incis, auersa parte candicantibus, aduersa cinereis, lanuginosis, densis: flore in vertice caulium, & ad superiorum foliorum exortum velut racematim congesto, spissa lanugine, incano, nigris punctis maculoso, odore & sapore Artemisiæ, cui similes vires habere putatur.

Nomina

Locus.

Forma.

*hæc figura d. regis  
pag. 651.*

CINERARIA, CAP. XVII.



**T**OTIVS plantæ colore cinereo vocata Cineraria, in maritimis prouenit, procera, surculosa, & ramis multis fruticante, lignosis, duris,

Nomen.

Locus.

Forma.

folio Artemisiæ, sed crassiore & ampliore: flore luteo, senecioni simili, copioso, virgulis infidente, in quas caulis fastigium diuiditur. Qui procul hanc plantam aspexerit è Cinereo candicantem, & tanquam lanugine opertam, eam cinere totam conspersam de industria obductamq; iudicauerit, non iniucundo spectaculo, quare Cineraria nomen ei ab herbariis inditum est. Vnicum eius ramulum depinximus, Pena plantam integram, rariorem, & littorum marinorum indigenam, maiorem fru-

CINERARIA.

IACOBÆA Maritima, Pena.



BBB







## SPERGULA MARINA,

## CAP. XIX.

CASSIA Ligneæ,  
Maritima.

SIMILITUDO quæ huic herbæ est cum Spargula vulgari locis umbratis, incul-  
tis, atque etiam aliquando cultis na-  
scente, fecit ut Spargula marina dice-  
retur, quod in maricinis proveniat, hoc illi dis-  
similis, quod ad caulium articulos pauciores, bre-  
viores, & candidiores folia ferat, quodque gustu sal-  
so sit, ut ceteræ plantæ quæ marinam aquam pro-  
ficiunt.

Nomen.

Locus.

Forma.

## CASSIA LIGNEA MARITIMA,

## CAP. XX.



CASSIAM ligneam herbarij plantam istam vocant, cuius nominis causa mihi adhuc est incognita. In maritimis crescit, radicibus copiosis, densis: caulibus multis ex vna radice prodeuntibus, surculosis, lentis, fractisque contumacibus, virgatis: foliis lenticulæ numerosis, per surculos inæqua-  
liter dispositis, gustu adstringentibus. In ramu-  
lorum & surculorum verticibus fructus exi-  
guus eminet, oblongus, niger, umbilicatus, ita gustu adstringens, ut acerbatis nonnihil habeat. Quidam genistæ marinæ genus esse putant, licet siliquas nullas edat.

Nomen.

Locus.

Forma.

Vide pag. 1386



## ERYTHRODANVM Marinum,

## CAP. XXI.



SIMILITUDINE etiam erythro-  
danum marinum nominatur, quod  
in litoribus arenosis gignitur, ra-  
dice prælonga, è rufo rubescen-  
te, lignosa, surculosa: ramulis multis in or-  
bem humi stratis: foliis rubiæ minoris, ex in-  
teruallis ramulos verticillatim ambientibus,  
rigidis: flore pusillo, herbaceo, ex foliorum  
aceruo prodeunte, filis tenuissimis subnixo.

Nomen.

Locus.

Forma.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM  
ERYTHRODANVM      POLYGONVM MARINVM,  
Marinum, Dalech.

Nomen.  
Locus.  
Forma.



POLYGONVM Marinum  
prius, Dalecham.

**M**ARINVM Polygonum ab herbariis planta hæc vocatur, quod rami ut in Polygono alio per terram spargantur, foliisque Polygonum ubiuis nascens imitetur. In littoribus & locis quæ maris fluctus alluit, gignitur, radice è rubro nigricante, crassa, lignosa, paucissimis fibris capillata, sensim gracilescente: caulibus multis, humi stratis, in orbem diffusis: foliis densis, nigricantibus, intervallo dispari caules ambiètibz, Polygono affinibus, sed myrto proximioribus, singulorum foliorum exortum membranofus cortex & candicans cõregit, quasi decidui aut renascẽtis foliis folliculosa squama. Semen nõdum mihi visum. Aliud Polygonum in maritimis fruticat, radice lignosa, nigricante, radice fibrata, caulibus multis, vno & altero cultu procerioribz, cortice subrubro vestitis, ramis: foliis admodũ densis, ramis & furculos orientibus, Polygono mari similibus nõnihil angustioribus & longioribus, gustu in maritimo

POLYGONVM Marinum  
alterum, Dalecham.



Lib. 27. c. 12. falso, alioqui adstringẽte. Herbarij quidam Polygonum siluestre à Plinio descriptum esse putant. Quartũ genus, inquit, siluestre appellatur, penè arboris modo fructu radice lignosa, stirpe cedri rubicundo: ramis sparti binũ palmorum, nigris geniculorum ternis quaternisve articulis, fuere qui Aizoum marinum vocauerint.

GNAP.



MARITIMARVM, LIB. XII.  
GNAPHALIVM MARINVM,  
CAP. XXIII.

1887



NAPHALII nomine plantas aliquot donarunt herbarij, ob densam lanuginem qua operta sunt earum folia, cuiusmodi hæc est quæ in litoreis sabuletis prouenit, radice lignosa, subatra, crassiuscula: caulibus multis, palmum altis, foliis satis densis, gracilibus, longis, angustis, acuminatis, rarissimarini ferè aspectu, incanis. In caulium singulorum verticibus capitula emicant squamatim compacta, turbinata: flos luteus, in pappos abit prolixos, densos, pictorum penicillis similes. Num hæc impia herba Plinij potius fuerit? Sic enim ille. Herba impia vocatur incana, rorisimarini aspectu, thyrsi modo vestita, arque capitata: inde alij ramuli exurgunt sua capitella gerentes: ob id Impiam appellauere, quoniã liberi super parentem excellant. Alij potius ita appellatam, quod nullũ animal eam attingat, existimauere. Est aliud Gnaphalij genus in

Nomen.

Locus.

Forma

Lib. 24. c. 19

GNAPHALIVM Marinum,  
Dalechampij.

GNAPHALIVM Marinum  
Tomentosum.



maritimis quoque proueniens, tomentosum ab herbarijs cognominatũ à densiore lanugine qua totum oblitum est, ut si qua alia plãta, certè hæc Gnaphalij nomine sit dignissima. Radice nititur crassa, longa, lignosa, sæpius excisa: caules edit multos, sesquipedales, foliis circũtectos mollissimis, albis, rutaceis, verũ paulò amplioribus, cana lanugine contectis, gustu adstringenti: flores in summis caulibus congestos, luteos, corymborum specie. Ad dysenteriam vtiliter folia trita ex austero vino bibuntur.

Forma.

Vires.

TRAGVS SIVE SCORPIO MARITIMVS,  
CAP. XXIIII.



TRAGVM & scorpionem de multis plantis dici ex Plinio intelligere licet scribente, In totum spina est asparagus, scordio, nullum enim folium habet, quod de scorpione Theophrasti accipiendum, qui Nepa Latine à Gaza dicitur. Et alio in loco. Tragon & Asia fert (vulgari

Nomina

Lib. 21. c. 15.

Lib. 6. hist.

cap. 1.

Lib. 13. c. 21.

BBB 3



codices Tragion habet) siue scorpionem, veprem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinæ vsum. Et rursus. Est & alia herba Tragos, quam aliqui scorpionem vocat, semipedem alta, fruticosa, sine foliis, pusillis racemis rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ipsa in maritimis nascens. Quib⁹ in locis de Trago loquitur de quo

Lib. 2. c. 1. *TRAGVS siue Scorpio maritimus, Dalechampij.*



*TRAGON, Matthioli & Lobellio.*

*Locus.*

*Forma.*

*de f. j. m. c. l. d. f. c. m. m. l. h. g. f. j. i. o. n. e. s.*



Lib. 2. c. 1.

hæc agimus. Item, Ex argumento nomē accepit Scorpium herba. Semen enim habet ad similitudinem caudæ Scorpionis, folia pauca. Est & alia eiusdem nominis affectuq; sine foliis, aspera caule, in cacumine aculeum habens, & inde nomen. Vbi prioris scorpionis nomine heliotropium magnum intelligit, quod tamen Dioscorides non Scorpionem, sed Scorpionum vocat, & florem habere ad similitudinem caudæ Scorpionis, non semen scribit, ut ipsius etiam rei inspectio demonstrat. Postremo Thelyphonon etiam Scorpionem vocat. Thelyphonon, inquit, ab aliis scorpium vocatur, propter similitudinem radices, &c. Quod de Theophrasto mutatum est. Est & Tragos cerealis, de quo Dioscorides lib. 2. Hic verò de Trago tractamus maritimum, de quo idem lib. 4. quem aliqui, inquit, Scorpionem vocant. Dicitur autem Tragos ut & cerealis ille, non ab hirci aut odore, aut aliqua alia similitudine, sed à τῷ ἰσχυρῶν, id est, à comedendo, unde & trogonem vocari testatur Dioscorides, id est, edule, unde etiam τρυγανία Latine Bellaria dicta, Gallis Dragee. Est autem Tragus verus prout à Dalechampio cognitus, & amicis communicatus, atque ita descriptus antequam recentiorum ullus de eo quicquam literis mandasset. Herba maritima in arenosis tumulis & littoribus gignitur, fluctu maris allidi & obruti, radice crassa, lignosa, longa, cortice fusco vestita: foliis nullis, ramulis quamplurimis, palmatis, altioribus, genistæ modo læuibus, & gracilibus instar equiseti geniculatis, cacumine pungentibus, adnatis multis, vertice quoq; subula militæ tractantium manus perfodientibus: flore minutulo, candido, in oblongum sertum coarctato, semine grano tritici magnitudine pari, anguloso, principio rufo, postea nigrescente, in angulis loculis herbaceis gemino, pediculo ad ramulorum alas subnixis, gustu adstringente. Quæ omnino cum Dioscoridis delineatione conveniunt. Tragus, inquit, nascitur maxime iuxta mare, frutex parvus, per terram oblongus, non magnas, palmi altitudine, aut maior, foliis caret. Verum in ramis adherent veluti acini parvi, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. Plinius iis quos

supra



supra citauimus locis similiter ferè depingit, nisi quod veprem esse ait, & rubètes racemos edere, cum veteres, nec sentibus nec vepribus adnumerarint, heet extremo cacumine pungat, nec rubentem fructum ferat, sed *πῆπῆν*, id est rufum. Huius *Πῆπῆν* fructus acini nimirum decem, inquit Dioscorides, in vino poti, cœliacis & feminis fluxione vuluæ laborantibus auxiliantur. Quidam ipsos tundunt, & pastillos ex ipsis fingunt, quos reponunt, & sic vtuntur. Plinius ramorum cacuminibus, quod Dioscorides acinis, tribuit scribens. Huius ramorum decem aut duodecim cacumina trita ex vino pota, cœliacis, dysentericis, sanguinem excreantibus, mensum abundantia auxiliantur. Matthioli Tragon hunc maritimum, siue Scorpium Dioscoridis eundem cum scorpio facit, de quo hæc Theophrastus. Ergo aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda & scorpium (nepam reddidit Gaza) hæc enim nullum præter aculeum folium habent. Similiter de eodem scorpio Plinium loquentem, citat duobus locis, videlicet. Est & herba Tragos quam aliqui scorpium, &c. Et spinosarum multa species, &c. Cum hic de scorpio Theophrasti intelligendus sit, ille de hoc Dioscoridis scorpio, siue Trago longe diuerso. Tragus autem quem Matthioli depinxit, de quo in lib. De Spinosis Dioscoridis Tragus non est, sed Kali spinosum propius ad eam speciem accedens, quam crithmum alterum faciunt: est enim sicculeuta herba, nullos acinos rufos habet, tritico pares, supernè acutos, numerosos, magnopere adstringentes: quæ omnia Dioscoridis Trago insunt, quem sine foliis & spinis ille descripsit. At Tragon Matthioli folia Aizoi carnosa habet, spinis horrida, attritionem penitus nullam. Hoc sic expressit Lobellius, figura a Matthioli pictura & satis diuersa.

## TRIPOLIUM DODON. CAP. XXV.



*ΤΡΙΠΟΛΙΟΝ* Græcis, similiter Tripolium Latinis, Serapioni *Turbid* dieitur, non illud quidem Mesues & Auicenna *Turbid*, sed aliud quod ab illo plurimum distat. Vulgare eius nomen nullum, quod sciam, nisi quod nonnulli *Camomille bleue*, vel *Marguerite bleue*, c. 330. lianp.

## TRIPOLIUM, Dodon.



non rectè vocant, cum neque in chamæmeli, neque in bellidum generibus sit: ferunt autem vocatum Tripolium, quod flores ter die colorem mutet. Hic ex Dodonæo depingitur, & describitur ab eodem foliis longis, latis, viridibus, læuibus & lubricis, glasti foliorum effigie, inter quæ caulis erigitur rotundus, sesquipedalis & maior, similibus foliis vestitus, nisi minora essent, circa summum in multos ramulos fissus, in quo flores venusti, purpurei antequam dehiscant, hiantes verò lutueam intus coronam ostentant, foliolis caruleis eam ambientibus, effigie chamæmeli floribus similes: quibus depereantibus succedit semen hirsutum, candidum, quod in auris abiteradix longa est, crassa, crassiusculo cortice amicta. In littoribus maris mediterranei & Oceani copiosè prouenit, quæ æstus maris reciprocus sæpe alluit, vt aliquando aquis obruatur, aliquando in sicco hæreat. In Zelandia magna copia inuenitur. Tripolium vulgare, & Tripoliū littoreū vocat Lobellius & Pena. Iulio & Augusto mensibus *Tempus*.



TRIPOLIVM *Vulgare,*  
*Lobellij.*

Li. 4. c. 40.

Vires.

Li. 16. ca. 7.

Lib. 21. c. 7.

TRIPOLIVM *Minus,*  
*Lobellij.*Lib. 9. lib.  
cap. 21.

Li. 17. c. 20.

Cornar.  
Embl. 17.  
lib. 4.

Id, inquam, male intellectum, neque ad polium pertinens ex Theophrasto per-  
tit, ut declarat ipsius Theophrasti verba, quæ modo citata proxime consequuntur.  
Καὶ τὰ περὶ τῆς διχέας δὲ τῆς διδοξίας ὁμοίως, καὶ μᾶλλον. διχέαν γὰρ φασὶν εἶναι  
ἀνίσπρον, &c. Qui locus ut rectius intelligatur, scire licet Theophrastum de

floret. Quæ omnia satis apte Dioscor. Tripolio  
congruunt, sic scribentis. Tripoliū nascitur in  
maritimis locis, quos alluit mare, & refluit, neq;  
in sicco, neque in mari. Folia habet, fatidi simi-  
lia, crassiora tamē, caulem palmi altitudine, su-  
perne diuisum. Narrant huius florem ter die  
colorem mutare, mane album, meridie purpu-  
reum, vespere Phœniceum. Radix alba est, odo-  
rata, calidi gustus. Hæc pota in vino drachma-  
rum duarum pondere, per alium aquam ducit,  
& vrinas. Secatur etiam in alexipharmaca. Pli-  
nius, Tripolium, inquit, in maritimis nascitur  
faxis, ubi allidit vnda, neque in mari, neque in  
sicco, folio satis crassiore, caule palmo alto, in  
mucrone diuiso: radice alba, odorata, crassa, ca-  
lidi gustus. Datur hepaticis in farre decocta.  
Hæc herba eadem videtur quibusdam quæ po-  
lium, de qua suo loco diximus. Hæc Plinius. Qui  
sanè & ipse ex iis est qui polium cum Tripolio  
cōfundunt. Quod enim Theophrastus de Tri-  
polio, id Plinius de polio scripsit, Musæum &  
Hesiodum citans his verbis, Saliuncā vestibus  
interponi gratissimum, sicut apud Græcos po-  
lium herbam, inclytam Musæi & Hesiodi lau-  
dibus, ad omnia vtilem prædicantium, super  
cætera ad famam etiam ac dignitates proli-  
scit, si modo, ut tradit, folia eius mane can-  
dida, meridie purpurea, sole occidente canis-  
aspiciuntur. Duo genera eius, campestre maius,  
silvestre quod minus est. Quidam Teuthriam  
vocat. Folia canis hominis similia à radice  
protinus, nunquam palmo altiora. Theophras-  
tus verò. Καὶ ὡς δὴ φασὶν, inquit, τὸ περὶ τῆς  
χρῆσις ἡσιόδοι καὶ μισοδίου, εἰς τὴν περὶ τῆς  
χρῆσις εἶναι. διὰ τὴν ὁρμήν αὐτοῦ νύκτωρ, καὶ  
πρὶν εἰς αὐτὸν. Id est, Et, ut aiunt, Tripolium Hesio-  
do & Musæo auctoribus, ad omnē rem ferien-  
peragendam vtile: quare id effodiunt nocturno  
bernaculo structo. Sic aperte Plinius polium  
Tripolio conuertit. Gaza tamen Plinium  
tasse secutus polium etiam reddidit. Quod  
tem Plinius adiicit, superq; cætera ad famam  
etiam ac dignitates, &c. Et quod rursus aliqui  
to post ad idem polium refert, Polio, inquit, Mi-  
seus & Hesiodus perungi iubent dignationis  
gratia, gloriæq; audios polium tractare, colore  
theo



thera cuius radices è vino datæ mores mitiores hilariorésque efficiunt locutum, subiungere. Non videtur autem hoc absurdum. Nam velut assumptio quædã fit eius quod vinosam vim habet. Verum stolidiora illa & magis incredibilia (legendum enim *Ανθερακη & Πικανόθερα*) & amuleta, & omnino alexipharmaca, & quæ corporibus, & quæ domibus adhibentur: & vt aiunt, Tripoliũ ex Hesiodi & Musæi sententia, ad omnem rem grauem aggrediendam vtile esse. Quare etiam noctu tentorio fixo ipsum effodiunt. Sed & ea quæ ad bonam famam, ac existimationem pertinent similiter, & adhuc magis. Bonam enim famam dicunt facere antirrhinum, &c. Præterea foliorum polij colorem ter die mutari scribit Plinius, quod de Tripolij floribus tradidit Dioscorides. Tripolij breuissimè meminit Galenus Li. 8. simpl. his verbis. Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Hec ille. Recentiorum quidam aiunt huius herbæ folia vulneribus omnibus perutilia esse: eorũque succum instillatum, aut ipsa contusa & imposita, ea conglutinare. Aliud Tripolium Lobellius pinxit, ad Padi ostia proueniens, longè minus Montepeliaco, minorem Conysam folio, radice, & flore vix æquans.

## GRAMEN, OXYAGROSTIS MARI, CAP. XXVI.

**G**RAMEN hoc in maritimis prouenit, radice longa, rufa, geniculata, lignosa: foliis graminis, circa radicem multis: caule pedali, iunceo, læui, tereti, enodi, foliis nudo, corticofo, ac squamoso capite, ex luteo rufescente, foliolis duobus vtrinq; subiectis, & veluti cornua prominentibus. Est & graminis marini species secundo loco picta, Oxagrostis marina merito dicenda: in maritimis enim crescit, radice non geniculata, vt in superiore Locus.  
Forma.

GRAMEN Maritimum,  
Dalechampij.OXYAGROSTIS Maritima,  
Dalechampij.

Gramine, sed fibris multis capillata: caule pedali, furculoso, nodoso, foliis ad singulos nodos geminis prodeuntibus, longis, angustis, gramine similibus, atrociter prætereuntes pungentibus.

XYRIS



Forma.



Nomina

Locus.

Forma.



INTER permulta & varia purga-  
mēta quæ in littora fluctus eiciunt,  
planta hæc sepius reperitur, quam  
Xyrim marinam vocant herbarij.

Radice est longa, crassa, geniculata, cortice rufo  
obducta, multum fibrata: caule pedali, foliis vir-  
diq; aggestis operto, longis, virgatis, in cacumi-  
ne mucronatis. In caulis fastigio tres quatuor-  
ve siliquæ prominent, & ipsæ rufescentes, an-  
gulosæ, seminibus fæctæ velut compressi dila-  
tatis, rufa membrana contectis, perspicua tamē  
vtrinq; macula in medio nigra, cum mandun-  
tur lignosis & duris, gustu subadstringentibus.

CICHORIUM BULBOSUM.  
CAP. XXVIII.



ST & hæc planta maritima, quæ à  
foliorum effigie & à radice Bul-  
bosa Cichorium bulbosum iure  
dicitur, in arena maris proveni-  
ens.

radice bulbosa, articulorum veluti cingulis distincta, superiore & inferiore parte  
exilibus fibris villosa, oblongum, geniculatum, & crassiusculum caulem ex se emi-  
tente, terræ instratum, quamplurimis, ac valde exilibus fibris ex geniculorum no-  
dis huc illuc se spargentibus, & arenis se infigentibus: foliis Cichorij in ambi-

CICHORIUM Bulbosum,  
Dalechampi.

Lib. i. hist.  
cap. ii.




Li. ii. ca. 17.

tu dissectis, paucis, lacte manantibus, gustu  
non insuavi, flore luteo, hieracio simili in pap-  
pos abeunte. Quidam perdicium esse suspici-  
tur à Theophrasto memoratum his verbis.  
Καὶ τὸ περδικιον καλεῖσθαι, καὶ ὃ τὸ παχέας  
καὶ πλεῖστος ἔχει τὰς ρίζας, ἢ φύλλα. καλεῖται δὲ  
περδικιον, διὰ τὸ τὰς περδικας ἐγκύλιε εἶναι.  
Id est, Et perdicium. Etenim id crassas & mul-  
tas habet radices, aut folia: vocatur autem per-  
dicium, quod perdices ad id se volent, & id  
effodiant. De quo Theophrasti perdicio (hoc  
enim nomine diuersi auctores diuersas plantas  
nuncuparunt) statim post Cichorium vulgare  
loquitur Plinius. Cichoriū & similia circa tota  
folia habent, germinantibus ab radice post Ver-  
gilia. Perdicium & aliæ gentes quàm Aegyptij  
edunt: nomen dedit auis id maxime crucis.  
Crassas plurimâsque habet radices. Quæ ex  
Theophrasto Plinium conuertisse perspicuum  
est, nisi quòd ab Aegyptiis, aut ab aliis gentibus  
edi Theophrastus non scripsit. Sic nostrum illud  
Cichorium crassas habet radices, nempe bul-  
bosas, & non solum plurimas, vt ait Plinius, sed & folia, vt scribit Theophrastus, in  
quib; radículas innumeras ex caulis humi iacentis nodis prodeuntes intelligat.

N A ST






THLASPI Maritimum,  
 Dalechampij.

**N**ASTURTIVM marinum in sabu- *Locus.*  
 losis maritimis provenit, radice *Forma.*  
 candicante, multiplici, caule pe-  
 dali, folio Nasturtij hortensis, acri:  
 flore purpureo, copioso, semine in loculis ha-  
 ste auspici similibus, rara mirabilique figura, &  
 huic planta penè dixerim peculiari.

THLASPI MARITIVM,  
 CAP. XXX.

**T**HLASPI marinum idq; minimū *Locus.*  
 in maritimis profilit, radice ligno- *Forma.*  
 sa, longiuscula, in furculos diuisa,  
 candida: caulibus multis, dodran-  
 talibus, simplicibus, foliosis: foliis multis, exi-  
 guis, angustis, longis: flore in summis caulibus  
 copioso: semine flauo, lato, thlaspi simili, acri in  
 loculis turbinatis concluso.

CHAMÆMELVM Maritimum,  
 CAP. XXXI.



**C**HAMÆMELVM & arenis mariti-  
 mis gignitur, radice nigra, crassius-  
 cula, in fibras multas diuisa: cauli-  
 bus multis, humi sparsis: foliis co-  
 tula grandioris, in caulibus vtrinque dispari si-  
 tu dispositis: flore leucanthemi. Quidam cotu-  
 lam marinam vocant.

CHAMÆPEUCE Maritima,  
 CAP. XXXII.

**C**HAMÆPEUCE MARITIMIS quoque nasci-  
 tur, radice crassa, oblique exporre-  
 cta, tota inferiore sui parte radicu-  
 las multas mittente, carnosas, su-  
 periore verò caules multos propè radicem, ve-  
 lut tubis in sese mutuo faretis coagmentatos,  
 furculosos, foliis piceæ aut asparagi, disparibus  
 interuallis ex caule prodeuntibus, vno coalitu  
 multis, & tanquam in penicilli comam congestis: flore paruo, purpureo, ex furcu-  
 lorum alis emergente. Sunt qui asparagi marini speciem esse contendunt.

CHA





## ERVCA MARITIMA, (AP. XXXIII

Nomina

Forma.



## ERVCA Maritima.



Locus.

Vires.

PLANTAM hanc Doct. Myconus Erucam marinam vocat, quod si-  
pore Erucam æmuletur, & nō nisi in maritimis nascatur. Catholani  
etiam *Rucas de mar*, id est, Erucam marinam, appellāt. Ad cubitali  
altitudinem attollitur, folia habet crassa, lævia, laciniata, ad senectu-  
tis folia accedentia, pingua, succosa, humi-  
pentia, infernè quandōque rubescencia ex quo-  
rum medio cauliculi tres, quandōque plures  
prodeunt, ab imo rubescens, rotundi, striati,  
surculosi, læves, solidi, modo recti, modo humi-  
iacentes: in quorum verticibus flosculi emic-  
purpurascens, raphani floribus similes: semina  
in siliquis triquetris concluditur minutum  
dices longæ, tenues, candidæ, intus lignosæ, per  
summa arenæ sparsæ, gustu aliquantum acres.  
Nascitur in arenosis maritimis, ut diximus, flo-  
ret Aprili & Maio. Foliorum, caulis, denique  
totius plantæ sapor acris est, cum quadam amar-  
ritudine, & medius inter Erucam & Sinapi-  
Hæc fere Myconus. Qui præterea scripsit se  
frequenti experimento observasse & comper-  
tum habere, aquam huius plantæ stillatitiam  
tepidam, quatuor unciarum pondere mane per-  
tam, colicis doloribus, nephriticis, calculosis  
mirè conferre. Eadem planè, vel certè similis  
huic est planta quæ à Lobellio & Pena Cakile  
Serapi-  
Serapi-



CAKILE Serapionis, Lobel.

PARTHENIVM Ma-  
ritimum minimum.

Serapionis Erucæ folio, napi flore, vulgo Erucæ marina dicitur, quia non nisi in littoribus maritimis, aut inde in hortos translata reperitur: plurima autem prope Venetias & Magalonam, foliis laciniatis, diuisura crebra senecionem, vel Erucam, nisi crassiora, & candidiora essent, referens. Flores autem purpureos iuxta caulium ramulos sparsos, magnitudine & similitudine napi habet: semen oblongum, mucronatum, fungosum, ex singulis floribus secundum caulem binos, sibiq; mutuo apicem duntaxat cohaesum iunctos, gustu Erucæ aut napi, salso: radicem lignosam. Strenuè purgare asserit Anguillara.

q. radice & ligno  
intra mar. & de  
caule cakile serap.  
serapionis.

## PARTHENIVM Maritimum.

CAP. XXXIIII.

**M**ARITIMUM & minimum Parthenium siue Cotulam exhibuit Pena: quæ ad Celtij Narbonensis radices non procul à piscatorum attingit oritur, & cichorio bulboso lubens associatur. Exilibus palmaribus cauliculis humi sternitur, quibus folia insunt Caphthalmi vulgaris paria, diuisura bellidis maioris, carnosâ, odore feriente, putidulo, cotulæ vulgaris, floribus non ita dissimilibus. Vires autem nec inferiores, nec dispares. Permultæ sunt aliæ plantæ maris accolæ, vt diximus, sed aliis eiusdem generis ita affines, vt ab iis disiungi, ac diuelli commodè non possint. Quare non hac, sed eadem cum illis tractatione comprehenduntur.

## IVNCVS MARINVS,

CAP. XXXV.



**I**VNCVS marinus gramineus Pseudoschœnanthum etiam dicitur, quod specie, magnitudine, culmo, colore vero schœnantho similis sit, adeo vt illius congenerem esse quidam dixerint. Sed viribus quàm maximè differunt. Præcioso, papposo, dense congesto in vulpinam eandem quincuncialem & sex uncias longam, sericeo argenteo ve nitore alopecuri ritu fastigiato. In Adriaticis littoribus frequens occurrit, & aliis mediterraneis, vt in litore mediterraneo

CCC



*MARINVS Gramineus*  
*Iuncus, Lobell.*



*PASTINACA marina* Pen.  
*& Lob. Crithmum I I. Matth.*



agri Montpelienſis pone aquas marinas. Hæc ex Lobellio. Maximum altum depinxit Pena, qui tantum in littoribus, & arenis Narbonæ & Galloprovinciæ reperitur, vis ſequipalmum & pedem æquans, foliis multis, tenuibus, candicantibus, anguſtis, & caule ſequipalmari duplo longioribus, ſentis, ſparſis, inflexis, è radice nigra, ſimpliciore cyperi longi modo, geniculata, longius ſerpente, multis tribus capillata, ſapore grato. In ſummo caule ſoliola plurimum terna conſpiciuntur, tres pollicis longa, ſlos globosus, lanceis ſeminibus glomosis ſtipatis, alperiuſculus, ex fulco & purpureo pallidulus, ampelopraſi magnitudine & figura.

*PASTINACA MARINA,*

CAP. XXXVI.

**C**RITHMVM ſecundum Matthiolum facit plantam hic appictam. Cortuſo miſſam, quæ ſcnicum marino, Crithmo primo ciuilem, ſeſe ſimilis eſt, niſi foliis eſſet anguſtioribus, cacumine mucronatis, atque pungentibus, ſo & acuto ſapore: caulibus magis ſuccoſis, gerioribusque, in quorum cacumine ramuli exeunt bini, terni, quaterniue, ſinguli ſingulas umbellas ferentes, albis ſloſculis reſertas, è quibus ſemen oritur ſcniculo quadamtenus ſimile, ſpinulis obſitum: cui ſimilem quoque radicem profert. Dodonæus, qui etiam ſcniculum marinum Crithmum primum eſſe arbitrat, hanc plantam Crithmum ſecundum ſtatuit, & Crithmum ſpinoſum vocat. Rectius, opinor, Pena & Lobellius Paſtinacam marinam, quæ in maritimis ſabuletis Narbonenſis Prouinciæ inter eryngia naſcitur, cuius radices erutas per becula eſcit, & Paſtinacam marinam vocat, ſunt enim prorsus eodem ſapore, nec longe à figura abſunt. De tertio Chriſthmi genere Matthiolo tradito diximus hoc libro.

LENT



## LENTICVLA Marina Serapionis, CAP. XXXVII.

**S**ERAPIO Lenticulæ marinæ meminit, quam ex Lobellio hic representamus. Tyrrheni maris & Adriatici indigena est, inquit, foliis angustis Oxyridis scopariæ dictæ, in flexilibus loricatis petiolis sesquipalmaribus refertis & onustis, copiosis baccis, vacuis, membranaceis,

Cap. 37.  
simp.

LENTICVLA marina Serapionis,  
Vua marina quorundam.



LENTICVLA marina  
ferratis foliis, Lobell.



teretibus, lenticulis similibus & paribus, vnde ei nomen. Est huic persimilis & eadem, nisi latiora & breviora, nonnihil ambitu ferrata essent folia.

## EX SVRCVLIS ARBORVM CONCHAE ANATIFERAE, CAP. XXXVIII.

**M**VLTA à veteribus Historicis literis mandata fuere, falsi suspecta, imo fabulosa & risu digna credita, quæ tandem à verò non abhorre cogimur fateri, à natura magis stupenda miracula nobis ob oculos ponente. Quid enim admirabilius quam ex putridis nauium ligas, aut ex arborum stipitibus furculisve in litus proiectis, & maris alluvionibus perpetuò irrigatis conchas, & ex iis aues generari? At id verissimum esse non solum testantur Septentrionalium rerum Historici, sed etiam harum rerum studiosi & curiosi viri, qui viderunt non solum in Scotia, ut illi narrant, aut Orcadibus maris Caledoniæ Arctici, olim à Romanis classe deuictis, sed etiam in Anglia, & Gallia Britannia. Scribunt Pena & Lobellius se ad Tamesim amnem, qua Londinum præterfluit, conchas pediculo rugoso, crassiore, è naui annosæ carina auulsas habere. Sunt ex conchâ pusillæ, circumatæ ferè rotunditatis, foris albidæ, lucidæ, leues, tenuitatemque testæ ouacæ fragilem, biforem Mytuli modo præferentes,



EX *Surculis Arborum Concha Anatifera.*

nuci Amygdalæ compressæ pares. Pendulae autem hæ erant foris ad imum ventricosa nauium carinæ, cui musco & limo semiputride innati erant, quasi fungi pediculi, quos fere vrachum vmbilici parui dixisses, cuius extremum, fructuum ritu inferebatur latiusculæ bali conchæ, quasi vitam alimoniamq; inde suggerent auiculæ, quarum auicularum rudimenta è summa parte conchæ hiantis conspiciuntur. Pediculos istos ferunt Historici, primum è vermiculis concreari, quod non potuerunt illi scire, neque adhuc credere. Præterea certò alierunt, easdem conchas elegantissimè efformari è surculis arborum temerè quàm maris æstus aluit, proiectarum enasci. Earum conchas quæ humi & in sicco manent, emori. Ex iis quæ in maris alluionibus rapiuntur, aues excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adulescere. Has Angli, & Britanni Galli *Barnades* vocant. Scoti *Clakis*, qui his auiculis abundant, & capiuntur dum per brumam gelu concreuerint paludes. Sapit nobis hesitantibus, inquit Lobellius Anatem, aut Anserem siluestrem.

## LIGNA LAPIDEA,

## CAP. XXXIX.



ST & id permirum, sed verum, quod & vidi, & tradunt Pena & Lobellius, esse amnes & rivulos, quibus merfi pali lignei, motu contive, aliquot mensibus lapidescunt, mox re in ferri naturam abeunt, eadem perstant superficie, situ striarum, & fibrarum ductu pristino: & quas eminus assulas ligni dicunt, atrectando & lapidi illidendo, dicas esse lapidem ferri metallo immixtum, soliditate gravitate, duritie, & duratione lapideæ, nec flammis obnoxia.

THALLVS HOLLADICVS,  
CAP. XL.

THALLVS, in maritimis Hollandiæ, ac Zelandiæ arenosis gignitur, hominis pudendo suo præputio contexto adeò similis, ut nomen sit tributum. Siue integrum, & par-

bus adhuc suis constantem, ac compactum, minimè diuisis, siue in partes è quibus componitur, iam discissum inspiciamus, ad verendorum hominis figuram sic accedit, ut in eo generando luisse natura videatur lasciuius, succo in arenis frigidis




ficcisq[ue] reperto, è quo penem hominis fingere meditata sit, afflatu etiam maris fortassis adiuta, cuius vim maximè genitalem esse periti rerum naturalium omnes restantur, & suis Poëtæ fabulis indicant, τὴν ἀναδυσσάμενην ἀπὸ τοῦ ὕδατος veribus celebrantes, nempe Venerem è maris fluctibus exorientem, ac emergentem. Posteriore parte velut inter duas prominulas nates, cauum pater: (malo enim cum podice comparare, quàm cum muliebri vulua.) In id cauum, tanquam in Scroti fundum, tenue filum subit, bifidum, quo tanquam radice, in arenoso solo defigitur. Quod terræ proximum est, Bulgæ figurâ, inferiora Phalli operit, extremaq[ue] ora lacinia- ta, in apices extantes diducta, vndiq[ue] illum amplectitur, rugosi Scroti quadam imagine. Bulga detracta subest aliud inuolucrum, tanquam elytricides tunica in hominis testiculis. Superiore angustius, ac minus, Phallum circundans orbe sim-

PHALLVS Batauicus  
integer.



PHALLI Batauici  
separate partes.



Phallos. & penis  
grævis vel coriaceus  
hinc ligni Phallus qui  
in præputio habetur præputio  
hinc vel coriaceus

Volva & tanquam scrotum.

Veretrum præputium.

plici linea circumeunte, non tamen continuato, sed interrupto rima, quæ veluti duorum testium interuallum, ac interstitium ostendit. In tuberculum subrotundum id definit, radici vicinum, cui radix inferitur. Inde penis in longum porrigitur, mentulæ specie, punctis quibusdam notatus, in summo, sub præputio, pertusus, rotundo foramine, quod in extremo hominis veretro fissuram imitatur, quæ vrina profluit. Munit summum illud fastigium, & vestit præputium, (sic enim aptissimè vocari potest,) vndiq[ue] circumuolutum, cutis plicatis modo. Extrema parte præputij, carnosus osculi rotundus, velut apex eminet, fistulosus, pelle circum crispata, humani præputij corrugato fini similis. Raræ huius & admirabilis plantæ exactiorem & ampliorem historiam tradidit, vulgato de eius forma libello, Belga quidam, vir huius tractationis studiosissimus, ac imprimis diligens.



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1702/D Vol. 2





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS  
TERTIVS,

In quo omnes planta, quæ non nisi aliis innixæ scandunt, describuntur.

## VITIS, CAP. I.



TIRPIVM quidem plurimarum erecta est ad cælum natura, nostræ perfectionis æmula, cœli appetens, longe quàm nos fœliciùs, qui frustra spectamus ipsum, nec nisi terram sapimus, vt ait Scaliger, tamen nonnullæ sunt natura tam imbecilles & caducæ, vt nisi radicis & pedamentis fulciantur, vel nisi pergulis, sepi- bus, arboribus, fruticibus adnascantur, aut prope ista ferantur, vel iis veluti adminiculis nixæ attollantur, & adolefcent, per humum repentes aut aridæ & exu- cæ permaneant, imperfectæque frutificent, aut breui

emorianantur. Quæ res differentiam perspicuam parit, quæ stirpes istæ ab aliis se- cernuntur, quæ nullius fulcri ope sese attollunt, adolefcent, vigent, florent, & fructus perfectos edunt. In illorum genere vitis habetur, quæ sursum versus serpit, omnibus tum facie, tum liquore suauissimo quem fundit, notissima. Eam hic intel- ligimus quæ Græcis ἀμπέλος διωφώρος, & ἀμπέλος ἡμερος, Latinis Vitis vinifera, & sati- ua seu culta nominatur, Arabibus Harin, karin seu karni, Italis Vite vinifera, Germa- nis Uueiureb, Gallis Vigne. Dicitur autem ἀμπέλος quasi ἐμπήλος, vinea, quia πηλὸς olim vinum significabat. Vitis verò à vino, vel, vt scribit Ruellius, quoniam inuite- tur ad vuas patiendas. Innumera vitium reperiuntur genera. Quare singula perse- qui superuacaneum fuerit: quandoquidem varietatem accipiunt multiplicem à soli conditione, morèque, & solis ab æquatore inclinatione. Si quis tamen illa dis- quire desiderat, rei rusticæ scriptores Pliniumque legat, qui profecto non omnia, sed maximè insignia persecutus est: quippe quæ totidem pene sunt, inquit, quot agri. Hoc tantum dicam, vites quasdam esse simplices in prouinciis quibusdam, quæ per se sine vlllo pedamento, vt ait Plinius, artus suos colligunt, & breuitate crassitudinem pascunt: alias arbustinas, quæ Græcis ἀνὰ δένδρα παδες, & δένδρα πιδες dicuntur, ipsa verò arbusta quibus maritata fulciuntur, eisdem nominantur voci- bus. In Campaniæ agro, vt ait Plinius, populis nubunt, maritæque complexæ, atq; per ramos earū procacibus brachiis geniculato cursu scandētes, cacumina æquant, in tantum sublimes, vt vindemiator authoratus rogum ac tumultum excipiat. A ra- dice vitis caudex vnus contortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multi- plici cortice vestitur, rimoso, membranaceo, flagellis longe latèque vagantibus, & per extremum sarmentorum foliis latis, multifidis, platani aut aceris diuisura, & per extremum

Nomina

Vile Rhysop. pag. 59

Genera. ἀμπέλος δὲ

ἀμπέλος ἀμπέλος

Lib. 14. c. 2. necro inghi

& 3. quæ quædam

Lib. 14. c. 2. per se non re

quæ

Ibidem

Forma.

Lib. 14. c. 2. ἀμπέλος quæ

quæ quædam



VITIS *Vinifera.*

Lib. 14. c. 1.

*Vires &  
Tempor.*  
Lib. 5. c. 1.Lib. 23.  
proem.

ferratis, quæ ex longo pediculo pendula læsciuunt: floribus fructum ambientibus, lanuginis. Vua compluribus acuiis aceruata, seminibus tunica clausis. Acini numerosi, qui magnitudine, colore, saporibus multiplicantur in vino, hîc purpureo lucêtes colore, illic fulgentes roseo, nitentêsq; viridi. Candidæ enim vugnigræque vulgares. Tument verò mammarum modo Bumasti, vt scribit Plinius: prælongis dactyli porriguntur acinis. Est & alia natura læsciuia, vt pregrandibus adhæreant pergulis parui, mites, & suauitate certantes, Leptoragis vocant. Vini omnes in vniuersum facultates ex Dioscoride, Plinio, Galeno, commemorare læperuacaneum & tadio plenum foret. Quare aliarum vitis partium vsum medicum exponemus. Vitis vinifera folia capriolique trita & lita, inquit Dioscorides, capitis dolores stomachique inflâmationes & ardorem cum polenta mitigant, folia etiam per se imposita, vt potus quæ refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsopotus dysentericis, sanguinem expuentsibus stomachicis, & citta laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua caprioli & poti eadem efficiunt. Lachryma verò eius quæ veluti gummi in eius caudicibus concrefcit, pota cum vino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat. Oportet autem locum nitro antea confricasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta pilos denudat: potissimum aquosus humor, qui ex incensis viridibus sarmentis exudat. Hîc etiam myrmecias inunctus eiicit. Cinis sarmentorum & vinaceorum circa sedem quæ antea ablata amputatæ sint codylomata & thymia, cum aceto illitus sanat. Confert luxatis & viperarum morsibus, lienis inflammationibus cum rosaceo & ruta & aceto illitus. Plinius ea ex Dioscoride referens, in paucis ab eo dissentit, folia vitium, inquit, & pampini capitis dolores, inflammationesque corporum mitigant cum polenta, folia per se ardores stomachi ex aqua frigida: cum farina verò hordei articulares morbos. Pampini triti & impositi, tumorem venenem siccât. Succus eorum dysentericis infusus medetur. Lachryma vitium, quæ veluti gammi est, lepras & lichenas, & psoras nitro ante præparatas, sanat. Eadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet, maximèque aqua, quam viturides accensæ vites exudant: qua & verrucæ tolluntur. Pampini sanguinem excreantibus, & mulierum à conceptu defectioni diluti potu profunt. Cortex vitium & folia arida vulnerum sanguinem sistunt, ipsûmque vulnus conglutinant. Vitis alba viridis tusæ succo & thuræ, impetigines tolluntur. Cinis sarmentorum vitiumque & vinaceorum condylomatis & sedis vitii medetur ex aceto: item luxatis & amputatis, & lienis tumori, cum rosaceo & ruta & aceto. Item igni sacro ex vino cinis oleum aspergitur: & intertrigines & pilos absomit. Dant & bibendum cinerum sarmentorum ad lienis remedia aceto cõspersum, ita vt bini cyathi in tepida aqua bibantur, vtque qui biberit in lienem iaceat. Clauiculæ ipsæ quibus repunt viturtritæ ex aqua potæ, sistunt vomitionum consuetudinem. Cinis vitium cum axungia vetere, contra tumores proficit, fistulas purgat, mox & per sanat: item & nervorum dolores frigore ortos, contractionesque: contusas verò partes cum oleo: canines excrefcientes in osibus cum aceto & nitro: scorpionum & canum plagas cum oleo.



oleo. Corticis per se cinis combustis pilos reddit. Quas mulieres Dioscorides  
*κισσώσας* dixit, Plinius mulierum à conceptu defectionem interpretatur. Id ma-  
 lum *κίτξ* dicitur, quod vitium auctore Paulo, accidere cōsuevit: tertio à conceptu  
 mense potissimum, varia & à natura aliena mulieribus appetētibus, veluti carbon-  
 es extinctos, cretam cimoliam, aliāque complura, ob vitiosa quæ in ventriculi tu-  
 nicis continentur excrementa. Plinius Malaciam stomachi vocauit. Præterea cine- Lib. 28. c. 7.  
 rem vinaceorum dixit *τέφραν τῶν στέμφυλλων*. Sunt enim *στέμφυλα* Caleno auctore,  
*ἡ τέρειά λείψανα τῆς σταφυλῆς, ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ληνοῖς ἐκτρίβῃ πάς ὁ χυλὸς αὐτῶν. ἡ καὶ ἀνθε-  
 σσωπιθέασιν ἐν πύθοις δι' ἀνθρώποις, σφῆγγονίς τε καὶ πηλιδωπτες ἰχυρῶς, ὀνομάζονται τε ῥύγα  
 αὐτοῦ τῶτο, ὅπερ ἔγωγε στέμφυλον ἐχέμεν. τὴν δὲ τῶ στέμφυλλοι παροσηγορεῖται ἐπιφύεσθαι αὐτῶν τῶν  
 κλημεῖων ἐκπεφυκότι ριζώματι τῶν βλαστῶν.* Id est, Sunt enim stemphyla id est vinacea,  
 solida: vuae reliquæ, quum in torculari succus ipsius omnis prorsus expressus fue-  
 rit, quas etiam homines in doliis componunt, stipantes ipsas valde atque constrin-  
 gentes: appellantque id ipsum *τρύγα*, id est, facem, quod ego *στέμφυλον*, id est, vina-  
 ceos appellauit. Nomine autem *στέμφυλλοι* id est, vinaceorum, acinorum radicem quæ Lib. 23. c. 1.  
 ex palmite enascitur, appellant. Plinius sarmenta vuarum in quibus acini fuere  
 nuncupauit: Columella, pedem & Scipionem acinorum: fructus verò vitis facul-  
 tates hæ sunt ex Dioscoride. Vua (Græci *σταφυλήν* à Staphylo liberi patris filio ap-  
 pellat) recens quæuis aluum turbat, & stomachum inflat. Minus horum parti-  
 cepts quæ aliquandiu decerpta pependit, quod in ea copia humoris exaruerit. Sto-  
 macho accommodata est, appetentiāque cibi excitat, & imbecillis conuenit.  
 Quæ autem in vinaceis aut vinario vase seruata sunt, ori & stomacho grata sunt.  
 Aluum sistunt, vesicam tamen & caput tentant. Profunt sanguinehi expuentibus.  
 similes iis sunt quæ in mustum coniectæ sunt. Sapa verò aut musto condita sto-  
 nachum magis infestant. Reponuntur & caelesti cum aqua, prius passa factæ,  
 minuscule vinosa fiunt, siticulosos, ardentibus & longis febribus viles. Vinacci-  
 zorum reconditi inflammatis, duris, turgentibusque mammis cum sale illinun-  
 tur. Vinaceorum decoctum dysentericis, cæliacis, & fluxui muliebri infusum  
 confert. Ad infusions quoque ac clysmata assumitur. Nuclei acinorum adtrin-  
 gunt, stomacho grati. Testi autem & triti, & pro farina illiti, dysentericis, cæliacis,  
 & stomacho resoluti profunt. Plinius de iisdem eadem ferè tradit. Recentes vuae Lib. 23. c. 1.  
 stomachum & spiritum inflant, aluumque turbant: itaque in febre damnantur, uti-  
 que largiores. Grauedinem enim capitis, morbumque lethargicum faciunt. Inno-  
 centiores quæ decerptæ diu pependere: qua ventilatione etiam viles fiunt stoma-  
 cho agrisque: Nam & refrigerant leuiter, & fastidium auferunt. Quæ autem in  
 vino dulci condita fuere, caput tentant (Alij legunt, Quæ in vino aut dulci con-  
 dita fuere &c.) Proximæ pensilibus palea seruata. Nam in vinaceis seruata & ca-  
 put, & vesicam, & stomachum infestant. Sistunt tamē aluum, sanguinem excrean-  
 tibus utilissimæ. Quæ verò in musto fuere, peiorem vim etiam habent, quàm quæ  
 in vinaceis. Sapa quoque stomacho inutiles facit: saluberrimas putant medici in  
 caelesti aqua seruatas, etiam si minimè iucundas: sed voluptatem earum in stom-  
 chi ardore sentiri, & in amaritudine iecoris, fellisque vomitione in choleris, hy-  
 dropicis cum ardore febrium ægrotantibus (Alias, fellisque vomitione, & in cho-  
 leris, ac hydropicis cum ardore febrium. At in ollis &c.) At in olla seruata & os  
 & stomachum & auiditatem excitant (in alijs exemplaribus scriptum est, & in os  
 & stomachum auiditatem &c.) Paulò tamen grauioribus existimantur fieri vinaceo-  
 rum halitu. Vuae florem in cibis si edere gallinacei, vuas non attingunt. Sarmenta  
 earum in quibus acini fuere, adstringendi vim habent, efficaciora ex ollis. Nuclei  
 acinorum eandem vim obtinent. Hi sunt qui in vino capitis dolorem faciunt.  
 Tosti tritique stomacho viles sunt. Inspergitur farina eorum, potenta modo,  
 potioni,



- potioni, dysentericis, cœliacis, & dissolutis stomacho. Decocto etiam eorum fovere psoras & pruritus utile est. Vinacci per se minus capiti aut vesicæ nocent quàm nuclei: mammarum inflammationi triti cum sale utiles. Decoctum eorum veteres dysentericos & cœliacos iuvat, & potione, & foru. Hoc Plinius à Dioscoride dissidet, quod in ollis seruatas stomachum infestare dixit, Dioscorides ἐν σφοδρῇ, id est, stomacho gratas. Interim varij seruandarum vuarum modi ab utroque indicantur, quos & declarat Galenus his verbis. In vinacea ollas nouas vis referas condunt, operculis exactè obturantes, ne alicunde diffentur, & qua operculum cum olla committitur, pice illinunt, perspiratus omnes obstruentes. Huiusmodi vua ventriculum dissolutum roborans, hominibus cibum fastidientibus appetentiam excitat, non tamen per aluum subsides: & si sumpta largius fuerit, caput ferit. Quæ in musto conditur, magis adhuc quam hæc caput infestat. Pensilis verò nihil prorsus caput lædit, ventrem autem nec sistit, nec ad deiectionem irritat. Sic Dioscorides κρημασθῆς habet, & Plinius pēsiles, & τὰς ἐκ τῶν σερμύλλων, καὶ ἐκ τῶν βρωτῶν. Plinius primum in vinaceis, deinde in ollis seruatas appellat, addens has grauiore existimari vinaceorum halitu, vt in ollis seruatas easdem esse ostenderet, quæ & in vinaceis seruantur. Vinacea autem vocat σερμύλλας, id est, vuarum expressarum reliquias, vt ex Galeno exposuimus: in ollis conditas & seruatas Cœlius Aurelianus Ollares nuncupat, in palea, Paleares. Hunc modum seruandarum vuarum Plinius sic declarat. Durant aliæ per hyemem, pensili concameratæ nodo. Aliæ in sua tantum continentur anima, ollis fictilibus, & insuper doliis inclusæ, stipatæ vinaceis circumfudantibus. Hic tamen annotat Hermolaus in codicibus vetustis legi foliis non doliis ex Plinij ipsius auctoritate sic scribentis. Liguria maritima Alpihus optima vnas sole siccatas iunci foliis inuoluit, cadisque conditas gypso includit. Hoc idem Græci platani foliis, aut vitis ipsius, aut fici, vno die in vmbra siccatis, argenti cado vinaceis interpositis. Sunt & alij seruandarum vuarum modi præter hos tres, quorum Dioscorides & Plinius meminere. Nam & sapa aut passo condiebantur, & in aqua pluuiâ componebantur. Est & id annotandum à Plinio sarmæta vitium in quibus acini fuere σέρμυλλας dici, & nucleos acinorū, γάρτε Dioscoridi, Lactis vinacea, rursus vinaceos σερμύλλας, quorum decoctum dysentericos & cœliacos inter tantum dixit, Dioscorides addit καὶ βρωτῶν, subaudiendo γυναικας, Ruellius femininas fluxione vuluæ laborantes interpretatus est, nec id absurde, iis enim vinaceorum decoctum aptissimum est remedium. Cornarius tamen βρωτῶν legit, & βρωτῶν πάλιν intelligit, quæ & fluidas alui affectiones conuertit, quod & confirmare videtur Galenus scribens. Vinacea secundo ordine siccant, refrigerant primo. Substantia eorum crassa est, & terrea, quod gustus indicat: nam omnibus ventris cum probo uio iunctis affectibus cōferunt. Est & Vua quæ Græcis σαρπῖς & ἀσπῖς vocatur, passilatinis. A patientia nomen acinis datur pallsis, inquit Plinius. Aliis placet passilum esse quod in rugas est contractum, vnde vua passa dicta, quod sit rugis implicita cum in sole suspensa fuerit, vt passa frons, & caperata, rugis exasperata. Sic myrtus nigra Catoni in vmbra perarefcit, dum erit passa. Vuæ passæ facultates hæc sunt ex Dioscoride. Vua passa alba adstringentior est. Prodest caro earum esitata arctia, tussi, renibus, & vesicæ. Item dysentericæ, si per se cum vinaceis edatur, & cum milij & hordei farina, & ouo commixta, cum melle in sartagine fricta. Valer & ad pituitam è capite detrahendam per se, & cum pipere commanducata. Sedar testium inflammationes, imposita cum farina fabacea, & cumino. Epinyctidas, carbunculos, fauos, & putredines circa articulos, & gangrænas, sine vinaceis trita & cum melle imposita, sanat. Podagræ conuenienter cum panacis succo illinitur: mobiles vngues illita celerius extrahit. A quibus non discrepat Plinius nisi in paucis duntaxat. Vua passa quam Astaphida vocant, stomachum, ventrem, interanea tentaret, nisi



pro remedio in ipsis acinis nuclei essentis exemptis vesicæ utilis habetur, & tussi  
 alba utilior. Vitis & arteris & renibus, sicut ex his passum, priuatim & serpentibus,  
 contra hæmorrhoida potens. Tertium inflammationi cum farina cumini aut co-  
 riandri imponuntur: item carbunculis, articularibus morbis, siue nucleis trita cum  
 ruta: fouere ante vino vlcera oportet. Sanant epinyetidas, & cæta, & dysente-  
 riam cum nucleis. Et in oleo coctæ gangrænis illinuntur cum cortice raphani, &  
 melle. Podagris & vnguium mobilibus cum panace, & per se ad purgandum os,  
 caputque, cum pipere commanducantur. Viris satiuæ facultas, inquit Galenus, ad-  
 similis est agresti, sed ad omnia imbecillior. De eadem Symeon Sethi ex eodem fu-  
 sius hæc prodidit. Vux plus nutriunt reliquis operis, minus tamen ficis: neque  
 mali succi sunt, si maturæ fuerint exquisite. Tamen his non robusta nec densa, sed  
 laxa & flaccida caro gignitur. Maximum quidem horum bonum, inquit Galenus,  
 quod celeriter subeunt, atque adeo si retinentur, lædunt: neque enim tunc probe  
 concoquuntur, sed crudum gignant humorem, qui non facile in sanguinem trans-  
 mueretur. Nucleorum natura sicca, & quodammodo adstringens est. Pertranscunt  
 igitur omnia intestina non alterati. Pensiles verò vux neque sistunt ventrem, neque  
 proritant, cæteris autem facilius concoquuntur. Neque vuarum parua est in dul-  
 cedine, & austeritate, & acore & aciditate differentia. Dulces quidæ calidiores ha-  
 bent succum, austera verò & acida frigidum. Alium subducunt dulces, & maxime  
 quando humida fuerint. Omnium itaque tutissimus vsus est quando carnosæ fue-  
 rint, & maturæ, & mediocriter quis ipsasumat. Vux albæ magis subducunt alium  
 quàm nigra. Omnes autem ciborum appetentiam excitant, & ventrem. Conue-  
 nit, cum eduntur, membranam & nucleos expuere, quod difficulter conficiantur.  
 Quæ immaturæ sunt, ventrem sistunt, at stomacho bonæ. Caliditatem à flaua bile  
 ortam, sedant, minus verò nutriunt. Oportet autem non solum vvas, sed etiam om-  
 nes fructus molli cortice præditos ante reliquos cibos apponere. Vux passa, au-  
 tore Galeno, satiuæ quidem concoquendi, adstringendi, & leniter digerendi sa-  
 cultate prædita est. At agrestis vehementer aciem obtinet, adeo ut ex capite par-  
 ges, abstergerique valenter. Itaque ad psoram accommodata est: sed & vrendi vim  
 habet. Idem vini usum medicum breuiter perstringit his verbis. Vinum ex secum-  
 da est ordine exalfacientium: sed quod admodum vetus est, ex tertio: sicut ma-  
 stum quod vocant, ex primo. Caliditati eius proportionem respondet siccitas. Vina  
 vetusta nervos lædunt, inquit Dioscorides, & reliqua sensuum instrumenta: gestu  
 tamen inuiciora sunt. Quare ab iis qui partem aliquam internam debilem ha-  
 bent, cauenda sunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum innoxie  
 sumitur. Nonnumquam inflat, ægrè concoquitur, grauius somnia inducit, urinam ciet.  
 Aetate medium vtræque vitia effugit. Quare ad victus sanorum ægrorumque vsur-  
 patur. De eodem & hæc Plinius tradit. Vino aluntur vires, sanguis colosque homi-  
 num. Et mox, Vino modico nervi iuuantur, copiosius læduntur, sic & oculi. Sto-  
 machus recreatur, appetentia ciborum inuitatur, tristitia & cura hebetatur, urina  
 & albor expellitur, somnus conciliatur. Præterea vomitiones sistit, collectiones  
 extralanis humidis impositis, mitigat. Aesclepiades utilitatem vini æquari vix Deo-  
 rum potentia posse pronuntiavit. Et alibi, Vino natura est hausto accedendi ca-  
 lore viscera intus, foris infuso refrigerandi. Nec alienum fuerit commemorare hoc  
 loco, quod Androcydes sapientia clarus ad Alexandrum magnum scripsit, intem-  
 perantiam eius cohibens. Vinum potaturus Rex, memento te bibere sanguinem  
 terræ. Sicut cicuta homini venenum est, sic cicuta vinum. Quibus præceptis si ille  
 obtemperasset, profecto amicos in temulentia non interemisset. Prius ut iure  
 dicti possit, neque viribus corporis vilius aliud, neque aliud voluptatibus pernicio-  
 sius, si modus absit. Sunt in regno Menin oppidi Syria nobilissima magnitudinis  
 tum

Lib. 6. sim.

Lib. 6. sim.

Lib. 3. 100

Lib. 6. 7.

Lib. 13. 61.

Lib. 14. 69.



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

1476  
tum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patria priuatim vocant *Alzibib*: nam generi commune est nomen *Hantz*, nos à succo vnam. Illius vocis imitatione suas grandiores vnas corrupto vocabulo Prouinciales dicunt *Augibim*. Sunt & vna quædam *ἀπὸ βρωτῶν*, id est, sine nucleis, quæ *Corinthie* vulgo vocantur, in Italicis & Pedemontanis hortis. Effigie nihil planè differunt à communibus: sed algidioris cœli impatiētes, gracilitate tantum racemorum, & exilitate acinorum superantur, qui piperina aut sambucina tantum æquant. In Madera quoque vna sunt sine granis vllis. Theophrastus auctor est ad Elephantinen & circa Memphim vites perpetua fronde virere, tamen si annuas tantum proferant vnas. Vites quidem & crassas esse Plinius tradit, quas ob id insanas vocant: quoniam in iis alia maturescunt, alia turgescunt, alia florent. Varro auctor est vitē fuisse Smyrnæ apud mare biferam.

## LABRUSCA,

## CAP. III.

### Nomen.

Vide Phleg. pag. 594.



RACIS *ἀμπέλως ἀγρία*, Latinis Vitis siluestris, & Labrusca propriè dicitur, Gallis *Vigne sauvage*, Italis *Lambrusca*, Germanis *Wildruin*. Labruscam dici putant, quod in marginibus terræ ceu labris quibusdam nascatur. Sed ne quem homonymia in errorem inducat, admonendus est lector aliam esse plantam quæ *ἀμπέλως ἀγρία* Græcis, Latinis vitis siluestris nominata est, de qua proxime dicitur. Labrusca viti satiuæ sarmentis, foliis & capreolis similis, Dioscoridi duplex est. Altera vnam ad maturitatem non perducit, sed ad florē tantum vsq;: ænanthen verò quam vocant, gignit: altera quæ fructu perficit, sed paruos acinos habet, nigros, & astringentes. Oenanthe, vt idem paulo post inquit, vitis siluestris quæ fructum fert, flos est. Sic enim restitui debet vici locus ille vitiosus. Recondi oportet in fictili non picato cum collecta est, & sub-

### Forma

### (Gene- ra.

Lib. 5. c. 2.

Lib. 12. c. 28

### Vires.

Lib. 5. c. 1.

Lib. 5. c. 5.

Lib. 23. c. 1.

cto linteo in vmbra siccata. Optima est in Syria, Cilicia, & Phœnice. Plinius huius Oenantes historiam fusius exponit his verbis. Eodem & Oenante pertinet. Est autem vitis Labruscæ vna. Colligitur cum floret, id est, cum optime olet. Siccatur in vmbra substrato linteo, atq; in cados conditur. Præcipua ex Parapotamia, secunda ab Anthiochia, atq; Laodicea Syriæ, tertia ex montibus Medicis. Hæc vitis medicina. Quidam omnibus iis præferunt eam, quæ in Cypro insula nascitur. Nam quæ in Africa sit ad medicos tantum pertinet, vocaturque Massaris. Omnis autem ex alba labrusca præstantior, quàm è nigra. Labruscæ folia, caules, & capreoli auctore Dioscoride, vim habent viti satiuæ similem, quemadmodum contra Galenus dixit, vitis satiuæ vires siluestris viribus similes esse. Quæ verba ad vitem siluestris de qua proxime dixerat, referenda non sunt, vt mox dicemus, sed ad labruscam. Oenanthe autem eodem Dioscoride auctore, vim habet adstringēdi. Quare potest stomacho utilis est. Ciet vrinam, aluum sistit, & sanguinis sputum. Sicca verò imposita contra fastidia & acorem stomachi efficax est. Capitis doloribus tam viridis quàm sicca ex aceto & rosaceo infunditur. Cataplasma ex ea fit, cum melle, croco, rosaceo & myrrha trita ad inflammationes arcendas in cruentis vulneribus, vlceribus, incipientibus ægilopis, & pudendorum nomis. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem. Illinitur & contra oculorum fluxiones & æstuantem stomachum cum polentæ polline & vino. Vsta verò intesta ad prunas, facit ad ocularia medicamenta. Redunias & pterygia, & abscedentes gingiuas cruentasque cum melle sanat. Eundem vsum medicum Plinius exponit his verbis, quæ multum lucis Dioscoridi afferunt. Omphacio cohæret ænanthe, quam vires siluestris ferunt, dicta à nobis in vnguenti ratione. Laudatissima in Syria, maxime circa Antiochiæ & Laodiceæ montes, & ex alba vite. Refrigerat, adstringit, vulneribus inspergitur, stomacho illinitur. Vtilis vrinæ, iocinori, capitis doloribus, dysentericis, cœliacis, cholericis.



ricis. Contra fastidia obolo ex aceto pota. Siccant manantes capitis eruptiones, efficacissima ad vitia quæ sunt in humidis: ideò quæ & oris vlceribus & verendis ac sed. Cum melle & croco aluum sistit. Genarum scabiem, vel, vt in manuscripto legitur, scabritiem, emendat, oculorùmque lacrymationes: ex vino stomachi dissolutionem: ex aqua frigida pota sanguinis excreationem. Cinis eius ad collyria, & ad vlcera purganda, & paronychias & pterygia probatur. Vritur in furno donec panis percoquatur. Massæ odoribus tantum gignitur.

VITIS SILVESTRIS, CAP. III.

**V**ITIS siluestris Græcis ἀμπέλως ἀγρία nominatur vt & labrusca, quam-  
uis hæc ab illa plurimum discrepet. Est enim labrusca viti viniferæ tam  
similis, vt solo cultu differat, At vitis siluestris sarmenta quidem vitis  
modo producit longa, vt describit Dioscorides, sed aspera, cortice in-  
rimas denicante: folia hortensi folano similia, sed latiora & longiora: florem ve-  
lut capillos muscosos: fructum paruis vis similem, cum maturuit, rubentem, ro-  
tunda acinorum figura. De eadem vite hæc Plinius, Labrusca quoque ænanthen  
fert, satis dictam. Quæ à Græcis ἀμπέλως ἀγρία nominatur, spissis & candicantibus  
foliis, geniculata, rimoso cortice, fert uvas rubentes cocci modo & c. Quibus verbis  
labruscam quæ etiam ἀμπέλως ἀγρία vocatur, cum vite siluestri confundere videtur,  
nisi ita contextum distinguamus, vt verba hæc, Quæ à Græcis ἀμπέλως ἀγρία nomi-  
natur & cetera, ad præcedentia non referantur, sicuti reuera referri non debent, sed  
ea velut à nouo principio legamus, vt de duabus stirpibus Plinium hîc loqui acci-  
piamus, priore labrusca, altera vite siluestri, quæ etiam ἀμπέλως ἀγρία appellatur. Idè  
alibi vitem siluestrem aliam esse à labrusca prodidit his verbis. Probat & vitis sil-  
uestris alia quam labrusca, & ipsa hederæ modo arborem scandens. Matthiolus pro  
vite siluestri herbâ pingit ab Herbariis Dulcamaroni & Solanum lignosum nun-  
cupam. Eam Theophrasti κηλῶγον esse Dalechampius & quidam alij periti esse  
coniiciunt, cuius fructus folano similis est. Sed cum repugnet florum figura, quod  
muscosi non sint, nec capillacei, verum racematim coherentes, ex Oribasio non  
Præterea cum hæc planta rimoso cortice non sit, vocem φλοιόραγον in Diosco-  
ride expungendam esse, quod in Oribasio non legatur. Quæ omnia refelli possunt.  
Primum quod vel diuersum à nostro Oribasium nactus est, vel βρωάδης flores le-  
git non βρωάδης. Sic enim ex Dioscoride vitem agrestem delineauit. Vitis agre-  
stis sarmenta vitis viniferæ modo longa emittit, lignosa, aspera: folia hortensi so-  
lano similia, longiora tamen, & latiora: florem habet vt capillos muscosos: fructum  
fert exiguis vis similem, cum maturuit rubrum. Rotunda est acinorum figura.  
Deinde tantum abest vt vox φλοιόραγον in Dioscoride delenda sit, vt Oribasij  
descriptioni adscribenda sit potius: quoniam vitem siluestrem rimoso cortice esse  
scripserit Plinius, item Serapio Dioscoridis verba transcribens. Planta est cuius ra-  
mi longe protenduntur, similes palmitibus vitis viniferæ, cuius lignum est grossum,  
& cortex separabilis ab eo, & cetera. Hîc tamen monendi sunt studiosi Serapionē  
eo loco, & Auicennam vitem hanc siluestrem cum labrusca siue vite siluestri tur-  
piter confudisse. Dodonæus vitem siluestre depingit, & describit eam quam Mat-  
thiolus pro vite nigra proposuit, alij pro cyclamino altera. Dalechâpius diuersam  
ab his, Vitem siluestrem statuit, eam nimirum quæ hîc picta est, Vitalba nominata,  
Gallis *Vorne*, Germanis *Lynen* vel *Lenen*, quibusdam *Vualdreben*, quam Matthiolus  
Clematidem tertiam facit, Dodonæus Clematidis alterius speciem tertiam, Fuch-  
sius Vitem nigram. Nam ea sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa,

Nomina

Forma.

Lib. 4. c. 175

Lib. 23. c. 2.

Lib. 6. c. 49.

Lib. 3. hist.  
cap. 18.

Lib. 11.

cap. 35. sim.

Lib. 2. c. 734

Lib. 3. hist.  
cap. 47.

Lib. 4. c. 177

Lib. 2. c. 7.

Lib. 3. c. 48.

Cap. 33. anal.

DDD







& hydropicis, inquit Dioscorides. Vux eius maculas cutis in facie à sole cōtractas, & omnes alias expurgant. Recentes eius ramuli muria condiuntur in cibum. Plinius, Vitis siluestris vux cutem in facie mulierum purgant, & variis coxendicū & lumborum vitis tuxa cum foliis & succo profunt. Radix decocta in aqua, pota in vini Coi cyathis duobus, humorē alui ciet: ideo hydropicis datur. In quibus perperam legimus in vulgatis exemplaribus, & variis coxendicum, pro & varos. Coxendicum & cetera. Eadē repetit Plinius alio in loco. Ampelas agria vocatur herba foliis duris, cineracei coloris, de qua nos satis diximus, viticulis longis, callosis, rubentibus. Flos qualis eius quā Iouis flāmam appellauimus in violis: fert semen punici mali simile acinis. Radix eius decocta in aquæ cyathis ternis, additis vini Coi cyathis duobus, aluum soluit leuiter: ideoque hydropicis datur. Vulux vitia & cutis in facie mulierum emendat (Idem mendum locum hunc occupauit: legendum enim ex herbæ ipsius natura, Varos & vitia cutis in facie & cetera, pro quib⁹ Dioscorides ἐφελῆς χυλὸν, πάλιν σπιλον) Isthadicos quoq; vti hac herba prodest tuxa cum foliis, & illita cum succo suo. Hanc tamen Plinij descriptionē peripicaciores herbarij conuenire putant non viti syluestri, de qua hoc loco tractamus, sed eiusdem autoris Salicastro, quod cap. 123. Viti syluestri dixit esse simile, eisdemque vsus habere. Huius enim plantæ ceruleus flos similis est Aquilegiæ flori, quā Theophrastus vocatam fuisse Iouis florem plerique omnes credunt, vitis autem syluestris de qua hic nos agimus, sicut reliquarum omnium, flos albus est. Theophrastus has etiam vires huic plantæ tribuit. Θεραντικὸν δὲ καὶ θριμὸν καὶ τὴν ἀμπέλον τὴν ἀγρίαν ἢ πύλα δαδὸν καὶ ἐν ψάλλοι καὶ χερσίων, καὶ ἐφελῆδας ἐπάρχειν (lege ἀπαγγεῖν) τῶν ὀνυχοειδῶν καὶ δαδῶν (inepte δαδῶν pro δαδῶν legi Theodorus secutus vulgatos codices) τὰ μὲν δὲ πάλιν ὡς ἄν, ὅπως ὁ μάλιστα, Id est, Theodoro interprete. Radix quoque vitis siluestris calfactoria, acrisque est: quamobrem ad psilothri vsū idonea, & vitia cutis in facie emēdat, Fructu eius defoliare arbores solent (Vertēdum, fructu eius depilant coria) Succiditur omni tempore, sed præcipuē Autumno. Vitis siluestris racemij, inquit Galenus, cutem extergendi vim habet, vt ephelῆς & nauios, & id genus omnia in extrema cute vitia curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina obtinent, quæ & sale condiuntur.

Lib. 23. c. 1.

Lib. 27. c. 7.

Lib. 9. hist. cap. 22.

Lib. 6. sim.

VITIS ALBA, CAP. 1111.



ΜΠΕΛΟΣ λεγὴ Græcis, Βρυονία & ψάλλορον, Latinis Vitis alba, & Bryonia, & Bryonias Columella, & Psilothrū, Officinis & Herbariis similiter Bryonia dicitur. Vulgus Viticellā nominat, Mauritani fessire, Alfsire fessera seu Alfescera, Hezargiesan, & Hezarchasan, Itali Vite Bianca, & Zucca saluatica, Germani Stuckurtz, Hispani Nuexa & Anorca, Galli Couleuree. Vitis alba dicta est, non q̄ vitis sit, sed q̄ ei similis. Sic etiam Viticella Psilothrū quod ex eius acinis coria depilari ac confici possint. Βρυονία verò à βρύω forte, quod est pul-lulo, atque adeo extollo & exalto, quod in vicinos frutices scandens se extollat, atq; late pullulet. Hanc sic descripsit Dioscorides. Sarmenta, folia, capreolos satiuæ viti familia habet, hirsutiora tamē omnia. Propinquis fructicibus se implicat capreolis apprehendens, fructum fert racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix est alba, crassa, magna, quam omisit Dioscorides, aut certe qui Dioscoridem transcripserunt ante verba illa, τὰς τῆς οἰ ἀπαγγεῖν, vt ex radice exeuntes asparagos intelligamus, sicut Plinius habet. Vitis alba est, inquit, quam Græci Ampeloleucen, alij Ophiostaphylon, alij Melothron, alij Psilothrum, alij Archezostin, alij Cedrostin, alij Madon appellant. Huius sarmenta longis & exilibus internodiis geniculata scandunt, folia pampinosā, ad magnitudinem hederæ, diuiduntur vt vitium. Radix

Nemina

Vide Physion. pag. 111

Lib. 4. c. 176

Forma.



*BRYONIA* sive *vitis*  
*alba*, *March.*



In c. 176.  
lib. 4.

*Locus.*

*Queque tuas audax imitatur Nyctis Vitis*  
*Nec metuit sentes : nam vepribus improba surgens*  
*et Abradas, insomitas Bryonias alligat vltimos.*

*Tempus.*  
Li. 4 c. 176.  
*Vites &*  
*Temper.*

Florat aestate, Autumno fructum producit. Bryonia, in prima germinatione asparagi, auctore Dioscoride, elixi manduntur : vrinam & aluum cunctes, folia, lactis, & radix, acrem vim habent. Eapropter chironis, gangrenicis, phagedenicis, & tibiis putrefacientibus vlceribus cum sale illita, auferuntur. Radix abstergit corpus, & erugat. Vitia faciei, varos, lentigines, & cicatrice, & gras cum eruo, terrachia, & scenogræco emendat. Ad eadem prodest decoctum oleo vsq; dum liqueat. Sugillata tollit, & digitorum prerygia compefcit. Cum vino illita, inflammationes dileuit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit trita & illita. Mactetur apte medicamentis quæ exedendo sunt. Bibitur comitialibus drachma potest, contra viperarum ictus pota drachmis duabus prodest. Menstruum quando subtrahit. Cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod præfocatur ne oppresis, tussientibus, latera dolentibus, & ruptis datur. Apposita vtero facit & fecundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto triginta diebus potest consumit. Illinitur eadem vtiliter cum fico ad eadem. Ad infessus decoquitur : vrinam siquidem purgat, & abortum facit. Vere ex radice eius extrahitur succus, lactis cum mulla ad eadem, pituitam ducens, fructus eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus fructus eius, si cum tritico decocto sorbeat. His satis consentanea sunt quæ Plinius de eadem re prodidit. Bryonia asparagi decocti in cibo, aluum & vrinam cient, folia & caules exulcerant corporis : vsq; vlcera phagedænis, & gangrænis, tibiârûmque radio cum sale illuntur. Semen in vna raris acinis dependet, succo rubente, postea croci (vetus crocus habet crocino) Nouere id qui coria perficiunt illo enim vtuntur. Ploris & lepris illinitur : Lactis abundantiam facit coctum cum tritico potumq;. Radix nunc

Lib. 25. c. 1.



rosis utilitatibus nobilis, contra serpētium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitis cutis in facie, varosq; & lentigines, & iugillata emendat, & cicatrices. Eademque præstat in oleo decocta, Decocta datur & comitialibus potus (Vetus codex habet, Datur & comitialibus in potu) item mēte cōmotis, & vertigine laborātibz, drachma pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat (turbat non purgat legēdum esse ex Dioscoride perspicuum est, qui habet ὑποταράττει τὴν διάνοιαν) Illa vis præclara, quod ossa infracta extrahit trita in aqua & imposita (Sic enim legēdum ex Dioscoride) vt Bryonia: quare quidam hanc albam Bryoniā vocant. Alia verò nigra efficacior in eodem vsu cum melle & thure (In veteri exemplari legimus, albam Bryoniam vocant: aliam verò nigram efficaciorē in eodem vsu: cum melle & thure suppuraciones &c.) Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Ciet menses & vrinam. Ecligma ex ea fit suspiriosis, & cōtra lateris dolores, vulsis, ruptis. Splenem tenuis obolis pota triginta diebus consumit. Illinitur eadem cum fico, & pterygiis digitorum. Ex vino secūdas fœminarum apposita trahit: & pituitam drachma pota ex aqua mulsā. Succus radice colligi debet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum eruo, latiore quodam colore & cutis teneritate mangonizat corpora, serpentes fugat (Dux postremæ voces in vulgatis codicibus redundant, nec in veteribus reperiuntur, nec huc pertinent) Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulatur: alia vrit, nisi frigidius abluatur. Lucidius hoc idem præstat nigra vitis: quoniam alba pruritū adfert. Bryoniæ prima germina, inquit Galenus, ab omnibus promovere edi solent, vtpote edulium stomacho propter adstrictionem gratum, sed & subamaram & modice acrem adstrictionem habent: quare & vrinam modice ciet. At radix & abstergentem, & desiccantem vim habet, & moderate calidam: quare & lienes induratos liquat tum epota, tum foris cum ficibus imposita: & lepram & psoam sanat. Porro fructus eius racemosus iis qui coria depfant, est utilis.

Lib. 6. sim.

VITIS NIGRA,

CAP. V.

Μ ΠΕΛΟΣ μέλανα Græcis, & Βρυόνια μέλανα, & χερώνια ἀμπέλος, **Nomina** Latinis Vitis nigra, & Bryonia nigra, & Vitis Chironia nominatur, Arabibz *Fesire sentanim*, Italis *Vite nera*, Gallis *Couleuree noire*. Nigra vero vitis dicta est ab acinis radiceq; nigris, & quod vitis similitudinē habeat. Vitem nigram describit Dioscorides foliis hederæ similibus, magis tamen ad similitudinem folia accedentibus, sed maioribus, ita & caulibus similibus. Clauiculis etiā hanc arbores amplecti, fructu esse racemoso, initio viridi, cū maturuit nigro: radice foris nigra, intus buxei coloris. Plinius cum de vite alba dixisset subiungit. Est ergo & nigra quam proprie Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Gynecanthen, aut Aproniam, similem priori, præterquam colore: huius enim nigrū esse diximus. Radix foris nigra, intus buxeo colore. Fuchsius pro vite nigra Vitalbā seu Viornam Gallorum, Germanorum Lynen seu Lenem exhibuit, quam pro Vite siluestri posuimus. Matthiolus Italorum Tamaro, à tamo, siue à Tano, quam in Italia edulem esse Plinius scribit cap. 15. 21. vocabulo, Vitem nigram Dioscoridis esse putat, quæ Herbariis & Officinis Sigillum beatæ Mariæ nuncupatur, Gallis *Signet de Nostredame*, & *Couleuree sauvage*, Dodonæo Vitis siluestris, vt diximus. Illius sententiæ duomaxime refragari videntur, quod vitis nigræ radix foris nigra sit, intus buxei coloris, quodq; racemos nigros ferat: vnde Viti nigræ nomen. At sigillum Mariæ si in pratis, aut humidis aut vliginosis locis nascatur, radice est crassa Bryoniæ instar, foris subrufa, intus alba, tactu viscida. Si in asperis, saxosis & opacis, tenuis, fibrata, perpetuò alba, fructu semper rubente, nō nigro. Qui fructus color Matthiolum à sen-

Li. 4. c. 177.

Forma.

Lib. 23. c. 1.

Cap. 33. hi.

In cap. 17. lib. 4.

Da

uio conu. h. 109.



Mathioli.



Lib. 3. c. 46.

Lib. 4. c. 177  
Vires &  
Temper.

Lib. 23. c. 1.

parum distare. Vuam Taminiam Plinij, diuersam à staplusagria, quā falsò quidam ita vocabant, hanc esse docti herbarij censent, rubentibus acinis, in apricis accedentem, præsertim cum Tamaro Italicum vocabulum ad Vuam Taminiam sonum accedat, siue ad Tamum, cuius vuam, Taminiam vocarunt. Vitem nigram ab alba tantum illis duabus notis discrepantem, quas expressit Dioscorides in Vvestphalia, Saxonia, Hestia, Misnia frequentem esse, è Germanorum scriptis ac epistolis còpertum sibi esse Dalechampius ait. Quare Sigillum Mariæ, non vitem nigram, sed potius Dioscoridis Cyclaminum Cissanthemon esse Ruellius & quidam alij docti Herbarij non temerè censent. Vitem verò nigrā nondum planè notam, in qua est sententia Dodonæus. Pena leuioris momenti esse ait, quod duæ supradictæ notæ Sigillo Mariæ desint, nèpe color rubens in acinis, & buxeus internus radices: quia aliqui folia sunt hederacea, similaci asperæ quamsimillima, circa frutices & sentes flexuosi gerri, viticularum multiplici capreolo proxima quæq; amplectente, racemi multisaggesti acinulis, virentibus primùm, deinde rubellis: demum ad maturitatē quasi vitetam progressis, ex fusco rubore in fuscèdinem atram vergentibus. Cætera (viti radice quæ Bryoniam magnitudine, figura, efficacia & teneritudine inuitatur, foris nigra, intus alba) planè tam vera, quā vulgo notissima sunt: etenim ubiq; in Gallia & Germania siluosis & asperis dumetis arbores sepèsque scandit, & vuis speciosis, oblongis, floribusq; muscosis labruscæ, vel oleæ, pallentibus conuestit. Hæc est Penæ sententia: cui addit, vires etiā satis cōuenire. Scribit enim Dioscor. viticulas prima gemitatione erupentes olerum modo in cibi vsum venire, vrinæ ciere, menses pellere, splenē liquare: comitialibus vertiginosis & resolutis prodesse: radicē similem alba vitis radici vim habere ad eadem vtilē, sed minus efficacē, folia cum vino exulceratibus iumentorū ceruicibus, cōmodissimè illini, & luxatis similiter imponi. Plinius Vitis nigræ asparagos, inquit, Diocles prætulit veris asparagis in cibo, ciendæ vrinæ, lieniq; minuēdo. In frutetis & arundinetis maximè nascitur: radix foris nigra, intus buxæo colore. Ossa infracta vel efficacius extrahit quàm supradicta. Cæterū eidem peculiare

tentia deducere non potuit, Nam in Vngaria & Bohemia, inquit, omnis Bryonia fructu fere nigrum, quem Dioscorides rubere tantum dixit. Quod & in Sambuco spectatur: eius enim si in motibus prouenit, fructus rubet, alterius. ex pura nigricat. Solanum quoq; hortense quibusdam in locis vuas fert modo nigras, modo rubentes, modo croceas: natura plerumq; in florum & fructuum colore ludere solita. Quantum ad solanum attinet, responderi potest fructus solani varietatem à Dioscoride obseruatā fuisse, nempe μέλαινα ἢ κισπὸν μέλι, ὁ πεπρωμένος, id est, nigrum aut fulvum post maturitatem. Quæ varietas si in vite nigra reperiretur, à Dioscoride prætermissa nō fuisset. Prætera color radices intus buxeus, foris niger, tam insignis est, tantiq; ponderis, vt nec excusari possit, nec dissimulari. Quinetiam in hac plāta sapor radices diu mālā cum fatuo humore multo leuiusculè tantum mordet, & quod vix sentias, at Bryoniæ radix, quæ valentior longe esse Vitis nigræ radicem omnes prodiderunt, acris & amara est vehementer, unde colligi potest hanc plantam à Vite nigra nō



peculiare est, quod iumētorū ceruicibus vnice medetur. Aiunt si quis villā ea cin-  
xerit, fugere accipitres, tutasque fieri villati-  
as alites. Eadem in iumēto homineq;  
phlegma, aut sanguine qui se ad talos deiecerit, circūligata sanat. In aliis exēplari-  
bus exaratū est, sanguine qui sceratur, talis circūligata sanat. Quā lectionē mēdo-  
sam esse & decurtatā putat Hermolaus. Id quod ipsa medicina indicat absurditas.  
Quid enim stultius, aut quā nā est hāc antipathia, vt adalligata hominis, aut iu-  
mēti talo herba, pituitā, aut sanguine qui reiciatur curet. Et sane codices vetustos  
longe aliter habere, etiam si corrosi & ipsi laceriq; sint: Dioscorides luxatos sanari  
circūligata ea scribit, vt fortasse legendū sit, Talos circūligata sanat, videlicet qui  
moti sunt. Priora autē verba separatū & facile sensum habent. Vitis nigra, inquit  
Galenus, quā propriē vocatur Bryonia, supradicta ad omnia similis est, nisi quod  
imbecillior. Sic cōpertum est vel mulierculis, ait Pena, Sigillum mariæ vehemen-  
tius vrinā, renūq; sabulū & mensū saburrā impellere potu. Verū quod scribit  
Matthiolus, Vitis nigra rad: ci vim præstantissimā inesse ad excitandā vene-  
rem, si sub feruē. ibus cineribus decocta deuoretur, id ille negat: quin potius quof-  
dam suo malo expertos fuisse lumbos enervare, sanguinem renēque inflammare.

**DULCIAMARA,**

**CAP. VI.**



PERITIS recētiōribus Herbariis herba hāc quā vt supra descripta, *Nomina*  
sepibus & fruticibus sese intorquet, & circūuoluit, γλυκύπικρον & γλυ-  
κύνικος nominatur, Latine Dulciamara, siue Amaradulcis, à studioſis  
Lutetia & Mōspelij præfertim, Solanū ligneū, vel lignosum, Germa-  
nis *leoger lecher*, id est dulciamara, & *Hinschkraut*, quod ad morbu pecorū, *Die Hinsc*  
appellatū faciat Sarmētis multis, lōgis, gracilibus, teneris, rotundis, lignosis, fruti-  
cat, quibus vicinis arboribus, sepibus & dumis

**DULCIAMARA, siue**  
*Vitis siluestris, Matth.*



cat, quibus vicinis arboribus, sepibus & dumis  
heret. Folia ei sunt lōgiuscula, obscure virentia,  
ferē hederā, sed minora, siue solani, vel simila-  
cis, vel Sigilli mariæ, sensim acuminata, quorū  
nōnullis infernē vtrinq; foliolū vnū quasi ap-  
pēdula vel pinnula adnascitur, ac totū mino-  
ris, vel saluē nobilis modo: flores multi aggesti  
violaceis saturationes, singuli in quina foliola  
mucronata, recurua, angusta, diuisi, ē quorū me-  
dio luteus apiculus prominet, vnde succrescūt  
acini oblōgi, teretes cōferti, primū virides, cū  
maturuerint, rubri, coralli rubri modo, granu-  
lis intus miliaceis, cōpressis, ingrati planē saporis.  
Radix parua est & fibrata. Plantæ huius cor-  
tex primū quidē gustatu amarus est, & insuauis,  
deinde quo diutius maditur, eo dulcior & iucu-  
dior redditur: vnde ei nomē. Secus sepes & du-  
mos vialq; viginosas luxuriat. Mōspelij etiā in  
ruderibus, maceris & macilentis. Floret Iulio  
mēse, Augusto semē maturū producit. Calida &  
sicca esse tēperie scribūt Herbarij. Quare deco-  
cti foliorū eius, siue sarmentorū & radicum in  
vino potu, hepar obstructiōnibus omnibus li-

*Vigna in folia  
di' quas. uia  
orham cū nō  
sepit de de in hō  
et.*

*cyper.*

*Locus.*

*Tempus.*

berari, & regiū morbu inde sanari. Idē decoctū ex alto delapsis, cōtufis, luxatis, ru-  
pris, vulneratis prodesse, quod sanguine concretum per vrinas vacuet. Hæc herba  
peritis quibusdā herbariis Theophrasti *μολωθρον*, Penæ & Mōspeliensibus, circa  
esse creditur, Dodonæo Cyclaminus altera, Matthiolo Vitis siluestris. Plinius,

*Lib. 3. hist.  
cap. 18.*



ἀμπέλως ἀγρία  
ἢ ἱστορία  
Vide Phryg. pag.  
591.

1414

# HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,

quod antea monuimus, in Historia Vitis silvestris, Ampelon agriam in salicis nascentem, ideoque Salicestrū vocatam esse tradit.

LVPVLVS,

CAP. VII.



RYONIS & Vitibus adiungenda hæc quæ in veterum Græcorum Latinorumque monumentis non extat, nisi sit Plinij Lupus salictarius inter herbas sponte nascentes, quibus pleræq; gentium vnum in cibis, numeratus. Officinis Lupulus dicitur, Latinis recentioribus Lupulus salictarius, & Lupus salictarius, quia subit scanditque salices, & arbuta omnia circumuoluendo sese complectitur: hinc etiam Lupulus reptitius à nonnullis hodie nominatur, à Græcis hodie vernacule *Βρυονία*, aliquot Italiæ rura ad Græcam appellationem alludentia Brusculam, quasi Bryon vel Bryonia seu silem vocant, Galli *Houblon*, & *Houblon*, Germani *Hopfen*. Lupulus duum est generum, silvestris & satiuus. Silvestris sarmenta producit longa, hirsuta, tædiosa, aspera, multis capreolis virgulta & frutices vicinos amplectentia, folia vitis alba, asperiora, triangularia: flores pallidos, foliaceos, ac multis tenuibus folliculis structis serie compactiles, qui ferè allium vinumque suboleant: semen compressum, pulli genistæ, sed minus: radicem nigram, longam, longius prorepantem & surculosam. Lupulum ex silvestri satium sedulo cultu fecere septentrionales, multisque pe-

Genera.  
Forma.

LVPVLVS, Matthioli.



Locus.

Tempus.  
L. 2. n. 1. p. 1.  
cap. 24.  
Tempus.  
V. p. 1.

damentis ac ridicis tenellos eius capreolos fulciunt, quæ fulcra, quia ferè semper saligna sunt, ideo forte salictarium Lupulum vocarunt. Hic silvestri prolixis sarmentis foliis & floribus est per quam similis, sed lætior multò tota plantæ cultu euadit, florumq; thyrsis foliaceis & squamosis aduolutoribus, semine item multò maiore. Lupulus silvestris iuxta sepes & vepres prouenit: item in hortorum & agrorum marginibus. Satiuum colunt Germani & Flandri in hortis atque in campis patentissimis vinetorum modo, solo humentiore, lætiore, pinguiore. Augusto mense florer & Septembri. Lupulus auctoritate Mesue, temperatus est, vel potius frigidus, principio ordinis primi. Sanguinem bile flaua purgat modicè, eumque clarum reddit, & sedaro eius calore temperat, præsertim sero lactis infusus. Iterum syrupus ex eo sanat, febribusq; biliosis & sanguineis prodest. Ipse quoque & succus eius cum hordei polëta, cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam. Cùmque tam efficax sit medicamentum,

mirum subit cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam raro habeatur. Hæc Mesues. Quibus haud assentiuntur recentiores. Flores enim calidos & siccos etiam odoris grauitas & notabilis amaritudo testantur, inquit Fuchsius. Antiquus Herbarius calidum & siccum secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse. Item Dodonæus Lupulum, flores potissimè calidos siccosq; esse secundo ordine statuit. Matthioli eiusdem flores, folliculos & radices calidiores, aperire, extenuare, abstergere & expurgare. Turiones verò quibus elixum utimur in acetariis eum plus humiditatis habeant, parum tum exalfacere, tum siccare esse sumentibus & cibum & medicamentum, quoniam sanguinem mūdum ventrem solunt, obstructions aperiunt, palatòque grati sunt. Florum & folliculorum

Ca. 58. hist.  
Lib. 3. c. 59.  
hist.  
In cap. 140.  
lib. 4.



lorum decoctum dari vtiliter potandū contra hausta venena, scabiem, Hispaniā  
laem, aliaq; huiusmodi vitia quae extrema n cutem insiciunt, veluti lichenas, serpi-  
gines, iampigines, alphas atque cetera id genus. Dari & in febribus diuturnis ab  
infarctu iocinoris prouenientibus: defensionibus additos, valere ad induratos &  
tumidos feminarum locos, & ad eos qui difficulter vrinam reddunt: semē tritum  
& potui datum semidrachmā pondere interaneorum animalia necare: mēses pro-  
uocare, vrinā pellere. Fuchius eiusdē vires ex recentioribus tradit. Bilem vtrāq; Ca 38. hist.  
detrahit, inquit, abscessus discutit. Pituitam in aqua inter cutem per aluum ducit.  
Succus eius crudus hauritus ventrē magis subducit, minus vero obstructions au-  
fert. Coctus vero magis ab obstructionibus liberat, minusque ventrem subducit.  
Auribus instillatus eas à putredine vindicat, & à sœtore liberat. Radices obstru-  
ctiones tollunt, lienis potissimum, & iocinoris. Ex his perspicuum est, diuersas lu-  
puli partes diuerso esse temperamento: asparagos primo vere erumpentes, quos  
tam siluestres quam satiuos acetariis miscēt, cichorii terra defolsi, vt sit ab hoto-  
bus, sapore non ingrato, item folia, calore esse temperato, flores & folliculos atque  
semen tum calidiore, tum sicciore esse temperie. Flores Septentrionales regiones  
frigidiore decerpunt, ad Bierā, siue Ceruissā confectionem.

H E D E R A,

## CAP. VII.

*HEDERA, CAP. VIII.*

**H**ΕΣΟΣ & Κίτλος Græcis, Hederæ Latinis, Mauritanijs Cusſus, Italis  
Hedera, Germanijs Ephœua, Hiſpanijs Edera, Gallijs Lierre. Κίτλον autē  
dictum putant à Ciſſo, quem puſionem Liberi patris fuiſſe Græci fa-  
bulantur, & in nominis ſui fruticem conuerſum, dum miniſter cum  
eo Deolaliens, aliſſius terræ perijt. Athenienſes Citron Bacchum ipſam vocant, &  
apud ſe Acharnis vico, Hederam primo natam volunt. Hederam Dionyſiam à  
gnata, qui primus ex India in Græciam Hederam aſportauit: itaque in tutela Li-  
beri patris putabatur eſſe. Nam vt ille iuuenis ſemper ita hæc perpetuo vires. Nec  
ſecus omnia, quàm ille mentes hominum illigat. Vel potius Κίττος Hedera dicta  
eſt τὸ τέκος, id eſt à verme ſiue curculione. Cis enim auctore Theophraſto, in  
hordeo & tritico naſcitur, cui natura eſt ſemina illa cuſpide potiùs, quàm ore, exi-  
guit ſoraminibus terebrare: vnde & κιοστρίς punex ob ſiſtulofas cauitates ira dici-  
tur. Sic & κιοσς à textura poroſa & ſpiraculis innumeris ferè petra, qua vinum  
tranſmittit, Catonis experimento ſic ſcribentis: Si voles ſcire an in vinum aqua  
addita ſit, nec ne, vaſculum facito de materia hederacea. Vinum id quod putabis  
aquam habere, eodem mittito. Si habebit aquam, vinum effluet, aqua manebit.  
nam non continet vinum vas hederaceum. Inde & κιοπτερον Homero vas paſtorale  
ex hedera factum. Hederam vero Pompeius dictam cenſet quòd hæreat, vel po-  
tiùs quòd edita perat, vel quia id cui adheſerit edat, & enecat. Pluriimæ Dioſcoride  
autore, ſunt hederæ ſpecies, ſed maximè generales tantum tres, candida, nigra,  
quæ & vulgo Dionyſia, & tertia Helix. Theophraſto quoque Hedera multiplex  
eſt, id quod fuſius declarat hiſ verbis. Πολυδῆδης δὲ ὁ κίτλος καὶ ᾧ οὐκ ἐπιγράφεται, ὃ εἰς  
ὅλους ἀμρόνους καὶ τῶν ἐν ὑψὶ πλεῖστον γίνεται, τρία δ' αὖθις φαίνεται τὰ μέρη. ὅτε λευκός, καὶ ὁ  
μέλας, & τρίτον ἢ ἑλίκη. Εἴδη δὲ ἐκ τούτων πλεῖστα. λευκός ὅστις, ὅμιον τῷ χαρπύ μόνον, ὁ δὲ  
καὶ τοῖς φύλλοις ἐστὶ παλαιὸν τῶν λευκοχάρπων μόνον, ὁ οὐκ ἀδρὸν ἔχει σπινόν, ἔσιωες ποικίλων  
(lege σιωες ποικίλων) χαρπὸν ἔχει καθάπερ εἰς σφαιραν, ὅτι διὰ καλοῦσαι τις περιέβλεψε. αἱ δὲ  
διαφοραὶ ἀνεγκνόν ἀδρυοειδώνων: ὁ δὲ ἐλάττω, διακεχυμένων, ὥστερ' ἔοικας ἐξελίξαι. ὁ δὲ μέλας  
τοῖς λευκοῖς, τῇ τε μικρότητι, ἔστω γωνοδεὴς καὶ τῇ λιθυώτερά ἐστιν ἐμενδα, γωνοδεὴς  
καὶ λιθυώτερη) τὰ δὲ τέσσαρες περικλυτά καὶ ἀπλὰ καὶ τῷ μέλει τῶν κλημάτων, ἔστι τὰς  
ἐκχαρπον εἶναι. Διακρίνοντες γάρ τινες, τῷ μηδικοῖς βλάπτει τὴν φύσιν τὴν ἐλαττω, ἀλλὰ τῇ ἐν τῷ  
κίτλω

Nomina

Li. cau?  
ca. 16.

Cap. III.]

Li. 2. ca. 175.

*Genera.*

Lib. 3. hist.

cap. 18.

1







paucis euenit, vt vetustate cōmutentur, velut in populo alba, & Ricino. (Quæ sic expressisse videtur Plinius, Maximè foliorum vnitas in suo cuiq; genere perma-  
 net, præterquam populo, Hedera, crotoni, quam & Cici vocari diximus) Sunt igitur Helicis genera multa, maximè verò nota & summa tria. Prima est virens siue herbacea, quæ plurima est; secunda candida, tertia versicolor, quam Thraciam quidam nominant. Et singularum differentia quædā sunt. Nam virētis alia tenuiore est, & longiore folio (Plinius habet, in ordinem digesto) densiorēque. Alia minus hæc omnia habet. Et versicoloris alia maius, alia minus folium habet, & colorum varietatem in eo dissimilem. Similiter & magnitudine & colore distant candidæ folia. Facillimè augetur herbacea, & altissimè assurgit. Manifestum esse aiunt Helicen in Hedera transituram, non solum foliis quæ maiora latioraq; gerit sed etiam germinibus: protinus enim recta gerit, non inflexa vel inclinata, tum ob reuinitatem, tum ob longitudinem. Nam alijs hederis (Gaza legit *πρόσως*, id est herbaceæ pro *πυρρόσως*) breuiora crassioraq; sunt germina. Nam Hedera cum sēmen parit, sublime & rectum germen edit. Est quidem Hedera omnis, radice numerosa, densa, intorta, lignosa, crassa, nec valdè in profundum acta, sed maximè nigra, & inter candidas quæ asperrima, maximeq; siluestris. Quare non sine damno arboribus adnascitur: omnes enim necat & arefacit, sublato ipsis alimento. Crassescit hæc maximè & arborefcit, ipsaq; per se arborefcit. Maiore autem ex parte super aliud viuere solet, caulibus suis vicinas arbores velut amplexando, tale quid statim habens sua natura. Etenim è germinibus assiduè radices per media folia emittit, quibus quasi de industria à natura datis, muros & arbores subit, & iis pertinacius hæret. Atque ita sublato humore, atque exhausto, ipsas tabefacit. Quod si inferius succidatur, durat, nec emoritur. Est & huius non parua differentia à fructu sumpta. Nam alius dulcis est, alius valdè amarus, tam candida, quam nigra. Id demonstrat aues, quæ alio vescuntur, alio minimè. Hæc de Hedera Theophrastus literis mandauit, cum quibus Plinij locum in quo eadem genera distinxit, conferre nec iniucundum, nec inutile fuit. Duo genera Hedera: prima, inquit, vt reliquarum. Mas & femina. Maior traditur mas corpore, & folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis est rosæ siluestri, nisi quod caret odore. Hæc scilicet Plinius quæ *μαρὴ τῆς κίτης* sunt audienda, τὸ κίτης, id est Hedera: incogitantè tribuit.) Species horum generum tres. Est enim candida & nigra hedera, tertiæque quæ vocatur helix. Etiamnum hæc species diuiduntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum candida, alia & folio fructum quoque candidam ferentium alius densus acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui vocantur Corymbi. Item selenitium, cuius est maior acinus, sparsior racemus (Hæc aliter legisse videtur Plinius quàm in Græcis nostris exemplari legimus) Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum, cuius coronis Poëtæ vtuntur, foliis minùs nigris, quam quidam Nyssam, alij Bachicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiāmnū duo genera huius faciunt, à colore acinorum Erythranum (rectius fortassè Erythrocarpum) & Chrysocarpum. Plurimas autem habet differentias helix, quoniam folio maximè distat. Parua sunt & angulosa, concinnioraq; cum reliquorum generum simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipuè tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis esse, non generis, existimant: primoq; helicem esse, deinde fieri hederā vetustate. Horum error manifestus intelligitur. At enim helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè insignia. Herbacea ac virens, quæ plurima est, altera cādido folio, tertia versicolor quæ Thracia vocatur. Etiamnū herbaceæ tenuiora folia, in ordinem digesta, densioraq; in alio genere

Lib. c. 22.

Lib. c. 34.



genere diuersa omnia. Et in versicolori alia tenuioribus foliis, & similiter ordinatis, densioribusque est: alteri generi neglecta hæc omnia. Maiora quoque, aut minora sunt folia, macularumque habitu constant: & in candidis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maximè herbacea. Arbores autem necat candidiora: nemque succu auferendo tanta crassitudine augetur, vt ipsa arbor fiat. Signa eius, folia maxima, atque latissima ramos erigētis (non mamas: nam *ματῶς* legisse videntur pro *βλατῶς*) qui sunt cæteris inflexi: racemi stantes atque surrecti. Et quanquam omnium hederarum generi radicosā brachia, huic tamen maximè ramosa, ac robusta: ab ea nigra. Sed proprium alba, quod inter media folia emittit brachia vtrinque semper amplectens arbores: hoc & in muros, quamuis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis inter cisa, viuit tamē duratque: & totidem initia radicū habet, quot brachia, quibus incolumis & solida arbores fugit, ac strangulat. Est & in fructu differentia albae nigraeque hederæ: quoniam aliis tanta amaritudo acini, vt aues non attingant. Est & rigens Hederæ, quæ sine adminiculo stat, folia omnium generū ob id vocata Cissos. Hactenus Plinius. Matthiolo duæ sunt præcipuè Hederæ differentie, maior & minor. Maiorem vocat arboream, quæ non solum in siluis excelsas arbores scandit strangulatque, arcto brachiorum complexu, sed etiam antiquis ædificiis, vrbium mœnibus, sepulchrisque adeo pertinaciter hæret, vt tandem ea diruat, & vna cum iis collabatur. Minorem quæ sterilis est, helix dicta, raro arbores scandens, sed aut humi repens, aut per saxa, macerías, sepes, aggeres serpens. Duo quoque Hederæ summa genera nostra ætate nota sunt. Primum genus est Hederæ vulgaris arboreæ cunctis notæ. Huius multæ varietates, inquit Pena, antiquis persuadere potuerunt, vt plures differentias, siue species statuerint: tamen si discrimen è baccis duntaxat Dio scorides accersat, vt in malis, nucibus, & aliis fructibus vulgò fit. Quinetiam arborefcit quædam, suo pteq; stat ille pite, nulli innixa pedamento, qualem in siluosis quibusdam Angliæ se vidisse ait. Orthocissos antiqui dicunt. Interdum etiam quibusdam locis perampelino colore folia nitent. Pisis sibi demonstratas ab Herbariis corymbis cæsijs & albicantis coloris: melinos subfuscis corymbos plerisque plantas scetas in hortis Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia hodie maturare. Alterum genus est humilis planè, minoris & infrequentioris hederæ, quæ concinne Helix vocata fuit à viticulis, quam plurimis clauiculis capreolisque quibus serpit & propagatur. Duo ista genera hic appinximus, tertium ex Dalechampsio adieci- mus. Hederæ alba, inquit Dioscorides, album fert fructum, nigra nigrum, aut crocei coloris. Helix nullum fert fructum, sed alba habet sarmenta (Antiquus codex habet *λεπτά* & *τὰ κλημάτα*, id est tenues viticulas habet) & folia tenuia, angulosa & concinniora. Hederæ nigra vulgaris est nostra arborea fruticosa stirps, quæ brachia fundit dura, lignosa, cortice cinereo, spisso contexta, quibus arbores, parietes, & quicquid nancisci potest, amplectitur. Folia primum cum pubescit, angulosa, quam plurimis in triangulam figuram exeuntia, quæ cum vetustiora sunt, rotundantur, pinguis, dura,

*HEDERA Arborea,*  
*Matthioli.*




Lib. 2. c. 175.

Forma.



lævia, etiam inuita bruma virentia: flores cōgerie muscartij glom. rosi, pallidi, non inodori, quibus æstate de lapsis bacca race mosa, primum herbacea, deinde atræ ineunte hyeme maturescentes, ex longiore pediculo in vix modum dependent, ligustro similes, corymbos vocant. Radicem spargit numerosam, densam, flexuosam, contortam, ac surculosam, nec admodum profundam. Helix, vt describit Pena, ex sarmētis, seu viticulis capreolos emittit, qui humi panguntur, & propagatione quadam quasi in spiras & anfractus prouoluuntur: interdum etiā serpēdo muscidis truncis & caudicibus aduoluitur, gracilioribus sarmentis, folia minora, alius triquetra diuisura, sinuata edentibus, planè superioris, sed minora, minorisque vñs: nec enim vel folia eius decerpuntur, vel gummi vllum Officinæ ex hac colligunt. Quin nec fructus quidem vllus in ea obseruatur: vnde sterilis putatur. Hederæ Chrysocarpos dicta ab acinorum colore aureo, Dionysia aut Bachica, quod coronis ex ea Poëtæ vterentur. Dionysiacos enim artifices Græci olim vocabant, qui aut cantu, aut musicis instrumentis scenæ ludisq; publicis inseruirent, ex congeneribus nigris folium habet minùs atrum, minimè angulosum, crassum, carnosum, venosum, in acumen fastigiatum, nec admodum densum: in corymbis acinos luteos aureo nitore fulgentes, maximè ex congeneribus aspectu pulchros. Hæc radicosis brachiis reliquarum modo vicinas arbores enecat, succo earum exhausto. Raro in Gallia prouenit. Helix in siluis humi serpit. Nigra & arborea vulgaris, circa vda, & circa ripas humentium regionum, frigidarū, & temperatarum: nam calidissimarum impatiens est. Hederæ omnis auctore Dioscoride, acris est, & adstringens, neruos tentat. Flores trium digitorū capti in vino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti profunt. Terneræ folia cum aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborū succus cum irino vngueto, melle, aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores valet, atque eo perfunditur caput cum aceto & rosaceo. Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ Hederæ succus, aut corymbi epoti imbecillitatē pariunt, mentemque turbant, largius sumpti. Pilulæ quinque corymborum tritæ calfactæq; in malicorio cū rosaceo, si instillantur in cōtrariam aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillos illiti corymbi. Folia in vino decocta, omnium

*HEDERA Helix,*  
*Matthioli.*



*HEDERA Dionysias,*  
*Dalechampi.*



*Locus.*

*Li. 2. c. 12.*

*Vires*

*Temper.*



*f.* vlcere generi, etiam si cacoethe sint, illinuntur: vitia cutis in facie, & ambusta, ut iam diximus, decocta sanant. Mouent menses triti & subditi corymbi. Iidem poti post purgationes feminatum, sterilitatem faciunt. Pediculus foliorum melle nigatus & vuluæ inditus, menstrua & fœtus extrahit. Succus instillatus naribus graueolentiam & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculósque illita, necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit. In veteri codice habetur *συν ὀξέϊ ἐψηθῆς καὶ ποθῆς*, id est, cum aceto potus coctusq; eundem vsum medicum hederarum Plinius exposuit etiam prolixius his verbis. *Li. 24. c. 10.* Hederæ genera viginti demonstrauimus. Natura omnium in medicina anceps. Mentem turbat, & caput purgat. Largius pota, nervis intus nocet. Iisdem nervis adhibita foris prodest. Eadem natura quæ aceto ei est. Omnia genera eius refert. Vrinam cient potu, capitis dolorem sedant, præcipue cerebro continentiq; cerebrum membranæ vtiliter mollibus impositis foliis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo. Illinuntur autem fronti: & decoctionum fouetur os, caputq; perungitur. Lien & pota & illita, profunt. Decoquantur & contra horrores febrium, eruptionesque pituitæ, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant, iocinora autem illiti. Trahunt & intestes appositi. Succus hederæ tædia narium graueolentiamque emendat, præcipue albæ satiuæ. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur autem purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorum facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus, satiq; est acinos sex in cyathis duobus sumi. Acini quoq; ex eadem alba terni, in aceto multo poti, tines pellunt: in qua curatione ventri quoque imposuisse eos vtile est. Hederæ quædam *Chrysocarpum* appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario trita ut terni cyathi petentur, aquam quæ cutem subierit, per vrinam edacit. *Li. 24. c. 11.* Stratus. Eiusdem acinos quinque tritos in rosaceo oleo, calefactosq; in cortice punicis, instillauit dentium dolori à contraria aure. Acini qui croci succum habent

*THLASPI Hederaceum,*  
*Lobell.*



*Li. 7. simpl.*

præsumpti potu, à crapula tutos præstant: sanguinem excreantes aut torminibus laborantes. Hederæ nigra candidiores Corymbi potes. Steriles etiam viros faciunt. Illinunt decocta in vino omnium vlcere generi, etiam si cacoethe sint. Lachryma hederæ psilothrû est, phthiribusq; tollit. Flos cuiuscumq; generis trium digitorum captu, dysentericos & aluum citius emendat in vino austero bis die potus. Eructibus vtiliter illinuntur cum cera. Denigraunt capillum Corymbi. Radicis succus in aceto potus contra phalangia prodest. Huius quoque decoctione vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Eructus nos terunt, moxque comburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui incidant succi gratia, eoque vtantur ad dentes erosos, frangi que tradunt, proximis cera munitis, ne lædantur. Gummi etiam in hederâ peruenit, quod ex aceto vtilissimum dentibus mittunt. Hæc Plinius. Galenus easdem vires distinctius docet. Hederâ, inquit, ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam refrigerantis substantiæ, quæ terrena & frigida est.



habētq; etiam nonnihil acris, quæ calida. Nec deest tertia, aqueam namque substantiam quandam tepidam habet, si viridis sit. Cum enim arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manētque quæ est terrena, frigida & adstringens, & ea quæ calida est, & acris. Viridis foliis in vino decoctis, vlcera grandia glutinat, quæq; maligna sunt, ad sanitatem reducit. Igne etiam factas exulcerationes, cicatrice includit. Cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo validiores sunt, vt ad lauorem redacti cum cerato ambustis conueniāt. Præterea succus medicamentum est, quod naribus infusum, capiti purgando idoneum est. Vetusitas aurium fluxiones sanat. Adhæc vlcera vetera, tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, vsque adeo calidæ potestatis, vt obscure adiuuat. Plantam aliam Hederaceam ex Lobellio pictam damus, Hederaceam Thlaspi vocat. In Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino portu Plimmoavve, aliisque maritimis cauitibus reperit herbula, dodratalibus & spithameis gracilibusque cauliculis, stratis, punctis, foliis sinuosis Hederaceis, carnosiss. Floſculi cædidi & semen exile in folliculis gustu & habitu Thlaspi exprimunt. Hæc Lobellias.

SMILAX.

CAP. IX

**S**MILACIS vox valde est ambigua vt quæ quasdam cognatas vel similes plantas, significet, quasdam admodum discrepantes, & viribus plane contrariis pollentes, veluti taxū venenatā, (σμυλαξ enim Dioscoridi dicitur) & Smilacem asperam quæ venenis aduersatur, præterea Smilacem læuam, facultatis non admodum exploratæ, quandoquidem vtilitatem nullam, sed tantum incommodum turbulenti somnij parere Dioscorides scribit. De duabus hæc agimus, quarum prior σμυλαξ τραχηλα Græcis dicitur, μύλαξ Gale-  
no, Latinis Smilax aspera, & Hedera Cilissa, aliquibus volubilis aculeata, vel pun-  
gens, Ital. s. *Hedera spinosa*, & *Rouo ceruino*, Gallis *Lisef piquant*, Germanicè, inquit  
Fuchsius, *Stechendumbel* ab aculeis quos habet apte nominari potest: σμυλαξ vero  
λεια, siue μύλαξ λεια Græcis altera vocatur, Latinis Smilax læuis vel leuis, Plinio  
Conuoluulus, Officinis & Herbariis Volubilis maior, nonnullis Campanella, &  
funis arborum, Ital. *Uilucchio maggiore*, Gallis *Grand Lisef*, vel *Liseron*, Germanis  
*Vreindenkraut*. Læuis porro non alia ratione appellatur quàm quod aculeis careat.  
Smilax aspera vt describit Dioscorides, folia habet periclymeno similia, ramulos  
multos, tenues, paliuri, aut rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sur-  
sum deorsum se circumagens: fructum fert racemosum, paruum, cū maturuit ru-  
bentem, gustu leuiter mordentem: radicem duram, crassam. Smilax læuis hederæ  
folia similia habet molliora tamen, læuiora, & tenuiora: ramulos supradictæ simi-  
les, aculeis carentes. Conuoluitur & hæc arboribus vt prior. Fructum fert lupino  
similem, nigrum, paruum: flores circumquaque albi, copiosi, orbiculati per totam  
Smilacem exeunt. Estate tabernacula ex ipsa fiunt: Autumno folia decidunt. Smi-  
lax aspera, vt Dioscorides ait, nascitur in palustribus & asperis, vt Plinius, in con-  
uallibus opacis, at Smilax læuis amat culta, & in iis potissimum gignitur. Nascitur  
nobis passim per fruteta, & sepibus se aduoluit. De vtrâque Smilace Plinius hæc  
prodidit. Similis est hederæ, & Cilicia quidem primum profecta, sed in Græcia fre-  
quentior quam vocant Smilacem, densis geniculata caulibus, spinosis, fruticosa,  
ramis & folio hederaceo, paruo, non anguloso, à pediculo emittente pampinos:  
flore candido, olente lilium. Fert racemos labruscæ modo, non hederæ, colore ru-  
bro, coplexa acinis maioribus nucleos ternos, minoribus singulos, nigros, durosq;  
infausta omnibus sacris, & coronis, quoniā sit ligubris, virgine eius nominis pro-  
pter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Et mox. E Smilace hunt

Nomina

Vide Thysag. pag. 503.

Li. 4. c. 139.

Forma.

Locus.

Lib. 16. c. 55.



Lib. 3. Hist.  
cap. 18.

codicilli, propriūque materiæ est, ut admota auribus leuem somnū reddat. Quæ Plinius ex Theophrasto sumpsit, sic scribente: ἡ δὲ σμίλαξ ἐστὶ μὲν ἐπαυλόχαρπον. ὁ δὲ χαρπὸς ἀγαυόδης, καὶ ὡς περ ὀρθόχαρπον (mendosa hæc, sic enim legenda. ἐπαυλόχαρπος, ὁ δὲ χαρπὸς ἀγαυόδης, καὶ ὡς περ ὀρθόχαρπος.) τὸ δὲ φύλλον κισσώδες, μακρὸν, ἐξήντη, τὴν μίχην περισφυσιν, καὶ πλεόντερον. ἴδιον δὲ ὅτι τὴν τε διαμείβου τριφυλίην ὡς περ ἔχει, καὶ τὰς τριφυλίας διαμήφει (Rectius ἢ τὰς τριφυλίαν διαμήφει) ἐκ ἀπὸ ταύτης, ὡς περ τὰ τῶν ἄλλων, ἄλλα περὶ αὐτὴν περιφέρει, ἡ γὰρ ἀπὸ τῶν περισφυσιν φύλλον. παρὰ δὲ τὸν χαυλὸν τὸν αἰττον, καὶ παρὰ τὰς διαμήφει τὰς φυλλικὰς, ἐκ τῶν αὐτῶν μυχίων τοῖς φύλλοις περιτρέφεται χαυλὸς λεπλός, καὶ ἐλαφύς, αὐθιγὸς δὲ λαφύς, ὅς τινες ἔτι (Repone ex Plinio λευκόν) τὸν δὲ χαρπὸν ἔχει περισφυσιν τῶν τριφυλίων, καὶ τῶν μυχίων, καὶ μάστιγι, τῇ χαλαρῇ τριφυλίᾳ ἀγρία, καὶ ἀκρέμαται δὲ οἱ βότρυες κίττις τρόπον, παρεγγύς δὲ μάλλον πρὸς τὴν τριφυλίαν, ἀπὸ γὰρ ἐνδὸς σημεία οἱ μίχοι οἱ βαγικοί, ὁ δὲ χαρπὸς ἐρυθρὸς, ἔχει πυρήνας, ὅ μιν ἐπίπαι δύο, ἐν τοῖς μετέσοις δὲ τρεῖς, ἐν τοῖς μικροῖς ἑνα, σκληρὸς δὲ ὁ πυρήν, καὶ τῶν χαυλίων μέλας ἐξάθεν. ἴδιον δὲ τῶν βότρυων, ὅτι ἐκ πλαγίαν τὸν χαυλὸν περιτρέφει, καὶ καὶ αὐτὸν ὁμειγνύσας βότρυς τῶν χαυλίων, ὡς περ ἐπὶ τῶν βότρυν, τὸ δὲ τριφυλίαν ὡς καὶ ἀκρόχαρπον καὶ πλαγίαπλακὸχαρπον, mendosè pro πλαγίαχαρπον, vel, πλαγιοπλόχαρπον. Id est, Smilax caulibus suis sese aliis implicat, & obvoluit. Caulis enim spinosus, veluti rectos aculeos gerit. Folium hederaceum, oblongum, angulosum, quā pediculo annectitur, & latius. Propriū huic quod mediū ipsum nervus, spinæ tenuis modo secatur, & staminum diuisiones non ab ipsa spina, ut in aliis foliis, sed circa ipsam in orbem circumactas ducit ab ipso pediculi annexu. Ad caulem vero imbecillum, quā folia velut interstitio quodam ab ipso se iunguntur, ex eodē sinu enascitur cum foliis cauliculus gracilis & conuolutus: flos est albus, odoratus, liliæ olens (Sic Plinius. Ex quo perspicuum est λευκὸν legisse, Gazam verò ἑρμὸν, sicuti habent vulgata exemplaria: vertit enim, Verno proueniens tempore.) Fructus enim milis solano, aut melothro, & maximè viti siluestri, racemis ut hederæ pendentibus, propius tamen ad vix figuram accedentibus: quoniam ab eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Fructus ruber sæpius quidem nucleos binos complexus,

SMILAX Aspera, Math.



maior ternos, minimus singulos. Foris nigri sunt nucleī, & valde duri. Peculiare habent racemi, quod ex obliquo caulem sepiunt, & vix omniū maximus est in summo caule, vel in rhamno, atque rubo. Vnde liquet Smilacem & in summo, & in latere fructiferā esse. Hæcenus Theophrastus. Smilacem asperam esse plantam hic depictam censent Herbarij, quæ, inquit Penna, non nisi montosis collibusq; feruidiorum tractuum, Romanæ, Hispaniæ, Lingæ Gothiæ, prouenit. Vbi plurima horridis, aduncis, crebrisque spinis rubi ritu amplexatur proxima quæq; assurgitq; ultra supraq; parietes, & sepes vicinas. Folia hederacea, longiora, bryoniæ nigriæ ambitu, & superficie, non incisa, sed læuibus & in medio secundum strias nervulorum spinulas habentia, ex atro virentia. Ferti acinos rubros racematim copiosos, ribes vulgaris magnitudine & modo: nec flores dissimiles ribes vtriusvis, racemosos, sed albos. Radices tamen longius excurrant subter humum, ternis, aut quaternis vlnis longiores, non tantum tamen cum



cum Zarfa parilla similitudinis habent, quantum hætenus persuasum fuit doctis quibusdam, qui scripserunt Zarzam parillam, nihil aliud esse quam Smilacis asperæ radices. Qua de re suo loco dicemus. Ab hac Smilace aspera, foliis, viticulis, spinosis, floribus, vuis, radice, viribus, deniq; natalibus differt Smilax lævis, ab Herbariis vulgò dicta Volubilis maior, Italis *Volucchio*

*SMILAX* *Lævis, Matth.*



*maggiore*, Gallis *Liseron*, Germanis *Vuidenkrant*. Consentiant notæ omnes dempta collatione seminis huius, nigri & angulosi, cū lupino compressio & rotundo. Quare suspicatur Pena pro *hermus* legendum esse in Dioscoride nomē *ἑρμης* ex Latino Græcum factum. Suspicionem augēt verba proximè sequentia, quæ neutiquam sibi cohererent, Semen veluti lupini, paruum, & nigrum. At semē lupini, nec paruum est, nec nigrum. Non est igitur quod quis conuoluulum reiciat, inquit Pena. Est enim nō modo sarmentis viticeis, mollioribus, longissimis, & aptissimis ad fornicatas opacationes, sed etiam foliis læuibus, hederaceis, flore albo, orbiculato, radice longa, sparsa, flexuosa. His accedit antiqui & manuscripti Herbarij testimonium, quod Smilacem læuem, Volubilem maiorem interpretatur. Quidam aptius pro re ipsa, nescio an verius, at melius, legūt apud Dioscoridem, *χαρπύδιον ἢ ἐπὶ ὀφθαλμοῖς, μέλαν, μικρόν*: alij verò, *ἐπὶ τῷ ἔκτῳ*, id est, fructum nigrum & paruum habet, folliculi septo inclusum. Eius etiam pictura, Volubilem,

quam maiorem appellauimus, penitus exprimit. Smilacis asperæ folia, auctore Dioscoride, si antè & post bibantur, cōtra lethalia venena efficacia sunt. Tradunt *Li. 4. ca. 139.* scitum ex his aliquid nuper in lucem edito infanti bibendum detur, nullum illi *Vires.* postea venenum nociturum. Conciditur etiam in Alexipharmaca. Smilacis lævis semen, eodem auctore, cum Dorycnio, & utrūq; trium obolorum pondere potest, somnia multa & turbulenta facere traditur. De utrūq; viribus hæc Plinius scripsit. Smilax quoque, quæ & Nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet, tenuioribus foliis. Coronam ex eo factam impari foliorum numero, aiunt capitis doloribus mederi. Quidam duo genera Smilacis dixere. Alterum immortaliari proximum, in conuallibus opacis, scandentis in arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omnia efficacissimis, in tantum, ut acinorum succo infantibus instillato, nulla postea venena nocitura sint. Alterum genus culta amat, & in iis gignitur, nullius effectus. Illa est Smilax prior, cuius lignum ad aures sonare diximus. Galeno Smilacis folia leniter acris gustu sunt, alioqui vrentibus calidæ: cui similes quodammodo vires Milax lævis obtinet. Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidos vtuntur affectus, capitis potissimum, & oculorum.

*HELXINE CISSAMPELOS, CAP. X.*

*Ἀξινη κισσαμπελος* Græcis, Helxine Cissampelos Latinis nominatur, *Nomina* Arabibus *Asim*, vulgus Herbariorum & Officinæ Volubilem mediā, *Vide Physiq. pag. 197.* & vitealem appellant, Gallicè *Liseron de vigne*. Est autem dicta *ἄξινη* *ἀπὸ τῆς ἄλκῃς*, quod significat trahere & arripere. Cissampelos autem, quod tum folio sit hederæ, tum viticea propagine vicinis sese obuoluat, vnde



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

HELXINE Cissampelos,  
Matthioli.

Forma.

Locus.

Cap. 174.  
hutor.



HELXINE Cissampelos,  
Dodonsi.

Lib. 5. cap. 3.  
& Purg. 3.  
cap. 6.



Vires.

Lib. 5. cap. 3.

in vineris reperitur. Vindemiæ tempore semen perficitur. Pena & Lobellius Helxinem Cissampelon alteram Atriplicis effigie nominant. Foliorum succus inquit Dioscorides, potu deiicit aluum. Et Galenus, Helxine, quæ Cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet.

Conuoluuli nomen, & q̄ in vineis potissimum nascatur, vnde & Virealis. Hæc, inquit Dioscorides, folia habet hederæ similia, minora tamen, ramulos exiguos, circumplectentes quodcumq; contigerint. Nascitur in sepibus, vineis, & frumento. Hæc, inquit Matth. satis declarat Helxinem Cissampelon eam esse quæ in aruis tū legeres ipsas, tū lini, tum legumina irretit, ac vincit, & in vineris, palis, ac vitibus circumuoluitur, quam Hetrusci *Vilucchio minore* appellant, Tridentina rura *Minutola*, Recentiores Volubilem minorem, & Conuoluulum minus, Galli *Petit Liseron*, Germani *Kleyn vinderkraut*. At Dodonæus & Lobellius Smilacis lævis speciem esse statuunt, & ad eam referunt. Ille Smilacem læuam minorem, hîc cum Pena Smilacis læui maiori subiungens, Conuoluulum minorem purpureum vocant. Maiorem Smilacem satis refert, sed humilior, tenerior, ac omnino minor est: tenues illi quoque & viticulosi cauliculi, quorum nonnulli humi repunt, alij herbas frugescque scandunt, & crebris eas voluminibus vinciunt: folia oblongiora, hederaceis minora, mollia, ac læuata, flos similiter calathi figura, nonnihil odoratus, magna ex parte candidus, relucens tamen in eo diluto rubentis purpuræ colore, & radiantis stellæ effigie: semen exiguum, radices tenues, candidæ, velut prioris sparguntur. Helxinem vero Cissampelon Dodonæus, tum in Stirpium, tum in Purgantium Historia esse censet, quæ ad Smilacis lævis genus quoque pertinet, & Conuoluulum nigrum, & Volubilis nigra dicitur, à Democrito in Geoponiciis *μολυβδινωσος*, Latine Mollis hederæ, Officinis Volubilis media, Germanis *Schneuzart vinder*, & *Mittel vinder*. Huic prætenues multæ circum instar subrubentes viticulae, quibus fructibus, & omnibus quæ contingit vicinis tectibus, & crebris circumuolutionibus implicat, ab imo ad summa proserpens: folia lata sunt, longa, acuminata, hederæ foliis molliora, tenuiora, flores exigui racematim coherent, candidi, semen triangulare, nigrum, tenuibus & subrubentibus membranis, veluti glumis integritur. radix exigua brevisq; est. Iuxta sepès & Lobellius

VOLV





OLVVLVM terrestrem plantam istam nominarunt Herbarij, quod *Nomina*  
flore Voluulo siue conuoluulo, siue volubili similem proferat, ter-  
restrem, quod caules perpetuo per humum spargat, nec conuoluulo-  
rum more in proxima adminicula scandat. Radice est crassiuscula, ni- *Forma.*  
gricante, modicè fibrata, caulibus multis, sesquipedalibus, humi iacentibus, villosis,

VOLVVLVS Terrestris,  
Dalechampij.



VOLVVLVS Ceruleus,  
siue Campana Azura, Lobel.



cum franguntur nullum lac emittentibus, quo-  
rundam Voluulorum modo, gustu subausteris:  
foliis longis, angustis, rugosis, non ita densis: flore  
Conuoluuli minoris, superiori capite descripti, è  
puniceo candicante, suauiter olèce, ex decem ve-  
luti foliolis constante, sed quæ à sese minimè dis-  
iuncta sunt, verum lineolis tantum discreta, alio-  
qui coherentia. Prouenit in aridis, macris, sabu- *Locus.*  
losis, apricis. Alius est Voluulus siue Conuolu-  
lus hederaceus, siue caruleus, omnium huius clas-  
sis rarissimus & pulcherrimus, inquit Pena, nec  
nisi hortis Italiae, Galliae, Belgij notus, vti amena  
purpura porrectis attextisque secus parietes, &  
perticas, longis viticulis, gracilibus, umbracula  
concinna, aspectu perueundus: visendus quoque  
floribus è pediculorum calice exeuntibus, Vincæ-  
peruinæ colore similibus, in ambitu quinque pro-  
minentibus angulis, Nolæ caruleæ effigie: vnde  
Campana Lazura Italica dicitur. Folia ternis angu-  
lis singula, in teneriusculis pediculis Cyclaminum,  
hederamve annosam imitantia, non nihil hirsuta:  
longa & gracilis radix. Nulla sui parte in usum à  
Medicis assumitur. Serapio cap. 273. Granum Nil vo-  
cat, etiam ab Auicenna memoratum, & ita describit:  
Conuoluulo similem esse: flagellis duobus, aut tribus,  
applicare sese arboribus: virētibz ramis & foliis: pur-  
pureo flore, oblongo, calathio simili, ad exortum folio-  
rum prodeunte: seminibus, flore delapso in suo capi-  
tulo tribus, nigris, leuibus, minoribus quam Staphys-  
agria: quæ huic plantæ conueniunt omnia. Dodo-  
næus esse putat Ligustrum nigrum Columellæ. Alij,  
quod non est contemnendum, censent Virgilij, Co-  
lumellæque: vnum ac idem Ligustrum esse, album Vir-  
gilio dictum à colore floris, nigrum Columellæ à co-  
lore fructus. Quidam Pothon caruleum Theophras-  
ti esse credunt, ornamento & umbraculis sepulchro-  
rum laudatum antiquitus. Alij Pothon illum esse ma-  
lunt Conuoluulum purpureum duplici Cortusij, illu-  
stris viri, laudandique multis nominibus, caulibus  
prælongis sese vicinis perticis aduoluentem, in altero  
genere spinosis, in altero lauibz: folio lato, laui, mi-  
nimè anguloso, in ea specie quæ caret spinis, prona  
parte candicante: flore eleganti purpura nitente: se-  
mine laui, nigro, splendido. Clusius Conuoluulum *Lib. 2. stir. Hisp. a. c. 30.*



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*CONVOLVVLVS Folio Althææ, Clusij.*



incana, per ambitum crispa, nonnunquam serrata, & nonnihil laciniata, gustu gūmofa, subacria, & subamara. Flores ex alarum sinu promit, longis pediculis hærentes, convoluuli floribus similes, qui ita complicantur, vt pluribus foliis contrare videantur, ex purpureo candicantes, interdum omnino purpurascens. Radix tenuis, exilis, fusca, per summos cespites repit, & alias plantas producit. In collibus iuxta Tagum lato solo, in Baetica, plurimisque aliis Hispaniæ locis frequentem esse ait, florereque Martio & Aprili. Ad quam stirpem à veteribus descriptam referri possit, ignorat, nisi fortè lalionem, cuius meminit Plinius, esse quis existimet. Valentini Conuoluulum folio althææ, Hispani vulgari nomine *Campanilla*, id est, Campanulam, Lusitani *Verdezilla* vocant, & ad vulnera curanda efficacissimam esse aiunt. Conuoluulum peregrinum Clusij vocat Lobellius, & Conuoluulū Scammonij facie, Heliconiæ Cissampelō Dioscoridis. Aliam huius congenerem idem Clusius pinxit, quæ ad Voluulum terrestrem Dalechampi videtur accedere. Constat multis tenuibus iuncetisque

*CONVOLVVLVS Minimus, Clusij.*



ramulis, ex eadem radice prodeuntibus, humi procumbentibus, pedali aut cubitali longitudine, duris, flexilibus tamen, & lanuginosis, qui in summo aliquot flores proferunt purpurascens, inodoros, superiori similes, minores tamen, vnicofolio constantes, sed ita implicato, vt quinque constare videatur, foris margine in totidem angulos prominente: folia per ramulos nullo ordine sparsa, oblonga, angusta, tenui lanugine obducta, salicis foliis haud ab similia, gustu gūmofa, & aliquantulum amara: radix candicans, singularis, perennis, infima parte ramolosa. Nascitur iisdem quibus superior locis, atque etiam in Gallia Narbonensi. Sunt qui *Camabricam* Plinij esse putent. Conuoluulum minimum spicafolium vocant Pena & Lobellius, cuius effigies minus scitè expressa est apud Penam, Scammonium tenue Plinij quorundam.



PERICLYMENVM, CAP. XII.


**P**EPIKATMENON Græcis, Periclymenum Latinis, Scribonio Syluæ mater, Græcis hodiernis *περικλυσμα*, vulgò, Officinis & Herbariis Caprifolium, Matriflylua, Volucrum maius, & Lilium inter spinas, Italis Vincibofa, Germanis *Geyßblatt*, & *Speck gilgen*, Gallis *Cheurefent*. Periclymenum autem dictum, quòd circumuoluendo ad se vicinas arbores aut frutices vocet, & ab Italis Vincibofa, quòd vicinas plantas vinciat. Periclymenum, vt describit Dioscorides, simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, hederæ similia: iuxta folia erumpunt germina, in quibus est semen hederæ simile, flos albus, fabæ similis, subrotundus, quasi in folium procumbens: semen durum egre euellitur: radix crassa, rotunda. Oribasius, qui stirpium delineationes ex Dioscoride transcripsit, sic depingit. Periclymenum frutex paruus est, simplex, caule quadrato, per interualla foliolis circumdato, albicantibus, hederæ figura. Inter folia furculi exeunt, in quibus fructus est hederæ similis, qui quasi in folium procumbit, durus, & qui difficulter euellitur: radix longa. Oritur in aruis & sepibus, sese fruticibus adstantibus inuoluens. Eodem ferè modo Plinius. Periclymenos fruticat & ipsa, ex interuallo duo folia habens, subcandida, mollia: in cacumine autem semen inter folia durum, & quòd difficulter euellitur. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens sese adminiculis quibuscunq;. Hanc Periclymenon Officinarum esse Caprifolium, & Herbariorum Matriflyluam censent periti: quibus minime placet eorum opinio, qui hanc in dubium reuocant, negantq; esse Periclymenum, quia radicem non habeat *παχέαν, περιεπρή*, vt ait Dioscorides, id est, crassam, rotundam. At *περικλυσμα* is non dixit, nempe orbiculatam, siue tuberosam, sed *περιεπρή*, id est, rotundam, non angulosam. Alij locum corruptum esse censent, atque ex Cræuea & Oribasio restituant, *παχέαν καὶ μακράν*, id est, crassam & longam, vt iam omnis dubitandi & rixandi occasio sublata sit. Sed in hoc frutice duplex obseruatur varietas foliorum, vt annotauit Pena. Nam folium Italicè & Narbonensis vulgarioris furculis vnũ cum sit, ac continuum, gemini tamen speciem præbet, quasi vmbilico medio traiectum, vt in Centaurio luteo, Perfoliata, & Tithymalo ferato: ideòque Periclymenum perfoliatum dictum, quasi pertusum aut perforatum. Extremo verò cacumine viticularum folium acetabuli forma vel vmbilici circinatum, florum delicias continet, ex purpura niueo candore nirentes, & alicubi luteo asperfas, sensim in longitudinè porrectas, quasi promuscides elephantorum, aut lagenulas, floribus sabaceis figura multum similes: semine rotundo, coccineo, bryoniæ, succulèto. Istud Dalechamplus Periclymenum grandius vocat. In septentrionalibus verò regionibus, vt in Germania, Gallia, Anglia, Belgio, frequentius vsitatusque est Periclymenum non perfoliatum. Longis, tenuibus, lignosis, & in ramulos diuisis sursum repit cauliculis, circa quæ ex interuallis folia bina ex aduerso sita, oblonga, mollia, dilutè virentia, infernè magis canescentia, non continua, nec à cauliculis pertusa: flores

Nomina  
Vide Phlegm. pag.  
600.  
Caprifolia qd. cap.  
At perfoliata non  
Lib. 4. c. 12.  
Forma in huius  
reperit.

Lib. 17. c. 12.

Pena Iz  
Aduers.

PERICLYMENVM  
perfoliatum.









præstat. Quibus accedit quod recentiores Herbarij suo Caprifolio easdem vires assignent. Exsiccare enim ipsum tradunt vlcera humida & fordida: sanare impetigines, & alias cutis fœditates, licenem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere.

CUCUBALVS PLINII, siue Ocimoides repens. CAP. XIII.

**P**LANTAM istam Cucubalum esse Plinij siue Cacubulū quasi maleficum, quidam esse arbitrantur, quam alio nomine, inquit, Strumum appellant, alij Græcè Strychnum ob foliorum cum Solano similitudinem. Est Cyclaminus altera Luca Ghini, Clusij Alfine repens, aliis Ocimoides repens. Nascitur in sepibus radice cādida, crassā, ramosā: flagellis multiis, candicantibus, per interualla semper geminis: flore candido, quinque foliolis constante, per medium fisis: baccis rotundis, nigris, fructui Solani similibus, quas foliola quinque herbacea sustinent & amplectuntur, fœtidi & ingratisimi saporis. Sunt qui hanc Clymenum herbam esse putent à Plinio descriptam foliis hederæ, ramosam, caule inani, articulis præcinctam, odore graui, & semine hederæ, siluestribus & montosis nascentem. Alij Cucubalum Plinij Solanum hortense

Lib. 27. c. 8.  
Cacubulu  
vide Phlegm. pag. 44  
a raxa nalu  
Locus. Bolet. in  
a Boletio in  
Forma. c. pale. in  
ple. nalu. in  
Lib. 25. c. 7.

CUCUBALVS,  
Plinij.

OCIMOIDES Repens,  
Polygoni folio.



Græcorum esse credunt, nimirum cuius acini nigricant, quod in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legerunt, Solanum hortense à Romanis Strumum & Cucubalum vocari. Sed hæc & permulta alia huiusmodi notha esse, & Dioscoridi falsò adscripta, à viris doctis dudum obseruatum fuit. Præterea cum Plinius aliis locis de Solano tractarit, credibile non est eum in vulgarissimæ herbæ cognitione lapsum fuisse. Cucubali folia trita cum aceto scribit Plinius serpentum ictibus & scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine Strumum appellant, alij Græcè Strychnum. Acinos habet nigros. Ex his cyathus succi cum mulsi duobus medetur lumbis:

Vires.  
Lib. 27. c. 8.



bisitem capitis doloribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita. Aliud Ocimoides repens polygoni folio pictum dedit Lobellius, quod, ut describit Pena, è cauliculis gracilibus, geniculatis reptantibus, teneris, flexuosis, Alsines maioris folia profert bina iuxta genicula, olea siluestris, myrti, aut polygoni similia, sed paulo latiora: flores in caliculis oblongis, saponariae concoloribus, multò minoribus: radicem exilem. In Taurinensium ad Padum collibus umbrosis & siluosis & iuxta sepes frequens oritur, atque etiam in Veganij herbis & umbrosis marginibus, secus riuulos è saxorum commissuris.

## I E S E M I N V M,

## CAP. XIII.

Nomina

Cap. 176.

Agiaria.

Genera.

Forma.

**A**RABES vernacula lingua *Zambach* & *Sambach* appellant auctore Serapione, & Græcos imitari volentes Iesemin, à Iasme Græco nomine, quod violaceum significat. Qui cum Gelsimini siue Iasmini (sic enim plantam istam nominamus, Itali *Gelsimino*, Galli *Iosemin* & *Iasmin*, Recentiores quidam *Apiariam*, quod apes eius floribus plurimum delectentur) flores odoratos, albicantes albæ violæ modo conspicerent, ipsi violæ nomen indidere, quod est Iesemin Huius tria genera Serapio esse tradit. Vnum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui cæruleus. Quartum adiecit Dalechamplus flore puniceo. Ioseminum planta est pergularum ornamentis aptissima, & quæ industria & pedamentis ad fornices concinnè erigitur, à radice prolixissima fundens virgulta octo vel decem cubitorum longitudine, flexilia, viridia, ex quibus folia prodeunt, fere semper septena, ex atro virentia, mollia, oblonga, in mucronem sensim desinentia, superne acutiora quam lentisci, toto ambitu minimè crenata. Flores in virgultorum summitate racematim prodeunt, oblongi, suauiter olentes, albi, ex quibus rarissime semen oritur, in quibusdam tamen locis edere lupino si-

*Iasmin ab iaspe erat* IASMINVM Album,  
*N. apud carnos unguentum*  
*quod spiritibus odoratissimis*  
*albi, ros. n. apud grecos*  
*et iuda. hinc iaspe*  
*id est odoratissimum*  
*caros a desiderium*  
*ne d. flos etiam*  
*non desiderabilis*  
 Matthioli.



POTHOS Cernuus,  
 Matthioli.





mile scribit Matthiolus, quod à Cortuso ad se missum fuisse ait. Calidos & amœ-  
nos tractus amat, passimq; habetur in hortis & vitidariis. Flores Iulio & Augu-  
sto profert. De lasmino luteo tractauimus in libro de iis quæ in asperis nascun-  
tur. Tertium genus quibusdam Pothos Theophrasti purpureo flore, Clematis pe-  
regrina carulea & purpurea Penæ & Lobellij, Clematis altera Matthiolo & Do-  
donæo & in Stirpium, & in Purgantium, Historia. Prolixis admodum, tenuibus,  
genicularis & subrubentibus sarmentis, per arbores, frutices, perticas, pergulas, pe-  
damenta scandendo in altum prorepat. Folia multa, prioris flammulæ modo diui-  
sa, sed ramen maiora latoraq;. Flores elegantes è tenuibus & longis dependent  
pediculis, expansis quaternis ex aduerso sitis foliolis constantes, sæpe carulei,  
quandòque purpurei, staminibus aliquot mediis: semina plana, rotunda, lata,  
acum nata in globulum congeruntur. Radices proluxæ, tenues, in omnem par-  
tem sparguntur. In hortis colitur, nec vsquam alibi se vidisse Penæ refert. Quare  
Dodonæo imposuerunt, qui in Anglia iuxta sæpes & agrorum margines sponte  
prouenire persuaferunt. Plantam istam quidam inter Iosmini genera numerant.  
Sed cum nec foliorum figura, nec positus, nec floris species lasmino quadret, hanc  
ab illo diuersam esse multi credunt. Quartum Iosmini genus numerari potest,

In cap. 66.  
lib. 1.

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 48.

In Aduers.

IASMINUM Puniceum,  
Dalechampi.



quod Galli *Iosmin rouge*, & *Iosmin large* appel-  
lant propter floris & colorem & amplitudi-  
nem. E' Chio insula planta Genuam primùm  
aduecta, inde Lugdunum, fruticat recto proce-  
roque caudice, sambuco non dissimili, fungoso,  
laui, non admodum crasso, eius cortice im-  
parte rugoso, ramorum viridi & tenui. Flagellis  
multis luxuriat in cameras & pergulas horto-  
rum scandentibus. Folia in ramulis alarum mo-  
do expansis septena aut nouena, ordine ex ad-  
uerso sita, extremo quod impar est longo, acu-  
to, molli tamen cuspide, nec pungente, cæteris  
breuioribus & rotundioribus quam in lasmino  
albo, crassis, nigricantibus, minimè incisis: flo-  
re priusquàm dehiscat purpureo, cum reclusus  
est, intus candicante, foris verò purpurascen-  
tibus foliolis duobus, qui priusquàm hiaret, flo-  
rem candidum contegebant, quàm in albo la-  
tiore, ampliore, venosiore. Qui Byzantium  
profecti sunt, affirmant plātam hanc in eo tra-  
ctu, & multis Peloponnesi locis, à Græcis &  
Turcis coli studiosissimè, & vbiuis in hortis  
spectari. Sunt docti Herbarij, qui Pothon albū,

Lib. 6. hist.  
cap. 7.

a Theophrasto memoratā inter coronarios æstiuos flores, lasminum esse putant: Lib. 6. hist.  
cap. 7.  
caruleum verò, plantam à nobis demonstratam, & explicatam suprà ad finem ca-  
pituli vndecimi. ἔτι δὲ ὁ πῶτος καλεῖται οὗτος δὲ ἐστὶ διττός. ὁ μὲν ἔχει τὸν ἀνθος ὁμοίον τῷ  
πυλαινῷ. ὁ δὲ ἕτερος ἀγρῶν, λευκός, ὃν χρῶνται πρὸς τὰς τέχνας, καὶ χρομιάτερος οὗτος. Quæ  
Plinius sic interpretatus est. Sed maximè spectabilis Pothos. (Desiderium vertit  
Gaza) Duo genera huius. Vnum cui flos hyacinthi est: alterum candidius, qui  
ferè nascitur in tumulis. (Rectiùs dixisset, quo circa sepulcra utebantur, nimirum  
prope ea serentes, vt eius vaga fronde contegerentur, deciduisque floribus con-  
spargerentur: id enim apud veteres in religione positum fuit, vt vita defunctorum



busta, & sepulcra, manesque floribus & coronis ornarentur.) quoniam diuturnior  
 est. Diutius florescentem Theophrastus intellexit ac viuaciorem, quia quotannis  
 non moriatur, vt cœruleus. Pothon priorem vulgare Iasmini num floribus albis,  
 quod dixi, plerique esse credunt. Alterum suprà descriptum, flore hyacintho si-  
 mili, cœruleo, venustissimo: Iasminum album sicut odore fragrat, ita & viribus  
 multis pollet. Serapio tradit calidum esse in principio secundi gradus, humores  
 à pituita viscida ortis & catarrhis prodesse: folia eius tam humida quàm sicca im-  
 petigines & lentigines abstergere: dolorem capitis facere iis qui calida sunt tem-  
 perie. Ex floribus paratum oleum frigidis affectibus confert. Ex iisdem vnguentu-  
 rij oleum conficiunt, quod Zambacinum siue Sambacinum vocatur, cum amy-  
 gdalino oleo hominum barbæ odoris tantum gratia affundendum, quod tamen  
 temperie calidis caput adeò excafcit, vt quandoque sanguinem è naribus eli-  
 ciat. Flores Iasmini cum amygdalis dulcibus tamdiu & toties commiscant, quo-  
 usque eorum humore odorato illa imbuta fuerint. Tundunt deinde eas in mor-  
 tario lapideo, & calidas sacco conclusas prelo committunt, vnde oleum ex-  
 primitur perquam odoratum. Sunt qui vtrumque similitudine decepti Sambaci-  
 num oleum & Sambucinum à Sambuco dictum idem esse falso credunt. Dio-  
 scorides apud Persas Iasminum oleum fieri prodidit ex albis floribus Leucoij, quod  
 inter epulandum odoris gratia vsurpabatur. Vnguentum hoc ex ea viola com-  
 positum intelligit Hermolaus, quæ vulgò Gelseminum vocatur, distinctione  
 & arundineos parietes in hortis opere topiario conuestiens. Nec de villo alio  
 violarum genere Iasminum Dioscoridis vnguentum intelligit Marcellus, Vergi-  
 lius, quàm de vulgari Gelsemino: cuius vnum genus cum sit flore cœruleo,  
 quartum id violarum esse genus colore cœruleo à Dioscoride traditum is aucto-  
 rat. Quorum sententia ab omnibus doctis hodie improbat. Nam Gelse-  
 minum viticulis, foliis, ramulis, flore, radicibus, totius denique plantæ ha-  
 bitu ab omni Leucoio differt. Præterea Iasminum vnguentum ex Gelsemini flo-  
 re quod cœruleum Leucoium Dioscoridis Marcellus esse vult, non fit, sed  
 τὸν ἀνθὸν τῶν λευκῶν τῆς ἰσ., id est, ex floribus albis violæ. Ad hæc Iasminum grauius  
 spirat Dioscoridi, quàm vt libenter à plerisque recipiatur, quod demonstrat ex no-  
 stro Ielsemino non fieri. Postremò Serapio Dioscoridis interpres, alterum ab alte-  
 ro diuersis capitibus distinxit, & seorsum de vtrisque tanquam de diuersis disse-  
 ruit. Probabilius est quod existimant attentiores herbarij, vnguentum id parari  
 ex Albæ violæ floribus, qui inter omnia τῶν λευκοίων genera iucundissimi & va-  
 lidissimi sunt odoris, vt suauitate & vehementia rubras, puniceas, cœruleas vio-  
 las longè superent.

## DE IASMINO RUBRO, Dalechampij.

## CAP. XV.



QUA plantam Iasminum rubrum vocant herbarij, in hortis co-  
 lunt ac serunt olitores, floris gratia pulchritudineque inuitati.  
 Radice ea nititur crassa, longa, carnosa, fibrosa, inæquali ac ver-  
 rucosa, foris nigra, intus alba, cum manditur, sapore acri. Caulis  
 ad altitudinem propè hominis surgit, iuxta radicem scabro & ruffo cortice  
 tectus, suprà herbaceo, ac virenti, malux instar, quadrangulus, canalicula-  
 tus, medulla candida farctus, statim nodosus, nodis alternatim & sigillatim  
 protuberantibus, non ex aduersè, alarum modo, sitis. E singulis nodis ra-  
 mi pro-



DE IASMINO Rubro,  
Dalechampij.



nescente caule , addito stercore munitam , perferre hyemem aiunt , vèrequè repullulascere.

mi prode unt, bicubitales, quadranguli caulis modo, atque medulla pleni, canaliculo exculpto, striati, nodis per intervalla ad cacumen vsque prominentibus, è quibus minores furculi nascuntur. Folia Amaranthi purpurei, aut Bliti, sed in extremo acutiora, ordine sic digesta, vt perpetuò inuicem bina opponantur, neruo per media porrecto, venis hinc illinc ad medium neruum distentis, vel à neruo ad extremam oram folij pertinentibus: in summo fastigio, quà flos exoritur, sena, ampliora nempe duo, minora quatuor: saporis principio fatui, deinde acris. Flos coccineus, coloris nitidissimi, Periclymeno similis, angustus infernè, suprà latiusculus, apicibus extantibus insignis, è quatuor decussatis granis emicat, compressis, quibus, delapso flore, semen continetur, rotundum, nigrum. Quod è sapore iudicare licet, aquosa & humida est quardam eius portio: ignea verò, calidàque, & sicca altera, quæ discutere valenter possit tumores frigidos. Alias eius facultates nondum cognitae esse intellexi, aut proditas. Ser-

CLEMATIS ALTERA BAETICA,  
CAP. XVI.

**P**EREGRINVM herbæ genus Clusij industria nacta est posteritas, quod sarmenta longa, lenta & ramosa habet, quæ binos per intervalla capreolos contrariis semper inter se pediculis nascentes proferunt, quibus per vicinas arbores & frutices scandit: folia acri & feruido, singula in singulis pediculis, sed plurima simul ex clauicularum alis prodeuntia: inter quæ ex utroque sarmentorum latere pediculi exeunt calyculum sustinentes vt in tithymalis, ex cuius medio capitulum eminet è multis seminibus milio similibus congestum, quibus insident oblongi cincinnati, villosæq; veluti plumulæ albæ. Hanc primum se inuenisse ait Clusius inter Asindum ( vulgo Medina Sidonia ) & Calpen secundum fluentia, vicinas arbutulas operientem, & pondere suo deprimentem: deinde aliis Baetica locis, Ianuario iam suos cincinnos explicantem. Censet ad Clematida, cuius meminit Dioscorides, referendam esse, quia illi admodum similis est cum forma, tum temperamento. Huic adiungenda Clematis altera minor, longifolia Lobellij, cui folia sunt flammulæ, siue Clematidis albæ, multò longiora, ex aduerso bina. Cubitales & bicubitales cauliculos humi spargit. Semen,

Forma.

Vide Physion. pag. 159.

Locus.

Lib. 4.



*CLEMATIS Batica,**Clusij.**CLEMATIS Alcea minor**longifolia, Lobellij.*

radix, cæteroque facies non diuersa à Clematide vulgari. Hanc quidam Cly-  
menum esse arbitrantur.

HISTO



# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS-

QVARTVS,

*In quo omnes Cardui & alia spinosa aculeataq; planta describuntur,  
& ad vitium depinguntur.*

SPINOSARVM PLANTARVM DIFFERENTIAE.  
CAP. I.



ONCE diuersam à superioribus plantarum differentiam prosequimur, eamque admodum conspicuam, ut pote quæ nobis inuitis se prodat, nec inultos abire sinat eos qui paulò imprudentius plantas huius classis vel colligant, vel cōtrectent. Hac differentia plantæ multæ ab aliis, spinis, sentibus, aculeis, muricibus, echinis discrepant. Eadem spinosarum siue aculeatarum caulibus, surculis, foliis, flore, fructu, carduorum & acanaceorum genus constituitur. Spina vocatur, quod prætenue in durum mucronem occalluit, sic ut vellicet, vel stimulo quodam laceſcat, non aliter quàm si quamprimùm à tangentibus sentiatur, sentis consuevit nominari. Aculei, quæcunque duriuscula in culpidem turbinate punctiōem infligunt spiculorum modo. Quicquid nunc merola congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen, echinus est, sic dictus quòd globoso spinarum agmine marinum echinum siue erinaceum imitetur. Nec longè secùs murer paucioribus sæuit aculeis. In istis autem producendis tantus fuit, & sic prodigus, ut ita dicam, naturæ luxus, ut ipsis etiam veteribus tam difficile fuerit omnes earum differentias nosse, quàm accuſas plantas & carduos diligenti herbariorum cōquisitione notiores, quàm de eorum lectiōe habemus, & quibus hodie cardui innotuerunt longè admirabiliores nostratibus, nusquam à veteribus memorati, longè difficilior fuerit ex obscuris ipsorum delineationibus prisca nomina passim obuiis accommodare, qualia sunt polyacanthos, onopyxos, myacanthos, tetralix, chalceios, leimonia, &c. atque iis quæ nominibus carent propria ponere. Præterea cùm inter sese dissidentes herbarij eandem plantam variis nominibus designarint, de hac controuersia iudicare arduum fuerit. Quare ut plantarum istius generis cognitionem capere possimus, primùm operæ pretium est ipsas exquisitè nouisse: deinde eas quæ ad veterum cognitionem referri, & prisorum nominibus nuncupari possunt, ita expendere, alias ab iis aut præteritis, aut ignotas neutiquàm omittere, sed & tum accuratis descriptionibus, tum aptè cōfictis appellationibus indicare. Quod ut rectè fiat, primùm ipsarum diuisionem vniuersè ponemus ex Theophrasto, deinde singulorū tractationem aggrediemur. Ἀγρῶν ἴγῃ, id est, spinosa siue aculeata Theophrasto sunt,

Ruell. lib.  
1. cap. 1.

Spina.

Sentis.

Aculeus.

Echinus.

Murex.

Lib. 6. hist.  
cap. 3.







fruticosius à terra statim (Scolymus est Theophrasti) alterum vnicale, crassius (Scolymus Dioscoridis iudicatur) vtrique folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus: sed alter (nempe Dioscoridis: nam alterius luteus flos est:) florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, & abeuntē cum aura. Scolymum Græci vocant. Idem cum tradit Orientem Scolymum quoque in cibos recipere, & alio nomine Limonium vocare, fruticem nunquā cubitali altiorē, cristisq; foliorum, ac radice nigra, sed dulci, Eratostheni quoque laudata in pauperis cœna, & c. de Scolymo Theophrasti illa sunt intelligenda, quāvis quod subiungit emedullatā radicis vnciam vnam graueolentiam alarum emendare, & vitium id ex alis per vrinam effluere, petium sit ex Dioscoride. Quod verò ibidem alio loco tradit, Scolymum quoque vocari Limonium, apud Theophr. legisse videtur *σκόλυμος, ὃς καὶ λειμώνια*, cum tamen illic apertissimē *Leimonia* Cardui genus à Scolymo discernatur. His ita distinctis prius Scolymum Dioscoridis proponamus, deinde alterum Theophrasti. Scolymus Dioscoridi folia Chamæleonis habet, aut eius plantā quam albam spinam vocant, nigriora, crassiora: longum caulem edit, foliis vndiq; plenum, cui spinosum caput inest: radix nigra, & crassa, cuius vis vilis est iis quorum alæ & reliquum corpus grauitèr olent, si illinatur, (Cornarius pro *καὶ ἀπὸ τοῦ σκόλυμου*, id est illita, legit *καὶ ἀπὸ τοῦ σκόλυμου*, id est inspersa, cū in puluillum detrita fuerit,) aut si bibatur in vino decocta: copiosa sic vrina & fœtida expellitur. Herba recens nata, asparagi modo elixa manditur vt olus. Scolymus hic circa Mōspelium in lætis agris secus vias prosilit, quem indigenæ vocant *Charadmerette*, Officinæ Chamæleontam, nulla prorsus nota ex iis quas Dioscorides memorat reclamante: partu etiam cū adhuc tener est, in cibis grato, & germinibus, ac radicibus, quæ præsertim germinibus connectuntur (nam inferiores & altius depactas ob lignosam duritiem respuunt) esu suauissimis. Hanc plantam Pena Scolymum siluestrem, siue Cynaram siluestrem vocat: quia tota facie Cynaram aculeatam refert. Hoc tantū interest, quod foliis angustioribus, aridioribus,

Li. &amp; c. 22.

Lib. 25. c. 9.

Lib. 6. hist.

cap. 3.

Lib. 6. ca. 4.

hist.

SCOLYMVS Dioscoridis,  
Cynara silvestris, Pena.



& multo densioribus spinis sit: flores item elegantius purpurei, conferti lanugine. Huius delibratis caulibus teneriusculis & capitulis nodum in flores erumpentibus victitare rusticos Italos ait Pena. Eius flore lac defant in caseum, eiusdē florem vulgō credunt contra fœminarū sterilitatem valere, & grauidarum partus ad iustum vsque tempus continere. Scolymo Theophrasti hoc proprium quod nō solum elixa radix vescendo est, sed etiam cruda: quod tum esu iucundissima est cū planta floret: quod durefcens lactescit: sed maximē peculiare florescēdi tempus, circa solstitium. In cibo grata est tumescētis capitis carnosa moles, oblonga, minimē aculeata, & omnino ei propria in illarum genere quibus spinosum folium, contrā quam in Chamæleone, cui folium aculeatum, non autem spinosum caput. Scolymi flos senescens in pappos abit, velut Acornæ, ixines, & aliarum quæcumq; his similes. Ad æstatis vsque finem capita & florem parit indefinenter. Semini humoris & medullæ parum. Arescens folium elanguescit, desinitq; pungere. Hactenus Theophrastus.



Plantam hanc Græci etiānum hodie vocant Scolymum: Vegetius libro de Veterinaria Eryngium nominat. Eryngium luteum Monspelienses, & Itali Bononienses appellant. Nascitur prope Narbonam in maritimis: radici crassities pollicis, raphani figura: color subflavus: succi lactei copia, ut denti leonis: estur illa

*SCOLYMVS* Theophrasti, Clusio.

Li. 2. Stirp.  
Hulpa. cap.  
78.



*CACTVS*, Matth.

*Carduus Aculeatus*, pp. auctor.

scabros, quia scabros  
nolus quia spinosa  
A. planta, vel quasi  
Cascos, a. uento. La. Sc.  
reboedo quia ingris  
scabros in hunc plant  
propter spinas reboe  
dant.

Li. 19. ca. 8.

in fol. 1440



cruda & cocta à perquam multis: ex ea caules numerosi prodeunt, crassitie digiti, cubiti altitudine, nonnunquam proceriores, foliosis: folia prope radicem maiora, longiora, obscure virentia, ut in aliis Carduis laciniata, albis maculis notata: per summos caules minora: flos luteus: semen compressum, in capitulis Cnicifolius: magnitudine nucis moschatae, aculeis præduris adeò tota planta horret, ut vix tractari possit illæsa manu. Clusius eandem plantam Scolymum Theophrasti esse censet, eoque nomine depinxit, quæ caules cubitales profert, admodum ramosos, ad quorum alas singulas folia intensius viridia, sinuosa, & albis spinis horrida: flos illi luteus Cnici ferè modo: semen in capitulis spinosis latum, foliaceum, squamatis coherens: radix longa, digiti crassitudine, carnosa, dulcis, qua libenter vescuntur sues, quæ admodum & Eryngij vulgaris radice, eaque de causa in agris utramque rostro eruunt. Tota planta dum recens est, lacteo succo manat. Salmanticensi agro & tota Castella frequentissimam esse ait. Tota æstate florere, & interdum etiam Autumno, deinde semen proferre. Similem etiam esse circa Monspelium, sed multo letiorem, paucioribus ramis, & altius assurgens, neque flore adeò copioso, & foliis veluti lacteis maculis insignitis. Salmanticenses Silybum nuncupant, vulgus Cardon Lechal, siue Ledor, id est Carduum lacteum. Idem tenellam adhuc plantam & primum germinantem cum ipsa tunc dice elotam, crudam aut cum carnibus coctam edunt: ipsius lacte omne lactis genus coagulat, & flore crocum adulterant. De hoc Scolymolegimus apud Plinium, gulæ, quæ portenta rarum in gancam vertit, etiam ea quæ refugium quadrupedes conscia, Scolymum in hortorum areas & pulvinos transtulisse, ubi cultus marginio domita feritate mansuecit, licet quidam de Carduis altilibus & Cactis exponat, ex agris in hortos transgressis, & ad hanc mitiorem deturam, qua hodie tantum placent, olitorum delicta perductis. Scolymorum caulibus adhaerentibus, & capitulis nondum florem ostendentibus, Itali rustici etiānum hodie vescuntur, ut diximus. Præter utrumque hunc Scolymum



CYNARA Non aculeata,  
Matthioli.



CARDVVS Vulgaris,  
Matthioli.



*(Carduus & Cynara)*  
*Carduus & Cynara*  
*agros: nascat.*  
*in v. infra p. 144*

sunt in hortis frequentes Cacti, ac Cynaræ cū cuius foliis albi Chamaeleonis folia  
Dioscorides confert. Gallia vulgus Cactos appellat Cardons, Cynaras Artu hauræ,  
hac differentia quod Cactorum capita non mandantur, sed radices pars suprema,  
foliorum ima, cū tenellis germinibus, planta terra sepulta per multos dies, quoad

CYNARA Non aculeata,  
Dodonai.



tenerefcatur, albescatur, dulcescat, idque ferè tota  
Hyeme, & Autūno iam progressio: contrā in  
Cynara nullus earum partium vsus est, sed capi-  
tum solum. Præterea Cactis & folia & capita  
nunquā nō aculeata sunt: Cynaræ verò cū du-  
plex genus sit, alteri, pariter ea, vt & Cactis, spi-  
nis armantur, alteri spinis carent, diuerso hac in  
re palatorum iudicio, quibusdam eam magis  
commendantibus quæ spinosa est, aliis contra  
eam quæ spinis nullis pungit, Theophrastus  
vtrāque hanc plantam Cacti nomine indica-  
uit, nulla facta Cynaræ mentione. Galenus, Pau-  
lus, Aëtius Scolymum stomacho prodesse ad-  
notarunt. Cynaram autem vitiosum succum gi-  
gnere, præfertim, vt Galenus ait, cū iam indu-  
ruit, nempe melancholicum, aliàs verò bilio-  
sum & tenuem, ideoq; elixam adiecto corian-  
dro potius edendam, ex oleo, garo, & vino: vel  
absq; iis, si in parinis, aut sartagine cocta fuerit,  
quo modo eius strobilos, siue capita multi præ-  
parant. De Cacto iam Theophrastum audia-  
mus sic scribentem: ἡ δὲ καλὴ καλεῖται καὶ περὶ  
σικελίαν μόνον, ἐν τῇ ἐλαφδίᾳ δὲ καὶ ἐν τῇ ἰσθμῷ δὲ παρὰ  
τὰ ἄλλα

Lib. 6. hist.  
ca. 4.



*Carduus altus i  
hinc colitur.*

HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,

CARDVVS Altus, Cynara  
sine capitibus acuta, Dod.



τὰ ἄλλα τὸ φύλον. ἀφίησι γὰρ αὐτὸς ἀπὸ τῆς ῥίζης  
καυλὸς ἐπιγίγνεται. τὸ δὲ φύλλον ἔχει (adde ex Gaza,  
Plinio, & Athenæo παλαιῶν) καὶ ἀχνηθῶδες. καλῶσι δὲ  
καυλὸς (deest vox καλῶς, ex Athenæo & Plinio  
addenda) ἐδώδιμοι δὲ εἰσι περὶ ἀπὸ τοῦ (emenda  
Athenæo) καὶ ἡ ἀχνηθῶς ἐστὶν αὐτὸς ἐν αἵμῃ (mendo-  
se, pro ἐν αἵμῃ) ἕτερον δὲ καυλὸν ὄρθον ἀρήσιν, οἱ κα-  
λῶσι περὶ νικη. γίνε) ὃ καὶ ἔστος ἐδώδιμος, πλὴν ἀν-  
σάμευτος. τὸ δὲ περὶ ἀπὸ τοῦ ἐν ᾧ τὸ σῆμα, τὴν μὲν  
μορφὴν ἀχνηθῶδες (lege ἀχνηθῶδες) ἀφαιρέθειν δὲ  
τῶν παππῶδων ἀπερμαλίων, ἐδώδιμον ἐστὶ τὸ καὶ ἐφε-  
ρὲς τῷ τῷ φοίνικος ἐγκεφάλῳ. καλῶσι δὲ αὖθις ὁ  
λαν. (Ascaliam legit Plinius, Athenæus Ascale-  
ron.) Id est, Cactus in Sicilia tantum nascitur, in  
Græcia nusquam habetur: planta est suæ pro-  
prietatis: statim enim à radice caules emitit,  
non in terram repentes, ut Gaza interpretatus  
est, sed in terram vergentes, folium latum &  
spinosum: caules vocant Cactus, qui delibati  
sunt edules, paulum subamari, quos & munia  
servant: caulem alium rectum edit, quem pter-  
nica appellant: is quoque vescendo est, sed fer-

uari non potest. Fructus in quo semen acanaceam speciem gerit: sed detractis pap-  
pulis seminibus, is quoque vescus est, & palmæ cerebro similis. Scalam eum ap-  
pellant. Plinius quoque hæc sic conuertit. Et Cactus quoque in Sicilia tantum  
nascitur, suæ proprietatis & ipso, cuius in terra serpunt caules à radice emissi, lato  
folio & spinoso. Caules vocant Cactus: nec fastidiunt in cibis inueteratos quoque  
vnum caulem rectum habent, quem vocant Pteruica, eiusdem suauitatis, sed detrac-  
to & statis impatientem. Semen ei lanuginis, quam pappum vocant: quo detracto &  
cortice, teneritas similis cerebro palmæ est: vocant Ascaliam. Hæc cum Theo-  
phrastus scriberet, Cacti in Sicilia tantum, nusquam in Græcia, nec Italia foras  
colebantur. Sed cum eò tandem colendi ratio manasset, nihilq; essent aliud Sic-  
li Cacti quàm carduorum genus, Græci Cactus & Cynaras, Itali Carduos nomi-  
narunt: quod auctoritate Athenæi comprobatur, sic scribentis: φαμίνας δὲ ἐν περὶ  
τῶν φυτῶν, καὶ φύλον σκελετικὴν τινὰ καλεῖ ἀχνηθῶδες φύλον, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐν ἐχθρῶ περὶ  
τῶν. ἡ δὲ καὶ καλῶς καλεῖται, & cætera quæ modò citauimus ex Theophrasto: quibus  
subdit Athenæus. τοῖς δὲ τῶν καλῶν καὶ ἀχνηθῶδες γὰρ αὐτὸν ἐν ἑπὶ τὴν καὶ φύλον εἶναι τῶν  
τὴν ὑπὸ Ῥωμαίων μὲν καλεῖσθαι καὶ ἀχνηθῶδες, καὶ μακρὰν ὄντων τὴν σκελετικὴν, περὶ αὐτῶν δὲ ἐν  
ἐλλήνων κυνάρων ὀνομαζομένην, ἀλλαγὴν γὰρ διὰ γεγενημένων καὶ ἀχνηθῶδες καὶ καλῶς τῶν αὐτῶν ἐν ἑπὶ.  
Id est, Phænias lib. quinto de plantis Cactum appellat Siculam quandam plantam  
spinosam, velut etiam Theophrastus in libro sexto de plantis. Quæ Cactus voca-  
tur, &c. Quis non iis notis persuasus intrepidè dicat, inquit Athenæus, Ca-  
cton eandem esse, quæ Romanis qui non procul à Sicilia abunt, Cardus nomi-  
natur, & perspicuè reliquis Græcis Cynara? Siquidem mutatis duabus literis &  
Cus & Cardus in eandem vocem consentient. Cynaræ olitorum industria &  
mangonio quadam est varietas, præcipuè capitis figura distincta. Nam omnibus  
est non quidem echinatum, ut scribit Matthiolas, (echinatum enim esse non po-  
test, quin sit etiam spinis horridum,) sed omnibus squamarum, seu laminularum  
ordine structili coagmentatam. Verum quibusdam aculei sursum eriguntur, in  
alii

*Li. 21. c. 16.  
Scalia et ascale  
onaria sunt  
scaliae folio  
hæc pteruica  
sunt edules  
sunt edules*

*Cap. 14.  
Lib. 2.  
quæ cardus est  
tunc tunc est  
tunc cardus est  
tunc cardus est*

*Cardus cynara*



CARDVI, ET ALIARVM SPINOSARVM. LIB. XIII. 144

aliis deorsum inclinantur, quarumdam capita prorsus aculeis carent, ut iam monimus, ceterisq; ut vulgus credit, in cibis præsant. In hoc genere caput nonnumquam in longam & sensum gracilescētem metam fastigiatur, nonnumquam in compressiorem & rotundiorē globum extuberat, laminis interdum sponte dehiscētib; & sese recludentibus, interdum arctius coniunctis & compactis. Spinis carebunt Carduorum capita, ut ait Palladius, si cacumina feminum confringas, vel, ut olitores aiunt, si delibratis lactucæ radicibus & dissectis, semina integra condantur. Cynaram Columella pinxit his verbis.

*Hispidā ponatur Cynara, \* quæ dulcis Iaccho*

*Potanti \* veniat, nec Phœbo grata cœnenti.*

*Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo,*

*\* Myrtolo mo d crine vivet, \* deflexaque collo*

*Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit,*

*Nunc similis calathæ est, spinisque minantibus horret.*

*Pallida nonnumquam \* tortos imitatur Achanthos.*

Qui potius & Carduum altilem, siue Cacton, & Cynaram videtur delineasse: utraque planta foliis conspicitur albæ spinæ, vel Cardui silvestris, caulibus altis, quorum summi vertices in squarosum extuberant globum, corticosis vnguibus turgentem, spicisq; squamatis compactilibus coagmentatum, quorum orbis exterior viret, interior niueo candore nitescit. Hac structili nucleorum serie pineam nucem videtur exprimere. Quare cum Galenus scribit Cynaræ capita *σπονδυλάς* Græcis dici, & *σκολύμης* potius legendum crediderim. Flos purpureo rutilat colore, & tandem evanescit in pappos. Caput vetustate dissilit in corriceas laminas, semen ostendens Cnici figura. Hæc est Scolymi, Cynaræ, Cacti dilucidior, opinor, & magis enucleata quam ab aliis quibusdam tradita distinctio: quas plantas satis indistincte Matthiolus explicauit & depinxit. Galenus scribit Scolymi radicem copiosam vrinam graueolentem elicere, si quis eam in vino coctam bibat, ad prodictamento inest ex tota substantia, nimirum cum succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut ter-plura Plinius habet. Scolymus vrinam ciere præcipue traditur: sanare lichenas & lepras ex aceto, venerem stimulare in vino, Hesiodo & Alceo testibus: qui florēte eo cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, virosq; in coitum pigerrimos scripsere, velut prouidentia naturæ, hoc adiumento tum validdissimo. Item graueolentiam emendat radicis emedullatæ vncia, in vini falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balineo ieiuno, itēque post cibum cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per vrinam effluere. Hæc Plinius. Nunc nullis non hortis cardueta spectantur, plurimæ hortorū aræ Cynaris refertæ sunt, nec iam sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, opipura vel adicialis vlla sit cœna. Apponuntur capita nondum florescētia Asparagi modo iuribus incocta, eorūque pulpa estur cum sale & pipere. Itali raro decoquunt, sed cruda cum sale vorant. Hac ob miram, tum raritatem, tum venustatem non omittendus carduus peregrinus, quem ex Pena depictum & descriptum hic exhibemus. Hunc, inquit, sponte edunt noui orbis insulæ occiduae, præsertim ea quæ D. Margaretæ sacra est, vnde reduces naucleri Angliquidam naturæ cinnus ex pepone, melone, & carduo coaluisse. Ob id ille Echino-melocactum, siue melocardium echinatū, signata magis, quam recepta nomenclatura vocauit. Turbinata illi metæ effigies, torulis, callosisq; quatuordecim quasi costis

Lib. 10.

\* Quidam: hæc non dulcis Iacchum.

\* Quidam: veniet, non.

\* Quidam: Luteolo.

\* d. uexa.

\* tortos.

Li. 2. alim.

In cap. 14. lib. 3.

Li. 8. simpl.

Vires.

Li. 8. c. 22.


In Aduers.

Locus.

Nomina

Forma.






costis canaliculata, à sessili & latiore basi secundum longitudinem in conū obtusiorē coeuntibus, ex quo quasi vertice emicat tomentosa, ut in cynara, sericea bombax admodum farcta & delicata, ferè qualis lapidis amianthi, qua inuoluuntur mucronata vaginula, siliquola, sanguinea, capfico concolores & similes, sed perquam exiles, semine pusillo, rotundo, amaranthi, plenæ, multis setis cro-

ceis superne se exerentibus, sed rigidis & pungentibus. Dorsæ autem summa striarum, quæ lauius protuberant, exerunt infestos hystricis, aut echini aduncos, corneos, denos & duodenos, quasi hamos, radatim septenas ut plurimum stellas effigiantes: adeoque vniuersum conum armant instar echini, vix ut inaleus manu premas. Est autem cutis externa callosior, crassiorque tota, aloës aut cucumeris colore, & concretionē. Caro subtus albicat, pinguis, flaccida, melonem, aut adipem referens, gustu insulso & acidulo, non ingrato, aqueo, refrigerante, innoxio. Quasi autem melo foret, interiore & superna sui parte, quæ flori subest, cellulis simili, carnem firmiorem dissepat: membrana per medium ducta, cellulasque efformans ferè qualis cucurbitæ, sed seminis vi fungosiorē minuique compacta medullam ibi inuoluit. Eius natales qui viderunt tum naucleri, tum familiæ quidam, maritima fabuleta esse referebant. Cum maturuit, peponem mediocrem, vel maximum melonem æquat. Nouem libras & vnius trientem pendebat. Humi sessilis est, nusquam apparentibus ne minimis quidem foliorum vestigiis in ipsa planta, aut radice, quæ exilis est, aliquot appendiculis viminalibus, pullis, prolixis, firmis, nec fractu facilibus sparsa. Carduum non minus admirandū

Li. 8. c. 24.

*CARDVVS Pitahaya*  
*fructum ferens.*



descripsit Ouiedus in Hispaniola insula nascentem. Pitahaya, inquit, fructus est pugni mediocris magnitudine. Hunc profert Cardui genus, spinis quidē horridum, sed aspectu iucundum & pulcherrimum: foliis enim caret, sed horum & ramulorum vice brachia quædam habet, sex pedes longa, quadrangula, in medio canaliculata, in quo medio & in angulis spinæ sunt valde pungentes, remote, satis longis spatiis à se distantes, remote simul, aut quaternæ digiti maximi longitudine. Inter hæc brachia fructus medius exoritur, qui Pitahaya illic nominatur, coriaceo, crasso, spisso, & veluti squamoso contextus, qui tamen facile cultro inciditur, etiam si co-

ta interiore parte granulis carni permixtis ficuum nostratum modo sit referens, coloris venustissimi, nempe chermesini saturati. Est & tota hæc pars edulis, manulq; inficit mori modo. Qui comederit, non statim, sed duabus horis ab eo fuit pro, urinam reddit planè crudam. Est tamen innoxius & spectatu elegantissimus, sed qui eum profert Carduus horrendus, specie valde agresti & admiranda, viridula cinerea, candicante, qualem hîc pictam videtis ex Ouiedo.

ACCA



## ACANTHVS,

## CAP. III.

**A**KANΘΟΣ & ἀκανθα Græcis, μελαμφύλλος & παίδερος, Latinis *Branche uanseyan*  
 Acanthus & Acantha dicitur: Officina à similitudine, quam eius fo- *Nomina*  
 lia cum anterioribus vrsorum pedibus habet, Brancam vrsinam vo- *Acanthos pur in*  
 cant. Ad quam etiam similitudinem respicientes Germani *Bernkraut*  
*florem in nomina;*  
*conuertiunt*  
 nominant, Galli *Branche vrsine*. Adnotauit *Lib. 14. hist.*  
 Fuchsius hanc herbam olim etiam Romanis  
 Marmorariam esse dictā, quæ vox in omnibus  
 Dioscorid. exemplaribus inter nothas appellationes  
 deprauata est, ac in Mamolariam detorta,  
 quod eius, columnarū, maximè Corinthiarū fo-  
 lia capitulis insculpebatur, quarū identidē, tam  
 scapi, quàm verticillæ marmore splēdebant. An-  
 tiqui etiam Acātho pateras & pocula alia or-  
 nabant. Acanthi genera duo Dioscorides tradi-  
 dit, satium, siue hortensem, & siluestrem. Sati-  
 um describit folia habere multò latiora, lon-  
 giora quàm lactuca, eruca modo incisuris diui-  
 sa, nigricantia, pingua, læuia, caulem læuem, bi-  
 cubitalē, digitali crassitudine: ex interuallis ver-  
 ticem foliolis quibusdam circumdatum, veluti  
 nucamētis aculeatis, è quibus flos candidus pro-  
 mitur: semen illi est oblongum, luteum, caput  
 thyrsi specie: radices subsunt glutinosæ, mucosæ,  
 rubentes, longæ. In quibus hæc in Græcis sic  
 exarata, *διονεί κίτλας υπομήκεσιν, ἀκανθάδεσιν,*  
 vertit Cornarius, veluti pileolis oblongis, pro-  
 nucamentis: per *κίτλα* intelligens foliorum  
 inuoluera illa ad oblongi pileoli figuram ob-  
 torta. Est enim *κίτλας* & *κίτλον* pileoli genus.  
 Est etiam id notandum in quibusdam exempla-  
 ribus Græcis scriptum inueniri *βανθώδεσιν* pro  
*ἀκανθάδεσιν*, sed perperam: nam minuta caulis fo-  
 lia, nec figura, nec colore hyacinthinis respon-  
 dent, quin potiùs exilia, & spinulis armata, quæ  
 verò humi procumbunt, amplissima, vt quæ  
 arearum puluinos possint vestire, nullis tamen  
 aculeis rigentia. Acanthus siluestris eodē Diof-  
 coride auctore, scolymo similis est, aculeatus,  
 breuior quàm satius & is qui in hortis pro-  
 uenit. Satius in hortis, petrosus, & humenti-  
 bus locis nascitur. Iunio præcipuè & Iulio mē-  
 sibus femine & floribus abundat. Plinius bre-  
 uius duo Acanthi genera notauit. Acanthus est  
 topiaria & vrbana herba, lato longoque folio,  
 crepidines marginum, assurgentiumq; puluino-  
 rum toros vestiens. Duo genera eius sunt, aculea-  
 tum & crispum, quod breuius: alterum læue,  
 quod aliqui pæderota vocant, alij Melamphyl-  
 lon. Hæc Plinius. Et si Acanthus, vel Acantha

GGG



ACANTHVS Siluestris,  
 Carduus pratensis, Tragi.



Genera.

Forma.

Embl. 17.  
lib. 3.

*acanthos, apud grecos  
 est spinia, hinc acanthos  
 quod spinia hinc*

Locus.

Tempus.

L. &amp; C. 22.



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

spinam significet, & Branca vřina omnium herbariorum sententia Acanthus Dioscoridis credita, rigidis spinis non horreat, non ob id tamen vera Acantha non dicenda: spinosa etenim est, verum thyrso duntaxat ex Dioscoridis descriptione, & columnarū apud Vitruvium epistyllis, sed mollibus duntaxat spinis, ideoque à Vergilio mollis Acanthus dicitur: nec vlla alia est, cui Dioscoridis descriptio verius respondeat. Siquidem quinis senisve foliis extenditur, lactuca, longioribus multo, ac latioribus, vt quæ nonnunquam cubiti longitudinē æquent, pinguibus, carnosus, eruca ritu laciniatis, subnigris, caule tripedaneo, digitum crasso, laui, cuius vertex foliorum in aculeos molles exeuntium cingitur vallo, & veluti in dehiscentem paniculam nucamentū mve fastigiatur. Summatim caput erumpit thyrli figura, flores candidi, semen oblongum, luteum, radices oblongæ, pingues, lentæ.

Lib. 2. ca. 13.

Trago & Lonicero *argia* *argia* Dioscoridis videtur esse Carduus pratensis, Germanis *Unisenkeel*, & *Grafzkeel*, id est Brastica pratensis nominatus, quod huius folia teneriuscula vře cum cæteris oleribus colligantur, & in cibos veniant, gustu suaui, nec molliusculis spinis linguam, aut palatum offendentia. Folio est latis longo latoque, ac vtinque diuiso, exiguis tenerisque aculeis, spinosis vře exasperato, ex viridi pene albicante, ac dipsaco quadamtenus consimili. Iulio mense caulem emittit cubitalem, nonnunquam proceriorem, nodosum, teretem, è geniculis hina folia fundentem, quæ dipsaci modo imbrem exceptum retinent. In horum & ramulorum cacumine oblonga capitula, florem in pallorem languescentem, sed purpureis staminibus oculis rubrum quid ostendentem sustinent. Flore marcescente semen maturatur, paruum, album, tenera & candida veluti & in aliis Carduis lan-

ACANTHVS Siluest.  
alter, Dalechamp.

Cardu: *Leimonis* *egre*  
*λεϊμων*, *ovos prat*

Lib. 6. hist.  
cap. 3.

Acanthus  
siluest. 2.  
Forma.



gine inuolutum, quæ in pappos tandem euanescit. Planta est hyemis contemptrix, & quæ frigora facillè ferat. In pratis nascitur, vbi rediuiua quotannis, Aprili mense folia emittit, radice candida, fibrata, crassa, plerumque exesa. Ex locis natalibus coniecturam sumpsere quidam hunc Carduum Leimoniam esse Theophrasti, à pratis sic dictam, quam nullis prorsus nominis inter spinosas numerat, nempe *αχραν*, *λεϊμων*, *χαλκιδον*, *κνιμον*, *πολυαχραν*, *ατρακιδιδα*, *ακρυον*, *λεϊμον*, *χαμαιλεον*, *σκληρυμον*, quibus additur *η λεϊμωνια*. Ineptè Betam siluestrem Gaza interpretatur nominum similitudine deceptus, quia Leimonium minimè spinosis foliis à Leimonia valde diuersum est. Hic quoque Plinius bis lapsus est, scribens scolymū in cibos ab Orientate recipi, & alio nomine Leimonion appellatum quod Leimonium, id est Betam siluestrem, quod *απὸ τῆς λεϊμωνίας* spinosa planta non separaret, nisi fortè mendosus sit codex, tum quod Leimonia spinosam plantā à Theophrasto inter aculeatas araneasque proximè scolymum memoratā cum scolymo confundat. Est etiam planta alia ex sese gignunt, exarescente radice ex qua propendent: folio crasso, incisuris sinuato, oblongo, aculeis armato, sic à natura factis, vt aculei singuli ex tribus cuspidibus in vnum

hic picta, quibusdam alter Acanthus siluestris, aliis Leimonia, quod vt & superior pronāve similes diuisa, quæ quotannis alias atque nouas, veluti sobole recitem ex sese gignunt, exarescente radice ex qua propendent: folio crasso, incisuris sinuato, oblongo, aculeis armato, sic à natura factis, vt aculei singuli ex tribus cuspidibus in vnum



in vñ coëuntibus videantur esse coagmetati, pallidè virentibus, caule recto, pro-  
cero, gracili, parū ramofo, capitulo echinato, vno fere tantum vel altero: flore pu-  
nico, semine oblongo, paruo, lanugine contecto, quæ in auras tandem euolat. Ob  
aculeos ternos, quemadmodū supra dixi, vna stipatos, herbarij quidam Carduum  
recylæxæ vocant. Quidam Leucacanthā, de qua posthac nos agemus, esse vo-  
lunt. Lobellius pinxit alium Acanthum siluestrem Scolymo similem aculeatum  
Dioscoridis, vel potiùs nouam aculeatam Brancam vrsinā, & subiicit, in agro Bo-

BRANCA Vrsina aculea-  
ta, Lobellij.



nonienfi Lombardiæ, adeò flores & folia simi-  
lia fuiffè huic Acantho spinoso, vt crediderit  
Dioscoridis esse Acanthum siluestrem, quem  
asimilauit Scolymo siluestri, & satiuo Acātho  
breuiorem & aculeatum dixit. Chamæleonta  
Monspelienfium esse non potest quia caput  
habet echinatum. Acāthi satiuæ radices, aucto-  
re Dioscoride, vltis & luxatis illæ profunt. Po-  
ta vrinā mouent, & aluū sistūt. Tabidis, ruptis,  
conuulsis mirè vtiles sunt. Eadē Plinius tradit.  
Huius radices vltis luxatisq; mirè profunt: item  
ruptis conuulsis, & phthisim metuentibus in-  
coctæ cibo, maximè ptiisanæ. Podagricis quoq;  
illinuntur trita & calefactæ calidis. Galenus,  
Acanthi folia, inquit, mediocriter digerentem  
facultatem obtinet: radix exsiccatoria est, & le-  
uiter incisoria, & tenuium partium. At quoti-  
diana & diurna experientia constat nostri  
Acanthi satiuæ radices emollire, vniuersamq;  
plantam mucosam esse, ac ob id ad enematum  
emollientium decoctiones duntaxat, in hortis  
haberi. Quare mirū Dioscoridem dixisse radi-  
ces τρέμμασι, id est luxationibus prodesse, cū iis

Lib. 4. c. 17.  
Vires &

Temper.  
Li. & c. 22.

Li. 6. simpl.

Pena in  
Aduerf.

obstè potiùs relaxando: aptiùs fortasse τρέμμασι hîc cōuertat torsiones, ligamen-  
torumve tractiones, quibus medentur initio suauia malactica, dolorem sedando,  
& leuiter digerendo, si quid affectæ parti influxerit: hac enim ratione fractis &  
conuulsis proderunt. Acanthi siluestris radix ad eadem ad quæ superior efficax  
est, nihilq; à satiuo differt, nisi mollitie & magnitudine.

A C A N T H I V M,

CAP. II. II.

**Q**UOD Græci ἀκανθιον, Latini similiter Acanthiū nominant, Germani  
Vneifz ouege distel, Galli Chardon argēin, cuius hæc est in vulgatis Diof-  
coridis exemplaribus descriptio. Ακανθιον ἐμπερή τὰ φύλλα ἔχει τῇ λευκῇ  
ἀκανθῇ, ἐπ' αὐρῶν δ' ἀκανθῶδες ἐξοχὰς, & συλλεγομένης, &c. Quæ ex Plinio,  
multo verò tutius ex Oribasio viri docti sic restituerunt. Ακανθιον ἐμπερή τὰ φύλλα  
ἔχει τῇ λευκῇ ἀκανθῇ, ἐπ' αὐρῶν δὲ ἀκανθῶδες ἐξοχὰς, καὶ αὐτὰ ἀραχνόδης ἔστι χνῶς, vel καὶ  
ἐπ' αὐτῶν χνῶν ἀραχνόδης, ὅς συλλεγομένης, & ὑφανομένης βαμβάκοδης γίνεσθαι. Id est, Acan-  
thium folia similia habet albæ spinæ in summis extremitatibus aculeata, in quibus  
est lanugo, instar telæ aranæ, quæ collecta & texta bombycis effigiem præbet.  
Plinius. Spinæ albæ similis est spina illa, quā Græci Acanthium vocant, minori-  
bus multo foliis, aculeatis per extremitates, & araneosā lanugine obductis: qua  
collecta etiam vestes quædam bombycinis similes fiunt in Oriente. Dioscorides  
folia quidem Acanthij figura candorēve cum Alba spina confert, sed citra

Nomina

Forma.

ακανθιον, ο' spinula  
hinc hinc distel.  
nomina quæ pōntas  
habet spinas

Li. 24. c. 12.



## ACANTHIVM, Matth.

Caus. hist.

Acanthiū  
montanū.

Forma.

magnitudinis, aut paruitatis comparationem, ut id de suo, quod plerumque solet, Plinius videatur adiecit, aut in nostris exemplaribus vox, minoribus, deesse. Anguillara pro Ratro hoc Cardui genus describere videtur. Acanthium Officinis creditur esse Carduus iste omnium ferè maximus ubiq; viarū obuius, & iuxta sepes in arenosis, incultisq; locis satis frequens, radice prægrandi, crassa, foris nigra, amara, caule proterzo, valde crasso, aculeato, cauo, candida teuiq; lanugine obducto, telis aranearū simili foliis admodum longis & latis, incis, per oras vncis spinis stipatis, molli araneosaq; lanugine pubescentibus, capitulis in caulium vertice aculeatis & echinatis, leucographidi similibus, flore purpureo, Iulio & Augusto mēsisbus facillè te, semine nigricante, & rotundiore quàm Cnici, amaro, acri, candida lanugine inuoluta. Hunc Carduū Fuchsius nomine spinæ albe siluestris descripsit & depinxit. Aliud Acanthiū ex Dalechampio exhibemus, montanum cognominatum, quod in gelidis montibus, ut in monte

ACANTHIVM, Spina  
alba siluestris, Fuchsy.

ACANTHIVM Montanum, Dalech.






Ipſa vndiq; per initia ſic obuoluto, ac circūcluſo, vt priuſquā deregi poſſit, ve-  
 luti lanæ glomus ſit dilacerandis & euoluendis. Acanthij radix & folia, inquit  
 Dioſcor. in potu opithotonicis auxiliatur. Eadem proſus Plinius tradit. Ipſa fo-  
 lia vel radices ad remedia opithotoni bibuntur. Galenus verò radicem & folia  
 facultatis eſſe excaſfactoria, & iis qui conuelluntur auxiliari.

Li. 3. ca. 16.  
 Vires.  
 Li. 23. c. 12.  
 Li. 6. ſimpl.

DIPSA CVS,

C A P. V.


 A K O S Græcis, Labrū veneris, & Carduus veneris Latinis, Virga pastoris Officinis, & Carduus fullonū vulgò dicitur, Gallis *Chardon à carder*, vel *Chardon à foulon*, Hetruscis *Cardo da cardare*, Foroiulienſibus *Garzo Germanis Kartendistel, Bubenstrel, Vuerkarten*. Dipſaci autē, id eſt ſitibūdi nomen à cōtrario inuenit, quoniā concouo alarū ſinu rorē, vel imbrē recipiat, quo velut ad abigendas ſitis iniurias abutitur. Labri veneris nomenclaturā à carinato foliorum habitu contraxit, quæ ſe anfractuofa ſinuantia ambage, peluis vel ſolij ſpeciem conſtituunt, & intra ſe humorem retinent. Virga paſtoris dicta eſt, ob longas virgas, quas detractis Carduis paſtores forē ſumūt, & ea parte qua poſſit manu capi aculeis nudant, reliqua autē aculeata gregē ducunt. Carduus fullonius appellatus eſt, quòd eo rudes pānos, velut echino quodā poliūt, detractiſq; floccis carminat. Cæterū hic animaduertendū Auicēnæ & Serapionis interpretes Virgæ paſtoris nomine minimē Dipſacum, ſed Polygonū utrūq; Dioſcoridis int. Ilexiſſe. Herbarij duo Dipſaci genera fecere. vnum ſarūum, alterū qui ſua ſponte paſſim prouenit, eumq; duplicē, nēpe Dipſacū ſilueſtrē maiorē, quē Dipſacū purpureū vocat Fuchſius, & Dipſacū ſilueſtrē minorē. Dipſacū, vt deſcribit Dioſcorid. aculeatarū generis eſt. Caulē habet albū, ſpinis horrentē, folia caulē amplectētia, lactucæ ſimilia, in ſingulis geniculis bina, oblōga, atq; etiā ſpinofa, quæ in dorſi medio intus & extrā veluti bullas ſpinofas habent, cōcāuo, quo ſe utiūq; geniculis cōiungunt ſinu, quo aquæ, rores & imbres aſſeruantur, vnde Dipſaci quaſi ſitientis nomen

Nomina caribae  
naviga in  
in caribae  
comitatus  
in caribae  
in caribae

carduus fullonae  
4a fullonae p. ann.  
Li. 2. c. 736. polypodii  
c. 351. simp. p.

*Genera.*

Ca S<sub>2</sub>.hist.

Lib 3.c.11.

*Forma.*

DIPSACVS seu Labrum  
veneris, Matth.

*DIPSACVS Sativus alter,*  
*Matthioli.*





*DIPSACVS Siluestris*  
*maior, Fuchf.*

L. 27. ca. 9.

*DIPSACVS Siluestris minor,*  
*seu Virga pastoris, Matth.*Matthi. in  
ca. 11. lib. 3.Lib. 3. ca. 11.  
Vires &  
Temper.

L. 27. ca. 9.



L. 6. simpl.

in Adnerf.

trahit. In cacumine caulis singulis furculis capitula singula echinis similia insunt, oblonga, aculeata: quæ postquam exaruerunt, candida apparere dissecit per mediâ medullam caput vermiculos habet. Plinius eadē breuiter & dilucidē tradit. Dipsacus folia habet lactucæ, bullâsq; spinosas in dorsi medio, caulem duum cubitorum, iisdē spinis horridum, genicula eius binis foliis amplectētib; cōcauo alarū sinu, in quo subsistit ros salus. In cacumine capitula sunt echinata spinis. Nascitur in aquosis. Huic descriptioni si pastoris virgâ cōferas cōperies notas omnes optimē respondere Dipsacus siluestris satiuo similis est, foliis tantē angustioribus, & floribus purpureis. Nec solo culta videtur euenisse, inquit Pena, vt satiuus Dipsacus aculeis aduncis, recuruis & rigidioribus à siluestri & spōte prodeute tantum distet. Nam pleraq; omnia culta, molliora & teneriora, minūsq; spinosa euadunt. At hic satiuus capitibus est reductioribus, oblongis spinis, crebris, aduncis, terram versus reflexis, adeo rigidis, vt flamina carpendo, & vellendo filamenta, non facili effringatur: siluestris verò mollioribus, minoribus, lutescentis, nec aduncis, longioribus multo, imbecillioribus: foliis itē mollioribus, minoribus, haud dissimilibus, capitulis crebris, & bituminosis trifolii similibus. Nascitur in agrorum & scrobium marginibus, & in viis iuxta sepes. Dipsaci tertium genus minimum, nec adeo frequens, superiori siluestri sat simile est, non tamē ita infirmioribus, nec tam spinis horrido, foliis itē infirmioribus, capitulis multo minoribus, vt quæ oliuæ magnitudinem vix superent. Sunt autem capitula hæc tenuibus capillis referta, ita vt sericis viridi colore infectis floccis similia videantur. Quidam Plumbaginem esse Plinij credunt, nec temere fortassis. Dipsaci radix, auctore Dioscoride, cum vino decocta & tusa vsque dum ceræ crassitudine accipiat, imposita rimas fistulasque sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc ærea pyxide recondere. Ferunt præterea formicis & verrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi, & collo aut brachio appensi quartanas sanare produnt. Eadem breuiter Plinius dixit. Sanat rimas sedis item fistulas, decocta in vino radice, vsq; dū sit crassitudo ceræ, vt possit in fistulâ mitti: itē verrucas omnium generum. Quidā & alarū, quas modò diximus, succū iis oblinūt. Dipsaci spinæ radix, inquit Galenus, est secundo ordine exsiccatoria, habetq; nonnihil abortiuū. Scribit Pena piores duo Dipsaci genera refrigerantis & siccantis esse facultatis, & cancerosis ulcerationibus multum conferre: tertium vsui incompertum.

CNICVS



## CNICVS, CAP. VI.

**C**ΝΙΚΟΣ & κνήκος Græcè, Cnicus & Cneus Latine nominatur, Mauritanis *Kartam*, siue *Charthom*, Officinis Mesuen & Serapionem secutis, *Nomina Kartam aqua* *Maup.* Carthamus, Italis *Zaffarano Sarrafinesco*, Germanis *Vuldengarten saffran*, Gallis *Saffran bastard*. Dicitur autem Cnicus seu Cneus ἀπὸ τῆς κνήκης, quod mordere & pungere significat: est enim spinosus carduus, vel ἀπὸ τῆς κνήκης, quod pun-  
gendo pruriginem excitet. Carthamus verò ἀπὸ τῆς καθαίρεσις, quod est purgare. Dioscorides de Cnico satiuo duntaxat scripsit. Theophrastus & Plinius duo genera fecere, satiuum siue hortense, & siluestre. rursus siluestris species duas. Cnicus satiuus, vt describit Dioscorides, folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeata, caules cubitales, in quibus capita oliuæ magnitudine, florem similem croco, semen candidum & rufum, oblongum, angulosum. Nascitur in hortis, & agris satus. Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semine etiam profert. Cnicum alterum pictum dedit Clusius, cui vnicus caulis, interdum bini, terni, aut quaterni, cubitales, firmi & lignosi vti alterius, nullis tamen aut paucissimis ramis: folia Cnici vulgaris, candidiora, & paulò longiora: capitula Cnici: flos diuersus, quippe qui non sit luteus, sed ex multis staminibus carulei coloris constans: semen Cnico & minus & subrufum: radix pollicari crassitudine, carnosa, succulenta, foris nigricans. Circa Cordubam in segetibus inuenitur, & agro Hispalensi. Floret Maio & Iunio. Vulgare nomen nullum nouit. Sed cum tota facie Cnicum vulgarem referat, Cnicum alterum nominauit. De reliquis generibus hæc prodidit Theophrastus. τοῦ κνήκος δὲ εἶσιν ὁ μὲν ἀγρίος, ὁ δὲ ἥμερος. τοῦ δὲ ἀγρίου διότι ἐστὶν τὸ μὲν πρὸς ἐμπερές σφόδρα τῶν ἡμέρων, πολλὴν εὐτυχαιότερον. διὰ καὶ πολλοὶς ἐνίοις τῶν ἀρχαίων ἐχρῶντο γυναικῶν. καὶ πρὸν δὲ ἔχει μέλαινα, καὶ μέλαν, καὶ πικρὸν. ὁ δ' ἥμερος διαστὸς τὸς καυλοῦ. ἔχει συγχάδεις, ὥστε τρόπον τινα ἐπιτεταμένους γίνεσθαι. διὰ γὰρ μαλακότητά τῶν καυλῶν καὶ ἀκύνεσθαι πρὸς τὰς ἀρούρας. καρπὸν δὲ ἔχει πικρὸν πωγωνώδους ἀπέρματος. ῥίζαι πᾶσι πλείους: μείζους δὲ, καὶ πυκνότεραι τοῖς ἀγρίοις. ἰδίον δ' ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα ἄγρια, τὰ μὲν γὰρ σκληρότερα, καὶ ἀκυνθωδέστερα τῶν ἡμέρων. αὐτὸς δὲ μαλακώτερος καὶ λειότερος. Id est, Cnicus est siluestris, & mitis. siluestris species duæ. Vna miti consimilis admodum, sed rectori caule. quare ex ea prisca quædam mulieres pro fuso utebantur. Fructum



CNICVS satiuus, Matth.



CNICVS alter, Clusij.



fert nigrum, magnum, amarum. Altera species hirsuta caules sonchi profert, & quodammodo humi accubat, nam propter caulium mollitiem in terram inclinat, fructum gignit amarum (*αμαρόν* pro *αμαρόν* legit Gaza, & vertit frequentem) batum semen omnibus radices multæ, densiores tamen siluestribus, & maiores.

*CNICVS Siluestris prior.*  
*Atractylis, Dalech.*

Lib. 21. cap.

τρακτὸν, α. *φαρμακ.*  
hinc atraxylidis  
hinc quædam spinosa  
quædam magis nuda  
ex illa quædam et color  
explicuit.

hæc flos et ad  
ad hanc  
pg. 1450.

Lib. 3. cap.

Cap. 4.  
hilo  
Lib. 4. c. 70.



*CARDVVS Benedictus.*  
*Cnicus siluestris alter.*



CH. 17

Præ aliis siluestribus hoc peculiare est, quod cum duriora spinosioraque sint mitibus, vrbani Cnicus mollior sit & læuior. Quæ ex Theophrasto sic transcripsit Plinius. Multas preterea ignobiles habent, sed maximè celebrant Cnicon Italiæ ignotum, ipsis autem oleo non cibo gratam. Hoc faciunt è semine eius. Differentia prima siluestris & sativi. Siluestris duæ species. Vna mitior est, simili caule, tamen rigido, itaque & colu antiquæ mulieres utebantur ex illis: quare quidam atractylida vocant. Semen eius candidum (hic Plinius contradicit Theophrasto, qui semine nigrum esse ait) & grande, amarum. Altera hirsutior torosiore caule (*αμαρόν* caules legit Plinius, quos *Γυχνό* Theophrastus) & qui penè humi serpat, minore semine. Aculeatarum generis hæc est. Hæc Plinius. Cnicus siluestris prior Ruellij, Fuchsj, Dodonæi Atractylis est. Is durus est & erectus, satiuo non dissimilis, foliis asperis & pungentibus: capitula multis foliolis angustis & per extremitates aculeatis muniuntur, ex quibus hirsutus flos prodit, magis quàm Cnici hortensis ex loteo pallefcens. Semen Cnico par, oblongum & angulosum, sed subatrum, non vt Cnici album: magnitudo ei quæ homini. Quamobrem præscæ mulieres, vt scribit Theophrastus, si locum mendo careat, pro colu vti poterant eius stipitibus satis firmis & longis ad lanam sustinenda quæ nebat, vt pro fuso atractylide, humilior planta, suis capitulis momentū & pondus præbente ad intorquendum & circumagendum filum. Alteram Cnici siluestris speciē, *Cardum* esse, qui *Benedictus* ob admirabiles eius vires contra varios morbos nominatur, iamdiu doctoris omnibus persuasum est, qui hunc cum alterius Cnici siluestris descriptione à Theophrasto tradita diligentius cõtulerunt. Herba est vti & visu omnibus cognita, radice longa, tenera, molle fibrata, foliis longis, pinguibus, teneris, mollelibus, hispida, profundius incis: caules ei hirsuti villosiq; *Γυχνό*, id est, leues, inanes, fragiles sonchi modo, non *αμαρόν*, vt legit Plinius, id est, torosiores, in terrâ sparsi, quoniam ob comæ foliorumq; mollitiem recti nō stant, sed caduci solo procumbunt, & inclinatur, hinc



futa quoque, capitula foliis pungentibus circundantur. Flos ex luteo pallet, semen copiosum, oblongum, cinereum, pilis barbatum, amarum, lanuginosis pappis obvolutum. In arduis alpinis Galloptoucię teste Pena prope Monasterias quas Marignols vocant, ubi effodiuntur CrySTALLINÆ, Irides, & varij coloris alij lapides, cre-  
 scit, in summis montibus, rigidior, & aliquantū minor hortensi. Nunc passim in hortis omnibus magno studio colitur ob eximias eius dotes. Cnici sativi flore prisci utebantur in obsoniis auctore Dioscor. Semen tundeatur, & ex eo exprimebatur succus, ut tum hydromelite, aut gallinaceo iure datus aluum purgaret. Stomacho tamen aduersatur. Fiebant etiam placentæ ad aluum emolliendam, succo eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto admixto. Oportet autem ante cenam in partes quatuor diuisas iuglandis nucis magnitudine, duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum totarum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendam aluum efficacius efficit. Cnici semine duntaxat utimur ad purgationes, inquit Galenus. Tertiij ordinis est exalfacientium si foris admoueat. Sed de eius temperamento & facultatibus fufius disseruit Mesues his ferè verbis. Cnicus est agrestis & satiuus, idemque melior semine, præsertim eo magno, albo, plano, pleno, medullæ pinguis, cortice tenui. Nec inutilis est flos croci pilorum effigie. Calfacit ordine primo, siccat secundo. Agrestis flos minus calidus ac siccus. Pituitam & aquas vomitu & deiectione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde natis, ut colico affectui & similibus confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat, præsertim eclegmate sequente & oleo suo, unde & vocem claram reddit: sperma quoque vfu augeat, sed alimentum est prauum, stomacho valde noxium, in eo & mammae lac dicitur cogere, fastidiendum ac nauseabundum est, ac conturbans, facultate est lassarum plantarum, sed remissa, terget, aperit, etiam flore cum mulsâ icterum sanante. Ne ventriculi lædat, ei misce stomachica, anisum, galangam, mastichen: aciora verò, ut cardamomum, zingiber, sal panis, sal gemmæ addita actione ipsius celerant, & intestinorum noxam prohibent. Sic medullæ eius drachmæ decem, cum cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudine drachmis quinque sufficienter purgant Paulo auctore. Eadem medulla panno ligata, oxymeliti præsertim scillitico incoquitur mersa, & purgatoriū id efficit. Medullæ eiusdem aurei duodecim, penidiorum aurei quatuor, cardamomi, zingiberis ana aureus vnus, cum melle forma bolus nucis magnitudine, da vnum vel duos. Medulla eadem ex iure galli vel gallinæ cum speciebus prædictis cocta, idem præstat: vel medullæ eius drachmæ tres, amygdalarum drachma vna, strobilorum drach. semis, cum melle cocto & sicco scillæ fiat eclegma, mirificum in thoracis affectibus. Hæc ex Mesue. Sed id animaduertendum orientalem Cnicum multò facilius & vtilius minori quantitate purgare. Nostrum multò imbecilliorē esse, ut pote qui non minore quàm duarum vnciarum, vel saltem vnus & semissis mole, aluum subducit, nec obstructions mesaraicarum æquè probè referet. Carduus verò benedictus obstructions internorum viscerum tollit, vrinam mouet, calculum frangit, vlcera potissimum pulmonis sanat. Percussis à feris venenatis medetur tam interiùs sumptus, quam venenatis ictibus aut moribus impositus. Negant etiam pestis sentire contagia, qui cum cibo aut potu præsumpserit. Iam quoque correptis magno fore præsidio vulgus sibi persuasit. Item contra capitis vehementissimos dolores, vertiginem, memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum valere tradunt. Item ad putrescentia vlcera, mammarum potissimum, si in puluerem reductus inspergatur: cacothæ tam recēs quàm sicca herba, pota & admota sanat, cutemq; obducit. Quamobrem decoctis miscetur, quæ ex ligno Gaiaco parantur Hispanica lue laborantibus.

Confert

In Aduers.

Vires &  
Temper.

Lib. 7. simi

Lib. 2. c. 11.



Confert maximè iis qui quartana febre aut aliis febribus laborant, quarum accessiones cum frigore redeunt, hausto eius decocto, aut stillatitia aqua, aut pulveris drachma pota. Profunt eadem comitialibus infantibus eodem modo pota. Herba decoctum ex vino sumptum, ilium & renum dolores mulcet, ventris tormina sedat, sudorem citralui tineas necat, & vteri vitii auxiliatur.

## CHAMÆLEON, CAP. VII.

## Nomina



ΑΜΑΙΛΕΩΝ λευκός Græcis, Chamæleon albus Latinis nominatur, Carduus varius, Carduus suarius, & Cardopatum, Arabibus Chamæleon leuce, seu Chamalium, Italis Carlina, & Chamelone bianco, Hispanis Cardo pinto, Germanis Eberwurtz, eleganti allusione ad Carduum suarium. χαμαίλεων μελας, Latinis Chamæleon niger. Chamæleon autem à foliorum

varietate dicitur Dioscoride teste: mutant enim cum terra colorem. Hic enim viridia, illic albicantia, alibi carulea, nonnusquam rubra inveniuntur. Suarius autem carduus, quod sues, si in polenta exhibeatur, perimat. Carlina verò quasi Carolina quod credat vulgus hanc herbam Magno illi Carolo Regi olim ab Angelo demonstratam fuisse ad propulsandam ab exercitu suo pestem, tanquam antidotum omnium præstantissimum. Quam ob causam multi ad arcendam pestilentiam huiusce herbae radices miris efferunt laudibus. Chamæleon albus à nonnullis Ixias vocatus, ut ait Dioscorides, quod quibusdam in locis ἱξίος, id est, viscum ad radices eius inveniatur, quo pro mastiche vtuntur mulieres. Folia habet silybo aut carduo similia, asperiora tamen & acutiora, nigroq; Chamæleone robustiora. Caule caret, sed

Lib. 3. c. 8.

## Forma.

è medio spinam echino marino aut cynaræ similem erigit: flores purpureos velut pilos, qui in pappos evanescent, semen cnico simile: radicem in pinguibus aromaticam, in montosis graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graueolentem, & dulcem. Chamæleon niger & ipse foliis scolymo similis est, minora tamen & tenuiora, & robustiora hæc habet. Caulem emittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrum, qui umbellam gerit, & flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, varios, radix crassa, nigra, densa, quandoque etiam corrola, quæ dissecta subflaua est, & commanducata mordax. Prouenit in campestribus, siccis & cliuosis tractibus & maritimis. Plinius de iisdem hæc prodidit. Chamæleonem autem qui Ixiam vocant. Duo genera eius. Candidiora, asperiora folia habet, serpit in terra echini modo spinas erigens, radice dulci, odore suauissimo. Quibusdam in locis viscum gignit album, sub alis foliorum, maximè circa canis ortum, quo modo thurra nasci dicuntur: vnde & Ixias appellatur. Hoc ut mastiche vtuntur mulieres.

## Locus.

Lib. 22. c. 18.

Lib. 9. hist. cap. 33.

Quare & Chamæleon vocetur, varietate foliorum euenit: mutat enim cum terra colores, hic niger, illic viridis, alibi cyaneus, aliubi croceus, atque aliis coloribus. Et paulò post. Ex nigris marem dixere cui flos purpureus esset, & foeminam cui violaceus. Vno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali. Theophrastus de vtroque Chamæleone hæc quoque Dioscoridi consentanea literis mandauit. χαμαίλεων δὲ ὁ μὲν λευκός, ὁ δὲ μέλας. αὐτὸ δὲ διωάμεναι τῶν ῥιζῶν, καὶ αὐταὶ ὅτι ῥίζαι τοῖς εἰδεσὶ διαφέρουσι τὸ μὲν γὰρ λευκὴ καὶ γλυκύτης, τὸ παχέστατον, καὶ ὁ σμῖν ἐχούσθαι σαφές. Et paulò post. φέρεται δὲ ὁμοίως πανταχοῦ, καὶ ἔχει τὸ φύλλον ὁμοίον σκολύμῳ, μείζον δὲ, αὐτὸ δὲ πρὸς τῇ γῇ, τὴν δὲ κεφαλὴν ἔχει ὁμοίαν ἀνθῶ, μεγάλην. οἱ δὲ ἀχάνον καλεῖσθαι. ὁ δὲ μέλας τὸ μὲν φύλλον παρὰ τοῖς σκολυμῶδες γὰρ ἔχει (non σκολυκῶδες, ut habetur in vulgatis exemplaribus) πλεονάζον καὶ λεπτότερον (λεπτότερον ex Dioscoride) αὐτὸς δὲ ὅλος ἔστιν (lege ἔχει) ὥσπερ σκῆλαιον. ἡ δὲ ῥίζα παχέστατη, καὶ μέλαινα διαφέρει δὲ, ὑπόλευκος. φέρεται δὲ χωρὶς ψυχρὰ, καὶ ἀργαία. Id est, Chamæleon quidam est albus, alter niger, radicum facultates, atq; ipsa etiam radices specie differunt: illius enim radix alba est, dulcis, crassa, & grauis odoris. Nascitur



Nascitur similiter multis locis, foliumque habet scolymo simile, sed maius, & terre proximum, caput autem magnum acano simile, quod nonnulli acanum vocant. Niger summi est folio, scilicet scolymi, sed minore & tenuiore. Tota planta habet veluti umbellam, radix crassa est, nigra, & disrupta, subflaua. Locis gaudet frigidis & incultis. Gaza non ἀργα sed ὑγρὰ legit, id est, humida, cui contradicit Dioscorides

Lib. 3. c. 9.

Lib. 3. hist. cap. 4.

scribens plantam istam in campestribus & siccis locis provenire. Idem Theophrastus alio in loco Chamæleonem album ἄλινον appellat, quam Carduum pineam interpretatus est Gaza, ratus fortasse diuersam hic à Chamæleonis genere plantam describi. At si quis plantas istas diligentius expendat, & Theophrasti locos conferat, tem aliter habere comperiet. Nam Chamæleonis facta mentione, alteram eius speciem, nimirum Ixinem accuratè omnibus suis partibus delineat, præterquam radice, quæ velut hic omiſſa luculenter declaratur loco supra adducto. Quod autem Ixine, vel, ut in Dioscoride legitur, Ixia, Chamæleon sit albus, eius historia fideliter

Lib. 6. hist. cap. 4.

facit, cum ex Theophrasto iam descripta, tum ex his eiusdem verbis. ἡ δὲ ἄλινος φύσις μὲν πολλὰ τοῦ (lege φέρει μὲν τοῖς πολλοῖς, ut & loco iam citato) μύστρον ἔχει, ὅτι μάλιστα ἐπικερύσσεται τῆς ῥίζης μέσης ὁ σπέρματινός ἀκανός ἐπιπέφυκεν, ὥσπερ μύλον, ὃ μέλαι ἐπικερύσσεται ἐπὶ τῇ ῥίζῃ, οὗτος δὲ ἐπὶ τῷ ἀκροῦ φέρει τὸ λεῖον, ὡς ὁμοῖον, καὶ τοῦτο ἐστὶν ἡ ἀκανότης καὶ ἡ μαστίχη. emenda, ἡ ἀκανότης μαστίχη, quod confirmat Plinius, ut diximus. Id est, Chamæleon albus æquè locis multis nascitur, à radice folia emittit, ex qua media feminibus gravis acanus veluti malum exoritur, in foliis ipsis absconditus. (Videtur Theophrastus hic acanum dicere spinosum & echinatum caput carduorum, quod Dioscorides nunc echinū vocat, nunc ἀκανότιν καὶ κεφαλὴν, nisi fortè pro ἀκανόν legendum sit ἄλινον. Hic lacrymam origanum parte summa profert, quæ est acanthice mastiche. Qui hos duos Theophrasti locos cum Chamæleonis albi historia a Dioscoride tradita contulerit, vnam & eandem plantam ab utroque describi iudicabit: hodie periti herbarij Carlinam esse credunt. Hac, inquit Dalechampius, vbiſis in Allobrogum montibus frequens est, Dientibus Chardouſſe dicta, quasi

Acanus ē spinosus  
et echinatus cap.  
carduorum. 6.  
acanthice mastiche  
u. d. fol. 1453

CHAMÆLEON Albus,  
Matthioli.



Carduus siluestris, radice longa, crassa, subruſa, cum gustatur principio fatua, mox subdulci, tandem acri, foliis latis, albis, aculeatis, humi iacentibus. ex horum medio absque caule echinus prodit, cynaræ capitibus similis, in metam fastigiatus, cōpactili squamarum pungentium aceruo horridus, quo exſecto, sicuti & diuulsis eius laminulis succus lacteus manat, vis i aut glutinis modo lentus ac tenax, sic contrectantium manibus inhærescens, ut vix detergatur, ut ab eo ixias meritò dici possit. Flos purpurascit, quod dilapſo hiat echinus, papporumque densam lanuginem media orbis sui area completitur, quæ in auras auolat. Semen cnico simile est. Huius echinos adhuc cōpressos priusquā florent, indigenæ detractis corticosis vnguibus, struſtilique laminularum serie reuulsa, concidunt in orbes, & raporum ritu in cibos coquunt, vel cum butyro in prunis, vel super foculo parant, sale & pipere condiant, gustu multò quidē palato suauiore & lautiore, quàm echinorum cynaræ, vel scolymi satui. Quare cum tam vulgaris sit in ea regione hic cibus, sentiendum



CHAMÆLEON Niger,  
Matth. & Fuch.

Lib. 4 c. 68.

In cap. 9.  
lib. 3.

In Aduers.

CHAMÆLEON Niger,  
alter Matth.

fatōrum marginibus obuium & frequentem esse hunc Carduum, figura & foliis  
Carlinæ, sed retusioribus laciniis, minoribus. Flores purpurantes, & capitula Carli-  
næ vulgaris, caule carentes, in pappos euanescentes. Semen Cnico simile. Radices  
aliquantulum rubefcentes, grauiſſimi odoris. Augusto menſe floret. Tragus pinxit  
album

ſentiendum viſcidū hunc echinati capitis len-  
torem minimè venenatum, neque exitioſum  
eſſe, cū citra noxam cum ſui globi fruſtulis  
comedatur, vel Allobrogū Chamæleonē inno-  
centiorem eſſe quā Græcorum, vel igne, præ-  
paratione, conditura maleficam eius vim ob-  
tundi. Plerique herbariis & Officinis ſerè om-  
nibus perſuaſum eſt, duplicem eſſe Carlinam,  
aliā caule carentem, aliā caule donatam,  
quam Leucacantham facit Dodonæus: Mat-  
thiolus & Fuchſius nigrum Chamæleonem. Sed  
ſi vti nos, inquit Pena, vtriuſq; radices, & vtriuſ-  
que gummi ſubſtauum, vermiculoſum, nonni-  
hil pellucidum, odore viroſo, guſtu & viſu ex-  
plorarent: demūque eadem radice & flore,  
caulēque donatam, alias verò caule carentes: &  
alibi etiam proximè copioſè enatas, partim cau-  
le viduas, partim vtrōque præditas obſerua-  
rent, volentes ſententiam mutarent. Id ſe ex-  
pendiſſe ait non procul ab arido & gelido di-  
ſtans D. Bernardi monte, atque etiam via qua le-  
ſurgo itur Tridentum locis lapidoſis & licet.  
Quare herbariorum Carlinam varietate non  
genere duplicem, non eſſe Leucacantham, ſed  
Chamæleonem album Dioſcoridis eſſe cenſet.  
Matthiolus aliā Chamæleonis nigri iconem  
exhibuit à Marantha Neapoli ad ſe miſſam,  
quæ tamerſi, inquit, umbellæ ſimilibus Hy-  
cynthi floribus ſcatescentes proferat, cū tamen  
folia rubris maculis diſtincta non ſint, cū mi-  
nimè rubeat caulis, cū manſa radix nullo mo-  
do ſit acris, non exca, non ſtaueſcens, nec cau-  
les digitali craſſitudine, hanc plantam genui-  
num Chamæleonem nigrum eſſe minimè pu-  
tat. Sed hæ notæ ne illi quidem inſunt. Tragus  
Chamæleonem nigrum ipſemet ſtatuit. Tragus  
Carlinam Officinarum, Chamæleonem vulgari-  
rem nigrum facit, alterum & exiguum eius ge-  
nus ſine caule, Cordus Chamæleonem album.  
Lobellius Carduum ἀχαιδον Septentrionalium.  
Vbiq; ſerè prouenit, inquit Tragus, poſiti-  
mum in aſperis montibus, ac forti albaq; terra,  
radice, foliis & ſemine Chamæleonti vulgari  
ſimile, ſed minus. Flos eius aculeatus & purpu-  
reus humi procumbit, & caule caret. Lobellius  
ſcribit Angliæ collibus Picardix & Gallobelgi-  
æ



CHAMÆLEON *Exiguus*,  
Tragi, Dalech.CHAMÆLEON  
Niger verus, Dalech.

alium verum Chamæleonem nigrum, pallidulis cæterisque carduis similibus floribus, semine oblongo & capillato. Chamæleonem nigrum in Gallia nusquam reperit Dalechampius, sed ex eius planta integerrima ex Calabria à Reinerio Solenandro viro humanissimo & doctissimo medico delata, illiq; dono data, effigies hæc ad viuum expressa est. Radix illi palmum longa erat, digitum crassa, foris nigra, & quæ lacera ta hiabat, intus flauescens: folia Chamæleonis albi, angustiora, minora, tenuiora: caulis dimidio pede non procerior, in cuius summo umbella floris purpurei splendebat, Hyacinthi colorem prorsus æmulantis, nisi candor eximius intermiseretur, & quamvis exaruisset, viuidum suum nitorem retinentis, absque echino globose capite, quod videlicet ex omnibus plantis quibus aculeata folia sunt, id peculiare sortitus est Chamæleon, ut citra echinatum verticem flos emicaret auctore Theophrasto duobus in locis, in quibus tamen litera adeo deprauata est, ut ex ea rectus sensus vix elici possit. Prior locus is est,

Lib. 6. hist.  
cap. 3.

Ἀλλὰ ὅ γε τοιαῦτα πάντων, οἷον αἰκονία, λευκὴ ἀνθή, χαλκίος, κνήκος, πολυάνθος, ἀβαυλὶς, δρόπιος, ἔλκη, χαμαιλέων, πλὴν οὗτος οὐ φυλλάγχθος, σκόλυμος, ἢ λετιμόνια, φυλλάγχθα, καὶ ἄλλα. In quo cum de Phyllacanthi loquatur, & Chamæleonem foliis aculeatis esse ex Dioscoride constet, falso οὐ φυλλάγχθος dicitur. Quare legit Dalechampius per parenthesis (πλὴν οὗτος φυλλάγχθος ἐκ ἀχνίσεως) σκόλυμος, &c. Alter locus est. Ἐκ ἀχνίσεως ὃ καὶ ἐδωδύμιος ἢ τοῦ ὄγκου κύσις, ἐκ ἀχνίσεως, ἀλλὰ προμήκης, καὶ τοῦτο ἴδιον μόνον ἐκ τῶν φυλλάγχθων, ἀνίσταμαι ἐκ τῶν χαμαιλέων. ὁ μὲν γὰρ ἀφυλλάγχθος ὡς ἀχνίσις, quæ sic restituit Dalechampius. ὁ μὲν γὰρ φυλλάγχθος ὡς, ἐκ ἀχνίσεως. Illi tamē corruptæ lectioni subscripsit Plinius scribens, Chamæleon in foliis nō habet aculeos, &c. Sed error is vnicus non fuit: nam pro Cnico Cnidos ibidē, & bis Helxine pro vixine legitur. Diuersum à superiore Chamæleonem pinxit Clusius, quem Salmaticensem vocat. Planta est, inquit, ex Acanaceorum genere, caule pedali, interdum etiam cubitali, multis alis siue ramis concauo, & quasi foliato, duro tamen & fir-

Lib. 6. hist.  
cap. 4.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 2. stir.  
Hispa. c. 79

ma: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis veluti umbellæ ex quinque aut sex caliculis seu capitulis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos purpureus dilutior, qui maturo semine in pappos euanescit, reliquorum Acanaceorum more: semen Cnici, minus, dulce, intus candidum, foris subnigrum aut cinereum: radix nigra, dura, dulcis si mandatur. Tota plāta firmis spinis vndique riget. Agro Salmanticēsi frequens. Floret Iulio, semē Augusto maturum.

HHH







βίωσιμος, λούειν κελεύουσιν ἡμέρας, καὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν, βίωσιμος. Deinde de nigri Chamæleonis radice. θύναται ὃ λέπραν ἐξελαίνειν ἐν ὄξει τριβόμενος, καὶ τριβέτης ἐπαλειφόμενος, καὶ ἄλλων ὡσαύτως ἀναρῶν διὰ καὶ τὰς κύνας. Id est, Chamæleonis albi radix ad fluxiones utilis esse traditur, cōcisā raphani modo, & iunco velut clauo transfixa ac decocta: & aduersus latos lumbricos cum vua passa acetabuli mensura in vino austero pota. Occidit & canes & sues. Canes in polēta subacta cum aqua & oleo, sues mixta cum brassica mōtana. (Quæ sequuntur, Mulieri datur ex fece vini passi, aut ex vino passo, Gaza non expresit, fortasse ea notha ac supposititia esse ratus.) Quod si quis experiri voluerit, moriturus sit æger nec ne, præcipiunt ea radice lauandum triduo, quod si tolerauerit moriturum negant. Nigri Chamæleonis radix in aceto trita & illitalepram & vitiligines exterit. Occidit & canes. Plinius partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto hæc exscripsit. Chamæleon cādidos hydropicos iuuat succo radicis decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in vino austero cum origani succo. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes, suesque in polēta addita aqua & oleo. Contrahit in se mures, ac necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicem eius aliqui cōcisam seruari iubent funiculis pendentem, decoquantq; in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Et mox de nigris addit. Radicibus eorum lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vna coctis: commanducatis verò dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Succo scabiem etiam quadrupedum sanant, & ricinos canum necant, iuuēcas quoq; anginae modo: quare à quibusdam Vlophonon, vocatur, & Cynozolon, propter grauitatem odoris. Ferunt & hæc viscum vlceribus vtilissimum. Omnium autem generum eorum radices scorpionibus aduersantur. Atq; hoc postremum videtur innuere, quod Dioscorides theriacam esse dixit. Cum origani verò succo bibi ait, quod Dioscor. dixit, μετὰ δερμάτις ἀποζέμας, quibus cum origani decocto bibendum esse significatur. Galenus de iisdem radicibus huc scribit. Nigri Chamæleonis radicē lethale quidpiam habere: quamobrem foris visum eius ad p̄foras adhiberi, & lichenas, & vitiligines, & in summa quæ deterfionem postulant. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commisceri, & phagædenica vlcera illitam sanare: esse enim siccam tertio ordine, calefacere secundocompleto. Porro albi Chamæleonis radicē potui dari cum vino austero mensura oxybaphi contra latos lumbricos: exhiberi etiam aqua intercutem laborantioribus, ad similitudinemque habere temperiem ipsius nigri radicis, nisi quod hac illa amara sit. Paulus quoque, Oribasius, & Aëcius tradunt Chamæleonis nigri radicē si intra corpus sumatur, veneni loco esse, & cetera eadem quæ Galenus. At Dioscorid. Theophrastus, Plinius neutrius venenatam esse radicem dixerunt. Neque enim venenatam eam esse intelligas, quæ canes, sues, & mures perimat. Quedam enim sunt ranearum tinea propinante: item hydropicis, & contra difficultatem vrinæ. Præterea Dioscorides de Chamæleone albo tractans, Ixiam venenum esse non ait, neq; Theophrastus, cum scribit, ἔχει ὃ δάκρυον καὶ ἡ ἰξία ἢ ἐν κρήνῃ. Id est, Lacrymam fundit Chamæleon albus, qui in Creta nascitur. Sed Dioscorid. de venenis agens, Ixiæ venem incommoda & noxias vires, & remedia tradit ex Nicandro, qui ἰξίδεν ἐλοφόνον vocat. Eius scholiastæ fides habenda nō est, qui Ixiam genus blattæ esse scribit, quod sit colore nigrum, odore verò in potu ocimi semini simile, quum apertè Dioscor. viscum esse dicat quod ad radices Chamæleonis albi reperitur. At Paulus & Aëcius de venenis tractantes, cum de vtriusq; Chamæleonis veneno & curatione dixissent, secutum de Ixiæ veneno eadem quæ Dioscorides retulerūt. Cum verò Chamæleon albus Ixiæ nominetur, ob viscidū illud gummi, quod ex radicibus manat, num etiā Chamæleonis nigri radices gummi fundunt: vt quæ de Ixiæ veneno veteres literis

Lib. 22. c. 18

Lib. 8. sim.

Lib. 7.

Lib. 15.

Lib. 1.

Lib. 9. hist.


cap. 1.



in cap. 21. lib. 6. mandarunt, ad succum etiam è radicibus Chamæleonis nigri pertineant. Matthi-  
 lus non solum Ixiæ nomenclaturam vtriq; Chamæleoni communem esse scribit,  
 quod vterq; gummi visco simile proferat, sed etiam Ixiam Dioscoridi de venenis  
 1. lib. 6. agenti, nihil aliud esse quàm Chamæleonem nigrum. Idem cum Carlinam in cau-  
 tem assurgentem nigrum esse Chamæleonem sibi persuaferit, vè ex vtriusque radi-  
 ce gummi exudare ex quorundam Cretensium oratione in vtraque Carlina id co-  
 crescere narrantium, asserere nō dubitavit. Quod verò Ixia Dioscor. Chamæleon  
 niger sit, haud verum est: soli enim Chamæleoni albo Dioscor. Ixia, Theophras-  
 tus Ixia & Ixines appellationē perspicuè tribuerunt, nusquā Chamæleoni nigro:  
 quorum auctoritas maioris apud omnes ponderis esse debet, quàm nothæ illæ ac  
 1. lib. 22. cap. 18 supposititiæ Ixiæ appellationes, & Plinij oratio quæ est eiusmodi. Ferunt & hæc, in-  
 quit, viscum vlcibus vtilissimum. Quæ verba cum de Chamæleonum generibus,  
 de quibus promiscuè supra tractauerat, citra distinctionem proferuntur, vtriq; Cha-  
 mæleoni videntur viscum assignare. Quod Ruellium mouit vt eum locum aliter  
 quàm est in Plinij codice citaret ad hunc modum. Chamæleonem etiam nigrum  
 ferre viscum vlcibus vtilissimum Plinius commemorat. Verum hæc de albo, nō de  
 nigro, audienda esse ex iis quæ diximus perspicuum est. His adde Penæ periti Her-  
 barij sententiam, qui gummi quod Ixia dicitur, è Carlinæ caule carentis, & caule do-  
 1. fol. 367. natæ radice exudare virosum, & gustu ingratum se certò scire affirmat, venenū sit  
 nec ne, nondum compertum habere. Id etiam asserit non nisi vnam esse plantam  
 vtramque Carlinam, vt dictum est, neque etiam Dioscoridem viscum vllum agno-  
 scere in verò Chamæleone nigro. Ixiam Græcorum Plinius locis quamplurimis vi-  
 1. lib. 3. cap. 9. scum conuertit. In causa fortasse fuit vtriusque consimilis lentor, inquit Ruellius.  
 Nam sicut viscum cuiuscumq; rei cui hæserit, tenax est, ita si deuoretur Ixias, omnia  
 glutinat interanea, omnesq; contrahit recrementorum exitus, & colligat. Sic forte  
 tan cum pro veneno Plinij Latina defecisset appellatio, maluit vt largiuscula no-  
 minis ambage, quàm vel Græcam sequi, vel nouam effingere nomenclaturam. Hoc  
 vtiq; pacto Plinius ab erroris suspitione posset vindicari, quanquam Scribonius  
 Largus antiquior eo, Græco contentus vocabulo, libellis suis Ixiæ vocem sacis pro-  
 triuerat. Quare nomen hoc ἐμπίλον ad viscum arboreum, & aucupis dicatum vi-  
 tio non caret, cum pugnent viribus viscum & Ixia, sitq; viscum in remediis  
 Ixia verò in venenorum censu numerandum. Id quod pridem obseruauit doctissi-  
 mus Leoniceus.

## ERYNGIVM, CAP. VIII.

Nomina



eryngium centumcapita

PYTHION Græcis & ἐρύων, Latinis Eryngium, Officinis com-  
 pto vocabulo Iringus vocatur. Plerique etiam Centumcapita nomi-  
 nant, à numero nimirum capitū quæ in summo obtinet. Vnde Galienus  
 Eryngium vulgare vocant Chardon à cent testes. Græci philosophi, in-  
 quit Pena, Eryngium quasi ἐρύων, id est, ructum, dictum autumāt, quod capra quæ  
 morfu fureculum Eryngij præciderint, vel deglutierint, cunctum gregem ponē  
 quætem quasi stupore attronitum sistunt, donec Eryngium ructu reiecerint. Eryngium

Lib. 3. c. 21.

Genera.

Lib. 2. c. 7.

8. &amp; 9.

Lib. 3. c. 21.

Forma.

corides Eryngij vnius meminit. Plinius scribit aliud esse albicans, aliud nigrum  
 satium quidem esse, & spōte nasci in asperis & saxosis: & in litoribus maris durum  
 nigriusq; folio apij. Ex his cādidum à Romanis Centumcapita vocari. Sunt, inquit,  
 qui & acanon Eryngio adscribāt, spinosam, breuemq; ac latam herbam, spinosius  
 tioribus. Recentiores quoq; herbarij aliquot Eryngij genera obseruauerunt, ducta  
 militudine quæ illis est cum Eryngij descriptione à Dioscoride tradita. Est autem  
 huiusmodi. In aculeatarum stirpium genere est Eryngium, cuius folia initio late  
 condita olerum modo comeduntur. Sunt autē lata, & in ambitu aspera, gustu odo-  
 rata. quum verò adoleſcunt, in multis caulium eminentiis spinis aculeatur, in quibus  
 summa



ERYNGIVM Montanum,  
Matthioli.ERYNGIVM Marinum,  
Matthioli.

summitatibus globosa capita duriorum acutis-  
simarumq; spinarū ambitu stellę instar circum-  
uallantur, quorum color modò viridis, aut can-  
didus, interdum caruleus inuenitur. Radix illi  
oblōga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis cra-  
ssitudine, & ipsa odorata, & aromatica. Nascitur  
in asperis & campestribus. Hęc quamuis satis  
dilucida sit à Dioscoride tradita delineatio,  
quodnam tamen Eryngium propiùs represen-  
tet, nondum inter herbarios constat. Aliis enim  
Eryngium cāpestre designari placet: aliis Eryn-  
gium marinū indiciis omnibus propiùs expri-  
mi, quod Dalechāpius luculenter sic descripsit.  
In litoribus & sabulosis, quę exundās maris flu-  
ctus irrigat, sępius hoc crescit: radice dulci, ex  
interuallis geniculata, decem duodecim vę pe-  
des longa, & nonnumquam longiore, vt inte-  
grā extirpare vix liceat: folio magno, lato, sub-  
rotundo, albicāte, crasso, per ambitum infecto,  
& spinoso, cū manditur suauiter olente: caule  
pedali, rotundo, ima parte rubente: in cuius ca-  
cumine globosa capitula, pilulę forma, nucis  
magnitudine, aculeis horrida protuberant, cir-  
cumfusi exiguus floribus, tractu nostro caru-  
leis, quinis, senisve foliolis spinosis, in orbem  
subtus muricato spiculorum vallo stellę modo  
radiantibus, colore quoque caruleo, quem cau-  
lis, floris, foliorum colorē in aliis regionibus va-  
riare quidam asserunt, quibus assentitur ille, sed  
quale Eryngium in maritimis nostris vidit, tale  
& descripsit in eorum gratiam qui procul à ma-  
ri absunt. Hoc Eryngiū Plinius in litoribus ma-  
ris folio apij esse dixit, quod aut falsum est; aut  
deprauati codices, vt pro σκολόμου, σελίνος, id est,  
apij folia, alicubi legisse videatur. Apud Theo-  
phrastum quo loco aculeatarum stirpium diffe-  
rentias ex caulium ramorumq; numero ac situ  
inuestigat, ῥύθρος, vel, vt Gaza legit, ῥύθρον mendo-  
sē pro ἐρύγγιον exaratum est, quod ex Pliniana lo-  
ci illius Theophrasti interpretatione facillē de-  
monstratur: quanquam Plinius mentem illius  
non omnino expresserit, neque is Theophrasti  
locus ex Plinij conuersione integer esse depre-  
hēdatur. Multis igitur enumeratis spinosis her-  
bis subiungit Theophrastus. διαφέρεισι δὲ ἀλλή-  
λων πρὸς τοῖς εἰρημένους, τῶν δὲ μὲν πολὺ καυλὰ εἶναι,  
Plinius conuertit. Est & illa differentia, quod quędam in iis multicaulia ramosaq;  
sunt, vt carduus. Vno autem caule, nec ramosum, cnicos. Quędam cacumine ran-  
tum spinosa sunt, vt Eryngium. Ex quibus intelligere licet legendū esse, καὶ ἀπορύσφς

Locus.

Fuchf. cap.  
m. hist.  
Pena in  
Aduers.Eryng. Ma-  
rinum.

Lib. 21. c. 75.

Lib. 6. hist.  
cap. 3.

Lib. 1. c. 6.



ἔχειν, ὥσπερ ὁ σκόλυμος, & δὲ μονόκευλα, καὶ ἀποφύσσει καὶ ἔχειν, ὥσπερ ὁ κήμος, & προ-  
 ῥύθρος legendum ἐρύγγιον: Plinium tamen non rectē dixisse, quādam cacumine tan-  
 tum spinosa esse: dicendum enim fuerat, quādam cacumine tantum ramos & adna-  
 ta fundere, quemadmodum Eryngium. Eryngium montanum in salebrosis mon-  
 tibus nascitur: foliis multis, à radice prodeunti-

Forma.

ERYNGIVM aliud monta-  
 num, Dalecham.



ERYNGIVM Planum,  
 Matthioli.

Lib. 6. c. 28.

Lib. 2. stir.  
 Hsp. c. 32.



bus, venosis, amplis, in ambitu crenatis, & leu-  
 ter pungentibus, vrticæ similibus, albicantibus,  
 longo pediculo subnixis: caule sesquipedali, vir-  
 gato, quā furculi echinos sustinentes prodeunt,  
 foliis oblongis & valde muricatis stellatim co-  
 ronato: echinis ovo similibus, foliorum spino-  
 forum vallo munitis albæ spinæ modo, quod  
 huic carduo peculiare est: dum maturefcunt ex-  
 ruleo colore nirentibus: radice ferè Helenij, fo-  
 ris nigra, intus candida, odorata, gustu Eryngij.  
 Aliud Eryngium montanum recentiores fece-  
 re, scilicet Crithmum quartum Matthioli. Na-  
 scitur in Bohemia inter segetes, in agrorū mar-  
 ginibus & secus vias, foliis longis, angustis, firmis  
 ternis ex pediculo longo prodeuntibus, vring-  
 denticularis, iis quæ in summis caulibus sunt mi-  
 noribus & brevioribus. Caulē habet ramulosum,  
 alis cōcauum, geniculatum, in summo alis divi-  
 sum, in quibus floridæ albicantēque vmbellæ,  
 in eis semina oblongum, paruum, acre, odoratū.  
 Radix silvestri haud absimilis est, minor tamē,  
 sapore primum dulci, deinde acri & odoratā.  
 Hæc Matthiolus. Pena scribit gustu & odore  
 esse Eryngij, radice simili, Crithmo dissimili. In  
 Flādria provenire scribit Lobellius. Aëtius aliud  
 Eryngium montanum describit, foliis angustis  
 & parvis, floribus aureis, & oculorum speciem  
 præbentibus, ex cuius radice pharmacum con-  
 cit, quod qui per anni spatium sumplerit, à co-  
 mitiali morbo non corripitur. Huius Eryngij  
 folia non solum contactu, sed etiam propē ab-  
 mota, vi prorsus admirabili salamandras aqua-  
 tiquas interficiūt. Matthiolus Eryngium aliud  
 pictum dedit, quod planum vocat, omīssa pro-  
 priis eius descriptione. Potest Eryngium leve di-  
 ci. Clusius aliud exhibuit, quod pumilum appe-  
 lat: tenuifolium etiam dici potest. Hoc pumilum  
 ferè in agro Salmanticēsi in colliculis nascitur,  
 palmi, nonnunquam pedis altitudine, caule qua-  
 cili, multis alis brachiato: folia secundum radicem  
 maiuscula, latiuscula & molliora, circa radicem  
 rotæ instar humi sparguntur: sed quæ in ipso  
 caule sunt sub alis, multitudine sunt, tenuia & ac-  
 leata: in ramulorum summitatibus globosā ca-  
 picula plerumq; octo, spinosorum foliolorum  
 ambitu



ambitu stellatim circumuallantur, & ipsa etiam sinuosa sunt: flos & tota capitula cum suis foliolis ea ambientibus carulei sunt coloris: folia statim exsiccantur & decidunt, vt raro plantam cum foliis reperire liceat, praesertim, vbi defloruit: radix lignosa & tenuis, quae singulis annis perit. Post menses plerumque inuenitur loco supra dicto. Huic subdendum aliud pusillum Eryngium planum Mutoni ex Lobellio, quod raro ruri, vel in hortis apud Belgas visitur, foliis quam Dipsacus lon-

ERYNGIUM Pumulum,  
Cusij.



PVSILLVM Eryngium  
planum Mutoni, Lobel.



ge minoribus, angustioribus, cauliculis dodrantalibus & pedalibus, anfractuosis, & diuicatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quam campestris Eryngij: radix Corruide, aut Asparagi, sed minor multo, perennis. Nusquam se vidisse ait Lobellius, quam in hortis Mutoni. Dioscoridi Eryngij radix calfaciendi vim habet. Pota menses & vrinas pellit: tormina & inflatones discutit: cum vino iocinorosis, venenatorum moribus, & iis qui lethiferum quid hauserunt succurrit. Bibitur aduersus plurima cum staphylini semine pondere drachmae vnus. Appensa & illita tubercula discutere proditur: cum hydromelite pota opisthotonicis, & comitialibus medetur. Plinius, Clara imprimis aculeatarum Eryngium est, contra serpentes, & venenata omnia nascens. Aduersus ictus morsus, radix eius bibitur drachmae pondere in vino: aut si plerumque tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax contra cherfydros, ac ranas. Omnibus vero contra toxica, & aconita efficacior Heracleides medicus in iure anseris decoctam arbitrat. Apollodorus aduersus toxica cum rana decoquit, ceteri in aqua. Eryngium Galenus ait caliditate parum, aut nihil, quod temperatum est superare, ceterum non parum habere siccitatem in tenui essentia consistentem. Aetius scribit potum radice decoctum colicis mederi: multo ad decoctum calculos, stiticia difficultates vrinae, & renum vitia sanare: quod per quindecim iugiter dies & ieiunos, & in lectum ituros bibere oportet. Quod si cum eo sum quoque decoxeris, magis proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij usu, nunquam postea minxisse calculos, cum prius eo morbo frequentissime vexaretur.

Li. 22. ca. 7

Li. 5. simpl.

Lib. 1.



Nomina  
Lib. 3. ca. 12.  
Forma.



Locus.

Ca. 16. hist.

KΑΝΘΑ ΛΕΥΚΗ Græcis, Latinis Spina alba, Arabibus Bedeguar, folia fert, vt Dioscorides describit, albo Chamæleonti similia, sed angustiora, & candidiora, aliquatùm hispida, spinosa, caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliori crassitudine, albicantem, intus cauum, in cacumine capitulum inest spinosum, echino marino simile, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu Cnicum, sed rotundius. Nascitur in montibus & siluosis. Diuersi rei herbariæ scriptores diuersas spinosas plantas pro Spina alba proponunt. Fuchsius Spinæ albæ genus vnum esse scribit, quod Carduus Mariæ hodie nominatur, & Spinam albam hortensem appellat. Alterum genus, siluestre, quod Acanthiū ex Dodon. & aliis esse diximus. Alij Spinā albam, Carduū benedictū, vulgò dictū esse putant: alij Carlinā: alij Cynarā aculeatā: alij Scolymum, alij alios siluestres carduos spinis rigētes. Dalechamp. Spinā albā esse arbitratur quæ hīc picta est, notis omnibus à Diosco. traditis ei aptissimè quadrantibus. Gignitur in niuosis, asperis, & lapidosis montibus Allobrogum, locis ad Orientem solem, aut Meridiem couersis, quæ celsi montium vertices in cliuolos tractus summittuntur. Planta cubito procerior assurgit, radice pedali, intus candida, foris ex albo flauescēte, parum furculosa, gustu adstringente: caule anguloso, supernè ramoso, inani, pollicis crassitudine: foliis Chamæleonis albi, candidioribus, angustioribus, altius incisis, spinosis, subhirsutis: echinis oblongis, ouatis, aculeis

SPINA Alba, Dalechampij.



SPINA Alba, Matthioli.




innumeris rigentibus, displici satiui echino prorsus similibus, horrido spinarum erectarum vallo cinctis, quod huic vni ac Eryngio cæruleo ex omnibus spinosis plantis ab eo visis peculiare est: aspectu pulcherrino: flore purpureo, in echino sub aculeorum velut radice prodeunte: semine Cnici, minore. Hæc descriptio ex planta viua expressa omnibus notis Spinam albam, ita representat, vt nihil deliderari queat, & eius cognitio herbariorum de Spina alba diffusionem dirimere debeat.

hec spina d. col. vult  
spin. d. h. p. 1462



SPINA Alba alera, Matth.



debeat, ac in posterum medicamentarios docere syrupo de Eupatorio indendā. Matthi-  
lus legitimam Spinam albam Patavio à Cortu-  
so ad se missam ait, quā hic expressimus. Hæc,  
inquit, Spinā albā Diosc. noris, omnibus, quas  
modò ex eo recensuimus, refert. Est & altera  
planta aculeata, inquit, cuius iconem hic exhi-  
bemus, quam quidam Spinam albam esse cen-  
sentes multa in hac desiderātur. Hanc tamen  
depinxit Pena, nomine Spinā albā, quā in hor-  
to Patavino vidit, indicante Melchiore Guil-  
landino illi præfecto, Carduum scilicet totum  
albidam, infernē albidiorē quā supernē, ha-  
bentem folia Chamæleonis, minora in regio-  
nibus siccioribus. Nam quem in Anglia tenuit  
ille, latiora aliquantò habuisse ait. Fuit quidem  
illi caulis bicubitalis, etiam tricubitalis, digitū  
crassus, & incanus totus: echinos marinis simi-  
les rotundos habuit: quando florent ex albo  
purpurascens, inter quos defluentes sese in  
summo, multò altius erigunt ternæ quater-  
næve, papposæ glumæ cōfertæ rigidis mucro-

natis tunicis, semen claudentibus oblongum, avenæ excorticatæ æquale & simile.  
Hæc, inquit, posterioribus, & accuratioribus peritiorum sententiis omnium ma-  
ximè quadrare videtur Spinā albā: semen tamen, cuiusmodi dixit, avenæ aut seca-  
li similis, sed rotundius Cnico. Huius iconem capite de Spina Arabica ostendi-  
mus. Spinæ albæ radix pota, ut tradit Dioscorides, sanguinē expuentibus, stoma-  
chicis, & cæliacis prodest: ciet vrinas: & ad tumores in cataplasmate imponitur.  
Decoctum ipsius in dolore dentium collutum confert. Epotum semen infantibus  
qui conuelluntur, & à serpente demorsis auxiliatur. Aiunt & amuletum ex ipso  
appensum serpentes fugare. Inter Spinarum genera Plinius Spinæ albæ meminit  
his verbis. Spinæ albæ semen contra serpentes auxiliatur. Corona ex ea imposita  
capitis dolores minuit: nec alibi ipsam describit, nisi quod ait, in Papyris & Feru-  
lis. Spinæq; albæ caulis ipse pomum est. Galenus scribit Spinæ albæ radicē desicca-  
re, & sanguinis reiectiones cohibere, ædematq; illitu contrahere, ac dentibus  
dolentibus prodesse, si decocto eius colluantur. Semen tenuis essentia: & calidæ  
facultatis esse, itaq; potui datum iis qui conuelluntur convenire.

Vires &  
Temper.  
Lib. 3. c. 12.

Li. 24. c. 12.

Lib. 15. c. 28.

Li. 6. simpl.

## LEVCACANTHA,

## CAP. X.

ΕΥΚΑΚΑΝΘΑ Græcis, Alba spina Latinis, non solum vocum  
transpositione & compositione ab ἀργύρα λανή soluta compositio-  
ne, idest Spina alba differt, sed etiam re ipsa maximè: quod aperte  
prisci auctores demonstrant, qui seorsum & diversa de vtraque tra-  
didisse, aliquantò post de Leucantha hæc brevius, quā nobis ad eius cognitio-  
nem comparandam necesse fuerat, scripsit. Leucacantha radix similis est Cypero,  
amaræ, valida, vel, ut alij legunt, συμπα ἰχυρὰ, idest amara valde. Nec fusiùs Plinius,  
Leucacantha, inquit, quam alij Phyllon, alij Ichia, alij Polygonatō appellant,  
radice Cyperi, &c. Ex qua brevi mentione quæ sit hodie Leucacantha, haud facile  
est decer

Nomina

Lib. 3. ca. 19.

Forma.

Li. 22. ca. 16.



In cap. 19.  
lib. 3.CARDVVS Lacteus,  
Matthioli.

Carduus liliifolius  
habet quatuordecim  
capitula liliifolia  
radix cardui  
lib. 4. c. 68.

Cap. 7.



Lib. 1. ca. 4.

LEVCACANTHA,  
quorundam.Lib. 1. cauf.  
cap. 10.Lib. 3. c. 19.  
Vires &  
Temper.

hanc suspensionem, quod legitur in vetustis Dioscoridi. ex paribus, Leucacantha  
Spinam quoque regiam nuncupatam fuisse. Dioscorides tradit Leucacantha radi-  
cem manducatam dentium dolores sedare. Dioscorides ipsius cyathorum trium  
mensura cum vino potum auxiliari... ischiadicis, ruptis, &  
convulsis.

est decernere. Matthiolus Leucacantham sur-  
spicatur esse aculeatum illum Carduum, cuius  
folia albis maculis notata sunt, vnde ab Italis  
Carduus lacteus nuncupatur, ab aliis Cardus  
Mariæ. Nam præterquam quod coniectura  
quadam dici posset, inquit, ab albis maculis no-  
men inuenisse, radicis etiã ipsius tum durities,  
tum amaritudo, etsi forma cyperi radicem non  
referat, satis cõsentire videtur. Dodonæus Car-  
linam quæ caulem profert, pro Leucacantha  
depinxit & descripsit, quam Chamæleonem  
album esse ostendimus. Aliam quidam pro  
Leucacantha monstrant, quæ hîc picta datur.  
Hæc in agro Valætino Allobrogum, & in agro  
Sesteriensis, reliquaq; Galloprovincia frequen-  
tissima nascitur, agricolis, messoribus & viro-  
ribus infestissima, quod eorum crura spinis  
suis validissimis configat, & sauciet. Sesterien-  
ses *Auriolæ* vocant, a floris aureo colore. Pro-  
uenit vbique in aruis & segetibus, radice subni-  
gra, lignosa, perquam amara, terete, quali geni-  
culorum lineis virgata, cypero simili (nam, vt  
scribit Dioscorides, Cyperi radices nunc rotun-  
dæ sunt, cum quibus Leucacanthæ radicem com-  
parare possumus, nunc oblongis oliui similes  
inter se cohærent) caulibus sesquipedalibus, fo-  
liis ferè cyani, oblongis, carnosissimis, cinereo vi-  
rentibus, prope radicem altissimè laciniatis, in  
extremo caule nihil incis, læuibus & exarma-  
tis, flore aureo, spinis candidissimis (quam ob  
causam Albam spinam veteres nominarunt)  
stellatis, myacantho similibus, & pariter, vt in  
myacantho collocatis, tam rigidis, & læuibus, vt  
prætereuntium caligis transixis sæpissime ir-  
bias dilanient. Huius folius & myacanthi folia  
in carduorum generibus, nullis spinis rigenti-  
bus. Monspelienses hanc spinam Solstitialem no-  
minant, quod æstiuo solstitio floreat, atque etiã  
serius. Quidam ἀκνὸν βασιλικὸν Theophrasti  
esse coniciunt, id est Spinam regiam, quæ ante  
æstatem non germinat, conueniente cum hu-  
ius natura germinationis tempore, & hac in-  
super cõiectura, quod cum Theophrastus men-  
tionem fecerit τῆς λευγαγίας plantæ veteri-  
bus notissimæ, & ab altera diuēse. Leucacantha



conuulsis:quin & succum radices potum eadem præstare. Plinius, Leucacanthæ ra-  
 dix, inquit, commanducata dentium dolorem sedat: item laterum & lumborum,  
 vt Hicesius tradit, semine poto drachmis octo, aut succo. Eadē ruptis, conuulsisq;  
 medetur. Galenus Leucacanthi, quam aliqui Polygonatō, alij Ischiada nuncupāt,  
 radicem amaram esse scribit, ac proinde incidere & exsiccare tertio ordine, calfa-  
 cere autem primo. Leucacanthæ hīc depictæ radicibus vtuntur hodie ad tollen-

Li. 21. c. 16.

Li. 7. simpl.

## LEUCACANTHA

Monspelienſium, Dalech.



das hepatis & lienis obstructions prospero  
 succellu: eiusdem succo ad aquam intercutem,  
 aquas mirificè per vrinas, ac nonnunquam per  
 aluum educente. Aliam Monspelienſes Leuca-  
 cantham vulgò appellant, hīc quoque apposi-  
 tam, quam neq; Spinam albam, neque Leuca-  
 cantham genuinam esse iudicant periti herba-  
 rij. In asperis & saxosis prouenit, radice crassa,  
 succosa, modicè fibrata, caulibus multis, sesqui-  
 pedalibus, ramosis, foliis laciniatis, incanis, la-  
 nuginosiſ, aculeatis, capitulis echinatis, flore  
 purpureo, coloris viuidiſſimi & nitidiſſimi, in  
 pappos abeunte, semine oblongo. Pena nullam  
 stirpem propiùs ad Leucacantham Dioſcori-  
 dis accedere existimat, quàm Carduum bulbo-  
 sum Monspelienſium, qui locis vdis & praten-  
 ſibus circum Monspelium frequens oritur in-  
 ter Narcissoſ & Aristolochias, cui folia palmū  
 alta, pingua, aut craſſiora, in ambitu laciniata  
 & ferrata Acanthij modo cernuntur, tenuibus  
 spinis ambientibus: caulis binos cubitos altus,  
 gracilis, cui in summo capitula, floribus purpu-  
 reis ſtamineis oppleta, semine Cnici, sed mi-

In Aduerſ.

nor: radices multæ, confertæ, ex vno quaſi nodulo aptæ, in multos oblongos glo-  
 bulos ductæ, Asphodeli, Cyperive modo, mandēti multum glutinis exhibentes,  
 nonnihil caloris, & tenuium partium, tametiſi amaroris penè nihil. Quidam Car-  
 duum Triglochina ſuprà deſcriptum cap. 3. Leucacantham eſſe malunt.

## SILYBUM,

## CAP. XI.

**Q**UAEIS σίλυβον, Latinis ſimiliter Silybum nominatum, tam breui-  
 ter à Dioſcoride delineatur, vt pronunciare difficile ſit, quænam ex  
 noſtratibus aculeatis ſtirpibus hoc nomine ſit donanda. Sic enim ille  
 ſcribit. Silybum ſpina eſt lata, folia habens Chamæleoni albo ſimilia.  
 Et Plinius, Silybum, inquit, Chamæleonti albo ſimilem, æquè ſpinofam ne in Ci-  
 licia quidem, aut Syria, aut Phœnice, vbi naſcitur, coquere tanti eſt: ita operoſa  
 eius culina traditur. In medicina nullum uſum habet. Quare cū breuitas iſta  
 obſcuritatē nobis pariat, diuinare potiùs licet, quàm de eius plantæ aculeatæ no-  
 tione certū aliquid ſtatuerē. Silybum igitur quidam eſſe arbitrantur plantā illam  
 aculeatam quam Lonicerus nomine Leucacanthæ exhibuit & deſcripſit, & à Ger-  
 manis *Ueiz* & *diſtel* appellari ſcripſit, vel ad differentiam Spinæ albæ *Ueiz garten*  
*diſtel*, *lungkrauten diſtel*, id eſt Carduum puellarum, quod in virginum ſerta & co-  
 ronæ veniat, *Zangarten diſtel*, id eſt Carduum ſatiuum hortenſem. Spiræ, & in ali-  
 quot alijs Germaniæ ciuitatibus inter coronariæ plātas magna diligētia in hor-  
 tis colitur & ſeritur à puellis, quæ ex Libanotidis folijs, & huius cardui floribus  
 intertextis

Nomina

Lib. 4. c. 153.

Li. &amp; c. 22.

*σίλυβον. quædam  
 planta huius illi  
 in leoni ſpina, quæ  
 Aggry. Sibil. curat  
 huius ſpina: huius  
 ſpina in ſilpho  
 conuerſant*



Forma.

SILYBUM, Sive Leuca-  
cantha, Loniceri.

In Aduers.



Li. 4. c. 153.  
Vires &  
Temper.

larum copiam lactis illius esu prouocat. Dioscorides tradit Silybi radicem cum sale oleoque coctam edi: radicis succum drachmæ pondere potum vomitiones mouere. Sed de hoc Carduo aliquantò post plura dicemus.

## SPINA ARABICA,

## CAP. XII.

Nomina

Lib. 3. ca. 15.

Li. 24. c. 12.

Lib. 13. c. 9.

Ca. 11. li. 13.

Li. 24. c. 12.

Li. 6. simpl.



KΑΝΘΑ ΑΡΑΒΙΚΗ Græcis, & αἰγυπτια, Spina Arabica, & Ægyptia Latinitis dicitur, Mauritanis *Suchaha*. Hanc Spinæ albæ subiicit Dioscorides, non tamen describit, sed similem naturam videri ait Spinæ albæ, adstringentem, & ad fluxum muliebrem, ad sanguinis reiectionem, & ad alias fluxiones radicem eius similiter vtilem esse. Plinius Spinæ Ægyptiæ, siue Arabiæ laudes, inquit, in odorum loco diximus: & ipsa spissat adstringens, destillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensiumque abundantia, etiamnum radice valentior. Ita vetus codex, sed in vulgatis, Ægyptiæ siue, voces desunt. Quæ eadem planè sunt cum iis quæ Dioscorides tradidit, nisi quòd *ποῦν γυναικείον* mensium abundantiam pro fluxu muliebri more suo conuertit. Locus autem quo se Ægyptiæ Spinæ laudes dixisse ait, est is. Nec minùs Spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id vtilissima narium collis. Candida facillè putrescit. Aculeus Spinarum est in foliis, semen in siliquis, quo coria perficiuntur gallæ vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis vtilis. Manat & gummi ex ea, &c. At non satis animaduertit Plinius aliam esse Spinam Ægyptiam, ex qua Acacia præparatur, quæq; etiam Acacia appellatur, de qua & hoc loco, & capite sequenti agit, scribens, Gummi optimum esse ex Ægyptia Spina conuenit, vermiculatum, &c. Item alio in loco suprâ à nobis citato, vbi Acaciæ spinam vocat ab hac spina Arabica, quæ etiam Ægyptia vocatur, de qua primo loco à nobis adducto tractat, eique eadem omnia quæ Dioscorides, attribuit, cum tamen hæc herba sit, illa arbor. Galenus quoq; scribit Spinam Ægyptiam quàm & Arabicam vocant, similem esse Spinæ albæ nostrati, verum facultate validior.







## ATTRACTYLIS.

ATTRACTYLIS flore  
purpurea.

Lib.

Lee figm. et  
cur. hinc figm.  
p. 1450.

πυκνόμενον δέντρον  
πυκνόμενον δέντρον  
κόμην κομην  
πυκνόμενον δέντρον  
πυκνόμενον δέντρον

lidi simili: foliis paulo latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extorsum distentis, partim, quod isti plantæ peculiare est, cauli & ramis pennarum rati natio coalitu sic agglutinatis, ut cohæreant, & vtrinque cauli ramisque incurvantur, tanquam de industria admota & impacta: flore Cnici, croceo, in oblongis capitulis fulgente: semine quoque Cnici. Quidam sunt, inquit Matthioli, qui plantam

mentem assecutus non videtur, sicuti neque Ruellius, qui vertit odore grauis, & pestem denuntians: nam cum quotannis repullulascens odorem suum vibret, oporteret pestilentem quoque luem quotannis hanc minari. Alij exponunt, olere cadaueris trucidati, & in tabu iam marcescentis foetidum virus, quod ad auctoris sensum aptius est, non tamen verum. Attractylis enim resinosa & iniucundum quidpiam spirat, non autem tam abominandum, ac putidum. Mendosus igitur locus est, & sic corrigendus. ἔχθρη δὲ τὴν ὀσμὴν ἀφ' ἧς, καὶ δυνάμει, id est graui est, & ingrato odore. Alij legunt, ἔχθρη τὴν ὀσμὴν, καὶ χυλὸν φονώδην. Hæc peculiaris Attractylidis nota, q. foliis sanguineum succum effundat, ob id ἐνδρὸς αἱματὸν ab Aëtio nuncupata. Attractylidem hic appictam genuinam esse arguit. Si quis enim echinorum squamas euellat, & plaga manabit cruor: si verò distractum & dilaceratum capitulum manibus, vel panis albis affrices, colore sanguineo tingentur: quod experientia quævis docere potest. Est & in agro Mōspelidi Attractylis purpurea frequēs, luteæ Attractylidi caule, folio, radice, echino, odore, succo similis, hoc verò distans, quod nec pubescit lanugine, quemadmodum lutea, & florem edit purpureū, seu potius coccineum. Ad hanc accedere videtur Attractylis Cypria, quam descripsit Anguilara, foliis Cnico similibus, minoribus, nonnihil crispis: ex horum medio surgit caulis, in cuius fastigio echinus protuberat, ex quo dodrantales ramuli graciles, foliis nudi, huc illuc procedunt, echinos in vertice pusillos sustinentes, flore dum explicantur purpureo, Anemone simili. Horum simul omnium, nempe & caulis & ramulorum, cubitalis est altitudo: semē album, Cnico simile. Nascitur & hoc Cardui genus in agro Bononiensi prope montem, quem *Matigiano* vocant, prope villam Medefanum, & in Maris prope oppidum, quod *Chieti* nominant, & in Narbonensi prouincia inter Malanum & Insulam oppidum, sed flore ad luteum inclināte. Est præterea Attractylis marina cognominata, quod in maritimis gignatur, *Pennocomon* appellat, radice vulgari Attractylidis simili: foliis paulo latioribus & longioribus, partim ex caule ramisque extor-



*ATTRACTYLIS Marina,*  
*Pycnocomon Pena.*

*ATTRACTYLIS quorun-*  
*dam, Matthioli.*



plantam cuius iconem hîc expressam videtis, Attractylidæ esse existiment. Quorû opinionem approbaret, si folia sanguineum succum funderent, & caules rectiores essent. Sit itaque ea de re aliorum iudicium. Attractylidis folia, coma & semen, auctore Dioscoride, trita cum pipere vinôque pota, contra scorpionum ictus

*CARDVNCELLVS,*  
*Pena.*



profunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos quamdiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita verò dolore affici. Plinius de eadem hæc tradit. Nec de Cnico, siue Attractylide verbosius dici par esset, Ægyptia herba, ni magnû cōtra venenata animalia præberet auxilium, item aduersus fungos. Constat à scorpione percussos quamdiu teneant herbam, non sentire cruciatum. Et Galenus scribit Attractylidem, quæ ex spinosarum est genere, facultatem habere desiccandi, & modicè digerendi.

In c. 9. li. 3.

Vires &  
Temper.  
Li. 21. c. 32.

Li. 6. simpl.

*CARDVNCELLVS,*  
*CAP. XIII.*



**I**N NARBONENSIS agri montanis ad montis Lupi ima, meridiem versus, scribit Pena oriri prope pusillum amnem, aut torrètem, hanc Cardui speciem omnium minimam, eoque Carduncellum ab ipso nuncupatam. Plantula huic radix est implexa, altè humi depacta, à qua mox foliola pluscula, exilibus & altis diuisuris

In Aduers.

Forma.

carduncellus  
carduus pennis



*Dentata.* Caulis vix dodrantalis, laevis, gracilis, humi demissus: caput maius quam pro foliorum proportionē, spinis horridis, foliosis cinctum florem claudit, purpureum, *Attractylidis*, cui etiam folia, ipsaq; vniuersa planta valde similis est, sed longē sim lior *Aëcij* *Attractylidi* purpureæ à flore vocatæ, fortē & eadem. Vñs incognitus, quia planta vix nota: Hæc *Pena*.

CARDVVS STELLATVS, *Dalecham.*

## CAP. XV.

Nomen.

Forma.

*carduus stellatus*  
*carduus*



**R**AETER Carduorum genera partim dicta, partim dicenda, & ad prisca nomenclaturas coniectura quam maxime fieri potuit verisimili reuocata, quedam atia hodie nobis innotuerunt, specie non minus quam illa considerata & explicanda: inter quæ primus occurrit *Carduus stellatus*, alius à *Myacantho* *Theophrasti*, quem *Officina* nomine *Cardui stellati* ostendunt. Hic noster foliis est breuib; & paruis, nec valde laciniatis, nec spinis aut multis, aut rigidis armatis: caule cubitali, parum furculoso: capitulo toroso & crasso, candicante, spinis vndique muricato, stella figura radiatis, ex aculeis septem vnaquaq; spinarum congre- coalescente, longissimo eo qui medius extat, breuioribus aliis vtrinque tribus qui medium ambiunt, elegantissima harum spinarum structura: flore puniceo.

CARDVVS CHONDRILLODES, *Dalech.*

## CAP. XVI.

Nomen.

*carduus*  
*chondrillodes*

Forma.



**C**ARDVVS hic *Chondrillodes* cognominatur, quod foliis *Chondrillam* secundam valde imitetur. Crescit in asperis & laxolis, radice dodrantali, lignosa, dura, candida, obliqua, tenuissimis villis circumpuncta: foliis proximè radicem multis, laciniatis, & pillata: foliis Chondrillæ modo, breuib; aculeatis, circumrosis Chondrillæ modo, breuib; aculeatis, in superiore caule paucis, qui pedalis est: in ramulos ferè duos tantum diuisus, teres, angulosus, in cuius cacumine capitulum nullum, sed eius vice coticosus vertex, ut in *Borragine* circinatus, velut in radios dispersus: flos aureus, in pappos evanesceus. Quod itaque *Scolymo* proprium esse vult *Theophrastus*, ut spinoso capitulo, quod acanthis vocat, is careat, id & huic *Carduo* commune est, præter aliorum Carduorum naturam.

CARDVVS



αργύρεος  
φυλλοειδής



**C**ST ET Carduus alius, Aræophyllos dictus, quod caulis, qui etiam angulosus est, raris foliis vestiatur. Hæc ex interuallis singula longiuscula, angusta, oleæ similia, paucis & mollibus spinulis aspera procedunt in caule terete, pedem alto, in cuius summo quatuor, aut quinque conspicias capitula, subalbida, minimè aculeata, sed laminularum positu, ordinibus, & scansili inæqualitate leuissimè tantum attristentium marius scabentia: flos purpureus est: semen paruum, oblongum, inter omnia Carduorum genera mollissima & longissima lanugine reconditum.

Nomen.

## ONOPYXOS. CAP. XVIII.



'ΝΟΠΥΞΟΣ inter spinosas stirpes à Theophrasto numeratur, & à Plinio. Buxum asininum vertit Gaza, quod sit Carduus asinis in cibo gratissimus, &

Nomina

Lib. 6. hist.

cap. 3.

Li. 21. c. 16.

Buxum asininum

summopere expetitus: quanquam non desint, qui non per *υ*, sed per *η*, *ὄνυξον* legendum esse putent, quod ad eum pascendum asinus perpetuò defigatur & hæreat: qua ratione & *Dipsacum* *ὄνον γιδιον*, idè nuncupant, quod ad eum asinus magna alacritate feratur cum senserit, quasi asini corculum. Cum verò asinos ubiq; obseruauerimus ad quosdam Carduos libentiùs accurrere, iis libentiùs, & maiori cum voluptate vesci, ab iisdem magis allici, merito *ὄνυξος* nominauerimus, atque imprimis eum qui nascitur passim secus vias, in agrorum limitibus, scrobium marginibus, siluarum aditu, & ubique ferè in campis obuius:

Forma.

## ONOPYXVS, Dodon.



radice longa, nigra, valde fibrata: caule bipedali, rotundo, ramoso: foliis Acanthio vulgari similibus, sed læuibus, nec lanuginosis, minoribus, nigrioribus, aculeatis: capitulis in summo caule spinosis, rotundis, atrociter pungentibus: quæ cum dehiscunt, purpureum florem Iulio & Augusto promunt, coloris venustate insignem: semen reliquis Carduorum generibus par. Notior est iste Carduus asinorum pabulo, quàm viribus, Dodonæo Cardui siluestris nomine descriptus, & depictus. Est & *ὄνυξος* alter, non in agris tantum, sed in pratis etiam frequens, radice nigra, pedali: caule tres quatuorve pedes alto, vel nudo, vel paucis ramulis vestito, tereti: foliis superioris, minoribus, angustiorib⁹, vndique hamatis: capitulis initio rotundis, deinde oblongis, parum aculeatis: flore purpureo. Tertius quoque *ὄνυξος* dicitur, qui in macris





& sabulosis agris nascitur radice crassa, nigricante: caulibus multis, cubitalibus, rotundis, rigidissimo spinarum vallo armatis, hinc inde in ramos diuisis: foliis longis, nigricantibus, in ambitu profundè laciniatis, atrociter pungentibus: echinis in caulium vertice horridis, florem egregiè rubentem explicantibus, deinde semen longum, exile, Cnico proximum.

ONOPORDON.

ONOPORDON,

CAP. XIX.

Li. 27. c. 12.



Forma.

**P**LINIVS Onopordon memorat his verbis. Onopordon si comederint asini, crepirus reddere dicuntur. Id Cardui genus Onopordon rectè dici posse Dalechampius putat, quod Parisienses seruata Græci nominis significatione *Pet d'asne*, vulgò vocant, aiuntque, & affirmant asinos eo gustato subsultare, crebròque pedere. In locis cultis & pinguibus pecudum morfù non violatum, ad hominis proceritatem crescit, duos ferè tréve caules proferens, angulosos, lanuginosos, medulla candida farctos: radicem pedalem, crassam, nigram, fibris paucis capillatam, gustu amaram: folia, quæ ramorum loco sunt, longitudine



longitudinem æquant supra radicem, prope verticem breviora, in foliola diuisa, oblonga, olæa similia, ad exortum & in cacumine spinosa, gustu subamaro & subaustero: capitula è foliorum sinu prodeunt suo pediculo surrecta, rotunda, antequàm florescant albo tomento lanuginosa, spinulis multis armata, extra lanuginem sese exerentibus, rubris: flos ex rubro purpurascit: semen est oblongum, vt in alijs Carduis.

## POLYACANTHOS, Theophrasti. CAP. XX.



**P**OLYAKANTHON quoque in spinosis stirpibus Theophrastus & Plinius recensuerunt. Theodorus Aculeosam Latine dixit. Sic autem nominatus est hic Carduus à spinarum infinito ferè numero, quod nullū sit Cardui genus pluribus, magisque confertis aculeis contextum & armatum. Gignitur ferè in pratis & madidis locis, radice tenuissimis fibris capillata; & quam fibras multas potius esse dicas quam radicem: caule tres aut quatuor pedes alto, recto, non valde ramoso, vndique spinis rigente: folijs Onopyxi secundi, angustioribus, & magis aculeatis: capitulis etiam minoribus: flore purpureo: semine minuto & candido. Dodonæus Cardui siluestris tertium genus facit.

Nomina

Lib. 6. hist.

cap. 3.

Lib. 21. c. 16.

Locus.

Forma.

Lib. 4. c. 72.

## MYACANTHOS. CAP. XXI.

**P**LINIVS Corrudā siue siluestre Asparagum à Græcis Myacanthum; Dioscorides Asparagum petreum Myacanthā, Galenus eundem Asparagum Myacan-

Lib. 19. c. 8.

Lib. 2. c. 118.

Lib. 6. sim.

thium vocari scripsere. Myacantham autem quidam dici volunt, quod in carnariis suspensa carnes à murium iniuria tueretur, quia propter eius aculeos mures irrepere non audeant. Alij quod sub cauis radicum huc illuc vagantium mures occultantur, easque alius cibi penuria arrodunt. Alij quod mures occidat, vt & canes. Sed ab hac Myacantho plurimum discrepat ea cuius meminit Theophrastus, & quā Gaza spinā murilem interpretatus est. Nam cum Corruda tota spina sit, spinasque pro folijs gerat, vt & Scorpius siue nepa, in iis numerat Myacanthon, quā, vt Ononis, folijs exarmatis innoxia, aculeis præter foliorū comam rigent. Quod cum in hac spinosa planta nos spectemus, quam Officina Calcitrapam, alij Stellariam, quidam Carduum stellatum, Cordus Polyacantham, Galli *Chausse-trappe*, Germani *Vruallen-distel* nuncupant, vt in Leucacantha dictum, eam Theophrasti Myacanthon esse non sine ratione arbitratus est Dalechampius. Profilit in pratis & locis incultis, sepiusque villarum & rudera obsidet: radice longa, foris nigricante, intus candida, carnosa, subdulci, folijs hirsutis, profundè laciniatis: caule bipedali, ramoso: capitulis multis, quàm in alijs Carduis minoribus, stellæ modo in complures aculeos siue radorum cuspides fisis, principio ex viridi rubentibus, postea albicantibus: ea cum patefuerint, purpureus flos emicat, deinde semen paruum, nigrum, rotundum, carum vino tritum potumque vrinam prouocare, & lapides exterere tradit. Adiciunt alij radicem eiusdem quotidie manè sumptam fistulis, in quacumque corporis parte sint, prodesse, & arcere pestis contagia. Huius generis est planta, quam

Lib. 6. hist.

cap. 4.

Lib. 6. hist.

cap. 3.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.

Lib. 4. c. 72.



Iacea nomine depinxit Clusius: nam radiatis & aculeatis capitibus, foliis, floribus & semine cum superiore conuenit: sed omnia longè maiora hæc habet: capitula quoque Cnicum siluestrem superant. Semen item & flos non dissimilia, quo marcescente è medio centro veluti gummi quoddam flori permixtum protuberat, vel-

MYACANTHOS,

Theophr.



IACEA LVTEA,

Clusij.



miculorum modo conuolutum, aut veluti Officinarium Tragacantha, rufi coloris vnde Tragacanthi nominis occasio Salmanticensibus, apud quos in vinetis, agrorumque marginibus frequens oritur. Est & huic cum Leucachanta nostra, seu Spina solstitiali suprâ descripta, magna affinitas, vt eadem videri possit.

LEUCOGRAPHIS.

CAP. XXII.

Lib. 27. c. 11.

Aesculap. lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Vnde in lib. 27. c. 11.

Nomina.

Lib. 4. c. 63.

Cap. 16.

histo.

Locus.

Forma.

**L**EVCOGRAPHIDOS meminit Plinius his verbis. Leucographis quævis esset, scriptum non reperi: quod eo magis miror, quoniam vultis proditur sanguinem excreantibus, tribus obolis cum croco: item corioli trita ex aqua & apposita: profluuiis fœminarum, oculorum quorundam medicamentis, & explendis vlcibus, quæ fiunt in teneris partibus corporis. Hanc si non facies, quam nec descripsit, nec ab aliis descriptam reperit Plinius, saltem vires Dalechamptio occasionem dedere coniiciendi esse Carduum Martem vulgò dictum, Germanicè *Mariendistel*, & *Frauwendistel*, Gallicè *Chardon nœstri damois*. Dodonæus Spinam albam, & Arabum *Bedeguar* esse credit. Fuchsius Spinam albam hortensem. Hunc Carduum prope olera in hortis, & in neglectis locis, præsertim si pinguis & latus ager fuerit, sponte nasci videmus, siticulosum Diplaci modo: nam inter caulem & foliorum sursum tendentium concauos sinus aqua colligitur. Radice est crassa, longa, candida, facultate sicca & astringente: caule procero, terete, siticulosulo, spinoso, digiti crassitudine: foliis latis, amplis, albicanibus, notis maculisque lacteis distinctis & aspersis, multis & acutissimis spinulis horridis, in ambitu pungentibus.



LEUCOGRAPHIS *Plinij*,  
*Carduus Maria.*

pungentibus: capitulis in summo caulium ramorumque globosis, squamis muricatis rigentibus, asperrimis, in orbem rotæ instar spiculis prælongis munitis: flore purpureo: semine Cnico simili, longo, lævi, gustu dulci, nucis iuglandis ferè sapore, nigriore, lanugine tenera & candida obuoluto. Floret Iunio & Iulio mensibus, hiemèque moritur. Ea præstat quæ ex Plinio supra recitauimus. Præterea aqua è foliis destillata caliditati hepatis, & animi deliquiis in linteolis extrinsecus adnota opitulatur. Lateris morbo succurrit, pellilenti veneno, & multis aliis partium internarum morbis: efficaciusque id præstat addita seminis drachma dimidia.

Tempus.

Vires.

## CROCODILIVM. CAP. XXIII.



POKOΔEΪAION Græcè, si- *Nomina*  
militer Crocodilium Latine, cuius  
nomenclatura ratio à nullo dum,  
quod sciam, explicata est, neq; de-  
scriptio tam aperta, ut à tot aculeatis plantis fa-

Lib. 3. c. 10.

Forma.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 3. c. 14.

cile sit genuinum Crocodiliū distinguere & internoscere: quæ descriptio à Dioscoride tradita est his verbis. Crocodilium simile est nigro Chamæleoni: nascitur in locis siluosis, radicem habens longam, leuem, aliquantum latam, odore acri veluti nasturtium. Radix feruefacta in aqua & pota sanguinem copiosum per nares pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen urinam ciedi vim habet, & rotundum, & duplum veluti scutum. Quæ Plinius sic videtur reddidisse. Crocodilium Chamæleontis herba nigra figuram habet: radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Nascitur in sabuletis. Pota sanguinem per nares pellit copiosum crassumq; atque ita lienem cōsumere dicitur. In quibus Plinius legisse videtur ἐν τοῖς ἀμυδάσει, id est, in sabuletis, pro ἐν τοῖς ἀμυδάσει, id est, siluosis, ut habet Dioscorides: dein de pro ὁ πλάττειν aliquantum latam, ὁ πλάττειν, siue ὁμαλῶς παχέαν, id est, æqualiter latam, siue æqualiter crassam, Oribasius subcrassam legit. Quem verò ὁ σπινθὶς ἀμυδάσει, Plinius suo more odorem asperum dixit. Oribasius radicem acrem, odoratamque nasturtio similem. Quod verò ad semen attinet rotundum, duplicis scuti figura, id à Plinio omisum est, & ab Oribasio, qui integras historias ex Dioscoride exscribere consuevit. Præterea id à Dioscoride præter more additum fuisse videtur, absoluta scilicet historia & viribus explicatis, atque falso huic plantæ attributum, cum ἀμυδάσει ferè omnia semē edant Cnico simile. Quare adiectitia hæc viri docti censent, & ex Tordylj historia, cuius semini figuram hanc Dioscorides assignat, huc à sciolo quodam nominum vicinitate decepto ascita fuisse. His adde, quod in Crateuæ fragmentis desunt verba illa, προσεμπερὲς ὄν, καὶ διπλοῦν ὡς ἀσπίς, id est, rotundum, & duplum veluti scutum. Quantum verò ex satis obscura delineatione colligi potest, cum præcipua Crocodilij nota ducatur ex similitudine Chamæleonis nigri, & altera Carlina, quæ in caulem attollitur, nigro Chamæleoni tam affinis sit, ut Matthiolus, & plerique alij Chamæleonem nigrum esse contenderint, Carlina illam Crocodilium esse non sine ratione Dalechampius indicauit. Etenim in siluosis sabulosissq; provenit: foliorum specie, & subrubro colore nigrum Chamæleonem

Κροκοδείλιον ὡς  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ  
ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ



maëleonem imitatur: radice est longa, leui, non solida, sed exesa, non nihil lata, odoris vehementis & acris, ad nasturtium accedentis: semen Cnico simile, cinereum. quod enim de semine Crocodilij legitur in Dioscoride, falsum esse ac supposititium diximus. Sanguinem quidem per nares potu eliciendi vim nullus in Carlina agnouit, quæ si Crocodilio inest, tanquam insignis & eximia magnificianda est, verum optanda potius quàm asserenda videtur. Nam in Dioscoride scribitur, ἡρίζα ζεοδράζεν ἐν ὑδατί, ἡγὺς τῶνομένη: pro τῶνομένη legunt quidam ἐπισπώμενη, id est, si per nares attrahatur, quemadmodum de Ocimo scripsit Dioscorides, ποτὶ δὲ καὶ τῶν ὀσφύων παλινστῶν ἐπισπώμενον διὰ δσφρήσεως, id est, sternutationes multas excitat si per nares olfactu attrahatur. Alias Crocodilio vires assignarunt Galenus, & eum secuti Paulus & Aëtius, quas omnes de Tordyllo tradidit Dioscorides, vt hoc magno sit argumento confusam fuisse vtriusque historiam. Maranthæ & Anguillæræ Chamæleon, inquit Pena, videtur aut verum esse Crocodilium, aut certe genuini opinionem sustinere posse, vsque dum doctis magis accurata descriptio, aut planta Crocodilio aptior occurret. Adeo enim ad descriptionem accedit, vt illis nigrum esse Chamæleonem persuaferit. Hunc capite de Chamæleone pinximus. Aliud Cardui

CROCODILIVM, Carlina  
caulem habens.



CROCODILIVM Mons-  
liensium, Dalech.



genus Crocodilium Monspelienfes vocant, in aridis & apricis profiliens, radice palmum longa, nigricante, gustu amara: caulibus ferè duobus aut tribus, cubitalibus, angulosis, lanuginosis, ramosis: foliis auersa parte candida lanugine pubescentibus, aduersa in viridi pallidis, multis, aculeatis, Carlinæ similibus: capitulis multis, pilæ modo rotundis & globosis, pungentibus, aspectu cinereis, flore copioso, purpureo Hyacinthi modo, subamaro, semine longo, nigricante. Quidam Silybum esse volunt, quidam Galedragon. Lobellius Crocodilium Fuchij & Cordi pinxis, plantam quam Dodonæus Spinam peregrinam vocat, Tragus perperam Chamæleonem verum, inquit Lobellius, cuius effigiem supra posuimus.

TRAGP.M



## TRAGVM, Matthioli. CAP. XXIIII.



RAGIVM & Scorpionum de multis & diuersis plantis dici iam monuimus. Aculeatum verò stirpem hinc depictam Matthiolus legitimum Dioscoridis Tragum, siue Scorpionum, siue Traganon esse credit: item Plinij Tragum, & eiusdem atq; Theophrasti Scorpionum. At alio in loco Tragum alium genuinum Dioscoridis ostendimus, qui à Scorpio Theophrasti, quem Nepam vertit Gaza, longè alius sit: præterea Matthiolum citatis duobus Plinij locis de Trago & Scorpio, Tragum Dioscoridis cum Scorpio Theophrasti perperam confudisse. Quod verò Tragus Matthioli à Trago Dioscoridis plurimum distineat, descriptio ipsa perspicue declarat. Tragus, inquit Dioscorid. nascitur ma-

Lib. de ma  
rit. cap. 22.

Vide Phytog. pag. 56.

Lib. 4. c. 46

## TRAGVS, Matth.



ximè iuxta mare: frutex paruus, per terram, oblongus, non magnus, palmi altitudine, aut maior: folia non habet, verum ramis adhærent velut acini parui, rufi, magnitudine tritici, cacumine acuti, multi, gustu valde adstringentes. At hic Tragus Matthioli, succulenta est planta, non frutex, ut dilucidè demonstrat Pena. nullos acinos habet rufos, tritico pares, & supernè acutos, numerosos, magnopere adstringentes: foliis non caret, carnosâ enim habet, spinis horrida, alstrictionem penitus nullam. Quare fuerit ille illegitimus Matthioli Tragus, eodem Pena auctore, Crithmi salicornij, seu kali cõgener, propius ad eam speciem spinosam accedens, quam Pastinacâ marinâ, aut Secacul, aut alterum Crithmum faciunt, pedem aut cubitum altam, intortis, crassis, densis ramulis diuisam, & adeo horridam, armatamq; foliis pungentibus, Aizoi colore & figura, carnosâ, crassioribus, numerosis in imo, in summo muricatis, cuiusmodi in Tribulo terrestri & aquatico, ut impune effringere surculum nequeas. Hisce ad imam basim intesummo exilis, lignosâ, kali & herbaceo prorsus gustu, succoque multo glutinoso pregnans, minimè adstringente, salso, & nullius alioqui excellentis facultatis. Hæc Pena. Lobellius Tragum hunc Matthioli paulò aliter expressit quàm Matthiolus. Illius picturam posuimus in libro de maritimis.

In Aduers.

## TRAGACANTHA. CAP. XXV.



TRAGACANTHA Græcè, Latine similiter Tragacantha, & Hirci spina, Arabicè Chitira, Itica, Chatheth, Gallicè Espine de bouc, in Galloprovincia, potissimum circum Massiliam, Barberenard, & Ramebouc, id est, Barba vulpina, & Surculus hircinus. Gummi ex ea manans τρυγδα-  
mi quoque Græcè nominatur, Latine Tragacanthæ lacryma, in Officinis gummi dragaganti. Tragacanthæ spinarum barbule nomen dederunt. Radix est lara, & lignosâ, inquit Dioscorides, supra terram etiam apparet, à qua surculi humiles, robusti, plurimè sese diffundentes, in quibus foliola sunt multa, tenuia, quæ spinas alios, robustas, rectas inter se occultant. Eius iconem sic expressit Matthiolus. Est etiam

Nomina

Forma  
Lib. 3. c. 20.



Lib. 13. c. 21.

Lib. 9. hist.  
cap. 15.

γαγκάνθα πολλή, καὶ ὅθεν χεῖρων, ὡς οἰοῖται τῆς κριτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ὀφει καλλίων. Id est, Tragacantha in Arcadia copiosa, & nihilo deterior, ut arbitrantur, Cretica, sed & aspectu pulchrior. Sed hæc non solum in Media & Creta, sed etiam in Gallia: provincia plurima fructuat, prope pomeria Massilia, ut asserit Pena, in marinis collibus ad Austrum spectantibus aliisq; finitimis locis passim multa. Frutex humilis, densus, totus candicat, vno cespite copia multa aggestus, radice alba, longa, lignosa, digiti crassitie, prolixis & flexilibus fibris subter humum mersa: caulis, cum maxime procerus, cubitalis, ex quo spicula foliata vtrinque quasi pinnis oriuntur, quæ ima & vetustiora nihil aliud quam veprem ostendant: superiora pallentia perpetuò sunt. Is caulis ab vna radice multiplex, solidus, lignosus, cãdidus, quem vestimenta spinæ foliata spinis rigidissimis. In summo inter spinosa folia & spinas stipantur multi flosculi inuicem collecti, genistellæ similes, sed albi. Siliqua etiam numerosa, recta, ciceris aut genistellæ spinosæ modo, sed multò minor & cãdida, in qua semina exilia, albicantia includuntur, sinapi magnitudine, angulosa. Hæc Pena. Ei simillima

TRAGACANTHA Altera,  
sive Poterium, Clusij.



est planta, inquit Clusius, fruticosa admodum, multos habens pedales ramulos flexibiles, hinc circumquaque sese diffundentes, candicantes, & dum adhuc tenelli sunt lanuginosos, multis longis candicantibus spinis horrentes: foliorum plurimæ simul iunctæ alæ lenticulæ aut Tragacanthæ proximæ, exiguæ, candidæ, lanuginosæ primo vèrè per interualla exeunt, sapore dulci foliis hieme decidentibus, nerui medijs, quibus folia inherebant, in spinas rigidas & acutas erigunt, ut eo tempore tota planta sine foliis conspiciatur, contra quàm in Tragacantha, quæ hieme etiã folia virètia retinet: radix lenta, longa, multos ramos diuisa, nigro cortice obducta, materie intus cãdida fungosâq; & dulci, cor ipsum gummosum quiddã & subdulce refert. Neq; ferentem, neq; fructum ferentẽ vidit ille, sed sub ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut Hypocotylis ferẽ inuenit, inanes, quos ab hac planta excidisse, & florem ex similibus proinde incolæ referebant, album, non magnum. De semine nihil certi intellexit. Nascitur plurima circa Guadix & la Venda el peral, in collibus aridis



CARD. ET ALIARVM SPINOSARVM, LIB. XIII. 1479

bus arido & inutuli solo. Cum adeo sic Tragacantha similis, facile sibi persuaserit Clusius esse Poterium legitimum Dioscoridis. Hæc Clusius. Tragacantha, vt tradit Dioscorides, vinum habet, meatus obducendi gummi similem. Vfus eius est ad medicamenta ocularia, ad tussis, ad arteriarum asperitates, vocem interceptam, & destillationes in eclegmate cum melle. Subdita quoque lingua liquefit, sed & macerata in passo bibitur drachma pondere contra renum dolorem, & vesicæ rosiones admixto cornu ceruino vsto, & loto, aut modico alumine scisso. Galenus breuiter de Tragacantha scribit, similem gummi vim habere emplasticam quandam, quæ acrimoniam obtundat, & similiter desiccare. Tragacantha lacryma, inquit Matthiolus, collyriis addita non solum humorum acrimoniam in oculos defluentium retundit, sed oculos quoque roborat, & magis adstringit quàm sarcocolla. Præterea lacte macerata & illita, oculorum vngues, palpebrarum pustulas, pruritus, & scabiem sanat. Valet ad pulmonum, pectoris, asperæ arteriæ morbos, & medetur eorum vlceribus, ad defluxiones omnes in fauces, guttur, pectus permeantes, & tussim excitantes. Datur vtiliter vlceratis renibus: auxiliatur quoque dysentericis tosta, & ex cydoniorum vino pota, tum clysmate infusa. Denique vbi laugare, obtundere, ac reprimere opus est, præstantissimum fuerit medicamentum.

Pres.  
Lib. 3. C. 20.

Lib. 8. sim.

In cap. 21.  
lib. 3.

DRYPIS, CAP. XXVI.

**ΠΥΝΙΣ**, Cardui species, à veteribus dicta fuit ἀπὸ τοῦ Ἀπὸν ἔχειν, id est, suis attritantes & colligere volentes vulneret. Huius semel tantum, quod scia, solus Theophrastus meminit, scribens Acornam, Drypida, Acanum spinosis esse foliis, nihilque præterea. Quare cum huius historia à nullo veterum tradita sit, Carduum istum in satis & segetibus frequentem, diris aculeis rigentem, Drypida quidam nominant. In aruis inter fruges quasi earum vitium, & auenam præcipuè, Carduus hic nascitur, interdum viri proceritate, interdum humilior, alba radice, & crassa: foliis caules ambientibus muricatis, dissectis & incisis: capitulis vt in Scolymo echinatis: flore aliàs purpureo, aliàs candicante, aliàs puniceo: semine oblongo, leui, paruo, rufescente. Agriculis & melloribus plerumque impedimento est. Nullus huius vsus in medicina ab herbariis traditus est, quanquam ob calidam siccamque huius naturam ad secundum vsque gradum varias vtilitates quisque meditari & excogitare possit. Hoc Carduo tenero asini vt Onopyxos, libentissimè vescuntur priusquam obduerit, & in caulem assurrexerit. surculos rustici effodiunt, & iumentis suisque pro cibo & pabulo obiciunt. Anguillare Drypis, à superiore diuersa, in Maris haud procul à mari nascitur, radicibus sub terra huc illuc serpentibus, graminis instar, exilibus: tenuibus ramulis, geniculatis, cubitalibus: foliis aculeatis, lunihero similibus: umbella in summis caulibus: flore candido: semine, priusquam cortex adimatur, orizæ

Nomina

Lib. 1. hist.  
cap. 16.

Forma:

DRYPIS.



KKK





*Acanos. dicitur de  
aest. aet. mure  
dixit id est  
aculeata spinis et  
de it id est aculeis  
mala excludunt  
et dicitur  
dicitur de spinis  
et dicitur de spinis  
Agrostis sylvestris  
spinis*

ribusque spinis. Guilandino Tragus Matthioli. Est & alia Drypis, seu Cardui syl-  
vestris species, quam Gaza Aculeosam, Ruellius Agriachantam, Lonicerus Car-  
duum sylvestre, seu Scolymum his verbis: Præterea sylvestris est quædam Cardui  
species in agris passim impedimentum, cuius meminit Vergilius, Carduus & spinis  
furgit Paliurus acutis: Latini Scolymus, seu Carduus sylvestris, poterit appellari.  
Nascitur in arvis maximè auenaceis bicubitali altitudine, sæpe maior, aut etiã mi-  
nor: foliis aculeatis, incis, capitulis aculeatis: flore in quibusdam purpureo, in qui-  
busdam albo, in quibusdam puniceo: quandiu tenera asinis gratissima, bobus vero  
non ingrata. calidum est in secundo completo aut tertio incipiente ordine, sicum  
verò in secundo. recens Asparagi modo in oleribus coquitur. Radices ex sale &  
pipere in secundis mensis hyeme eduntur: in cibis decocta vrinam cit copiosam  
feridamque educit. Extrinsecus radix illita graueolentiam alarum totiusque cor-  
poris emendat.

## CHALCEIOS. CAP. XXVII.

*Nomina*  
*Χαλκεος, αἰς*



ΧΑΛΚΕΙΟΣ Theophrasto, & Chalceios Plinio seruario nomine  
Græco, Gaza Aeraria Latine dicta, inter spinosas & acanaceas stirpes  
ab iisdem recensetur. Eius historia quamuis apud Theophrastum villa  
niumve nusquam extet, ac ne nomenclaturæ quidem ratio vlla  
illis tradita sit, si coniecturæ locus est, eam spinam sic vocatam fuisse arbitramur  
quidam quod eius foliis vasa ænea detergerentur, vel quod ærei coloris sit, non  
pe virentis obscurius, intersperso flauescens nitoris paululo, splendentis. Poste-  
rius etymum magis placet, quod peculiare quiddam assignet, cum prius spi-  
nos omnibus propter foliorum asperitatem congruere possit, nisi forte egregia  
quædã detergendi facultas huic insit, ut Struthio. Herbam certè speciosam, raram,  
& elegantem, cuius figuram hinc apposuimus, Chalceion esse suspicantur quidam  
quod



CHALCEIOS.



RUTHRVM, Theophrasti.



quod tamen peritis herbariis disquirendū magis, quā asserendum proponunt. Gignitur in macris & aridis locis: radicibus multis, foris nigricantibus: caule tereti, subatro, quatuor vel quinque pedes alto: foliis magnis, latis, profundius incis, per ambitum pungētibus, parte superna virentibus, sed obscuro, fusco ac tristi colore, qualis in aëre conspicitur, vnde fortasse est illi nomen inditum: inferna verò cinereis & villolis: capitulis rotundis, echinatis: flore in caruleo candicante, qui ex capitulis vndique promitur, & Iunio mense Iuliōve prodit. Folia inter digitos trita odorem validū ac iniucundum vibrant, acriāque gustatu sunt. Hanc igitur plantam Chalceion vocant, quousque certiora de eius natura & specie herbarij compererint. Obseruandum apud Plinium in catalogo spinosarum plantarum pro Chalceo legi Chalceon, quemadmodum pro Ixine Helxinē, Chalcerumq; herbam ab eodem alibi memoratam, plurimum dissidere à Chalceo spinoso Theophrasti. Fuchsius olim Chamæleonem nigrum, sed postea rectius sentiens Spinam peregrinam nuncupauit. Dodonæus in stirpium historia Spinæ peregrinæ nomine pinxit & descripsit: in lib. purgantium Sphærocephalum Carduum primum fecit, quam hīc pro Chalceo exhibemus. Pena Rithrum siue Ruthrum Theophrasti esse opinatur, quæ Spina peregrina fuit Dodonæo, Echinopus seu Carduus Echinatus Gesnero, Sphærocephalus Cordo. Germanis *Uvelschedistel*, Belgis *Roomshedistel*. Theophrastus vno tantum loco Rithri seu Ruthri meminit, quo scilicet stirpiū aculeatarum differentias ex caulium ramorumque numero ac situ inuestigat. sed hīc *ῥιθρος* seu *ῥιθρον* pro *ἐρύριον* mendose legi docuimus capite de Eryngio. Eius tamen iconē, quam Ruthrum vocat, ex Pena hīc apposuimus, & descriptionē. Duplīcis est differentiæ, inquit, & Chamæleonis ritu variat, radice exigua pollicem æquante: folijs Chamæleonis albi, longè minoribus: caule nullo, interdum exiguo, nonnunquam palmum, & alias cubitum alto: folijs semper proportione exiguis, & Spinæ albæ modo profundè incis. Echinus illi caruleus, eximie purpurascens, orbiculatus, spectatu iucundus, & magnitudine quanta sphærule lusoria. Semen & eius glumæ similia sint acerosæ intus & lanuginosæ, vt in Spina alba. Ruthrum esse Theophrasti censet Anguillara, qui tamen proximæ, vt videtur, descriptionis immemor, ean-

Locus.  
Forma.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 26. c. 7.

Cap. 338 hī.

Lib. 4. c. 64.

*Echinus hīc pro Ruthro exhibetur*

Lib. 6 hist. cap. 3.

In Aduers.



dem Spinæ albe notis accommodat, iisdem ferè verbis. Altera, quam Crocodilium Fuchsius putauit, prorsus genere eadem huic est, sed magnitudine multò maior. In silua tamen Valena, quæ Gangem oppidum itur, se collegisse ait caruleam, & hanc excaulem, aliam caule palmum alto præditam, quæ alibi ad duos, ternos, & quaternos cubitos assurgit. Echinus candidus est, non caruleus, & cum maximus est & rotundus magnitudinem mediocris mali Arantij assequitur: semine alterius, sed multò maiore. Cauli ino secundum longitudinem striato adnascuntur permagna folia, Acanthi similia & spinosa. Belgici horti & Britannici

## CARDVVS Sphærocephalus

acutus, Dodonæi.

*Carduus spinosus, huiusmodi  
capitula huiusmodi  
sphaerica, globosa, pile  
regula caput, pile  
carduus huiusmodi caput  
globosus*



hanc spectaculo alunt, vbi luculenta magnitudine Spina peregrina dicitur. Dodonæus descripsit Carduos alios Sphærocephalos. Secundus Sphærocephalus acutus folia superiore minora habet, ac spinosiora: capitula quoque globata, sed è quibus longæ quædam, & duræ eminent spinæ. Tertius primò forma figuræque similis, sed longè minor, & eius foliorum ad caruleum magis accedunt color. Quartus minimus est, foliisque acutissimis ac spinosissimis, capituloque exiguo, cuius folculi vbi primi candicant. Huc referri alius potest, qui tamen capitulo est minùs globato, compressiore videlicet, ac superius latiore, è quo folculi carulei. Tenuis huic caulis exili lanugine candidat: folia oblonga, vtrinque similiter lacinatim diuisa, ad singulos angulos spinis minutissimis. Hunc plerique esse volunt, quem Martialis pro Spina alba proponit. Anguillara proinde diuersam ab his Chalceion memorat his verbis. Ad Chalcei naturam accedere videtur ea, quam in Peloponneso & Zacyntho etiam num appellant Chalcoma. Lignosa & humilis est planta, rubens, aculeata, tenuibusque

nis, folio lentis, minore, in ramulis ordine digesto sicuti in Lente, qui fructum succum fundunt Tithymali modo. Quidam Hippophastron Dioscoridis esse putant.

## TETRALIX, CAP. XXVIII.

## ETPAΛIZ, Nomina

Lib. 6. hist. cap. 3.

Lib. 24. c. 16.

Lib. 24. c. 9.

Lib. 24. c. 16.

Lib. 24. c. 9.

Lib. 6. hist. cap. 3.



ETPAΛIZ à Theophrasto cum reliquis aculeatis plantis Acanthi, Leucacantha, Cnico, Chalceio, Polyacantho, Atractylide, Onopordio, Ixine, Chamæleonte numeratur: item à Plinio cum imitatio, quæ tamen alibi Ericam Atheniensibus Tetralicem appellari, in Eusebio Sifaram auctor est. Ex quibus colligere licet Tetralicem spinosam ab Ericam diuersam esse: quia Ericam spinis armatam esse nullus vnquam herbariorum prouidit, id quod etiam perspicuum est ex Dioscoride & Plinio de Erica tractantibus. Deinde Tetralicem Ericam post primos Autumnii imbres florere, nempe ad Idus Septembres, & Calendas Octobres idem Plinius testatur. Alio vero in loco Tetralicem & Ixinem florere tradit æstate: quanquam Theophrastus, ex quo hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate, sed germinare.

*hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate, sed germinare*







ACARNA, *Carlina silue-*  
*stris minor, Clusij.*



floret, eaque perpauca, lenticulæ similia, quæ cum breui decidant, tota planta maxima ex parte sine foliis spectatur, & multiplici spinarum vallo erinaceum

vna radice cubitalibus, floribus Bupthalmi similibus, sed oculi formam stamina in medio nascentia perturbant. Huc referendæ spinosæ duæ plantæ à Lobellio depictæ, Prior est Acarna Theophrasti Anguillaræ, flauentibus aculeis horrida: virentibus sinuatis foliis, auersa parte tomento incanis, vti tota planta: plures fundit sesquicubitales caules: flores luteolos: semen Cnici, sed minus in squamoso & spinis horrido capitulo. Hanc Valerandus Doureus Iustinopoli Illyrij rediens Venerias detulit, sicut & sequentem eiusdem Valerandi Acarnam, foliis longioribus, spinis horridis caulem pinnatim secundum longitudinem ambientibus, quasiq; pennis telo affixis. Incana lanugine tota pubet. Caulis dodrantalis, interdum cubitalis: flores Cardui benedicti, confertim stipati minores, & Senecionis maiores: semen Cnici minus. Huc etiam Clusij planta noua, & sanè perelegans adducenda, quæ dodrantalis est, in orbem per terram diffusa, spinis multis virentibus aculeis horrida: flores Pisi ex caruleo purpurascens, minores, caliculis concluduntur hispitis & villosis & ferè incanis, bini aut terni semper coniuncti: foliola interdum, sed rarò, producit dum

ACARNA Theophrasti,  
*Anguillaræ, Lobel.*



ACARNA Valerandi  
*altera.*









mirè prodest. Debent accommodatæ esse equorum naturæ, neque ex alia causa nomen accepisse. Quippe quædam animalium remediis nascuntur, locupleti diuinitate ad generanda præsidia, vt non sit mirari satis ingenium eius disponen-  
 tis auxilia in genera, in causas, in tempora, vt aliis proſit, atque aliis horis, diſſeque  
 nullus propè ſine præſidio reperiatur. Et alio in loco. Hippophæſtum naſcitur in  
 ſpinis, ex quibus fiunt aeneæ fulloniæ, ſine cauliculo, ſine flore, capitulis tantum  
 inanibus, & foliis paruis, multis, herbacei coloris, radículas habens albas, molles.  
 Hoc loco Hippophæſtum ſcriptum eſt in Plinij exemplaribus, & ita habet  
 etiam Paulus ſub litera v. Quod verò dixit, ex quibus fiunt aeneæ fulloniæ, cor-  
 ruptum eſt: quæ enim eſſe poſſunt aeneæ fulloniæ? Quidam hîc legunt, peſtines  
 fullonij: alij, venæ fulloniæ, &c. Quidam, Hippophæſton ſpina in maritimis na-  
 ſcitur: hac implentur cortinæ fulloniæ, &c. auctore Hermolao, quemadmodum &  
 lib. 24. Vulgaris quoque hæc ſpina, ex qua cortinæ fulloniæ implentur. Corna-  
 rius legendum putat, ex quibus fiunt pilæ fulloniæ. Theophrastus Hippophæſ inter  
 τὰ ἀναγκαῖα ἔχοντα φύλλον recenſet, id eſt, quæ iuxta folium ſpinas habent.  
 Et paulò poſt ait eſſe ἀναγκαῖον τοῖς φύλλοις, μονόριζον δὲ καὶ ἐπίγρυν, καὶ χαμαίφρων,  
 id eſt, folia ſine ſpinis habere, vnica niti radice, & deiectis in terram caulis. Hæ  
 delineationes quanquam perſpicuè ſatis & ſcitè Hippophæſ fulloniam plantam

HIPPOPHÆSTVM  
 quorundam, Dalech.

Pen. in  
 Aduerſ.

Li. de ma-  
 rit. ca. 1.



Li. 4. c. 356.  
 Vires.

planta miſſa eſt, nulla adiuncta mittentis hiſtoria. Hippophæſ, auctore Dioſcori-  
 de, ſuccum ex radice emittit, qui ſyncerus pituitoſa, bilioſa, aquoſa; oboli  
 pond. re deorſum purgat, erui farina exceptus quatuor obolorum pondere cum  
 aqua mulſa. Sed & ipſe frutex cum radicibus tunditur, & datur tritus cum aquæ  
 mulſæ ſeſquihemina. Exprimitur etiam ex radice & herba ſuccus, velur è Tha-  
 pſia. Huius drachma vna datur ad purgationes. Ex Hippophæſti folijs, radice, &  
 capite expreſſum ſuccum ſiccato, & pondus trium obolorum cum aqua mulſa cui  
 voles exhibeto: per hunc enim purgatio aquam & pituitam ducit. Priuarim vero  
 conuenit orthopnoicis, comitialibus, & neruorum vitiis hæc purgatio eadem

exprimant, nullis tamen, aut certè paucis her-  
 bariis, etiam diligentiffimis inueſtigatoriſ,  
 adhuc comparuit, niſi fortè Anguillæ huius  
 hiſtoria peritiſſimo, qui ſibi hanc viſam oritur,  
 mat. Sabuloſis Peloponneſi maritimis, ra-  
 inquit, vocaturque vulgò Spina purgatoria, ra-  
 dicibus palmo longioribus, lacteum ſuccum  
 frangendo fundentibus, amariffimum, odore  
 graui. Florem aut fructum tunc non vidit. Ce-  
 tera ſimilia Hippophæſto fuerunt. Tribulus  
 marinus, ſiue Paſtinaca marina, quædam cum  
 Hippophæſ ſimilia habet, ſed alia ita diſſimilia,  
 vt Hippophæſ dici non poſſit: qua de re alibi  
 diximus. Hippophæſtum notius non eſt Hip-  
 pophæſ. Spina hîc depicæ ad Dalechampia  
 Hippophæſti nomine miſſa eſt è Melita inſu-  
 la, de qua nihil aſſerit, ſed lectoribus liberam  
 iudicandi poteſtatem relinquit. Eſt autem Spi-  
 na candida, diſſuſis huc illuc ramulis, aut poris  
 ſpinis, ſparſa: flore exiguo, albo, veluti racema-  
 tim congeſto. An cathartica ſit, an ſuccus la-  
 cteus purgatorius radice, caulibus, folijs expri-  
 matur, aſſeuerare non poſſet, quoniam arida



eadem breuius tradit. Radicis Hippophæsti succus ad detractiones in comitali morbo vtilissimus habetur. Et succus earum (radicum Hippophæsti) exprimitur ætate ad soluendam aluum tribus obolis, maxime in comitialibus morbis, & tremulis, hydropicis, contra vertigines, orthopnœas, paralyseis incipientes. Galenus Hippophæstis & Hippophæstum in simplicium censu omisit. Paulus ea, quæ Dioscorides de utroque tradidit, exscripsit.

## POTERIVM.

## CAP. XXXI.

**P**OTHPION & νέρπας Græcis, Latinis Poterium & Neuras, & Phrynium teste Plinio. Poterium autem, quia potrix herba paludosum rigumq; solum amat, ut scribit Dioscorides: Neuras quod nervis amica sit. Hanc sic depingit Dioscorides. Frutex est magnus, ramos habens longos, molles, lori modo lentos, tenues, Tragacanthæ similes: folia parua, rotunda. Totus autem frutex tenui, lanosa lanugine obductus est, & spinosus (in aliis exemplaribus legitur, ὅλος δὲ ὁ γένος περιεμύς) φλοιὸν λεπτόν, καὶ πολλὰ χνούϊ ἐκείδον. Id est, totus frutex tenui cortice obductus est, & multa lanugine lanosa: flores sunt parui, albi. Fructum ferre gustu odoratum, acrem, & inutilem (sic enim legendus is locus, ut in Aldino exemplari. χαρπὸν δὲ γλυκύφω δίδω, καὶ δέμνυ, &c.) Nascitur in palustribus & collibus. Radices subsunt duum, aut trium cubitorum, robustæ, nervosæ, quæ prope terram recisæ lacrymam emittunt gummi similem. Poterij duobus locis meminit Plinius: priore his verbis. Sunt & ramis venena, rubetis maxime: vidimusque Pyllo in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quam aspidum perniciæ. Auxiliatur eis Phryniō in vino pota. Aliqui Neura appellat, alij Poterium, floribus parvis: radicibus multis, nervosis, bene olentibus. Posteriori verò sic. Poterium, aut ut alij vocant Phrynium, vel Neuras, large fruticat, spinis rectorrida, lanugine spissa: foliis parvis, rotundis: ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus: flore longo, herbacei coloris: seminis nullius usus, sed gustu acuto, & odorato. Inuenitur in aquosis collibus: radices habet duas, aut tres, binum cubitorum in altitudinem, nervosas, candidas, firmas. Circumfoditur Autumno, & præciso frutice dat succum gummi similem. Priore loco Plinius flores paruos dixit, qui ἀνθη μικρὰ legerit: posteriore verò flores longos, eosque herbacei coloris, id est, ἀνθη μικρὰ καὶ χλωρὰ, quum recta lectio sit, ἀνθη μικρὰ, λευκὰ, velut Dioscorides habet. Postremo Plinius pro fructu semen dixit, & δέμνυ acutum pro acri reddidit. Poterium fruticem, quem Dioscorides ramulis & foliis Tragacanthæ aptè confert, genuinum se pinxisse putat Matthiolus. Peculiariter, inquit, supremos ramos habet in vertice extuberantes, & tenui lanugine obductos, quod in Tragacantha non cernitur. Pena hoc Matthioli Poterium nihil aliud quam Tragacanthum esse ait, aut ex eius icone depictum: neque enim spinæ, neque cortex similia, neque in spinis folia, neque multa alia à verò dissidentia. Verum autem & legitimum vidisse se ait in horto Patavino, atque alibi. Sparsum & latè porrectum fruticat multis cauliculis, exilibus, cortice nigricante, ac tenui vestitis, etiam aridis, non rectis uti Tragacanthum, sed vltro citroque flexis, & ordine intortis ut Nepa, & Corrua: sic etiā spinulæ nullo ordine digestæ, sed multò delicatiores quam Tragacanthæ, & minores passim cancellatim & reticulatim implicantur foliis nudæ. Foliola non albida, sed nigricantia, quæ non ex aculeis, sed è caule fibris exilibus, triplo quam Tragacanthæ minoribus, Lenticulæ modo, vel Astragali exeunt: semem pusillum, rubellum, Rhoi simile, & minus. Poterium in Allobrogibus, prope Muram oppidulum Gratianopoli vicinum, in siluosis conuallibus reperitur. Poterij radices contusæ, & in cataplasmate impostæ nervos dissectos & vulnera glutinant. Decoctum quoque ipsarum nervorum affectibus pro

## Nomina

Lib. 3. cap. 15.

## Forma.

πῦλον ὄβο. ποτρίον.

αὐτὸν δὲ ὁ γένος περιεμύς.

ἡ γὰρ πύλην ἔχει ἡ φ.

γὰρ ἐν Πύλῳ ἡ φ.

πύλην ἔχει ἡ φ.

Locus.

Lib. 27. cap. 10.

νέρπας, το, νέρπας.

ἡνὲν ἡνὲν ἡνὲν.

ἡνὲν ἡνὲν ἡνὲν.

Lib. 27. cap. 10.

ἡνὲν ἡνὲν ἡνὲν.

ἡνὲν ἡνὲν ἡνὲν.



POTERIVM, Matthioli.

POTERIVM, Pena &amp; Lobel.

Li. 27. c. 12.  
Vires.

bus prodest. Eadem Plinius tradit. Radix mira vulneribus sanandis traditur, præcipueque nervis, vel præcisis illita. Decoctum quoque eius cum melle potum dissolutiones nervorum, & infirmitates & incisuras iuvat. Quibus suffragitur Galenus scribens. Neuras, quidam Poterium vocant: desiccandi absque

Li. 8. simpl.

CARDVVS Eriocephalus,  
Dodonei.


eius potissimum eiusmodi vim habent: quin & decoctum earum quidam exhibet iis quibus affecti sunt nervi.

CARDVVS ERIOCEPHALVS.

CAP. XXXII.

in  
spior. to lana  
Xapqin caput

Nomen.  
In histor.  
purgant.



CAPITVLO lanoso Carduum hunc Eriocephalum Dodonæus alio nomine destitutus nuncupavit, Lobellius Carduum romentorum Anglicum, Coronam fratrum Herbariorum. Caulibus altis assurgit, crasis: folia eius laciniosa, magna, spinosa, prona parte candidiora: capitula rotunda, multa, tenui, candida mollique lanugine vestiuntur, eminentibus vndique aculeis exiguis, pungentibus, superius vero stamineis purpureis floribus. Semen oblongius, splendens ut multis Carduis. Aliunde in Belgium translatus fuisse auctor est Dodonæus: Lobellius Arthesie & Nervienis agri collibus passim, non secus ac in Angliæ Sommerfeti præfectura, obuium esse.

CEANO





HEOPHRASTVS cum dixisset gramen e geniculis oriri, quod eius radices geniculatae essent, atque e singulis germen sursum, radicem subtus erumpere, subiicit, ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἀχνοθα κεάνωθος: ἀλλ' ἔτι χαλμώδης, ὅδε γὰρ αἰὶν ἡ βίσα τοῦ αἵματος. Id est, Similiter & spina, quae Ceanothus appellatur, germinat. Verum huius radix, neque arundinacea, neque geniculata. Hanc Ceanothon Anguillara opinatur esse, quae in agro Patauino vbiuis nascitur: radicibus sub terra procul huc illuc serpentibus: folio Sonchi, magis spinoso: caule striato: multis in eius vertice capitulis, aculeatis: flore purpureo, in pappos abeunte: semine Cnici, paruulo. Vulgus *Astone* vocat. Acanus vero quamuis priuati speciem nullam Cardui significet, sed spinosarum omnium echinatum caput, missum tamen e Creta fuisse asserit Anguillara spinosae plantae semen, Acani titulo, quod cum herbam edidisset, humi sparsa eius fuerunt in orbem folia, minus longa quam lata, obscure virentia, sed neruis per ea discurrentibus candidis: ex quorum medio caulis exit, in ramos exiles diuisus fere tres, & nonnunquam plures, in vertice tribus foliis cinctos, e quorum medio prodit echinus pusillus, Caeto similis, floris rubri, semine Cnici coloris cineritij. Harum plantarum quamuis figurae desint, interea dum opera dabitur alicunde ut ad nos mitentur, historias ex Anguillara addendas hic putauimus.

CARDVVS FEROX, Lobell.

CAP. XXXIII.




CARDVVM hunc totius acanacei generis facile Phoenicem, Leonem & ferocem dixerent recentiores, Itali *Cardo fiero*, *Leone ditto*, a spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud e foliis altius diuisis, & capitulorum exordii, quam spicula & vepres vnciam & sesquunciam longas videas: cauliculus vix palmum aequat. Flos Cnici siluestris, pallidus, spinis & aculeis saeuientibus horridisque cinctus. Plantae rarae, & vix notae nullus vsus. Aiunt in quibusdam collibus Italiae, ab Apenninis non ita disitis, magna copia prouenire. Hac Lobellius.

HISTOR

Handwritten notes in Greek and Latin script, likely a commentary or translation of the main text, written in a cursive hand.









# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS  
QVINTVS.

*In quo describuntur & ad viuum depinguntur Plantæ bulbosæ,  
carnosæ radicibus, & geniculatæ.*

LILIA. CAP. I.



X DIFFERENTIIS à plantarum partibus sumptis  
tum multæ, tum rei herbariæ studiosis maximè co-  
gnitu necessariæ sunt, quæ à radicum diuersitate pe-  
tuntur, quas diligenter Theophrastus explicauit. Nam  
vt arborum radices omittamus, in oleraceo genere  
aliæ sunt lignosæ, inquit, vt Ocimi (legendum enim  
Εἰσι μὲν γὰρ αἱ ἑυλαδῆς, vt legit Gaza, pro λευκαδῆς) alię  
carnosæ, vt Betæ, & multò magis Ari, Asphodeli, Cro-  
ci: aliæ ex carne & cortice cōstant, vt Raphani & Ra-  
pi: aliæ sunt geniculatæ vt Arūdinum & Graminum:

Lib. 1. ca. 9.  
& 10.

aliæ ex tunicis multiplicibus & corticibus cōponuntur, vt Scillæ, Bulbi, & Cepa-  
rum. De quibus omnibus hīc non agimus, sed de bulbosis: quo nomine tum eas  
intelligimus, quæ ex multis capitulis coherentibus coagmetatæ sunt, vnde etiam  
capitata appellantur, quæ capitula, bulbi, & nuclei, & spicæ Latinis dicuntur, sicut  
Græcis Gelges, Aglithes, & Aglidia grana, sicuti in Allio, tum eas quæ rotundæ  
suis membranis tunicantur, quæ radices etiam Bulbi nominantur, quales sunt Li-  
lij & Narcissi. Tum de carnosis hoc libro dicemus, & de geniculatis, id est, iis quæ  
nodis quibuldam interstinctæ protuberant, rotundæ & leuiter capitatæ. Ac pri-  
mum de iis quæ etiam vulgò notæ sunt, quale est quod λεῖον Græcis dicitur, &  
λεῖον & λεῖον, & λεῖον, Latinis Lilium & Iunonis rosā, Lilium album  
Officinis, Mauritanis *Susen*, Gallis *Lys*, Germanis *Vveisz Gilgen*, & *Lilgen*, Italis  
*Giglio*, λεῖον tamen, id est, blandum, suaue, ac concupitum, nō Lilium duntaxat,  
sed plures alios venustos flores, & bulbaceas herbas significat. Iunonis rosā dici-  
tur, quod veteres Poætæ Græci finxerunt ex Iunonis lacte resperā terra natum Li-  
lum. Nam cum Hercules puer, quem ex Alcmena sustulerat Iuppiter, Iunonis  
dormientis vberibus admotus esset, & lacte se repleset, post factū digressus mam-  
ma lacte copioso profluxit. Quod in cælo perfusum est, lacteā effecit viam: quod  
humani sparsum, Lilium lacteo flore nitens creauit, vnde Iunonis rosā dictum. Lilij  
genera sunt album & rubrum, testibus Dioscoride & Plinio, quæ sponte non arte  
oriuntur, etiam si colores Lilio candido mangonio quæsitos fuisse Plinius asse-

Nomina

*Vide Phlegon. pag. 109*

Genera.

LLL



## LILIVM album, Matth.

Forma.

Lib. 21. c. 5.



ueret. Lilium album folia fert longa, lata, car-  
nosa, pallido vi ore nitentia, secundum longi-  
tudinem striata: ex horum medio caulem rectu,  
rotundum, cubitalem, & maiorem, foliis multo  
minoribus vestitum, in cuius summitate flores  
Croci, maiores, eximij candoris, odorati, senis  
vt plurimum foliis ordine dispositis constant,  
longiusculis, angustis, calathi vel nolæ effigiem  
exprimentibus, repandis, è quorum medio fi-  
bræ crocæve stamina exeunt lingularum effi-  
gie. Inter hæc vnus omnium longissimus &  
rectus apex, in extremo quadatenus rotundus,  
herbacei coloris, nolæ plectro ferè similis: radix  
rotunda, candida, cepæ magnitudine, compa-  
ctili laminularum sursum spectantium serie,  
inferne fibrata, viscido succo turgens. Huius  
bulbaceæ plantæ vt notissimæ delineationem  
Dioscorides prætermisit: quam tamen Plinius  
affabre depinxit his verbis. Lilium rosæ nobi-  
litate proximum est, & quadam cognatione  
vnguenti oleiq; quod Lirium appellatur. Et  
impositum etiam maximè rosas decet, medio

prouentu earum incipiens. Nec vllis florum excelstitas maior, interdum cubito-  
rum trium, languido semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius  
eximius, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem sese laxantibus, effigie  
calathi, resupinis per ambitum labris, tenuiq; filo & semine, stantibus in medio  
croci. Ita odor colorq; duplex, & alius calicis, alius staminis, differentia angula.  
Et paulò post. Est & rubens Lilium, quod Græci Crinon vocant. Alij florem eius  
Cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia, & Laodicea Syriæ, mox in Phæli-  
de. Quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea Lilia, aliquando  
gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, sed vnus Narcissus  
cât. Huius alteri genus flore cādido, calice purpureo. Differentia à Liliis est & hæc,  
quod Narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio ge-  
neri cætera eadem, calix herbaceus. Omnes ferotini: post Arcturum enim flores  
ac per Æquinoctium Autumni. Inuenta est & in his ratio inferendi, monstrificæ  
hominum ingeniis. Colliguntur namque mense Iulio scapi arecentes, Liliaque  
suspenduntur in furno. Deinde nudantibus se nodulis, in fæce nigri vini vel Gi-  
ci mense Martio macerantur, vt colorem percipiant, atque ita in scrobiculis li-  
runtur heminis facis circūfusus. Sic fiunt purpurea Lilia: mirumque ita tingi ali-

Lib. 6. hist.  
ca. 6.

quid, vt nascatur infectum. Quæ partim ex Theophrasto translata sunt. τὰ δὲ  
κεῖνα, inquit, τῇ ὕδρῃ χροῖζ τὴν εἰρημὴν ἐχθ' διαφορὰν, μονόχρουν δ' ἔστιν, ὡς ἐπὶ τῇ  
χρυσῇ δὲ σπανίως. τάχα δὲ τὸ τοῦ χάρου καὶ αἵματος διαφορά. καὶ ἔχουσιν δὲ χρυσοῦν ὅτι ἐπὶ  
ἐν κερμένῳ, ὅτι δὲ πολλὰ γινέται. βλεψάνη γάρ τὸ ἀκρον. σπανιώτερον δὲ ταῦτα. βίβαν δὲ καὶ  
πολλὴν, ὡς καὶ τὸν ῥοζύλιν. ὁ δὲ χαρπὸς ἀφαιρέματος ἐκ βλεψάνης, καὶ ἀποδοῦσαι τὸ κα-  
ρον, πολλὴν ἔλαττον. ποιεῖ δὲ τινα τὴν συρρίγγην. (lege συρρίγγην) ἢ καὶ φουδύσιν. Id est, Lilia  
præ dicta coloris differentia inter sese distant. Vnicum ferè caulem habent, dupli-  
cem rarò: quam differentiam cælum & solum efficiunt. Ex singulis germinat. Sed  
quando vnum, aliquando plura Lilia emergunt: pars enim suprema germinat, &  
hæc rariora. Radice est copiosa, carnosa, rotunda. Fructus detractus germinat, &  
Lilium emittit, sed minus. Reddit & lacrymarum confluxum quandam, quem  
etiam



etiam ferūt. Gaza, nescio qua ratione motus, vertit fecit & lacryma cæcum quod-  
dam confluuium, quod etiam ferunt. Caterum quod dixit Plinius rubens Li-  
lium Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum censent, ἐρυθρὸν κρινόν, vel  
composita voce ἐρυθρόκρινον: nam etiam albū Liliū Crinon vocant. Quod autem  
Lilij florem Cynorrhodon vocari apud eundem legitur, alij ex Hesychio lectio-

MARTAGON, Matth.



LILIUM Purpureum  
maius, Dodonai.



nem hanc retinendam, alij falsi suspectam, &  
Crinorrhodon legēdum censent: maximè cum  
Lilium paulò antè Crinon vocari dixerit, &  
Cynorrhodi appellatio nihil cum Lilio com-  
mune habeat: & Crinorrhodon propriè Lilij  
rosam & florem significet, voce ad exprimen-  
dum rubentis cocci splendore aptiore, vt quæ  
cum rosa Liliū comparat, non alba quidem,  
sed rubente, & purpura fulgente: quod Crinor-  
rhodon Hippocrates Crinanthemum nuncu-  
pauit. Lilium purpureum, quod auctore Mar-  
thiolo Chymistæ in Italia Martagon vocant,  
Dodonaus Liliū siluestre, Germani Goldtuerke  
à flauo Bulbi colore, Galli *Lys sauvage*, Itali  
*Giglio rosso*, caules edit bicubitales, aut altiores,  
rotundos: folia longa, lata, acuminata, non per  
caulem incerto ordine sparsa, sed quibusdam  
interuallis stellæ modo radiatis eum ambientia:  
flores è suis pediculis deorsum dependent, Lilij  
diuisura, sed minores, colore purpureo obsole-  
to, purpureisque aliquot maculis splendent,  
& staminibus eiusdem coloris in medio, quorū


foliola retrorsum reflexa in orbem ferè incuruantur:  
radices bulbosæ, veluti ex nucleis multis compositæ,  
atque vel flauæ coloris, ex quibus fibræ dependent.  
Nascitur Lilium istud in multis Germaniæ locis, in  
siluis & montibus, Fuchsio & Gesnero testibus. Belgæ  
cum aliis Liliis in hortis habent. Floret sub finem  
Maij, aut Iunij initio, candida Lilia anteuertens.  
Fuchsius pro Asphodelo fœmina depinxit. Tragus  
pro Hyacintho Poëtarum. Est Herbariorū Heme-  
rocallis. Peruenusta alia planta à quibusdam Liliis  
rubris adnumeratur, quæ florem vnum pulcherrimè  
& suauissimè rubentem profert, magnum instar Li-  
lij rubri, quam Turcico vocabulo *Tulipam* vocant: de  
qua cum Tulipis aliis dicemus. Dodonaus Lilia alia  
purpurea proposuit. Vnum maius, caulibus proceris,  
longis, sæpe altioribus quàm Lilij albi: foliis nigri-  
oribus & angustioribus, circa caulem multis, ante eius  
exortum nullis: flores summo caule erumpunt co-  
piosi, decem, duodecim, aut plures, vsque ad decem  
& octo, & viginti, alij super alios incerto ordine di-  
gesti, Lilij alterius forma & magnitudine, colore ru-  
bro ad croceum inclinante, multis, exiguis, nigris  
quasi punctulis, literarum quarundam veluti rudi-

De florib.  
ca. 33. & 35.



mentis reserpsi: radices Bulbi magni sunt, ex multis quoque nucleis, ut Lilij candidi, sed maiores. Dodonæus etiam Hyacinthum scriptum & Comolandalon nuncupat, Fachsius Liliū croceum, Lobellius Liliū cruentum, alij filacitre Liliū. Estq; aut Hemerocallis, aut eius congen. Negat tamen Dodonæus Hemerocallidem esse: cum enim Hemerocallis, auctor: Dioscoride in singulis apophysis tres, aut quatuor flores proferat colore valde luteo, Liliū autem istud apophyses, id est, ramulares propagines nullas habeat, & flores in caule non modò tres, aut quatuor, sed non raro decem & octo, & viginti, coloris non lutei, sed purpurei crocei, Hemerocallis dici non potest, quin potius Liliū, quod Dioscorides *πύρρην* vocat, Plinius rubens. At hæc de apophysis & florum numero ratio levis est momenti, ut ait Pena: nam si quis Liliū candidum contempletur interdum exortus istos edere, in quibus aliquando complures flores congecti sunt, interdum singuli, non magnopere refragabitur. Alterum purpureum Liliū minus, caule est multò breuiore, cubitali, videlicet tantum, aut minori: foliis similiter nigricantibus, angustioribus & minoribus. Flores è summo caule erumpunt, singuli tamen suis pediculis, modò breuioribus, modò longioribus insidentes, coloris quoque purpurei crocei, notulis similiter quibusdam nigris, & perquam exiguis ornati, Lilij etiam diuisura, sed paulò minores: pro radicibus & minores Bulbi sunt, supra quos & infra fibræ adherent. Floret sub finem Maij, reliqua Lilia ante-

LILIVM Cruentum bulbos gerens, Lobellij.



LILIVM Cruentum aliud, Lobellij.



cedens. Liliū istud Dodonæus Ouidij Hyacinthum esse credit. Hæc duo Lilia culta tantum distare videntur, ut maius sativum sit, minus agreste. Neutrum verò purpureum est flore, sed colore corticis mali aurei. Quædam alia pulcherrima Lilia Lobellius picta dedit. Prius est Liliū cruentū bulbos gerens, summo alis diutis, cui flores rutilant, & bulbos nucleis stipatos profert. Alterum, Liliū cruentum, Lilio purpureo maiori minus, flore Martagi rutilo, & secundum caule sesquicubitalem bulbulis à medio ad summū vsq; ornatū. Tertiū, Liliū Persicū, vulgò *Pennach*





nachi Persiano, quod rarius Germaniæ, Galliæ & Angliæ: Lieræ solum Belgarum visitur, inquit, in horto amœnissimo, stirpiùmque exoticarum ditissimo generosi viri Ioannis Dilsij. Caulis est ternum cubitorum, quem fuscè ambiunt folia ex caruleo virentia, mucronata, Liliis cruentis paria: flores nutantes, nolarum effigie obsoleta purpura nigricant: radix bulbosa, fissâ, minimè squamis loricata, albida, auersâ parte sessilis & plana, porrectis subtrâ, obscurè flauentibus. Nec multum à Liliis differt Chalcedonicum Lale, quod supradictis Belgij hortis provenit, sesquipedem alto caule, foliis longioribus Liliij montani. Flores rubentes, nutantes Liliij Persici ritu nolarum figura, quales pictura docet, se non potuisse obseruare ait: caulem quidem edidisse, sed qui summo statim marcescere cœpit. Radix cepacea cœcretionem terri & virosi Colchici, vti tota planta, odoris. In Belgium missum Lale, Turfani & Coronæ Imperialis nomine. Myconus plan-

tam aliam ex Hispania misit, quam Lilium polyrrhizon nominauit. Lilium quidè, quod florum figura, colore, dulci & glutinoso sapore Liliū albū referat: polyrrhizon à radicum copia. rectè, an secus, id peritis Herbariis æstimandum relinquens. Herba hæc Hastulæ regiam prorsus æmulatur, siue folia cōsideres, quæ illius foliis adeo similia sunt, vt priusquam florere incipiat, Hastulæ regiæ esse dicas. Radices multas habet non admodum crassas, albas, huc & illuc sparsas, nō multum in terram demissas, dulces, glutinosas: ex quibus caulis erigitur, sapius duos cubitos altus, cauius, sine medulla, in quo flores candidi, Liliij effigie, odorati, multo tamē minores,



*L I L I V M Polyrhizon My-  
com, Phalangium quorundam.*

Lib. 3. c. 99.  
Vires &  
Temper.



Li. 26. c. 19.

men & folia cū vino trita. Vsum Liliū medicū etiam Plinius prolixè exposuit his verbis. Liliū radices multis modis florē suū nobilitauere, contra serpentū ictus, vino potæ, & contra fungorū venena. Propter clauos pedū in vino decoquuntur, triduoq; nō soluūt. Cū adipe, aut oleo decoctę, pilos quoq; adustis reddūt. E mulso potæ inutilē sanguinē cū aluo extrahunt, lieniq; & ruptis vulsis profunt, & mensibus fœminarū. In vino verò decoctę, impositæq; cum melle, neruis præcis me-  
dentur. Lichenas, & lepras, & furfures in facie emēdat, erugat corpora. Folia in aceto cocta vulneribus imponūt: epiphoris testium in melle cū Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro, flos & folia vlcera vetustati. Succus qui flore expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Siriū, ad emolliendas vulvas sudoresq; faciēdos, & suppurationes coquēdas. Vbi pro Syriū, Seiræum, quasi sapa Dalechapius legit: Cornarius falsò legi putat, Mel vocatur, & legendū esse, Phaselinū

Li. 23. ca. 41.

vocatur, ab aliis Syriū, ex eodē Plinio demonstrat, qui hunc locū citat alibi his verbis. Lirinū, quod & Phaselinū & Syriū vocauimus, renibus vtilissimū est, sudoribusque euocādis, vuluæ emolliēde, cōcoquēdisq; intus: quo tamen loco Dalechapius legit, Lirinō, quod & Melinū & Seiræū vocamus. Sed & laudatissimū in Leodicea Syrię, & mox in Phaselide Liliū esse Plinius ipse dixit loco à nobis primū

Li. 7. simpl.

adducto. Galenus distinctius hæc declarat. Liliū flos, inquit, temperaturā mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; habet, vt gustu sit amara, partim ex aquea, eaq; tēperata. Itaque etiā quod ex ea cōficitur oleum, citra morsum digerēdi, simulq; emolliēdi facultatē habet: vnde fit vteri duritię aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita desiccāt & abstergunt, & digerūt moderatē, proinde ambustis quoq; cōpetunt. Radicē ergo tostā, deinde cū rosaceo contrita, ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponūt: quippe cū alioqui & aliorū vlcera omniū bonū sit inducēda cicatrici remediū. Quinetiā neruos emollit, mensesq; prouocat. Folia verò præcoquētes, & ipsa ad obductā vsq; cicatricē imponūt, non in ambustionibus dūtaxat, sed aliis quoq; vulneribus. Sūt & qui aceto ea cōdiētes, ad vulnera

stamina quædā lutea intus habentes: semen in vasculo triangulari cōclusum, nigrū, triquetrū. Nascitur in montibus, sed terrenis humidisque locis, quādoq; iuxta fluentia. Quibusdā Phalangium videtur esse, aut Phalāgij genus, diuersum à Phalāgij icone quā Matthioli dedit. Ex Liliū flore, vt scribit Dioscorides, vnguentū fit, quod ab aliis Lirinū, ab aliis Sufinum appellatur, ad emolliēdos neruos, priuatimq; vuluarū duritiā aptū. Folia herbæ illita serpentū moribus subueniunt, feruefacta ambustis profunt, eadem in aceto cōdita vulneribus opitulantur. Succus foliorū cū aceto & melle in æreo vase coctus, contra vetusta vlcera & recētia vulnera medicamentum fit. Radix asia, aut cū rosaceo trita ambustis medetur, vuluā emollit, mēstrua ducit, & vlcibus cicatricē inducit. Cū melle subacta neruorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphas, lepras, furfuresq; emēdat. Achores absterget, faciemq; expurgat, & erugat. Testiculorū inflammationes trita cū aceto, aut Hyoscyami foliis & farina tritici demulcet. Semē cōtra serpentū morsus potū valet. Illinuntur erysipelati bus i-



ad vulnera suo tempore vtuntur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis: quanquam tamen nec in ea ipsa multum insit: nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut vitilignes, aut pforam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus ei aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Ceterum si id moderatè illi ac conuenienter admisceatur, & ad nervorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa, quæ valenter exficari postulant absque morfu. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus vtroque erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ exficari postulant absque morfu: ceu vulnera omnia ingentia, & maxime quæ in capicibus musculorum eueniunt, tum ea quæ nimis mollia sunt & diuturna, atque ægre ad cicatricem perducuntur. Tradit Matthiolus elixam Lilij radicem, veteri axungia exceptam & illitam, pedum clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere. Eandem ex adipe & oleo adhibitam fluxos pilos replicare: cum mulso autem potam, sanguinem extra vasa concretum per aluum eiicere, suppuraciones moliri & concoquere, & duritias quasque emollire. Stillatitiam forum aquam dari vtiliter potandam ægre parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & cassia. Oleum quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos nervorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones: præstat item ad emollienda articulorum impedimenta, & scirrhosos quoscunque tumores. Illinitur quoque puerperis vteri dolore languentibus, addito oleo è Lini semine, præsertim cum succida lema iis calidis imbuta ventri superponatur. Additur clysmatibus cum induratas faeces mollire fuerit opus. Lilia, quæ diu in oleo macerata fuerunt, illita, prius calefacta, apostemata calida citra dolorem maturant ac digerunt, præsertim ea quæ sunt in articulis.

In cap. 99.  
lib. 3.

## HEMEROCALLIS. CAP. II.



RAECIS ἡμεροκallis & ἡμεροκallēs, Latinis similiter Hemerocallis & Hemerocalles dicitur, Gazæ Elium, Italis Giglio saluatico, Gallis Lys sau-  
uage. Hemerocallis, vt describit Dioscorides, folia & caulem habet Li-  
lio similia, Porri modo viridia: flores in caule per singulas propagines

Nomina  
Lib. 3. c. 120.

terni aut quaterni erumpunt, Lilij diuisura quum hiare cœperint, colore perquam pallido. Græcè legimus, τὴν δὲ χεῖρα ἰχθυῶς ὡχρὰν, id est, colore valde ochreo. Ochra autem, teste Dioscoride, ὡχρῖνα est, id est, lutea, & melior quæ saturata. Quare colorum florum Hemerocallidis Dioscorides intelligere videtur saturatè luteum, non valde pallidum: radix est bulbosa valde magna. Plinius Hemerocalles inter ea quæ folio tantum coronant, numerat. Alio in loco, Hemerocalles, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicè odoratam & bulbosam. Quæ de Hemerocalide Dioscoridis accipienda esse perspicuum est. Theophrastus suffrutices coronarios recenset, Rosam, Violam, Iouis florē, Amaracum, Hemerocalles, item Serpyllum, Silymbrium, Helenium, Abrotonū. ἅπαντα γὰρ ταῦτα, inquit, ξυλῶδη καὶ μικροφυλλῶδη. Διὸ καὶ φρυγανιχῶς. Id est, Omnia hæc lignosa sunt, & minutis foliis constant. Quare suffrutices sunt. Et alio in loco, ὃ ἄλλα ἀνθή, inquit, καὶ προστριμένα, πάντα σπέρτεται, διὸν ἰωνία, διὸς ἀνθος, ἱερὸν, φλῶξ, ἡμεροκallēs. Ἐ γὰρ αὐτῆς, καὶ αἱ ῥίζαι ξυλῶδεις. Id est, Reliqui autem omnes suprà dicti flores semine exeunt, vt Viola, Iouis flos, Iphyum, Phlox, Hemerocalles. Nam & ipsa, & eorum radices lignosæ sunt. Ex quibus intelligere licet, Hemerocalles Theophrasti radicè lignosâ, ab Hemerocalide Dioscoridis bulbosâ diffidere. Athenæus ex Theophrasto Hemerocalles inter coronarios flores numerari scripsit. τοῦ δὲ ἡμεροκallēs λεγομένου ἄνθους ὁ τὴν ἀπὸ νύκτα μαραίνεσθαι, ἅμα δὲ τῶ ἡλίῳ ἀνελλόντι θάλλει. Id est, Hemerocallis florem nocte tabe-

Forma.

Lib. 5. c. 68.

Lib. 21. c. 10.

Lib. 6. c. 27.

Lib. 6. hist.  
cap. 1.

Lib. 6. hist.  
cap. 6.

Lib. 15.  
Dipnos.



scere, oriente sole pullulare. Quod sic intelligendum, florem hunc noctu contrahi collabiq; in sese, diu verò sese explicare, ac veluti reuiuiscere: quod Solisequiis

*HEMEROCALLIS prior,*  
*Matthioli.*



*HEMEROCALLIS altera,*  
*Matthioli.*




In c. 120.  
lib. 3.

& Heliotropiis cæteris accidit. Matthiolus Hemerocallidem nusquam non in Italia prouenire tradit, circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus, aureo colore micantem, Liliū siluestre vulgò dici: radice nri bulbosa, Lilio hortensi simili, sed alio colore: flores suo tempore dehiscences fulgentis auri modo rutilare, quem colorem perquàm pallidum perperam appellat, nec eum intelligit Dioscorides, cùm dicit *χρῆμα ἰσχυρὸν ὠχρῶν*, colorem valde ochreum quem saturatè luteum à Dioscoride intelligi diximus. Hemerocallidis genus alterum idem Matthiolus facit, specie quidem superiori simile, sed radice ex multis & paruis coagmentata bulbis, floribus aliam diuisuram habentibus, ut eius pictura demonstrat. Priorem Hemerocallidem superiori capite diximus esse Liliū purpureum maius Dodonæi, qui huic Hemerocallidem aliam substituit, Liliū videlicet non bulbosum. Cuius duo reperiuntur genera, florum colore distincta. Vni flos luteus: alteri in rubro dilutiori purpureus. In lutei genere flos vnus minor, alterius paulò maior est: vterque tamen purpureo minor, qui maximus est, & Lilio candido magnitudine ferè par. Sunt autem Lilio non bulboso folia oblonga & angusta, Porri aut Asphodeli foliis similia: caulis cubito altior, rotundus, laevis, absque foliis, superius in apophyses duas vel quatuor diuisus: in quorum singulis flores tres aut quatuor, Liliū forma & diuisura referentes, colore in vno quidem ochræ, id est, ut diximus, luteo, in alio rubro purpureo, cuius tamen medium floris luteum est. Post flores crassæ, triangulares gignuntur siliquæ, in quibus semen nigrum & splendens, Pæoniæ fœminæ simile, sed minus. Radices sunt non bulbosæ, sed veluti Asphodeli lutei, multæ, oblongæ, coherentes, & vni quidem, cui videlicet flores maiores & purpurei, crassiores nodosioresque: alteri verò minoris floris, tenuiores & longiores, è quarum annexis fibris quædam crassiores

De florib.  
cap. 35.



*LILIUM* Non bulbosum,  
Hemerocallis Dodo.



*LILIUM* Rubrum  
non bulbosum.



flores serpunt, quibus non secus ac Asphodelus luteus in plures piatas facile mul-  
tiplicatur. Peregrinum Belgio istud Liliaceae est: floret ante Lilia candida. Liliaceae lu-  
teum nonnulli appellant, sed rectius Liliaceae non bulbosum dici Dodonaeus putat:  
alii Liliaginem: plerique Liliaceae: Pena & Lobellius Liliaceae Asphodelum luteum  
Liliaceae: veteres, inquit Dodonaeus, Hemerocallida, quia caules non bulbosi  
Lilij in propagines seu ramulos distribuuntur, singulaque flores tres aut quatuor  
promunt, & eos quidem ochrea colore in vno genere. Iam & porphyranthes He-  
merocallis nominata reperitur: quae appellatio purpurei floris non bulboso Lilio  
conuenit. Quae omnia non bulbosum Liliaceae Hemerocallida legitimam esse per-  
spicere ostendunt. Quod verò tribuit Dioscorides Hemerocallidis radicem bulbo-  
sam, innuit istud, inquit, apud Dioscoridem Hemerocallidis descriptionem depra-  
uatam: vel enim superuacuum scilicet, & veritati repugnatum adiectione an-  
phiacam, vel duorum Liliaceae descriptiones in vnam contractas. His rationibus  
Hemerocallidem suam asserere nititur Dodonaeus. Herbarij tamen Matthioli He-  
merocallidem magis amplectuntur. Lilio non bulboso est persimilis planta hinc  
appicta, Lilij rubri non bulbosi nomine merito donanda: radicibus dumtaxat dif-  
fert, quas multum fibratas habet. His pulchrius Hemerocalles pictum damus. Se-  
mine ex Constantinopoli delato Lugduni in horto quodam Dalechampij indu-  
num phoeniceum, raro hanc stirpem, aspectu perelegans, Hemerocalles Constantinopoli-  
tana phoeniceum, vnicum flore ab ipso appellata, è qua viua pictura hanc expressa est.  
Bulbum planè Lilij vel Hemerocallidis Matthioli pro radice habet, fibris pluri-  
mis capillata, ex qua erigitur caulis vnicus, cubitalis, teres, laevis, herbaceus, nodis  
& geniculis distinctus: è nodis singula folia, ex singulis geniculis modò bina, mo-  
do quaternaria, rariùs terna prodeunt, caulem ambientia, Lilij foliis similia, sed mino-  
ra & acuminatiora. In caulis summo vertice vnicus flos emicat, qui sex foliis con-  
stat, striatis, florum Lilij speciem referentibus, nisi minora essent, & colore phoeni-  
ceo pulcherrimo: ex quorum medio sex apices sese exerunt phoenicei, staminibus  
pallidis







rinchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme, verno autē cūm apparuerit viola, minui & contrahi, tum deinde Bulbum pinguescere. Ex quorum locorum cōparatione perspicuum est vtriusvis auctoris locos corruptos esse: nec enim Setanion Bulbum, nec acrocordion Theophrasti exemplaria habent. Idem Plinius Catonem Megaricos Bulbos celebrare ait. Deinde cūm tantæ suauitatis esse in Cherroneso Taurica natus dixisset, vt crudi mandantur, post hos, inquit, in Africa nati maximē laudantur, mox Apuli. Est & hic obseruandum, Bulbum esculentum & vomitorium propriē Bulbos appellari. Verūm generaliter omnes olerum radices, quæ similitudinem Bulbi habent, Bulbos dici. Sic Celsus. Ex oleribus valētiora Napiq; & omnes Bulbi, in quibus Cepam quoq; & Allium numero. Quare Theophrastus loco citato non *βολβός*, sed *βολβώδη* appellat. Id verō magis mirum est de lanigeris bulbis Theophrastus prodidit his verbis. *μεγίστη δὲ καὶ ἰδιωτάτη καὶ ἁπλοῦς ἔστι γὰρ τιγίος τοῦτον, ὃ φέρεται ἐν ἀργαλοῖς. ἔχει δὲ τὸ ἔχειν ὑπὸ τῆς ἁπλότητος. ὥστε ἀνὰ μέσον εἶναι τοῦτε ἐλωδίου τοῦ ἐντὸς, καὶ τῷ ἐξω. ὑφαίνεται δὲ ἐξ ἁπλότητος.* (Athenaus & Pollux legunt *πόδις*, Plinius interpretatur mapalia) & maximē propria differentia est lanigerorum. Est enim tale quoddam genus in litoribus nascens. Lanam sub primis tunicis habet, ita vt in medio sit eius, quod edule est tum internum, tum externum. Texuntur ex ea & toga (Sic *πόδις* vertit Gaza, Bayssius fascias pedum, seu fascias crurales) & alia vestimenta: est enim id lanosum, non quemadmodum apud Indos capillaceum. Qua de re Plinius ita scribit. Theophrastus auctor est, esse Bulbi genus circa ripas amnium nascens, cuius inter summum corticem, eamque partem qua vescuntur, esse laneam naturam, ex qua mapalia vestesque quadam conficiuntur. Sed neque regionem in qua id fiat, neque quicquam diligentius, praterquam Eriophoron id appellari in exemplaribus, quæ quidem inuenerim, tradit. Ex his colligas, multa quondam genera Bulborū fuisse omnibus nota, quod Dioscorides de esculento Bulbo dixit, cuius ob id descriptionem pratermisit, nobis verō ignota: quia, vt ait Pena, non secūs atque Asphodeli, Bulbi plerique omnes edi mortaliū luxu & mollitie defiere, præsertim Europæis regionibus, seu fuerint gustu minūs commendabiles aut vtiles quā Bulbacea multa, Porri, Cepæ, Allia, & similia: viscidi enim sunt omnes & mucosi, & plerique insulsi, & magis ad excipienda condimenta, vt Hyacinthi multi, & Galenicus Asphodelus, quā ad condiendum apti. Quare ex Dioscoride diuinare seu coniectari potius licet, quā asseuerare quid sit esculentus Bulbus: pro quo Ascaloniam cepam, de qua dicemus, Officinæ usurparunt, quod venerem stimulare vulgò dicatur, quod de Bulbis antiquitas prodidit, vt Martialis cecinit his versibus.

*Cum sit anus coniux, & sint tibi mortua membra,  
Nil aliud, Bulbis quā satur esse potes.*

Bulbi nusquam hodie in hortis coluntur: quare satius caremus. Siluestres multiplures sunt: quidam edules, quanquam paucis, nempe Græcis & Apulis, eo satius deteriores quod nullo cultu mansuescant. Gignuntur passim ac in fegetibus, radice bulbosa, cortice subrufo, (quamobrem quidam Pancratium esse putauerunt) atq; defossa: foliis Porri, longis & latis: caule tereti, nudo: flore per initia racemoso, paulatim sese discescente purpureo: semine paruo, nigro, in oculis triangularis, primis Bulbi tunicis subamaris, vt in Bulbina, media cartilagine dulciore. Huius piceuram pro Hyacintho primo Matthioli, Fuchsii, & Tragus exhibuerunt: floret Aprilis initio iam deflorescente Bulbina. Horum flores rustici nostrates fertorū manipulis, quos in foro vendunt, immiscent, ob purpurei floris venustatem. Allium est caninum Dodonæi, quem Bulbum esculentum & hortensem vocat, quod alibi in siluis, in Belgio non nisi in hortis cultu nascatur. Non est tamen Allij

Lib. 19. c. 5.

Lib. 1. c. 18.

Lib. 7. hist. cap. 13.

Lib. 19. c. 2.

Lib. 19. c. 2.

In Aduers.

Bulb. esculentus multorum.

Locus.

Forma.

In cap. 18.

lib. 4.

Cap. 33. hist.

Lib. 2. c. 79.

Lib. 5. hist.

cap. 76 &amp;

De florib.

cap. 32.



BVLBI esculenti genus maius,  
Dodonæi. Hyacinthus, Matth.

*Bulbina & Bulbus*  
*n. s. s. s. s.*

Lib. 2. c. 79.

Lib. 2. c. 10.

Lib. 2. c. 9.



ce rotunda ceu Ceba siue Allium, citra odorem glutinosa. Multis Germaniæ locis  
crescit, sabulosis & umbrosis, atque circum conualles & riulos, nonnunquam in  
sepibus. Per initia veris Aprilis & Martio mensibus erumpit: ac statim deinde eua-  
nescit. Quomodo veteres nuncuparint, haecenus incertum esse ait. Sunt qui

BVLBI esculenti genus  
minus, Dodonæi.



BVLBVS silvestris Fuch.  
& Dodonæi.



*Bulbina*

*See figure of each in the original  
manuscript page 1503.*



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1503

Bulbinam vocent, alij *Βολβόν ἐσώδιμον*, id est, Bulbum esculentum. Quorum sententia illi & peritis herbariis haud placet. Quare Bulbum siluestrem nominavit quemadmodum & Fuchsius, Germani *Feldszuibel*, id est, Cepam agrariam siluestrem. Ruellius Bulbum siluestrem prior nuncupavit, quem rura Gallica, quod radice & foliis Porrum imitetur, Porrium vocant.

BVLBVS Vomitorius,  
Matthioli.



Quibusdam Theophrasti Perdicium esse placet, quod radices crassas habet, & plures radices quam folia, multis in vnam acervatis. Dictum est autem Perdicium, quod perdices ad id se volurent, terramque suffodiant. Non desunt qui vomitorium Bulbum esse credant, quod usu compertum sit radice decoctum vomitiones

Li. i. cap. ii.

ciere, & alium valenter ducere, non dissentiens Dioscoridis delineatione, scribentis Bulbum vomitorium folia habere lori modo latiora, & multo longiora quam Bulbus esculentus: radicem similem Bulbo, cortice nigro. Quæ si per se edatur, vel decoctum eius bibatur, vesicæ malis medetur, & vomitiones mouet. Matthiolus Bulbum alium vomitorium depinxit tantum, & sine vllis notis nudam imaginem cum nominis inscriptione exhibuit. Alij Hyacinthi speciem esse statuunt. De quo fusiùs differemus capite proximo de Hyacinth s. Dodonæus hunc ex esculentorum Bulborum genere esse censet, & Bulbum vomitorium ab isto planè diuersum describit, de quo in Narcissis dicemus. His Bulbis idem Dodonæus Leucanthemum addit. Sed cum Ornithogalon legitimum Dioscoridis esse putet, de eo magis idoneo loco tractabimus. Bulbum alium ex Dalechampsio hic proponimus, quem æstium meritò cognominat. Gignitur in sabuletis aridissimis & perflatis: radice mali instar rotunda, subter fibrata cepæ modo, gustu lenta, & paucillulum acri cum diu mansa fuerit: foliis multis angustis, tenuibus, croco similibus, tres digitos longis: caulibus tribus aut quatuor ex interiore Bulbi rima nascentibus, ut in Colchico, quatuor digitos altis, flosculis plenis, ex purpureo rubentibus: semine anguloso, paruo, nigro, gustu perquam amaro & subacri in oculis oblongis, triangularibus. Scillæ modo sub finē Iulij Augusto toto & Septembri ante foliorum exortum hæc planta caulem florémque gignit: nec priùs exeunt folia, quam dilapso flore conceptum semen fuerit. Hyacinthum quidam esse credunt. Sed ab eo plurimum diffidet, quod aduētante Vere ad Februarij finem, Martijve principium Hyacinthus floreat, hic verò Bulbus desinēte Iulio, Augusto toto & Septembri: quod duo

Li. 2. cap. 66.  
Bulbus Vomitorius.

De florib.  
cap. 52.

De florib.

Bulbus

Locus.

Forma.

Tempus.

BVLBVS Aëstius Dalech.  
Tiphym Theophrasti.



thus floreat, hic verò Bulbus desinēte Iulio, Augusto toto & Septembri: quod duo

M M M



aut summum tria folia Hyacinthus edat, hic verò plura quàm octo, graciliora, angustiora, breuiora: quòd Hyacinthi flos emergat post folia, huius verò flos cum caule ante folia exoriatur. His adde, Hyacinthum vmbrosis siluis, humidis sepibus, locisque aliis vdis gaudere, Bulbum hunc sicciſſimis, ſqualidiſſimis, apricis, ventò-

*BVLBVS Eriophorus,*  
*Dodonæi.*

Lib. 7. hiſt.  
cap. 12.

Append.  
lib. purg.  
cap. 31.

Append.  
lib. ſtirp.  
Hiſpanic.



*BVLBVS Eriophorus,*  
*Cluſij.*

*qz, et qzior. lora  
hinc origines idest  
ferens lora ppa  
bore. ferens*



que expositis. Iam verò vnico tantum caule Hyacinthus affurgit, hic verò duobus, tribus, quatuor. Postremò paucis diebus florem Hyacinthus retinet, hic mensem integrum, atque etiam diutius: qui flos in Hyacintho omnino purpurascit, in hoc Bulbo in purpura rubet. Sunt qui Bulbum hunc Theophrasti esse conſiciant, quòd florem ante folia promat. Bulbos ~~Eriophorus~~ diximus esse ex Theophrasto, qualem Belgij, ſe in horto Ioannis Brancionis vidisse, refert Dodonæus. Bulbus erat qualis ceparum ex multis tunicis compactus, inter quos ienta quædam veluti lanugo reperitur. Iconem Parauio ad ſe à Cortuſo miſſam fuiſſe ait, quam hic in nullo mutatam, nec vllò modo mutilatam expreſſimus. Sed hanc commentitiã esse veri & gemini Bulbi Eriophori pictura demòſtrat, quam fidus & accuratus rei herbariæ ſcripſit Cluſius expreſſit, qui eundẽ etiam Bulbum deſcripſit his ſerè verbis. Habet folia multa oblonga, Hyacinthinis ſerè ſimilia, minùs carnoſa & ſucculenta, duriora tamen, viridia, mucronata, ſapore ingrato, quibus minutiffimè etiam compreſſis, tenuia quædam fila inſtar tela araneorum diduci poſſunt. Ex horum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rectus, Scillini cuius æmulus, læuis, nudus, ſuſcens, ſuperiore verò parte ad cæreum colorem tendens: in ſummum veluti oblongam ac denſam fert ſpicam, in denos vel plures verſus diſtinctam, viridem primum, ſed paulatim (dum ſeſe explicat in flores) cæreum colorem contrahentem: conſtant flores ſenis foliolis ſtellarim expanſis, triangulo vmbone in medio protuberante, Hyacinthi autumnalis floribus propemodum ſimiles, inodorati, colore cum ſuis pediculis cæreoleo, & intermiſtis ſtaminibus, quorũ apices initio purpurei ſunt, & ubi ſeſe explicarunt, veluti pallescente quadam farina aſperſi. Incipit florere ab imo, vbi Scilla ſolet, & reliqui magna ex parte Bulbi, qui flores racemi aut ſpicæ in modum conſertos habent. Semen ſe obſeruaffe Cluſius ait, ſed flores admodum caducos ſtatim marceſcere capillis & relictis in caule tantummodò pediculis decidiſſe. Radix craſſa & bulbola eſt, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentola, & veluti araneorum



BVLBVS parvus  
vnifolius, Pena.



nearum telis obsita, multos adnatos Bulbos habens, & cras-  
sis oblongisque fibris nitens. *ἐκφορπ* nomen huic Bulbo  
inditum ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina  
diduci potest. Hic non omittendus Bulbus parvus vnifolius  
aut bifolius batrachoides: Pena, qui recto, gracili caule con-  
stat, palmari vel sesquipalmari, vnicum folium aut summū  
duo in medio quasi centro sustinente, multis & altis inci-  
suris radiatim diuisum Aconiti modo, in cuius medio qua-  
si vnibulbo flos vnicus, herbaceus pallensque, Aprili & Ma-  
io cōspicitur, Ellebori prorsum, deinde semen siliquatum  
etiam stellatum, & effigie Ellebori: radice Bulbus parvus,  
quātus Fumariæ Plinij, admodum acris gustanti. Hunc col-  
legisse se ait Pena in collibus Patauij vicinis, in quibus vi-  
peræ capiuntur. His atteximus admirabiliorem Bulbum, nō

BVLBVS Marinus  
crinitus.



*ἐκφορπ*, sed *τερχωδιν*. De quo hæc legimus in  
Nauigationibus Italico sermone cōscriptis, in-  
ter quasdam insulas tantam stirpis elegāter ex-  
pressa copiam prouenire, vt naues hanc super-  
gredi coactas quandoque remoretur. In fundo  
maris crescit, quatuordecim vel quindecim bra-  
chiorum longitudine, quatuor vel quinque al-  
titudine extra aquam eminens, colore ceræ lu-  
teg, caule satis crasso, ex quo per interualla exo-  
riuntur Bulbi, ex fastigiis capillitium quoddam  
emittentes. Radix est crassior, bulbosa, quam plu-  
rimis fibris capillata. Bulbus esculentus, vt do-  
cet Dioscorides, stomacho & aluo utilis est, ru-  
fus, & qui ex Lybia defertur. Amarus verò &  
Scillæ similis stomacho utilior est, & concoctio-  
nem adiuuat. Omnes Bulbi acres sunt, & calfa-  
ciunt, & venerē stimulant. Exasperant linguam  
& tonsillas: multum nutriunt, carnes gignunt,  
inflationes pariunt. Ad luxata, fracta, articulorū  
dolores, & furculos extrahendos illiti condu-  
cunt. Gangrænis & podagris cum melle & per  
se, hydropicorumq; tumoribus & canū mor-  
sibus similiter cum melle & pipere trito impo-  
siti profunt. Sudores cohibent & stomachi dolores mitigant: furfures & achoras  
cum nitro rosto exterunt: sugillata & varos per se, aut cum oui vitello purgant, &  
lentigines cum melle aut aceto: fractis articulis vnguibusque ex polenta medetur.  
Iidem calidis cineribus torrefacti tollunt ficos, item cum cinere e manarum capi-  
tibus impositi. Cremati verò & cum alcyonio misti vitia cutis in facie, & cicatri-  
ces nigras in sole illiti emaculant: faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed  
copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant. Plura de Bulbi vi-  
cie medentur. Per se verò triti neruorum contractioni, & ex vino porrigini: cum  
melle canum morsibus: Erasistrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere  
tradit illitos cum melle. Alij si e naribus fluat, coriādrum & farinā adiiciunt. Theo-  
dorus & lichenas ex aceto Bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero  
aut ouo. Et Bulbos epiphoriū idem illinit, & sic lippitudini medetur. Aequē vitia

Bulbus Cri-  
nitus mari-  
nus.

Locus.

Forma.

Lib. 2. c. 6.  
Vires &  
Temper.

Lib. 20. c. 9.



quæ sunt in facie, eorum rubentes maximè (id est, silvestres quibus cortex radice rubet) in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucumri cocto (cum melle vel aceto Dioscorides.) Vulneribus quoque mirè profunt per se, aut (vt Damion) ex mulso, si quinto die soluantur. lisdem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscent farinam. In vino cocti illi ventri duritiem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua cælesti co-  
perato dantur. Ad conuulsus intus, cum Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem tussis illinuntur. Nervis viles, ideo & paralyticis dantur (contra Dioscorides monet à largiore eorum cibo abstinendum, *διὰ τὸ ἀπλεῖον τοῦ ὑδατός.*) Luxa in pedibus qui sunt rufi ex his, citissimè sanant cum melle & sale. Venerem maxi-  
mè Megarici stimulant. Silvestres interaneorum plagas & vitia cum Silphio pilulis deuoratis sedant. Et satiuorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen antiqui bibendum in sanientibus da-  
bant. Flos Bulborū tritus crurum maculas varietatēque igne factas emendat. Dio-  
cles oculos hebetari ab iis putat. Elixos assis minùs viles esse adicit, & difficile co-  
coqui ex vi vniuscuiusque naturæ. Bulbine traditur vulneribus mirè vtilis, duntaxat recentibus. Galenus Bulbum edulem frigidiorē & crassiorē esse, lentumq;  
succum procreare scribit: nam & coctu difficilis est, & flatuosus, & venerem pro-  
cat. Attamen illitus ob amaritudinem simul & adstrictionem, abstergit simul &  
glutinat, atque etiam exsiccat. Bulbus vomitorius multò est calidioris tempera-  
ræ. Veretrum, inquit Marcellus Empiricus, id est, Bulbus, quod est genus cepæ, in  
aceto decoquitur, idq; acetum ore continetur, vt mobilitas dentium sistatur.

Lib. 6. sim.

Cap. 12.

## HYACINTHVS. CAP. IIIII.

## Nomina

Lib. 4. c. 58.

Lib. 6. hist.

cap. 7.

## Genera.

Lib. 4. c. 58.

## Forma.

Lib. 3. c. 104.

Idem Phyt. pag. 38

Lib. 2. hist.

cap. 4.

De florib.

cap. 51.

1. Hyac.

Lib. 1. plan.

cap. 101.

Lib. 10.



RAECIS *ἵακινθος*, Latinis Hyacinthus dicitur. Dioscorides vnicū  
Hyacinthum descripsit. Theophrastus Hyacinthum inter vernos flo-  
res recenset, eūque duplicem, tum satiuum, tum silvestrem. Recen-  
tiores Herbarij multò plures Hyacinthorū species obseruauerunt. Hy-  
cintus, vt descripsit Dioscorides, folia Bulbo similia habet: caulem dodrantalem,  
laeuem, minimo digito tenuiorem, viridem, comam incumbētem incuruam, flo-  
rum purpureorū plenam: radicem etiam ipsam Bulbo similem. Quis sit iste Hy-  
cintus scitu perdifficile est. Ruellius frequentem in Gallia Hyacinthum esse as-  
eūque florem à rusticis *Vaciet* appellari: in quo Romani vocabuli rudimēta qua-  
dam relucēt, quasi Vaccinum & Vaccinium innuant, quo Vaccinij nomine Hy-  
cintum à Romanis dici inter notha Dioscoridis legimus. Et Seruius, Vaccinium  
pro Hyacintho Maroni acceptum in carmine, affirmat. Dodonæus etiam Hyacin-  
thum *Vaciet* Gallici nomine, descripsit, foliis oblongis, angustis, lauibis, & splen-  
dentibus, Porri, sed minoribus: caule glabro, terete, cuius coma florum pondere &  
mole, cum primū dehiscere incipiunt, grauata, deorsum incuruatur: floribus ob-  
longis, rotundis, concavis, in latius se pandentibus, per oras reflexis, colore pluri-  
mū cæruleis, nonnunquam albicantibus, aut candidis siue niueis, aliquando pur-  
pureis: semine in siliquis triangularibus paruo, rotundo, nigro: radice rotunda, bul-  
bosa, candida, lento succo, vti & tota herba, plena. Cordus in Germania reperit  
scribit in apricis quibusdam tumulis. Dodonæus in Belgio etiam in prop-  
agrorum margines fruticibus aut arboribus confitos, & præcipuè quidem prope  
Mechliniam urbem, ibique copiose nasci: florere Aprili & Maio mense. Hunc ele-  
Dioscoridis Hyacinthum citra adiectionem autumat: item eum cuius meminit  
Columella, diuersitatem coloris quæ est in floribus vno versiculo complexus,  
*Nec non vel nuceos, vel cæruleos Hyacinthos.*

*Nec non vel nuceos, vel cæruleos Hyacinthos.*



HYACINTHVS, Dodon.



Ipse Dodonæus Hyacinthum non scriptum vocat, ad differentiam alterius, nempe scripti, qui luctus notas inscriptas habet. Pena & Lobellius Anglicū & Belgicum: quia nusquam maiori copia prouenit, quàm in Anglia & Belgio. Matthiolus Hyacinthum pinxit, quem Bulbum esse diximus: item aliū, quem Orientalem vocat, eumq; duplicem, quòd ex Orientalibus regionibus ad Cortusum missus sit: alij Græcum nuncupant. Dodonæus priorem Orientalem & legitimum à *Vaciet* Gallico, siue *Iacintben* Germanico non distinguit, nisi quòd hic minor ac magis serotinus est, ille maior ac præcocior. Et reuera tum inter sese similes sunt duo isti Orientales Hyacinthi, tum ab Hyacintho non scripto Dodonæi non multum diuersi, teste etiam Pena, qui hos Parauij primū se vidisse ait: floribus tamen, foliis & bulbo distinguuntur. Hos Lobellius feliciter & accuratius multo expressit. Prioris, qui Hyacinthus Orientalis Græcus ab eo dicitur, triplex differentia folio & flore: angustifolius, latifolius, & polyanthes alter

In cap. 58. lib. 4.

De flo. c. 51.

seu minor. Cum defloruerit duntaxat, maculis vipereis caulis variat. Præcox diluciore est flore: serotinus saturatiore, hilari, cæruleo, amæno. Hyacinthus Orientalis, maior polyanthes, quem mutilum & deprauatum Matthiolus pinxit, ut ait Lobellius, à medio cubitali caule ad summum vsque, in vnam partem vergente florum peramænorum, cæruleorum ordine decoratur, eximie magnitudinis, ca-

HYACINTHVS Dioscoridis:  
non scriptus, Dodonæo.



HYACINTHVS Orientalis  
Græcus, Lobellij.





lathis, seu alabastris parvis similia: folia latiora: bulbis Narcissi par. Lobellius in Appendice Hyacinthum alium Orientalem, brumalem, album Louanio a Cornel. Gemma Medico ostendit cum hac fere descriptione. Rarum hoc atque exoticum videtur Hyacinthi genus: nam etsi foliorum & florum forma cum plerif-

*HYACINTHVS Orientalis*  
maior polyanthes,  
Lobel.



*HYACINTHVS brumalis,*  
Orientalis Gemma ex  
Lobel.



que aliis conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub solis hybernorum tropicon terra erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias niues: florem quoque venustissimum edat circa principium Ianuarij, vel fine Decembris fere ad medium vsque mensis Martij: folia sunt, non vt ceteris Alaxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac fere semper erecta vt in generibus Aioi. Nervi in his nulli conspicui, sed striæ solummodò rectæ, ac veluti tenuis fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iunij, ac multò diutius quàm in cæteris: flos leni caule, nonnihil circa fastigia ad pediculos singulos excavata, propender candidus, nonnihil tamen sub initia, & circa supremas oras quiddam subcæruleum leuiter præ se ferens, quo quidem euanescente sensim Februuario mense totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mense plus integro perseverans. Radix bulbosa, intus candida, foris ruffa, circa foliorum exortus maculas quasdam, quales in Serpentaria maioris caule aspiciuntur, effundit, interfusa purpura nigro. Verùm id maximè sub Veris auspicia, & cum terræ rursus mandata caulem emeritum gerit. Hæc Lobellius ex Gemma. Poëticum Hyacinthum, vt scribit Plinius, comitatur fabula duplicem præferens eius quem Apollo dilexit, aut ex Aiæis cruore editi, ita ductum currentibus venis, vt Græcarum literarum figura, AI, legatur inscriptam, Quam duplicem fabulam Ouidius in vnâ contraxit, & AI, literarum figuram, non Aiæcem, sed Apollinis luctum referre dicit. Versus eius hi sunt.


Liban. c. ii.



HYACINTHVS Orientalis, 1. Matth.



HYACINTHVS Orientalis, 11. Matth.



Ecce cruor, qui fusus humi signauerat herbas,  
Desinit esse cruor, Tyrioque nitentior ostro  
Flos oritur, formamq; caput quam Lilia, si non  
Purpureus color his, argenteus esset in illis.  
Nō satis hoc Phæbo est (is enim fuit auctor honoris):  
Ipse suos gemitus solus inscripsit, & Ai, Ai,  
Flos habet inscriptum, fuit etque litera ducta est.

Hic tamen etiam Apollo de a'tera fabula vaticinatur his versibus.

Flosque nouus scripto gemitus imitare nostros.  
Tempus & illud erit quo se fortissimus heros  
Addet in hunc florem, folioque legetur eodem.

Huius Hyacinthi meminit etiā Theocritus:

Νῦν ὁκίμωθε λαλεῖ τὰ σὺ γέμυσσας, ἢ πλεον αἰ, αἰ,  
Αἰεὶ γὰρ τοῖς πλεονασμοῖς.

Poëticum istū Hyacinthum Dodonæus κεῖνον  
καρπορὸν, id est, Liliū purpureū, siue rubrum  
minus esse censet, ut iam monuimus, quod ex  
sanguine Hyacinthi adolescentis ruber flos or-  
tus sit, eademque de causā à Poëtis Latinis fer-  
rugineum cognominari, ut à Vergilio.

Et pinguem te dant, & ferrugineos Hyacinthos.  
Et à Columella.

Syrpiculum ferrugineis cumulare Hyacinthis.

Ferrugine im verò Hyacinthum dici, quod ad  
similitudinē ferruginis rubeat. Est autē ferru-  
go, inquit, ferri corruptela, velut aris rubigo,  
quæ à colore subrubente rubigo appellatur:  
vnde & ferrugineus color, instar ferruginis ru-  
bens. Sunt qui velint ferrugineum Hyacin-  
thum appellari, quasi lugubrem & funestum:  
aiunt enim ferrugineum fuscum esse & sub-  
obscurum colorem, Vergiliūq; cū ferrugi-  
neum nominat Hyacinthum ad fabulam eius  
alludere, quæ Hyacinthum ex sanguine Hy-  
acinthi adolescentis natum fingit: ferrugineam  
etiam ab eo dici Charontis funestā & luctuo-  
sam cymbam. Sed his cōtradicere videtur ipse  
Vergilius scribens Hyacinthum suauiter, id est,  
non intensē rubere his versibus.

Et me Thæbus amat, Phæbo sua semper apud me  
Munera sunt Lauri, & suauē rubens Hyacinthus.

In qua significatione Ouidium loco superius  
adducto purpureum dixisse Dodonæus putat,  
quod purpureus omnis qui rubet color in flo-  
ribus nominari consueuerit. At Plinius purpu-  
reas violas, quas Vergilius nigras vocat, sola Græco nomine à cæteris discerni, ap-  
pellariq; la, & ab his lanthinam vestem, & colorem purpureum qui in viola, lan-  
thinum nuncupat his verbis. In quibus vnguento vicisse naturam gaudens luxu-  
ria, vestibus quoque prouocauit eos flores, qui colore commendantur. Hos ani-

Li. 10. Me-  
tanor.

Idill. 19.

Lib. 2. hist.  
cap. 39.  
De florib.  
cap. 33.

Li. 4. Geor.

Lib. 10.

Eclog. 3.

De florib.  
cap. 33.

Lib. 21. c. 6.

Ibid. ca. 8.



madueto tres esse principales: vnum in cocco, qui in rosis micat. Gratius nihil traditur aspectu, & in purpura Tyria, dibaphaq; ac Laconica. Aliū in Amethylo qui in viola: & ipse in purpureum, quēque lanthinum appellauimus, &c. Hic violarum Mart arū color violaceus perspicuē intelligitur, vbi rubor nullus. Quare non omnis purpureus in floribus color rubet, vt sentit Dodonæus. Quod autem Hyacinthinus color lanthino vt voce, ita re similis sit, id est, violaceus, nō cruentus à cruore, ostri Tyrij color violaceus, siue lanthinus aperte demonstrat, cui laus summa, inquit Plinius, color sanguinis cōcreti, nigricans aspectu, idēq; suspectu refulgens. Eundem colorem violaceum ostentat purpura, cuius sanies, inquit Penna, ex violaceo tantillum rubet. Vnde apud Vergilium suaue rubens Hyacinthus dicitur. At Lilio purpureo non suauiter rubent flores, sed flammeo, siue luteo saturato rutilant, vt diximus. Porro ferrugine tinctum lbera cū canit Poëta, innuit colorem, quem politæ casides igni calefactæ, aut candefactæ simulac frigescent,

Lib. 9. c. 38.  
In Aduers.

HYACINTHVS Poë-  
ticus, Penna & Lobellij.



De florib.  
cap. 12.

prorsus violaceo & elegantissimo colore, in odori tamen, quibus pro fimbria, lutea macula est, vt in reliquis succedunt binæ siliquæ magnæ, laxæ, in quibus semē reliquis maius, erui vulgaris magnitudine, pallidum, rotundum, rugosum, quod maturum, in siliquis, si quatiantur, sonum edit: radix est reliquis maior, & multis membranis tenacioribus nigricantibusque circūuestita, quæ nucleis etiam seponitur, sed nō tam copiosis, atque in varia Iride & lutea, quæ singulis annis quinque aut sex huiusmodi nucleos deponunt. Floret quo reliquæ tempore. Verisimile est Hispanicis nauibus primum ex Hispania, aut Lusitania in Angliam delatam. Idem Lobellius Hyacinthum Poëtarum luteum pictum dedit, à superiore nulla proinde nota discrepantem, nisi floris colore, qui in hoc luteus est, in illo violaceus. Hec barij, vt diximus, multos alios Hyacinthos esse iudicant, spurios à Dodonæo vocatos: quorum primus folia habet angusta, quasi rotunda, bene virentia, per terrā magna parte strata: cauliculos inter ea rotundos, glabros, palmo longiores, in quorū summo

violaceum rubidum, nitidum cōtrahunt, Galli vocant *Brumissure*. De quo etiam ferrugineas violas dixit Claudianus, ne utiquam, vt putarunt, funestas aut lugubres intelligens: nam Virgilij versus contrarium indicat,


*Pictus acu chlamydem, & ferrugine clarus lbera.*

Quare alium à Lilio purpureo Hyacinthum poëticum proposuerunt Penna & Lobellius, qui magnam cum Lilio, Iride, & Gladiolo similitudinem habet. Flore etenim, semine, vniuerso caule & siliqua Iridem refert, bulbo, foliorum raceis, colore lanthino Hyacinthum, foliorum similitudine Gladiolū, quem in Anglia, Flandriæq; viretis passim videri ait. Hanc plantam Clusius à Lobellio ad se missam Iridis bulbosæ genus facit, cuius iconem à Lobellio expressam omisit: sed descripsit folio crassiore & velut cepaceo, viridiore, parte interiore canaliculato & candido, multisq; veluti bulbis argenteis resperso: caule crassiore & firmiore, quem, vniuerso alio Iridum bulbosæ generibus, amplectuntur folia quaterna, aut quina. Hic ex vaginulis binos flores exerit inuicem succedentes, quā in aliis Iridibus bulbosis maiores & latiores,




summo flosculi parui, rotundi, caui, hiantes, colore caruleo, aliàs diluto, aliàs saturato: post quos siliqua membranosa, in quibus semen paruum, nigrum: radix subest bulbosa. Peregrinus Belgis hic Bulbus est, inquit Dodonæus, neque vspiam illic sua sponte nascitur: in hortis satus faciliè comprehendit, & in plures bulbos citò

HYACINTHVS comosus  
minor. Bulbine Plinij.



HYACINTHVS corn-  
leus maior, Fuchsj.



multiplicatur. Folia ante Hyemem exeunt, cauliculi primo Vere, flores Martio. Hunc Hyacinthum Lobellius & Pena Hyacinthum comosum minorem vocat, ad verum Dioscoridis proximè accedentem, qui in toto Meridiano tractu multò frequentissimus est, Septentrionalibus, in hortis tantum. Vere ornat editiora, agrorumque margines herbidos, flosculis item venustis, & in comā perspicuam per versus congestis, lagenulas numerosas & admodum exiles, confertas & patulas ostentantibus: vnde vulgus Prouincialium *Barrelets* vocat, quasi lagenulas. Cauliculis est sesquipalmū altis: foliis iuncis, tenerioribus, sparsis, striatis. Dodonæo Bulbi esculenti genus esse videtur, Hyacinthum siluestrem vocat Cordus, Tragus Hyacinthum exiguum, Herbarij Hyacinthum botryoidem. Hyacinthum etiam Fuchsius appellat, & altera eius speciem facit, de qua mox: quem tamen Fuchsius foliis non ita iuncis, & ferè rotundis, sed latiusculis & striatis depingit, & Hyacinthum caruleum maiorem nuncupauit. Alterum Neotericorum Hyacinthum superiori similem pro Matthioli Bulbo vomitorio præcedenti capite descripsimus, depinximusque. Tertius inter spurios Hyacinthos is est, quem Fuchsius, Matthiolus, Tragus primā Hyacinthi speciem ponunt, quem Bulbum esculentum, siue Bulbum hortensem, & Allium caninum vulgò nominatū fuisse ex Dodonæo diximus. Sunt qui velint Scillæ, aut Pancratij speciem esse: quorum iudicium Dodonæus non probat, quòd Scillæ & Pancratij bulbi grandes sint, huius autem parui, & si cum illis conferas exiguius. Pena & Lobellius hunc Hyacinthum spurium, siue recentiorum, tertium Dodonæi, vel Dioscoridis geminum esse arbitrantur, vel certè quàm maximè ad illum accedere. Etenim foliis est porraceis, Bulbi vomitorij latioribus, in terram reflexis: caule albicante, læui, herbaceo, tenero, in quo à medio à summum vsque numerosi flosculi vtrinque congesti, oblongi, purpurei, ex paruulis petiolis, qui supernè comosam umbellam, latiusculam, deorsum vergentem & incuruam efficiunt, purpuream violaceam, suauis rubore permixto. Radix cæ-



Ca. 33.

Ca. de Bul-  
bo.

Lib. 4. hist.  
cap. 76.

pacea,



HYACINTHVS maior,  
Bulbus siluestris.HYACINTHI comosi ma-  
ioris genuina effigies, Lobellij.

pacea, fermè quanta Narcissi, exteriore cortice nitido & roseo dilutiore purpura: qua de causa Bulbinam Plinij quidam docti esse existimarunt. Sponte sæpius in Septentrionalibus regionibus prouenit. Germani *Brunlingr*, Hispani *Maos flores*, Galli *Vacier*, Cordus siluestrem Hyacinthum nominant. In appendice verò hanc

HYACINTHVS Co-  
mosus albus, Lobellij.

protulit Lobellius Hyacinthi comosi maioris genuinam effigiem: atque aliam Hyacinthi comosi albi eiusdem generis, qui reperitur in hortis Belgij, foliis quidem similibus, sed flore albo, intus cæruleis staminibus decorato. Radix tunica minimè rubent. Ad Hyacinthum comosum referenda planta, quæ tum ob formæ elegantiam, tum ob suauissimum odorem minime silentio prætereunda fuit. Hanc pinxit Clusius, & descripsit his ferè verbis. Quina, aut sena oblonga folia habet, inflexa, per terram huc illuc diffusa, in acutum desinentia, canaliculata, satis crassa & succulenta, quæ cum primùm germinant purpurascunt. Ex horum medio caulis veniens erumpit, satis crassus, rotundus & nudus, sed pro sua crassitudine admodum infirmus. Hunc à medio ferè ad summum racematim coherentes ambiunt flores, viceolis similes, initio interdum purpurascens, aut virides, deinde ex purpura virentes, aut ex virore albicantes, vel nigricantes, deinde pallidi, qui marcescere incipientes gratissimum moschi ferè odorem recipiunt. His succedunt prægrandia, triquetra, & veluti



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, LIB. XV. 1513

DIPCADI Chalcedonicum,  
Bulbus vomitorius, Matth.

DIPCADI candidis floribus,  
Lobellij.

nomen d'habera, de  
peregrina?



veluti pinnata capitula, in quibus semen continetur nigrum, rotundum magnitudine orobi. Radix subest magna, albicans, multis tunicis ceparum ritu contexta, & frequentibus crassis fibris lignosis, viuacibus subter firmata. Huius notitia Cornelio acceptam refert, qui in Belgiū misit Tibcadi nomine. Constantinopoli semper missa fuit Muscari appellatione, ob insignē odoris suauitatem, quæ ad moschum accedere videtur, vel potius ad pastillorum fragrantiam, qui ex Beniuiuo & aliis odoratis fieri solent. Lobellius Dipcadi Chalcedonicū vocat, Matthiolus Bulbum vomitorium. Idem Lobellius alterum Dipcadi floribus candidis pictum dedit, cuius varietas gemina. Quæ niueo cādore, alicubi & purpura diluta conspiciuntur, folia supernè latiora ferunt. Floribus ex cæruleo virentibus alioqui superioribus similis in hortis Belgicis visitur. Quartus ex spuriiis Hyacinthis est, Orientalis alter à Matth. nominatus: foliis oblongis & latis: caule longiusculo, ab imo ferè usque ad summum flosculis circūuestito: radice bulbosa, cuius imaginem solam Matth. olus expressit. Quintus Hyacinthus serotinus est, foliis angustis, parvulis & minoribus quā primis: cauliculis breuibus, tres aut quatuor digitos altis: flosculis in summo raris, cæruleis: staminibus in medio exiguis: semine in siliquis triangularibus exiguo: radice parua & bulbosa. Nascitur in Gallia quibusdam provinciis, ut iuxta Parisiorum

HYACINTHVS Autumnalis, Dodon.





*HYACINTHVS* Autum-  
nalis maior. *Tiphium* Theoph.



tus est. Item alius *Hyacinthus stellaris*, *Lilifolius*, *floridus* Mutoni, à Lobellio de-  
pictus: & *Liliaceus Hyacinthus*, siue *stellaris Hyacinthus Liriophyllus*, ex Biscaya  
montibus itidem asportatus, rarus & perelegans, appositè *Liliaceus* dictus: radix  
enim est sicuti *Lilij* bulbus, sed minor & oblongior flavescent: folia *Lilio* candide

*HYACINTHVS* *Stellaris*  
*albicans*, Lobellij.




*HYACINTHVS* *Stellaris*  
*alius Lilifolius*.



similium



HYACINTHVS Lilia-  
ceus, Lobelij.



simillima, sena, aut septena, inter quæ medius  
exilit sine foliis spithameus caulis, in cuius  
summo flores Hyacinthi stellaris in caruleo  
purpurei. Præter hos, & alios duos descripsit  
pro Hyacinthis Fuchsius. Vnum foliis ternis,  
alterum binis, latiusculis, Porri minoribus: flo-  
ribus circa cauliculi summum sparsis, multum  
& radiantis stellæ ferè similitudine parentibus,  
colore in priore caruleis, in altero candicanti-  
bus: quibus succedunt capitula rotunda, ochri  
magnitudine, in quibus semen nullo simile: ra-  
dice rotunda, bulbosa. Priorem Hyacinthum  
caruleum marem minorem Fuchsius appellat,  
alterum Hyacinthum albicantem, seu feminâ:  
plerique à floris effigie Hyacinthum stellatum.  
Pena & Lobellius Hyacinthum Germanicum  
Liliflorum stellarem. Dodonæus Satyrj genera  
esse aliquando existimavit: quam sententiam  
postea retractavit, quòd Satyrj caulis sit cubi-  
talis, folia Lilij, bulbus mali magnitudine, bul-  
bo verò isti folia parvula, angusta, bulbus exi-  
guus, cauliculus brevis. Reperitur vterque in  
plerisque Germaniæ locis, læto pinguiq; sed  
in cultu solo. Martio, quandoque etiam Februario flos exit. Alium Hyacinthum  
ex Dalechamptio hic pinximus, latifolium cognominatum, qui in Monte Aureo  
Arenariæ spote crescit: radice corticosa, Lilio simili: foliis sex, aut octo, nigrican-  
tibus, crassis, lati, Lilij ferè: floribus purpureis elegantibus, particulatim sese

Ca. 23. hist.

Lib. 2. hist.  
cap. 4.

De florib.  
cap. 12.

HYACINTHVS Caru-  
leus mas minor, Fuchf.



HYACINTHVS Albicans,  
seu femina, Fuchfj.





HYACINTHVS La-  
tifolius, Dalechamp.Li. 4. ca. 18.  
Vires.

Li. 21. c. 16.

Li. 8. simpl.



expandentibus: semine in capitulis rotundis, herbaceis. Dioscorides tradit Hyacinthi radicē pueris cum vino albo impositam impuberes seruare, vt creditur. Sistere autem aluum, & vrinam ducere potam. Opiulari demorsis à phalangio. At semen altringentias esse, & theriacis expetitur: regium morbum expurgare cum vino potum. Quæ Plinius prodidit his verbis. Hyacinthi radix est bulbacea, mangonicis venalitiis pulchrè nota: quæ è vino dulci illita puertatem coërcet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorum moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & Scorpiones, morbumque regium semen eius cum abotono datur. Galenus, Hyacinthi radix bulbosa est, inquit, ordinis primi in desiccando, secundi verò completi, aut tertij incipientis refrigerando. Itaque pueros diutissimè seruare impuberes creditur illita. Fructus leuiter extergit & adstringit. Quamobrem & ipse regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, ceterum in medio consilens caliditatis ac frigiditatis.

## NARCISSVS.

## CAP. V.

Nomina



YACINTHIS congener est νάρκισσος Græcis, Narcissus Latinis, Arabibus *Narces*, seu *Nargies* dictus, Gallis *Narcisse*, & *Iannette*, Italis & Hispanis *Narcisso*, non à Narcisso adolescente, nimium suū plus amante, vt fabulantur Poëtæ, sed à vi stupefaciendi & sopiendi, quam Græci νάρκωσιν appellant, & νάρκη, quod & Torpedini pisci nomen, quia enim stupidam tangentis manum efficiat: qualem vim inimicam neruis & caput grauuantem Narcisso inesse testatur Plinius, item Plutarchus his verbis. Καὶ τὸν νάρκισσον ὅτι τὸς ἀνθρώπων, ὡς ἀμβλύνοντα τὰ νῦν, καὶ βαρύτερως ἐμπούσιντα νάρκωσιν. Διὸ καὶ σοφοὶ αὐτὸν ἀρχαῖον μεγάλων θεῶν σφαίνωμα, τὸ τετρετῶν χθονίων προσηγόρευκε. Id est, Narcissum nominarunt, quia neruos hebetet, & torpida grauitates efficiat. Quare Sophocles ipsum velut magnorum Deorum subterraneorum coronamentū vocauit. Quod hi torpeant, utpote mortui. Theophrastus & Dioscorides Narcissum etiā λεγεῖν appellari scripsere, Apuleius ἀνδρον, βολβὸν ἐμμελὲν, αὐτογενές. Ἀνδρον quidem montanum, quod procul ab aquis proueniat: βολβὸν ἐμμελὲν ab effectu, quod vomitum cieat. Est tamen alius Bulbus vomitorius propriè dictus, de quo diximus. Αὐτογενὲς id est, à seipso genitus, vel per se nascens, quod sponte germinet. λεγεῖν etiam Liliū dicitur: & Iulius Pollux λεῖξ appellatone Homerum omne genus florum comprehendere auctor est. Narcissi genera duo notauit Dioscorides, vtrumque flore albo, sed vnum intus croceum, alterum intus purpureum. Plinius de Narcisso cum Liliis tractat, & hunc ab illis ita distinguit. Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule, carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnus Narcissus vocant. Huius alterum genus flore candido, calice purpureo. Differentia Liliis est & hæc, quod Narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cetera eadem, calix herbaceus. Omnes ferotini: post Arcturum enim florēt, ac per æquinoctium Autumni. Clariùs aliquantò post de iisdem agit Narcissus

Lib. 21. c. 19.  
a Symp. 3.

Li. 4. ca. 155.

Genera.  
Lib. 21. c. 5.



Eclog. 5.

24) c.

*Locus.*

Lib 6. hist.  
ca.6.

De florib.  
ca. 55.

*purpureus, Dodonai.*





nequaquam, sed florendi tempore differentes, magnitudine etiam nonnihil, sed partim dissidentes. Maiores medijs præcoces & serius prodeuntes minores sunt. Quamvis Dioscorides optimum & odoratum in montosis locis nasci tradiderit, tamen Mediopurpurei Narcissi apud Hæduos & Sequanos in pratis reperiuntur: ita Adærf. item Narbonensia & Galloprovincia præta, inquit Pena, Liliaceo floru stellarum radiantium candore ornant Februario & Martio mensibus, qui sunt odoris suavisissimi & verè soporiferi, & quasi quiddam Nymphae redolentis. Theophrastus etiã in pratis Narcissum nasci testis est, ubi Europam cum suis præta ingressam bene spirantem Narcissum carpisse canit. Dodonæus florere in Belgij hortis ait primi generis præcoces Narcissos initio Aprilis, medios sub finem, seriores Maio mense. Alter Narcissus in medio luteus folia habet longiora, latiora, & aliquantò minùs virentia: caules proceriores, crassiores, in singulis flores ternos quaternosve, prioribus similes, sed medio luteos: semen & radicem bulbosam similia. Huius generis & alius quidam tertius Narcissus à Dodonæo describitur, foliis non modo quàm primus, verum etiã quàm Alphonseus latioribus longioribusque: floribus in singulis caulibus quaternis, aut pluribus, candidis, minoribus, medio eorum luteo, calice eminentiore, multò tamen quàm Narcissi lutei siluestris brevior: radix similis est & bulbosa. Iste in pratis florent, & in Belgij hortis ferè sub finem Aprilis. De primo horum Narcissorum, scilicet Mediopurpureo. Theophrastus scripsisse autumat Dodonæus, quo loco Narcissum ter florere vti Scillam refert, & tria quidem arandi tempora, vti illam demonstrare. Quæ ex his Theophrasti verbis melius intelliguntur. *Ἰαμικὸν δὲ ἐπὶ πάλαιον, ὅπερ ἐπὶ τῇ Σικελίᾳ καὶ τῇ νερκίᾳ συμβαίνει. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων, καὶ τῶν ἐν ἡμῶν χῆς φυλάσσειν, ἢ τῶν βασιλευσίων, καὶ ὅτι τὸ φύλλον ἀνέλλει πρῶτον, εἴθ' ὕστερον ὁ καρπὸς τῶν, ὁ καρπὸς πρότερον. τῶν νερκίᾳ δὲ, ὁ τῶν μόνον, ἀνθ' ὅτι πρῶτον γὰρ ὁ ἄνθος. τῆς δὲ Σικελίᾳ αὐτὸν εἰς ὕστερον ἐπὶ τῶν ὁ ἄνθος ἀνίσχεται μῶν (lege, καὶ αὐτὸν πρότερον, ὕστερον ὁ τῶν αὐτοῦ ὁ ἄνθος ἀνίσχεται), &c.) ποιεῖται δὲ τὸν πρῶτον τρεῖς. ἢ ἡ μὲν πρώτη δόκιμη σημαίνει τὸν πρῶτον ἄρσεν. ἢ δὲ διὰ τὴν τὸν μέγαν. ἢ δὲ τῆς τῆς ὅσαι γὰρ ἂν αὐταὶ γένωνται, οἱ ἄρσοι χεδὸν ἕως αὐτῶν νῶν. ὅταν δὲ ἕως ἀπογενέσθαι, τότε ἡ τῶν φυλάσσειν βλάστησις πολλὰς ἡμέρας ὕστερον. ὡσαύτως δὲ ἐπὶ τῇ νερκίᾳ, πλὴν ὅτε καρπὸν φανερόν, ἀλλὰ καὶ τῇ ἄνθος, ὡς περ εἰ πομπή, ὅτε καρπὸν φανερόν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἄνθος ἀμα ἰσὺ καρπὸν καὶ φανερὸν, ὅταν αὐτὸν τῶν*

NARCISSVS Medio  
luteus, Dodon.

De florib.  
cap. 5.

Ibidem.



NARCISSVS Medio  
luteus alter, Dodon.

Lib. 7. hist.  
cap. 12.





τοτε τὰ φύλλα ἀναλλὰξ. Quæ sic conuertit Gaza. Mirum quod in Scilla Narcif-  
 soq; euenit: cæterorum enim tam recens satorum, quàm regerminantium, suo  
 tempore folium oritur, deinde caulis exit. In his verò caulis prius, & Narcissi  
 quidem floris tantum caulis protinus exit: flos enim eius plurimum festinat, Scil-  
 læ autem caulis per se prius, tum flos ex eo emergens insidit, eadẽque florum  
 prouentus ternos ostendit: quorum primus tempus arandi primum significare  
 videtur, secundus medium, tertius nouissimum: quot enim fuerint isti, totidem  
 & arandi tempora ferme occurrunt. Sed cùm ita senuerit, tunc foliorum exor-  
 tus multis postea diebus inceptat. Idem in Narcisso fieri solet, nisi quod nec  
 alium caulem præterquàm floris proprium habet, vt diximus, neque fructum  
 conspicuum parit, sed ipse flos vna cum caule desinit, & cùm reflorescit,  
 (legendum, cùm exaruerit) tunc folia exeunt. In his quidem inquit Dodonæus,  
 Scillæ caulem florum ternos exortus ostendere Theophrastus scribit: Narcissum  
 autem caulem non habere alterum iuxta eum qui floris est: fieri autem non po-  
 test, vt ex eodem caule ter floreat. Quare tres differentes bulbos esse consequitur,  
 qui tribus temporibus florent, vti Narcissum Mediopurpureum facere iam dixi-  
 mus. Hunc etenim ter florentem existimare possunt, qui vno eodẽque loco re-  
 periunt, & differentes bulbos esse non animaduertunt. Sed vbi cùmque hoc  
 Theophrasti loco νάρκισσος legitur, Plinius κρβικος legit. Notabilis & Scillæ Cro-  
 cique natura, quod cùm omnes herbæ folium primum emittant, mox in caulem  
 rotundentur (alij protrudantur) in his caulis prior intelligitur (aliàs impellitur)  
 quàm folium. Et in Croco quidem flos impellitur caule: in Scilla verò caulis exit,  
 deinde flos ex eo emergit. Eadẽque ter floret, vt diximus, tria tempora satio-  
 num (Theophrastus habet arationis) ostendens. Secundi verò & potissimum ter-  
 tij Narcissi Ouidius meminit, vbi Narcissi formosi adolescentis mutationem in  
 florem sui nominis describit his versibus.

Li. 21. ca. 7.

NARCISVS totus  
 albus, Dodonæi.



Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem  
 Inueniunt, foliis medium cingentibus albis.

De tertio verò ea scripsisse Theophrastum pu-  
 tat quæ suprâ citauimus, & diuerso ab eo cuius  
 lib. 7. meminit. Hic enim folium ei tribuit τενόν, Cap. 12.  
 id est, angustum, quale vtique primus Narcissus  
 habet: illic verò folium ἀσφοδελῶδες, ὡς θύπερον  
 ἢ ἐπὶ πολὺ, ὡς θάπτερον ἢ κρυανία, id est, folium Aspho-  
 delo simile, multò latius Lilij modo: vt diuersis  
 locis de diuersis Narcissis Theophrastum scri-  
 psisse perspicuum sit. Eodem verò Theophra-  
 sti loco paulò antè à nobis citato Dodonæus  
 pro μέλαινα τῇ χροίᾳ, legendum censet κίτρινα, id  
 est lutea, vt non niger, sed luteus Narcissi flos  
 intelligatur. At locum aliter emendandum, &  
 de semine Narcissi, non de flore, hæc verba ac-  
 cipienda esse demonstrauius. Præterea quar-  
 tus quidem est Narcissus Dodonæo, antedictis  
 forma similis, sed per totum florem & medio  
 quoque candidus: quem etiam Clusius depin-  
 xit foliis oblongis, viridibus, ternis, aut quater-  
 nis, è quorum medio caulis satis latus, angulo-  
 sus tamen & concauus exit, cui insident seni,  
 septeni, interdù deni flores oblongi & omnino


4. Narcif.

Li. 2. Scisp.  
 Hist. c. 11.



candidi, quorum videlicet calix, qui in alio luteus, etiam albus est & odoratus: radia superioribus similis. Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, inquit Dodonaus, tum primi, tum alterius generis, foliis & bulbis aliis haud dissimiles. Ita varia semper natura, & ad stirpiū genera multiplicanda fecunda, tum ad ea permu-  
 Advers. transferantur: hæc enim ad stirpiū mutationes plurimū possunt. Idē Pena asserit culturæ lenocinio Narcissum variatis foliis, floribus & bulbis posse admodum à  
 ibidem. pristina effigie desciscere, seseq; audisse iamdiu apud Venetos, quosdam stirpium mangonio, in dies bulbi seminibus quibusdā, vel insertis pullulationibus novas & miras excrasisse figuras. Clusius Narcissum etiā flore multiplici depinxit, latioribus, & quodammodo carinatis foliis, multiplici flore: quia mediis ille calix luteus interiora sex cādida folia sic interfecat & distinguit, ut calicis formam amplius non

NARCISSVS flore  
multiplici, Clusij.



NARCISSVS Iunci  
folius, Dodon.



seruet, sed veluti apophysis quardā lutea ad singula folia adnata videatur. Odorati-  
 6. Narciss. tissimus est illos iste, & grauedine quadā caput tentans. Dodonæus Narcissis etiā  
 annumerat plantā, quā Hispani, à similitudine quā folia cū iuncis habēt, Iuncifolios  
 vocāt: unde Narcissum Iuncifoliū appellat. Folia huic oblonga, angusta, crassa,  
 interim propemodū rotunda, admodū laxa & flexibilia, iuncis cū lauore, tū color  
 re, & quodammodo flexibilitate, nec nō rotunditate similia, inter quæ caulis mediū  
 exit, in cuius vertice sfoeculi tres, aut quatuor, vel plures, odorati, Narcissis forma  
 similes, verū minores, & colore per totū florē lutei: radix bulbosa, candida, tenui  
 nigra membrana integitur. Nascitur plerisq; Hispaniæ locis sua sponte. In Belgio  
 Aprili mense florem promit. Hunc Βελγiov ἐμεινον, id est, Bulbum vomitorium  
 Diosc. esse cōtendit Dodonæus, quod eius descriptio huic Narcisso similissima sit.  
 De florib. Etenim folia ei sunt multo quā alterius Bulbi ἐμεινον, id est, flexibilio-  
 cap. 66. ra, utpote iunzei propemodum lentoris, & perquam longa, longioraque mul-  
 Li. 2. stirp. to quam esculenti Bulbi, & radix in tenui nigra membrana reconditur. Hanc  
 Hippa. ca. 1. plantam Narcissi Iuncifolij alterius & pusilli nomine descripsisse videtur Clusius  
 Priorum



Priorem verò lancifolium depinxit & descripsit aliquantum diuersum. Huic, inquit, bina aut terna sunt folia, oblonga, angusta, carnea, & propemodum rotunda, luncis viridioribus & medullosis, lauiore, colore, & flexibilitate quodammodo simili: inter quæ medius erumpit caulis, rotundus, cauus, absq; foliis, in cuius sum-

NARCISSVS lancifolius  
prior, Clusij.



NARCISSVS montanus lancifolius minimus, Lobellij.



mo ex tenui quadam membrana flores quatuor, quinque aut sex prodeunt oblongi (gemelli interdum) forma Narcissinis similes, sed odoratiores, & omnino lutei, hoc est, tam interiore calice, quàm ambientibus eum foliis, quæ nunc mucronata, nunc quodammodo circinata concipiantur. His succedunt siliquæ triangulares, sed obtusis angulis, semine nigro & anguloso plenis, vt in Narcissis, verum minore. Radix parua, bulbosa, candida, nigricantibus densisq; membranis tecta. Hunc sponte nasci in pratis montanis non procul Toletis, & circa Guadalupe ait Clusius. Alterum ex Dodonæo proxime descriptum, viginosis inter Hispalim & Gades locis cum ipso flore se collegisse mense Ianuario: in Belgio non nisi Aprili vtrunque florere, interdum etiam media hieme. Quare Lobellius Narcissum lancifolium Dodonæi, qui alter est & pusillus Clusij, Narcissum lancifolium luteum præcoccem vocat. Narcissum lancifolium priorem Clusij appellat Narcissum lancifolium ferotinum, paucioribus foliis & floribus duntaxat diuersum: tamen pictura plura in hoc quam in alio folia demonstrat. Addit Lobellius in Appendice Narcissum montanum lancifolium minimum. Palmari est longitudine, tenuibus foliolis, in necis multo exilioribus, interdum erectis, interdum ad terram reflexis: inter quæ cauliculus palmaris erumpit, in cuius summo ex tenui, instar cæterorum Narcissorum, consimili membrana flos singularis luteus vulgato Narcisso montano simili, & penè par, aspectu suauissimo & hilariore, cui siliqua Narcissi succedit. Radicis bulbus quætus nucis Ponticæ nucleus. In figulinis seruatur & colitur. Huic subdit idè Lobellius tres alios Narcissos. Primum Narcissum montanum lancifolium minimum alterum, flore luteo fimbriato: rugosis plicis, fimbriatisque floribus ex montibus Bycæ, alioqui non differt à superiore. Alter est Narcissus montanus omnium minimus Hispanicus, flore Narcissi lutei, sed albo. Tertius est Narcissus lancifolius, flore circinatus rotunditatis roseo. His addunt Dodonæus & Clusius Narcissum, quem Autumnalem minorem vocant. Planta est digitalis, inquit Clusius, vnicum

7. Narcissus.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
**NARCISVS** *Autumnalis*  
*montanus.* *minor, Dodon. & Clusij.*



Narcissus montanus iuncifolius minimus alter, Lobel.



Narcissus iuncifolius flore rotundo roseo, Lob.

cauliculus gracilem & vacuum ferens, & in summo florem album Narcissi, odoratum, sex foliis constantem, & in medio caliculus luteum: siliqua angulosa: semen nigrum, exiguum, angulosum continet: radix Narcissi iuncifolij, minor tamen bulbosa, multis tunicis candidis, lentoque

**NARCISVS** *Autumnalis*  
*quorundam, ex Clusio.*

Ibidem.  
 8. Narcif.



9. Narcif.

co prægnantibus cõstans, quam ambit membrana quædam nigra. Tota planta amara est. Narcissus plurimus ad Anam flumen in Turdulis floret: sine vllis foliis sub Octobris finem, à Beticis Tomanda dicitur. His addi potest, inquit Clusius, & is quæ nonnulli Narcissum vocant, tamen si flore Narcisso dissimili: foliis quibusdam senis, oblongis, & pollicem latis, præ virore ferè nigricantibus & splendentibus, humi sparsis: inter quæ brevis exit pediculus potius quam caulis, florem suo cacumine ferens luteum, Colchici forma, sex foliis constantem (quorum tria maiora, alia tria interiora, quæ minora sunt, amplectuntur) ex membrana veluti vasculo proberantem, intra quem sex stamina cum suis apicibus & medio pistillo videre licet: radice crassa, rotunda, intus candida, foris vt in reliquis Narcissis nigricante. Sub Augusti finem & Septembris germinare incipit, & plerumque flores. Gaudet montosis quibusdam Hispaniæ pratis. Vide quæ de eo scripsimus capite De Saryrio. Appellam & Narcissum totum luteum, sine Narcissum.



NARCISSVS luteus  
siluestris, Dodonæi.



Narcissum montanum Theophrasti, siue Narcissum siluestre, siue Pseudonarcissum, qui Gallis *Coquelourde* dicitur, Hispanis *Campanilla*, Germanis *Geeltornings blumen*, Belgis *Geel Tydeloofen*. Folia Porri aut Narcissi similia habet, sed breuiora ac minora: caulés dodrantes, atque in singulis flores singulos Narcissis similes, sed medio eorum calice longiore, oblongioris calathi similitudine, colore in totum luteo, absque odore: capitula rotunda, oblonga. Nemorosa Angliæ Belgiue prata isto scatent, auctore Pena, Februario mense & Martio. In regionibus Meridiei In Aduers. propioribus, vt Narbona, Valconia, Hispania, non nisi editis montibus nascitur, & Maio lunioq; floret, vt in Veganiis, Mindenis, Pyrenæis que iugis non procul Tholosa, inodorus, inefficacior, nec perinde narcesin inuehit. Codion Theophrasti nonnulli esse opinantur, pro quo ineptè in vulgatis codicibus Codiaminon legitur, vt dudum annotauimus in libro de iis quæ

flore placent: quidam Bulbum vomitorium. Narcissi siluestris lutei species est Narcissus multiplex, quem hic proponimus ex eodem Dodonæo, ab illo solo flore folia multiplicante discrepans: colore etenim totus luteus est: folia quoque ac bulbi conueniunt. Alius est Narcissus flore multiplici, quem ex Clusio paulò antè depinximus. Multos etiam Narcissos Marthiolus exhibet sine vlli descriptionibus, quos tamen excepto primo non Narcissos, sed omnino alterius generis flores esse iu-

NARCISSVS luteus multiplex,  
Dodonæi.



NARCISSVS Constantinopolit.  
1. Mattholi.



dicat



De florib.  
cap. 55.

dicat Dodonæus. Nam quos secundo, tertio, & octauo locis depinxit, Scillarum aut Bulborum litoralium species videntur, quales in Gallia Narbonensi plerisque locis, & alibi proueniunt. Quartus similis est illi Bulbo, quem Marcellus capite de Narcisso in commentariis describit his verbis. Nos in Apennini montibus his

**NARCISSVS II.**  
Matthioli.



**NARCISSVS IIII.**  
Matthioli.



**NARCISSVS III.** Constan-  
tinopolitanus, Matth.



**NARCISSVS V.**  
Matthioli.



nolite



NARCISSVS VI.

Matthioli.



NARCISSVS VII.

Matthioli.



nostris frequentem vidimus, florem Augusto & Septembri mensibus florentem, figura Lilij, dodrantali altitudine: foliis qualia in Narcisso describuntur: singulari caule, iisdemque aliis omnibus, excepto colore, qui nec candidus nec purpureus, ut Plinius docet, sit, sed inter candidum & luteum colorem, nullius aut exigui odoris.

NARCISSVS VIII.

Matthioli.



Vidimus & in mitioribus collibus enatum, sed non tam speciosum & magis albicans: sed de quarto hoc Narcisso plura dicemus cap. De Ornithogalo. Quintum omnes Tulipam vocant, de qua aliquantò post dicemus. Sextus & septimus Leucoia sunt bulbosa, flores à Narcissis multum distantes, de quibus mox. Pena In Aduers. Narcissum tertium Matthioli, quem Constantinopolitanum appellat, nihil aliud esse censet, quam Pancratium maritimum, de quo suo loco agemus. Alium verò radice squamosa & nucleis stipata: floribus multiplicibus & foliosis secundo loco pictum, olitorum industria & mangonio, non natura, talem videri. Matthiolus tamen non explicat ubi, quando, & quomodo nascatur, & an arte, an sponte, quemadmodum nec alterum veri Narcissi bulbo, sed florum foliis prolixioribus, angustioribus, porrectioribus staminibus. Narcissi radix siue estur, siue bibitur, vomitiones ciet, auctore Dioscoride, ambustis igni prodest cum melle trita. Dissectos nervos agglutinat imposita. Luxatis malleolis, diuturnique articulorum doloribus trita cum melle

Vires &  
Temper.  
Lib. 4. cap. 55.



Lib. 21. cap. 19. melle & imposita subuenit. Purgat & maculas in facie & vitilignes cum semine vrticæ & aceto. Cum eruo & melle vlcerum sordes expurgat. Abscessus, qui ægre maturescunt, rumpit. Educt aculeos infixos cum loliacea farina & melle imposita. De eiusdem vsu medico Plinius eadem ferè tradit. Vtriusque radix mulsei saporis est. Ambustis prodest cum exiguo melle. Sic & vulneribus & luxatis: panis verò cum melle & auenæ farina. Sic & infixa corpori extrahit. In polenta tritici oleoque contusis medetur, & lapide percussis. Purgat vulnera permistus farinæ. Nigras vitilignes emaculat. Ex hoc flore fit Narcissinum oleum ad emolliendas duricias, Lib. 8. sim. calfacienda quæ alserint: auribus vtilissimum, sed capitis dolores facit. Narcissi radix, vt scribit Galenus, vsque adeò exsiccandi facultate pollet, vt maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones vsque, quæ circa tendones accedunt. Habet verò quiddam absterforium & attractorium. Hæc Galenus. Narcissi lutei siluestris radicem decoctum per aluum lentos & pituitosos humores, nec non serofos expurgare recentiorum quorundam experimento exploratum est: & his prodesse qui crudorum humorum copia grauantur, semine anisi, & zinziberis pauxillo additis, vt minis noceat, minuscule ventriculo molestum sit.

## LEUCOIVM BVLBOSVM.

## CAP. VI.

Lib. 6. hist.  
cap. 7.



HEOPHRASTVS scribit, inter vernos flores τὸ μὲν πρῶτον ἐκφαίνει τὸ λευκόν, ὅτι μὲν ὁ ἀπὸ μαλακώτερος, ἐν τῷ τοῦ χειμῶνος, ὅτι δὲ σκληρότερος, ὕστερον. Id est, Leucoium inter vernos flores primum emicare, vbi

Lib. 7. hist.  
cap. 13.

postea. Quod de eo Leucoio accipiendum esse docti censent, quod ipse postea de Bulbis differens, bulbosis annumerat: quia id præ cæteris Leucoiis florere postea de

Nomina

Quare Leucoium vnum non bulbosum Dioscoridis, de quo diximus, alterum bulbosum Leucoium Theophrasti statuere necesse est, à Leucoio Dioscoridis plantæ diuersum. Leucoium bulbosum Fuchsius, nomen Græcum exprimens, Violam al-

NARCISSVS, Matthioli.

Genera.  
De florib.  
cap. 3.

Forma.

Locus.



bam vocat: nec abs re, inquit, flos enim huius herbæ colorem album, & violarum odorem refert: Germani *weiße Hornungs blumen*, Lugdunenses *Campanes blanches*. Dodonæus Leucoi bulbosi tria obseruauit genera. Vnum Triphyllum, alterum Hexaphyllum, tertium Polyanthum cognominat. Primum Triphyllum tribus floris foliolis dictum, folia ex singulis bulbis bina promit, oblonga, angusta, in virore albicantia: foliis Pseudonarcissi lutei colore proxima: inter quæ medius exit cauliculus palmaris: in cuius summo flos è vaginula oblonga erumpit, à tenui pediculo deorsum dependens, foliolis tribus constans, maioribus candidis, inter quæ alia tria breuia ac minora, pallide virescentia, & aliquantulum striata: in medio floris staminibus cum apicibus luteis: radix bulbosa cœlis obscuri, & eius cuius Castaneæ nucleus comparatur, quæ faciliè in plures bulbos multiplicatur. Peregrinus Belgio flos, sed Italiæ & aliis regionibus familiaris. Exit præmaturè Februarium mense reliquos omnes ferè antecedens. Matthioli.



thiolus sextum Narcissi genus facit. Lobellius & Pena Leuconarcissolirion minimum, palmari cauliculo paucis foliis, quæ terna vel quaterna habet: flore exiliore, qui vnicus illi est, herbaceus, lacteolus. Septentrionalibus etiam regionibus, vt Antuerpiæ, & in Normannia frequens. Videtur Leucoium bulbosum Theophrasti:

*VIOLA ALBA bulbosa,*  
*Fuchsij.*



cuius meminimus in libro de iis quæ flore placent. Secundo generi, Hexaphyllo non abs re dicto à sex floris foliolis, folia similiter sunt angusta, Porri & Pseudonarcissi similia, sed breuiora, virētiora, læuora, & magis splendentia, versus terram aliquatenus reflexa: cauliculi tenues, palmares: flores in singulis singuli, rarissimè gemini, deorsum quoque penduli, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis commissi, staminibus in medio cum luteolis apicibus: semen in rotundis capitulis paruum, rotundum, læue, & colore flauum: radix candida & bulbosa in plures bulbos facile propagatur. Plerisque Germaniæ

*Tempus.*

*Forma.*

*Locus.*

*Tempus.*

superioris locis in vmbrosis & humidis siluis reperitur, apud Belgas hortorum areas exornat: floret eodè quo superius tempore, aut non multò post. Matthiolus pro septimo Narcissi genere depinxit. Leuconarcissolirion paucioribus floribus à Lobellio & Pena nuncupatur, quos non dissimiles, sed singulos in singulis cauliculis minoribus habet, luteis capillamentis è medio erumpentibus, semine fusco. Tertium Leucoium bulbosum, Polyanthemum à florum vno ex cauliculo dependentium multitudine cognominatum, caule & foliis secundo simile est, maius tamè

*Forma.*

*LEUCOIVM bulbosum minus*  
*Autumale, Dodon. & Clusij.*



ac procerius: florem in singulis cauliculis non vnicum, sed quinq; aut sex, & particulatim quidem florentes profert, alterius floribus forma & magnitudine per omnia similes. Est in Belgio hortense tantum. Non primo Vere cū aliis duobus, sed multò post, Aprili videlicet mense vna cum Narcisso, floret. Lobellius & Pena Leuconarcissolirion pratense vocant. Hoc Narbonense multiflorum, inquit Pena, vt cæteris maius, ita multò pulchrioribus est floribus: sunt enim lacteo Ornithogali candore, sed L ilij parui effigie, in singulorū cauliū summo seni vel septeni ex nodo vno procumbentes: deinde semen rotundum, nigrum, Pæonia simile in membraneo folliculo: folia & radices sunt Narcissi Medio-lutei. Copiose floret in pratis vel decliuibus locis herbidis, & lacunosis scrobibus, non procul Mæspelio & Magalona ad Lateranum castrum dirutum: semen fœniceciis maturat. Eadem planta quibusdam videtur esse Narcissus secundus Matthioli. Dodonæus alio in libro aliud Leucoium bulbosum minus pinxit, à reliquis distans, quod non Vere sed Autumno floreat.

*Locus.*

*Tempus.*

*Lib. purg.*



Lib. 2. stir.  
Hispa. c. 8.

Locus.

Idcirco Leucoium bulbosum minus Autumnale vocat, quod sic descripsit Clusius. Cauliculo est palmum alto, gracili, vnum, interdum alterum & tertium ferens florem, candidum omnino seu lacteum, pendulum, sex foliolis constantem, & in calathi seu tintinabuli modum formatum, inodorum & ingrati saporis: flori insunt pallida stamina, eoque iam aperto primum prodeunt folia quatuor aut quinque, capillaria & viridia: radix bulbosa, satisque magna pro plantæ proportionē, candida, multisque tunicis glutinosis compacta & amara, quæ candicante membrana tegitur. Ad Anam flumen nascitur: floret sub finem Octobris & Nouembris initio. Nusquam alibi hanc plantam se vidisse Clusius ait, cui Leucoij Autumnalis nomen indidit, quod Autumnno duntaxat florētem inuenerit. De horum Leucoiorum viribus nihil neque à veteribus proditum est, neque à recentioribus obseruatum. Fuchsius tamen ex foliis omnis ferè qualitatis expertibus, radice autem dulci & glutinosa, digerentem leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut & reliquos Bulbos, habere colligit.

TULIPA. CAP. VII.

Nomina

Genera.

Forma.

**T**ULIPAM peregrinum peregrino & Turcico vocabulo recentiores Tulipam nominarunt: sic enim Dalmata & Turca vocant pileum seu amiculum capitis quod gestare solent, quod ei inuersi flores illi aperti similes sint effigie. Est autem Tulipa ex bulbosarum numero cuius varia & quamplurima sunt species, & varietates, magnitudine & florum colore dissidentes: de quibus accuratissimè pertractauit Clusius. Is Tulipæ duo obseruauit genera, non quod forma à sese differant, sed quod alterius flores soleant esse præcoces, & alterius serotini. Hoc genus Turca sua lingua *Canala lala*, appellant, illud *Cafe lala*, à locis vnde primum Constantinopolim fuerunt allata, nomine addito: *lala* enim illis florem significat. Vtrumque pedalem profert caulem, interdum cubitalem aut ampliorem, rotundum, virentem, & breui quadam incanaque lanugine aspersum, non cauum, sed firma medullâ plenum: hunc plerumque ternam amplectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferior lata & liliacea, longiora & crassiora, supra terram sese expandentia & contorquentia, superiora minora & angustiora, vel propendentia, vel sursum erecta, omnia colore ex caruleo virente, aut ærugineo, veluti farina asperso, & oris interdum admodum inflexis vt sinuato videantur, interdum minimè. Summo cauli insidet magnus flos sursum spectans, sex foliolis sæpius constans, interdum septem aut octo, calathi aut cyathi modo sese in fundo pandens, ex quo sena, aut totidem, quot folia sunt, stamina erumpunt, modò lutea, modò pallida, modò nigricantia, pediculis etiam, quæ stamina sustinent, mirum in modum colorem variantibus. Dilapso flore succedit breuiusculum triangulare caput, satis magnum, quandoque oblongius, quandoque brevius, & ventre magis prominulo: quo in tres partes à summo dehiscente, conspicitur sex ordines seminis plani, cartilaginei, ferè liliacei, & circinata propemodum rotunditatis, pallidi, fului, aut rubescentis. Radix bulbacea interdum breuior, interdum obliquis, crassa, inferiore sede nonnihil prominente, vt ferè in Colchico, fibris aliquot tenuibus donata, & foris nonnunquam fuluescente, sæpius nigricante membrana obducta, quæ interiore parte lanuginosa est quemadmodum cactacearum cortex, quandoque tam denso tomento plena, vt mollissimè recubet radix, quæ solida est & firma, & veluti albumen oui coctum candida, gustantique dulcis, nec ingrata. Est autem in *Cafe lala*, id est, Tulipa præcoce tanta coloris varietas, quanta in nullo alio flore videri potest. Nam flos aut est omnino luteus, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum bini vel plures ex his in eodem flore permixti colores



*TULIPA maior,*  
*Clusij.*



*TULIPA minor,*  
*Dodonei.*



colores conspiciuntur. Simples illi colores etiam variant: aut saturatiores, aut dilutiores, aut aspectu iucundi, aut inelegantes & obsoleti. Permixtorum & variorum adeo multiplex est differentia, ut eam describere perdifficile sit. In serotina Tulipa tam variam colorum differentiam se non observasse ait Clusius, sed luteas duntaxat & rubras. Tulipas varias quidam curiose in hortis alunt ob excellentem florum venustatem, quarum nonnullas hic pictas damus. Prima Tulipa maior nominatur, Matthiolo Narcissus quintus, Lobellio Lilionarcissus purpureus, cui ab eodem appictus est Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus, sanguineo puniceo par & similis, à Dodonæo maioris Tulipæ nomine donatus & expressus. Minores Tulipæ foliis sunt angustioribus, & ferè Porraceis: cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus, & minus in latitudine se pandentibus, bulbis minoribus. In Thracia & Cappadocia Tulipa provenit. Italia, Gallia, & Belgio peregrinus est flos: quare in hortis tantum colitur. Aprili mense floret in Belgio Lobellio Narbonensis Lilionarcissus luteus montanus. Pena Narcissolilium luteum vocat, quem erutum ex Dei Paradiso in iugis Cemenei Narbonensis, iam multi sunt anni, in Belgium deferendum curavit, amicis Antuerpianis communicandum, qui primi illic Tulipam nominarunt. Huic appingit Lobellius Bononiensem Lilionarcissum luteum, siue Tulipam, qui Narbonensi, folio, caule & flore proximus est, omnia tamen vegetiora & grandiora habet: quandoque flores in caule bipartito geminos, stellatos, & alicubi ternos, iucundo Leucoij lutei odore. Sequuntur duæ aliæ pictæ à Lobellio. Prior Lilionarcissus luteus latifolius, obtusis phœniceis rubentibus oris dicitur, cuius flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat. Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor & nonnunquam plura folia, Liliaceis & Porraceis media. Interdum innatum bulbum in folio notavit Lobellius. Altera eximio est flore sese pendente, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium sanguineo fusco cingente: caliculi oris & media carina foris luteis: cetera omnia sanguineo fusco exoleto similia, medio intus stamine nigro, flaminibus croceis obducto. Semina, uti reliquarum, compressa in oblongo, tripartito, membranoso, anguloso folliculo: quæ itidem sata colorum varias subeunt mutationes, & sæpe degenerant. Lilionarcissus luteus oris, flore patulo nominatur. His adnumeranda speciosissima flore planta, quæ



*LILIONARCISSVS luteus*  
Bononiensis, Lobel.



Lilionarcissum purpureum variegatum Lobellius appellat, alij Fritillariam, rectius Meleagridem dici posse Dodonæus arbitratur: Meleagridis enim avis plumas non coloris quidem specie, ac varietate, situ, magnitudineq; macularum refert: est autem avis hæc variis sparsa plumis. Hæc planta à Narcissis differt, Tulipæ similior, sed minor. Flos pulcherrimus deorsum vergens elementis quoq; foliolis componitur, violaceo colore purpurascens, quæ dilutè admodum purpureæ, ac quasi albicantes, ordine coccinno digestæ, ac intermixtæ maculæ elegantissima varietate commendant, & foris quidē. Interiore parte nigricantibus sparsim dispositis lituris, circa basin maioribus ac frequentioribus exornantur. Stamina hinc quoq; sex, & medius pistillus, colore sub lutea. Caulis tenuis, circa quæ quina, oblonga, angusta foliola, Croci, è virore candicantia. Radix bulbosa, rotunda, & candida est. Semē albidum, compressum, siliquis Hemerocallidis minoribus. Tulipæ Bononiensis paribus clauditur. Nōnnulla hæc planta accedere videtur ad figurā Colechæ Orientalis Matthioli. Tulipæ genus quidam esse

arbitrantur plantam, quam Ouloudiam Græcum vulgus appellat, & in hortis colitur. Bulbi aduecti sunt nobis ex hortis Eremitarū & Monachorum qui mōtem Archo incolunt, solitudine & innocentia vitæ sic venerabiles, ut ob eorum integritatem

*TULIPA siue Lilionarcissus*  
*luteus latifolius, Lobel.*



*MELEAGRIS*  
*lutea, Dodonai.*  
*pag. 91.*









nat, vel præpropere floret, vtro scilicet modo tempus acceperis: floret enim Vergiliarum occasu, & paucis diebus: statim enim cum folio florem pellit, imò & prius florem mittit quàm folium. Radix huic multa, carnosa, & omnino viua. Calcari gaudet, atque ita lætior fit, radice deorsum versus attrita. Quare iuxta vias & fontes optimus. Seritur radice. Quæ ferè expressit Plinius

*CROCVS sativus,*  
*Matthioli.*

*CROCVS non florens,*  
*Matthioli.*



**Lib. 21. c. 6.** his verbis. Vfus Croci in coronis nusquam. Herba est folio angusto, pendu-  
capillamenti modum. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, folioque hy-  
rem expellit. Viret bruma & colligitur. Siccatur umbra, melius etiam hyber-  
na. Carnosa & illi radix, viuaciôrque quàm cæteris. Gaudet calcari & attri-  
**Locus.** pereundôque melius prouenit. Ideo iuxta semitas & fontes lætissimum. Cro-  
cus optimus erat Dioscoridi Coryceus, ex Coryco Ciliciæ monte. Secundum  
locum dat Coryceo è tractu Lyciæ contermino. Tertium Lycio è monte Olym-  
po. Quam Ruellij conuersionem non probat Marcellus Verg. hæc scribens. In  
his verbis, *ἡ ἀρετὴ δὲ ὅ ἐκ τῆς πρὸς Λυκίαν κορυφῆς, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Λυκίου δὲ ὄρους.*  
articulus præpositiuus, & Corycij in genitiuo casu illic occurrentes, legitimam  
sermonis seriem miscent. Ideoque nos secundæ bonitatis à Corycio ex Cilicia  
esse dicimus eum, qui ex agro ad Lyciam, & Lyciæ Olympo monte asseratur  
Sic & conuertit Cornarius. Secundum locum obtinet qui extra Corycum ad  
Lyciam nascitur, & qui in Lyciaco Olympo. Deinde qui ex Aegis Aetoliæ in-  
be adfertur. At Cyrenæicus & Centuripinus omnium in Sicilia nascentium in-  
**Lib. 21. c. 6.** firmisimis est viribus. Similiter Plinius, Prima nobilitas Cilicio, inquit, & ibi in  
Coryco monte: dein Lycio, monte Olympo: mox Centuripino Sicilia. Alique  
Phlegæo secundum locū dedere. Hodie verò non solum regiones ad Meridiem  
Africa, Cyrene, Sicilia, Gallia, sed etiam ad Septentrionem sitæ Anglia, & Hiber-  
nia laudatissimum ferunt, quo Belgium, Germania, aliq; vicini cibos condunt.



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1533

ac medicamentis. Cent. Matthiolus Crocum ex Aquila Vestinorum vrbe  
primum sibi locum vendicare in Italia scribit, eo tamen prestantiorem esse qui ex  
Vienna Austria metropoli defertur. Probat, inquit Dioscorides, recens, boni  
coloris, parum candidi gerens in circuitu, oblongus, integer, non fractus, cui  
nihil deest, plenus, dum diluitur manus tingens, non cariem, aut situm redo-  
lens, odore iucundo & acri. Quitalis non est, aut vetus est, aut humore perfusus.  
Croci, auctore Theophrasto, tam montanus inodorus, quam satius Autumno  
florete incipit: statim enim primis imbribus floret. Quare flores ante folium edit  
continuo ferè mense: quibus collectis folia exeunt, tota Hyeme virescentia spre-  
tis algoribus. Deinde arescunt, ac Vere depereunt, nec Aestate apparent. Crocus

In cap. 25.  
lib. 1.

Electio.


Lib. 2. hist.  
cap. 7.

Tempus.

CROCUS siluestris I.  
Dalechampij.



CROCUS siluestris II.  
Dalechampij.




siluestris verus (alium enim Officina Crocum siluestem faciunt, nempe Ephe-  
merum Colchicum, ob floriscium cum satiuo Croco similitudinem) a satiuo cul-  
tura, & satiuo differt. Huius tria obseruauit genera Dalechampius. Primum  
minutum radice bulbosa, exigua, rotunda, multiplici cortice vestita, infernè  
Cepa modo fibrata: cauliculo dodrantali, duobus latiusculis foliis obuoluto, vs-  
que ad floris exortum ferè ascendentibus, quatuor insuper, aut quinque fo-  
rescat, diuisis: flore Croci horrensis, paruo, supernè purpureo, infernè fla-  
vescente, extantibus in medio staminibus croceis. Secundus priori in multis  
similis est, in quibusdam diuersus: nempe quòd radice sit ampliore, ac den-  
sius fibrata: caule proceriore, grandiore, crassiusculo: foliis paucioribus: flore  
maiore & latiore. Tertius radice est gemina, Gladioli modo, lauiore, integrio-  
re, minusque lacero cortice obducta, parum fibrata: foliis quatuor, aut quin-  
que, longissimis, sed angustissimis, linea media candidissima distinctis: caule  
foliis vacuo, recto: flore media sui parte purpura nitente, suprà & infrà candi-  
do, interdum prorsus albo. Crocus siluestris in plerisque Gallie locis, sed in  
Allobrogibus potissimum nascitur, praesertim primus & tertius in niuosis

Crocus sil-  
uestris.



*CROCVS silvestris* III.

Dalechampij.

Li. 2. stirp:  
Hispa. c. 4.

montibus, terra nigra & ingui. Liguata ni-  
ue, & sub finem Maij florem & folia sta-  
tim promunt. Hanc ob causam, opinor,  
Crocum Vernum Clusius appellavit, quòd  
flore sit Croci, Verèque floreat: cuius genera  
duo constituit, Crocum Vernum minus, &  
Crocum Vernum maius. Croci Verni minoris  
species tres. Primo angustifolio, seu minori bi-  
na aut terna sunt folia oblonga, crocinis longè  
angustiora, gracilioraq; rotunda & capillaria  
ferè, viridiaq; Inter ea cauliculus erumpit pol-  
licari longitudine, angulosus, in quo flos vni-  
cus Croci ferè, sed minor, senis foliis confans,  
ima parte foris flavescentibus, intus nonnihil  
candicantibus, reliqua caruleis, siue violaceis,  
(inveniuntur & toti candidi) odoratis, quibus  
insunt aliquot parva stamina: succedit follicu-  
lus trigonus, in quo semen exiguum, fulvescens  
radix exigua auellanae magnitudine, duro spa-  
diceoq; cortice tecta, intus alba, firma, subad-  
stringente gustu. Bini plerūque flores, interdū  
terni ex eodem cortice, qui totidem bulbulos  
complectitur, prodeunt. Plurimus invenitur

Gadibus, atque inter Asindum & Calpen, locis salebrosis & apricis. Alterum ge-  
nus cum foliis, tum radice externo cortice huic omnino simile Clusius observa-  
vit in Beturiæ collibus Lusitaniæ conterminis, flore paulò minore, & ex albo pur-  
purascente, vixque è terra prominente, qui ex octo foliis compositus est, quatuor

*CROCVS Vernus minor* I.

et III. Clusij.

*CROCVS Vernus*  
maior, Clusij.



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, LIB. XV. 1553

exterioribus paulò maioribus: radix illi candida & gemina, vna alteri insidente: superior firma, dulcis, edulis inferior flaccida. Tertium genus vberioribus, & crassioribus est foliis, interdum rectis, cum reliquorum folia humi sparguntur, & superioribus multò minor, totisq; caruleus, tribus exterioribus foliis exceptis, quæ foris virecente colore diluta sunt: radix superioribus similis, sed paulò maior, & semen crassiusculum. Hunc Crocum Gadibus duntaxat iuxta priorem Clusius inuenit. Florent omnes Ianuario & Febuario. Crocum Vernum maius, inquit, foliis satiuum omnino refert, nisi breuiora essent: ante florem ea prodeunt, deinde subsequuntur bini, aut terni flores crocinis similes, sex foliis constantes, quorum exteriora terna, quæ pallidula sunt, tres purpureæ saturatiores, & quasi

CROCUS serotinus cum flore, Lobellij.



CROCUS montanus, Clusij.



nigricantes lineæ, ab infima basi ad extremum folium ductæ versicoloria efficiunt, intus verò tum hæc, tum tria interiora candicant, staminaq; in medio habent Croco montano similia: floribus succedunt siliquæ parvæ, oblongæ, angulosæ, subrufo, & rotundiusculo semine refertæ. His adiungit Lobellius duas alias Croci Verni species. Prior est Crocus Vernus serotinus, flore ex purpureo rubente, violaceis lineis striatus. Alter est Crocus Vernus serotinus, caruleis oris, sparsis in latera foliis. Præterea Clusius Crocum montanum Autumnalem depingit, qui flore est satiu Croci, sed dilutiore, staminibus intus tribus croceis, inter quæ veluti penicillus luteus emicat: folia quaterna Crocinis similia, viridia, interiore parte veluti lineam quandam candicantem secundum longitudinem, exteriori verò duas huiusmodi lineas & quasi canaliculos habent: radix satiu candida, plena, & veluti internodiis distincta, subdulcis primum, deinde ingrati saporis, integitur cortice quodam denso, & multis villis contexto. Nascitur in nonnullis Lusitanie rupibus, præsertim iuxta mare. Floret istic toto Nouembri. Siliquas Maio fert crassas, angulosas, semine plenas, quales Croci Verni est. Est & in Calcaris, vulgò de L'esperon, præcelso Gallie Narbonensis monte, Crocus montanus albo flore. Theophrasto κρόκος ἀπὸ δὲς dicitur, Latinis Crocus montanus, Autumnalis, silvestris, Lusitanis Pie de Borro, id est, Pes asininus. Crocus satiuus, ut tradit Dioscorides, concoquit, emollit, leuiter adstringit, vrinam cit, & coloris bonitatem efficit. Arcet crapulam cum passò potus. Fluxiones oculorum cum muliebri lacte inunctus sicut potionibus, quæ pro interaneis parantur, vtiliter miscetur: item iis quæ vuluæ sed quæ subiciuntur & illinuntur. Venerem stimulat. Inflammationes erysipelatodes inunctus lenit. Aurium remediis vtilissimum est. Lethalem sanè dicitur hunc, Titium

Lib. 1. ca. 25.  
Vires &  
Temper.



si trium drachmarum pondere cum aqua bibatur Radix eius cum passo pota vri-  
 nam ci. Hæc & alia quædam de eodem prodidit Plinius. Discutit inflammatio-  
 nes omnes quidem, sed oculorum maximè ex ovo illitum. Vulvarum quoque  
 strangulatus, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iocinoris, pulmonum,  
 vesicarumque, peculiariter inflammationi earum vehementer vtile: item tussi &  
 pleuriticis. Tollit & pruritus, vrinam ciet. Qui Crocum prius biberint, crapulam  
 non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem.  
 Somnum facit. Caput leuiter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illi-  
 nitur cum creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur. Crocus, in-  
 quit Galenus, paulum quid adstringens habet, quod terreum frigidumque est  
 superat in eo calfaciens & qualitas & facultas, vt tota eius essentia secundi sit or-  
 dinis ex calfacientium, & primi exsiccantium. Quare cōcoquendi vim quandam  
 obtinet, adiuuante scilicet in hoc paucula illa adstrictione. Scribit Auicenna Cro-  
 cum cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exiguo, sed nimio vsu  
 efficere potest. Vigiliis enim copiosus inducit, quæ modum excedentes capiti &  
 sensibus obsunt. Moderatus autem Croci vsus cerebro prodest, sensus vegetiores  
 reddit, somnum & torporem excutit, lætitiā gignit, corroborat cor. Thoracis  
 crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione  
 liberat: & ad hæc tam efficax est remedium, vt subinde phthisicis in summo vitæ  
 discrimine, & propemodum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam ad  
 aliquot dies proroget: scrupuli dimidij, aut ad summum integri pondo, cum pas-  
 so, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo grauissimas subito irruentes  
 dyspnœas citra febrem, statim & momento temporis tollere experimento com-  
 pertum est. Laudatur ad hepatis & fellis obstructiones, & ad regium morbum.  
 Croci stammina trita carpis, aut sub mammis admota illitæ, vires suas cordi cere-  
 broq; illico transmittunt, quasiq; vertiginem tenebricosam inuehunt, aciem ocr-  
 lorum præstringunt, aut hebetant. Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Croci  
 drachmarum duarum pondere partum accelerare, maximè inebriare si cum vino  
 misceatur: tantam lætitiā parere, vt ex nimia lætitiā insaniam gignat. Quod ex-  
 perimento confirmat Amatus Lusit. asserens se mercatorem vidisse, qui cum in  
 ollam in qua carnes coquebantur, multum Croci inieciisset, post earum cūm in  
 tam profusum risum prorupit, vt parum abfuerit quin risu nimio & cachinnos  
 vita excoerit. His addenda Symeonis Sethi auctoritas. Crocus stomacho bonus  
 est, inquit, ciborumq; concoctionē efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethar-  
 gica vitia iuuat. Discutiendi quoq; vim obtinet, vlcerebus vtilis est, & ad spiritus  
 difficultatem conducit. Si quis illo mediocriter viatur, bonum colorem habebit  
 sin verò vltra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappeten-  
 tiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus vbi dolent,  
 summopere prodest, superpositis Betæ foliis. Croco siluestri verno maiori, quem  
 ex Clusio descripsimus, foris duntaxat vtendum esse censet Pena. Illius pubi vi-  
 nas elicit crebras atque crassas, tumores hydropicorum discutit, spicula euellit.

## C E P A.

## C A P. IX.

Nomina



P O M N Y O N Græcis, Cepa & Cepe in neutro genere Latinis &  
 Officinis, Arabibus *Basil*, seu *Bassal*, Italis *Cipolla*, Germanis *Zumel*,  
 Hispanis *Cepolla*, Gallis *Oignon*. *κρόμμυον* autem Aristotele in Proble-  
 matis auctore dictum est *παρὰ τὸ χάρος μύδι τῶν ἐσθίωντων*, quod ocu-  
 lorum tunicam pupillamq; mordaci vapore lancinando, conuiuere contrahit  
 cogat lacrymas eliciendo: vnde Latinis Cepa lacrymosa. Cepa autem à capite  
 magnitudine. Quemadmodum Theophrasti & Dioscoridis auctores, ita etiam hodie  
 magni

quædā copia id est  
 copiosa Genera.












*CEPA* *fibilis*,  
*Matthioli.*

*CEPA* *Ascalonia*,  
*Matthioli.*

*ob Ascalone quida  
pudor nominata*



ῥαί παύσα πύδ μόνον, ἔτι καὶ στεινὰ, καὶ ἀναιεῖ. Quæ sic Plinius expressit. Ascaloniarum Lib. 9. c. 6.  
propria natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, & ob id semine feri illas, non  
deponi iussere Greci. Præterea serius circa Ver cum germinant transferri: ita  
crassescere, & tunc properare præcisi temporis pensitatione. Festinandum au-  
tem in his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt. Si deponantur, & caulem  
emittunt & semen, ipsæq; evanescent. Has Ascalonias, siue Ascalonitides, siue Pa-  
lastinas Cepas esse putant docti, quas Galli vocant *Eschalottes* seruatis prisca voca-  
buli vestigiis, quæ quod ancipitis & dubiæ sunt naturæ inter Cepam Allium &  
Porrum, peculiarem quandam naturam, vel figuram eas habere tradit Theophra-  
stus. Sunt tamen Cepæ similiores, sed multò minores, & crudæ in ientaculis lau-  
tiores frequentioresque habentur. Quapropter Franci *Appetiz* appellant, quia Pen. in  
Theophr. & Plinius Cepæ genus quoddam esse testatur. Quæ Cepa Ascalonia ex Aduers.  
Matthiolo hic expressa est, Schœnoprason Dodonæi quibusdam videtur, de quo  
capite proximo dicemus. Omnium maximæ sunt Cepæ, quæ Caieta Romam im-  
portantur, quæ et si saturatè rubescant, & crassioribus tunicis cōpactæ sint, leuius-  
cula tamen acrimonia prædita sunt, mansuq; tenerrimæ: ob id in cibos præstan-  
tiores sunt cæteris. In Hetruria, inquit Matthiolus, minùs acres, quæ magis rubet, In cap. 14.  
alba omnium acerrimæ, quamuis flauas candidis aciores esse Dioscorides scri- lib. 2.  
pserit. Suauitate & mole omnibus Italicis & Gallicis, inquit Pena, excellunt Afri- In Advers.  
cæ, ac Hispanicæ, & Hispanicis maiores, ac speciosiores D. Altomari in Belgio sa-  
turæ, quibus prima commendatio, & magnitudo capitis extuberantis, compressæ  
verinque rotunditatis, Rapum non mediocri æquantis, squamosa cuticula, exti-  
misque tunicis sanguineo saturo colore rubentibus, & nitentibus, Flandriæ, An-  
glis, alijsq; Septentrionalibus expetitur. Ad quas tamen gentes asportantur quot-  
annis Hispanicæ non minore copia, aut commendatione, quæ partim albæ, par-

PPP



3140  
 tim purpurascens, gustuque aliquatō acriores sunt, pares teneritudine & mole,  
 cibus & condimentis quā medicamentis aptiores. Caterarum ubiq; in Italia,  
 Gallia, Germania, Anglia, Vasconia prouentus maximus hortorum cultoribus  
 venit. Et ut quæque ad illarum bonitatem proximè accedit, ita optima habenda.  
*Tempus.* Terram amant pinguem vehementer subactam & irriguam. Florent Iulio postis-  
 simum mense, deinceps semen proferunt, quod non antè legendum quā cum  
 nigrum colorem præ se fert, is enim color maturitatis est index. Omnibus eadem  
 facultas incidendi, lacrymas ciendi, odor non insuauis, sed vapor & sapor inten-  
 tior, aut mitior. Omnes mordicant, inquit Dioscorides, status gignunt, appeten-  
 tiam inuitant, extenuant, sitim excitant, fastidium pariunt, & expurgant. Aluo vir-  
 les sunt. Detractis tunicis in oleum coniectæ, ac pro glandibus subditæ, hamor-  
 rhoidas reliquasque excretiones aperiunt. Succas cum melle illitus oculorum he-  
 betudinibus, argemidis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq;  
 laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis  
 moribus cū sale, ruta, & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inunctus, albos  
 sanat: cum pari spodio scabras lippitudines sedat. Varos cum melle reprimat. Con-  
 tra calceamentorum attritus cum gallinaceo adipe uilis est. Alui fluoribus pro-  
 dest. Aurium grauitati, ac sonitui confert. Ad purulentas aures, & eliciendam  
 aquam in iis interceptam valet. Alopecie earum succo utiliter perfricantur: cele-  
 rius enim quā alcyonium pilos euocat. Largior Ceparum cibus capitis dolo-  
 res ciet. Cocta vehementius urinam pellit. In morbis cocta etiam largius come-  
 sta lethargum efficit. Cum papis uis & sicu illita, tubercula concoquit & rumpit.  
*Lib. 20. c. 9.* Plinius de iis eadem & quædam alia prodidit. Cepæ olfactu ipso & delacrymato-  
 ne caligini medetur, magis verò succi inunctione. Somnum etiam facere tradun-  
 tur, & vlcera oris sanare commanducatæ cum pane. Et canis moribus virides ex  
 aceto illitæ, aut siccæ cum melle, aut vino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic  
 & tritæ sanant (lege ex veteri codice, Sic & attrita sanant.) Coctam in cinere & epi-  
 phoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium vlceribus. Succo &  
 cicatrices oculorum, & albugines, & argema inunxere: & serpentium morsus, &  
 vlcera omnia cum melle: item auricularum cum lacte mulierum: & in iisdem so-  
 nitum & grauitatem emendantes cum adipe anserino, aut cum melle stillanero.  
 Et cum aqua bibendum dedere. repente obmutescens. In dolore quoque ad-  
 dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionu.  
 Alopecias fricare & psoras tufis Cepis. Coctas dysentericis vescendas dedere.  
 & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinerem in-  
 linentes ex aceto serpentium moribus, ipsaq; multipedæ ex aceto. Reliqua inter  
 medicos mira diuersitas. Proximi inutiles esse præcordiis & concoctioni, inflatio-  
 nemq; & sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad colorem quoq; validū pro-  
 fici hoc cibo: & si ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri: stoma-  
 cho utiles esse spiritus agitatione: ventrem mollire: hæmorrhoidas pellere suble-  
 tas pro balanis: succum cum succo fœniculi contra incipientes hydropides mu-  
 proficere. Item contra anginas cum ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos  
*Li. 7. simpl.* Cepa, auctore Galeno, ex quarto est ordine excalescentium. Essentia eius potius  
 crassarum est partium: unde etiam hæmorrhoidas aperit tum apposita, tum cum  
 aceto inuncta. In sole albos abstergit: tum alopecias attrita pilos alcyonio citius  
 restituit. Si succū eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantie  
 est, cuiusque caliditas succus aqueæ acereæque caliditatis. Hic igitur iis qui suffu-  
 sunt, aut aciem oculorum obtusam præ crassitie humorum habent, inunctus pro-  
 dest. Ex huius temperatura tota Cepa flatuosa est manducata. Itaque quæ tempe-  
 ratura sunt sicciora, minus flatuum generant. Cepa elixa, aut sub prunis rosta-  
 inquit



inquit Matthiolus, datur cum saccharo vtiliter anhelosis, asthmaticis & tussientibus, addito butyri momento. Excavatur ea parte quæ sunt radices, & præstanti repletur theriaca citrei mali succo subacta: deinde occluso foramine sub calidis cineribus coquitur, donec probè fuerit macerata: tunc premitur, & excipitur cremor, iis perutilis qui pestilentialaborant, sed eos illicò sudare oportet. Item excavatur & cymini pulvere repletur, coquitur, & exprimitur eodem modo. Succus is vtiliter instillatur ad aurium furditatem. Crassior Cepæ squama sub feruenti cinere tosta antiquum capitis dolorem sedat, si frustulum eius calidum in dolentis lateris aurem intromittatur, superasperso rosaceo & laurino oleo, succidaque addita lana quæ totam operiat aurem. Cepæ succus cum acerrimo aceto mistus sanguinem è naribus manantem sistit iis immixtus.

PORRVM.

CAP. X.

**N**ON solum hic Bulbus Cepis est affinis, sed etiam tunicarum involucris demptis, interius eius capitulum cor vocatum Cepam refert: nec foliis, floribus, caule, & semine multum dissimilis, quem Græci *ωπόρον* vocant, Latini Porrum, Arabes *Curat*, siue *Kurat*, Itali *Porro*, Germani *Lauch*, Galli *Porreau*, Hispani *Puerro*. Præsum verò dictum est à colore, quod sit *ωπείριον*, siue *ωπείριον*, id est, viride. Porrum autem Latine quod porro eat, & longè latèque grassetur auctore Ruellio. Pena à callosa Porri capitis simillima in ossibus ferruminatis concretionem dictum conicit. Olitorum industria Porrum in capitatum & sectium diuisit. Illud *ωπείριον* Græci vocant, id est, capitatum, quod in caput accrescat, hoc sectium, cui frondentem comam solo tenus amputant. Tale si facere velis: ait Columella, densius satum præceperunt priores relinqui, & ita cum increuerit se-

Nomina

Vide Physic. pag. 101

Lib. 1. c. 20.

In Aduers.

Genera.

Lib. 11. ca. 3.

PORRVM sectium,

Fuchsij.



cari. Sed nos docuit vsus longè melius fieri, si differas, & eodem more quo capitatum modicis spatiis, id est, inter quaternos digitos depangas, & cum conualuerit, defices. In eo autem quod magni capitis efficere voles feruandum sit, vt antequàm translatum deponas, omnes radículas amputes, & fibrarum summas partes intondeas. Tum testulæ vel conchæ quasi sedes in singulis subiectæ feminibus adobruuntur, vt fiant capita latioris incrementi. Quod & Plinius tradidit. Seritur semine ab Æquinoctio Autumni: si sectium facere libuit, densius. In eadem area secatur, donec deficiat, sterco- ra urq; semper: nutritur in capita, antequàm secetur. Cum increuit in aliam aream transfertur, summis foliis leuiter recisis ante medullam, & capitibus detractis tunicis extremis. Antiqui silice, vel tegula subiecta capita dilatabant. Nunc leuiter sarculo conuelluntur radices, vt delumbatæ alant, neque distrahant. Porrum foliis est Allio similibus, latioribus tamen ac longioribus, carinatis, & in acutum desinentibus. Cernix illi

Lib. 19. ca. 6.








ambusta, & epinyctides : item alia vlcera cum melle trito. Vel bestiarum mor-  
sus ex aceto : item serpentium. Aurium verò vitiis cum felle caprino, vel pari  
mensura mulsi : stridores cum lacte mulieris : capitis dolores, si in nares funda-  
tur, dormitur siue in aurem duobus succi cochlearibus, vno mellis. Succus & ad  
serpentium scorpionumque ictus bibitur cum mero, & ad lumborum dolores  
cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreantibus & phthisicis, distilla-  
tionibus longis, vel succus, vel ex ipso cibo prodest. Item morbo regio, vel hy-  
dropicis. Et ad renum dolores cum pitisanæ succo acetabuli mensura. Idem  
modus cum melle vulvas purgat. Estur verò & contra fungorum venena : im-  
ponitur & vulneribus. Venerem stimulat, sitim sedat, ebrietates discurit. Sed  
oculorum aciem hebetare traditur : inflationem quoque facere, quæ tamen sto-  
macho non noceat, ventremque molliat. Voci splendorem affert. Capitato ma-  
ior est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum gallæ, aut  
thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mistura dari iubet : vul-  
uasque contractas aperiri iubet : fecunditatem etiam feminarum hoc cibo au-  
geri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tusim & destillationes thoracis, pul-  
monis, & arteriæ vitia sanat, datum in sorbitione pitisanæ, vel crudum, præter ca-  
pita, sine pane, ita vt alternis diebus sumantur, vel si purulenta excreantur. Sic &  
voci, vel veneri, somnòq; multū confert. (De voce nihil Dioscor. dixit, de somno  
autem, *ὑπνὸς* esse, id est, tumultuosum somnum parere.) Capita bis aqua mu-  
tata cocta aluum sistunt, & fluxiones veteres. (Dioscorides ait, Porrum bis aqua  
mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & minùs inflat.) Cortex de-  
tractus illitusque inficit canos. Hæc Plinius, qui paulò antè tradidit Neronem  
Porro sectiuo auctoritatem dedisse, vocis gratia, ex oleo statim mensum omnium  
diebus, nihilque aliud, ac ne pane quidem vescendo. Grauem enim vocem ex-  
plicat Porrum, sua lentitia faucium asperitatem deliniens. Certè & perdices

Lib. 19. c. 6.

AMPELOPRASVM,

Matthioli.



vtuntur eo, si credimus Aristoteli, canoræ  
vocis gratia. Galenus de Porris, Alliis, &  
Cepis agens : Harum plantarum, inquit, ra-  
dices vulgò frequentissimè esitant, caulem  
tamen rarò & folia, quæ & ipsa proportionem  
radicum acrem admodum habent faculta-  
tem. Corpus calefaciunt, & qui in ipso sunt,  
humores crassos tenuant, lentosque inci-  
dunt. Si cocta tamen bis tæue fuerint, acri-  
moniam quidem deponunt, tenuant tamen  
adhuc, & alimentum corpori dant paucissi-  
mum, quod certè priùs quàm elixa essent,  
omnino non dabant. Est aliud Porrum, ni-  
mirum siluestre, quod Græcis ἀμπελόπρα (G)  
dicitur, id est, Vineale Porrum, Arabibus  
Nahati, Italis Porro saluatico, & Porrandello, Ger-  
manis Vuilblauch, Gallis Porreau de chien. Am-  
peloprason caule profluit bicubitali : foliis  
porraceis, sed angustioribus : flore candido :  
radice bulbosa. Prouenit in vinetis, in agro-  
rum marginibus, & in amœnis collium locis.  
Ex Matthiolo id pictum damus : à quo diuer-  
sum est quod Lobellius exhibuit, folio Allij

Lib. 2. Alim.

Forma.

Locus.



## AMPELOPRASVM,

seu Porrum siluestre,

Lobellij.

Li. 2. C. 144.  
Vires &  
Temper.  
Li. 24. ca. 15.

Li. 2. Alim.



siluestris tenuifolij non dissimili, sed maiore & acriore, in caule bicubitali, radice bulbosa, non ex nucleis, sed singulari capite constante, Porri minore, duriore, acriore, nonnullis adnatis sese propagante: flore & nucleis feminis vice, triticeis granis paribus, in glomeratis capitulis non disparibus Allij siluestris tenuifolij. Vinetis, aru's, marginibus, senticetis, & dumeris Gallia & Belgij gaudet. Stomacho magis quàm Porrum aduersatur, vt tradit Dioscorides, plus excafcit, vrinam & menses vehementius ciet. Eius esus contra serpentium morsus vtilis est. De quo hæc Plinius. Ampeloprasum in vinetis nascitur, folijs Porri, ructu grauis. Contra serpentium ictus efficax. Vrinam & menses ciet: eruptiones sanguinis per genitale inhihet potum impositumque. Datur & à partu mulieribus, & contracanis morsum. Galenus scribit Ampeloprasum tantum à Porris dissidere, quantum in omnibus alijs generibus agrestia omnia à domesticis differunt. Quosdam autem in totum annum sequentem, vt Cepas aceto condientes, ita & Ampeloprasum reponere.

fieri que in cibo præstantiora, ac minùs habere vitiosi succi. Item Ampeloprasum agreste esse Porrum: quare & acrius eo, & siccius esse, sicut agrestia omnia reliquis hortensibus, ac proinde stomacho quàm illud nocentius. Sed & crassos & lentos humores potentiùs incidere, valentiùsque infarcta organa obstructione liberare. Hac quoque ratione vrinas sæpe prouocasse, vbi à crasis & lentis humoribus retinebantur. Adeò verò esse calidum, vt, illitum cataplasmatibus modo, exulceret.

Schoenoprasum  
Dodon.

Forma.

Locus.

Cap. 24.

Porrum aliud paruum à Dodonæo ponitur. Germanis *Vinzenlauch*, Belgis *Bieslook*, id est, Allium iuncum: vnde *χονδρόπαχυ* Græcè nuncupauit. Cauliculos, graciles, teneros, cauos veluti iuncos paruos, in vnum aceruum coactos foliorum vice profert, gustu ferè Porri. Inter hos nonnunquam cauliculi emergunt rotundi cum capitulis, vt in Cepa, sed multò minoribus, floribus purpureis referti. Radices sunt Bulbi Cepas paruis similes, vel porracei, minores, oblongi, cohærentes & implexi, fibris quamplurimis capillati. Prouenit vbi que in hortis, adeò que Porrum refert, vt quibusdam non solum veri Porri vicem expleat, sed opinionem faciat. Crudi folia acetariis gustum gratissimum addunt. Hanc plantam Fuchsius Porrum sectium facit. Matthiolus pro Cepa Ascalonia Theophrasti depinxit, vt diximus, Lobellio & alijs testibus. Pena negat verum Ascalonitidem, seu Palaestinam Cepam esse.

ALLIUM



## ALLIVM. CAP. XI.

**A**LIIUM etiam generis est, quod σκορδον Græci, Latini Allium **Nomina** vocant, Arabes Chaum, Chairin & Thum, Itali Aglio, Germani Knobloch vel Knoblauch, Hispani Ajos, Galli Ail & Aux. Scorodō Aristophanis enarrator in Pluto dici tradit, quasi σχορδόνιον, id est, rudem & iniuriam rotam, quod asperè suprà modum redolet, & olfacientium nares offendat. Latinos Allium dixisse putat Ruellius à Græco ἄλλεα, quod exiliendo crescat. Alij varietates hæc sunt Theophrasto. τὸ δὲ σκορδον φύεται μὴ μικρὸν πρὸ τρωπῶν, καὶ τρωπῶν, διακρίνεται ἐν γένει (legendum ἢ γέλοις.) διαφορά δὲ ἐστὶν αὐτῶν, ἢ τῶν φύων πρὸς τὸ παλαιότερον γένος γὰρ τι τυγχάνει τοῦτον. ὅθεν (repono, ὅ, τε ἐν) ἐξήκοντα τοῖς χρόνοις τελεῖται, καὶ μεγέθει καὶ μικρότητι. Ἐ τῶ μεγέθει γένος τι διαφέρειν ἐστὶ μαλιστα τοῦ παλαιότερου τοῦτον, ὅπερ ὅχι ἐφύσιν, ἀλλὰ πρὸς τὸς μυτιλοῦς χεῖνται: καὶ ἐν τῇ τριῖσι θήμισιν ποιεῖ τὸν ὄγκον ἐκπνέμεντον, καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ἔχειν ἐν τὰς γέλοις. ἢ ὁ γαυρότης. Ἐ ἡ εὐωδία, καὶ ἡ ἀδρότης χεῖνται πρὸς τὰς ὥρας (legendum χώρας) γίνεσθαι, καὶ τὸ θερπείας. ὅπερ καὶ τῶν ἄλλων. Id est, Allium feritur paulò ante solstitia, aut post solstitia in ipis diuisum. Differunt Allia, quod alterum sit serotinum, alterum præcox: est enim genus quoddam, quod sexaginta diebus perficitur. Differunt & magnitudine & paruitate. Magnitudine excellit maximè quod Cyprium vocatur: quod non decoquant, sed ad inrita, quæ Myrtota appellantur, vtantur, & cum teritur in molem admirandam flatu intumescit. Præterea quædam ex spicis non coagmentantur. Dulcedinis autem, odoris, & crassitudinis Alliorum, quæ admodum & cæterorum satorum, causa sunt natura loci & cultus. Ex quibus hæc sumpsit Plinius Allium ad multa ruris præcipuè medicamenta prodesse creditur. Tenuissimis, & quæ separantur in vniuersum, velatur membranis: mox pluribus coagmetatur nucleis, & his separatim vestitis, asperi saporis: quo plures fuere, hoc asperius. Tardium huic quoque halitus, vt Cepis, nullum tamen coctis. Generum differentia in tempore. Præcox maturefcit sexaginta diebus. Tum in magnitudine. Vlpicum quoq; in hoc genere Græci appellauere Allium Cyprium, alij Antiscorodon, præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, grandius Allio. Triterum in oleo & æeto mirum quantum increfcit spuma. Ex his intelligimus prægrande Allium Vlpicum Latinis dici, quod Theophrastus Cyprium vocat, quod Antiscorodon dici corruptè in Plinij vulgaris exemplaribus legimus, cum ex Columella Aphroscorodon legendum videatur, qui Vlpicum, non Cyprium, sed Punicum Allium appellat. Verba eius hæc sunt. Vlpicum, quod quidam Allium Punicum vocant, Græci autem ἀφροσκορδον appellant, longè maioris est incrementi quam Allium. Sed hic dubitare licet, an Aphroscorodō à spuma, quæ Græcis ἀφρος dicitur, qua increfcit, vt Plinius ait, vel, vt Theophrastus, ἐκπνέματι, an ab Aphrorum gente, cum Columella Allium Punicum appellet. Id quod Plinius etiā non differtur, scribens Vlpicum præcipuè Africæ celebratum inter pulmentaria ruris. Iam verò quod Theophrastus genus quoddam Allij nucleos habere negat, id Dioscorides in Aegypto nasci tradit, Matthiolus in Hetruria, & multis aliis Italia locis, vbi Allium mas appellatur. Dioscoridi Allij genera sunt duo. Satium siue hortense, & siluestre, quod Ophioscorodon, id est, Anguinum Allium vocat, & Euphioscorodon, id est, Ceruinum Allium. Recentiores siluestris duo genera faciunt tenuifolia, aliud latifolium maculosum serpentinum, Ophioscorodon. Præterea aliud vrsinum etiam latifolium. Allium satium fronde viret cepitia, sed minime caua: caule tereti & inani, in cuius cacumine flores in globum circumaguntur, in quo semen emicat. Radicis bulbus tenuibus velatur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & iis separatim vestitis, in cuius vertice complures

Lib. 1. c. 20.

Lib. 7. hist. cap. 3.

Lib. 19. c. 6.

Lib. 1. c. 3.

Lib. 2. c. 146.

Forma.  
Ruell. lib. 2.  
cap. 87.



*ALLIVM sativum*  
silvestre, Matthioli.



Pena in  
Aduerf.

*Locus.*

rum Allij vrsini speciem proximè referunt & redolent, radicis ceruice longiore, rimosa cute obsita. Allium hortense passim in hortis satum provenit. Silvestre sponte in arvis & capestribus, inuisum alicubi colonis, quia segeti innatum prauum odore & saporem ei comunicat, quo deinceps tum farina, tum panes imbuntur.

*ALLIVM Vrsinum latifolium,*  
Fuschij & Dodon.



*ALLIVM Vrsinum,*  
Matthioli.



*Vrsinum*



ALLIVM anguinum,  
Matthioli.



Vrsinum in editis montibus & umbrosis, vel  
vdis pratenſibus. Anguinum maculoſum etiam  
in montibus. Hortenſe & ſilueſtre aſtate flo-  
rent. Vrsinum Vere, Aprili & Maio menſibus. *Tempus.*  
Vis Allio eſt acris ex Dioſcoride, calfacit, flatuſ *Li. 2. c. 146.*  
excernit ( Legendum enim non εκκρῖναι, φου- *Vires et*  
σώζειν, id eſt, vim excernendi, flatuoſum, ſicut in *Temper.*  
publicis codicibus habetur, ſed εκκρῖναι φου-  
σώζειν ) alium turbat, ſtomachum exſiccatur. Sitim  
efficit, flatuſ alterat aut concoquit (Ruellius in-  
terpretatus eſt, flatum permouet, cum Græcè  
legatur, εκπιδιδωσκεισ ἀλδοιωκην, id eſt, fla-  
tuum alteratricem, aut concoctricem vim ha-  
bet.) Summam corporis cutem exulcerat. Eſu  
latòs ventris lumbricos expellit. Vrinaſ ducit.  
Contra viperarum morſus & hæmorrhoidum  
prodeſt, ita vt non aliud magis ( Græci habent,  
εχιδνητοῖς τε, καὶ αἱμορροῖσι ἀρμόζει, &c. Sunt  
enim αἱμορροῖντες q. per vniuerſum corpus ſan-  
guinem fundunt, ab Hæmorrhoi, ſue Hæmor-  
rhoidis ſerpentis morſu ) ſi vinum iugiter ſuma-  
tur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabio-  
ſorum morſus vtiliter illinitur. Contra aqua-

rum mutationes confert. Aſperas arterias clarificat. Veterem tuſſim etudum &  
coctum eſu lenit. Cum origani decocto potum pediculos & lendes enecat. Vſtum  
& cum melle ſubaſtum illitumque hypopia & alopecias ſanat. Exanthemata cum  
nardino vnguent, ſule & oleo curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, le-  
pras, ſurfureſque eximit. Cum teda & thure decoctum, ſi in ore contineatur, den-  
tium dolore leuat. Contra muris aranei morſus cum ſiculneis foliis & cumino  
illinitur. Comæ decoctum in infeſionibus menſes & ſecundas trahit. Eiuſdem  
gratia ſuſtitur, factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci μυτιωλον vocant,  
vinam cit, & aperiendi vim habet. Vtile etiam hydropicis. Hic Myrtori vox ali-  
quorū ab Hippocrate vſurpatur, vt in libro de viſu, de medicamento quodam  
oculū ſcribens. καὶ ὀλίγον ἀναμίξειν, ἕως ἂν πάχον γένηται ὡς μυτιωλός. Cuius vocis  
Galenus meminit in Gloſſis Hippocraticis, Dioſcoridem citans. μυτιωλον ὑπερδύμια  
ἐκπνεύοντις ἔλαι φησι σκορόδου ἢ κρομύνης. Quæ de hoc Dioſcoridis loco intelligi  
poſſunt. Eadem voce vſus eſt Theophraſtus loco ſuprà à nobis citato. Allij vires  
aquaſ exponit Plinius his verbis. Allio magna viſ, magnæ utilitates contra *Lib. 20. c. 6.*  
didere, & beſtiarum omnium iſtibus medetur potu, vel cibo, vel illitu: priuatim  
contra hæmorrhoidas prodeſt cum vino redditum vomitu. Ac ne contra araneo-  
rum murium venenatum morſum valere miremur, aconitum, quod alio nomine  
pardalianches vocatur, debellat: item hyoſcyamum: canum morſus, in quæ vul-  
nera cum melle imponitur. Ad ſerpentium quidem iſtus potum cum reſtibus ſuis  
Alij cum veſtibus, id eſt, membranoſis corticibus ) efficaciffimè ex oleo illinitur:  
auritiſque corporum partibus, vel ſi in veſicas intumuerint. Quin & ſuſſitu eo  
ſecundas partus euocari exiſtimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo capi-  
re. Diocles hydropicis cum centaury, aut in fico duplici ad euacuandam aluam:  
quod efficacius præſtat viride cum coriandro in mero potum. Suſpirioſis aliqui  
&

Libro de  
morb. mu-  
lier.







BVLBOSARVM, ET CARNOCARVM, &c. LIB. XV. 1549

& senis ex squamatis cuticulis coacto, odoris ingrati, Allij, vegetioris. Item aliud, crassioribus & longioribus nucleis: bulbus eius stipatur membranis inuolucris ex atro flauentibus: flos & folia Allij exiliora: odor & sapor Scorodoprafi. Magis spirare Allium ait Pena, sed propius exprimere Porrum, quod in cliuosis vineis,

SCORODOPRASVM,  
Matthioli.

SCORODOPRASON alterum  
duplex, Lobelij.



& incultis ericetis Ligurum, Niceæq; in Sabaudia sponte prouenit. Quare fallitur Marcellus Vergilius, qui, quod Plinius huius plantæ non meminerit, nec alij rei rustice scriptores, monstrum aliquod Naturæ credit id fuisse, coactis humano opere coalescere simul non dissimilibus penitus oleribus duobus: qualia in re rustica aliquando excogitata in maiore ocio ab aliquibus fuere. Scorodoprason, ut scribit Dioscorides, promiscuas sibi vires ex Allio & Porro vendicauit, effectus Li. 2. c. 147. Allij & Porri præbens, sed inefficacius. Coctum Porri modo dulcescit, & in olerum vicem transit. Idem Galenus tradit, Scorodoprason sicut gustu & odore median Lib. 8. sim. Allij & Porri qualitatem possidet, ita & viribus.

ORCHIS.

CAP. XII.

**O** VM Bulbis, Hyacinthis, Cepaceis, atque aliis similibus Testiculos & Satyria recensere conuenit. In quibus qui ὄρχις, & κρυδὸς ὄρχις Græcis, Latinis similiter Orchis & Cynorchis dicitur, Officinis Testiculus canis, Arabibus *Chafi alkes*, seu *Chafi alchels*, Italis *Testicolo di cane*, Germanis *Knabenkraut*, Hispanis *Coyon de perro*, Gallis *Couillon de chien* & *du Satyrion*, Officinarum nomen retinentes. Nam Officinæ Orchies Satyria nominant, & eorum bulbis legitimi Satyrij vice vtuntur. Præbuisse occasionem videtur Apuleius, qui nullam inter Satyria & Orchies differentiam facit, sed vtrumque Satyrium cum veroque Orchis canis videlicet dicto, & Serapiade confundit. Græcis, inquit, dicitur Satyriū, aliis Cynorchis, aliis Eutaticos, Panion, Serapion, aliis Orchis, Galienum Vram, Itali Priapiscum, alij Orminalem, alij Testiculum leporinum nominant. Orchis

Nomina



Orchis dicta est herba, quod radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohereant. Cynosorchis verò quod canum testiculis similem radicem habeat.

**Genera.** Orcheos duo esse genera dixerunt Dioscorides, Galenus, Plinius, Orchin siue Cynosorchin, & Orchin Serapiada. Multò plures sunt recentioribus differentia, omnes à radicis effigie sic nominata. Fuchsius Orcheos duo genera facit, marem & fœminam. Marem item duorum generum, vnum latifolium, alterum angustifolium: fœminam itidem duorum generum, vnam maiorem, alteram minorem. Matthiolus quinque Orcheos species depinxit, foliis & floribus differentes, quibus addidit Palmæ Christi species duas, de quib⁹ capite De Satyrio dicemus. Dodonæus Orcheis quatuor generibus distinxit. Primi generis, Orcheos videlicet, siue Cynosorchis quinque species constituit, duas priores maris, tres reliquas fœminæ nomine designans. Secundam Tragorchin, id est, Hirci testiculum. Tertiā speciem duplicem etiam, marem scilicet & fœminam. Quartam quoque duplicem, hanc maiorem, illam minorem. Alio in libro Orcheis quinque generibus comprehendit. Primum Cynosorchin vocat, cuius species quinque, secundum Testiculum morionis, tertium Tragorchin, quartum Orchin Serapiada, quintum Testiculum odoratum, siue Testiculum pumilum. Orchis siue Cynosorchis, ut describit Dioscorides, folia habet circa caulem, & ima eius parte per terram strata, molli similia, angustiora tamen, lævia & longiora: caulem dodrantali altitudine, in quo flores purpurei: radicem bulbosam, oblongam, duplicem, oliuæ modò angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem mollem ac rugosam, illam verò plenā. Plinius Cynosorchin, aliqui Orchin vocant, foliis Oleæ mollibus, ternis, per semipedem longitudinis in terra stratis: radice bulbosa, oblonga, duplici ordine, superiore quæ durior est, & inferiore quæ mollior. Hanc Orcheos delineationem Dodonæus primo, vel secundo, vel vtrique Cynosorchis conuenire censet, & falsò legi apud Dioscoridem folia ἐλαττωμένα ὄνεια, pro σκιδναῖα μαλακῆ, ut Scilla intelligatur Epimenidia, foliis minus asperis & angustioribus, quam hîc Dioscorides mollem appellat. Hanc lectionem confirmat Theophrasti auctoritate, qui de Orchi scribens ait, ὅτι φύλλον σκιδναῖες, id est, folium Scillæ habet. Quare paulò post dicturi sumus. At priorem in Dioscoride lectionem agnouit Plinius loco iam citato, Orchideas mollia folia assignans, & Theophrastus, ut ex eodem Plinio colligere licet, non de Cynosorchis, sed de Orchis Serapiade hîc verba facere videtur. Cynosorchis prima species, auctore Dodonæo, folia fert lævia, pingua, Lilij foliis, propemodum similia: caulem pedalem ait altiore, angulosum, & in eo flores purpureos, spicatim digestos, colore rubentis dilutæ purpurei cucullo aut galeæ patenti similes, ex quibus parte inferiore laciniosum quiddā, canis aut alterius animalis quadrupedis exuuii simile dependet, dilutè & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respergitum. Pro radicibus præter fibras supra adhaerentes geminos sunt bulbi veluti testiculi, forma aliquantum oblongi, quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior. Secunda species foliis similibus læuibus, oblongis & latis est, sed quàm antecedentis minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulē amplectentibus qui dodrantalis est, spica densa brevis.

In c. 124. &  
125. lib. 3.  
Lib. 2. hist.  
cap. 46.

De flor.  
cap. 61.

Lib. 3. c. 124.  
**Forma.**

Lib. 27. c. 8.

De flor. c. 61

**ORCHIS** 1. species Dod.  
s. Matth.

Lib. 9. hist.  
cap. 19.

1. Cynoso.  
Lib. 2. hist.  
cap. 46. &  
De flor.  
cap. 61.



Dod. ibid.

quorum vnus plenior ac vegetior, alter rugosior. Secunda species foliis similibus læuibus, oblongis & latis est, sed quàm antecedentis minoribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulē amplectentibus qui dodrantalis est, spica densa brevis.



ORCHIS II. species Dod.  
& Matthioli.



brevi, in qua flores multi, colore ex cādido pur-  
puralescentes, multis purpureis punctis, & inte-  
riore parte obscurioribus, copiosis, exiguis li-  
neis ornati, forma galeam aut hiantem cucullū  
referentes, dependente ex singulis veluti ani-  
malculi quadrupedis, aut homunculi extensis  
brachiis, & diuaticatis cruribus absque capite  
corpusculo: radices duæ subsunt globosæ, nu-  
clei nucis myristica magnitudine, adharētibus  
ad annexū fibris aliquot crassiss. Tertia Cynof-  
orchis species folia edit angusta, striata, Planta-  
ginis angustifoliæ foliis quodammodo similia:  
caulem dodrantalem: flores in breui densaque  
spica copiosos, colore foris puniceo, & obscurio-  
rem purpuram referente, intus verò albicante,  
eiusdem cum superioribus formæ, sed tamē mi-  
nores, dependente quoque ex ipsis rudi ac infor-  
mi exiguo veluti quadrupedis animantis rudi-  
mēto. Radices subsunt aliorum Orcheon simi-  
les. Exhibuit Matthiolus eam, quæ hīc expressa  
est, Testiculi speciem tertiam sine vlla deline-  
atione. Illi & alius floribus per omnia similis, fo-  
liis tamen latioribus, & secundum referētibus.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Dod. ibid.

Orchis  
genus. 2.  
De flor.  
cap. 61.

Iam & quinta quædam species reperitur, foliis vti secundus canis testiculus, caule  
pedali, spica longa, floribus colore herbaceo subuirentibus, ex quibus quod laci-  
næ simile dependet, oblongum est, & quasi quadrangulum. Hæ sunt primi gene-  
ris Cynosorchios species. Secundum Orchews genus, Testiculus morionis à Do-

ORCHIS III.  
Dodonæi.

TESTICULI III.  
species, Matth.



QQQ



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

## ORCHIS IIII. & V.

*Dodonæi. I. March.*



modo adnascuntur, non erectis, sed ipsi floris cucullo ita incumbuntibus, ut non facile obseruentur: gemini & huic testiculis similes globuli exeunt, & supra annexum aliquot fibræ. Et vni quidem huius generis flores purpurei, violæ ferè nigre colore, in medio candidiores, punctis aliquot variegati, pluresque in dēfiori spica

donæo dicitur, isque duplex, mas & fœmina. Mari folia sunt quinque aut sex, lata, læuia, lilijs foliis similia quidem, sed minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata: quorū vnum atque etiam alterum caulem amplectitur, qui dodrantalis est: flores in spica purpurei, circa umbilicum albidiores, odorati & aspectu grati posterius corniculum habet propendens, simile ferè corniculo Regij floris, antèrū verò cucullum auriculatū & cristarum morionis referunt. Nam cuculli quidem & patētis galeæ modo flosculus hiat, & angusta folia quæ à laterib⁹ surgunt, auriculas, quod verò ē medio attollitur cristam refert. Radices gemini sunt globuli, nucleo nucis myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. In historia stirpium Orchis secundum genus facit Dodonæus, Matthiolas Testiculum quartum. Fœmina folia habet similiter læuia, sed angustiora, & aliquantū venosa siue striata, Plātāginis angustifoliæ quodammodo similia: flores hiantes quoque & velut patentes cucullos, à tergo dependente ē singulis corniculo, sed foliolis quæ cristæ auriculatū

TESTICVLVS Morionis  
mas, Dodonæi.



TESTICVLVS Morionis  
fœmina, Dodonæi.





caulisque quàm reliquorum longior. Alteri flores dilutè rubent, cauliculus breuior est, & folia aliquatenus minora. Tertij flores purpuram referunt exquisitè rubentem, & vermiculum colore: densa huic breuisque spica: flores minores: folia nonnihil striata, pleraque erecta, & caulem circumamplectentia. Sunt verò & huius generis minores Testiculi, quibus cauliculus brevis est: folia paruula, quina aut nunc in cæruleo purpureo diluti, nunc candidi, quandoque rubentes, sed coloris obsoleti & odoris ingrati. Tertium Orchæus genus Tragorchis nominatur, id est, Hirci testiculus, ab aliis Testiculus leporis: tamē ab odore, quo hircū, cū in flore est, refert, Hirci testiculus potiùs appellandus: folia similiter læuia, lata, & longa

*ORCHIS Saurodes vel Scinophora*  
Gemma: Testiculus Hircinus vulgaris.



fert, Liliaceis proxima, maiora quàm aliorum Orchæon: caulem cubitalem, sæpe foliis nonnullis inferiùs implicatum: flores secundum caulem in longa veluti spira multos, foetidos & hircum olentes, quorum forma patenti quoque galeæ similis est, ex quibus tamen non exuio simile quid, sed longa, aliquantulum retorta veluti laceratæ cum medio corpusculo cauda propendet, coloris eius cuius est caulis, purpureis aliquot punctulis circa annexum insignita: semen in valvulis oblongis & striatis gignitur perexiguum: testiculi subsunt grandes, fibræ aliquot suprâ adherent. Eius iconem infra posuimus. Quartum Orchæus genus Serapias ab antiquis cognominatur auctore Dioscoride, quoniam

*Saurodes, Scinophora*  
*ante Saurodes hirci*

Lib. 3. c. 116.  
Cap. 210.  
hist.

Lib. Geo.  
17.  
Lib. 6. & 7.

De flor.  
cap. 61.  
Cap. 210.

Lib. 3. c. 125.

Lib. 9. hist.  
cap. 19.

In corall.  
cap. 143.  
lib.

radix ad multa utilis sit. Sunt qui à Serapi Alexandrinorum Deo sic nominatum velint, inquit Fuchsius, propter lasciuia impudentē, qua is Deus Canopi, vbi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur, vt videre est apud Strabonem. Paulo Triorchis dicitur non alia de causâ, quàm quòd tribus testiculatis radicibus in terra nititur, quas etiam Fuchsius vtrique Serapiadi appinxit. Plinius tamen & Theophrastus non nisi geminos bulbos Serapiadi tribuerunt, neque plures duobus in his vel aliis testiculis se obseruasse Dodonæus affirmat. Huius Serapiadis duo genera depinxit Fuchsius, marem & fœminam. Dodonæus tria. Vnius flos papilionem, alterius fucum, tertij muscam refert. Orchis Serapias, vt describit Dioscorides, folia Porro similia habet, oblonga, latiora & pingua, in alarum cauis inflexa: cauliculus dodrantales, subpurpureos flores: radix subest testiculis similis. De quo hæc scripsisse videtur Theophrastus. κατὰ πᾶν ἐπὶ τῆς ὀρχέως καλῶς ἔχουσιν ὁμοίαν τῇ μὲν μεγάλῃ, τοῦ δὲ μικροῦ, τὸν μὲν μέγαν ἐνεργότερον ποιεῖ πρὸς τὴν ὁμοίαν, ἐν γὰρ καλῇ διδόμενον ἀγρὸς ὀρεσίνους, τὸν δὲ ἐλάττω σίνεα καὶ καλῶς ἔχει πρὸς τὸν μὲν φύλλον σιλωάδες, μετώτερον δὲ καὶ ἐλάττω. τὸν δὲ καλὸν ὁμοίαν τὸν ἀπὸ ἀπύρρω, ὡς ἔστιν. Quæ sic vertit Gaza. Sicut qui testiculus appellatur. Cū enim gemini sint, alter magnus, alter autem paruus, magnum efficacem ad coitum, datum ē verum caprino tradunt, minorem verò obesse, ac inhibere. Habet folium Laferis, hunc locum mendosum esse testatur Plinius, vt rectè Hermolaus annotauit. Non enim Silphij seu Laferis folium habet Serapias, vt Gaza conuertit, σιλωάδες pro



σκιλλῶδες legens. Etenim Silphio folium est. Apij, nō scillaceum aut porraceum, vt Serapiadi. Deinde spinosus huic herba caulis, & Apio, id est, Raphano siluestri, inquit Hermolaus, nō, vt Theodorus, Piro similis. Plinius Theophrastū sic interpretatus est. Sed inter pauca mirabilis est Orchis herba siue Serapias, foliis Porri: caule palmeo: flore purpureo: gemina radice, testiculis simili, ita vt maior, siue, vt aliqui dicunt, durior ex aqua pota exciter libidinem, rarior siue mollior ē lacte caprino inhibeat. Quidam folio Scillæ esse dicūt, læuiori ac minori: caule spinoso. Quare legendum, φύλλον σκιλλῶδες, λειότερον ὃ καὶ ἔλαττον. τὸν δὲ καυλὸν ἀγροῦ γῶδον, ὁμοίωτον ἀπὶ τοῦ, Potest & sic legi, σκιλλῶδες, λειότερον δὲ καὶ ἔλαττον, καυλὸν ἀγροῦ γῶδον, ὅρχω δὲ ὁμοίωτον ἀπὶ τοῦ, id est, Piro. Testiculum Serapiada primum his verbis describit Dodonæus: folia fert duo aut tria, læuia, latiuscula, at Liliij foliis multo mi-

De flor.  
cap. 61.

ORCHIS Serapias primus,  
Dodonæi.



TRIORCHIS Serapias  
mas, Fuchsij.



nora: caulem dodrantalem, aut altiore: flores in eo raros, candidos, papilionibus expansis alis quodammodo similes, ē foliolis scilicet tribus, vno superiore, duobus lateralibus alas referētibz, & longiori, tenui velut papilionis corpore, cauda pro- pendente, melleum & dulcem liquorem continente commissi: qui contorto alio quantulum pediculo cauli adhaerent. Globuli subsunt gemini, candidi & rotundi, & supra eorum annexum fibræ aliquot pro radicibus. Secundum Serapiadis genus quinis senisve constat foliis, venosis, aliquantulum latis, Plantaginis angustius foliæ quadantenus similibus, sed minoribus, quibusdam terram versus reflexis aliis circum caulem, qui palmaris aut dodrantalis est: floribus in summo quinque aut sex, ex aliquot foliolis compositis, quorum inferius forma, & colore subnigro sordido fucum proximè referre videtur: testiculi subsunt vt aliis gemini. Reperiuntur huius species duæ: vnius flos foliola maiora, candidiora, & aliquantulum purpurascens habet: alterius omnino minora & subiuventia. Huius caulis est maior, illius altior. Est Triorchis femina Fuchsio. Tertiis Orchis Serapias foliis est minoribus & paucioribus: cauleque breuiori ac tenuiori quàm secundus, cui alio qui satis similis est: flores huic tres aut quatuor, ex tribus exiguis superioribus foliis



ORCHIS Serapias secundus, Dodo.  
Math. Testiculus 11.

TRIORCHIS Serapias  
tertius, Dodonai.



TESTICVLVS odora-  
tus, Dodonai.



liolis, & quarto inferiore oblongiore, colore in purpu-  
ra tristi subnigro, nonnihil variegato, forma musca  
cuiusdā corpori similes. Testiculi veluti geminae par-  
uae pilulae sunt. Secundum ex his Serapiada praesertim  
maiores Dodonaeus cum Dioscoridis delineatione  
conuenire ait: folium enim ei Marrubij folio longius  
latiusque & laeue est, quod reflectitur: caulis dodranta-  
lis: florum superiora foliola dilute in candore ruben-  
tem purpuram referunt: testiculi exigui sunt. Vbi Do-  
donaeus *ὄρχις ὑπομαρτυρία*, id est, Marrubio, pro *ὄρχις*, id  
est, Porro legit, Pliniumq; qui folia Porri ei tribuit, in-  
terpretibus omnibus errandi occasionem dedisse ait.  
Quintū Orchios genus Testiculus odoratus, siue pu-  
milio nūcupatus, omnium foliis minimus est: etenim  
ei foliola sunt omnino paruula, eaque venosa, & Plan-  
tagini aliquatenus similia, sed minutis ac paruulis eius  
foliis minora, virentia: caulis tenuis est, palmi altitudi-  
ne, circa quem flosculi paruuli, candidi, suauiter odo-  
rati, ordine digesti, ac spirae modo caulem ambientes:  
bulbi subsunt gemini, parui, oblongi. His addo Te-

Lib. de flo.  
cap. 61.

Genus  
Orchios.  
Dodon. de  
flor. ca. 61.

sticulum vulpis vulgò vocatum, seu Testiculum sacerdotis, Germanis *Stendeluurtz*,  
quem Fuchsius Satyrij trifolij nomine descripsit & depinxit. Tria duntaxat ferè  
semper folia profert Lilij albi foliis similia, minora tamen & rubicundiora, cau-  
lem pedalem, in quo flores venusti, radices cauae floribus haud dissimiles, modò  
nuci candoris, modò saturè purpurei: radices sunt veluti nuges duae exiguae, vel  
oluae coherentes, foris rubescentes, intus candidae, quarum vna plenior & maior,  
altera minor, spongiosa, flaccida, sapore dulci & grato. Est alius Orchis, rotundus

Cap. 269.  
hist.  
Dodo. lib.  
2. cap. 46.





à Dalechampsio cognominatus, radice gemina, testiculis simili, carnosa, superius  
 fibrata: caule unico, cubitali, rotundo: foliis ad summum tribus vel quatuor, latis,  
 venosis, pallidis, arundinis instarè caulis amplexu sese explicantibus: flore pun-

*CYNOSORCHIS maior Lob.*

Serapias Dioscor.

Gemma.



I.  
 II.  
 III.  
 IIII.  
 V.  
 VI.

ceo in capitulis globosis, & aliquantulum com-  
 pressis, non aliorum generum modo in thyris  
 longo & spicato emicante, capituli verticilli vel  
 de industria affixo. Præterea observavit Dale-  
 champius in editis montibus Orcheos genus  
 humile, rarum flore luteo, tribus aut quatuor  
 foliolis constans, cætera vulgò cognitis simile.  
 Prope oppidum Monspelio vicinum, Vegetius  
 nominatum, id genus nascitur. Orcheon gene-  
 ra aliter distinxit Lobellius ex Cornelio Gem-  
 ma, & multò plura spectanda nobis proponit  
 ut tum huic, tum illi multarum id genus plan-  
 tarum cognitionem acceptam referre debeamus.  
 Sunt omnes ordine, qui sequitur, expre-  
 ssæ. Cynosorchis Morio, Orchis mas angustifolia  
 Fuchsij, Satyrium Apulei, Orchis Delphinia  
 palustris Corn. Gemma, Testiculus Morio-  
 rionis mas Dodonæi. Cynosorchis maioris spe-  
 cies secunda, Cynosorchis altera Dodo. Cyno-  
 orchis Morio fœmina Dodonæi, Orchis Del-  
 phinia mōtana Corn. Gemma. Testiculus Serapias  
 cinus. Testiculus vulpinus primus, Orchis Serapias  
 primus Dodonæi. Testiculus vulpinus secundus,  
 Orchis Serapias secundus Dodonæi. Hi



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1557

sticuli suprà descripti sunt, & depicci. Cynosorchis Lobel. maior. Serapias Diosc. VII.  
Cornel. Gemma, siue Basilica, Syderites vel Erythraea, floris omnino purpurei,

SERAPIAS Dioscor. 2. Gemma  
Orchis Basilica altera, Cynof-  
orchis altera maior, Lob.

& aliarum omnium facile princeps. Cynosor-  
chis altera maior Lobellij, Serapias Dioscori-  
dis secunda. Corn. Gemma, siue Orchis Ba-  
silica altera Syderites flore candidiore, thyr-  
soq; magis compresso, & foliis latioribus vsq;  
ad verticem inflexis, circa caulem argenteis.

In Serapiadum genere principes, siue Basili-  
cas appellauit Corn. Gema, ob regalis sceptri  
diadematis ac trabae similitudinem. Maior  
tum prima, tum secunda foliis constant per-  
fectè virentibus instar Porri, oblongis, pin-  
guibus, paulò latioribus, interdum leuiter in-  
flexis: testiculi perfectè rotundi: cauliculus  
dodrantalıs, sæpe procerior: flos venustissi-  
mus, valde purpureus, interdum leuiter sub-  
purpurascens, dispositis ferè in umbellæ dila-  
tescentis speciem, nulla odoris gratia. Altera  
flore minùs purpureo, magisq; in aciem ex-  
plicato. Floret vtraque à principio Iunij men-  
sis, sæpe vsque in medium Iulij, constante spe-  
cie & venustate mirabili. Erumpunt folia cir-  
ca solstitium Hyemale. Gaudet vmbrosis &  
asperis, muscoso solo, & maximè graminetis.  
Vulgaris Testiculus hircinus, seu Tragorchis, IX.



TRAGORCHIS minor, &  
vrior, Gemma.

ORCHIS Melittias,  
Gemma.





- X. & Leporis testiculus nostrâs, quem iam descripsimus, Orchis saurodes vel Scin-  
cophora, lacertarum æmulatione, Cornel. Gemmæ, siue Tragorchis altera. Tra-  
XI. gorchis minor & verior Corn. Gemmæ, siue Coriosmites, siue Coriophora, flore  
XII. instar Cimicum. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens, Orchis

ORCHIS Myodes I.  
Gemma.

XIII.

XIII.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

ORCHIS Sphecodes,  
Gemma.

ORCHIS Myodes  
altera, Gemma.

Myodes prima Cor. Gemmæ, floribus muscam  
exprimens. Hæ duæ postrema videntur refer-  
re Orchis Serapiam marem & fœminam Do-  
donæi in Historia stirp. Vulpinus Testiculus,  
siue Orchis Myodes lutea Narbonensis, con-  
gener cû minimo Testiculo vulpino, floribus  
fucum colore & effigie repræsentantibus, Or-  
chis Serapias 3. Dodonæi, supra descriptus. Or-  
chis Sphecodes Gemmæ, Gallicè *Mouscheugeste*, &  
Belgicè *U-vespen*. Huius ex magnitudine, &  
floris intenso & remisso colore varietas geni-  
na conspicitur. Orchis Myodes altera Corn.  
Gemmæ, folio laxiore & flore grandiusculo.  
Orchis Ornithophora, vel Ornithes, folio laxi  
Corn. Gemmæ, Testiculus Vulpinus Lobellij,  
papilionis alas expansas referens. Orchis Or-  
nithophora folio maculoso Corn. Gemmæ, cu-  
ius differentiæ multæ sunt, ex floribus purpu-  
reis, subpurpurascens, albis: foliis prægradi-  
bus, parvis, ovalis figuræ, ex acuto in latum de-  
sinentibus, ex acuto in amplum & rotundum  
flore medio Aprilis ferè, & quandoque sub  
initium, vel finem mensis Martij. Orchis Stra-





teumatica, vel Stratiotes maior, siue Militaris Cor. Gemma, quam meritò Basili- XIX.  
cam tertiam liceat appellare. Orchis Strateumatica minor Cor. Gemma. Or- XX.  
chis Barrachites, vel Batrachoides Gemma, Belgarum *Vorskens*, id est, Ranula, à XXI.  
floris figura. Orchis Hermaphroditica secunda Cornel. Gemma, siue Orchis XXII.

ORCHIS *Ornithophora folio*  
*laui, Gemma.*



ORCHIS *Ornithophora foliis*  
*maculosis, Gemma.*



ORCHIS *Strateumatica maior,*  
*Basilica 3. Gemma.*



ORCHIS *Strateumatica*  
*minor, Gemma.*



*psychoides*



psychoides diphylla. Testiculus odoratus, à nobis suprâ depictus & descriptus.  
 XXIII. Orchis Spiralis Cornel. Gemmæ. Huic adiungitur Tetrorchis, vel Triorchis al-  
 ba Spiralis, vel Autumnalis Cornel. Gemmæ. Alter Pumilio, inquit, flore candi-  
 do odorato, rectè Spirale Satyrium vel Autumnale vocetur. Estq; vt plurimum

ORCHIS Batrachoides,  
 Gemma.

ORCHIS Hermaphroditica Gemmæ  
 siue Orchis psychoides diphylla.



TETRORCHIS vel Triorchis  
 alba, Gemma.



ORCHIS Frisia litoralis,  
 Gemma.



Triorchis



Triorchis, aut Tetrorchis, oblongis bulbis instar oliuæ compressæ, folia rhomboide, impensè virentia, cum fulgore subatro. Flores in spiram aptè dispositi forma diadematis, vt Testiculo odorato. Erumpunt folia mense Septembri, flores iam marcescēte, ac perseverant vsque in Maium, inde verò per æstatē delitescunt:

TRIORCHIS lutea  
Gemma, Lobell.



TRIORCHIS lutea, flore  
luteo Gemma, Lobell.



erumpit autem cauliculus mense Augusto, florens vsque in Septembrem. Orchis Frisia litoralis Gemma, quæ gemina inferiora folia

bifolia, Plantaginis latifolia angustiora edit, & in dodrantali cauliculo herbaceo, siue luteo virentes flosculos in horto D. Braconis. Eadem, aut illi congener est Triorchis lutea altera Corn. Gemma, folio rotundiore & latiore quàm Triorchis albæ virētiore, trifolia & nonnihil hirsuta. Est eiusdē Triorchis lutea tertia, cuius effigies hic appositæ est, sed oblongioribus radicis oliuariis bulbis. Sequitur Orchis minor Leodienfis Triorchis lutea, flore luteo, siue

Basilica minor Corn. Gemma. Serapias & Triorchis quorundā. Terna folia angustiora, Quinqueneria Plantaginis amula edit, laeuore & viriditate Auriculæ vrsinæ, vti superior flos

itidem in cauliculo exili testiculi odorati pari. Radix ternis & quaternis pusillis, pendulis testiculis subest, quibus diuicatur & propagatur. Collibus agri Leodienfis gaudet. Dicitur hæc Basilica minor Gemma, Pumilio, flore luteo nonnihil herbaceo instar regij diadematis, odore fragrantissimo, cui vis ad excitandam venerem præ cæteris admiranda: quare Hispani *Amor di donna* meritò appellant: testes parui, rotundi, solidi, cortice rufo obducti. Folia emergunt prius Maio mense, vel circa finem Aprilis: floret mense Iulio vsque in Augustum: valde sese multiplicat sub terris. Gaudet montosis. Duæ, quæ sequuntur, à nobis descriptæ sunt & depictæ capite de Satyrio. Serapias mas læui folio, floribus dilutè purpureis, notulis conspersis, Satyrium Basilicum primum Dodonæi, Palma Christi Herbariorum, & Serapias scemina pratensis, foliis notulis inspersis, Satyrium Basilicum alterum maius Dodonæi, & Palma Christi. Serapias candido flore montana maculatis foliis, Cynoforchis montana folio maculoso Corn. Gemma in pratis niueo flore crebra visitur: cætera haud absimilio Satyrio Basilico altero Dodonæi. Serapias minor rubra nitente flore angustifolia, nullis inspersis punctulis. Serapias palustris latifolia, Cynoforchis palustris platyphylla, folio læui luteoque, flore albo, subpurpurascēte Cornel. Gemma

XXIII.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.



*SERAPIAS candido*  
flore, Lobell.

*SERAPIAS minor rubra,*  
Gemma.



*CYNOSORCHIS palustris*  
Platyphylla, Gemma.



*SERAPIAS palustris altera*  
Leptophylla Gemma.



- xxx. Gemmæ. Præcior est violacea Cynosorchi. Serapias palustris altera Lep-  
phylla. Serapias palustris tertia, Cynosorchi altera Corn. Gemmæ, ferius florens.  
xxxii. coma violacea, foliis interdum læuibus, interdum maculosis. Serapias montana  
xxxii. folio læui, Cynosorchi montana folio læui Corn. Gemmæ. Cynosorchi Dra-  
contis



SERAPIAS palustris  
III. Gemma.

SERAPIAS montana folio  
leui, Gemma.



CYNOSORCHIS Dracon-  
tias, Gemma.

CYNOSORCHIS  
Conopsea.

~~serapias~~ ~~serapias~~  
calce.



contias foliis & floribus impensè rubris Corn. Gemma. Floret circa finem Apri-  
lis, aut initia mensis Maij. Nascitur in humidis & viginosis, præsertim vbi nigrior  
terra est. Cynosorchis Macrocaulos, vel Conopsea, siue Galericulata Cornel. XXXIII.  
Gemma. Floret circa medium finemque mensis Maij, vique ad mensis Iunij ferè

R R R

pro-  
prie-  
tate  
Dra-  
contias



medium. Ad duorum cubitorum altitudinem sæpe pertingit. Flores illi purpurei admodum elegantes, & odorati vt in Serapiade Basilica prima, atque secunda, nisi quod color Conopsea magis dilutus, & hæc alterius velut scemella propria videtur. Gaudet pratis, sed tamen non vsque adeo humidis, vt priores: quin potius medio quodam solo ac temperato. Satyrium

XXXV. SATYRIUM castratum, Gemma.

XXXVI.

Locus.

Vires &  
Temper.  
Lij. c. 24.



CYNOSORCHIS leptophylla, Gemma.



CYNOSORCHIS palustris altera lophodes, Gemma.



Thellala



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1565

Theſſalia mulieres mollem cum caprino lacte bibendam dare, vt ad venerea exci-  
tent, aridam verò ad inhibenda, ac diſſipanda. Alterum etiam alterius potu reſol-  
ui. Eadem planè Plinius tradidit. Eduntur vt Bulbi cocti in vineis ferè inuenti. Li. 27. ca. 8.  
Ex his radicibus ſi maiorem edant viri, mares generari dicunt, ſi minorem fœmi-  
næ, alterum ſexum. In Theſſalia molliorem in lacte caprino viri bibunt ad ſtimu-  
landos coitus, duriorem verò ad inhibendos. Aduerſatur alter alteri. Serapiadis  
radix, auctore Dioſcoride, illita tumores diſcutiendi vim habet, atque vlcera ex- Li. 3. ca. 125.  
purgat: herpetas cohibet: fiſtulas abolet: inflammationes illita mitigat: ſicca nomas  
compescit, vlceræque putreſcentia & maligna oris ſanat. Cum vino pota aluum  
ſiſtit. Feruntur de hac etiam quæcumque de Cynoſorche dicta ſunt. Plinius quæ- Li. 26. c. 10.  
ta: aluum ſiſtunt è vino potæ. Cynoſorcheos radici bulbosæ, ac geminæ, inquit  
Galenus, viſ inest calida & humida, ac guſtantibus duriuſcula eſt. Caterùm ma- Li. 8. ſimpl.  
ior radix multam videtur habere excrementitiã humiditatem & flatuoſam.  
Quapropter epota venerem excitat. Altera minor contrà, admodum elaborata  
eſt ad calidius & ſiccus vergens. Itaque hæc radix tantum abeſt, vt ad coitum ſti-  
mulet, vt etiam contrà planè inhibeat ac reprimat. Orchis Serapias ſiccio-  
riorem obtinet, quã vt primi ordinis haberi mereatur. Quocirca nec proinde  
ad venerem accommodus eſt. Oedemata illitu diſcutit: ſordida vlcera expurgat,  
herpetas ſanat. Siccatus multò ampliùs deſiccatur: nam & putreſcentia vlcera ſanat  
contumaciæque: quippe cum & ſubadſtringens ſit, ac proinde etiam ventrem ex  
vino potus ſiſtit. Hodie Sepplarij, inquit Dodonæus, Orcheon bulbos compo- De florib. cap. 61.  
ſitionibus ad excitandam venerem ſine diſcrimine admiſcent. Præſtantes ta-  
men ſunt Tragorcheos bulbi. Ambo autem aſſumendi non ſunt, ſed durior,  
plenior ac ſucculentior: ſtaccidior ac rugoſior reiiciendus. Eſt autem plenior non  
ſemper qui maior, ſed non rarò etiam minor, ſi videlicet bulbi colligantur priuſ-  
quàm ſtirps deſtuerit, aut cum primùm caulis erumpit. Neque enim ſucculen-  
tior alterum magnitudine ſuperat, priuſquàm ſemen maturari cœperit. Nam  
cum alternis annis vnus bulbus intumeſcat, alter verò pereat, fieri non poteſt vt  
durior ac ſucco plenior ſemper maior ſit. Quando enim folia erumpunt, tunc  
demum, vel non multò antè plenior creſcere incipit, quo paulatim incrementũ  
ſumente alter flacceſcit, rugaſque contrahit, donec marurato ſemine vna cum fo-  
liis & cauliculis ſubinde totus ſubſidat, ac pereat, eo qui interea creuit vegeto, ac  
ſucci pleno.

SATYRIUM.

CAP. XIII.

**I**VSDEM Bulbacei generis cũ Teſticulis eſt *Γαύριον* Græcis dictum, *Nomina*  
Latinis Satyrium, Arabibus *Gaſi alchaleb*, *Chafi australeb*, ſive *Tartarichi*,  
Italīs *Satirio* & *Satirione*, Gallis *Satyrium*. Satyrio nomen fecerunt  
Satyri, qui primi ſilueſtres dii colludentes Nympbis per ſiluas &  
antra, ad firmiorem venerem herbam hanc inuenerunt. Dioſcorides Satyria duo Li. 3. ca. 126. & 127.  
ponit. Vnum Triphyllum, id eſt, trifolium, alterum Erythronium, ſive Erythraicũ, Genera.  
id eſt, rubrum. Præter iſta recentior ætas Satyrium Baſilicum adinuenit, id eſt, Sa-  
tyrium Regium, quod & Palmam Chriſti nominauit, propter ſimilitudinem  
quandam, quam eius radix cum humana habet manu, Germani *Creutzblumen*,  
Galli *Satyrium Royal*. Sed ne quis homonymia fallatur, lōgè alia eſt ſtirps vehemen-  
ter purgans Palmæ Chriſti nomine donata. Satyrium Baſilicum duplex eſt. Vnum  
minus, alterum minus. Quoddam folio non maculato, aliud maculato. Satyrium  
trifolium delineat Dioſcorides his verbis: Folia fert Rumici, aut Lilio ſimilia, mi- Ibidem.  
nora tamen, & rubentia: caulem nudum, longum, cubitalem: florem Lilio ſimilem, Forma.



album radicem Lilio similem, mali modo extuberantem, foris rufam, intus cui modo albam, gustu dulcem, & ori gratam. Satyrium Erythronium semine est Lini, maiore, duro, laui, splendente, quod fertur quemadmodum & Scincus veneri excitare: cortice radiceis gracili, iuso, interiore parte alba, gustanti dulci, & ori non ingrata. In apricis & montosis nascitur. Plinius de iisdem hæc prodidit. Concretricem vim habet Satyrium. Duo eius genera, vna longioribus foliis quam Olea: caule quatuor digitorum: flore purpureo: radice gemina ad formam hominis costium, alternis annis intumescere, ac residente. Altera Satyrium Orchis cognominatur, & semina esse creditur. Distinguitur internodiis & ramosiore humice, radice fascinis vtili. Nascitur ferè iuxta mare. Vbi Cornarius legit ex veteri codice, radice fascini, pro virilimembro fascinum accipiens, in quo significatu vtpote pavit Horatius hoc versu.

Ode 8.  
Epod.

*Minusne languet fascinum.*

Hic Plinius Satyrium cum Orchi confudisse videtur, & ex Latini cuiusdam auctoris sententia ista prodidisse subiungit enim. Græci Satyrium foliis Lilij rubri, minoribus, & tribus non amplius e terra extantibus tradunt: caule laui, cubitali, nudo, radice gemina, cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac minor feminas. Et aliud genus Satyrij (Erythraicum appellant) semine Viticis maiore, lauidura radiceis cortice rubro intus album includi, sapore subdulce: ferè in montosis inueniri. Satyria Dioscoridis vera vix adhuc Herbariis bene sunt cognita: tamen ex Dalechampi coniectura potius quam certa asseueratione ea hic exhibitum. Erythronium, siue Erythraicum montosis & apricis nascitur: radice bulbosa, ima parte fibrata, oblonga, Porro non dissimili, foris subrufa, intus candida, nulla granitate odoris iniucunda, veluti Orcheos, tenera, gustu principio dulci, qualis est Castanea, deinde acri Cepæ Ascaloniae modo, quam aiunt semine perfecto in globosum caput colligi, nuda nigra, crescente verò caule extenuari, ac in locum gummi produci, vt cauli quod satis sit alimentum velut de suo suppeditet, nunc simpliciter, sublut è duabus in vnum coeuntibus iuncta, nascuntibus aliis perpetuò, & coherentibus duabus, tribusue, ac interdum pluribus, quæ exhausta crassiore, ac maiore postea angelica caule, si ortum eius à radice consideres, procerior, tereti, supernè rubenti: foliis Rumicis, aut Lilij, minoribus, binis, nonnunquam ternis, ad quando quinis, ad terram infractis, virentibus sed maculis rubris conspersis, tam crebris, vt referre magis quam virere videantur: flore purpureo, Lilio rubro, quod Martagon vocant, digura simili, priusquam pandatur, oblongo, radice referatur est, sex foliis constante, ad radicem candicantibus, reliqua sui parte ostro capite

*SATYRIUM rubrum,*

*Dalechampi.*



rascentibus, apicibus totidem quot sunt foliola, niueis, supernè velut aro confinis conspicuis. Alterum, trifolium videlicet, inuentu rarius, priori omnino confinis, nisi quod guttis & maculis lacteis folia variegantur, flos candicat. Vtrique men oblongum siliquis includitur, nunc triangulis, nunc quadrangulis, compressum. Inuenitur genus quoddam vnico, ac lato folio, sine flore, sine fructu. Ma. etc. appellatur.



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, LIB. XV. 1567

SATYRIVM trifolium, seu  
album, Dalechampij.

SATYRIVM Dalech. fortè  
Pseudohermodyctylus, Matth.



appellant Herbarij. Florent Aprili & Ma'o mensibus. Satyriorum historia id re-  
pugnare videtur, quod rotunda & globosa radice non sint, qualem requirit Dios-  
corides. At si Satyria non sunt, tamen ob insignem & venustam figuram descri-  
benda fuerunt vulgato apud Herbarios seruatò nomine, quoad verius sit inuen-

SATYRIVM Erythro-  
nium, Matthioli.



tum, aut è veterum libris erutum. Ad excitanda venerem magnam vim habere ostendit humida & calida substantia cum acrimonia paululo iuncta. Pena eandem plantam Herbariis innotuisse scribit Satyrij Erythronij nomine, non multis ab hinc annis nulla desiderata nota præterquam coloris, qui valde variat loci varietate, vt in Scilla, Cepis, & aliis Bulbaceis videre est. In Iura monte & collibus Taurinensibus Pado sesquileucam disitis provenire ait. Est Lobellio Satyrium & Dens caninus Belgarum, Hermodyctylus & Pseudohermodyctylus Italarum & Matthioli. Genuini verò Erythronij radix ex Matthiolo hic depicta conspicitur à Cechino Martinello Pharmacopæo præstantissimo & Herbario peritissimo missa. Ea est mali effigie, cortice tenui & rufo, candida intus pulpa, sapore dulci, orique non ingrato. Easdem radices Pena se Venetiis vidisse ait in Alberti Martinelli Officina, quas hic Satyrij Erythronij radices esse iudicabat. Ea sunt subrotunda, magnæ, rugoso tuberosoq; cortice, ex fusco rubello, effigiem & magnitudinem

*folio  
Erythronij ruber  
Erythronij illud satyru  
In Admef.  
It quod habet radice  
corticem rubellum*



Cyclamini vel potius Aristolochia rotunda fragrantis affecuta, carne intus al-  
bida, eduli, dulci. Idem Matthiolus postrema Commentariorum editione aliud  
Satyrium primum pinxit, nulla adiecta descriptione. Satyrii trifolij radix, aucto-  
re Dioscoride, bibitur in vino nigro austero ad opisthotonum. Ferunt etiam hanc  
Vires & impetum ad venerem excitare. Erythronij radicem, si manu omnino teneatur,  
Temper. venerem stimulare produunt, multo magis si bibatur in vino. Idem planè de Ery-  
Li. 26. c. 10. thronio Plinius tradit. Quibus addit arietibus quoque & hircis segnioribus  
in pota dari. Et à Sarmatis, equis ob assiduum laborem pigrioribus in coitum,  
Li. 8. simpl. quod vitium procedamum vocant. Et Galenus Satyrium, aut Triphyllum, inquit,  
humidum & calidum temperatura est. Quamobrem gustu quoque apparet  
dulce. Attamen recementitiam & flatuosam humiditatem possidet: quocirca ad  
venerem concitat. Hæc verò & herbe ipsius radix præstare potest. Perro, ut qui-  
dam aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opisthotonum. Hæc de veterum

SATYRIUM primum,  
Matthioli.

SATYRIUM Basilicum  
maius, Dodon.



Dodon de  
flori. c. 62.

Satyriis. Recentiorum Satyrium Basilicum maius, quod plerique marem ap-  
pellant, folia habet oblonga, lata & lævia, Lilij folijs minora, nullis aut omnino  
vix apparentibus maculis resperfa: caules pedales, vel altiores, non absque adnatis  
folijs: flores in summo spicatos, colore dilutè purpureos, exiguis punctis saturate  
purpure resperfos: forma florum Testiculi morionis maris, nisi quod ipsi crassa  
desit, sub quibus singula acuminata nascuntur foliola: radices sunt veluti gemine  
palmae, singula in quaternos digitos distributa, quarum vna flaccidior & quali  
fungosa, altera vegeta, ac solida, paucis ab annexu exeuntibus fibris. Alterum  
maius genus, quod feminam vocant, priore tamen minus, folia eiusdem forme  
promittit, sed minora, & multis nigris maculis conserpta: flores Cucullo similes, er-  
statos & hiantes, uti Testiculi morionis maris, colore nunc candidos, al is in pur-  
purea vel rubentes, vel dilutè ad caruleum inclinantes, semper magis angustis, &  
ornatos, ac variegatos: radices alterius similes. Minus genus folijs est angustis, &  
ut Matth



SERAPIAS *femina praeclara, siue*  
*Palma Christi: Satyrion basilicum*  
*alterum, Dodon.*



PALMA Christi minor, Matth.  
*Satyrion Basilicum minus,*  
*Dodonaeus.*



Pena, tum quia succulenta minus sicciorque est, & deterget intro forique vlceribus admota, tum etiam quod melancholicis, quartanariis, epilepticis, neruorum

vt Matthiolus ait, Croci, caule dodratili, iunceo lauique, in cuius cacumine flos emicat purpureus, Amarachi amulus, qui recens odore quam suauissimu reddit: radicibus aliorum similibus, sed quae magnitudine ipsis cedant. Nascuntur Sa-

Locus.

tyria haec locis maxime humetibus, palustribus in pratis & siluis. Florent Maio & Junio. Horu duo reperiri genera in Anania vallismontibus Matthiolus ait. Sunt qui velint Buzeide siue Buzidan Arabum esse. Sed scribit Auicenna Buzeidem esse medicinam ligneam Indam, in qua est virtus similis virtuti Been. Et Serapio, Buzeiden, inquit, est species Satyrionis. Et Buzeiden sunt radices durae, albae, similes Behen albo. Et est medicina India, qua nos parum vtimur. Satyrion autem huiusce radices nihil minus quam lignae sunt, nec ex India petuntur. Matthiolus Satyrion Basilicum siue Palmam hanc Christi, Auicenna digitos citrinos esse vult, de quibus haec scribit. Alahafra siue digiti citrini quid est? Eius figura est sicut vola manus commixta ex citrinitate & albedine: & est dura, in qua est parum dulcedinis: & ex ea est citrina cum puluerulentia absque albedine. Et Rhasis digitos hos croceos, vt exemplaria habent, appellat, & esse gummi seu venam tinctorum ait. At Satyrion Basilici radices durae non sunt, neque croceae, neque ad tingendum viles. Quare id a Digitis citrinis Auicenna & Rhasis perspicue differre videtur. Satyrion Basilici radices Orcheae radices sapore & gustu referunt: quare & facultatibus similes existimantur. Nicolaus Nicolaus Florentinus capite de quartana curatione vim habere ait, & per superiorem & per inferiorem ventrem purgandi, & aduersus quartanas febres inueteratas, post purgationes radices partem pollicis longitudine, tusam cum vino ante accessionem vtiliter exhiberi, hocque remedio ter sumpto biliorum quendam post quadraginta quatuor aut quadragintaquinque accessiones, a febre quartana fuisse liberatum. Matthiolus Fuchsum reprehendit, quod Palmam Christi Satyrionum generibus accensuerit, cum in generibus Testiculorum canis potius numeranda fuerit. At Fuchsum Dodonaeus & alij multi Herbarij secuti sunt, eam Satyrion Basilicum nuncupantes, vt diximus. Triorchin Serapiadae Aeginetae esse Palmam Christi alias opinabatur

Lib. 2. c. 98.

Cap. 260. simpl.

Lib. 2. c. 207.

Lib. ven. 60. tin.

Vires & Temper.

In Aduers.



offarctu & pituitosa saburra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericum sistat, quot qualisque facultates Palmæ Christi recentiores vindicant, dignandas sanè Egyptiis veneranda Serapiadis Dæ augusto cognomine: alioquin nihil attinebat à cæteris secreuisse, & Serapiadas nunc apasse. Rationibus hæc fauebat ex lectione coniectura: nam vbi πολύχριστον τῆς ρίζης, id est, multi vñs radicem Dioscorides habet, legendum fortasse πολύχριστον multifidam radicem, & fortè vtrunque, id est, multifidam & multi vñs radicem innuebat. Et mox inferiùs, vbi Dioscorides, ρίζα δὲ ὑπερὶ ὀρχιδέοις ὁμοία, id est, radix subest pusillis testiculis similis, legebat Pena multifida leuiore metathesi multò quàm in superiore capite, vbi pro oleo substituit Dodonæus Scillam teneram Pancratium, vti dictum est à nobis.

## COLCHICVM EPHEMERVM. CAP. XIII.

Lib. 4. c. 79.  
Nomina

*Id. Phryg. pag. 48.*



DIOSCORIDES κολχικὸν à Græcis etiam ἐφήμερον, & βολβὸν ἄγριον dicit auctor est. Latine Colchicum, Ephemerum, & Bulbum agrestem, & strangulatorium: Colchicum, à Colchide veneni ferace, in qua nascitur. Ephemerum, quoniam sumptum vno die interficiat, Gallis

Lib. 6. sim.

Lib. 5.

Lib. 7.

Genera.

Lib. 4. c. 79.

Cap. 80.

Forma.

Locus.

Diosc. ibi.

Lib. 25. c. 13.

Tue-chien & Mort aux chiens, Germanis Tentosen, Italis Zaffarano saluatico Item aliud ἐφήμερον seu ἴριον ἄγριον, id est, Ephemerum seu Irim siluestrem, quod lethale nō est sic nuncupatum, quod breui vna & altera die florem amittat. Idem Galenus habet. Ephemerū, non illud lethale ac deleterium, sed alterum, quod Irim agrestem cognominant. Et hos secutus Aegineta, Ephemerum, inquit de venenis agens, quod nonnulli Colchicum, quod in Colchide nascatur, vocant aut Bulbum agrestem. Et alio in loco. Ephemerum, nō deleterium, sed quod Irim agrestem appellat. Et Aërius. Qui Ephemerum, quod aliqui Colchicum, aut Bulbum siluestrem appellant, &c. Est igitur Ephemerum duplex, lethale quod Colchicum, & non lethale, quod Ephemerū non lethale nominatur. De Colchico priore loco tractat Dioscorides, de altero proximè sequenti capite. Colchicum, vti ille describit, Bulbi tumni exitu florem edit subcandidum, crocino similem: post florem folia triangularia, pinguiora tamen: caulem palmi altitudine, fructum ferentem rufum: radicem quæ corticem habet in nigro rufescentem, quo nudata, candida, tenera, & ei plena & dulcis inuenitur. Habet bulbus eius in medio rimam, vnde flos emittitur. Plurimum in Messenia & Colchis nascitur. Ephemerum nō lethale caulem & folia Lilio similia habet, tenuiora tamen: flores candidos amarosque, fructum mollem: radicem vnam digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. Nascitur in siluis & vmbrosis locis. Plinius, Ephemerum, inquit, folia habet Lili, sed minora: caulem parem, florem caruleum, semen superuacuum: radicem vnam digitali crassitudine, dentibus præcipuam concisam in aceto, decoctamque, vti tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit. Cavis & exesim imponitur. Hæc Plinius. Colchicū Ephemerum aliud non est, Herbariorū iudicio, quàm vulgare. Simum plebi præter Crocum & siluestre vbique vocatum, vti & in Croco dictum stri diximus. Nam floret vti Crocus Autumno, flore perquam primo Vere ortum, & lutiùs tamè caruleo, staminibus pallidè luteis, iamdiu antea primo Vere ortum, & Aestate amittit folia, quæ porraceis latiora, Pancratij sunt æqualia, vel Bulbi, pinguiora, terna, aut quaterna, virentia, nitentia ab radice: caule sesquipalmari: bulbosa, semitrotunda: radice altera parte compressa Castanæ figura, aut Anacardioidis tunica rufescente ex fusco, ab ima latioreq; basi ad apicem canaliculum imperforatam: prima caulis germinatio, intus tota alba, fungosa, mucida, virosa, guttu non ingrata. Est quibusdam Narcissus purpureus Plinij & Virgilij, apud Theophrastum.





Itum florens Autumno, post Arcturū circa æquinoctium, perperam Moly Tia-  
 go lib. 2. cap. 76. quia eius flos minimè lacteus. Est & Syriacum siue Alexandrinum  
 Colchicum, cui bulbosa radix, vt describit Pena. Id non parum à nostrate differt,  
 tametsi Dioscorides delineationem non minùs bene referat: non enim ex radice

COLCHICVM Anglicum,  
 Lobelij.



fulco, siue rima quæ est à latere, caulem emittit,  
 sed caulis erumpens mediū findit bulbū, qua-  
 siq; geminum Colchici bulbū ab imo coagmen-  
 tatum, caulemque vtrinque amplexatum osten-  
 dit, nigriorque nostrate euadit intus prioris si-  
 mili, forisq; alioqui è cepacea fungosaque  
 concreione vti & totius figura. Istis adiungunt  
 Lobelius & Pena aliud Herbaris indictū, quod  
 quia Anglia copiosissimum fundit, nec alibi fa-  
 cile reperias, Anglicum candido flore nuncu-  
 pant. Perpulchra est planta, lacteis floribus Or-  
 nithogali vel Asphodeli, maioribus, Croci mō-  
 tani siluestris paribus: caulem ornant sèquipal-  
 marem radix & folia, alioqui pratensis vulgaris  
 sunt, foris fusca, intus candida. Londini hortis  
 mersæ radices Hiemem ferunt, Vere emergūt,  
 non secùs atque in collibus & montosis prope  
 Bristolium & in agro Somerseti. Clusius aliud  
 Colchicum montanum exhibuit, quod terna  
 quaternave folia fundit, digitum longa, per ter-  
 ram strata, Hyacinthi non scripti ferè æmula,  
 sed saturatiùs virentia & splendentia, gustuque  
 acida, quæ vbi flaccescere incipiunt, colorem  
 subrubrum

Lib. 2. stir.  
 Hist. p. c. 6.



subrubrum contrahunt. Flos sine foliis primum exilit, & sex oblongis purpureisq; foliis, & in medio staminibus totidem constare: cum folia statim (contra quam in alio Colchico) subsequuntur & quodammodo protrudunt, totamque Hiemem perdurant in mensem vsque Maium aut Iunium. Radix est bulbosa, vnica, non magna, multis subruis & nigricantibus tunicis amicta, intus solida, candida, dulcisque cum quadam adstrictione, sede longiuscula, quæ adnatis in lateribus propagatur. In collibus Salmantica vicinis lapidoso admodum solo provenire ait Clusius, seque mense Maio collegisse preferentem caulem dodrantalē, firmum, & in fastigio triangularem siliquam: semine ex rubro nigrescente, lævi, exiguo, subrotundo, amariuscule plenam. Illic vulgò *Merenderas* vocari. Idem scribit se observasse in pratis Salmantinis Colchicum nostro vulgari simile, sed minus, atque eius platas nonnullas flore omnino lacteo: sed in eo genere folia antè primum Ver emergere non solere, quemadmodum nec in Anglico, quod hic ex Clusio pictum videris. Colchici nostri radix quovis anni tempore eruta, à quibusdam pharmacopœis pro *Hermodactylo* habetur, etiamsi siccata, flaccida, vieta rugosaque, turgenti partim euanida, partim fungosa sit. Id quod acerrimè Matthiolus reprehendit, & eius erroris causam Serapioni adscribit, qui Surmen gen, id est, *Hermodactylum*, ut ipsemet interpretatur, iisdem planè verbis describit, quibus Dioscorides Colchicum. Quod autem magno & pernicioso errore has duas plantas confuderit, confirmat ex Paulo Aegi. qui lib. 7. de Ephemero & *Hermodactylis* seorsum tanquam de diuersis tractavit, ac primum de *Hermodactylo*. *Hermodactyli* radix, inquit, & per se, & ipsius decoctum vim habet purgandi. Priuatim arthriticis, cum humores defluunt, exhibetur. Verum stomacho valde aduersatur. Paulo post de Ephemero ita scribit. *Ephemerum* nomen venenatum, sed quod Iris silvestris & discolor mixta facultatis est, & repellentis, & discoloris per halitum. Ex quibus perspicuum est *Hermodactylum* ab *Ephemero* longè diuersum esse, & hac in re Serapionem vehementer errasse, & Mauritanos omnes, ac eius sequaces medicos, qui Colchicum *Hermodactyli* vice catapotis, & aliis medicamentis immiscerent. Quare Matthiolus genuinum *Hermodactylum* esse credit, quem ex planta expressit quam Augerius de Busbeke Constantinopoli allatam donauit: ubi etiam *Hermodactylus* appellatur, & r-dices.

*COLCHICVM montanum*  
cum flore, Clusij.



Cap. 194.  
simpl.

*COLCHICVM montanum*  
minus, Clusij.





BVLBOSARVM, ET  
HERMODACTYLVS

Verus, Matthioli.



PSEUDOHERMODA-  
CTYLVS, Matth.



CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1573

dices digiti speciem referunt, aded vt vnguium quoque figura conspicua sit. Folia fert prelonga binum dodratum longitudine, & fortasse longiora, Porri aut Hastulae regiae similia: sed longe angustiora, breuioraque sunt quae circa radicem diffunduntur. Radices habet quatuor ex vna eademq; basi emergentes, digitorum figura, colore ex pallido rufescente, albis in summitate vnguibz, nullis circa sese fibris: nam quae spectantur fibrae, circa radicem originem superiore parte capillacea sese fundunt. Caulis e medio profilit tenuis, herbacea tunica circumuestitus, in cuius summitate oblongum prominet capitulum (flore non vidit) piri figura, Colehici fere modo, minus tamen. Differt ab hac planta ea quam quidam in Italia Hermodactylum esse arbitrantur, Matth. Pseudohermodactylum appellat. Sed Hermodactylum priorē, quē verū putat, pleriq; respuunt, & Iridis generibus adscribunt, Iridē tuberosam appellantes, de qua capite de Iride locuti sumus. Præterea Colchici nostri radix medicamentis immixta, pernitiola non est. Neq; propterea dicendū, id, quod in Colchide plurimū nascebatur auctore Dioscoride, aliud a nostro esse: sed illic lethali interimēdi facultate ceteris omnibus antecelluisse, tum q. succo illic esset magis concocto, tum quod a solo cœloque vim hanc nancisceretur. Sic fungi quibusdam locis exitiosi proueniunt, & nisi iisdem quibus Colchicum remediis vincantur, interimunt: alibi innoxij passim esantur. Sic Taxus Narbonensis & Hispanica deleteria sola umbra, vt prodidit antiquitas: in Anglia & alibi minimē malefica. Cicutę & aliis idē vsuuenit. Sed nostri Colchici radices etiam si pro Hermodactylis a quibusdam vsurpentur, sciendum tamen ab Officinarum Hermodactylis plurimū differre. Hi enim peregrini sunt, non perniciosi, vt multis seculis plurimus vsus edocuit. Hos Hermodactylos Officinarum, Tralliani & Pauli, esse Colchicum, seu Ephemerum non venenatum Dioscoridis Pena opinatur, & leuiore aliqua nota, non specie differre, vel si eadem non sint saltem admodū affinia esse. Idem censuit Lobellius, ex quo Colchicum Illyricum, siue Græcum non venenatum Anguillare, pictum exhibemus. Hermodactylos non venenatos Officinarum appellat. Se Venetiis habuisse ait munere Alberti Martinelli Alepo Syriae euulsa, a fratre, Cequino Colchici Anguillare plantas, prunis palmitibus, septenis, denis & duodenis foliis Colchici striatis, mucronatis, reflexis, in angustum fastigiatis, imbricatis & lateratim stipatis, e quibus in pu-

ερεμ. & mercurij  
δακτυλος digiti  
hinc ερμωδακτυλος.  
dest digiti mercurij



COLCHICVM *Illyricum* siue*Gracum non venenatum,**Lobellij.*EPHEMERVM *non lethale,*  
*Matthioli.*

Lib. 3. c. 79.

Lib. 6. sim.



Lib. 28. c. 9.

Li. 26. c. 12.

sillo pediculo flores exoriuntur lutei, pallentes, terni, vel quaterni, Colchici parui minores, flaminibus ite concoloribus. Siliqua non dissimilis. Radix foris cepe cōcretionē, intus euanida & vicia, quia in caulē, folia, flores, fructū & semen vis tota exhausta fuerat. Anguillara & Cequino assentiendū putat, quibus hanc plantā acceptam refert. Colchicis accenset Lobellius plātam quam capite de Narcissi ex Clusio descriptissimus nomine Narcissi Autumnalis quorundā, Lobellij Colchicū luteum, fortasse Ephemero non venenato Dioscoridis cōgener, Narcissus Autumnalis Marcelli Vergilij Mutono, flore luteo pallente, cuius Narcissi meminimus cū de quarto Narcisso ageremus. Certē radice, caule, folio, flore, ortu, tota deniq; planta propius ad Colchicū accedit. Matthiolus longē aliud Ephemerum nō lethale depinxit, q̄ in Ananiaslibus mōtibus tam in partibus quā in siluis copiosē nascitur, ab indigenis vulgō *Giglio matto*, hoc est, *Lilium stultum* nomenatum: Ephemerū spurium Lobellius appellat. Folia habet *Lysimachia* Glasti aut *Luteola* media, in sesquicubitalibus cauliculis densis, multis, que alis concavis: flosculos candicantes, Verbesci nigri, quinario foliorum numero: semen pusillum in rotundis lini pericarpis ocellatum: radicem multum fibratam Isatidis. Hæc Lobellius Fuchsius plantam, vulgō *Lilium conuallium* nuncupatā, Ephemerum non lethale esse contendit. Colchici radicem comestam scribit Dioscorides fungorum modo strangulando enecare. Remedio esse quacūq; contra fungos opem ferunt. ad fuerit, nullum præterea querendum præsidium sit. Ephemerum non lethale radicem dēcium doloribus remedio est, si decocto eius colluantur. folia in vino decocta & illita, oedemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris contraxerunt, discutiunt. Vbi pro, *μῆτρον ὑγρὸν ἐχόντα*, legēdum putat Fuchsius, *μῆτρον πύον ἐχόντα*, vt ex Galeno liquet sic habere. Ephemerum nō lethale radicem habet asperam, stringentem, & boni suauisque odoris. Ex quibus perspicuum est facultatis temperatioris esse mixtæ, nempe repellentis, & habitu euaporantis. Testificatur opera quæ particulatim edunt. Siquidem non ineffaciter radix eius in dentibus

doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statui folia cōueniunt. Plinius de Colchico ter autem ea in vino decocta prius quā pus moueas illinere. Plinius de Colchico

hæc solum tradit, priuatim lac bubulum iis qui Colchicum biberunt vtile esse. Ex folia Ephemerum tuberibus atque tumoribus illinuntur, quæ etiam dum discutiunt possunt



possunt. Ferunt Turcas Colchici floribus uti cum inebriari volūt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in ecstasim abeant. Hermodactylus, auctore Mesuē, calidus est & siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementitia, flatulenta, nauseabunda qua vtriculo nocet, praesertim quando in eum ex partibus aliis excrementa cōfluunt. Pituitam crassam maximē à iuncturis trahit: ob id podagrae, & aliis arthritidis differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam cataplasmate admotus, praesertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguar, sperma auget, vlcibus confert, quia terget sortem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticum, Menthastrium, mastiche mixta, Hermodac. prohibent, ne suo humore excrementitio & flatulento laedat ventriculum, neve status crassos & nauseabundos in eo exciter, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò Hermodactylus cum paucis Zingibere, & succo Raphani, vel Scilla asata, aut Scilla sicco & Zingibere, & pauca spica in trochiscos fingatur, purgat celerius & plenius (per se enim tardè & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque roborando stomachum Hermodactylos citò deturbant, & humorum in ventriculū affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureo duos. Ad annos tres seruatur.

## SCILLA.

## CAP. XV.

**S** C I L L A. EPACEO etiam generi tantopere similis est σκίλλα Graecis dicta, *Nomina* Latinis similiter Scilla, ut multi eam Cepam marinam vocent, & *Vide Phlegm. pag. 10* Varro Squillam, cuius exemplo omnibus Officinis sic nominatur, Arabibus *Haspel, Hausel, Aschil* seu *Alachil*, Italis *Silla*, Germanis *Meer-tunzel*, Gallis *Stipoule, Oignon marin*, Hispanis *Cebolla Albatrana*. Quia autem inter hanc & marinum testaceum piscem, à tunicata squamarum copactili serie Squillam vocatum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic dicta, inquit Pena. *In Aduert.* *ποτὸ τῆς σκίλλης μέλος*, id est, ab ariditate dicta esse, quod in fabuletis maritimis Sole torridis oriatur, cuiusmodi sunt in Hispania, & prope aridæ Lusitanie tesqua maritima. Plinius, Scillarum in medicina, inquit, alba est quæ masculus, *lib. 20. c. 9.* femina nigra. *Genera.* Quæ candidissima fuerit, vtilissima erit. Et, Nobilissima est Scilla, *lib. 19. c. 5.* ut nec vis asperior. Duo genera medica: masculus albis foliis, femina nigris. Et tertium genus est cibus gratum: Epimenidium vocatur, angustius folio, ac minus aspero. Quæ ex Theophrasto transtulit Plinius. *ἐδωδικοί μὲν γὰρ οὐ μόνον βοτάναι, καὶ τῶν ἰσχυρῶν τούτων, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς ἀσφοδέλης ρίζα, καὶ ἡ τῆς σκίλλης, πολλὴν δὲ πλάσσης, ἀλλὰ τῆς καὶ λευκῆς καὶ γαλακτέως, ἢ ἀπὸ τῆς χηρσεως ἐχέει τὴν προσσηγορίαν. ἀλλ' ὃ στενοφυλλώτερὰ τε Ἰσχυρῶν τούτων λοιπῶν ἐστὶ.* Id est, Edules non solum Bulbi & his similia, sed etiam Alphodeli radix & Scilla, non omnis quidem, sed eius quæ Epimenidia vocatur, quæ ab usu nomen accepit. Hæc angustiore est folio, lauioreq; quam cætera. Scillæ differentias duas ex colore duntaxat inter Hispanicæ tam multas animaduertit Pena: quarum extimæ tunicæ vni rubent, ut Cepis oblongis, alteri albent, magnitudine pares. Vtrius maxima pomū Assyrium nō superat, Cepæ modo multiplicitè tunicata, corticosaq;. Vniuersa folii carina vel dorsum palmum ferè latè pedè alta, crassitudine minori quàm Aloës, crebro è bulbo pullulant squamamiles, sed minores, in spicam postremò deficiens. Matthiolus ait se cum olim credidisset Scillas, quibus in Italia tum medici tum seplasiarii vtuntur vulgò, veras esse Scillas, mutata tandem sententia eas pro legitimo Pancratio habere, Scillas ve nō geminas eas esse, quæ illis duplo maiores in Hispaniæ maritimis proueniunt,

SSS

Forma.

In cap. 168. lib. 2.



SCILLA, *Matthioli.*SCILLA Hispanica sine flore, *Clu.*

*Vires &  
Temper.*

& Hispaniæ locis. Floret Augusto & Septembri, semen Octobri & Nouembri maturefcit. Folia maturo iam semine, & caule arido emergunt Nouembri & Decembri. De Scillæ vicibus & præparatione satis prolixè Dioscorides. Vim acrem & feruentem habet. Affata verò multiplicis est vsus. Pasta aut luto oblita in clibanum conicitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficienter tosta fuerit. Quæ amara, si non mollescat, altera pasta aut luto circumlinitur, eademq; quæ prius fuit. Nam quæ ita non affatur, noxia magis est, præsertim intercanis data. Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum coniecta. Sumitur ex ea abiectionis extimis partibus, quod maximè medium est, quod concisum effusa prior aqua coquitur, nouaque superinfusa vsquedum nec amaritudinem, neque acrimoniam habeat aqua. Siccatur autem in vmbra dissecta, & lino traiecta, ita vt ne talleola inuicem se contingant. Sic igitur secta, ad oleum, vinum, acetumq; scilicet cum vtimur. Ad rimas verò pedum crudæ Scillæ intercanca pars in oleo seruanda, aut

foliis Aloë æmulatibus, sed minus crassis, cum illa folia ferant nō Aloë, sed Lilio proxima, inter quæ non parua est differentia. At perperam, inquit Pena, pro Pancratio vulgarem Scillā, quæ vera est, accipit: quam non nisi vietam, aut adulescentem, cuiusmodi Venetiis vaneunt, viderat. Et foliorum gracilitas sanè nō aliam speciem constituit Scillæ, sed tantum contingit habitiora & maiora adulescere folia mutatione calisoli, & cultu. Sic Cepis euenit angusto interiecto tractu, sic in foliis Aloë, & aliis multis obseruatur. His verò Bulbis flores, folia, omnia prorsum similia, aliquantò duntaxat graciliora, vt bulbaceis multis præpropere enatis, & aliò transplacitatis euenit. In contiguatione suspensæ, dum bulbulo merguntur aut seruantur, languidiora pomunt folia, & succo seu pabulo consueto deficiunt, exilioraque sunt. Ratio par in Scillis pusillis, quas Pancratium Matthiolus adstruit. Sed ex Clusio legitimam Scillæ iconem hic proponimus, qui eam & primum emergentem, & florentem seminèque onustam plerisque Hispaniæ & Lusitaniæ locis se eruisse ait. Est verò Scilla, requit, caulis plerunque cubitalis aut maior, rectus, nudus, absque foliis, floribus plurimis candidis & stellatis ornatus, Asphodeli minoribus, Ornithogalo maiori similibus, qui ab imis florere (vti rectissimè scripsit Theophrastus) quæ admodum Asphodelus incipit. His succedunt siquæ triangulares, & veluti compressæ, in quibus semen nigrum, planum & paleaceum. Folius demum emergunt quinque aut sex lata, amplæ, viridia admodum, densa, humi extensa, & quodammodo carinata. Radix crassa, alba, multipliciter tunicata, lento quodā humore plena, multis fibris crassiusculis capillata. Copiosè nascitur supra Olysiponem, & plerisque aliis Lusitaniæ



SCILLA Hispanica cum  
flore, Clusij.

aut cum resina liquefacta imponitur. Decocta in aceto demorsis à vipera cataplasma est. Assie eiusdem pars vna, tosti salis partibus octo subigitur, datúrque ieiunis cochlearis vnus duorumve pondere ad emolliendam aluum. Additur potionibus & odoratis medicaminibus, & quibus vrinam ciere voluerimus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatant cibi, & morbo regio, torminibus, in vetere tussi, asthmaticis, cruenta reiicientibus (ἀναφορεῖς). Hic Dioscorides, & Medici alij ἀναφορεῖς appellant, qui sanguinem ex inferioribus partibus sursum educunt, & per os reiiciunt.) Trium verò obolorum pondere in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem cum melle, sumiturq; in cibo ad eadem, maximè coctionem adiuuans. Strigmētita per aluum ducit. Coctu & simili modo sumpta idem potest. Cauendus Scillæ vsus iis quibus interaneum aliquod exulceratum fuerit. Prodest verrucis & pernionibus assam inungere. Semē eius tritum cum caricis, aut melle exceptum, si manditur, aluum emollit. Pro foribus domus suspensa tota amu-

Lil. 10. c. 10.

letum est. De iisdem Plinius confusè tractauit his verbis. Scillæ aridis tunicis direptis, quod reliquum è viuo est confectum suspenditur lino modicis interuallis. Postea arida frustra in cadum aceti quàm asperrimi pendentia immerguntur, ita ne vlla parte vas contingant. Hoc fit ante solstitium diebus 48. Gypso deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis totius diei solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acutum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi laterumque doloribus, parum sumptum quo speciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus, vel per se commanducata. Tineas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Linguae quoq; recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla quæ coniciatur in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum ferpetum ictibus imponitur. Tosta quoq; purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vtus sic coctæ ad hydropicos. Ad vrinam ciendam tribus obolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibis. Ad tormina, regios morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & foliis strumas quadrinis diebus soluta, furfures capitis, & vlcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè vti coctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mista resinæ. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Pythagoras Scillam in limine quoque ianæ suspensam malorum medicamentorum introitum pellere tradit. Hæc Plinius. In quibus Marcellus Vergilius & Cornarius erroris eum in simulat, quod dixerit adipe aut luto illita, pro eo quod est apud Dioscoridem *ἐν τῇ ἢ πολλῶν τῶν ἐπιλεσίων*, id est, farina aqua subacta, quam pastam vocamus, aut luto oblinitur. *ἐν τῇ* enim & *ἐν τῇ* hic non adipem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed pastam aut fermentum. Dioscorides de Stibio, *ἀπὸ τῆς ἐν τῇ περὶ πλάσθης*, id est, Lib. 6.



- affatur farina circumlitum. Vbi tamen etiam impegit Plinius, qui sic vertit. Qui-  
dam non fumo vtuntur coquentes, sed adipe. Idem Dioscorides de Eriſymo. ἐρί-  
σμος ὁ ὄνιον, καὶ ὁ πρὸς ἐν τῷ σπύρῳ περικταδένος. Hoc est, linteo illigatum, & fermento  
oblito affatum. Et de ſici vtriuſq; ſucco. καὶ μύρμηκων ἀπὸ τῶν ἐλῶν περικταδένος τῆς  
Lib. 3. c. 38. ἐν κύνελοι σπύρῳ. Id est, fermento vel pasta oblita in circumſita carne. Idem Paulus  
ἰωὺ ἐν τῷ σπύρῳ ὁ πρὸς τὴν λέκυντον. Hoc est, Qui in fermento affati vitellum. At ſicut  
his in locis atque alijs τῶν pro pasta aut fermento rectè intelligitur, ita multis alijs  
Lib. 7. hiſt. pro adipe vſurpatur. Porro quod ex Pythagora refert, idem prodidit Theopha-  
cap. 12. ſtus, λέγει καὶ κατὰ τὸν θυρῶν τῆς Εἰσοδὸς φυτὸς ὀφείσας, ἀλεξίτηλον εἶναι τῆς ἐπιφθορίας  
τῆς ἀνελήσεως. Id est, Traditur & ante portas ſaram remedio eſſe contra venetio-  
rum noxam. Scilla, inquit Galenus, admodum incidentem facultatem habet, non  
tamen admodum calidam. Sed ſecundum hoc eam quiſpiam ſecundi ordinis cen-  
ſeat excaſſacientium. Præſtat autem aut aſſam aut elixam ſumere: ſic enim virium  
eius vehementia exoluitur. Vnum de Scilla volumen condidit Pythagoras philo-  
Lib. 19. c. 5. ſophus auctore Plinio, colligēs medicas eius vires. Idem Plinius Scillam ter flore-  
Lib. 21. c. 17. re refert, tria tempora ſationum oſtendentem. Quod ex Theophrasto exſcriptum  
eſſe capite de Croco declarauimus. Vbi non τρις ἀνθῆναι Scillam ait, id est, ter flore-  
re, quemadmodum Plinius ſcripſit, ſed ποτὶς καὶ τρις ἀνθῆσκει. Quibus verbis non  
ſignificatur Scillam tribus diuerſis anni tēporibus, exempli gratia, Autumno, Ve-  
rè, Aestate florē edere, ſed inter bulbosas plantas Scillam & Aſphodelum quā-  
diutiffimè florere, ob alimenti copiam & vbertatē, quod Theophrastus τὴν ἀν-  
θῆσιν καὶ μέρος ποτὶς, id est, particulatim florem promere dicit, ( In vulgatis tamen co-  
Lib. 7. hiſt. dicibus mendose legitur τὴν ἀνθῆσιν, pro τὴν ἀνθῆσιν ) vt ab ima caulis parte primū  
cap. 12. incipiat. Quare Auguſti menſis principio Scillæ caulis aſſurgit, ſeoriſum eam ob  
caulam pictus, quod ſæpius eſt obſeruatum, cubitalis aut etiam procerior, denſiſ-  
ſimè floribus ſtipatus, qui primū diducuntur, ac interim dum aperti vigent, me-  
dij turgescunt, ſupremi gliscunt duntaxat, quæ πρῶτη ἀνθῆσις eſt, primus ad flore-  
ſcendum impetus. Exactis aliquot diebus flores qui primi recluſi fuerunt, dilabun-  
tur, medij ſeſe promunt, ſupremi tantū intumescunt, quæ eſt ſecūda ἀνθῆσις. Po-  
ſtremo deſluentibus medijs ſupremi ſeſe explicant, quæ eſt tertia ἀνθῆσις. Hic flor-  
reſcendi ter repetitus impetus, terrā quoque ter ſubigi oportere denuntiat, priuſ-  
quā fruges ſerantur. Flaccido verò & emortuo caule folia naſcuntur circa la-  
nuarij medium vel finem, ob id bulbus cum folijs depictus ſine caule, quæ po-  
ſtea Aestatis ſqualoribus exareſcunt. Quod de Scilla illi prodidere, Vergilius ex  
Arato idem de Lentisco literis mandauit.

## PANCRA TI VM. CAP. XVI.

*libe Phytog.*  
Nomina pag. 107.  
Lib. 2. cap. 163.  
Forma.

Lib. 27. c. 12.



RAECI πανκράτιον, ſicut & Latini Pancratium, à vincendis & proli-  
gandis morbis omnibus nomināſſe videtur. Scillæ ſpecies eſt, prope-  
reā Scillā nominant, vt ait Dioſcorides, vt Plinius Scillam puſillam  
Pancratiū, vt deſcribit Dioſcorides, radix eſt Bulbo magno ſimilis,  
ſub albo colore aut ſub purpureo, guſtu amaro ac ſeruere. Folia habet Lilio ſimilia,  
ſed longiora. Plinius, Pancratiū aliqui Scillam puſillā appellare malunt, folijs Lili  
albi, longioribus craſſioribuſq;: radice Bulbi magni, colore ruſo. Dalechampius  
ſic depingendū curauit, & deſcripſit his ſerè verbis. Naſcitur vbiuis in litore ma-  
ris, radice Bulbi magni, cortice ſubruſo veſtita, infernè capillata Cape modoſo-  
lib. 27. c. 12. lis, id eſt, Lili albi, vt Plinius vertit, longioribus & craſſioribus, quod idem ad-  
didit: caule pedali & nonnunquam proceriore, anguloſo, ſummo ſaſtigio in quin-  
que folioſa candicantia virgata, acuminata ſeſe explicante, è quorum medio an-  
guloſe,



gulosæ, breues & veluti compræ eriguntur filiquæ pediculis subnixæ, ex quarum  
 vertice flos albus emicat, oblongus, infernè arctus, supernè latus, ambitu supremo  
 in radios velut cuspidatim diuiso, pallidis apicibus multis, staminibusque totis  
 extantibus, flore delapso semen in filiquis adolescit, & maturefcens grædescit. Flo-  
 ret mense Iunio. Ex his perspicuum est, Pancratium Scillam non esse, sed speciem

PANCRATIUM, Dalech.



PANCRATIUM C.



flore potissimum ab ea distat. Pancratium istud Monspelienſe Cuius Heme-  
 rocallidem Valentinam vocat, eoque nomine depinxit. Pancratium verò longi-  
 aliud, quale hîc videtis expressum. Cum autem de Scilla dixisset, subiicit. Pancratium  
 amplitudo maior est, extimæ tunica rubent, foliæque ampliora & longiora. Na-  
 scitur copiose in mediterraneis Hispaniæ, estque præfens venenû. Germinat cum  
 Scilla. Vires Scillæ & præparationem habet, vt tradit Dioscorides, ac eodem pon-  
 dere in iisdem morbis exhibetur. Mitior autem huius vis est quàm Scillæ. Radicis  
 succus cum erui farina in pastillos cõformatus cum hydromelite splenericis & hy-  
 dropicis vtiliter exhibetur. Horum quædam omisit Plinius, & alia addit his verbis.  
 Alium soluit succo cum farina erui sumpto: vlcera purgat. Hydropicis spleneri-  
 cis, cum melle datur. Alij decoquunt eam donec aqua dulcis fiat, eaq; effusa a-  
 dicem terentes digerunt in pastillos Sole siccatos: & postea vtuntur ad capitis vl-  
 cera, & cætera quæ repurganda sunt. Item ad tussim, quâtum tribus digitis appre-  
 henderit in vino dantes, & ad lateris dolores, aut peripneumonias. Theobald.  
 Propter ischiada in vino bibendum, & propter tormina mensisque ciendoy. Ra-  
 dix Pancratij, inquit Galenus, Scillæ similem gustum refert ac vires. Quare ex qui-  
 dam pro Scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem si-  
 militer, sed longè imbecillius.

SISTRINCHION Dodonæi.

CAP. XVII.

HEOPHRASTVS cum Bulbis multis σισυγχιον vel σισυγχιον πα-  
 merat, & post eum Plinius. Ἰσχυον ὃ τὸ σισυγχιον, inquit Theobald.  
 ρίζης αὐτῆς ἐστὶ τὸ κατὰ πρῶτον, ὃ καλεῖται χιμῶνα (corrigere πρῶτον ἐστὶ τὸ κατὰ  
 χιμῶνα, vt legunt Plinius & Gaza.) τὸ δὲ ἵππος ὑποφαίνοντος (addit Plinius ad  
 SSS 3







**Q**UOD ὀρνιθόγαλον Græcis, Ornithogalum similiter Latinis dicitur, Plinio Ornithogale. A lacteo gallinarum candore Ornithogalum nomen accepisse videtur, inquit Ruellius, quod flores intus lacteo colore niteant, nisi quis censeat ab oui candidi figura, quam radix præ se fert dictum: nam auicularum oua radix imitatur, intus albisima. Ornithogalum, ut describit Dioscorides, cauliculus est tener, tenuis, subalbicans, ad duos dodrantes assurgens, superne tres quatuorve habens propagines teneras, in quibus flores foris herbacei, aperti verò lactei coloris, inter quos capitulum Cachryos modo infectum, quod vnà cum pane coquitur velut Melanthium. Radix bulbosa, quæ & cruda & cocta editur. Idem delineauit Plinius his verbis. Ornithogale caule tenero, candido, semipedali, radice bulbosa, molli, tribus aut quatuor agnatis. Coquitur in pulte. Ruellius Ornithogalum esse ait, quod à rusticis in Suefionum agro eruitur, rotunda radice, bulbaceam speciem præ se ferente, è cuius medio cauliculus exit tribus, aut quatuor adnatis appendicibus in cacumine: foliis in capillamenta quadam extenuatis: floribus exiguis, foris herbaceis, intus lacteo colore candicantibus, qui simul coaceruati velut panicula quadam compacti callosquamati coherentes in pilulam extuberant, nucamentum pineæ nucis præferentem. Suefionensis ager *Churles* vocat, pueris non incognitos, qui propter adstantes cum aratro terra profcinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos vomere colligunt, multò castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis, & in cineribus incoctis rura vescuntur, odore iucundissimo mirum in modum os commendante. Radix in orbem ferè collecta est cortice pullo, candidissima intus carne pulpave perquam odorata. Vere vel Æstate cum fronde virent: Hyeme vel Autumnio cum exarantur agri radicitus euelluntur. Diu seruari possunt, & vbi annonæ premit inopia, plebis rusticæ famē & ieiunia castanearum more satiant.

Nomina

Li. 1. ca. 20.

Vide Phytog. pag. 97.

Li. 2. c. 138.

Forma.

Li. 19. c. 17.

ORNITHOGALVM  
1. Matthioli.



Nec aliud humo genitum promptius in cibum cedit, cum frugum penuria gliscit. Mirè suis expetitur, qui rostro scrobiculos excavant, & horum capti dulcedine, gregatim ad hos eliciendos, radicitusque vellendos adcurrunt. Rura ex agris sponte natum gratiorem cibum non norunt. Lautiores etiam mensas diuitum Ornithogalum non reformidat. At Dodonæo huiusmodi radix non Ornithogalum, sed Bolbocastani genus esse videtur. Radix enim est Bulbi forma, sapore castaneæ, quale Bolbocastanum esse nomen ipsum indicat. Ex Matthiolo duas Ornithogali plantas exhibemus, quod duo esse eius genera existimet. Quorum vtrumque cum caule foliosum sit, differt ab eo quod Dodonæus depingit, quodque legitimum Dioscoridis Ornithogalum esse censet. Id etiam Bulbum leucanthemum appellat. Huic folia multa sunt & angusta, graminis minora: caulis inter hæc exit, dodrantalis minor, rotundus, glaber, absque foliis: flores in summo dispersi emicant sex aut septem, foris herbacei viridis, intus candidi, ex sex foliolis commixti, exiguis Liliis, præ-

Li. de flor.  
cap. 43.In cap. 138.  
lib. 2.



# HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,

## ORNITHOGALVM

I. I. Matthioli.

Li. purgāt.  
App. c. 6.



ment. At superiora pro legitimis Dodonæo magis placent. Ornithogalo Narbonensi simile, & magnitudine tantum distare videtur, quod à Mycono habemus. Inter segetes oritur, inquit, cubitali altitudine, interdum maiori. Caudem ha-

sertim priusquam aperiuntur similes, qui Sole quidem splendente patent, noctu vero, & cum aer nubilus etiam interdiu oclusi permanent: capitula succedunt triangularia, Cachrys semini similia, in quibus semen exiguum: radix bulbosa, lento succo plena, sapore ut plurimum insipida & aquea, cum obscura tamen quædam acrimonia. Reperitur in agris frumentis apud Brabantos locis compluribus. Maio mense flores edit. Dodonæus alio in loco Ornithogalum, quod Narbonense cognominat, haud parum differens à superioribus depinxit, foliis oblongis & tenuibus, & quam aliorum angustioribus: caule tenello, cubitali, aut proceriore, nullis foliis vestito, floribus verò exornato quamplurimis, à medio fastigium petentibus, qui foris herbacei sunt, patentes verò interiùs lactei candoris visuntur, Phalangij flores præferunt. Fructus triangularis est lobus, in quo semina: bulbos paruos & oblongos pro radice est. In Narbonensi Gallia, ac iuxta Monspeum in agris frumenti feracibus gignitur. Sunt qui Dioscoridis legitimum Ornithogalum esse existimant.

ORNITHOGALVM Dodon.  
seu Bulbus Leucanthemus.



ORNITHOGALVM  
Narbonense, Dodon.



ber leucom



ORNITHOGALVM  
magnum, Myconi.



bet læue, rotundum, solidum, Asphodeli instar, in quo flores intus candidi, ex sex foliolis constantes, foris virides ex petiolo pendent, prope cuius exortum foliolum è caule prodit, ipsum petiolum amplectens: in florum medio stamina multa sunt veluti in Rosa. Radix crassa est, bulbosa, candida, solida, non squamata, dulcis, inferiore parte fibras in orbem emittens, eius extremum ambitum cingentes coronæ capitis monachorum instar. Cum huic idem sit sapor qui Ornithogalo vulgari, foliorum, florum forma eadem, Ornithogali speciem esse censer Myconus, etiam si folium sit in hoc duplo maius & latius. Quare Ornithogalum magnum appellauit. Raram plantam esse ait, seque bis tantum reperisse, semel Toleti, iterum iuxta Barcinonem. Ornithogali speciem faciunt quidam, ut scribit Pena, quod Ornithogalum luteum vocant. Quamuis enim Ornithogalo nomen dedit florum lacteus cador, cuiusmodi in gallinarum alis renidet aut ouis, non earum lacte, quo caret volucrum genus, tamè propter totius figuræ affinitatem nobis erit etiam vo-

candum Ornithogalum, quod flore luteo est elegantissimum, nec ita frequens Italia, Narbonæ, calidioribusque visitur. In Aruernis & ad pomeria Lugduni ponere & prope suburbium trans Lugdunum, vulgò *La Guillotiere*, in campis latis &

ORNITHOGALVM luteum Lobel.  
sive Bulbus siluestris Dodon.

NARCISSVS IIII.  
Matthioli.



glareosis,

he figure of a bulb  
of the bulb. pag. 150.







Arabum medicorum *Halizelm*, sed *fulo*. Nam *Alzelin* ab Arabibus inter fructus, seu grana, non inter radículas numeratur. Sic enim Serapio scribit, cap. 3. 7. simpl. *Halizelm*, id est, Granum *zelim*, est granum pingue, ciceris magnitudine, citrinum exterius, album interius, & habet bonum saporem, & deferitur ex terris Barbariae. Idem confirmat Auicenna, cap. 304. his verbis. Granum *Alzelin* est granum boni saporis, & oritur in partibus *Herzuz*. Ex quibus perspicuum est, granum istud à *Trasis* multum differre. Horum cremore, ut tradit *Matthiolus*, pectoris & laterum vitia expurgantur. Quo fit ut rursus peritilibus finitunduntur enim maceranturque carni iure, deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam venereis portionibus miscens recentiorum nonnulli. Idem cremor potus ad vrinę ardores valet, & ad dysenterias: nam humorum acrimoniam retundit, praesertim ex aqua potus, in qua candens ferrum extinctum fuerit. Veronenses pro bellariis videntur. Sunt haec radices, ut ex experientia & dulcedine conici potest, in modum calfacientium & humectantium genere, sed flatu quodam modo gignunt. Humenti Belgico solo complures capillares radices edidisse scribit *Lobellius*. Verem stimulare, abstergere moderate humectando, idem expectoratione iuuare.

Vires &  
Temper.

TVBERA ET FVNGI.

CAP. XX.

**R**ADIGIEVS aut Bulbis, inquit *Galenus*, adnumeranda quae Graece *Nomina* *ῥίζα* & *ῥίζα*, Latine *Tubera* dicuntur, Arabicè *Ramech*, *alchamech*, *Tumer* & *Roma*, Italicè *Tartuffi*, Germanicè *Hirtbrunst*, Hispanicè *Turmas* de terra, Gallicè *Truffes*. Vocantur autem *ῥίζα* ab imbribus, & *ῥίζα* à tumore. Ac ne quis homonymia fallatur, sunt fructus arboris *Tuberes* nominati, & à *Plinio* descripti, & *Cyclaminus* Tuber terrae appellatur. Tuber tradit *Dioscorides* radicem esse rotundam, sine foliis, sine caule, sublauiam. Effoditur Vere, & cruda & cocta in cibi vsum venit. Eius luculentior est apud *Plinium* descriptio. Et quoniam à mirabilis rerum cepinus, sequemur eorum ordinem, in quibus vel maximum est aliquid nasci, aut viuere sine vlla radice. Tubera haec vocantur,

Lib. 15. c. 14.  
Li. 2. ca. 19.

Forma.  
Li. 19. c. 1.  
& m.

TVBERA, *Matthioli*.




vndique terra circumdata, nullaeque fibras nixa, aut saltem capillamentis, nec vtiq; extuberante loco in quo gignuntur, aut rimas agente neque ipsa terrae cohaerent. Cortice etiam includuntur, ut planè nec terram esse possumus dicere, nec aliud quam terrae calum. Sicis haec ferè & sabulosis locis fructuosisq; nascuntur. Excedunt saepe magnitudinem mali coronci, etiam librali ponde e. Duo horum genera, arenosa dentibus inimica, & altera sincera. Distinguntur & colore, nigro rufosq; & intus candido, laudatissima Africae. Crescunt, an ne vitium id terrae (neque enim aliud intelligi potest) ea protinus globetur magnitudine qua futurum est: & viuunt ne an non, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est iis cum ligno. *Lartio* *Licinio* *Prætorio* viro, iura reddenti in Hispania Carthagine, paucis his annis scimus accidisse mordenti Tuber, ut deprehensus intus denarius primos dentes inficeret. Quo manifestum erit terrae naturam, in se globari: quod certum est ex









enim lenti admodū  
crassissimiq; sunt suc-  
ci arteriarum oscula  
ita obstruūt, vt con-  
clulis intus spiriti-  
bus suffocent. Quod  
cū norint Hetruf-  
ca rustice, rarō Fun-  
gos edunt, nisi Allio  
& pipere additis. Af-  
feruatur Fungi mu-  
ria, inquit Matthio-  
la, *fungos, vel dicitur  
a frigido quia in-  
tra. par-  
at ut glaucum  
penicillatim: non  
et in coram*

las, præsertim qui vulgò porcini vocantur: sic enim innocentiores redduntur, de-  
posito lentore. Idem multa alia Fungorum vulgaria genera recenset, *Prataoli, Tu-  
rini, Boleti, Orceje, Cardarelli, Ordinali, Parigioli, Vesica di Lupo.* Fungi etiam non  
tantum humi, sed etiam in arborum caudicibus nascuntur, quos omni ferè peri-  
culo vacare putat Matthiolus, modò non sint arbores noxiæ, & è corticibus pro-  
deant, quibus nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpens cadauer sublit. Ex  
eo genere præter Agaricum, quosdam Laricibus innasce, ait in Ananèsibus mon-  
tibus, triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum infectos, in cibis gra-  
tissimos, sine vlllo amaro, licet Agaricus, ex eadem arbore sit amarissimus. Sed  
optimè omnium Galenus dixit Fungum plantam esse admodum frigidam & hu-  
midam: quamobrem ad deleteriam enecantemque facultatem accedere, ac san-  
tem putredinosam. Et in lib. de Alim. Inter Fungos, inquit, Boleti si bellè in aqua  
elixi fuerint, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solis ipsis vulgò  
vtuntur, sed apparant variè & condiunt, vt alia omnia, quæ nulla insigni qualitate

FVNGVS spongiosus, ...  
Dalechampij.



sunt prædita. Alimentum autem ex ipsis est  
pituitosum & frigidum, prauūque succi, si quis  
ipsis largiū, vtatur. Omnium igitur Fungorum  
ij minimū sunt noxij. Secundi autem post  
hos sunt Amanitæ. Reliquos verò tutiū est ne  
atingere quidem: multi enim ex ipso-  
rum esu interierunt. Noui quēdam, cui post Boletorum  
non satis elixorum (qui innocentissimi esse pu-  
tantur) vsū largiorem, os ventriculi pressum,  
ac grauatum coarctatumq; fuit, difficilēque  
habuit respirationem, & in animi deliquum  
incidit, sudoremq; frigidum sudauit, ac demū  
seruari ægre, sumptis iis quæ humores crassos  
incidunt, potuit: cuius generis est oxymeli  
ipsum per se, & cum hyssopo, & origano ipsi  
mediocriter incoctis. Is enim tū hæc sumpsit,  
tum nitri spumam ipsis inspersam: post quæ  
Fungos quos comederat vomuit, qui iam quo-  
dammodo in succum pituitosum frigidumq;  
admodum, ac crassum erant mutati. Hic non  
omittendus Fungus insignis, quem spongiosū  
Dalechapius cognominauit. Nascitur in aspe-  
ris & saxosis, sæpe ad Castanorum radices, co-  
Locus.



lore fuluo, corpore spongiolo, figura in meram desinente, suauissimi gustus: quamobrem in delitiis habetur variis modis præparatus, vt hominum palatum variis condimentis oblectatur. Galli vocant *Morilles*, inde fortasse, quod ad Mori fructus figuram nonnihil accedat.

## ASPHODELV.S.

## CAP. XXI.



RAECIS ἀσφodelos, Latinis Asphodelus, & Hastula regia, quod dum floret prorsus sceptri regij effigiem referat, & Albucum, siue Albucos vocatur, Officinis corrupta voce Afrodilus, Arabibus *Cheunce*, *Bhunte*, *Biruach*, *Abg*, seu *Axeras*, Italis *Asphodelo*, Germanis *Goldwurze*, Gallis *Asphodel*, & *Hache Royale*, Hispanis *Gamonos* & *Gamonites*. Florem ἀσφodelον appellari ait Dioscorides, Plinius caulem Anthericum, radicem verò, id est, bulbos, Asphodelum. Theophrastus etiam caulem ἀσφodelον vocat, Albucum vertit *Gaza*. Plinius secutus. Dioscorides vnus Asphodeli meminit. Plinius Dionysium duo genera facere tradit, marem & ferminam. Recentiores tria obseruauerunt. Asphodelum describit Dioscorides his verbis. Folia habet Porro maiori similia, caulem læuem in summo florem ferentem, Anthericum vocatum: radices oblongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Hunc Dioscoridis Asphodelum album vocant Herbarij quidam, alij marem, qui folia fert complura, oblonga, angusta, Porri foliis similia, acuminata: caulem rotundum, læuem, cubito longiorem, colore candidi, aut ex rubro valde diluto modicè purpurascens, staminibus in medio, post quos capitula sequuntur orbiculata, in quibus semen durum, triangulum, nigricantis obsoleti coloris: radices ab vno capite complures exeunt, oblongæ, teretes, pæonia minores, concolores ferme, acres, magnis glandibus quodammodo similes, succosæ. Arida Narbonæ litora huius Asphodeli feracissima sunt, nec minus montes à mari disiti, vbi bulbis illius aduolutoribus rostro effolis quantumvis acribus sues lubenter vescuntur. Apud Germanos & Belgas non nisi satus prouenit. Floret Maio & Iunio mensibus, & particulatim quondam ab imis incipiens. Plinius, Asphodelus, inquit, oblongum & angustum folium habet. Et mox Asphodeli mentione & Homerus fecit. Radice eius Napis modicis similis est: neq; alia numero, octoginta sunt aceruatis sæpe bulbis. Theophrastus & ferè Græci, princepsq; Pythagoras, caulem eius cubitalem, & sæpe diuum cubitorum, foliis Porri siluestris, Anthericum vocant: radicem verò, id est, bulbos, Asphodelum. Nostri illud Albucum vocant, & Asphodelum. Hastulā regiam. Theophrastus hæc de Asphodelo. ὁ μὲν γὰρ ἀσφodelος μικρὸν, καὶ τεινέστερον τοῦ ὑπόλευχον ἢ τὸ φύλλον. Id est, Asphodelus folium habet. Et, μέγιστον ὁ πάλιν ἀσφodelος, γὰρ μέγιστος ἀνθερίκος. Omnium maximū Asphodelus habet: Anthericus enim maximus. Et mox. ἔτι ὁ πολύκερρος ὁ ἀσφodelος, καὶ ὁ πικρὸς αὐτὸς ἐν τῇ μὲν μορφῇ τεχνίσιος, καὶ ὁ πικρὸς αὐτὸς ἐν τῇ οὐσίᾳ. Id est, ὁ πολύκερρος ὁ ἀσφodelος, καὶ ὁ πικρὸς αὐτὸς ἐν τῇ οὐσίᾳ.

HASTVLA Regia, siue  
Asphodelus, Matth.



Lib. 7. hist.  
cap. 2.

Nomina  
R. de Phrygia pag. 56.  
ἀσφodelos ἢ καθ' ὅσον  
ἀσφodelos flor.  
lib. 21. cap. 22.  
lib. 7. hist.  
cap. 2.  
lib. 21. cap. 22.  
Genera  
Ibidem.  
Forma  
Albucum vocat  
siue Albucos  
neq; alia numero  
maioris aut minoris  
modicis  
floribus aliorum quod  
velut inuicem  
apparet. Locus.



ἀνθός, ἐκ τῶν πλῶν διὰ τὸ γένος, ὅταν τῷ διαχάνῃ. τὴν ἀνθήσιν (non ἀνασιν, vt habent pu-  
blica exemplaria) ποιεῖται χαλὰ μίρος, ὡς περὶ ἐπὶ τῇ σκίλλῃ. ἀρχαίαι δὲ πρῶτον ἀπὸ  
τῆς κατωθεν. ἐν δὲ τῇ ἀνθερίῳ σωτήρι. σκώληξ, ὅς ἐστι ἄλλο μεταβάλλει ζῶον πρὸς τὸν  
ἀνθροπῶδες. Ἐθ' ὅταν ὁ ἀνθροπῶς ἀναρθῇ, διεσθίων ἐκπέταται. Διοκρίτῃς δὲ ἰδίον ἔχει πρὸς τὰ ἄλλα  
τὰ λαβύουλα, διότι γενὸς ὦν, ἀποφύσκει ἀνθὸς ἔχει.

ASPHODELVS minor,  
Dodon. & Clusij.



ASPHODELVS bul-  
bosus, Galeni.



Id est, Multi seminis est Asphodelus, estq; semē  
eius lignosum, forma triangulum, figura nigrū.  
Gignitur hoc in rotundo quodam quod flori  
subest, excidens ætate cū id dehiscit. Floret  
particularim, vt & Scilla, incipiens ab imis. In  
Antherico nascitur vermis, qui in aliud animal  
volatile floridum transmutatur. Deinde cū  
Anthericus exaruerit, ipso ei oculo euolat. Vide-  
tur autem hoc peculiare habere præ cæteris læ-  
ui caule præditis, quod angustus cū sit, pro-  
pagines supernè habet. Hæc Theophrastus.  
Dioscoridis Asphodelo satis similis est caule,  
foliis, floribus, planta appicta, sed radicibus dif-  
fert, quæ non glandulosæ, sed crassæ, fibratæ,  
numerosæq; ex vno capite nascuntur: folia  
Asphodeli minora & angustiora multò, bre-  
uioraq; & dilutiore colore: è quorum medio  
sex, aut plures ex ead. m radice assurgunt caules  
cubiales, ramosi, quos sine ordine nas. ètes ex-  
ornant flores, superioribus similes, sed mino-  
res deinde triangulares siliquæ, primū virides,  
deinde albicantes, & in his semina rugosum, tri-  
quetrum, altero minus. Dodonæus & Clusius  
Asphodeli minoris nomine plantam hanc do-  
narunt: nullumq; alium ferè Asphodelum ait  
Clusius toto Valeriano regno nas. i, & Gadibus,  
& plerisq; Granatensis regni locis: inueniri etiā  
in lapidosa illa planitie supra Arelatem, secus  
vias. Huius meminimus in libro de iis quæ flo-  
re placēt, cū de Phalangio ageremus. Aspho-  
delus fœmina Dodonæi, siue bulbosus, siue  
Hyacinthinus, folia habet porracea, sed tamen  
angustiora & tenuiora quàm primi Asphodeli:  
caulem rectum, rotundum, floribus similiter  
multis circūuestitum, rarioribus tamē, qui pri-  
mi Asphodeli floribus, haud multum sunt absi-  
miles, ex sex paruis acuminatis foliolis, & ali-  
quot in medio staminibus compositi: capitula  
quoque triangularia, sed longiora, in quibus se-  
men, radix subest bulbosa, magnitudine esculē-  
ti Bulbi, aut maior. Belgæ in hortis colunt. Flo-  
ret eodem quo primus tempore, aut paulò tar-  
dius. Asphodelum esse caulis Antherico simi-  
lis ostendit. Quare is erit Asphodelus, cuius me-  
minit Galenus in libris de Alimen. facultatibus,

Lib 5. c. 80.  
hist. stirp.  
& de flor.  
cap. 39.



de quo postea dicitur. Ab hac sententia non abhorrent Lobellius & Pena, qui Asphodelum fortè Galeni & Hyacinthinum appellant: quia ancipitis videtur figura & generis ex Asphodelo, cuius flores habet, & ex Hyacintho, propter similem radicem. Est & alius Asphodelus luteus, à florum colore luteo cognominatus, cui folia sunt oblonga, angusta, striata, in virore quasi cærulea, longiora & angustiora quàm primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo à medio sursum versus plurimi, alterius satis similes, sed colore lutei, staminibus in medio: capitula succedunt rotunda, in quibus semè: radices similiter còplures, sed singula oblongæ & tenues, multò quàm primi & tenuiores & lōgiores, colore luteola, supra quas fibræ quedam è lateribus exeunt, per quas in plures alias stirp. ipsa facillè multiplicatur. Hortis Belgij & Gallie familiaris est. Floret similiter Maio aut Iunio mense. Est & Asphodelus luteus palustris, de quo in lib. de Palustribus. Addit Lobellius Liriasphodelū Liliiflorū, de quo egimus cap. de Hemerocallide. Præterea Liriasphodelū phœniceū, cui ex miniato flauetè flores rutilant: folia sunt Porri, Asphodeli albi vel Liriasphodeli vegetiora latioraq; , supernè reflexa: caulis rotundus, durior, binos ternosq; cubitos interdū superans, in cuius summo Liliacei iridem flores striati, Liliū puniceum minus æquant. Radix tuberosa teres, Asphodeli lutei minoris. Aspho-

Dodon. de  
Hortib. c. 38.

*ASPHODELVS luteus,*  
*Dodonæi.*



*ASPHODELVS luteus*  
*minor, Lobellij.*



*LIRIASPHODELVS*  
*phœniceus, Lobellij.*





deli radix, vt Diosc. tradit, calcificandi vi prædita est. Vrinâ & menses pota mouet. *Vires & Temper.*  
 Lateris dolorib<sup>9</sup>, cūlisionib<sup>9</sup>, rptionibus drachmæ pōdere ex vino pota  
 medetur, vomitiones adiuuat ludicri tali magnitudine in cibū accepta. A serpēte  
 demorsis datur vtiliter triū drachmarū pondere. Illinire aut oportet morsus foliis  
 radice & floribus cum vino: itē vlcera sordida & depascētia: mammarum quoq; &  
 testū inflāmationes, tubercula & furūculos, decocta in vini face radice: ad recen-  
 tes autē inflāmationes cū polenta. Radicis succus adiecto vino vetere dulci, myr-  
 rha & croco simul decoctis, perquā vtile fit oculis medicamentū. Ad purulentas  
 aures per se, & cū thure, melle, vino & myrrha tepefactus prodest. In contrariam  
 aurē per se infusus dentiū dolorē mitigat. Cinis ē radice cremata illitus, alopecias  
 capillis replet. Oleū in excuatis radicibus igni decoctū, illitū exulceratis pernio-  
 nibus, & ambustis igne cōducit. Dolori auriū instillatus auxiliatur. Candidā vici-  
 ligine linteo antea perfriatā in Sole, illira radix emendat. Semen & flores in vino  
 poti, scilopendræ & scorpionū venenis egregiē aduersantur. Aluū quoq; deticiūt.  
 Galenus tradit Asphodeli radicē vtilē esse sicut Ari, Arisari (exēplaria falsō habent  
 Afari) Dracōtij, nempe extergentis facultatis: vltæ autē cinerē calidiorem & exsic-  
 cantiorē magis tenuium partium, & ad discutiendum potentiorē effici. Quare  
 & alopecias sanat. Meminit Asphodeli etiam Hesiodus his versibus.

Νήπιοι ἐδ' ἴσσι ὅσῳ πλεόν ἡμῶν πάντες,  
 Οὐδ' ὅσον ἐν μαλάχῃ τε, καὶ ἀσφοδέλῳ μεγ' ὄντα φερ,

Id est,

Ignorant stulti quanto plus dimidium sit

Toto, quāque bonum magnum in Malua Asphodelo que.

Sed cūm Asphodeli Dioscoridis radices acriores sint & ingratiore, quā vt præ-  
 fertim hominibus nostris in cibū cedere possint, verisimile est Hesiodū Aspho-  
 delū aliqūc aliū intellexisse, fortē Galeni, cuius vis etiā nō elixi ignauior multō, &  
 feruor mitior. De quo sic scripsit. Radix Asphodeli & magnitudine & figura & a-  
 marore Scillæ radicis quodāmodo similis est, si tamen vt Lupini paretur, maximam  
 partem sui amaroris deponit, in eoque à Scilla discrepat. Nam Scillæ qualitas diffi-  
 cillimē exiit. Hesiodus certē Asphodelū laudat. Equidē noui quosdā rusticos  
 qui grassante fame vix tandem cōpluribus elixationibus decoctionibusq; in aqua  
 dulci esculentam ipsām reddiderint. Porro hæc quoque radix, quemadmodū &  
 Dracontij, facultatem habet tenuandi & aperiendi. Proinde quoq; pro summo re-  
 medio ipsius asparagum ictero laborātibus exhibent. De eodem eduli Asphodelo  
 hæc literis prodidit Theoph. πολλὰ δ' εἰς τροφήν παρέχεται χυσιμα, καὶ γὰρ δ' ἀνθρώπος  
 ἐδωκεν αὐτὸν ἐνέμενος, καὶ τὸ σπέρμα φρυγόμενον. πάλιν δ' ἐν μέλισσῃ ἢ ῥίξῃ κοπιούμενη μελὶς σὺν αὐτῇ  
 καὶ τῇ ὄντιν ἐχέει καὶ ὁ σόλοδον. Id est, interprete Theodoro, Asphodelus permulta  
 ad cibum vtilia adfert: quippe Albucū tostum in cinere manditur, & senicē toti refa-  
 ctum vsui est. Sed radix rufa cum ficu in vsu maximē omniū venit, & vtilitatis plu-  
 rimū auctore Hesiodo præbet. Hæc ex Theophr. Plinius exscripsit, Asphodelus  
 præterea cū ficis, præcipua voluptate, vt videtur Hesiodo. Traditur & ante portas  
 villarū fatum remedio esse contra veneficiorū noxiam. Quod postremū Theoph.  
 & Diosc. non de Asphodelo, sed de Scilla literis mandarūt, vt diximus. Idem Plin.  
 prolixius Asphodeli vires exponit, sed quæ partim mari, partim sceminæ debentur.

Li. 2. Alim.

Lib. 7. hist.  
cap. 12.

Lib. 21 c. 17.

M O L Y.

CAP. XXII.

TS1 Homerus Moly illud primus celebrauerit, quo contra Circes  
 veneficia Vlysses Mercurius armauit, ita canens:

Ὅς ἄρα φωνήεις ὡς φάρμακον ἀγγεῖ φόντης  
 Εὐ γὰρ αὖτις ἐρύθεις, καὶ μοι φύσιν αὐτὴν ἔδιδες.  
 Ρίξαν μὲν μέλιθ' ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον αἶνθος.

Odiss. 10.

TTT 3



Μόλυ δὲ μὴν χαλκῶσι θεοί.

Id est,

Sic fatus diuulsam è terra porrigit herbam

Mercurius, simul &amp; naturam me docet huius.

Radix magna huic, sed lactis flos concolor exit.

Moly vocant superi.

Et post Homerum Ouidius, dum canit:

Pacifer huic florem dederat Cyllenius album,

(Moly vocant superi) nigra radice retentum:

Lib. 14. Me  
tamor.

## Nomina

vide Phleg. pag.  
100.Li. 3. ca. 47.  
Li. 7. simpl.

Li. 25. ca. 4.

Lib. 9. hist.  
cap. 15.

tamen cū graues Græci & Latini rei herbariæ scriptores peculiaris herba bulboſe meminertint, quæ μόλυ Græcè dicatur, Latinè etiam Moly, eique locos natales in quibus reperitur assignarint, de ea hic dicendū. Dictam autē volunt ἀπὸ τῆς μάστιδος τὰς νόσους, id est, à mitigandis sedandisque morbis. Verū cū nomen istud non vni, sed pluribus postea accommodarint plantis, vt insigni quopiā odore, ita vi & figura non ita dissimili præditis, vt Ruta siluestri, auctoribus Diosc. & Galeno, tamen de Moly bulboſo Diosc. hic agimus. Folia, inquit, graminei similia habet, latiora, humi sparsa, flores Violæ alba, lactei coloris, minores tamen, & cū Viola purpureæ floribus cōparandos: caulem album, quaternū cubitorū, in cuius summo inest quid Allij speciei referēs. Radix est parua, bulboſa. De alio Plinius scripsit. Clarissima herbarum est, Homero teste, quam à Diis vocari putat Moly, & inuentione eius Mercurio assignat, contraq; summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Phenē, & in Cyllene Arcadiæ tradunt, specie illa Homericæ, radice rotunda, nigra, magnitudine Cepæ, folio Scillæ: effodi autē difficulter. Græci auctores herbarum luteum pinxere, quum Homerus candidum scripserit. Inueni ē peritis herbarum Medicis, qui & in Italia nasci eam diceret: affertq; ē Campania vidi, aliquot diebus effossam inter difficultates saxæas, radice triginta pedes longæ, ac ne sic quæ de solida, sed abrupta. Quæ magna ex parte ex Theoph. transcripsit, cuius verba hæc sunt. Τὸ ὁ μόλυ περὶ φανεὸν (legendum ex Plinio φανεόν) ἐν τῇ κυλλήνῃ. φασὶ ὅτι εἶναι ἐν φανεῷ ὡς ὁμπρός ἐστιν, sic habent vulgata exēplaria: Gaza legit, καὶ ἐν τῇ κυλλήνῃ φασὶ εἶναι ὡς ὁμπρός ἐστιν, τὴν μὲνρίζαν ἐχόν τὴν τροχύλην, προσεπιφερές κρομύου, τὸ δὲ φύλλον αὐτοῦ σκίλλης. καὶ ὁ δὲ ὁ μόλυ πρὸς τὰ ἀλεξίφάρμακα, καὶ τὰς μαγείας. & μὴν ὁρῶσιν γε εἶναι χαλεπὸν, ὡς ὁμπρός ἐστιν. Id est, Gaza interprete, Moly apud Phenē exit, atq; apud Cyllenem esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda nō dissimili Cepæ, folio Scillæ. Vsum eius contra veneficia summū, non tamē effodi difficulter, vt ait Homerus. Hæc Theophr. De Dioscoridis Herbaris primū dicemus. Id genuinū doctis Herbariis videtur esse, quod horri Patavini & Bononienses iam diu, nunc etiā Belgæ colunt, cui bulbus exiguus, oblongus, fermè Porri, albicans, triticeis aut gramineis foliis: flos in cauliculis cubini altitudinis, lacteus, Ornithogali aut Allij vrsini æmulus: semen in siliqua. Istud Moly Dioscoridis facit Matth. Patavio missum à Cortuso pictum doctis. Idē prorsus esse opinor quod Clulius vidit Caradibus extra mœnia, Februarii initio flores, & ita describit. Habet hæc planta bina aut terna folia graminea, exteriore parte aliquantulum lanuginosa, mollia, & ad terrā inflexa, inter quæ caulis exilit dodrantalis læuis, rotundus, vacuus, in cuius

## MOLY, Matth.

Forma.





*MOLY foliis Narcissi, Lobellij.*




cuius cacumine ex membranula quadam emergunt multi flosculi exigui, candidi, sex foliolis constantes: radix bulbosa, alij aut auellanae magnitudine, nigricantibus mēbranis inuoluta, intus candida, succulenta, calidiuſcula, & subingrato odore. Cluſio plurimū ad Dioſcoridis Moly accedere videtur, præſertim ſi pro *ανχών τεσσάρων*, legatur *δελιδών τεσσάρων*, id eſt, quaternū digitorum. Illi aſſentiuntur Lobellius & Pena. Idem Lobellius perelegans aliud Moly ſerpentinum exhibuit. Dioſcoridis Moly ortu perſimile, folio ad terram item reflexo, odore & bulbo, ſed flos candore rubens, cui ſubiacent bulbuli nitidi, Indici Moly ritu. Radix cepaceo quodam inuolucro obtegitur: caulis pedalis & ſeſquipedalis. Belgis hortēſe eſt. Addit aliud folio Narcissi, proceritate & caule non aſimile, ſed floribus cæruleis, & folijs compreſſis Narcissi ſimilibus, & ferè paribus, oblongis, & albis radicis bulbis porraceis ſimul implexis & cohærentibus magno capitulorum ſtipatu, Allium odore præferentibus. Ab his differt Moly, quod ex Homero Theophrastus & Plin. deſcripſerunt iis verbis quæ ſupra memorauimus. Eſt enim horum Moly folijs Scillæ, tribus aut quatuor, lōgioidos, caule cubitali, craſſo, concauo, rotundo, foliorum experre, multos flores can-

ne in capitulis triangu-  
lis nigro, Ceparum ferè ſimili: radix craſſa, alba, nigra mem-  
brana teſta. Iuxta caulem inter folia plerunq; exit alius cauliculus planus & folia-


*MOLY ſerpentinum, Lob.*



*MOLY Liliflorum, Lob.*







ceus seu veriùs folium, quod in summo veluti Allij nucleum gerit, initio candi-  
cantem, deinde pallescentem, qui terra exceptus germinat, & plantam eiusdem  
profert. Moly Liliiflorum vocat Lobellius. Aliter in hortis, & Maio mense floret.  
Ita descripsit Clusius. In lib. Purgantium Dodonæus pinxit & descripsit. Præter  
eà aliud Moly Indicum cognominatum, quod alij barbaro nomine *Causacon*,  
quod ex India primùm in Hispanias delatum est. Superiorem, inquit Clusius, cum

*Causacon et  
Causacon è nomine  
barbaro.*

PSEUDOMOLY,  
Dodonæi.



Lib. 4. c. 50.

Lib. Quæ  
flore plac.

Ibidem.

Lib. 3. c. 47.

liculis teneriusculis, breuib, gracilib, in summo flores in muscariis candidos  
aut purpureos edentibus: radices teneræ sunt, graciles & longæ. Dioscorides  
tradit Moly radicem habere ad aperiendas vulvas maximè vtilem, tritam cum  
irino vnguento, & in pello adhibitam. Hoc Moly Dioscoridis à Galeno  
dictum



dei demonstrant ea quæ Galenus ei attribuit, citato etiam ipso Dioscoride. Sic enim Galenus. Myles radix paruo Bulbo similis est, facultatis constringendi siue contrahendi. Quare ipsam cum lolij farina admotam mederi vuluæ apertæ scribit Dioscorides. At in nostris vulgatis Dioscoridis exemplaribus legimus, *μετὰ τῆς λωπύνης, non μετὰ τοῦ ἀλευροῦ*. Cum verò scribat Dioscorides, hanc radicem esse *σκληρὰ ἀγὰρην πρὸς ὑπερασ ἀναστομώσας*, id est, summopere prodesse, non ad aperiendos vteros, videlicet conclusos, vt perperam quis accipere possit, sed aduersus vteros apertos, vt videlicet constringantur atque concludantur, (est enim *συμπεπνευμένη μύσας ἀναστομώσας*, vt Galenus clarè dixit,) sitq; lolicea farina ad id idonea, ordine tertio calefaciens ac siccans, ineptum verò vnguentum irinum molliens vteri conclusionibus, & hæmorrhoidibus aperiendis vtile, perspicuum est ex Galeno reponendum in Dioscoride, *μετὰ τοῦ ἀλευροῦ*, pro, *μετὰ τῆς λωπύνης*: ad stipulante etiam veteris codicis lectione, vt annotauit Andreas Lacuna.

ΑΠΙΟΣ.

CAP. XXIII.



*ἡ ἀπὸ τοῦ ἁπλοῦς ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία, ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία, ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία*

R. AECIS *ἀπὸς* & *ἰσχυρὰ*, & *ῥαφανοῦς ἀγρία*, Latinis Apios similiter dicitur, & *ἰσχυρὰ*, & Rhabbanus siluestris, Cretensibus hodie Pyraria, Theodorus Caricam siue Pyrum vertit. Apion dixerunt Græci, quod radicis extremum in pyri figurâ turbinetur. Eadem ratione *ἰσχυρὰ*, id est, ficus, scilicet à radicis effigie, cuius hæc est ex Dioscoride delineatio. Ramulos duos aut tres, iunceaos, tenues, rubentésque profert, qui supra terram parum se attollunt: folia Rutæ similia, longiora tamen & virentia, semen exiguum, radicem Asphodelo similem, & ad pyri figuram accedentē, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice contectam. Plinius iisdem penè

Nomina


Li. 4. c. 170.

Forma

Lib. 26. c. 8.

*ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία, ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία, ἡ ἰσχυρὰ ἡ ῥαφανοῦς ἀγρία*

ΑΠΙΟΣ, Matthioli.



verbis descripsit. Apios, *ἰσχυρὰ*, siue Raphanus agria iuncos duos siue tres spargit in terra rubentes, foliis Rutæ: radix Cepæ, sed amplior. Quare quidam Raphanum siluestre vocant. Intus habet mammā candidam, extrā cortices nigros. Nascitur in mōtosis asperis, aliquando in herbis. Effoditur Vere. Theophrastus *ἡ δὲ ἰσχυρὰ ἡ ἀπὸς φύλλον μὲν ἔχει τῶν γεννιῶν βραχὺ, καὶ οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς, τρεῖς ἢ τέσσαρες βίβαν ὃ δὲ ἀσφρόδεος, πολλὴν λευκώδην φιλᾷ δὲ ὀρεῖνὰ χωρὶς καὶ κοχλακώδη. τὴν λευκὰ δὲ τῆς ἡρῆς*. Id est, Apios folium habet rutaceum, breue: caules per humum stratos tres aut quatuor: radicem veluti Asphodeli, verum squamosam. Locis gaudet montosis & lapidosis. Legitur Vere. Apios vera ex Creta aduecta ex Matthiolo hîc depingitur, foliis exiguis, Rutæ vel Hyperico proximis, primo statim Vere ab radice exeuntibus, nigrioribus tamen, alba quadā linea in longitudinem procurrente: cauliculis iuncea, subrubentibus, lacteo succo madentibus: radice foris nigra, intus candida, pyri effigie: vnde & nomē. Cuius radicis mirabiles sunt vires. Nam eius superior pars

Lib. 9. hist. cap. 10.

Lib. 4. c. 170.

sumpta, inquit Dioscorides, vomitione bilem pituitamque extrahit, inferior per aluum. Tota verò vtrinque purgationes mouet. Succus eius sesquicuboli pondere haustus, vtrâq; parte, hoc est suprà & infrâ purgat. Cùm verò liquorem colligere volueris, tundi radices, coniectasq; in craterem aqua plenum gitato, tum penina collectum qui supernabit liquorem siccato. De eiusdem radicis vlu hæc Plinius.



Lib. 16. c. 33.

nius. Radix tusa in fistili mergitur, deiectione quod supernatur, reliquus succus purgat utraque parte, sesquibolo in aqua mulsâ. Sic & hydropicis datur acetabuli mensura. Inspargitur & aridæ radicis farina potionibus: autque superiorē partem eius vomitione biles extrahere, inferiorem per aluum. In quibus Plinius non niti in succi collectione à Dioscoride dissentit. Theophrastus quoque de eadem radice hæc tradit. τὸ μὲν ἔστι μὴ πρὸς τὸ ἀπὸ πάντων τὰ μέρη χεῖσιμα πυχρόν, & ἰσχυρόν. τὸ δὲ τῆς αὐτῆς ῥίζης τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω καθαίρειν θυμασιώτερον. διὸν τῆς τελευτίας, καὶ τῆς ἐλάτης (ὅτι ἔστι πικρὸν καὶ λυγρὸν) καὶ τῆς λιβαυωδούς. Id est, Non omnes eiusdem herbæ partes ad idem viles esse minimè absurdum fuerit. Sed radicis partē vnam

Lib. 9. hist. cap. 10.

## APIOS, Fuchsj.

Cap. 46. hi.  
Lib. 4. c. 33.

per superiora, alteram per inferiora purgare admirabilius, ut Thapsia & Ischados, quam Apion vocant, & Libanotidis. Ab hac legitima Apio & facie & viribus longissime abest ea quam Fuchsius Apion fecit. Dodonæus ῥαζον vocat, id est, Glandem terrestrem, Germani Erdnusz, Erdfeighen. Cauliculus tres quatuorve profert, seu furculos teneros, paulum à terra rubescens, cum capreolis, quibus vicinis sepibus, atque omnibus quæ nasci potest, se alligat: folia parua, angusta, flores venustus, rubore tinctos odore non ingrato: siliquas exiguas semen exiguum cōcludentes. Radices longæ sunt, graciles, à quibus pendent bulbi peni naps exiguus similes, glandium ferè figura, teris nigricantes, intus albæ, gustu ferè castaneæ. Prouenit copiosa in Hollandia, in frumentaceis agris, hordeaceis potissimum, & in sepibus. Sunt docti qui Astragalum esse arbitrantur. Matthiolus Pseudoapion vocat. Caule est multiplici, inquit, cubitali, quandoque maiore, biprocumbente. Viciæ ferè modo foliis oblongis & subasperis: floribus punice coloris, omnibus, odoratis, racematim coherentibus, quibus flaccesceribus filiquæ onantur, in quibus est semē. Radices habet Fici aut Pyri figura, ternas aut quaternas vi pendentes, nigra exteriori cute, alba interiori pulpa nulla purgatoria videtur. Floret Iunio mense. Passim nascitur in Boemia præsertim in vineis.

## ARVM. CAP. XXIIII.

Nomina

Vide. Hieron. pag. 364.



ARVM PON Græcis, Arum Latinis, Syris *Lupha* dicitur, Arabibus & Oricinis *Iarrus* & *Sara*. Quidam, quod folium vestigij bubuli effigiem præbeat, Pedem vituli appellant, Barbari *Aron* & *Barbam arum*, Draconteam minorem & Serpentariam minorem, quod Dracunculum amaret in iola magnitudine discrepans. Vulgus, quod pistillum promit exerti fecit genitalis effigie, Sacerdotis penem nominat, Germani *Pfaffen pint*, Itali *Aro* & *Gargaro*, Galli *sed de Veau*, & *Vid de prestre*. Arum, ut describit Dioscorides, folia emittit Dracunculo similia, sed longiora, & minùs maculata: caulem dodrātem, purascetem, pistilli figura, à quo Croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis. Plinius Arum cum Dracunculo cōfundit de Bulbis agens. Est inter genera bulborum & quod in Aegypto Aron vocant, Scillæ proximam amplitudine

Lib. 2. c. 162.

Forma.

Aron de apud  
J. C. in Arum & plin.



pluritudine: foliis Lapathi: caule recto, duum cubitorum, baculi crassitudine: radice mollioris natura, quæ edatur & cruda. Quibus ferè verbis Dracontium descripsit Dioscorides. Arum in siluis, locis vmbrosis, humidis & frigidis nascitur. Officinis & Herbariis notum est, idque geminum. Etenim folia promit hederacea, cordatis ferè effigie, Dracunculi longiora, minimè dissecta, paucioribus & albis respersa

Locus.

ARVM, Matthioli.



ARVM aliud minus, Matthioli.



maculis: caulem dodrantalem, album, in purpureum leuiter tendentè, è cuius fastigio erumpit inuolucrum, quod mucronata in turbinem vaginula pistillum complectitur, & suo fouet sinu. Verùm ubi fructu pragnans fatiscit in hiatu, solida pistilli facies dilutiore purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum viridia, dein crocea spectantur semina, quæ in coronæ modum concinnè cõtecta imam eius partem ambiunt. Radicem habet albam, bulbosam, oblongam, permultis stipatam fibris, Ellebori ferè modo, gustu perquam acri. Matthiolus scripsit, in Bohemiæ montibus quibuldam copiosum admodum cõuenire, sed Italico longè minùs, foliisque tenuioribus, & minori quoque radice. Quare hoc Arum minus vocat. Alteram Ari speciem ex Baldo monde à Francisco Calzolario ad Matthiolum missam hic etiam expressimus, cui folia sunt sagittæ speciem referentia, caulis valde perspicuus, rubentium baccarum botrum in cacumine habens confertum, & in acutum desinentem. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, circumquaque sese diffundentibus, è quibus bulbosi quidam globuli fabarum magnitudine dependent, alba intus pulpa, gustus acerrimi. Idem Matthiolus alio in loco aliud Arum, nimirum Aegyptium, depinxit, & eum, opinor, secutus Dodonæus, Exit, inquit, & in Aegypto Arum, sed ab Europæo diuersum, maius videlicet & latioribus foliis, quod plerique perperam Colocasiam appellant. Quos secutus est Clusius, vt ostendimus in Agro cap. de faba Aegyptia. In eadem est sententia Anguillara. Matthioli & Dodonæi sententiam Myconus approbat, non solùm eam ex simili plantæ illius cum Aro sapore confirmans, sed multò certiore argumento, quòd scilicet vaginam emittat Aro similè, petiolo crasso fultam, ex profundo & medio plantæ sinu ortum ducente. Primum intra vaginam, deinde extrà flores visuntur, postea semen racematim coharens adnato illi longo ex vagina enato: folia & radix eadem quæ Matthiolus icone repræsentauit, vt in hac nihil præterea spectare possis quàm vaginam, flores, & semèn racemosum Florentem

In ca. 162.  
lib. 2.

In cap. 99.  
lib. 2.

Lib. purg.  
cap. 5.

Lib. 2. stir.  
Hispa. c. 19.

Li. 2. c. 162.



ARVM *Acgyptium cum  
flore, Myconi.*

Li. 2. c. 162.

Vires &  
Temper.

Li. 24. c. 16.



rentem hanc plantam se vidisse ait Myconus Barcinone in horto Petri Gulielmi Regii pharmacopœi Barcinonensis. Radix Ari cocta estur, inquit Dioscorides, ut quæ minus acris sit. Folia sale condiuntur ad esum, & arida per se decocta maduntur. Radix, semen, & folia eadem cum Dracunculo vires habent. Radix priuatim cum fimo bubulo illita podagricis prodest, Dracunculi more reponitur. In totum ob mitiorem eius acrimoniam edendo est. Arum miris laudibus extulere Græci, ut scribit Plinius, primum in cibis sceminam præferentes, quoniam mas durior esset, & in coquendo lentior. Pectoris vitia purgare, & aridum in porione insperium, aut ecligmate urinam & menses ciere. Sic & in oxymelite potum stomacho, interaneisque exulceratis ex lacte ouillo bibendum: ad tulum in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum biberetur. Epiphoris elixum imposuere: item sugillatim, confillis. Ex oleo hæmorrhoidum vitio infudere, lentiginis & ex melle illinentes. Laudauit Cleopantus, pro antidoto contra venena: pleuriticis, peri-

pneumonicis, quo tussientibus modo: semen intritum cum oleo aut rosaceo infundens aurium dolori. Dieuches tussientibus aut suspiriosis, & orthopnoicis, & purulenta excreantibus farina permixtum in pane cocto dedit. Diodorus phibicis è melle ecligmate, & pulmonis vitiiis: ossibus etiam fractis imposuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ circumlitum. Succus radices cum melle Attico, oculorum caligines, ac stomachi vitia discutit, tussim decocti vis cum melle. Ulcera omnium generum, siue phagedænæ sint, siue carcinomata, siue serpentes, siue polypi in naribus, succus mirè sanat: folia ambustis profunt ex vino & oleo cocta. Aluum inaniunt ex sale & aceto pota. Etiam luxatis cocta cum melle profunt item articulis podagricis cum sale, recentia vel sicca. Hippocrates qualibet ad collectiones cum sale imposuit. Ad menses trahendos seminis vel radices drachmæ dug in vini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio, si à partu non purgantur, & secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit. Dicitur & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nidore cum crematur, priuatimq; aspides fugat, aut inebriat, ita ut torpentes inueniantur. Peruncos quoque Aro & laureo oleo fugiunt. Ideo & contra ictus dari potu in vino nigro putant utile. In foliis Ari caseus optimè seruari traditur. De eodem hæc statuit Galenus.

Li. 2. Alim.

nus. Manditur Ari radix eodem modo quo Rapi. In quibusdam autem regionibus acrior quodammodo prouenit, ut propè ad Dracontij radicem accedat. Et dum ipsam coquis, priore aqua effusa, in aliam calidam conuenit conicere. Ad Cyrenen plantam hæc à nostrate est diuersa. Nam in illis locis Arum minime est medicamentosum & acre, ut Rapis etiam sit vtilius. Perspicuum autem est, quod talis in cibo quidem est præstantior. Si quis tamen humores crassos vel lentos in thorace vel pulmonibus collectos tussim velut eicere, acrior ac medicamentosa magis est præferenda. Non obscurum etiam est, quod succus qui ex ipsa in hepar & totum corpus distribuitur, ex quo animalia abuntur: crassior quodammodo est, quemadmodum de Rapis dictum est: potissimum quum radices ipsæ qualitate me-



dicamentosa fuerint expertes, cuiusmodi sunt, quæ Cyrene adferuntur. Quando-  
quidem apud nos in Asia Arum magna ex parte est acrius, facultatēque haber  
iam medicamentosam. Et alio in loco. Arum terrena essentia constat, sed calida. Lib. 6. sim.  
Quare extergendi vim habet, verum non valentem, sicut Dracontium. Est itaque  
in exsiccano & excalfaciendo primi ordinis. Radices eius maximè sunt vtilēs: si-  
quidem comestæ crassitiem humorum mediocriter incidunt, adeo vt & excreatio-  
nibus ex pectore vtilēs sint. Vbi Galenus de Aro quod non vehementi acrimonia  
pollet, locutus est. Est enim haud dubiè quod in tertio ordine calidum & siccum  
est, ob multam qua præditum est acrimoniam.

ARISARVM. CAP. XXV.

**A**ΡΙΣΑΡΟΝ & Αἰς Græcè, Arisarum Latinis & Aris Plinio. Apud **Nomina**  
Hippocratem Αἰς non pro herba, sed pro instrumento chirurgico **Lib. de Art.**  
legitur. Galenus autem in Glossis Hippo. ait. Αἰς ἔστι μόνον τὸ ὄργανον,  
ἀλλὰ καὶ βοτάνη τις ὅσως ἀνομάζεται. Aris non solum instrumentum, sed  
herbam significat. Arisarum tradit Dioscorid. parvam esse herbulam, quæ radi-  
cem habet oleæ magnitudine, maioris quàm Arum acrimoniæ. Eius post Arum &  
Dracunculum meminit Plinius his verbis. Est & Aris quæ eadem in Aegypto na-  
scitur, similis Aro, minor tantum, minoribusque foliis, & vtrique radice, quæ ta-  
men oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera vnum  
tantum emittens. Hæc Plinius. Huius plantæ genera duo Herbarij ostendunt.  
Matthiolus prius, cui folia sunt Aro similia, à Luca Ghinose accepisse ait, alterum  
ab Anguillara, quod non approbat, neque verum putat. Totidem statuit Clusius,  
prius latifolium, alterum angustifolium. Latifolium Hederae aut Smilacis ferè fo-  
lia habet tria aut quatuor, satis carnosæ, mollia, viridia, & acria, oblongo sulca pe-  
diculo, qua illi adherent vtrinque pinnata, vt Ari folia, sed obtusioribus multo

*Arif. similis Aro. in  
cap. 163. lib. 2.*

ARISARVM prius,  
Matthioli.



ARISARVM alterum,  
Matthioli.



VVV



angulis. Inter hæc pediculus duorum vel trium digitorum longitudine multis rubris maculis variegatus erumpit, cui oblongus flos insidet, cuculli monachi, seu floris Aristolochiæ modo efformatus, amplior tamen, extrema parte nigricans, coloris qui deorsum radiatim definit, in cæteris candidus, caninum oleis, & qui pistillum obtusum incurvum, & veluti ex cucullo spectans continet: radix rotunda & globosa, Aro minor, foris nigricans, intus alba, interdum tuberosa & oblonga, initio dulcis, deinde acris, non adeo tamen uti Ari radix (licet veteres contra

*ARISARVM cum flore*  
*Myconi, angustifolium.*



sentiant) fibris aliquot super eam expansis. Illud à pictura Arisari prioris Matthioli aliquatenus diuersum est. Alterum Clusij Arisarum planè diuersa est forma: eius enim folia oblonga sunt & angusta, Plantaginis angustifoliæ ferè modo, viridia & splendentia, quinque aut sex, post quæ flos seu cucullus oblongus, mucronatus, & retrorsum inflexus candicansque prodit, è cuius rima longus veluti vermis exilit, spithamæ interdum longitudine, inflexus, nunc purpureo, nunc ex purpureo virescente colore, extremo non obtusus, sed acuminatus: fructus racemosus, albus, non ruber (ut quidam, qui non obseruauerunt, prodidere) vixque terra emergens. Latifolium in collibus Lusitanie frequens est, solo lapidoso, in sepibus iuxta vias, vbi Nouembri & Decembri floret, atque nonnullis etiam Beturiæ locis solo sæcundo & pingui, iuxta semitas & aggeres, vbi Ianuario & Februario. Lusitani *Iaro* vocant, quod nomen etià Aro comitane est, Hispani *Fraillos*, id est, fraterculus, fortasse quod eius flos cucullum monachi amulat. Alterum genus in vmbrosis ad olearum ra-

dices nascitur post urbem Olyssiponem. Secundum hoc Arisarum cum flore Myconus ex Hispania misit, in cuius historia à Clusio in quibusdà dissidet. Ex eius recensione, inquit ille, agnoscuntur omnes Ari seu Arisari speciem esse. Inuolucrum enim habet oblongum, intus rufum, aliquantum fœtidum, eiusdem cum Draculi inuolucro coloris. Intra hoc semen continetur in processu longo, superne laui, inferne versus radicem aspero, racematim coharens, cum maturuit rubrum. Hanc

Li. 2. c. 163.

*Vires.*

Li. 24. c. 16.

plantam Guadalupi iuxta Carpentaniam collegisse ait. Arisari radix, auctore Dioscoride, illita nomas sistit. Fiunt collyria ex ea ad fistulas. Corrupta ea indita cuius animalis pudendum. Quæ sic tradit Plinius. Medetur vtraque radice vice-ribus manantibus: item combustis ac fistulis. Collyrio immisso nomas sistunt decoctarum in aqua, & postea tritarum. Sed vnum miraculum ingens, contactu genitali cuiuscunque femini sexus, animal in perniciem agi. Quæ cum mendosa sint, ut ex Dioscoride intelligere licet, sic ex vetere codice emendar Cornarius. Fistulis collyrio immissa. Nomas sistunt decocta folia in aqua, & postea trita rosaceo addito. Arisarum scribit Galenus multò minus esse Aro. Radicem habere oliuæ magnitudine, sed multò esse acrius.

Lib. 6. sim.

DRACON



## DRACONTIVM. CAP. XXVI.



RAECIS *Δρακόνιον*, & *Δρακόνισ*, Dracunculus Latinis, *Serpentaria*, *Nomina*  
& Colubrina, Arabibus *Luf*, *Alluf*, Italis *Dragontea*, Gallis *Serpentaire* &  
*Serpentine*, Germanis *Schlaugenkraut*. Nomen autem à figura sumpsit:

caulis enim glaber purpureis que resperis maculis, vericolori facie  
corpus anguinum repræsentat aequali longitudine. Vertex quoque sinuoso oris  
hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. In antiquissimis Græcis Diosco  
ridis codicibus teste Marcel. Vergilio duo de Dracunculo capita leguntur, vnum  
de maiore, alterum de minore. At neque Galenus, neque post Galenum Paulus  
Aegineta diligentissimus in Græcis medicinarum auctor, & qui Dioscoridis dicta  
vbi que bona fide retulit, Dracunculum priorem nouerunt, neque post Græcos  
Latini scriptores, Apuleius, Serapio, & quod multi apud omnes momenti esse de  
bet, in vetustissimis Latinis codicibus, vnicum est duntaxat Dracunculi caput, al  
terius vestigium nullum. Præterea de utroque eadem ferè traduntur, sed diuersis  
verbis, vt ex alio auctore id caput adscriptum fuisse videatur. Quare viri docti  
supposititium esse illud censuerunt, quod *Δρακόνιον μέγαλον* describit: ideo que  
ipsum hoc loco exierunt, & inter notha retulerunt. Plinius tamen, qui Arum  
cum Dracontio confundit, plura eius genera facit his verbis. Quæ & Aron ma  
gna cum Dracontio litis. Quidam enim eandem esse dixerunt, Glaucias situ dif  
ferunt, Dracontium siluestrem Arum pronuntiando. Aliqui radicem Arum ap  
pellauerunt, caulem verò Dracontium, in totum alium si modò hic est, qui apud  
nos Dracunculus vocatur. Namque Aros radicem nigram, in latitudinem rotun  
dam habet, multoque maiorem, & qua manus impleatur: Dracunculus subruti  
li, & draconis conuoluti modo, vnde ei nomen. Quin & ipsi Græci immen  
sam posuere differentiam, semen Dracunculi feruens mordax que tradendo: tan  
tumque inesse ei virus, vt olfactum grauidis abortum inferat. Idem paulò inferius,  
Dracunculus, quem dixi, Hordeo maturecente effoditur Luna crescente. Omnino  
habentem serpentes fugiunt. Ideò percussis prodesse in potu aiunt maiorem, vt  
& menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus eius & aurium dolori prodest. Id  
autem, quod Græci Dracontium vocant, triplici effigie demonstratum, mihi est,  
foliis Betæ non sine thyrso, flore purpureo. Hoc est, simile Aro. Alij radice longa,  
veluti signata, articulosaque monstrare tribus omnino cauliculis, folia eius ex  
maiori decoqui contra serpentium ictus iubentes. Tertia demonstratio fuit, folio  
quorū haberet annos, totidemque esse folia. Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes  
dabant. Theophrastus quoque quoddam Ari genus Dracontium appellari scribit  
his verbis: *δὲ τὸ Δρακόνιον (καλῶσι γὰρ τὸ Δρακόνιον, ἄρον, διὰ τὸν καυλὸν ἔχειν τινὰ  
περικλινῶν) βίβρατος καὶ φαρμακώδης*. Est Dracontij radix (vocant enim quoddam Ari  
genus Dracontium, quod caulem habeat variegatum) ad esum inepta & medica  
mentaria. De Dracunculo Dioscoridis ab Aro diuerso hic agimus, quem scribit  
folia habere Hederae similia, magna, albis maculis notata, caulem rectum bicubi  
talem, varium, anguis specie, purpureis notis aspersum, baculi crassitudine: fructus  
est in summo racemosus, colore primum herbaceo, & cum maturuit croceo, gu  
stui mordax. Radix quodammodo rotunda est Bulbi specie, Aro similis, corticem  
habes tenuem. Nascentur locis vmbrosis circa sepes. Hic Dioscoridis Dracunculus  
doctis Herbariis, vt Fuchsio, Dodonæo, Pena, Serpentaria est maior vulgò dicta,  
foliis hederaceis, maculas albas habentibus: caule recto, glabro, lani, extima cu  
te serpentis exuium maculis albis, fuscis, vipereis, pullis, puniceis, giluisque, trans  
uersis, obliquis & fortuitis adeò exprimente, vt eminus repente intuenti horro

Genera.

Li. 24. c. 16.

Lib. 7. hist.  
cap. 11.

Lib. 2. c. 16.

Forma.

Locus.

Cap. 86. hi.

Lib. 4. c. 6.

Vena.


Aduerf.



*DRACUNCVLVS* *sive Ser-*  
*pentaria maior, Dodon.*



*SERPENTARIA minor,*  
*Matthioli.*



pentaria, è radice fibrosa, geniculata, latius serpente, & multis fibris humi depacta,  
nullo bulbo appenso aut annexo, vrente gustu & crustas excitante. Iuxta riuius  
& labentes aquas frigidarum & calidarum regionum, vt in Belgio, Northmānia,  
Apulia, Hispania Granata sponte emergit. Inde in hortos suos alij transplantant.  
Serpenta

rem incutiat, scilicet cubitali, bicubitali, in cuius summo ex vaginula emicat cōgestus in eorum racemus, planè Ari, cui radix etiam nō ab-  
similis, rotunda, maior, scēque in latera propa-  
gans. Qui hanc Dracontium Dioscoridis esse  
negant, folia hederacea obiciunt, quod nō sint  
huiusmodi. At illi, inquit Pena, actum agunt,  
nempe monent propter consecutionem & ar-  
ctam similitudinē folia Dracontij dicta fuisse  
hederacea, cum potius folia Ari hederacea de-  
buerint dici, quia huius postea conferuntur ei  
foliis Dracunculi & radice. Vbi Dioscorides ad  
vniuersum habitum plantæ respexit, foliorum  
lauorem, virorem, colorem nitidum superfi-  
ciei contulit, quia essent per quā affines plan-  
tæ, vt vides in collatione radices: vbi singularis  
numeri nulla expressione maioris aut minoris  
Dracontij bis repetit collationem. Nec vniuer-  
so tractu Græciæ ab iis qui eam lustrarunt, eo-  
dem Pena teste, vlla alia vsipiam visā Serpen-  
tia quā ista, quæ etiam non procul a montibus  
Monspelij inter segetes, Gladiolos, & Hyacin-  
thos lata exit, alibi in pinguibus aruis non  
diuersa, nisi ætate, quando decussis seminibus  
& summitatibus extractis à prateruentibus, se-  
quenter repullulant nouellæ. Quæ potuerunt  
Plinio persuadere, vt plures cōstitueret species  
Dracunculi, misceretq; Ari, Arisari cognatas  
differentias, vt in Bechio, alijsq; locis illi conti-  
git. Nec alterius plantæ videtur geminata de-  
scriptio apud Dioscoridem, sed ab alio quopā  
paulum diuersè, vt ferè fit, descripta. Eandem  
Serpentariā Matthioli Dracunculum minor  
rem facit, maiorem longè aliam, cuius radix est  
Rapi effigie, quam tamē non describit, verum  
que se Tridenti ac Venetiis vidisse atfirmans.  
Vbi sepius se frustra sciscitatum fuisse ait Pena.  
negauerunt enim Parauini, Veneti, Veronenses  
pharmacopœi, & doctissimi cōplures vsipiam  
sibi visam: negauerunt item Cortusius & An-  
guillara Penæ anxie sciscitāti. Adiecerunt Her-  
barij Dracunculum palustrem, quem Arum pa-  
lustre vocāt alij, Gallicè *Serpētaire d'eau*, super-  
tigue, q̄ folia promit hederacea, maiora, super-  
nè acuta è caule rotundo, humili, vix palmari  
florem rubellum, odorum, non absimilem Ser-  
pentariae.



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1603

SERPENTARIA maior,  
Matthioli.



DRACUNCVLVS palustris.



Serpentarię succus, auctore Dioscoride, ex semi  
ne expressus & cum oleo in aurem infusus, eius  
dolorem sedat. Lana exceptus & naribus indi-  
tus polypum confumit. Illitus carcinomata cõ-  
pescit. Triginta eius grana cum posca pota abor-  
tum faciunt. Odorem, postquàm flores emarcue-  
runt, recens conceptos fetus enecare aiunt. At  
radix calfaciendi vim habet: orthopnoicis, ru-  
ptis, vulsis, tussis catharro auxiliatur. Humores  
pectoris excreatu faciles reddit tum cocta, tum  
assata, cū melle & per se ipsam in cibo accepta.  
Eadem arida trita cum melle delingitur. Urinã  
ciet, & venerẽ stimulat cum vino pota. Vlcera  
maligna & phagedænica addita Bryonia alba,  
cum melle trita repurgat, & ad cicatricem per-  
ducit. Collyria item ex ipsa fiunt ad fistulas &  
fetus extrahendos. Eum, qui radice manus suas  
confricauerit, à viperis feriri negant. Expurgat  
vitilignes cum aceto illita. Folia trita lina-  
mentorum vice recentibus vulneribus indun-  
tur. Eadem in vino cocta & imposita ad pernio-  
nes faciunt. Et caseus foliis inuolutus à putrefa-  
ctione tutus manet (Hoc foliis Ari Plinius ad-  
scripsit, vt suprã diximus.) Succus autem radice  
ad nubeculas, albugines & caligines conuenit.  
Radix ad sanorum vsus oleris vice est, cruda co-  
ctãve editur. Dracunculi radicem bis terve eli-  
xantes, quoad medicamentosum omne deponat,  
nonnunquam exhibemus mandendam, inquit  
Galenus, quẽadmodum Ari: quando humores  
crassi & lenti, qui in thorace ac pulmonibus cõ-  
tinẽtur, vi maiore indigent. Et alio in loco, Dra-  
cõtiũ, ait, quiddam Aro persimile habet tum  
foliis, tum radice. Cãterũ illo tum acrius est,  
tum amarius: quare calfactorium magis, tenu-  
ioribus partibus. Habet etiam leuiculam quan-  
dam adstrictionem, quã quandoquidem cum  
prãdictis duabus qualitatibus, acri scilicet &  
amara coniuncta est, medicamentum factũ est,  
vt quã maximẽ efficax. Nam radix viscera om-  
nia expurgat, crassos potissimũ & lentos suc-  
cos extenuans: optimũq; remedium est cõtuma-  
cium vlcerum. Expurgat extergetq; strenuẽ tum  
alia, quẽ extersionem desiderant, tum vitiliginẽ  
cũ acerum tum folia, vt pote similem facultatẽ habẽria, vlceribus, vulneribusq; re-  
mẽdiis accommoda sunt, & quantò minũs fuerint sicca, tãtò magis cõglutinãt.  
Nã quã sicciora sunt, viribus sunt acrioribus, quã vt vulneribus cõueniant. Cre-  
ditũ quoq; est caseũ humidũ, si illis foris tectus reponatur, ob tẽperaturẽ illorũ sic-  
catũ, à putredine cõseruari. Fructus valẽtiõr est nũ foliis tantũ, sed & radice. Itaq;  
& cãeros & polypos eliquare creditus est. Succ⁹ quoq; eius vitia oculorũ expurgat.

Lib. 2. c. 151

Lib. 2. Alim.

Lib. 6. sim.



Vide Phytog. pag.  
611.

Archeuta ē  
panis barban.

panis pueri  
symon.

Genera.

Forma.

Locus.

Lib. 25. c. 9.

Ibidem.

CYCLAMINVS vulgaris,  
Lobellij.



Lib. 2. c. 75.

ΥΚΛΑΜΙΝΟΣ vel ἰχθυόθηρον Græcis, Cyclaminus, Rapum, & Tu-  
ber, Umbilicusque terræ Latinis, Cyclamen Officinis mutata voce,  
Panis porcinus & terræ, atque Archanita à nostræ ætatis Herbariis  
dicitur, Mauritanis *Buchormarien Buthermarien*, seu *Bothormarie*, Italis  
*Cyclamino*, & *Pan porcino*, Gallis *Pain de pourceau*, Germanis *Erduurtz*, & *Schuenbrat*.  
Cyclaminum Græci ἐπὶ τοῦ κύβου, id est, ab orbe dixerunt, tum ob folij circinatum  
ambitum, tum ob orbiculatum radicis bulbum. *Ichthyotheron* autem, quod ea  
piscēs necantur. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra velut Rapum  
extuberat: quæ sanè ratione Tuber terræ, quod in molem quandam intumescit, aut  
Umbilicum terræ, quoniam, ut umbilicus circinata figura emergit, sic & Cyclami-  
nus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. *Panem* porcinum haud dubie primi  
vocarunt subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Alij  
quia radicem in orbem circumactam sæpius intueretur, quæ non in globum intu-  
mescens, sed veluti compressa sese in latitudinem explicaret, quæ forma in quoti-  
diano vsu panes visuntur, Terræ panem nominauerunt. Cyclamini species duas  
ponit Dioscorides. Cyclaminus prior folia habet Hederae similia, purpurea, varia,  
suprà infrâque albicantibus maculis: caulem longitudine quatuor digitorum, nu-  
dum, in quo flores Rosarum effigie, purpurei: radicem nigram, Rapo similem, &  
aliquantulum latam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus. Cyclaminus altera  
caules crassos, geniculatos, qui vicinis arboribus capreolorum modo se obvoluit  
flores albos, odoratos. Fructus est velut vix acini, similis, Hederae mollis, gustu le-  
uiter acris & viscosus. Radix inutilis est. Nascitur in locis asperis. Duas etiam spe-  
cies describit Plinius, Dioscoridem ferè exprimens his verbis. Folia habet minora  
quàm Hedera, nigriorâque & tenuiora, sine angulis, in quibus albicant macu-  
le: caule exiguo, inani: floribus purpureis: ra-  
dice lata, ut Rapum videri possit: corrice nigro.  
Nascitur in vmbrosis: nostris Tuber terræ vo-  
catur. Et paulò post de altera sic. Est & altera  
Cyclaminus cognomine Cissanthemos, gen-  
culatis caulibus, superuacuis, à priore distans,  
circa arbores se voluēs: acinis Hederae, sed mol-  
libus: flore cædido, specioso: radice superuacua.  
Mihi & tertia Cyclaminus demonstrata est, co-  
gnomine Chamæcissos, vno omnino foliorum  
dice ramosa, qua piscēs necantur. Hæc Plinius  
Prior Cyclaminus nota est Officinis & Herba-  
riis sine cōtrouersia: altera non item. Matthi-  
olis duas Cyclamini primi generis species Me-  
lus auctore reperiri dixit, minorem & maiorem.  
Minorem se vidisse ait in agro solum Triden-  
tino in vallis Anania montibus, vbi copiose  
nascitur. Sed eam neque depinxit, neque descri-  
psit: dixit tantum radicem esse parua, nucis autem  
lanæ cicerumque magnitudine. Cyclaminum se-  
cundam fatetur se non vidisse. Tragus in Hel-  
uetia, non procul à Curia oppido, nec nō pro-  
pe Velcurium, in planitie inter quædam denta-  
te





ac vlginis locis sita arbuta, plantā quandam  
nāci scripsit elegantissimam, foliis rotundis,  
prorsus cosimilem Afaro, ita vt primo quidem  
intuitu Afarum esse crederet. Sed cū eam effo-  
disset, radicem deprehendit rotundam, rufam,  
magnitudine radicis Croci, gustu aliquantulum  
amarā: flores. odoratissimos, Biesilij colore  
tinctos, odore & forma Violam Martiam pur-  
pureā referentes. Hanc ille Germanicē *Valdtzeit-  
lofen* nominat. Quam cū Hermodactylum esse  
aliquando falsē credidisset, postea Cyclamini  
exigua vera speciem esse iudicauit, quia Cyc-  
laminō priori per omnia responderet, nisi quod  
non perinde acris est & feruens. Nascitur etiam  
in vmbrosis siluis. Dodonæus Cyclaminum alte-  
ram esse arbitratur, quæ hodie *Vitalba*, Gallis  
*Viorne* nuncupatur, Cordus Dulcamaram, alij  
Bryoniam nigram, alij Periclymenum alterum,  
aliis aliæ magis placent. Pena in montibus Alpi-  
nis Rhericis in Italiam proficiscentibus, locis  
vdis, & faxeis itineribus obuiam passim esse al-  
teram Cyclaminum scribit, quæ non est folio  
circinato Afari, aut vulgaris Cyclamini, sed po-

Trag. lib. 2.  
cap. 14.

Lib. 3. cap.  
11. & 48.

Li. de pur-  
ga. cap. 13.

rius triplici mucrone distincto, herba Trinitatis, aut Hederæ helicis modo. Eandē  
etiam Narbonæ riguis montibus & hortis crebram. Eius radices quæ vetustiores,  
magnitudine alterius sunt, quæ nouella, adēdō exigua, vt auellana magnitudinem  
vix superent. A lultioribus caulis est exilis, teneriusculus, & in humum pronus,  
ex quo prælongis pediculis folia surrecta fastigium versūs, vbi sunt flores purpu-  
rei, vulgaris Cyclamini prorsus similes. Nonnunquam & luteos verno tempore  
exortos nondum foliis exortis meminit se vidisse. Florent enim Vere & Autūno  
interdum odorati, aliās non. Lobellius Cyclamini alterius, plantæ hederaceis fo-  
liis in Italia collibus repertæ, rei herbariæ studiosis iconem hanc & descriptionem  
exhibet. Herba est Hederæ foliis sinuatis, paribus, in mollibus, flexilibus, cubito  
prolixioribus cauliculis, floribus oblongis, galericulatis, ex purpura pallentibus.  
Dodonæus tradit præter Cyclaminum alterum Dioscoridis, eius qui orbiculari est  
radice, nempe primi, à recētoribus aliquot obseruatas fuisse species, & foliis qui-  
dam differentes. Prima foliis vires latis, angulosis ac Hederæ similibus, in ambitu  
leuiter serratis, superiore parte in virore nigricantibus, albicantibus tamen macu-  
purea, & vmbilico siue medio folij subalbido, inferiore verō ac prona pur-  
pura, aliquando saturato colore, aliās dilutiore. Flosculi ex tenellis pendent pe-  
diculis, deorsum nutantes, foliolis earum sursum reflexis, & purpureo Viola nigre  
colore non tamen intenso splendentes, odoris exigui. Succedunt capitula semini-  
fera, pediculis in spicas contortis. Radix Bulbi aut Rapi modo in orbē circumacta,  
& aliquantulum in latitudinem pressa, foris nigricat, intus candida, rugas inare-  
scens contrahit. Hanc speciem pinxit etiam Lobellius nomine Cyclamini folio  
Hederæ. Alterius Cyclamini & lata quidem sunt folia, sed non angulosa, verū  
quasi rotunda, nullis superiūs aut omnino obscurissimis apparentibus maculis,  
saturato colore virentia, inferiūs verō è punicante purpura rubentia: flores prioris  
maiores, ac odoratiores: radix aliquantō minor. Tertia species foliis est similiter  
haud angulosis, sed ambitu eorum aliquantū crenato: maculata hæc sunt, sed



CYCLAMINVS altera  
hederaceis foliis, Lobell.



CYCLAMINVS altera  
orbicularis, Dodon.



Li. 2. ca. 1. 8.

Vires &  
Temper.

umbilico nigriore. Flos intensiore colore purpurascit, odoris suauissimi: radix  
quàm aliarum minor. Hæc ex Dodonæo. Vires Cyclamini non vulgares has colo-  
cet Dioscorides. Radix Cyclamini cum hydromelite pota pituitam aquamque  
per inferna trahit: menses pota & apposita cit. Tradunt si prægnans mulier radi-  
cem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Bibitur & in vino  
cōtra lethalia, præsertim leporem marinum. Illita contra serpentium ictus reme-  
dio est. Immissa vino ebrietatem facit. Regium morbum sistit tribus drachmis  
pota cum passo, aut diluta mulsâ. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calido re-  
clinare multis vestibus contextum, quo sudet. Eiectus verò sudor felleus colore  
inuenitur. Succus eius ad purgandum caput naribus instillatur. Ad deicienda  
etiam excrementa in lana subiicitur. Umbilico, imò ventri, & coxæ illitus succus  
aluum mollit, (pro κοιλίαν μαλδός, verus codex habet κοιλίαν ταρατλή, id est, aluum  
turbat. Quæ lectio videtur alteri præferenda, quia purgationes, quas molitur Cy-  
claminus potus admotusque, sunt admodum violentæ & difficiles) verum abortum  
efficit. Suffusus & hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest: medicæ  
mentis abortum facientibus admiscetur. Sedem procidentem cum aceto decoquitur.  
compefcit. Exprimitur succus tusa radice, & ad mellis crassitudinem decoquitur.  
Radix autem extergit, exanthemata reprimat, vulneribus per se ex aceto, aut mel-  
le medetur. Illita lienem minuit, vitia cutis in facie à Sole, & alopecias vlcera  
Decocto eius luxata, podagra & capitis vlcuscula (ἐλκυσμα, id est, manantia vlcera)  
pernionesque vtiliter fountur. Ipsaque in vetere oleo feruefacta, ad cicatricem  
perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Cauata radix oleo repletur, & cineri fer-  
situdinē cōtrahat vnguentū, cū primis vtile pernionibus. Radix Scillæ modo con-  
cisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos cōformatam.  
In veteri codice pro κοπείτω, id est, contusam, legitur κείτω, id est, combustam.  
Cyclaminus



Cyclamini alterius fructus drachmę vnus pōdere potus cū vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus splenem liquat, ita per vrinam & aluum consumens. Bibitur & ad orthopnœam, & reliquias à partu purgat. Easdem vires variis in locis exponit Plinius. Bibitur Cyclamini radix, inquit, contra serpentes omnes, in omnibus serenda domibus, si verum est, vbi fata sit nihil nocere mala medicamenta, amuletum vocant: narrantq; & ebrietatem representari addita in vinum. Radix siccata Scilla modo concisa reponitur decoquitur eadem ad crassitudinem mellis. Suum tamen venenum ei est: traduntq; si pręgnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Lepori marino aduersatur & Cyclaminus. Purgat cum melle in nares addita, & vlcera capitis sanat illita. Ad hypochysim & caliginem Cyclaminum in pastillos diluunt. Soluit ex aqua pota, aut balanis subditis sedem conuersam Cyclamini radix ex aceto sanat. Eius radice decoctum pernionibus prodest. Eruptiones pituita eadem emendat cum melle. Tribus drachmis bibitur in loco calido, & à persfrictionibus tuto: sudores enim felleos mouet. Sanguinis profluuium sistit Cyclaminus, si ore sanguis reiciatur, siue è naribus, siue aluo fluat, siue fœminatum vtero. Vlcerata manantia sanat Cyclamini radix, vel per se, vel ex aceto, vel cum melle. Eadem & contra steatomata efficax. Omnia corpori infixā extrahuntur Cyclamini radicibus cum melle: cutis maculas omnes emendat. Theophrastus de Cyclamini prioris viribus hæc prodidit. τὸ δὲ καλὸν μὲν ἢ μὴν πρὶν αὖτε τὰς πρὸς τὰς φλεγμονῶν, καὶ προσθεῖν ταῖς γυναιξὶ, καὶ πρὸς τὰ ἐλκῆ ἐν μέλει, ὁ δὲ ὀπὸς πρὸς τὰς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καθάρσις ἐν μέλει ἐγγερόμεος: καὶ πρὸς τὸ μεθύσκεν, ἂν ἐν οἶνῳ διασέχων διδῶ τις πρὶν ἀγαθὴν δὲ καὶ τὴν πρὶν καὶ εἰς αἰκίαιον περιέπειν, καὶ εἰς φίλτρα. ἔτι δὲ ὀρύξωσι, καὶ λαχρίσιν. Ἔτι οἶνον διδύσαντες, τροχίσκος ποιεῖσιν ὡς τῆς τρυγός, ἢ πρὸς μεθυσθῆναι. Id est, Cyclamini radix ad inflammationum exhalationes valet, & ad menses subdita, & ad vlcerata ex melle. Succus autem ad purgandum caput cum melle infusus, & ad ebrietatem, si vino inspersum potui dederis. Confert & radix ad partus celeritatem appensa, & ad amatoria. Cum autem effoderint, vrunt: deinde cum vino subegerint, in pastillos formant sicuti facis vini, qua macula abstergantur. Cyclaminus vterque, auctore Mesue, est medicatorius, calidus siccus initio tertij ordinis. Galenus gradus non finit, sed absterget, inquit, incidit, ora venarum aperit, attrahit, digerit, quod ex particularibus operibus eius perspicuum est. Nam succus eius hæmorrhoidas referat, violentèrque ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis phymata, strumas, aliisque durities digerentibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit: adhuc per nares quoque expurgat. Adeo vehemens eius facultas est, vt abdomine illito ventrem subducatur, & fœtum interimat. Nam & alioqui validum interimendo fœtui medicamentum est in pesto additus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa vehemens sit: nam & menses siue pota, siue apposita euocat, & aurigini prodest, non modo ipsum viscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem eiiciens. Proinde post potionem, sudoris adiuuanda prouocatio est. Modus eius bibendi est diachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cuius curret lienem quoque induratum iuuat emplastri modo illita tum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant. Porro altera Cyclaminus radicem quidem superuacaneam habet, sed fructum admodum efficacem: nam hic cum vino pluribus diebus potus lienes sanat, vrinam mouens, ac venter subducens: locos quoque eiicit, & asthmaticis prodest. Qualitas eius gustanti acris est & sublena. Hæc Galenus. Cyclamini alterius vires, inquit Pena, communi prioribus, & vsus frequens Narbonensibus ad Hispanicam lucem.

Lib. 25. c. 9.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Li. 7. simpl.

LEON



## Nomina

Li. 3. ca. 49.

Forma.

Vide Phleg. pag.  
620.

## Locus.

Li. 27. ca. 11.

## Vires &amp;

Temper.

Ibidem.

Lib. 7. sim.



RAECI λεοντοπέταλον vocant, Latini  
Leontopetalon, id est, Leoninum  
folium. Caulem, ut describit Dio-  
scorides, emittit dodran:alem, aut

etiam maiorem, plurimas alas habentē, in qua-  
rum cacuminibus siliquæ sunt veluti in Cicere,  
& in his duo aut tria parua semina: flores puni-  
cei, Anemonæ similes: folia similia Brassicæ, in-  
cisa foliorum Papaveris modo: radices nigrae,  
Rapo similes, eminentias habentes veluti nodos  
quosdam. Nascitur in aruis ac segetibus. Sic pla-  
ne descripsit Plin. Leontopetalon alij Rapheton  
vocant, folio Brassicæ, caule semipedali: ala  
multa, seme in cacumine in siliquis Cicereis mo-  
do: radix Rapo similis, grandis, nigra. Nascitur  
in aruis. Hanc plantam, eiusque nigram exube-  
rantemq; radicē Rapi instar vidisse se ait Ma-  
thiolus non modò Venetiis & Patauij in qui-  
busdam hortis, verum etiam in Hetruria aruis,  
aliisque Italiæ locis, nascique frequentem in  
Apulia. Huius radix, inquit Dioscorides, in vino

pota auxiliatur demorsis à serpentibus, breui dolorem omnem sedans. Miscetur  
etiam infusus per clysterem in coxendicum affectione. Sic & Plinius. Radix aduer-  
satur omnium serpentium generibus ex vino pota: nec alia res celerius proficit.  
Datur & ischiadicis. Leontopetali radice maxime vimur, inquit Galen. Digerenda  
facultatem, exsiccandi, exsiccandi in tertio ordine possidet.

## COTYLEDON. CAP. XXIX.

UMBILICVS Veneris, Matt.

## Nomen.

Li. 4. ca. 87.

Forma.

Lib. 25. c. 13.



COTYLEDON Græcè, Latine  
Cotyledon, Acerabulū, Umbilicus  
Veneris nominatur, Italicè Omphalo-  
di Veneris, in Hetruria, quod eius ro-  
lia hctilium operculis similia sint, Copertinae  
Hispanicè Scudetes, Gallicè Escuelles. Dicitur autē  
Cotyledon à concauo folio acetabulū aut um-  
bolicum imitato. Folium enim habet, inquit  
Dioscorides, rotundum, acetabuli figura, inen-  
denter cauum: caulem in medio breuē, in quo  
semen est: radicem rotundam oliuæ herbæ  
delineauit Plinius. Cotyledon paruula herbæ  
cauio, ut coxendices. Nascitur in maritimis pe-  
trosisq; viridis, radice oliuæ modo rotunda.  
Hæc Plinius. Vulgaris est notitia planta à Ma-  
thiolo rectè depicta. Radicis & foliorum saccis  
circumlitus aut infusus coniecta genitalia nu-  
sipelaris, pernionibus, strumis, & stomacho  
æstuanti auxiliatur. Folia cum radice comesta  
calculos

## Vires.







Li. 7. med. timis, sed mediterraneis, magisque ad Septentrionē sitis. Galenus in Asclepiadeo  
 gener. quodam acopo Macedonicam habet, sicut etiā Carthaginensem in quadam The-  
 riaca, lib. 2. de Antidotis recipit. Quanquam eam quæ ex Lybia magna sua ætate  
 plurima adferebatur, tantum ab Illyrica distare ait, quantum mortuum corpus à  
 Lib. 1. An- viuo. Iris passim in hortis colitur, foliis acutioribus, rigidioribus & latioribus quā  
 tidot. Acori aut Gladioli, ut scribit Pena. Flores cōstant senis potissimū foliolis, quorum  
 Loc. tria deorsum repanda arcus modo curvantur, alia tria sursum, & contra se mutuo  
 reflexa stamina aliquot cōdunt, quibus marcidis Æstate media ferē, siliqua Xyn-  
 dis aut Acori palustris non dispar: angulosum item semē erui, sed minus se prodit,  
 quod omisit Dioscorides. Radix est viuida plan-  
 ta semper virentis, plena, solida, albida, in mul-  
 tas propagines per summum cespitem sulca, a-  
 maro, vehementi, acriore & feruidiore, dum  
 recens est, gustu, ut & purgandi vi, quam arida  
 facta prorsus amittit, multumque feruoris, in-  
 gratique saporis remittit, & odorator, eoque  
 commendatior euadit, præsertim Thulca, siue  
 Florentina, hodie primam laudem adepta, ut  
 scripsit Pena. Quæ plurima in mediterraneis,  
 non procul à Florentinis montibus eruitur,  
 multum temperie agri, & ætheris ad Illyricos  
 tractus accedentibus, ideòque præstantior Illyri-  
 ca habetur, quia hæc nonnihil rufescat, minū-  
 nitida sit, Florentina verò candidior, & elegan-  
 tiore aspectu, suauiorque odore sit. Neutra tamē  
 illic flaccida, rugosa, raucida, fuscave aut mu-  
 da insolata sit, ut nostras, præsertim Septentrio-  
 nalis. Quamuis autem Galenus Illyricæ palmam  
 statuerit, cum tamen idem sanxerit quodlibet  
 simplex medicamentum in suo genere quo sit  
 fragrantius, eo esse præstantius, de eius senten-  
 tia Florentinæ postponat quis Illyricum, à eu-  
 rius bonitate tantum abesse Africanam, quantum animal vegetum à suo cadu-  
 re Galenus dixit, ut supra retulimus. Quare videtur Iris natalibus gaudere neque  
 admodum feruidis, ut Africa, neque ita frigidis, ut Septentrionum, sed montosis  
 temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam & laudatissi-  
 mam ferunt. Sic ad Drilonis & Naronæ fluminum ripas, non in maritimis, Illy-  
 ricam Irin nasci cecinit Nicander,

IRIS domestica, Matth.



Ibidem.

In Theria.

Ἰριν ἢ, ὡς ἐθρεψε Νελων, καὶ νάρονος ὄχθιν.

Id est,

Irinq, quam Drilonis & Naronis ripa aluit.

Vbi Scholiastes Illyricam Irin intelligit: Drilonem enim fluuiū esse Illyriorum &  
 Narorum, qui Illyrios & Liburnos separat, vbi Cadmus & Harmonia habitauerunt  
 in serpentes transmutati. Et Ptolemæus Drilonem & Naronem fluuios esse scribit  
 in Dalmatia Illyrico vicina. Quare non genere aut specie differunt hæ Irides, sed  
 multiplicem hanc sortiuntur varietatem non modò viribus, ut dictum est, sed  
 etiam magnitudine, odore, & potissimū florum colore. Cuius multiplicis venu-  
 sta mixtura, ut ait Pena, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vnius duntaxat  
 floribus spectanda est. Elegantiæ enim hortensis amantes non modò purpuream  
 (quæ vbiuis ferè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed  
 etiam quasdam floribus candidis, Liliaceis alunt, non item luteam, ut Dodonæus  
 parat

Iris vulga-  
 ris candidis  
 floribus.



putat, rarus vulgarem aureis floribus vbique in pratis Acorū, esse Iridem. Cuius radices, vt idem tradit, tantopere adstringunt, & Iridis facultatibus aduersantur, vt rectè scripserit hæc vel duntaxat appenſas quemlibet sanguinis fluxum sistere. Hæc autem florum purpureorum & alborum varietas fecit, vt Herbariorum vul-

Lib. 2. hist. ca. 35. & de florib. cap. 40. & 45.

*IRIS siluestris, Matth.*



*IRIS siluestris altera, Matthioli.*



gus olim inter Iris & Ireos discrimen fecerint, vt vulgatus ille versiculus indicat,

*Iris purpureum florem gerit, Ireos album.*

Quæ distinctio ineptior est, quā vt refutatione egeat. Iris siluestris duū est generum auctore Matth. Vna quæ plurimū saxosis nascitur locis, satia per omnia similis, minoribus tamen foliis: floribus, caulib⁹, & radicibus graciliorib⁹. Altera foliis Gladioli, longioribus: radice tenui, lignosa, geniculata, subruſa, inodora: caule breui: flore cæteris longè minore, odore Armeniaci mali, qui constat foliis nouem, purpureis, quorum extrema superiore tantū parte aureis pinguntur lineis. Siluestris vtriusque generis plurima, inquit, oritur in Goritienſi agro Saluatino monte, & lapidiæ vallibus inter saxa, odore non ingrato. Pena duas etiam Irides, quas silueſtres vocant recentiores, agnoſcit, inodoras, minus obuias, multoque minus aromatica dote commendabiles. Vna hortensi fermè eadem, inquit, nisi quia tota gracilior, quæ plurimū squallidis saxorum marginibus sponte oritur, cultaque retinet speciem, qua distat à satia, etiā sapore ingrato, odore nullo. In subalpinis Ligurum & Taurinensium passim occurrit. Alteram non triualis venustatis se primū legisse ait in Nitiobrigum maritimis & sabuletis herbis, non procul ab oppido Frontignano ex aduerso montis Cetij multam, nec vſpiam alibi in vniuersa Gallia aut Italia facilem repertu, nisi maritimis: cuius radicis recēs erutæ effractæq; nullū vnquam se obseruisse Armeniaci mali odorem, qualem ei inesse scribit Matthiolus. Radix, caulis, folium, siliqua, & semen Iridis, sed minora, minusque aromatica, saltem quibus locis natalibus illam obseruauit, scilicet humidis & incultis. Flores tamen Iunio aptius Xyridem colore & figura, foliolisque minus repandis exprimunt. Sapor illi feruidus, amarus, tenuitas multa, quam etiam in medico vsu se cōpertam habuisse scripsit. His idem Pena aliam addit Iridem minimam & rarissimam omnium, saxatilem, Narbonensem etiam, quæ radicis plexu, substantia densa, & colore Illyricæ ab similibus nō est: caule verò nullo, præsertim natalitiis: folio latiusculo, rigido, mucronato, palmum alto,



Dodon. de  
flor. ca. 4. 2.  
cuiusmodi Gladioli: flore, semine, siliqua Xyridis. Hæc statim atque è terra asurgit  
Chamaeontis albi modo pusilla humilisque permanet: ob id à nonnullis Cha-  
maeiris nuncupatur. Plurima oritur in agro Narbonensi, locis aridis & saxosis, se-  
cus specum illam scsquimiliari à Monspelio disitam, via qua Frontignagnū tur,

*IRIS perpusilla & saxatilis.*



*CHAMAÆIRIS seu alia per-  
pusilla Iris latifolia, Lob.*

Lib. purg.




Lib. purg.

in cuius cauitibus & rupium commilluris fre-  
quens adolescit prope Ferulam. Chamaeiris seu  
alia perpusilla Iris latifolia à Lobellio picta est,  
quæ ex Monspelienfi agro in Belgium & An-  
gliam transmissa, frigido humidoque solo ex-  
cepta, non secus ac innumeræ calidarum regio-  
num peregrinæ stirpes, soli & celi tēperie mu-  
tata varias subit mutationes. Caulis illi dodran-  
talis, alicubi pedalis: flores candidi, aut lutei, aut  
violacei. Alibi caule carentes, dilute rubentes,  
violacei, striati, & ex luteo pallentes obferuntur.  
Idem annotat, Cladium Irides Austriacas odora-  
tis Vienna Belgium misisse, cum Chamaeiris  
purpureo odorato flore. Alterum Iridis genus  
descripsit & depinxit Dodon. Chamaeiridem  
vocaui Lobellius Iridē perpusillam, siluestrem,  
angustifoliā. Folia habet Gladioli altitudine,  
foliis breviora: caulem palmi altitudine,  
suis pediculis insidentes erumpunt odorati, ex  
caeruleo violacei, aliquando ex purpureo viol-  
cei, ex nouem foliolis conflati: radix gracilis,  
minimo digito duplo minor, obliqua, foris  
fa, intus candida, acris, gustu Xyridis. In Belgio  
& Germania frequens, Maio mense flores, Hieme  
pereūt, Vere noua erumpūt. Dodonæus  
longē diuersam Iridem depinxit, quam tubero-  
sam vocat, cui folia serē Chamaeiris oblonga,  
angusta, tenuis cauliculus, flos in cacumine ter-  
ma Iridis, minor, angustiorūque foliorū  
obscurè virens, & quo aliis fimbria loco nigre-  
cans. Capitulum satis magnum semine rotunde  
dependet, in tres rimas fatiscens. Semen rotun-  
dum Ochro minus, initio albicat. Non velut  
formæ radix: ante florem duo vel tres veluti  
bulbi parui coharēt: hoc enato in plures singuli  
extuberant propagines, quarum nonnulli digi-  
tum referunt: vnde illi Hermodactyli nomen  
pleriq; dedēre, Iridis siluestris genus esse potest  
Dodonæi sententia, non Ephemeris. Sunt qui  
velint hūc esse quem Matthiolus perperam pro-  
vero depinxit Hermodactylo. Eius tamē pictu-  
ra parum cum hac conuenit. A quibusdam Leu-  
chitis prior Dioscoridis cēsetur esse. Item aliam  
Dodonæus pinxit, quam bifloram Cladium



*IRIS tuberosa,*  
*Dodonei.*



*IRIS biflora, Clusij, & Dod.*




Clusius Lusitanicā seu biflorā, quā etiam pinxit & descripsit. Huius, inquit, folia breviora sunt & angustiora vulgari Iride, alioqui haud absimilia: in summo caule, qui pedalis est, flos ē vaginulis purpurascens prominet, senis foliolis constans, vt vulgaris Iridis, sed minor aliquantulum, & colore omnino violaceo, seu purpureo saturatiore, qui deorsū reflexis tribus foliis intensius nitet: villosa illa fimbria, quā in vulgari lutea, in hoc omnino candida est. Vnicum autem plerumque in singulis caulibus florem profert, interdum sed raro alterum, rarissimè tertium, singulari quemque vaginula inclusum, iucundissimo odore, & Liliū cōuallium æmulante. Istius florem se vidisse ait Clusius, qui quaterna haberet folia deorsum vergentia, totidem ligulas bifidas fimbriam & stamina contegentes, & quaterna etiam folia sursum reflexa, & inuicem amplectentia, vt interdum in floribus Natura ludere solet. Semen angulosum & rugosū in siliqua triangulari satis crassa sed raro perficit. Radix subest nodosa ac veluti geniculata, solida, pollicari crassitudine incurua, intus candida, ingrati saporis, & paulò post feruidissimi gustus, multis fibris summa terra hærens, & in multas propagines è lateribus nascentes distributa. Nascitur passim in Lusitania supra Tagum, nunc pingui solo, nunc planè lapidoso. Bis floret, Vere cum aliis Iridis generibus, & Autumno: quam ob causam bifloram Clusius nuncupauit. Huic ferè similem esse ait eam, quam Alfonso Pancius medicus Ferrariensis Belgium misit, nomine Dalmaticæ minoris, nisi quod paulò angustiore folio videtur, flores purpuræ dilutioris, & terni, aut quaterni in singulis caulibus, oblongiori pediculo inhærentes. Dalmatica maior, quam idem misit, vulgari forma & magnitudine similis, inquit Clusius, sed est aspectu hilaris & peruenuustus foliorum exortus lateratim traiectus, vt describit Lobellius, & radiatim alas pauonis explicatas imitatur: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis, nitentibus senis foliolis, alternatim etiam repandis. Virera Belgica hanc in deliris habent. His iungenda Iris flore cæruleo obsoleto, cinereo ve polyanthes à Lobellio depicta. Aliquot alias plantas in Hispania obseruauit Clusius, quæ cum flore sint Iridis aut Xyridis, tamen bulbaceas habet radices: quare eas Irides bulbosas nominauit. Prior sena sæpius habet folia longiuscula & latiuscula, inuicem alternatim amplectentia, mollia, in terram recurua, supernè ex viridi pallen-








*IRIS bulbosa angustifolia*  
flore vario, Clusij, & Dodon.



iucundo spirat odore præmanſi ferè Coriãdri. Flori ſuccedit ſiliqua longa, gracilis, triangula, ſubruſum anguloſumq; ſemen continens. Radix bulbosa, candida, ſubdulcis, ſpadiſſis aliquot membranis inuoluta, quæ nucleis vti Al- lium ferè ſeparatur, & feri poteſt. Lobellius Hiſpanicum poëtarum Hyacinthum vocauit. Tertia iam dictæ per omnia ſimilis ferè eſt, breuiore tamen caule, gracilioribûſque, & ex viridi pallescentibus foliis: flores bini contra- rios latiorẽſque & lutei, inodori: ſiliqua craſ- ſior & breuior: ſemen ſuperiori ſimile: radix iam dictæ ſimilis, quæ nucleis etiam ſeparatur. Naſcitur pingui ſolo, & petroſis collibus ad Ta- gum ſupra Olyſiponem. Floret quo ſuperior tempore. Lobellius Hyacinthum poëtarum lu- teum nuncupat. Priorem Cluſius appellat lati- foliam, & à floris colore purpuream, ſive cæ- ruleam, Hiſpani nunc *Lirio* ſimpliciter, nunc *Lirio Eſpadanal*, & *Lirios azules*, hoc eſt, Lirium enſiforme, & Lirium cæruleum. Alteram angu- ſtifo liam flore vario nuncupat, Hiſpani *Lirio Illyrico*. Tertiam Iridem bulbosa flore luteo, eſt Lirium maius Dodonæi, foliis Porro, aut Aſphodelo ſimilibus: caule cubitali: flore Iridis, aut Siſyrinchij, colore aut toto luteo, aut cæruleo purpureo, cum li- neis luteis, quæ in inferioribus foliolis ſimbriæ loco ſunt: radice oblonga, bulbosa,

Lufitani *Reylla buey* De harum Iridum viribus nihil adhuc compertum. His affine eſt Lirium maius Dodonæi, foliis Porro, aut Aſphodelo ſimilibus: caule cubitali: flore Iridis, aut Siſyrinchij, colore aut toto luteo, aut cæruleo purpureo, cum li- neis luteis, quæ in inferioribus foliolis ſimbriæ loco ſunt: radice oblonga, bulbosa,

*LIRIVM* maius, aut *Lirium*  
verum, Dodonæi.



*IRIS angustifolia flore*  
luteo, Clusij.





Cepæ simili. <sup>284</sup> <sup>109</sup> videtur esse Theophr. quod Vere post Liliū exit, & aliud à Lilio & Narcisso est. Plerisque Hispaniæ, Baticæ, & Lusitanicæ locis sponte gignitur. His addemus duas Lobelij Irides. Prior admodum rara est, cui flores Chamæiridis Monspeliciacæ, tribus foliis repandis, peregrina elegantia striatis, oblenre violaceis. In Belgij hortis prouenit. Alterius florem vidit Bruxellis delatum, eximia magnitudinis, maculis fortuitis transuersis & obliquis, giluis, cinereis & purpuræ nigræque variatum: foliis tantillum gladij ritu vndantibus. Cætera omnia Iridi vulgaræ, aut Dalmaticæ similia. Cæteræ Irides calfaciendi extenuandiq; vim obtinent. Contra tussim efficaces, humorésque excreatu difficiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnū conciliant, lacrymas cient: torminibus medentur. Cum aceto potæ venenatorum morsibus, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur.

Vires &  
Temper.  
Diosc. li. i.  
cap. i.

*IRIS lutea variata.*



Li. i. c. 22.

Menses cum vino potæ ducunt. Decoctum earum ad muliebria fomenta vtile, molliens aperiensque locos. Ischiadicis infunditur. Fistulas & sinus carne implent. Quinetiam glandis modo cum melle appositæ fæctus extrahunt. Strumas veterésque duritias coctæ & illitæ emolliunt. Arida vlcera explent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo vtiliter illinuntur. Lentigines, vitia cutis in facie cū Elæboro albo, & duabus mellis partibus illitæ emendant. Pelsis, malagmaris, & acopis medentur. In vniuersum magni vsus sunt. Infantibus circumligari salubre est, inquit Plinius, denticulis præcipuè & tussientibus, tinearumque vitio laborantibus instillari. Cæteri effectus eius non multum à melle differunt. Vlcers purgat, caput multum à melle differunt. Vlcers purgat, caput præcipuè, suppuraciones veteres: aluum soluit, duabus drachmis cum melle. Tussim, tormina, inflationes potæ, lienes ex aceto. Cõtra serpentium & araneorū morsus ex posca valet. Contra scorpiones duarum drachmarum pondere in pane, vel aqua sumitur. Contra canam mor-

sus ex oleo imponitur: & cõtra perfrictiones. Sic & neruorū doloribus. Lūbis verò & coxendicibus cū resina illinitur. Vis ei cõcalfactoria. Naribus subducta stermentamenta mouet, caputq; purgat. Dolori capitis cū cotoneis malis aut struthois illinitur. Crapulas quoq; & orthopnœas discutit. Vomitiones ciet, duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cū melle. Ad paronychias farina eius comanducatur: cū vino ad clauos vel verrucas, triduoq; nō soluitur. Halitus oris comanducatur: abolet, alarumq; vitia. Succo duritias omnes emollit. Somnū cõciliat, sed genituram cõsumit. Sedis rimas & cõdylomata, omniaq; in corpore excrecentia, lūbis decocto ij colluuntur. Coquit, abstergit, digerit, lenit, referat, expurgat & detrahit. Vulnerariis medicamentis admixta sarcotica est. Radicis succus drachmis tribus, galangæ, zedoariæ, singulorū drachmis duabus, cinnamomi, caryophyllorum, singulorū sesquidrachma, brassicæ marinæ semuncia, & melle quantum sufficit ad excipiendū, quo maximè iuuatur hydropici, si quotidie semuncia ieiuni den-

In cas. li.



rarint. Radicum farina drachmarum quatuor pondere additis cinnamomi & anethi singulorum drachmis duabus, & croci scrupulo, tumores & dolores testiculorum mirificè tollit, si panni coccinei frusto meraco albo perfuso hæc omnia in puluerem trita excipiantur, & calida apponantur. Hæc radices velsibus interpositæ, eas à tinearum erosionibus tuentur, & odoris fragrantia commendant. Radix trita, & ex aceto pota omnibus aduersatur venenis. Succus naribus infusus cerebrum à pituita expurgat: ventriculo tamen nocet: ideo non exhibendus nisi cum mullâ & Indica Nardo. Potum radice decoctum obstructiones aperit, præsertim cum crassa materia impacta fuerit, ventris tineas pellit, vrinas ciet, renum calculos eiicit. Datur vtiliter potandum ictericis: sudores enim mouet, & auriginem exterit. Pulmones & thoracem expurgat, aut iocinoris inflammationibus auxiliatur. Recentes radices saccharo conditæ aut melle, dantur vtiliter deuorandæ vnciæ pondere calculo affectis, anhelosis, hydropicis ac resolutis. Eadem in passo decoctæ contusæq; addita hordeacea farina & illitæ parotidas discutunt. Illyricæ puluis sesquidrachmæ pondere datur ex passo calido ad iliacos affectus. Oleum, quod ex floribus & radicibus succo paratur, resouit, emollit, concoquit, frigidos dolores mulcet, attenuat, & mirificè prodest iocinoris & lienis doloribus. Podagricos iuuat, lenitque articulorum duritiem, & cæterarum corporis partium. Valet & ad frigidos vteri dolores, ad conuulsos, & aurium cruciatus. Vfus apud veteres radicum tantum, florum apud recentiores. Hæc ex Matthiolo.

ACORVM.

CAP. XXXI.

**A**KOPON Græcè, & ἀκόπος Plinio, Latine Acorum & Acorus. In Officinis nomen retinet, Arabicè *Vage* seu *Vgi*. *Ἀκρόδισμα* etiam Græci vocarunt Apuleio teste, id est, Veneream, & Piper apum, quod ea in alueariis suspensâ nunquam diffugiant apes. Dixerunt autem Græci, quia τὰς χόρπας, id est, pupillis, siue aciei oculorum caliginosâ mederetur. Acorum depinxit Dioscorides foliis Iridis, angustioribus tamen, radicibus non dissimilibus, implicatis, neque in rectum enatis, sed obliquis, & in superficie positâ, quæ geniculis distinctæ sunt, subalbæ, gustu acres, odore non ingrata. Præstat densum, candidum, non cariosum, plenum & odoratum, cuiusmodi est in Colchide & Galatia. Acorus folia Iridis habet, inquit Plinius, angustiora tamē & longiore pediculo: radices nigras, minuscule venosâs, cæterò & has similes Iridis, gustu acres, odore non ingratas, ruptu faciles. Optimæ Ponticæ, deinde Galaticæ, mox Creticæ. Sed primæ in Colchide iuxta Phasin amnem, & vbiçunq; in aquosis. Recentioribus virus magis (alijs, vires magis, legunt) quàm vetustis. Creticæ candidiores Ponticis. In his Plinius cum Dioscoride prorsus conueniret, nisi radices nigras tribueret, & minus venosâs esse, ac ruptu faciles adderet, quanquam in vetustis quibusdam legitur raptu, in alijs erutu. Legitimum istud Acorum scitè à Matthiolo expressum est, foliis Iridis, angustioribus longioribusque, odoratis ac gustu seruidis: radicibus Iridis æmulis, frequenter geniculatis, firmis, subcandidis, innumeris ima parte adnatis fibris, odoratis, gustu acris ac subamaro, complicatis, haud in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, & summa tellure sese diffundentibus. Caule est laui, ex quo ramuli prodeunt, in quorum cacuminibus nunc camenta quadam exoriuntur (ita affirmante Quacelbeno medicor: ea enim se nō vidisse ait Matthiolus) nucis Ponticæ iulis, aut longo Piperi similia. Talis est legitima Acori planta, quam Constantinopoli ad Matthiolum miserunt Augelius de Bourbecke, Ferdinandi Cæsaris ad Turcarum imperatorem orator, & Qua-

Nomina

*Uile Physic. pag. 59.*

Pena in Aduers.

Lib. i. c. 2.

Forma.

Lib. 2. c. 13.



celbenus medicus, è Nicomedia, ex quodam vastæ magnitudinis lacu perita, vbi copiosum prouenit Acorum. Est enim Nicomedia Bithyniæ ciuitas, Galatis ac Colchis vicina, vbi optimum Acorum nasci tradit Dioscorides. Eandem Acori veri delineationem ex virëtis plantæ inspectione tradidit Lobellius scire admodum & accuratè, id nimirum folia Xyridis habere, sed oblōgia & angustiora, sesqui-

ACORVM verum,  
Matthioli.



ACORVM cum flore, domini Robini,  
regis Francorum Herbarij.



*Calamus aromaticus  
officinarum.*

cubito maiora, nitida, ex atro virentia, consimili radici eximia fragrantia prædita, quæ Iridis siluestris ritu Hieme marcescunt, & Vere pullulant: radices quales in Officinis prostant nomine Calami aromatici, implicatas, nec in rectum, nec altum actas, sed cespitem summo in obliquum, vt rectè dixit Dioscorus. sparsas, subtris numerosa coma fibratas, albicantes foris, intus candidas, gustu acres & amaras, & geniculis distinctas, ex quibus vtrinque alternatim alarum ritu aptantur pullulationes. Neque caulem, neque florem edidisse ait. Idem de ea quam aluit prodidit Cladius quinimò asserit relatu Augerij de Bousbecke, Cæsaris ad Turcarum Imperatorem oratoris, & Quacelbeni medici, nullum vbi nascitur sponte, neque florem neque semen proferre, sed duntaxat nucamenta quædam iulis nucis Ponticæ similia, è ramulis ex laui caule prodeuntibus pendentia. Nascitur autem ingenti quodam lacu ad radices montis præcelsi iuxta Prussiam Bithyniæ urbem. Hac ideo inculcauimus, tum vt omnes apertissimè Acorum verum agnoscerent, tum vt intelligerent id prorsus esse (vt periti omnes huiusce temporis Herbarij censuerunt) quod Officinæ falso Calamum aromaticum vocant, non Galangam maiorem, vt quidam opinati sunt, multo minùs Acorum nostratè palustre, Gallis *Glaiacul de marais* dictum, Germanis *Geelshuurtel* & *Drachenuurtz*, Belgis *Geelisch*: Officinæ olim Acorum perperam appellauere, & maiori errore radicibus eius pro genuino Acoro vsæ sunt: nam non forma modò, sed viribus potissimum ab Acoro dissidet, Quare Pseudoacorum plerique nominarunt: Dodonæus Iridem luteam siluestrem, aut potiùs Pseudonidem nuncupare maluit, vtpote Iridi quàm Acoro fr-

Lib. 2. hist.  
cap. 35. &  
De florib.  
cap. 45.



ACORVS luteus falsus,  
Matthioli.



PSEUDOACORVS  
caeruleus, Tragi.



miliore: cum contra Acoro aut Galangæ quàm Iridi propter radicis vim adstrictoriam similior sit. Quidam Butomum Theophrasti esse volunt, & verè quidem, ut opinor: quia Butomū Theophrasto lib. 1. cap. 8. caulem læuem & æquale habet, ut & Cyperus: capite verò 17. lib. eiusdem foliū habet Arundinis & Cyperi modo, velut ex duobus constans angulosum, & media parte velut carinatum: fructum, ut alij legunt, magnum, ut alij, nigricantem, magnitudine Sidaæ proximū. Quæ Acoro palustri conueniunt. Dictum autem Butomū, quòd à bubus libenter edatur ac proscindatur. Est igitur Pseudoacorus planta foliis Iridis, longioribus & angustioribus, dorso aliquantulum vtrinque extante, ensis figura: caulibus glabris, rotundis, cauis, nonnunquam bicubitalibus, in quorum cacuminibus flores multi exeunt, lutei, foliolis ternis deorsum vergentibus, ternis aliis multò minoribus & surrectis. Siliquæ crassæ succedunt triangulares, in quibus semina multa simul cōpressa, ordine digesta, plana, cartilaginea, lentibus maiora: radices obliquæ, longæ, geniculatæ, cirrosæ, in propagines diuisæ, pallidè rubentes, gustu adstringentes. Nascitur in palustribus locis, humidis & riguis tractibus, Italia, Germania, Gallia, Belgioque familiaris. Floret Maio & Iunio mensibus. Tragus Pseudoacoro Gladiolum quendam cæruleum minorem subiungit, quem potius Pseudoacorum cæruleum vocare debuerat. In quibusdam humectis pratis, inquit, & campis, qui Rheno, & prope Vormatiam & Oppenheimium oppida adiacent, plantæ genus hoc inuenit, cuius flores aquei penè coloris, sed cum cæruleo mixti, ternis singuli versus terram inflexis foliolis præditi. Cæterum quod ad reliqua attinet, folia, caulem, radicem, ea ad Iridem proximè accedunt, nisi quòd tota sua substantia magis exigua, & angustioribus foliis & acutioribus illa esse deprehenditur. Semen fert in oblongis & triangularibus siliquis, non aliter ac Pseudoacorus. De singulorum viribus nunc dicendum. Acori radix calfaciendi vim habet, auctore Dioscoride. Decoctum eius potum vrinam cit. Prodest lateris, thoracis, & iecoris doloribus: torminibus, ruptis, conuulsis. Lienis minuit. Vrinæ stillicidio & venenatorum moribus subuenit. In fessu, quemadmodum Iris, ad muliebria utilis est. Succus radicis caligines oculorum discutit. Antidotis radix vtiliter admiscetur. Vis ei ad calfaciendum extenuandumque efficax, inquit Plinius, cōtra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem

Lib. 6. 2.  
Vires &  
Temper.

Lib. 25. cap. 3.



co eiusdem potio, contrâque serpentes. Et variis in locis. Pectoribus subuenit, ideo antidotis miscetur. Iocinori medetur, thoraci quoque & præcordiis. Vrinam citius decoctum, & omnia vesicæ vitia sanat. Testium tumores radix decocta in vino, tritâque & illita mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto huius herbarum fouentibus. Contusis & euerfis pota duobus obolis in nulli cyathis tribus radix prodest. Acorum quoque vtile est interioribus fœminarum morbis. Lib. 6. sim. Galenus scripsit Acori radicem gustu esse acri & modicè amaro, odoréque non iniucundo. Quare facultatis calidæ esse, & consistentiæ tenuis. Hinc cōsentaneum est vt vrinam moueat, & lienes induratos iuuet, tum corneæ membranæ crassitiem detergeat simulque extenuet: sed ad hoc melior est succus ipsius. Omnino verò siccificum esse clarum est. Et sanè ordinis esse tertij in vtroque, calfaciendo scilicet & desiccando. Ab his Pseudoacori vires multum distant. Desiccatur enim citra calfactionem: radix adstringendi facultate prædita. Quare densatur, cogit, contrahit. Igitur vrinam non cit, nec menses prouocat, sed potius supprimit. Sanguinem vndeque manantem cohibet, vt rectè Pandectarum auctor scripserit, cum, qui secum Acori radicem gestauerit, à nullo sanguinis profluvio corripitur. Ex recentioribus aliqui hanc Pseudoacori facultatem obseruauerunt, atque hinc adeo tradunt eius succum igne expressum menses nimium promanantes constringere posse. Dyntericis vtilis est.

Vires &  
Temper.  
Pseudo-  
acori.

## GLADIOLVS.

## CAP. XXXII.

70. Nomina

Ἰψος. gladij

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj

Ἰψος. gladiolj



GLADIOLVS, Math.



XIPHION & Ἰψος, & μαχαίριον Græcis, Latinis Gladiolus, Ensis siue Ensiculus, Romanis Segetalis, Arabibus *Kasisto*, Italicè *Gladiolo*, flores *Mucuncie*, Germanicè *Schuuertel*, Gallicè *Glaus* & *Glaitel*. Xiphio, id est, Gladiolo seu Ensiculo nomen factum à folij figura, quæ tamen eadem propemodum sit multis plantis, vt Iridi, Xyridi, Acoro, & bulbosis quibusdam, tamen huic præceteris remansit, quia folium proprius ensen mucronatum refert, striatumque liris & neruis scabris rigidisque satis firmum. Quia in satis frequentissimè reperitur, Segetalem dixerunt. Gladiolus Iridi similis est, vt dixerunt Dioscorides, minor tamen & angustior, & gladij modo mucronatus, nervosusque. Caulis emittit cubitalem, in quo flores purpurei, ordine à sese distantes: semen rotundum: radices duas, alteram alteri insidentem, velut paruos bulbos, quarum inferior gracilis est, superna crassior. Nascitur maximè in aruis. Plinius Lonicitidem à Xiphio discernens, cum illam in stientibus nasci dixisset, de Xiphio subiungit. E diuerso Xiphion & Phalangion in humidis, cum primum exit, gladij præbet speciem, caulem duum cubitorum, radices ad nucis auellane figuram fimbriatæ, quam effodi ante melle oportet, sicariq; in umbra. In quibus à Dioscoride dissentit, qui non in humidis, sed in aruis nasci scripsit. Hic Gladiolus verus depictus est in aruis & satis frequens, interdum & in pratis reperitur. Cui caulis singularis, inquit Pena, rectus, rotundus, striatus, nitidus, & folijs quali



BVLBOSARVM, ET CARNOSARVM, &c. LIB. XV. 1621

quasi sese exerens, & flores conditos deinceps habens per interualla, interdum ad vnam tantum caulis partem digestos, quemadmodum in Narbonensi, interdum binis ordinibus, vtrinque vno, vt in Italico: flores rutilant hilari saturaque purpura, senis & septenis foliolis constantes, liliaceis similibus, vel Ornithogali, sed minus repandis aut diuulsis. Semen in folliculo rubrum crucæ magnitudine. Gemini bulbi radici sunt, quorum habitior & corpulentior interdum superior inferiori incumbit, interdum inferior maior & languidior. Vere exacto iam effecta multis pusillis bulbis propagatur Ornithogali modo: coma fibrosa subtus radicanter glutinosi bulbi, & villosi inuolucro teguntur fusco, sapore non ingrato, acri. Superior radice pars, auctore Dioscoride, cum vino & thure imposita, spicula & aculeos extrahendi vim habet. Cum farina liliacea & aqua multa panos discutit: quare eiusmodi emplastris additur. Menses apposita trahit. Tradiunt eandem superiorem radicem cum vino potam venerè stimulare, inferiorè verò steriles efficere. Quin & superiorem radicem cum aqua bibendam commodè exhiberi pueris enteroccele laborantibus. Plinius eadem ferè tradit. Superior pars eius cum thure trita, & quo pondere admixto vino ossa fracta ex capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Serpentis eadem contra venena efficax. Et alio in loco. Xiphij quoque radix superiorem vrinam ciet infantibus. Enteroceliciis datur ex aqua, & illinitur vesicæ vitiiis. Et rursus. Appetentiam veneris facit radix ex Xiphio superior, data potu in vino. Xiphij radix, inquit Galenus, & maximè superior, attrahentem, digerentem, & desiccantem facultatem habet.

Lib. 25. c. 11.

Lib. 26. c. 3.

Lib. 26. c. 10.

Lib. 3. lib.

XYRIS. CAP. XXXIII.



LANTIA, quæ Grecis *Ξυρίς* appellatur, & Theophrasto *Ξυρίς ἀγρία*, id est, Iris siluestris, Latinis quoque Xyris, Arabibus *Casoras*, Officinis & vulgo *Spatula foetida*, Germanis *Vuandeleuskraut*, à cimicibus necandis, Gallis *Glaieul puant*. Prisci autem appositè *Ξυρίς* ob folij similitudinem, quasi rasorium cultum aut nouaculam dixere. Est enim illi folium ancipiti nouaculæ similis, acutiore acie, & tenuiore rigidiorèq; quàm Gladiolus aut Iris mucrone. Spatula autem foetida, tum ob eandem folij figuram, (spata enim gladii significat) tum quòd grauem exhalet odorem vniuersè nuncupata est.

Penā in Aduers.

XYRIS, Lobellij.



Hanc his verbis delineauit Dioscorides. Xyris folia Iridi similia habet, sed latiora, & in summo acuta: è quorum medio caulis erumpit, satis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & in ipsis flos purpureus, quod verò in medio est, puniceum est: semen in folliculis fabis simile, rotundum, rubrum, acre: radix est multis geniculis distincta, longa, rufa. Nascitur sponte in Galloprovincia teste Pena, & in Anglia quàm vberimè prope vda prata, & litoreos maris aggeres. Alibi in hortis colitur. Veterum Xyridem, vulgi Spatulam foetidam esse periti Herbarij credunt. Cum enim oblitiscunt, Xyridis radicem longam esse, geniculatam, & rufam, quæ in Spatula multiunda sit, gracilis,

Lib. 4. c. 11.

Forma.



Pena in  
Advers.

cilis, fibratâque, præterea florum colorem, facile refelluntur, quod radices magnitudo & color, ut pleraque alia, facile non nihil non ita magna de causa mutantur. Etenim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeo variant, ut cum Florentina si nostram conferas, longè aliam colore & odore putes, quid ni possit tantilla mutatio Xyridi contingere? Illyrica Iridis radix est subrufa, nostratis pulla & cinericia, Florentina candida eximia fragrantia, nostras verò ingrata fermè fœtet. Adhæc cum *πλαστήρεα* folia Dioscorides dixit, & cacumine acutiora, innuit medium folij latius & ventricosius, summum verò multo angustiore mucrone, cuiusmodi prorsum spatule spôte nascētis. Caulis etiam eius cubito maiores, plures, glabri, teretes, crassitie mediocri per media folia recti assurgūt, florēque in summo promūt Iridis siluestris, ternis foliis luteis, nec inflexis, purpura saturatiore Violæ Martiæ, & in medio venis nonnullis luteis & phœniceis apparētibus, siliquis itē Iridis, triquetris, trinaq; carina dehiscētibus quādo maturuit semen, quod rubrum, nitidū, gemina secundū longitudinē

XYRIS, *Marth.*Lib. 4. c. 22.  
Vires &  
Temper.

serie conditur in siliquarū membranis loculis, ut in Pœonia, Orobi, ut quidā in Oribasio legūt, aut Fabæ, nō vulgaris nostratis, sed Dioscori. quæ multo minor, & nostrate rotundior fuisse probatur à doctis. Radix parua (facilis enim & frequens est in Dioscor. deprauatio vocis *μαρπη* in *μαρπη*) geniculata, fibris multis donata, & Iridi concolor, similis, aut fusca. Postremò ea vi & acrimonia prædita est radix, tamen si Corulam aut cimices oleat, ut multorum nostræ medicorum monumentis & experimentis constat ea præstare quæ Dioscorides Xyridi reddidit. Quin Iridi non modò similis facie, sed & viribus anteit, tum ad vlcera, ossaque deliquamāda, tum intrò sumpto decocto aut succo vehementius lotium ciet, & sudores mouet, ut pharyngem adurit fermè. Si multa decocto bibatur, vomitum excitat, & tormina ventris, ut Iris facit. Hisce spatulam fœtidam esse Xyridi veterū astruit Pena. Cui has vires tribuit Dioscorides. Radix Xyridis ad capitis vulnera facit & fracturas. Educit aculeos & omne telum extrahit citra dolorem, admixta floris æris tertia parte, radices Centaurij quinta, & melle. Sanat tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo contusa bibitur ad conuulsā, rupta, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, & alui profluvia. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est, trium obolorum pondere in vino potum. Idem & lienem liquat cum aceto potum. Xyris tenuium est partium, inquit Galenus, facultatis attrahendi, digerendi, atque desiccandi cum radice, tum multo ampliùs fructus, qui & vrinam ciet, & lienes induratos sanare potest.

Lib. 8. sim.

POLYGO



POLYGONATVM. CAP. XXXIIII.

**P**OLYGONATON Græcis, Latinis Polygonatum vocatur, Officinis, *Nomina*  
Herbariis, & vulgo Sigillum Salomonis, Italis *Frasinella* & *Gimochieto*, *vide Phlegm. pag. 601*  
Germanis *Ueizumrtz*, hoc est, radix alba, Gallis *Signet de Salomon*. Poly-  
gonatum autem à radice geniculorum frequentibus nodis ex intervallis tumete  
appellauerunt. Fuchsius, Dodonæus, alique recentiores Herbarij duo Polygo-  
nati genera dant. Vnum verum Dioscoridis, latioribus foliis, alterum multò an- *Genera.*  
gustioribus. Polygonatum Dioscoridis frutex est cubito altior, folia habens Lau- *Forma.*  
ro similia, latiora & læuiora, quæ gustanti simile quid malo cydonio aut punico  
exhibent cum quadam adstrictione. Per singulos foliorum exortus candidos flo-  
res promit numero maiore quàm folia, supputatione à radice facta. Radicem  
habet candidam, mollem, longam, geniculis plenam, densam, graecolentem,  
digitali crassitudine. Nascitur in montibus. Iam si singulas Sigilli Salomonis no-

POLYGONATVM maius,  
*Matthioli.*



POLYGONATVM angusti-  
*folium, Fuchsj.*



tas persequi libeat, omnes, ne vna quidem reclamante, adesse comperies. Nam  
in montibus gignitur, frutice cubito procior: foliis Lauri, latioribus & læuio-  
ribus, quæ gustata quendam mali coronei aut punici saporem referunt cum  
quadam adstrictione. Flores per singulos foliorum eruptiones exeunt candidi, qui  
folia numero superant: etenim bini, terni, aut plures ab vnoquoque foliorum  
sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, longa, crebris nodis articulata, den-  
sa, graecolens, digiti crassitudine. Floribus excussis baccae pisi ferè magnitudi-  
ne dependent, primum virides, deinde nigricantes. Ab hoc Polygonatum siue  
Sigillum Salomonis minus foliis discernitur: cui radix & caulis, plantæq; ha-  
bitudo & natales sunt eadem, verum folia angustiora multò, & ambitu stellato,  
rubrae maioris vel asperulae, quaterna aut quina: minores etiam flores inter folia

Pena in  
Aduers.

YYY



herbacei, paruaq; bacca piperis minores. Multum hoc collibus Rioli, & Taurino Pedemontium collibus siluosis vicinis, & arduis Veganij Narbonensis Belgicis hortis charum & multum. Vbi maius etiam in pratis siluosis sponte luxuriat. Ruri etiam Gallia & Germania prouenit crebrum. Huius radix, auctore Dioscorido, coride, vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas delet in facie. Scribit Lib. 8. Sim. Galenus Polygonatum mistam habere tum facultatem, tum qualitatem: habet enim adstrictionis pariter & acrimoniae quidpiam, nec non fastidiosam quandam amaritudinem explicatu difficilem. Quocirca nec admodum est vsui, sed tantum quod radicem eius quidam vulneribus illinunt. Sunt etiam qui nausos in facie illo detergent. Hac Galenus. Hodie mulieres ex Polygonati radicibus aquam stillatitiam conficiunt, qua ad faciem detergendam proluendamque pro fuco vtuntur.

*a signa floris coloris.  
de greca nomen assumpti  
flor. n. a. quamplurimis  
maculis notatus.*

FLOS Tygridis,  
Dodonaei.

Lib. purg.

Forma.



FLOS TYGRIDIS.

CAP. XXXV.

**D**ODONAEVS & Lobellius rarissimum florem Tygridis vocatum pinxerunt, quem nunquam vidisse putantur, sed illius iconem tantum affabre coloribus expressam à D. Ioanne de Brancion communicatam, virentibus, oblongis, angustis, & acuminatis foliis, & pullo radice bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis puniceis fortuito variato, cuius medio suae rubens stilus exoritur. Omnibus rei Herbariae studiosis ipsa planta hactenus incognita. Eius bulbus edulis fertur.

COIX.

CAP. XXXVI.

Locus.

Forma.




**L**ANTAM hic exhibemus à Mycono missam & descriptam his fere verbis. Passim in pratis prouenit, altitudine dodrantali: caule vincto, rotundo, geniculato, qualis est Tritici calamus, in quo folia prorsus Gramini similia, in summitate veluti Auenae panicula habente. Pro radicibus bulbi duo subsunt, minor maiori insidet, vterque candidus, dulcis Graminis modo, vt inde Graminis speciem esse colligere possis. Si tamen planta est à veteribus descripta, eam potius esse suspicatur Myconus, quae à Theophrasto *κοῖξ* dicitur, alicubi *κοῖξ* mendose pro *κοῖξ*. Etenim Coicem inter *καλαμώδεις* & *γυμνόφυλλος*, id est, ea quae folium habent arundinaceum & angulosum recenset. Quibus mox subiungit, folia haec quasi ex duobus constare, & medium veluti carinam habere, vnde & ceteris meatus me dius amplius porrigatur. Quae folij forma graminibus competit, etsi folia habeant arundinaceis minora. Praeterea idem Theophrastus Coicem bulborum generibus

Lib. 1. hist. cap. 16.

Lib. 7. hist. cap. 13.



COIX, Myconi.



generibus adscribit, qui sunt radice rotunda, non squamosa. Quod huic plantæ conuenit. At duplicem radicem Coici Theophrastus non tribuit, quæ reuerà in hac planta duplex cenferi non potest, ut ex pictura iudicare licet: superior enim non bulbus, sed vestigium tantum & veluti bulbi rudimentum. Vulgare herbæ nomen & vsum Myconus se ignorare scripsit, audiisse tantum lepores hac magnopere delectari, nocturneque eius radices effodere. Quibusdam τὸ ξῆφις, id est, Gladioli species à nostrate diuersi, quem depinximus, videtur esse, aliis Sisyrrinchium, in quo explicando Theophrastus genuinam radicem adnotasse videtur. Quanquam aliud Sisyrrinchium ex Dodonæo iam ostendimus. Quid si Aegilopa Plinij quis esse dicat, quam inter bulborum genera numerat?

Lib. 7. hist.  
cap. 13.

Lib. 19. c. 1.

YYY 2



# HISTORIAE OMNIUM PLANTARVM

LIBER DECIMVS

SEXTVS.

(662)

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Plantæ Cathartica.

MERCVRIALIS. CAP. I.



RAETER differentias plantarum, quæ à locis natalibus & earum partibus sumuntur, de quibus hæcenus egimus, alias esse diximus, quæ ab earundem facultatibus & viribus petuntur, de quibus hîc tractare instituiamus. In his maximè admirabilis, & miseris mortalibus, qui tot ægreditudinibus quotidie conficiuntur, vtilissima, quæ κατάρκων, id est, purgatoria nominatur, vnde plantæ κατάρκων, id est, vi purgandi prædite. Quid enim admirabilius, quàm stirpis particula aliqua deuorata, vel decocto aut succo epoto, humore

rem quempiam aut plures ab aliis secerni, attrahi, & vomitu aut ventris deiectione purgari? Quid vilius, quàm ægros horum sarcina oppressos, vel praua qualitate cruciatos, hac ope veluti Deorum manibus subleuari, atque morbo liberari. Quamplurimas huiusmodi munifica Dei beneficentia hominibus largita est, quas omnes nec nouimus, nec omnes à veteribus aut recentioribus memoratas cognitasve hîc persequimur. Sunt enim multæ iâ sparsim locis idoneis explicatas, & à quibus disungi non poterant, vt Daphnoides, Rosa, Rosa Damascena, Senna, Catha, Tripolium, Hippophaës, Hippophaëstû, Apios, Bryonia, Cnicus, Narcissus, Brasica marina, Brasica siluestris, Lactuca siluestris, Gratiola, Rhamnus purgatorius, Sambucus, Iris, Thapsia, Polypodiû, atq; alia quædam. Alias hîc explicabimus, easque manifestè catharticas, & satis notas, à Mercuriali etiam mulierculis cognita exordientes. Αινοζώνης & παρθέριον Græcis, & ἐπὶ τοῦ βοτάνου, vel ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, id est, Mercurij herba dicitur, Latinis Mercurialis, quod à Mercurio inuenta sit, Gallis

ide Phryg. pag. 197.

Nomina

Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 183.

Lib. 15. c. 5.

Mercuriale & Vignoble, Italis Mercorella, Germanis Ringelkraut. Eius genera duo tradidit Herbarij, marem & fœminam, quæ semine internoscuntur, & foliis in mari nigrioribus, in fœmina candidioribus. Mercurialis, vt tradit Dioscorides, folia Ocimo similia habet, Helxinæ cognata, sed minora, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum fœmina copiosum, racemosum, mas è foliorum sinu dependentem, paruum, rotundum, ceu binos pauculos vna coherentes: frutex est dodrantalis aut minor. Plinius de eadem re paulo aliter scripsit. Linostotis siue Parthenium Mercurij inuentum est, ideo apud Græcos Hermupooan multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo eius genera, masculus & fœmina, quæ efficacior: caule cubitali, interdum ramoso in cacumine: Ocimi angustioribus foliis, geniculis densis, alarum cauis multis, semine



mine in geniculis dependente, fœminæ copioso, mari iuxta genicula stante, raro-  
riac breui contortoque, fœminæ soluto & candido. Folia maribus nigriora, fœmi-  
næ candidiora: radix superuacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis.  
Hæc Plinius. In vinetis nostris maximè provenit, interdum tam copiosa & efficax, *Locus.*

*MERCVRIALIS mas,*  
*Matthioli.*



*MERCVRIALIS fœmina,*  
*Matthioli.*



ut vina etiam suo sapore inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Augusto mense se-  
mine prægnans est. Vtrique Mercurialis Medicis, seplasiariis omnibus, atque  
etiam mulierculis notissima est subnitroso sapore, & nonnihil viroso succo, pur-  
gare, & medicato, ad multa perquam utili. Vtraq; enim, auctore Dioscoride, aluū  
mouet, olerum modo comesta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aquosa ducit.  
Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, post purgationem pudendis ap-  
posita, ut fœminæ concipiantur efficere: masculæ verò similiter adhibitis, mares  
generari. Plinius de medico vtriusque vsu paulò aliter quam Dioscorides tracta-  
uit, eundemque fufus ex Hippocrate declarauit, qui etiã hodie in libris illius ex-  
ta, maximè eo qui de sterilibus inscribitur, & in duobus de morbis muliebribus.  
Verba Plinij hæc sunt. Mirum est quod de vtroque genere eorum proditur, ut  
mares gignantur, hunc facere, ut fœminæ, illam. Hoc contingere si à conceptu  
succus protinus bibatur in passo, edanturq; folia decocta ex oleo & sale, vel cruda  
ex aceto. Quidã decoquunt in nouo fictili cum Heliotropio, & duabus aut tribus  
Alliis spicis, donec percoquatur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo  
altera die purgationis muliebris per triduum: quarto die à balneo coire eas. Hip-  
pocrates miris laudibus in mulierum vsu prædicauit has. At hunc modum medi-  
corum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel rosaceo, vel irino admouit. Item  
ad ciendos menses, ad secundasq;. Hoc idem præstare potu fortq; dixit. Instillauit  
auribus olidis succum, inunxitq; cum vino vetere. Aluo folia imposuit & epipho-  
ris Stranguriæ, & vesicis decoctum eius dedit cum myrrha, & thure. Aluo quidem  
soluendã, vel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aque  
ad dimidias: bibitur sale & melle admisto, nec non cum vngula suis, aut gallina-

*Tempus.*

*Vires.*

*Lib. 25. c. 5.*



ceo decocta. Salubrius purgationis causa putauere aliqui vtramq; dandam per se, siue cum Malua decocta. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachu laedunt. Mercuriali, inquit Galenus, vtuntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eius hodie in enemacibus frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopæi multum vtuntur melle quod Mercuriatum vocant. Succus expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas, ad enemata, & muliebria encathismata.

In cap. 183.  
lib. 4.

Matthioli obseruatum fuisse scripsit, verrucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tolli, vel earum succo. Item vtriusque semen cum Absinthio decoctum ictericos mirificè iuuare: malis quæ serpunt succum cum aceto mederi. Quæ ante Matthiolum literis mandauit Ruellius.

CYNOCRAMBE. CAP. 11.

Nomina



CYNOKPAMBII, vel κυνία, vel Ανοξωγίς ὀξυγία ὀξυγία Græcis, Canina brassica, Cynia, & Mercurialis siluestris mas Latinis dicitur, Italis Mercorella battarda, Gallis Chou-de-chien, & Mercuriale sauvage, Germanis Vuilckingeleyaut. Cynocrambe, vt tradit Dioscorides, cauliculum binum dodrantum altitudine emittit, tenerum, subalbidum: folia Mercuriali aut Hederae similia, certis interstitiis, subalbidum: semen foliis adhæret paruum, rotundum. In siluis copiose prouenit. Semen Aprili mense profertur, Maio maturefcit. Herbam hæc pictam Fæchtus & Dodonæus pro Cynocrambe proposuerunt: quibus assentitur Pena. Quæ, inquit, in tota Europa secus vmbrosas vias, & in siluis vltisque locis, præsertim Septentrionalibus & minus calidis copiosissima oritur, & vulgò siluestris: Mercurialis vocatur, tantam cum mare habet similitudinē, foliis per interualla binis, in gesticulis & semine testiculis simili, gemino, in pediculis longis, caulibus quadratis, tenellis, vt quin vera sit Cynocrambe nulli sit dubium. Rectis hæc binis, ternis, & interdum quaternis non alacris cauliculis prouenit: folia subpallida sunt, quàm Mercuriali longiora: sapor, & odor oleraceus, & subuiosus: radix latior humiq; serpens, pæne fæ. Tota facies Mercurialem esse testatur. Eius nullus, tamen optimus futurus ad ferociores humores & melancholicos educendos. Cynocramben eandē Matthioli pictam, quod foliis ad notis omnibus Dioscoridis delineationi respondeat, præter semen, quod foliis adhæret. Quam ob causam dubitat an hæc legitima sit Cynocrambe. Dioscoridis sanè oratio προσεχὲς τοῖς πετάλοις ἡ γὰρ ἡμῶν, καὶ τὸ γένος: quod verum est, si γὰρ ὅν non solum geminos velut testiculos intelligamus, sed præterea nentem eos pediculum. Scribit Dioscorides caulem & folia pota, & olerum nocrambes neque Theophrastus, neque Galenus, neque Paulus, neque Aesculapius meminerunt. Verum Galenus, Paulus, & alij, atque etiam Dioscorides alterius Cynocrambes mentionem fecere sub nomine Apocyni, à superiore mulcūm diuicis.

Forma.  
Li. 4. c. 184.

Locus.  
Tempus.  
Cap. 167.  
Lib. 1. c. 91.



In cap. 184.  
lib. 4.

notis omnibus Dioscoridis delineationi respondeat, præter semen, quod foliis adhæret. Quam ob causam dubitat an hæc legitima sit Cynocrambe. Dioscoridis sanè oratio προσεχὲς τοῖς πετάλοις ἡ γὰρ ἡμῶν, καὶ τὸ γένος: quod verum est, si γὰρ ὅν non solum geminos velut testiculos intelligamus, sed præterea nentem eos pediculum. Scribit Dioscorides caulem & folia pota, & olerum nocrambes neque Theophrastus, neque Galenus, neque Paulus, neque Aesculapius meminerunt. Verum Galenus, Paulus, & alij, atque etiam Dioscorides alterius Cynocrambes mentionem fecere sub nomine Apocyni, à superiore mulcūm diuicis.

Li. 4. c. 184.  
Vires.  
Lib. 4. c. 76.

Κραμβύ. κυνία  
Κυνία, Κυνία, canis  
hinc herba brassica  
canis, id est Solano  
et Κυνία

STAPHIS



ΤΑΦΙΣ ΑΓΡΙΑ & ἀγρίη ἀγρία, Latinis Herba pedicularis, & pituitaria, Officinis & Italis Staphisagria, Arabibus *Alberas*, *Flabebras*, *Musbaragi*, *Minbezgi*, Gallis *Staphisagre*, & *Herbe aux pouilleux*, Germanis *Bismijntz*, Hispanis *Fabaras paparaz*. A foliorū diuisura, qua Labruscam, siue Vitē siluestrem

Nomina

imitatur, nomen duxit Staphisagria, id est, Vitis siluestris: pedicularis autem, siue pituitaria, à viribus quas habet. Pediculos enim necat, & commanducata feruore suo multam pituitam trahit. Folia habet Labruscæ, fissâ, cauliculos rectos, molles,

Vide Phlegm. pag. 649.

Forma.

nigros: florem fert Glasti: semen in folliculis viridibus, velut cicer, triangulum, asperum, ex nigro subfuluescēs, intus album, gustu acre. Ita descripsit Dioscorides, & sic breuiter Plinius. Astaphis agria, siue Staphis, (Vnam Taminiam vocant fallo:

Lib. 4. c. 10.

sui enim genus habet) cauliculis nigris, rectis, foliis Labruscæ, fert folliculos verius quam acinos, virides, similes ciceri: in his nucleum triangulum. Maturescit cum vindemia, nigrescitq; cum Taminia rubentes norimus acinos, sciamusque

Locus.

illam in apricis nasci, hanc non nisi in opacis. Hæc Plinius. Hodie in hortis nostris feritur. In Istria, Dalmatia, Apulia, Calabria copiosissime prouenit, auctore

In cap. 10. Lib. 4.

Tempus.

Matthiolo. Æstate floret. Monspensili quidem vbiuis nascitur. Hæc est omnium

Vires.

Lib. 4. c. 10.

tum Medicorum, tum Officinarum consensu Staphisagria, cuius hodie vsus est ad

eorum, quæ à veteribus præscripta sunt. Verumtamen Dioscorides ei flores Istati

tribuit, qui sunt latei pallidæ, cum Staphisagria sint carulei, venusti, & stellati, in quinque, aut sex foliola diuisi. Isti autem Glasti color intelligendus, non

qualis visitur in Glasti flore, sed qualis sit Glasti succo, nempe subcaruleus. Eius

grana decem aut quindecim, inquit Dioscorides, si trita in aqua mullâ dentur,

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

causæ per vomitum purgant. Sed qui hauserunt ambulare debent. Prudenter tamen

## STAPHISAGRIA,

Matthioli.



morbum pedicularem, pruritus & scabiem valet. (Hæc in veteri codice sic leguntur, τριφύλον καὶ ταυτὴν, καὶ μὲν σαρδαράχης, καὶ ἀγριο σαρδαράχης, &c. Id est, Trita per se, vel cum sandaracha, posteaq; ex oleo illita, &c.) Cit plurimam pituitam commanducata: decocta in aceto dentium dolori, si ea colluantur, subuenit:

rheumatismum gingivarum sistit: vlcera oris, (aphthas vocant) cum melle sanat. Vrentibus malagmatis imponitur. De iisdem ita disserit

Lib. 3. c. 6.

Plinius. His nucleis ad purgationem vti non censuerim, propter ancipitem strangulationē,

nec ad pituitam oris siccandam: fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti, facilius admixta sandaracha: item

pruritu & psoris. Ad dentium dolores decoquantur in aceto: ad auriū vitia, rheumatismū cicatricum, vlcerū manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur: semen enim abdicauerim, propter nimiam vim ardoris. Quidā

eam pituitariam vocant, & plagis serpentium utique illinunt. Hactenus Plinius. In quibus quod dixit rheumatismos cicatricū, perspicue



7630 HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
 lapsus est, vel corrupta sunt Dioscoridis exemplaria: non enim  $\epsilon\lambda\lambda\epsilon\varsigma$ , id est, cicatri-  
 ces, sed  $\epsilon\lambda\lambda\epsilon\varsigma \rho\acute{\epsilon}\sigma\mu\alpha\iota\varsigma \zeta\acute{\upsilon}\delta\iota\sigma\iota\alpha$ , id est, gingivarum rheumatismos, siue gingivas fluidis  
 dicere oportet ex Dioscoride, itemque vlcera oris depascentia. Astaphis agria, in-  
 quit Galenus, vehementer acrem facultatem obtinet, addo vt ex capite purget,  
 quod  $\alpha\pi\omicron\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\alpha\iota\varsigma \zeta\acute{\upsilon}\delta\iota\sigma\iota\alpha$  Græci dicunt, abstergatq; valenter. Itaque ad psoram accom-  
 moda est. Sed & vrendi vim habet.

RICHNS.

C A P. 1111.

Nomina

κατακίον αβυθου  
κατακίον νεκ.  
q. de g. v.

Li.H. C2.34

Li. 39. C. 10.

Li 4. C. 158.

Forma.

Lib. 15. C. 7.



IKI vel *κρότων* Græcis, *Ricinus* Latinis, Mauritanis *Kerua*, Officinis nonnullis *Cataputia maior*, quibusdā *Pentadaetylon*, & *Palma Christi*, Mesuræ granum Regium, Italis *Girasole*, Germanis *Underbaum*, vel *Creatzbaum*, Gallis *Paume de Christ*, Hispanis *Figuera de l'inferno* dicitur, non autem & *Ricinus* à similitudine animalis, quod semen eius refertur.

Est enim Croton Latinis Ricinus, inquit Plinius, animal eiusdem turpitudinis, cui fixo semper sanguini capite viuens, atque ita intumescens, vnum animalium, cui cibi non sit exitus: dehiscitq; nimia satietate, alimento ipso moriens. Nūquam hoc in iumentis gignitur, in bubus frequens, in canibus aliquando, in quibus omnium in ouibus & in capris hoc solum. Et alio in loco. Minus miretur hoc, qui sciunt foedissimum animalium quantum magnificent ricinum: quoniam vni nullus sit exitus faginae, nec finis alia quam morte (mendorē, legendum enim, nec finis alia quam morte) diutius in fame viuenti. Septenis ita diebus durasse tradunt, ac in satietate paucioribus dehiscere. Palmā Christi vulgus vocat à foliorū digitata effigie, quā volam palmamque expansis digitis quodatenus emulatur. Ricinus, ut describit Dioscorid. arbor est parua Ficus magnitudine, folio Platani, maiore, latius, & nigrior: ramis caudicibusq; cauis arundinis modo: femine in vitis alpeioris, quod cortice nudatum, ricino animali simile est. Plinius de oleo Crotonem, alijs Sesamum siluestre appellant: ibiq; non pridem. Et in Hispania repente prouenit.





dicamentorum ex Occidentali India Nicol. Monardus scribit se vidisse in Hispania circa Malacam & Calpen ad fletum Herculeum, aliisq; maritimis Baticæ locis, Ricini plantas crassitudine hominis, altitudine trium, multis prægrandibus ramis brachiatas instar aliarum arborum, qui rami illic tertio aut quarto quoque anno amputari solent, adamusimq; cōuenire Dioscoridis descriptioni illas plantas asserit. Refert etiam Bellonius, magnas in Creta Ricini arbores se vidisse. Theophrastus aliarum arborum folia sibi ipsis similia esse scribit, sed Populi, Hederae, & eius, quæ Croton vocatur, dissimilia, & figura diuersa: noua enim rotunda sunt, vetustiora angulosa, quod & alio in loco repetit. *ὁ δὲ τῶν φύλλων μεταχρηματισμός καὶ ἑτέρον κοινός, ἐπεὶ καὶ τὰ τῶν πρώτωνος ἐνία περιφέρει φύλλα τὴν σχῆν, ὅτερον ἀπογωνίσται, καὶ ἄλλοι ἀναδιαθρόμματα.* Id est, foliorum transformatio etiam aliorum communis est, nam Crotonis nonnulla initio cum proueniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur, tanquam perfectè articulata. Quod & Plinius adnotauit. Maxima foliorum vnitas in suo cuiq; genere permanet, præterquam Populo, Hedera, Crotoni, quam & Cici diximus vocari. Huic vires istas reddidit Dioscorides. Ex semine Ricini oleum nomine Cicinum vel Ricinum exprimitur, ad edendum minimè aptum, alioqui tamen lucernis & emplastris vtile. Grana triginta, putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, aquasque per aluum extrahunt, vomitionesque mouent. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio: stomachum enim vehementer subuertit. Tusa & imposita varos & faciei maculas à sole contractas expurgant. Folia cum polenta trita oculorum tumores & inflammationes sedant, mammasque turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita, ad purgationes restinguunt. Plinius de eadem re hæc tradit. Oleum Cicinum bibitur cum cinere verò muricum sedis inflammationibus, item psora. Colorem cutis commendat, capillumq; fertili natura euocat. Semen ex quo fit, nulla animans attingit. Ellychnia ex vna sunt claritatis præcipua: ex oleo lumen obscurum propter nimiam pinguitudinem. Folia igni sacro illinuntur ex aceto: per se autem recetia mammas, & epiphoris. Eadem decocta in vino inflammationibus cum polenta & croco: per se autem triduo imposita faciem purgant. De eiusdem purgatrice facultate manifestius hæc scripsit Mesues. Ricinus calidus succu ordine tertio, Hamlech in principio tertij. Pituitam ac interdum bilem valenter purgat deiectione, & vomitu, materias quoque & aquam serosam à iuncturis attrahit. Dantur autem grana eius cocta & trita in iure galli antiqui: conferunt colico dolori, & iuncturarum, vt podagræ, ischiadæ: aut coquantur in aqua casei, aut lac caprinum super ea mulgetur & colatur, & datur hydropicis vtiliter. Oleum autem Ricinum colicodolori à pituita & flatibus confert. Quoniam ventriculo nocet, corrigitur asfatione, & si coquendo semen Anisi & Fœniculi addatur. Ricini fructus, inquit Galenus, quemadmodum expurgat, deterget ac digerit, sic quoque folium, sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum partium quam oleum commune: quare potentiùs quoque digerit.

Li. 1. obser.  
cap. 15.  
Lib. 1. hist.  
cap. 16.

Li. 16. c. 12.

Li. 4. ca. 18.  
Vires.

Li. 23. ca. 4.

Li. 2. purg.  
cap. 28.

Li. 7. simpl.

## ELLEBORVS ALBVS. CAP. V.

ἈΛΕΒΟΡΟΣ λεγὸς dicitur à Græcis, à Latinis Elleborus albus, & Veratrum album, Arabibus *Cherbachem*, seu *Chaebech Abaid*, Italis *Elleboro bianco*, Germanis *Vveisniesz uurtz*, Hispanis *Herba de Baleste*, Gallis *Elleboe blanc & Veraire*. Elleborum autem dictum volunt, quod cibum corporis eripiat, Veratrum quod mentem vertat. Album à radice vocant, quæ cum nigri radice comparata, candida est. Ellebori albi & nigri tantum meminit

Nomina

Genera.



Lib. 25. ca. 5.  
Li. 4. c. 145.

Forma.

meminit Dioscorides: & Plinius, Genera prima duo sunt, inquit, candidum & nigrum. Hoc radicibus tantum intelligi tradit plerique. Elleborus albus, ut describit Dioscorides, Plantagini similia folia habet, aut Beta silvestri, breuiora tamen, nigriora & colore rubentia (id de costis intelligendum): caulem palmi altitudine, cauum, quum sicari inciperit, corticibus, seu tunicis inuolutum, à cuius summo, quod Dioscorides omisit, alternis pediculis surrecti florum thyrsi, ut in Botry, racemosis floribus onusti colore albicante visuntur, quibusdam in hortis purpureo. Radices subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo capite Ceparum modo

Lib. 25. c. 6.

*ELLEBORVS albus,*  
*Matthioli.*



Lib. 25. c. 6.

Locus.

Tempus.

Ibidem.

Eleatio.

Vires.

Li. 4. c. 145.

Li. 5. meth.

prodeuntes. Plinius albi folia esse tradit Beta incipientis, (Dioscorides silvestris) hæc quoque nigriora, & canalium dorso rubescentia. Vraq; caule palmi, ferulaceo, bulborum tunicis conuoluto: radice fibrata, Ceparum modo. Hæc Plinius, in cuius veteri codice exaratum reperis fimbriata pro fibrata, ut non fibras, sed fimbrias variè sectas radices accipiat Cornarius: siquid id quod Theophrastus dixit, πολλὰ ῥιζὼν ἀπὸ τοῦ μάλῃ τοῖς λεπτὰς καὶ χρησίμοις, id est, multis radicibus, isque tenuibus & vtilibus, & Dioscorides, ῥιζὰ ἀπὸ ὑψηλοῦ πολλὰ, λεπτὰ, ἀπὸ κεφαλῆς μικρὰ, καὶ ἐπιμήκεις ὥστε κρομῆν συμπερικταῖα. Quod autem Plinius habet, Hæc quoque nigriora & canalium dorso rubescentia, facit ut in Dioscoride legendum suspicetur, καὶ ἐρυθρὰ τὴν ῥίζαν, cum vulgata exemplaria habeant, ἐρυθρὰ τὴν χροίαν, id est, colore rubro. Nascitur Elleborus albus in montosis & asperis locis. Circa messem radices colligendæ. Candidi probatur Oetæum, inquit Plinius: secundum Ponticum: tertio loco Eleaticum, quod in vitibus nasci ferunt: quarto Parnasium, quod adultetur Aerolico. Quæ sequuntur voces duæ, ex vicino, in vulgatis codicibus, in vetusto exemplari desunt. Veratrum album legitimum hic depictum esse, cum optimi consensus, tum experimenta infinita & certissima comprobant. Optimum habetur, quod mediocriter extetum est, album, fragile, carnosum, nec tamen interci modo mucronatum, aut cum frangitur puluerulentum, tenuem interiorem clemullam habens, gustu non admodum feruens, neque saluam confertim clemullam. Huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet, Galaticum aurem & Cappadocium candidiora, & puluere quodam obsita celerius strangulationem mouent. Purgat vomitionibus, varia educens, auctore Dioscoride: miscetur clemullis, quæ claritati oculorum officientia purgare possunt. Menses ducit, & si in vtero appositum enecat. Sternutamenta citius interficit cum melle & lenta subactum. Carnes simul coctum colliquat. Datur ieiunis per se, & cum Sclamo, aut pisanæ succo (Græca habet θάψιαν χυλῶν, id est, Thapsiæ succo, sicut & legitur in Aetuario, pro πσιονάων χυλῶν) aut alicæ, aut aqua multa, aut lentricula, aut alia sorbitione. Pani compinsitur & torretur. Dant aliqui cum copiosa sorbitione, aut succo multo, aut modicum cibum dari præcipientes statim Elleborum offerunt, præsertim iis in quibus suspecta timendaue erit strangulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tuto enim sic peragitur purgatio, quod non intempestiue medicamentum corporibus cibo munitis accedat. Sed etiam balani ex Elleboro



Elleboro subditę cum aceto, vomitiones eliciunt. De vtroque Elleboro simul Galenus & Plinius differunt, quę proximo capite explicabuntur. Album Mesues mortiferum esse prodidit, quod facillę homines suffocare possit, ideoq; prorsus reiiciendum. Matthiolus tamen scribit antiquos Medicos albi Veratri puluerę propinasse comitialibus, melancholicis, vertiginosis, infanientibus, lymphaticis, conuulsis, podagricis, hydropicis, elephanticis, sed nunc eius vsum exoleuisse, quod eius puluis, non sine periculo dari possit, quamuis eius diluto multi absque incommodo vtantur. Id dilutum se melancholicis quibusdam exhibuisse testatur, nullo eorum incommodo. In lixiuio decocta eius radix pediculos & lendes necat. Decoquitur in lacte ad muscas perimendas: cum enim degustauerint, paulo post moriuntur. Mures quoque necat & gallinas. Paratur ex earundem radicum succo arte quadam presentaneum venenum, quo quibusdam in locis venatores sagittas inficiunt. Id, vt saepe in brutis animantibus & pullis gallinaceis se periculum fecisse Matthiolus affirmat, vbi sanguinem contigerit, facto sagittę ictu vulnere, paulo post vulneratum animal interit. Sed id permirum, quod deuoratum id venenum, nisi magna quantitate, nihil ferę incommodi adfert, eoque ipso vesci venatores affirmant Hispani, cum purgationes moliri cupiunt. Quare nihil mirum, si ferinę carnes hoc veneni genere infectę, nihil comedentibus obsint. Verum vbi facto a iaculo vulnere sanguini se commiscuerit venenum, nulla alia antidoto seruari potest animal, quā deuoratis malis cotoneis. Id quod se a Cesare Ferdinando primū audiisse ait. Hac de re Hispanus quidam venandi peritissimus, rogatus, ita scripsit, Celiberos, seu Nauarros succum albi Veratri seruare in valis corneis, aut fictilibus fuso lythargyro subtilis, donec exactę fermentescat. Id cognosci filo intincto, & inserto acui, si ratha transfixa moriatur: celerius enim interire animalia cetera cū sagittis eo succo illitis vulnerata fuerint: venatores stuparum eo succo imbutarum puluillo ferrum sagittarum cum hastulę parte quadam obuoluere, ne humore siccescente vis exalaret: integris viribus succum diu custodiri, si mala Cydonia, vbi reponitur, nulla fuerint, quia Cydoniorum odor vim eius obtundat: illam autem restitui mixtis vix bene maturę acinis collisis, aut pipere trito & iniecto: quamuis feris perniciosum id venenum sit, occisarum tamen carnem esse teneriorem, ac suauiore, illam pręsertim, quę circa vulnus est. Lobellius scribit esse Elleboron quod postremum ante aliud germinat, foliis etiam maioribus, latioribus & longioribus. Ex horum medio caulis exit tricubitalis, aut amplior, in quo flores non albi, sed ex atro rubentes, stellati, quibus succedit semen foliaceum alterius non est, cum sola sit in floribus differentia.

## ELLEBORVS NIGER.

## CAP. VI.



ELLEBOPOS μέλας, Μελαμπόδιον, ἐκστομον, πολύρριζον, & μελανόρριζον  
Gręcę dicitur, Latine Elleborus niger, & Veratrum nigrum, quibusdam Luparia, Arabicę Cherbachem, seu Charbech Afued, Italicę Elleboro nero, Gallicę Ellebore noir. Melampodium, auctore Dioscoride, quod

Nomina.

Li. 4. c. 140.

Genera.

Li. 6. c. 145.

Melampus caprarum pastor Pręti filias furore correptas eo purgasse, ac sanasse creditur. Recentiores Ellebori nigri species aliquot faciunt, vt ex sequentibus perspicuum fiet. Is, vt depinxit Dioscorides, folia habet viridia, Platani foliis similia, sed minora, ad Spondylii folia accedentia, pluribus incisuris diuisa, sed nigriora, subaspera: caulem asperum: flores albos, purpureos, racematim coherentes: semen Cnici, (in Anticyra Sesamoides vocant,) quo deiectiones moliantur: radices subiant tenues, nigre, veluti a quodam capitulo Cepę simili prodeutes, quarum est vsum.



Locus.  
Elect.o.

est vsus. Nascitur in asperis, editioribus, ac siccis locis. Optimum quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum ibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu feruensque. Plinius de eodem hac tradit. Melampodis fama diuinationis artibus nota est. Ab hoc appellatur vnum Ellebori genus Melampodium. Aliqui pastorem eodem nomine inuenisse tradunt, capras purgari pasto illo animaduertentem, datoq; lacte eorum sanasse Prætidæ furentes. Genera prima duo sunt, candidum & nigrum. Hoc radicibus tantum intelligi tradunt pleriq;. Alij folia nigri Platani similia, sed minorâ, nigrioraq;, & pluribus diuisuris scissâ. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, bulborum tunicis couoluto: radice fimbriata Ceparum modo. Et aliquantò post. Nigrum alij Entomum vocant, (Dioscorides Ecstomum) alij Polyrhizon. At verò, vt Plinius in his cū Dioscoride de Elleboro vtroq; consentire, ita Theophrastus dissentire videtur. Scribit enim: ὁ δὲ ἐλλέβορος, ὃς τε μέλας, καὶ λευκός, ὡς περ ὁράντων φαίνον. περὶ δὲ τῆς ὀψέως διαφέρουσιν. οἱ μὲν γὰρ ὁμοίους εἶναι, πλὴν τῷ χροματί μόνον διαφέρει. τὴν γὰρ ῥίζαν τῶ μὲν λευκῇ, τῶ δὲ μέλει, οἱ δὲ τῶ μέλανος δὲ φύλλον διαφέρουσιν, τὸ δὲ λευκὸς παρσώδες. τὰς δὲ ῥίζας ὁμοίας, πλὴν τῶν χρομάτων. οἱ δὲ ὁμοίας λέγουσιν, ὡς περ φαίνον εἶναι τὴν μορφήν· καὶ μὲν δὲ ἀνθεμιάδην, βραχὴν σφόδρα, φύλλον δὲ πολυχόλον, πᾶσι τῶν νάρθηκος, μῆκος ἔχον ὡς ὁμήκεος, αὐτὸς δὲ ἐκ τῆς ῥίζης ἡρτημύδον τε καὶ ἐπὶ τῷ φύλλῳ, καὶ λυβρίζον δὲ ὡς μάλα, τὰς λεπταῖς καὶ χηρσίμοις. Id est, Elleborus niger & albus velut homonymi esse videntur. De figura varia sentiunt. Alij enim similes esse aiunt, sed colore tantum differre: huius enim radicem albam esse, alterius nigram. Alij nigro folium Lauri, albo Porri tribuunt, radices autē similes dempto colore. Qui similes putant, talem eorum figuram esse dicunt: caulem Antherico similem, sed valde breuem: folium latè fissum, Ferulæ simile, bene longum, statim à radice pendens, & humi sparsum: radices multas prætenues, atque viles. Et paulò superâ scriptum est Elleborum καρπὸν ἔχειν σιγμαειδῆ, id est, fructum ferre Sefamo similem. Quæ cum Dioscoridis descriptione haud conueniunt, qui nigro Elleboro Platani

Lib.9. hist.  
cap.11.

Cap.10.

ELLEBORVM nigrum,  
Matth. flore purpureo.



In cap. 146.  
cap. 4.  
Elleb. nig.  
flore purp.

folia & Spondylii, Theophrastus Lauri tribuit. At si Theophrasti locus is diligentius expendatur, haud alium quam Dioscorides Elleborum delineasse videbitur. Cum enim nigri folium ait esse διαφωδες, albi παρσώδες, subaudiendum est τὴν χροίαν, vt de colore intelligat. Quid enim ineptius, quid tam graui auctore indignius, quam Elleboro vlli Porri folium assignare? Cum autē vtrique Ferulæ folium tribuit, tam absurda comparatio demonstrat locum hunc vitæ esse, quia veterum nullus Veratri folium Ferulæ folio comparauit. Quare locus sic videtur emendandus. καὶ μὲν δὲ ἀνθεμιάδην, ἢ ὡς περ νάρθηκος, βραχὴν σφόδρα, φύλλον δὲ πολυχόλον, vt apud Dioscoridem legitur, καὶ μῆκος ἔχον, &c. Id est, caulem Asphodeli, aut Ferulæ similem, sed valde breuem: folium multum fissum, &c. Quam lectionem Plinius confirmat his verbis. Vtrumq; caule palmi ferulaceo, &c. Ellebori nigri tria sibi nota esse genera scribit Matthiolus: primum, quod flores fert purpureos: alterum, quod candidos: tertium, quod similes flos est purpureus, numerosi folia



folia, robusta, saturatè virentia, septena simul ex apice canaliculatiq; pediculi prodeuntia, quorū sena, vtrinque videlicet terna in exortu coniuncta sunt: quod medium est, solū, & sine comite est. Caulem habet cubito paulò breuiorem, rotundū, glabrum, ac solidum: flores Rosarum effigie, in purpura albicantes, è quorū medio inter alba quadam capillamenta, octo exoriuntur siliquæ, parua, coniunctæ, corniculorum figura, in quibus semen oblongū. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, longis, saturatè nigricantibus, tenui intus matrice, à bulbosō capitulo, vnde caulis exit, prodeuntibus, amaro acriq; gustu, & qui faciliè stomachū moueat, odore insuauis, & ingrato, præsertim cum exenteratæ radicēs siccescunt. Ab hoc facie nihil distat Elleborus is, cui flores candidi, nisi florum colore. Eandem plantā pro genuino Dioscoridis Elleboro agnoscunt Pena & Lobellius. Niger Elleborus, inquit ille, iam plurimus ex Pyreneis & Alpinis in hortos translatus ineunte Hyeme, vel paulò post brumam flores profert, in candore roseos, interdū albos, nonnunquam purpureos, è pediculis statim à radice ortos, Cyclamini modo. Folia habet in singulis pediculis maiora, breuiora, rotundiora, & retusiora superne, quæ duntaxat paululū crenata sunt, ex atro viridia, minus crassa, aut rigida. Radix intricata innumera fibrarum nigrarum sobole, eodē ferme superno complexu appesa, amara valde & ingrata. His reclamatione nota vna à Dioscoride posita, nempe florum τὸ ὄνυμα βοτρυώδες, id est, florum forma racematim coharens. Ij autē in vero Elleboro sunt primū Rosarū compressarum & nōdum reclusarū, deinde expansarum effigie, quæ figura à racemosa multū abest. Quare non βοτρυώδης in Dioscoride periti quidam legendum censent, sed βοτρυώδης, facili lapsū in tantā nominum affinitate, id est, comæ, siue capill. in modum. Sunt enim βοτρυῶδες siue βοτρυῶν cirri muliebres, capilli, casaries, & plexus muliebriis, quæ scitè exprimūt in medio florum Ellebori velut Rosarum capillamenta, alba, deinde siliquæ octo parua coniunctæ. Præterea caulem τριχῶς, id est, asperum, Elleboro nigro tribuit Dioscorides, qui in nostro glaber lauisq; est, non asper. At τριχῶς etiam rigidum

Elleb. nig.  
flore albo.

ELLEBORVS niger  
III. Matthioli.



firmumq; exponi posse Pena putat. Tertius Elleborus, quem Matthioli ferminā, aut Pseudoelleborum appellandum censet, habet folia digitorum nouem instar ad pediculum vsq; dissecta, Aconiti cynoctoni ferè modo, sed longioribus diuisuris, nigricantia, vndequaq; ferrata, & è longo planoq; pediculo, caua per medium excurrente linea ortum ducentia. Caulem edit vegetum, subasperum: flores cæteris similes, sed herbaceo colore subuirides, quinq; aut plures, emergentibus è medio corniculis acuminatis, & vtrinque compressis, in quibus semen. Radicibus cohareret numerosis, tenuibus, palmā longitudine, ac etiam longioribus, colore nigricante, ac perinde vt in aliis è cepaceo capitulo enascentibus, odore similiter graui, & sapore amaro, acuto, ac nauseam mouente. Nascitur in montibus & conuallibus. Germināt omnia hæc Ellebori genera Ianuario, ac Februario mensibus, & sæpe germinādo niues perforant: florēt Martio. Dodonæus Ellebori nigri nomine tres plātas complexus, primū genuinum Dioscoridis Elleborū nigrū esse asserit, cui folia aspera,

Locus.  
Tempus.

Elleb. nig.  
Dodon.  
Lib. 3. hist.  
cap. 26.

ZZZ



nigricantia, in quaternas, aut quinas crenas profundius fissa, Vitis, aut, vt Dioscorides ait, Platani foliis similia, sed minora: caules laues, & quorum verticibus flores aceruatim exeunt in paruis umbellis, veluti in Scabiosa, dilute purpurei: deinde semen grano tritici haud ab simile: quam plurimæ subsunt fibrae, tenues, longæ, nigrae, ab vno capitulo prodeuntes. Idem Dodonæus alio in libro eundem Elleborum nigrum verum Dioscoridis esse, non Theophrasti, pertinacius astruit, eiusque descriptionem ei ad amissim quadrare contendit, caulem asperum illi tribuens, quem illic lauem esse dixerat. Præter formam vires etiam cōuenire ait. Sed id hominem torquet, quod scribat Dioscorides semen Ellebori nigri in Anticyra Sefamoides vocari, eiusque ad purgationes vsum esse: idem hanc lectionem vitiatam esse opinatur. Nam si Sefamoides, inquit, à Sefami similitudine nomen habet, improprie Veratri nigri semen, non Sefami, sed Cnici amulum, Sefamoides nuncupabitur. Ex his colligit aliunde hæc verba Dioscoridi accessisse, & fortasse ex Theophrasto translata: scribit enim, ὁ δὲ ἑλλέβορος ἐπὶ ταῦτα τῆς τερίζης, ἢ τῆς καρπῶς χυμῶς. Ἐπεὶ δὲ ἐν ἀντικύρῳ, καὶ θάσσῃ φασὶ, τῶν καρπῶν καὶ θάσσῃ συνῆλθαι, καὶ δὲ σιγαμοφῶν τῶν τοιούτων. Id est, Elleborus ad eadē & radice & fructu utilis est: siquidē in Anticyra, vt aiunt, fructus eius purgant, quē Sefamo similem fert. Et aliquantō post, οὗ ἐν ἀντικύρῳ τῶν σιγαμοφῶν ἑλλέβορος διδύσσῃ, ὅς τινι καρπῶς ὅμοιος σιγαμῶς. Id est, Anticyrentes Sefamoides Elleborum propinant, cuius fructus Sefamo similis est. Hæc verò non ab alio Dioscoridi adscripta, vt arbitratur Dodonæus, sed ab ipsomet Dioscoride ex Theophrasto mutuo sumpta fuisse non dubito, cum scribit, καὶ ἐν ἀντικύρῳ καὶ θάσσῃ συνῆλθαι, καὶ δὲ σιγαμοφῶν τῶν τοιούτων. Quæ sic vertit Ruellius. Semen Cnici, quod in Anticyra Sefamoides vocant, quo purgationes moluntur. Hæc si recte intelligantur, vera sunt, & legitimi Ellebori fructus opinemur referunt. Nam fructum Sefamo similem, auctores illi non semen, sed siliquis integras intelligunt, in quibus inclusum semē est Cnico simile: quas similes Dodonæus legitimū Dioscoridis Elleborū nigrū statuit. Hæc nota, atque alix quædam cū

## ELLEBORVS niger,

## II. Dodon.

Elleb. nig.  
II. Dodo.



Elleb. nig.  
III. Dod.  
Cano.

in eo desideretur, illegitimus Dioscor. Elleborus niger habendus, est Sanicula femina Fuchii. Atrantia nigra Geshero. Alteram plantā à veris Ellebori nigri viribus parū dissidentē possidet Dodonæus, quæ à Belgis Heylichkesterwey, id est, Herba Christi aut natalitia dicitur, quod Hyeme clemētiore ad Domini natalem diē flores, quibusdam Planta Leonis. Huic folia sunt dimidia, spissa, in septenas, aut octonas partes diuisa, quarum singula oblonga, acuminata, marginibus vtrinque à medio sursum versus serrato: caule erecto: flores in pediculis palmum altis è radicibus erumpunt, magni, primū niuei & venusti, deinde purpurascētes, postremò virentes, si iqua in mediis staminibus luteis exorta si iqua in creuerint, quatuor aut quinque sunt crassique, quibus semen. Pro radicibus multæ sunt nerui fibrae, nigrae, in quibus medius tenuis nigrum Tertium genus Dodonæus Elleborum nigrum adulterinū cū Fuchii nuncupat, à Germanis Christwurte appellatū, à Belgis Vierwey, quæ vox Herbam ignis significat, quod quadrupodum morbo.



**ELLEBORVS niger**  
111. *Dodonæi.***ELLEBORVS niger**  
adulterinus *silueſt Fuchſ.*

morbo, quē ignē rustici vocāt, medeatur. Superiori quadātenus similia folia habet, minora, in multa etiā alia nouena scilicet diuisa, angustiora, toto ambitu vnde quaque serrata: caulē pedalem, aut maiorē, cacumine in ramulos diuiso, à quibus flosculi deorsum nutātes depēdent, minores, coloris ex pallido herbacei: quatuor etiā, aut quinque siliquæ paruæ succrescūt, semēq; nigrū & rotundū continent. Radicis fibræ sunt tenuiores, nigricantes, inter sese implicatæ. Enneaphyllō Plinij esse quibusdā deētis placet. Enneaphyllō, inquit, longa folia nouena habet, causticæ naturæ. Est Elleborus niger tertius Matthioli, flore herbaceo. Fuchsius Elleborum nigrum genuinū Dioscoridis non describit, sed adulterinū genera duo. Prius, Elleborū nigrum adulterinū hortēsem, quod tertiū esse Dodonæi modō diximus. Alterū, Elleborū nigrū adulterinum silueſtrē, quod Germani *Leuszkraut*, id est, pedicularem vocāt, quod pediculos interimat.

Lib. 27. c. 9.

Elleb. nig.  
adulteri-  
nus, Fuchſ.

Hunc Elleborū inter Aconita recēset, & Lycō-  
ctonum primū appellat: in a. no libro Elleborum  
nigrū tertiū facit, proximē descripto nō admo-  
dum dissimile. Caulē proceriorē habet & cras-  
siorem: folia minora & angustiora, in sena, vel  
septena alia diuisa, ambitu vndiq; serrato: flores  
magnitudine superioris, pallidos: siliquas par-  
uas, Sefamo similes, in quibus semē: radicē ligno-  
sam, breuē, cū foliis plurimis & subnigricatib⁹.  
Nascitur in montibus asperis & petrosis, atque  
inter sepes. Hyeme aut eius fine floret. Allobro-  
ges *Masſure* vocāt. Tragus Elleborū nigrū adul-  
terinū eundē cū priore Fuchſij posuit, genuinū  
verò longē alium, tenerrimis videlicet foliolis,  
Abrotoni exigui, vt mox dicemus. Elleboro affi-  
nes sunt Elleborastri & Cōsiligines, sic dictæ à  
rusticis, quod in aruis inter Siliginē frequētissi-  
mē reperiatur, vel fortasse quod cierent aluum.  
Matthiolus plantā hīc appictā Cōsiliginē esse  
suspiciatur, nō asserit: quoniā nullus tum veterū,  
tum recentiorum Cōsiliginis notas memoriae  
prodiderit. Verū quia huiusce plantæ radices  
per aurículas pecorū perforatas insertæ, à pul-  
monaria, atque aliis morbis ea liberāt, Ellebori  
nigri modo, suspicio est Columellæ & Plinij Cō-  
siliginem esse. De hac sic Columella. Præfens remediū cognouimus radicula, quā  
Lib. 6. ca. 5.

Lib. 3. hist.  
cap 78.  
In Hist.  
pungant.

Lib. 2. c. 135.



Hinc & intrinsecus, & ex superiore parte inricula etiam fictum est, media pars de-  
scripti orbiculi eadem subula tranſiit, & factio tota in prædicta radicle inſe-  
ritur, quam cum recens plaga comprehendit, ita continet, vt elata non possit. In  
eam deinde auriculam omnis vis morbi, pestilensque virus elicitur: deinde pars,

**PSEUDOELLEBO-**  
rus, siue Consiligo. *Matth.*

Lib. 4. c. 8.

*Nile Phytop. pag.*  
*339.*



Lib. 1. c. 15.

**ELLEBORASTER**  
maximo flore & semine  
pregnans



quæ subula circumscripta est, demortua excidit,  
& minime parvis lactina caput conservatur.  
Plinius. Nostra æra meminit herbam in Mar-  
sis repertam Nasitur & in Equiculis circa vi-  
cum Neruesis, Consiligo vocatur. Et radix her-  
bæ Consiliginis, quam nuper inuentam dixi-  
mus, suam quidem & pecoris omnis remedium  
præfens est pulmonum vitio, vel traiecta tantum  
in auricula. Bibi debet ex aqua, haberi que in ore  
assidue sub lingua. Planta itaque, cuius hæc ima-  
go expressa est, siue sit Consiligo, siue Pseudoe-  
leborus, ad duorum palmorum altitudinem as-  
surgit: cauliculos proster tenues ac molles: folia  
longiuscula, tenuia, quadatenus Abrotanionio-  
res Buphthalmi, paulo maiores, ex quibus capi-  
tula prodeunt oblonga, moris Ruborum similia:  
radicibus nititur nigris, nigro Elleboro simili-  
bus, tenuioribus tamen, & aliquantulo nigriori-  
bus. Plurima nascitur in Boemia, præsertim in  
agro Pragensi. Ea vtiuntur illic tum Medi-  
cum pharmacopei omnes pro Elleboro nigro,  
peculiariter ad pecorum morbos magno ac-  
cessu. Tragus legitimum Elleborum nigrum  
perperam esse vult, vt diximus, alij Elleborum  
ferulaceum Theophrasti. Sed iam ostendimus  
Elleborum Theophrasti à Dioscoridis Ellebo-  
ro diuersum non esse. Gesnero Scamoides mi-  
nus est hæc planta, Dodonæo & Angustillæ  
Buphthalmum. Elleborastrum, siue Consiligo-  
nem geminam tradunt Pena & Lobellius, Ma-  
ximam, quæ in segetibus reperitur passim circa  
Biturigas, & variis aruis Vidugallum (Vearciam  
vocat) Gallie Aquitanice & Narbonensis, vt  
iuxta Ladum amnem Monspelio vicinum, co-  
piose prouentu foliorum florumque. Caulis pro-  
ducit sesquicubitales, geniculatos, squamæ cren-  
te, ex viridi nigricante vel ærea, in alas multas di-  
uisos, quæ densa folia fulciunt, singula septena,  
leuiter crenata, digitata, Lupini, Platani, vel Vi-  
ticis diuisura & figura, sed longiora, crassa, rigi-  
da, odore & sapore ferè Laureola. Porriguntur  
inde multiplices pediculi, qui in flores primùm ce-  
ceos, vel buxeos, pallentes, rugosos primùm ex-  
plicantur. Deinde succrescunt corniculæ: se-  
branosa, pallentia, quadamtenus Aquilegiae se-  
men teres, atrum, oblongum, grano Tritici mi-  
nus, &



nus, recludentia Sole Arietem ingresso. Perennis bruma frigidissima etiā Septentrionalibus perstat, florētque Christi natalibus ferē. Altera Consiligo minor est tota, paucioribusque caulibus, & foliis, sed maioribus & latoribus magisq; serratis. Hæc nihil aliud est quā Elleborus niger Matthioli flore herbaceo, Consiligo Ruellij, Sesamoides Cordi, Elleboraster Belgarum Lobellio. Annotat Pena nostra memoria pharmacopœcos utraq; Consiligine vsos fuisse Ellebori nigri penuria & ignoratione, nonnullos etiam quod verum Elleborum nigrum esse sibi persuasisent: quæ tamen ad illum non parum accedunt, tamen ei neutiquam tutō in vsu medico substitui posse. Superest vt Ellebori nigri vires explicemus. Purgat, inquit Dioscorides, (legendum τὴν κατὰ νοίαν ex Plinio, Purgat per inferna.) Pituitā & bilem detrahit datus per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma falsi decoquitur etiam cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumuntur. Prodest epilepticis, melancholicis, insanientibus, arthriticis & resolutis. Menses inditus trahit, partus enecat, purgat fistulas impositus, & post tertium diem exemptus. Item contra grauitatem auditus in aurem immittitur, ibique in alterum, aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat illitus cum thure, aut cera, & pice, cedrenoq; oleo: vitiligines, impetigines, lepras ex aceto sanat: coctus cū aceto do- lorem dentium collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: ex eo, farina hordeacea & vino vtile fit hydropicis cataplasma. Confitus prope vitiū radices, vinum purgatorium efficit. Ipso domos respergunt, expiandi vini habere putantes: quare cū effodiunt, stantes Apollinem & Asculapium precantur, vitantes aquilam, aduolare enim non sine periculo aiunt, quia mortem adfert auis, si Ellebori effossionem conspexerit. Celeriter autem effodere oportet, quoniam capitis grauitas ex odore oboritur: quapropter qui effodiunt, ad id arcendū Alliū edunt, & vinum bibunt, ita nulli noxæ oportuni redduntur. Emedullatur Veratri albi modo. De vtriusque Ellebori vsu multa præclare à Plinio literis madata sunt. Nigrum, inquit, purgat per inferna. Candidum autem vomitione, causāq; morborum extrahit, quondam terribile, postea tam promiscuum, vt plerique studiorū gratia ad peruidenda acrius quæ commetabantur, sæpius sumptauerint. Carneadem resposurum Zenonis libris, Drusum quoque apud nos Tribunorum popularium clarissimum, cui ante omnes plebs stans plausit, optimates verò bellū Martium imputauere, constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam sesamoides admiscet. Farina eorum per se, & mista radícula qua lanas diximus lauari, sternutamentum facit, amboq; somnum discutiunt. Nigrum medetur paralyticis, insanientibus, hydro- pici, dum citra febrim, podagris veteribus, articulariis morbis. Trahit ex aluo bilem pituitaq;. Ex aqua datur ad leuiter molliendam aluum, plurimū drachma, modicè quatuor obolis. Miscuere aliqui & scammoniam, sed tutius solum. In dul- cibus datum copiosius periculum infert, oculorum caliginem foris discutit: ob id quidam & inunxere trito. Strumas, suppurata, duritias concoquit & purgat: item fistulas tertia die exemptum. Verrucas tollit cum squama aris, & sandara- cha. Hydropicorum vteri imponitur cum farina hordeacea, & vino. Pecorum & iumentorum pituitas sanat, furore per aurem traiecto, & postero die eadem ho- ra exempto. Scabiem quadrupedum cum thure, aut cera ac pice. Album optimū quod celerimè mouet sternutamenta, sed multò terribilius nigro, præcipue si quis apparatus poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, in- tempestiuas somni vires, singultus infinitos aut sternutamenta, stomachi dissolu- tiones, tardiores vomitus, aut longiores, exiguos, aut nimios. Quippe alia dari so- lita, quæ concitarent vomitiones, ipsūq; Elleborum extraherent medicamentis, aut clysteribus, sæpe etiam sanguine venis emissio. Iam verò & cū prosperè cedit,

Consiligo  
Belgarum.Vires.  
Li. 4. c. 146.

Lib. 25. c. 5.



terribili visu variis coloribus vomitionum, & post vomitiones obseruatione alui, balnearum dispensatione, totius corporis cura, antecedente omnia hæc magno terrore famæ. Namque tradunt absumi carnem si coquatur vnâ. Sed antiquorum vitium erat, quod propter hos metus parcius dabant: cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas dedit: sequentes & quaternas dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum imprimis exire. Præterea mirum inuentum est, quod incisum forficulis, vt diximus, ciibrant: cortex remanet: hunc inaniunt: medulla cadit: hæc in nimia purgatione data vomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nubilo die detur: quippe impatientes cruciatus existunt. Nam Æstare potius quàm Hyeme dandum, non est in dubio. Corpus septem diebus antè præparandum cibis acribus, abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus, pridie cœnæ abstinentia. Album & in vino dulci datur, apertissimè verò in lacte, aut pulce. Nuper inuenere dissectis Raphanis inferere Elleborum, rursusque comprimere Raphanos, vt transeat vis, eoque lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur ita morbis comitialibus, vt diximus, vertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephantia alba, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusque, tympanicis, stomachicis, spasticis, cynicis, ischiadicis, quartanis quæ aliter non desinant. tussi veteri, inflationibus, torminibus redeuntibus. Verant dari senibus & pueris: item mollis ac fœminei corporis, animæ, exilibus, aut teneris, & fœminis minùs quàm viris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, vel tumeant, minimè sanguinem excreantibus, causariis vel latere, vel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus pituitæ cum axungia salsa illitum: item suppurationi veteri. Mures polentæ admistum necat. Galli sagittas in venatu Elleboro tingunt, circuncisoque vulnere teneriorem sentiri carnem affirmant. Muscæ quoque necantur albo trito, & cū lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur. Hæc de

*Li. 6. simpl.* Elleboro Plinius. Elleborus vterque tum albus, tum niger, inquit Galenus, extergentis simul & exsalfacientis est facultatis. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, lepræque accommodati sunt. Quinetiam niger si in fistulam callo indurata immissus fuerit, duobus tribusue diebus callum detrahit. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine exsalfacientium & desiccantium.

*Li. 6. meth.* Porro niger gustu calidior est, candidus, subamarus. Veratrū album, inquit Aetius, rarius, varios humores vomitione educit: datur ieiunis per se, & cum Sesamoide, Thapsiæ succo, halica, aqua mulsa, lenticula aut sorbitione quapiam. Nonnulli exiguo cibo antea exhibitio Veratrum offerunt, iis potissimum quibus strangulationis suspicio imminet, aut corporis imbecillitas adest. Siquidem in iis qui ita assumunt purgatio periculo vacat, quod medicamentum citra mediū corporis non apponitur. Quin & glandes ex eo sedi inditæ, vomitiones cient. Veratrum nigrum atram bilem & flauam vndique ex corpore trahens, deorsum pellit, non tamen cum difficultate: quocirca ipsum in febribus circuitu redeuntibus & diuturnis exhibemus. Datur etiam furore percitis, altera capitis parte dolentibus, & quos cephalæa diu infestauit. Est autem longè omnium apertissimum intestinis, vero, vesicæ medicamentum purgans exhibentibus. Maxima eius vis est educendi peculiariter si quid permixtū est sanguini, quod ipsum vitare possit: quare & in venustis arquat commodum est, & aspritudinibus quæ in summa cute exoriuntur, qualis est lepra, impetigines, & id genus alia: quin & elephantia laborantibus est accommodatum. Modus exhibitionis sunt scrupuli tres, paulò plus minùsve, tenuiū fibrarum è radicibus pendentium, in aqua paululū maceratarum, deinde cortice detractō, & in vmbra siccato, proiectaque tenui quæ ipsi subest medulla. Datur ex passo



ex passo & in oxymelite: verū suauitatis gratia quadā ex odoratis seminibus sunt inferenda. Si verō efficaciorē cupis purgationē, scammonij paucillū adiciat. De vtriūsq; etiā vsu distindē admodū scripsit Mesues his ferē verbis. Elleborus duplex albus & niger, idēq; albo salubrior: quin & albus symptomata terribilia minatur: niger autē corpus incolume, & velut iuuenile tuetur. Calidus est & siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluit, carnē vlcibus superexcrecentē exedit. Adde quōd si ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorios reddit. Albus calidus siccus in medio tertij, similiter terget, mordet: sed vomitu multo purgat, & sternutamentā valenter mouet. Vitandus autē hic est, quōd strangulet. Niger autem omnium consensū sumendus, præsertim castigatus natura & arte: solis robustis & animosis dandus, & Vere ipso. Datus autē quando & cui cōuenit, temperamētum melius: ob id mores quoq; probatiorē reddit, & corpus incolume ac velut iuuenile efficit. Hæc enim propria ipsius sunt opera. Corpus enim totū extremētis corruptis expurgat, clementer ac sine molestia vacuat bilē vtramq; & pituitā: sanguinē proinde puriorē reddit, attrahēdo scilicet excrementa in venis mista, nō à solis cauitatibus partiū, sed à toto corpore, & à remotis partibus, & cute ipsā. Ad cerebrū quoq; purgandū, & caput totū, & sensuū instrumētā, & neruos & viscera, & vesicā & vterū est efficacissimus: cerebri quoq; affectibus, vt cephalalgia, hemicrania, mania, melancholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aquatū in oculos defluxui apertē cōsummat, iuncturāq; quoq; morbis, vt nodis, & tumoribus scirrhosis, strumis etiā. In erysipelatis, exanthematis, phagedenarū. Puluis quoq; tenuissimus Ellebori nigri visum roborat. Acetū quoq; cum hoc decoctū, auri instillatū tinnitui cōfert, & auditū roborat. Idē acetū, si os colluatur, dentiū dolori cōfert: præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartanæ biliosa, reliquis affectibus melancholicis sanantur contumacibus: urinā & menses mouet: corporis colorē & odorē bonum efficit, acetū oris. Cutis affectus, alphas vtrōsq; quouis vtēdi modo sanat: ex aceto affricus cuti, eius fœditatem & panos delet. Albus autē vomitu immodico & violento symptomata excitat horrida: foris autē affricus cutis vitia, scabiem, impetiginem, lentiginē valenter iuuat. Vterq; autē fistulis & vlcibus putridis ac malignis medetur. Albus autē quia huius tēpestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum præsertim suffocans vitatur. Nigri autē virtus ad nostra vsq; tēpora est tolerabilis, licet etiā difficilis. Sanis etiā corporibus Elleborus est molestus, inquit Hippocrates. Arte autē & industria nostra castigatū quādo, & cui conuenit rectē propter pinanus, agitq; salubriter. Filius autē Zesar manna melli simili, tepida, quantitatē corticis radicularum Ellebori aptam horis octo macerat, colatū dat, in quo virtus est Ellebori. Idē fit in melle vuarū passæ aut iure gallinarū vel carniū, aut oxymelitem, aut vino dulci, aut condito, aut syrupo, aut sapa aliqua, superaddentes polentam vel orizam, aut pultem, & sorbēdum ita datur. Sunt qui in radicem Raphanum Ellebori fibras immittūt die vno, post die fibris ablatis dant Raphanum Ellebori vites habentem. Daucus item & piper longum, anisum, petroselinum, hyssopus, succus Calaminthæ, origanum, succus Cyrenaicus efficaciorē eum hæc confirmant. Ex hoc catapotia formauit Haly ad affectus melancholicos: elephantiam, alphas nigros contumaces efficacissima, quæ recipiunt Hieræ piper drach. duodecim, Ellebori nigri, Polypodij ana drach. quinque, Epithymi, Scachadis ana drach. septem, agarici, lapidis Cyanei, salis Indi, Colocynthis ana drach. tres. Dantur tutō à drach. vna ad aureos duos. Vtriusque autem Ellebori virtutem ex corpore deturbat mulsā, decoctum vuarum passerarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum, cum oleo nucum, vel amygdalarum dulcium, vel simili:



puluerem verò Ellebori sumere tutum non est. Datur autem à siliquis sex ad tertiam drach.vnius, vel vsque ad drach.vnam.

## TITHYMALI.

## CAP. VII.

Nomina



ΙΟΥΜΑΛΟΣ & Τίθυμαλον Græcis, Latinis Lactaria herba, Lactuca marina, & Lactuca caprina, Mauritanis *Xanxer*, & *Ethulia*, Italis *Tithymalo*, Germanis *U-volffz milch*, Gallis *Tithymal*, vel, *Herbe au lait* dicitur. A succo lacteo, quo turgent species omnes, nomen commune inditum Tithymalis, vel per diphthongum potius Tithoimalis, quòd mammam siue papillam vberis exitiosam siue virosam, non inficet quis interpretetur: <sup>παιδος</sup> ~~παιδος~~ exitiosam significat. Similiter Lactariae ob commune omnium mammarum, <sup>παιδος</sup> exitiosam significat. atque ob eandem causam Lactuca, quòd ex hac herba haud secus atque ex Lactuca secta lac fluit: caprina, quòd caprae Tithymalis vescantur. Septem sunt Dioscoridi & aliis veteribus Tithymalorum genera. Sed plura hodie à recentioribus sunt obseruata. Primus Dioscoridis Tithymalus est mas, Characiac, id est, vallis cognominatus, quòd vallis septisque muniendis idoneus sit, à quibusdam Cometes, aut Amygdaloides, aut Cobius nominatus. Secundus fermina, Myrtites, aut Myrsinites, id est, Myrtifolius, à Myrti foliorum figura, aut à nucibus, quibus similem fert fructum, Caryites. Tertius Paralius, id est, marinus, quòd in maritimis nascitur: quidam Tithymalida, & Mecona, id est, Papauer nuncupauerunt. Quartus Helioscopius, hoc est, Solem aspiciens, quia eius coma ad Solis cursum circumagitur. Quintus Cyparissias, à Cupressi foliorum similitudine. Sextus Dendroides, quòd ad arboris magnitudinem crescit. Septimus Phyllos, id est, Latifolius à foliorum latitudine. Plinius eadem & totidem genera recenset: Theophrastus tria tantum, Paralius, Marem, & Myrtiten, vt dice-

Lib. 16. c. 8.

Lib. 9. hist.

cap. 11.

Forma.

Lib. 4. c. 159.

CHARACIAS, *Math.*  
secundus, *Dodonai.*

TITHYMALVS *Myrsinites*  
seu *fermina*, *Math.*





TITHYMALVS *Myrsini-*  
*tes melius expressis.*TITHYMALVS *Paralius,*  
*Matthioli.*

albo succo pleni: folia circū ramos, Olea simili, sed longiora, & angustiora: radix crassa, & lignosa. In summis caulibus coma est, qualis iuncuarū virgarum, & super ipsis caeculae peluibus similes, in quibus semen est. Nascitur in asperis & montosis. Myrsinites similis natura *Locus.* Daphnoidi est, foliis similibus Myrti, maioribus, firmis, in cacumine acutis & spinosis. Samenta à radice mittit palmi altitudine: fructū fert alternis annis nuci similem, mordaci gustu. Nascitur & hic in asperis. Paralius nascitur in maritimis: ramos habet palmi altitudine, subrubētes, quinos senōsve, a radice, circa quos folia ex ordine parva, subangusta, oblonga, Linifoliis similia: caput in summo rotundum, in quo semen velut crum, colore varium, flores albi. Totas autem frutex & radix succo albo turgēt. Helioscopius Portulacae folia similia habet, tenuiora rotundioraque: ramulos emittit à radice quatuor aut quinque, dodrantales, tenues & rubentes, lacte copioso plenos: caput est Anethi specie, & semen velut in capitulis. Huius coma cum Sole circumagitur, vnde Helioscopij nomen accepit. Nascitur maximè in rudatibus, & circa oppida. Colligitur succus & semen, vt aliorum. Cyparissias caulem profert dodrantalem, vel maiorem, subrubrum, ex quo folia oriuntur Piceae foliis similia, teneriora ramentum & rotundiora, & in totum Piceam nascentem æmulantia, vnde nomen traxit. Candido succo madet. In petris nascitur. Tithymalus Dendroides cognominatus, in cacumine amplius & largam spargens comam, succo prægnans, subrubentes ramos habet, circa quos folia Myrto tenui similia, semen Characiarum simile. Platyphyllos Verbasco similis est. Plinius eadem genera iisdem serè verbis descripsit. Tithymalum nostrum Herbam lactariam vocant, alij Lactucam caprinam, natrantque lacte eius inscripto corpore, cum inaruerit, si cinis inspergatur, apparere literas: & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, quàm codicillis. Genera eius multa. Primus cognominatur Characias, qui & masculus existimatur, ramis digitali crassitudine, rubris, rugosis, (reponere succosis ex veteri codice) quinque aut sex, cubitali longitudine, à radice foliis pendulis, in cacuminibus coma iunci. Nascitur in asperis maritimis. Alterum genus Tithymali Myrsiniten vocant, alij Caryiten foliis Myrti, acutius & pungentibus, sed mollioribus, (maioribus, non mollioribus, vetus codex habet) & ipsum in asperis nascens. Tertium genus Tithymali Paralius vocatur, sive Tithymalis,

Lib. 6. c. 2.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*TITHYMALVS helioscopius,*  
 Matthioli.



*TITHYMALVS dendroides,*  
 Matthioli.



Lib. 9. hist. τῶν δὲ τιθυμάλων μὲν παράλιος καλούμενος κόκκος, φύλλον ἔχει περισφαιρὸν, καὶ δὲ δὲ τὸν μέγαν ὡς τῆς σπιθαμῆς, τὸν δὲ κερπὸν λευκόν. ὁ δὲ ἄλλος καλούμενος τὸ μὲν φύλλον ἐλαφρότερον ἔχει, τὸ δὲ ὅλον μέγαν λευκός, τὸ μὲν φύλλον ἔχει καθαπτερόν, καὶ δὲ τὸν μέγαν ὡς τῆς σπιθαμῆς, τὸν δὲ κερπὸν λευκόν. ὁ δὲ ἄλλος καλούμενος τὸ μὲν φύλλον ἐλαφρότερον ἔχει, τὸ δὲ ὅλον μέγαν λευκός, τὸ μὲν φύλλον ἔχει καθαπτερόν, καὶ δὲ τὸν μέγαν ὡς τῆς σπιθαμῆς, τὸν δὲ κερπὸν λευκόν.

*TITHYMALVS Cyparissius,*  
 Matthioli.



Tithymalis, folio rotundo, caule palmum alto, ramis rubentibus, semine albo. Quartum generis Helioscopium appellant, foliis Portulacæ, ramulis stantibus à radice quatuor aut quinque rubentibus, semipedali altitudine succi plenis. Hoc circa oppida nascitur semine albo, columbis gratissimo, quod colligitur incipiente vna. Nomen accepit quoniam capita cum Sole circumagat. Quintum Cyparissiam vocant propter foliorum similitudinem, caule geninoduce triplici, nascentem in campestribus. Sextum Platyphyllum vocant, alij Corymbitem, alij Amygdaloidè à similitudine, nec vilius latiora sunt folia. Septimum Dendroides cognominant, alij Cobion, alij Leptophyllum, in petris nascentis copiosissimum ex omnibus maximè (maximè in veteri codice legitur) cauliculis rubentibus & semine copiosissimum. Hactenus Pinius Dioscorides Characiam Cobion appellatum fuisse scripsit, quam appellatione Plinius Dendroidi attribuit, item ille Characiam Amygdaloidè vocari, Plinius Platyphyllum. Theophrastus de tribus generibus hæc literis mandavit.





ἀφ' ἑνὸς ἐπὶ γῆς, ὡς σπιθαμῶνα. ταῦτα δὲ ἑκάστα φέρει τὸν καρπὸν, ἀλλὰ παρ' ἑτοῦ, ὡς  
ἰσχυρῶς, & ὅς ἐστι νεότερος, πεφυκὼτα ἀπὸ τῆς αὐτῆς βίτης. φιλεῖ δὲ ὄρεσινα χωρία. ὁ δὲ καρπὸς  
αὐτοῦ χαλεπὸς καίρου. Id est, Ex Tithymalis est Paralius, granum vocatus, folio ro-  
tundo, caule tota magnitudine palmum attingente, fructu candido. Qui mas-  
vocatur folio est Olea, magnitudine duos cubitos aequat. Myrtites, qui Tithy-  
malus albus dicitur, foliū habet Myrti, nisi quod in cacumine spinosum est, lar-  
menta parua per terram emittit, palmi longitudine, quae non simul, sed alteriis  
annis fructum ferunt, alia hoc anno, alia proximo, exorta tamen ab eadem radice:  
fructus Nux vocatur. Matthiolus haec Tithymalorum genera depinxit, Chara-  
ciam, Myrsiniten, Paraliū, Helioscopium, Cyparissiam, Dendroiden: Platyphyll-  
um vulgaris notitiae praefermit, & aliū, cuius Dioscorides non meminit, Le-  
ptophyllum addidit, quo Leptophylli nomine Plinius Dendroiden nuncupauit.  
Pena affirmat Characiam Matthioli, Tithymalum Platyphyllum esse. Est enim  
longioribus, latioribusque foliis quam ceteri, ramis sesquicubitum & cubitos duos  
altis, alioqui Dendroidi assimilatur. In Narbona, Gallicae Prouinciae, Lugdunen-  
sis praefectura, & alis plurimis Galliae & Germaniae siluosis, & fluentorum ripis,  
nihil frequentius. Floret Maio & Iunio vnicaulis saepius, eoq; Dendroidi affinitior.  
Characiam verò huic Platyphyllō admodum similem, sed minorem caule & fo-  
liis, ait Pena frequentiore etiam esse in Germania, & Aureliae vicinis siluosis,  
quam calidiori solo, nullibi quam in Anglia copiosior: primò Vere florere,  
cauleque complures à radice lignosa, fusca, rubentes mittere, in quibus folia mul-  
to minora, purpurascencia, amygdalinis similia, quam Paralij maiora: luteoles  
flosculos, ex quibus deinde per Iunij menses oriuntur triangulares siliquae, in qui-  
bus terna grana, paulò superius quam sint concava folia, quae pertranseunt vni-  
bellarum ramuli. Dodonaeus in Historia purgant. Characiae species quinque con-  
stituit. Primus caules proferat cubitales, teretes & rubentes, folia tenuia, ob-  
longa, angusta & longiora, maioraque quam Olea, sed amygdalinis angustio-  
ra, com-

Campan-  
lib.



*TITHYMALVS Characias*  
*primus, Dodon.*



*TITHYMALVS Characias*  
*quartus, Dodon.*



terorum Tithymalorum ritu fert. E' Narbonensi agro & Gallica Provincia in hortis Belgicis colitur. Quintus Dodonæi Characias, nobis est Tithymalus Myrsinites serratus, de quo mox dicemus. Matthioli Myrsinites habet folia circa caulem totum crassa, acuta, Myrto similia. Idē Paralium nasci ait in maritimis tūm, Senensibus

ra, comam in cacumine largam, & Iunci fere modo effusam, quæ concava quædam sursum spectantia profert, vasculis siue acetabulis similia, ex quibus flosculi sublutei: deinde triquetra exeunt capitula, parua, in quibus semina: radix dura fibras multas habet. Mōspeliensibus Amygdaloides dicitur, in agro Mōspeliensi ad crepidines Ledi amnis cis pōtem Castri noui, item Lugduni ad Athenæum cœnobium in peninsula, Aureliæ, Biturigibus, & alibi in Gallia plurimus: folio Characiæ Anglici, sed longiore, molliore, & longè maiore, latiore magisque sparsa fœtura, peltata coma: radix fibrata. Est Clusio Characias legitimus Dioscoridis, cui florem nigrum tribuit, nō subluteum aut pallescetem. Est altera Characiæ species, foliis superiori similis, sed durioribus: caules quoque nonnihil, tamē minùs rubent: coma alior, & qui hanc fert caulis, foliis haudquaquam ut prioris exiuit: illius enim comam peltatam facientis folia fere semper defluunt: vascula, flores, semina, & radices satis conueniunt. Hic est Characias Matthioli. Ad hoc genus pertinere videtur, non caulibus rubēs, sed candidus Tithymalus. Caules ei teretes sunt, ramoli, cubito sæpe altiores, folia quoque oblonga, angusta, albida, tenuique lanugine pubescentia: umbella contractior: flosculi parui, luteoli: semina trigemina in acetabulis, ut aliorum. Tithymalus Characias quartus Dodonæi foliis est similiter longis, angustisque, paulò quàm primi aut secundi minoribus, etiam albicantibus, sed minimum lanuginosis, umbella ex viridi fruticosa, quæ priusquam explicetur, oblongioris fructus, veluti amygdala, rudimentum præferebat, eiusdem tamen cum reliquis foliis coloris: flosculi & semina aliorum similia: radix alre demittitur. Est Myrsinites altera, & Turbich Alexandrinū quorundam, multò tamen cognatio-rem Characiæ quàm Myrsiniti putarunt Belgæ, inquit Lobellius, quamvis priusquam umbellas pandat, suprema folia proferat ocellata, quæ veluti nucem amygdali adumbrare videntur, ut diximus: foliis enim est pallidè virentibus, Characiæ æmulis, sed minoribus angustioribusque: fructus & flores luteos herbaceos in



*TITHYMALVS paralius,*  
Dodonai & Pena.



Senensibus, Argentario promontorio, & in toto illius regionis tractu, item in Aquileiensi agro esse frequentissimum. At Pena Paralij & Myrsinitæ effigies à Matthiolo propositas esse commentitias, neque ex plantis ipsis expressas ait, Paraliûmque, nusquam, nisi sabuloso sterili- que litorum solo mediterranei, occidui, & Germanici maris, copiose proueniẽtem, describit, virgis à radice rectis, rubellis, tactui glutinosi: foliis densè stipantibus, subnigris, lino latioribus; flosculis ex herbaceo luteolis, in summis pediculis circinata foliola media traiciẽtib- us, sicq; umbellam efformantibus, & semen edentibus tricoccum, Chamælææ aut Lathyri- dis non dissimile, minus & coactius: intus esse tria medullosa grana: radice simplici, prolixa, lignosa. Eundem Paraliûm descripsit & pinxit Dodonæus in Histo. stirpium. Pena Dioscori- Lib. 3. c. 19. dis Myrsiniten, id est, Myrtifolium, siue fœmi- nam, siue repentem Tithymalum, proxima Pa- ralio facie esse scribit, sed breuioribus, pedi- libus, pinguioribus furculis humi repere, quos fo- lia prorsum Chamælææ, latiora Myrti, vel Ru-

sci, mucronata, crebra stipant, vt Paraliûm, pallidè virentia, & in summo magis sparsa, Sedi maioris aut Laureolæ ambitu, è quo trans folia concaua & umbilicata sparguntur quaterni aut quini pediculi, qui Iunio & Iulio flores luteos herbaceos, pusillos, muscosos ferunt, & semina triquetra Paralij, Augusto matura, maiora, quæ

*TITHYMALVS helioscopius,*  
Dodonai.



*TITHYMALVS paralius,*  
Dodon. ex Hist. purgant.





etiam tribus constans lateribus, & in trigonas valuulas dehiscant, quæ singule singula grana, teretia, oblonga, fusca concludunt, medulla alba, acri, non ingrata. Hunc, inquit, Angliæ, Belgii, Franciæ horti sæpius alunt, nec alibi natum vidi. Eum certè multò melius pinxit Dodonæus, additis flore & capitulis asabre ex-

*TITHYMALVS Helioscopus,*  
*Dodonæi.*



*TITHYMALVS Cyparissias,*  
*Dodonæi.*



pressis. Idem in Historia purgantium Paraliū diuersum à Matthioli Paraliū exhibuit, & ab eo, quem ex Historia stirpium monstrauius. Illi cauliculi quini senive assurgunt, cubitalis, tenues, dilutè rubentes, quos multa parua, angusta, oblonga vestiunt foliola, instar Lini, sed candida densioraq; rotunda, sed minime ampla in cacuminibus umbellæ, in quibus flores & semina perinde vt aliorum. Tithymalus Helioscopius, inquit Matthiolus, vulgaris notitia est: nascitur enim passim prope vrbium & oppidorum mœnia, in agris cultis & incultis, hortis & collibus. Dodonæus & Pena eundem Helioscopiū depinxerunt, qui Germanis *Sonnenwende-vuolsemelk*, Belgis *Cromkens cruyt*, Gallis *Reucille-matin* dicitur, omnib; familiaris & notior, foliis Portulacæ, minùs crassis, ambitu nonnihil crenato: caules paruos, pedales, teretes, in humum flexos, quaternos & quinos cingentibus: floribus ex luteo in pallidum languentibus, in umbellam collectis: semine cæteris simili. Sed Narbonæ, vbi maturuerit, adeo spiritu vaporoso turget, vt in solo relictum quasi sese moueat, exiliat, mediūque crepet, puerisque grato sit spectaculo, quæadmodum & Tamaricis semen. Hæc Pena. Cyparissias, inquit Matthiolus, ea est planta, quam Esulam minorem perperam vocant Itali, cuius pro omni Tithymalo inualuit vsus. Ab hoc multum differt Cyparissias Dodonæi in Histo. purgant. & ab eo, quem ipse in Historia stirpium depinxit. Illi enim foliola sunt oblonga quidem, sed perangusta, & quàm Esulæ minoris angustiora, sic ad Piceæ folia accedentia, molliora tamen & tenuiora: cauliculus nonnihil rubet, dodrante altior, ramulos effundit complures, in quorum medio umbella cum acetabulis purpurascens: floribus seminibusque perpusillis: radix fibrata. Idè videtur esse, qui Leptophyllos Matthioli: cacuminibus tamen differunt. Huius species quædam minor reperitur, auctore etiam Dodonæo, palmum duntaxat alta, tenuibus cauliculis, oblongis & angustissimis foliis, umbella exigua, flosculis luteolis, seminibus minutis. Matthiolus Dendroiden vrbem, intra Terracinam, agri Neapolitani vrbem, inter saxa



ter saxa antiquissimi specus, plantæ arboreſcentis effigie, & in Tergeſtino litore, non procul à Timauo fonte in ſaxoſis quibuſdam rupibus arboreſcens, Anguillara in Thuſcia, Liguria, & prope Maſſiliam. Bellonius refert in Creta ad duorum hominum altitudinem creſcere, caudicem habere craſſitudine corporis humani. *Platyphyllū*, id eſt, Latifolium genuinū ſe reperiſſe credit Cluſius. Is pedali, interdum maiore altitudine aliquot à radice ramos emit tit, nonnunquam ſimplici caule aſurgit, circa quem amplafolia, mucrone rotūdiore, ad lſa- tidis nouellæ foliorum formam accedentia, vi- ridia, aliquantulum carnoſa, & ſucco pallescen- te acrique turgentia: ſlos ex luteo purpureſcens ramulis inſidet, ac veluti acetabulis quibuſdā continetur: radix craſſa eſt & candida. In ſolo Valentino regno inter Biar & Huentimente via ſalebroſa inter medios frutices duntaxat ſe obſeruallſe ait, florentem menſe Martio. Eun- dem pictum dedit Dodonæus in Hiſtoria pur- gant. Duos alios Tithymalos ex Dalechambio hic exhibemus. Prior eſt Tithymalus ferratus, qui in agro Monſpelienſi vbiuis gignitur, ra- dice multiplici, candida: caulibus multis, pede altioribus, rotundis: foliis ima parte longis & anguſtioribus, ſuperiore latoribus, ferratis in ambitu, vnde cognomentum: flore ſubluteo, fructu anguloſo. Tota planta lacteum ſuccum fundit acrem & erodentem. Summa caulium parte, vt in Tithymalo Characia, folia duo iun- cta quaſi lacunatum alueolum efficiunt, è quo pediculi florem ac fructum ſuſtinētes exeunt. Alter eſt Tithymalus verrucoſus, qui in aridis & ſabuloſis gignitur prope Lugdunū, ad Rho- dani fluenta: radice breui, ſed ſurculoſa: cau- libus multis, cubitalibus: folio Myrti, inæqua- libus ſpatiis diſpoſito, candicante, minimè per ambitum diuiſo: flore ex herbaceo ſubluteo: fructu rotundo, verrucarum tuberculis ſimili, qua de cauſa Verrucoſum cognominarunt. To- ta planta lacte manat, vt & cætera Tithymalo- rum genera. Nunc de eorum viribus dicēdum.

Characiæ liquor lacteus, auctore Dioſcoride, vim habet aluum per inferna purgandi: pitui- tam & bilem ducit, duorum obolorum ponde- re ex poſca ſumptus. Cum melicrato autem po- tus vomitiones cit. Appetente vindemia la- cteus hic liquor colligitur. Depilat is recens ex oleo in Sole inunctus, renaſcentēſq; capillos ſtauos & exiles efficit, tandēque omnes peri- mit. Cauernis dentium inditus leuat dolores, ſed cæra dentes oblinendi, ne effluēs fauces aut

Li. 4. c. 159.

Aaa 2



TITHYMALVS ferratus, Dalechampi.





TITHYMALVS verrucosus,  
Dalechamij.

Lib. 26. c. 8.

linguam vitiet. Idem inunctus formicætes verrucas penfiles, thymos & impetigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas fistulâsque. Semen & folia eadem quæ lacteus succus præstant, dimidio acetabulo pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota, per inferna purgat. Decocta cum aceto colluto ore, dentium dolori auxiliatur. Huic consimilem facultatem habent Myrsinitæ succus, radix, semen, folia, ad ciendas tamé vomitiones imbecillior hic est. Paralij vsus supradictio similis est. Helioscopius vim eandem habet cum superioribus, sed non adeò validam. Cyparissia vis etiam eadem quæ præcedentibus. Dendroides quoque eiusdem effectus cuius superiores. Platyphyllos radix, succus, & folia, per inferna trahit aquas. Pisces necat tusus, & aqua dilutus. Plinius eorundem Tithymalorum vires partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto, partim ex aliis tradidit his verbis. Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characiæ exceperit. Est & semen in vsu cum melle deco-

ctum ad cataportia soluendæ alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluuntur radicis decocto è vino aut oleo. Illinunt & lichenas succo bibuntque eum, vt purgent vomitione, & aluo soluta, aliàs stomacho inutilem. Trahit pituita sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluum purgari libeat, in poscasi vomitione, in passo aut aqua mulsâ. Media portio tribus obolis datur, ficos à cibo sumpsisse melius est, fauces vrit leniter: est enim tam feruentis natura, vt per se extra corpori impositus, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in vsu sit. Myrsinitæ fructus demetitur cum messium maturitate, lauaturque, deinde siccatur, & datur cum Papaueris nigri partibus duabus, ita vt sit totum acetabuli modus. Minus hic vomitionibus purgat quàm superior, cæteri item. Aliqui sic & scordium eius dedere, nucem verò ipsam in mulso, aut passo, vel cum sesama. Trahit bilem & pituitam per aluum. Oris vlcera sanat. Ad nomas oris folium cum melle estur. Paralij semen colligitur incipiente vua, & siccatur teritur, sumiturque acetabuli mensura ad purgationes. Trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo: cæteri vsus qui Characiæ. Cyparissia eadem vis quæ Helioscopio aut Characiæ. Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice, vel foliis, vel succo, in mulso, aut aqua mulsâ drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas. Dendroides est

Lib. 8. sim.

eiusdem effectus cuius Characiæ. Galenus dilucidius has vires exposuit his verbis. Tithymali omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem inest vero & amaritas. Validissimus Tithymalorum liquor est. Secundum locum tenerior & amaritas. Sed & radix earundem facultatum particeps est, verum non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maximè qui illis erosus ipsa ueniunt. At liquores vt qui valentior vim habeant, in foramina quidem ipsa adurunt, vlcerantque: quapropter foris illis cera circumuoluitur. Sic pilos quosque succus inunctus tollit. Porro quum vehementior sit, oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandem prorsus radices pilorum adustæ corrumpuntur, corpusque depile denur.



detur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia, & thymos auferunt, deterguntque lichenas & psoras, quia scilicet illis abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea vlcerum phagedanica, anthracode, & gangrenode, quia valenter calfaciunt & abstergunt, si in tempore & moderatè quis vtatur, iuuare poterunt. Verumenimvero & fistularum callos eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnante capiendos vti assolet. Celerrimè namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditi ad aquæ superficiem feruntur. Cæterùm cum septem sint eorum genera, valentissimus est, quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur instar arboris: deinceps qui Verbasco similis est, & Cyparissias, post Paralys, de nique Helioscopius. Proportionem verò cõprehensæ eorum facultatis & cinis, & lixiuium erit.

## TITHYMALVS TUBEROSVS

sive Apios. CAP. VIII.



**TUBEROSVS** Tithymalus exiguos promit cauliculos, aliquantulum rubentes, tenues ac teretes: circa quos exigua & parua foliola, formidè foliorum Hyperici aut huiuscemodi Ruta sylvestris, at minoræ, Chamæsyces amulæ, Umbellæ in fastigiis raræ, in quibus acetabula: folioli pallentes lutei: semina asperiuscula triquetra, vti aliorum Tithymalorum, minora tamen: radix tuberosa pyri modo turbinatur, inferiore parte angustior, foris nigricans, interius candida. Manat ex hoc lacteus quoque succus, quacunque eius vulnerata aut læsa parte. In Apulia Italiæ prouincia gignitur, nec non in Græcia ac vicinis insulis, vt Creta, Lemno, alijsq; & quidem illic locis montosis. Exit vno loco longioribus cauliculis: alijs tenerioribus breuioribusq;. Huius quandoq; maior: illius verò subinde minor est radix. Memini siquidem me ab excellentissimo clarissimoq; viro Iacobo Antonio Cortuso, patritio Parauino, duas olim huius plantas accipere. Vnius radix maior crassiorq;: folia verò & ramuli minores: alterius verò radix minor, sed ramuli longiores, & folia paulò maiora. Hunc Tithymalum Græci ἀπιον à figura & similitudine pyri nūcupant: dicitur quoq; & ἰχθὺς & à Gaza Latine Carica, quod ἰχθὺς, id est, Caricam siue ficum aridam, radix referat: item & χαμαῖδαρος, siue terrestris glans, & à figura quoq;. Sunt tamen & alij χαμαῖδαροι Germaniæ familiares ac edules, de quibus in historia frumentorum. Pempt. 4. scribit Bellonius χαμαῖδαρον modò in Græcia Apion dici scribit. Facultate autem temperamento Tithymalus iste, siue Apios, vehementer calidis ac siccis est, rebus Tithymalis similis, ac perinde quoque humano corpori molestus ac non educitur: ad radicem inferior, per aluum. Tota vtrinque purgationes mouet. Succus seliquioboli pondere, vtraque etiam parte purgat. Hydropicis, inquit Plinius, datur acetabuli mensura.



Carica. 1847  
Ergon



Nomina



ITYOYΣA Græcis, Latinis Pityusa, Mauritanis *Alsebran*, & sine articulo *Scebran* & *Scobran*, quod ex Serapione facile intelligi potest, qui nomine *Scobran*, id est, *Esula*, ut ipse interpretatur, totum Dioscoridis de Pityula caput transcripsit, Officinis *Esula* siue *Ezula* nominatur. Pityula autem à

Li. 4. c. 160.

*Idem Phlegm. pag. 577.*

Forma.

Lib. 24. c. 6.

In cap. 160.

lib. 4.

PITYUSA *Marth. siue*  
*Esula maior.*



ῥισφιδρα ἐννεγέθη, id est, valde magnum, quæ est *Esula maior*, unica nota repugnante: scribit enim Dioscorides Pityulæ fructum esse *πλατύς ὡς φακός*, id est, latum Lenticulæ instar, quum *Esula* flores & fructum habeat non Lenticis, sed Tithymali, id est, triqueræ capitula, in quibus semen. Sed mendosum hunc locum esse credunt docti viri, rei ipsius cognitione, & virium experientia suffragante. Veriusque *Esulæ* iconem ex Dodonæo in historia purgant. hic proponimus, quæ & à Matthioli pictura hic etiam posita, & ab *Esula* in *Histo. Stirpium picta* differe re videtur, ubi *Esulam* maiorem pinxit, quem Fuchsius Tithymalum plarphyllum

esse plantam, quæ Officinis *Esula minor* dicitur, Dioscoridi Tithymalus Cyparissias: *Alsebran* maius, siue *Mehefelengi* Avicennæ, eam esse, quæ Græcis dicitur Pityusa, Officinis *Esula maior*, quæ in Italia passim ferè provenit, hæc minoris *Esulæ*, sed longè in omnibus maius, adèd ut in quibusdam regionibus, ut in Apulia, arbusculæ speciem referat. Copiosa nascitur in Veronensi agro, ea planitie qua ad Benacum transitur, sed quod aridissimum hic sit solum, non valde adolefcit. Dodonæus, Pena, Lobelius Pityulam *Esulam* minorem esse censent. Cum enim Dioscorides non totum Pityulæ habitum & lineamenta *Piceæ* comparet, sed nonduntaxat, *Esula minor* *Piceam* foliis suis rebus, quàm Cyparissias maioribus latioribusque, terea *Esulæ* vox ex Pityula videtur detorta, ut tunc enim duabus primis syllabis Pity, ex vi videretur deminutum nomen *Usula*, & mutata per ma vocali *Esula*. Cum etiam Dioscorides Pityulam, id est, *Esulam* minorem delineat, invenit eius alteram esse speciem maiorem, scribens fruticem hunc quibusdam in locis reperiri.



*ESULA maior, Dodonæi  
Hisor. purgant.*



*Esula parua, flosculis rubris, & semine Pepli, peltata foliola transmittentibus, Tithymalorum ritu. Esula maior Dodonæi ex Hisor. purgant. videtur esse Esula maior Germanica, à Pena depicta, cuius apud Germanos & Belgas pharmacopæos*

fecit. minorem, quem ille Tithymalum Cyparissum. Esula maior, ut describit Dodonaus, fruticosa stirps est: caules eius complures, teretes, supra cubiti altitudinem assurgentes, foliis vestiuntur oblongis, angustis, quam Tithymali Characi minoribus: umbellæ angustiores sunt: flores seminaque Tithymali: radix ampla, ramosa, crasso cortice obducta, succo lacteo plena, ut tota stirps. Reperitur in collibus quibusdam Germaniæ, circa Scaphusiam & Basileam. Minor priori similis est: caules tamen eius breviores, tenerioresque: folia etiam oblonga, angusta, acuminata, minora: flosculi fructusque respondent: radix tenerior, lignosior, tenuiori cortice vestita. Tota similiter lacteo succo prægnans est. Hæc Turpetum nigrum est Actuarius, quamvis dixerit Dioscorides, Pityusæ radicem candidam esse: nam internam pulsam intelligit, non externam corticem, qui viridis rufescit, siccatus nigrescit. His subiungit Lobellius Pityusam, siue Esulam minorem alteram, floribus rubris, quam Pityusæ speciem alunt Belgæ, inquit, stirpium peritiores, spithamam & pedem altam, foliolis

*Vide Phys. pag. 576.*

*ESULA minor, Dodonæi  
Hisor. purgant.*



*PITYVSA siue Esula minor, Dod.  
Hisor. stirp. Tithym. platyphyllos, Fuchf.*





*PITYVSA* siue *Efula minor*,  
*Dodon. Histor. stirp. Tithym.*  
*Cyparissias, Fuchf.*



bi quàm in litoribus, quèadmodùm *Tithymalus Paralius*, & insulis maris Adriatici facillè reperitur, & *Lio*, insula parua. Est hæc Venetis Medicis & pharmaco-

*PITYVSA* siue *Efula minor altera*  
*floribus rubris, Lobell.*



*ESVLA* maior Germanica,  
*Pena.*



paris fl.





*ESVLA* silvestris, *Tragi.*



poris Pityusæ species, & hac Efulæ vulgaris vi-  
 ce vtuntur in confectione Benedictæ, & cata-  
 potis catharticis: purgat enim non segius,  
 quàm Efula communis. Quibusdam creditur  
 Alypum Dioscoridis, aliis, sed perperam, nigrū  
 Turbith, quod Aëtianus Pityusam esse arbitra-  
 tur, vt diximus. At Pityusæ quidem ea non est,  
 sed persimilis, ideò rara Efula nominata. Tra-  
 gus tres alias exhibuit. Siluestrem, quæ in sabu-  
 losis siluis prouenit, caule procero, cubiti alti-  
 tudinem ferè attingente, elegantioribus, ac  
 magis rubris umbellis: alteram dulcem, quæ in  
 vmbrosis ac vliginosis montibus & vallibus  
 alpium Helueticarum nascitur, caule, flore, fo-  
 liis, radice & lacteo succo Tithymalis & Lathy-  
 ridi adeò propinqua, vt ab illis vix discerni  
 possit. At gustus ipsius lactei succi & radice  
 dulcis est: semen rotundum, luteum, ad milium  
 accedens, è vasculis suis cum maturuerit exili-  
 re solitum. Est Trago alia Efulæ exiguæ species,  
 quæ in agris quibusdam à messè autūnali tem-  
 pore reperitur, frutex dodrantalis, surculosus,

Li. ca. 100.

Li. 4. c. 160.

Vires &

Temper.

Lib. 24. c. 6.

tuitam

minutissimis foliis, Thymo similibus, vestitus: semen in tripartitis loculamentis  
 continetur. Pityusæ radix, vt auctor est Dioscorides, purgat per inferna duarum  
 drachmarum pondere, data cum aqua multa. Seminis autem drachma vna datur:  
 succi verò cochlearis vnus mensura. Excipitur hic farina, & in catapotia forma-  
 tur. At foliorum drachmæ tres dantur. Plura tradit Plinius. Bilem, inquit, & pi-



tuitam per aluum detrahit radix, decocti hemina, aut seminis ligula in balanis. Folia in aceto decocta furfures cutis emendant: mammas quoque misto Ruta decocto, & tormina, & serpentium ictus, & in totum collectiones incipientes. *Li. s. simpl.* tyusam, inquit Galenus, quidam speciem esse putant Tirhymali, quod succum illi similem habeat, quodq; similiter purget, & in cæteris omnibus sit illi viribus ad-  
*Lib. purg. cap. 23.* milis. Multa de hac planta tradit Mesues diligenter notanda. Esula, inquit, herbarum lactiarum species, rusticorum est purgatorium. Vna est magna, altera parua. Magna vlcera viscera, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim cortice radice tenui, leui, fragili, subrubro Casia modo, ante sex menses collector.

ESULA dulcis, Tragi.



ESULA minima, Tragi.



nam recens quo mense collecta mala est, & orta loco aliquo prope thermas. Col-  
 ligenda est Veris initio. Lac, quod calidius, tum acrius, ac valentius sit, sine Veris.  
 Calida sicca principio tertij gradus. Substantia constat tenui, ignea, acii, inciden-  
 te, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terrea styptica etiam, siccante mate-  
 rias altius immerfas. Purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam, à iunctu-  
 ris: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, sed nocet cordi, stom-  
 cho, hepati, viscera excoriat, venarum ora disrumpit, corpus immodicè siccac, le-  
 men absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maximè. Ob id miscenda ei  
 sunt cardiaca, stomachica, hepatica. Ad hæc glutinosa, cogentia & astringentia:  
 glutinantia, vt gummi, tragacanthum, bdellium, mucago Psyllij, succus Portula-  
 cæ: postremò refrigerantia. Infundantur ergo in acetum, præsertim quo Cydo-  
 nia sint macerata, & in succu Intybi, vel Sonchi, vel Portulacæ, vel Solani: additis  
 etiam myrobalanis, absinthio, aloë præstantior euadit. Radicè Esulæ maioris, in-  
 quit Lobellius, aceto & lacte præparatam, in puluerem redactam à granis duode-  
 cim ad grana sexdecim enenmate infundere solemus, & in medicameto idest lute-  
 go grana sex vel octo sine molestia: pituitosis verò ad tempus tantillum idest lute-  
 molestum, quia ægrius pituita expellitur.

LATHI



**L**ATHYRIS Græcis, Latinis etiam Lathyrus, quibusdam Tithymalus, *Nomina*  
& inter Tithymalos numeratus teste Dioscoride, Officinis Catapu-  
cia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotis semen fe-  
rat, vel potius quia dixit Dioscorides, *ἐν ῥηλαποσίῳ λανθάνουσα*, id est, in  
catapotis sumpta grana purgare, Arabibus *Mensana*, seu *Mahendane*, Italis *Ca-*  
*tapucia minore*, Insulribus *Cacapuz*, Gallis *Esperge*, Germanis *Sprinkraut*. Caulē *Forma*  
profert cubitalem, vacuū, ut describit Dioscorides, digiti crassitudine, in cuius ca-  
mine sunt alae: folia in caule oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen & la-  
tiora. Quæ in summis sunt ramulis, minora, Aristolochia, aut Hedera oblongæ  
figura. Fructum fert in summis ramis, tribus localamentis distinctum, rotundum  
ceu capparim, in quo terna sunt semina, mēbranis discretæ, rotunda, maiora eruis,  
quæ cum corticibus exuuntur, candida sunt & dulcia: radix illi tenuis, & inutilis.  
Totus frutex lacteo succo Tithymali modo turget. Plinius paulum à Dioscoride  
disidet, hæc scribens. Lathyrus folia habet multa, Lactucæ similia, tenuiora, germi-  
na multa, in quibus semen tuniculis continetur, ut Capparim, quæ cum inarvere,  
eximuntur grana piperis magnitudine, candida, dulcia, facilia purgatu. Hæc postre-  
ma omnium Tithymalorum Lathyrus, notissima est omnibus & vñtatissima, Ca-  
tapucia nostra minor, cui omnia aptissimè quadrat. Nascitur in hortis, & in agro-  
tum marginibus occurrit. Carpitur Autumno, dum fructu prægnans est, semenq;

*Li. 4. c. 161.*

*Li. 27. c. 11.*

*Locus.*

LATHYRIS, Matthioli.

LATHYRIS minor, Dalech.



eximuntur dū tuniculæ quibus includitur inarvere. Lathyridis grana sex aut septē, *Vires &*  
et tradit Dioscorides, purgant aluum in catapotio, aut cum caricis, aut palmulis *Temper.*  
deborata, sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem pituitam, & bilem, & *Li. 4. c. 161.*  
aqua. Succus Tithymali modo exceptus eundem effectum præstat. Folia cum  
gallinaceo, aut oleribus decoquantur ad eisdem effectus. Plinius verò eius grana *Li. 27. c. 11.*  
vicenā in aqua pura, aut mulla pota, hydropicos sanare tradit. Trahunt & bilem,  
inquit.



Ll. 6. meth.

inquit. Qui vehementius purgari volunt, cum folliculis ipsis sumunt eam: nam stomachum lædunt. Itaque inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacei sumerentur. Sunt qui dicant, inquit Galenus, Lathyrum etiam Tithymalum esse speciem, tum quod similem illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce. Quod sane etiam maximè purgatoriam vim habet. De eadem Actuarius hæc scripsit. Lathyrus vehementius pituitam purgat: dantur eius grana maiora quindecim, & minora viginti. Atque iis, qui vberius purgari cupiunt, mandari iis verò, qui multa euacuatione opus non habent, integra deuorari iubentur, præsertim si eius qui sumit stomachus vitiatum fuerit. Lathyrus minor in pinguibus nascitur, radicibus multis, crassiusculis, tenuissimis fibris huc illuc vagantibus: ramulis ad radicem complusculis, humi sparsis, in quibus folia sunt Polygono similia, paruula. Caulis dodrantalis, aut paulò altior: foliis inæquali situ utrinque prodeuntibus, oblongis, Hyssopi fere modo. Floribus in eius summo vertice conglomeratis, planta tota lacteum succum fundit.

## PEPLVS, PEPLIS.

CAP. XI.

Nomina

Vide Physiq. pag.  
579.



GRÆCIS *πέπλος, πεπλή*, & *μήλων ἀφρώδης* dicitur, Latinis Peplus, Officinis Efula rotunda, Gallis *Reuille-matin des vignes*, Germanis *Tuffelmilch*. Peplus autem nominatur, auctore Pena, quod ramulorum ambitu, & quasi rotundo amictu velum efformet: est enim *πέπλος* velum, & itragulum. Vel potius ob purpuream foliorum superficiem, sanè xerampelam, quæ Pello in vinetis, & Peplidi in maritimis nascenti sæpius inest. Peplum enim fuisse purpurei, vel phœnicei coloris multæ historiæ declarant. *πέπλος*, & *ἀνδράχνη ἀργία*, id est, Portulaca siluestris. Hippocrati *πέπλιον*, Latine etiam Peplus & Peplum, ut nomine, sic effigie Peplum referens, & propius adhuc etymum Pepli exprimens, idcirco *γάμος ἀμφιλόφης* à Dioscoride dicitur, id est, largius & vberius fruticans vnde quaque. Peplus, ut descripte

## PEPLVS, Matthioli.

Lr. 4. c. 162.

Forma.

Locus.

Ll. 27. c. 12.



Dioscorides, exiguus frutex est, albo liquore plenus, foliis paruis, ut Ruta, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi sparsa: semine sub foliis paruo & rotundo, minore quam candidi Papaueris. Radix vna, ex qua totus frutex prouenit. Nascitur in hortis & vineis. Colligitur melsibus, siccaturque in umbra, & continuo vertitur. Plinius, Pello, inquit, quæ aliqui Sycem, alij Meconium aphrodes vocant, verum Meconium, alij Mecona aphrode vocant, foliis codex habet) ex vna radice tenui fruticat, foliis Rute, paulò latioribus: semine sub foliis rotundo, minore quam candidi Papaueris (huic lectiori Dioscorides assensit: repugnât quædam exemplaria, quæ habent, minus candido, quæ Papaueris, ut hinc color, illic magnitudo indicetur. Quod ter Vites fere colligitur melsibus, siccaturque, & fructu suo, subiectis aquis in quas excidat. Quod postremum perspicue falsum est. Quod enim siccari opus erat, si in subiectas aquas excideret? Quare ex veteri codice legendum, subiectis



## PEPLIS, Matthioli.



iectis in qua excidat, vt intelligamus vasa, aut substrata lintea. Peplis autem, Dioscoride auctore, frutex est vndequeque amplus, candido succo plenus: foliis Portulacæ hortenſis ſimilis, rotundis, & infernè rubrum quid habentibus: ſemine ſub foliis rotundo, velut in Peplo, feruente guttu: radice ſingulari, ſuperuacua, tenui. Vtraque hîc depicta eſt. Quibus Dalechampi Peplion, & Peplin minorem adiecimus. Illud in litorum arenis gignitur, radice vnica, tenui, ſex digitos longa, nonnihil capillata, ſupernè rubente, infernè candida: caulibus multis, humi ſparſis, & circūque terram operientibus, rubris, lacte manantibus: ſemine rotundo, gemino ſerè, foliis annexo, vt in Chamæſyce, & Peplo, ſeruidi guſtus. Peplis minor in vineis gignitur, radice craſſiuſcula, tortuoſa, paucis fibris capillata: caulibus multis, palmum altis, ſurculosis: foliis ima caulium parte Lino ſimilibus: quâ verò caules in ſurculos diuiduntur, amplioribus, proximè caulem latoribus, in acutum deſinentibus: flore ſubluteo, minuto: fructu gemino teſticulorum modo, in alucolis lacunatis reposito. Lacteo ſucco tota planta turgat, & corpus vehementer purgat. De Pepli viribus hæc ſcripſit Dioſcorides: Herba ipſa multos habet vſus, radix verò inutilis. Semen eius tuſum, ſeruidaꝫ aqua madefactum reconditur. Pituitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cytho potum ducit. Obſoniis mixta herba aluum conturbat.

Peplion  
Dalech.Peplis mi-  
nor Dalech.Li. 4. c. 162.  
Vires &  
Temper.

## PEPLION, Dalechampi.



## PEPLIS minor, Dalech.



Bbb



Li. 17. c. 12. Cōditur in muria. Eadē Plinius tradit. Pepli semine poro aluus soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media portio est acetabuli mensura, in aqua mulsæ heminis tribus. Et cibus inspergitur, obsoniūq; ad molliendā aluū. Peplis, ut Dioscorides tradit, Li. 4. c. 163. colligitur, ac reponitur, & datur quemadmodum Peplos, muria item conditur: vires denique easdem quas Peplos habet. Portulacæ, etiam Peplion, ob similitudinem foliorum vocari præfatus Plinius. Portulacæ vires prolixè memorat, à Peplij facultate diuersas. Galeno Peplos frutex succum habet similem Tithymali, cum in aliis, tum quia purgat, ceu illi. Peplion quoque frutex paruus succum habet sicuti Tithymali. Nascitur plerumq; ad mare: radicem habet superuacuum, ut & Peplos: succum verò validum, non tamen admodum vtilem: sed semen vtile est, & flatuosum, similiter ac semen Pepli purgans. Eo in loco in Græcis codicibus falso *φυσώδες* legitur, & ab interpretibus flatuosum conuertitur, quod Dioscorides & Paulus *φυσώδες τῆ γῆς* esse dicunt, id est, feruentis gustus: quare & hic apud Galenū pro *φυσώδες* legendum *φωφώδες*. Præterea Aëtius ex Hippocrate ait Peplion esse *φωφώδες καὶ ἀσπρῆς τινος*, id est, flatus disrumpere, ac discutere, quare flatuosum dici minimè potest.

## CHAMÆSYCE.

## CAP. XII.

Nomina

Li. 4. c. 164.

Forma.

Ide Phleg. pag. 500.

Locus.



RACIS *χαμαίσκη*, & *συκὴ* nominatur, Latinis similiter Chamæsyce. Ramos profert, inquit Dioscorides, quaternum digitorum, per terram stratos, rotundos, succo plenos: folia Lentis specie, Peplo similia, parua, tenuia, humi strata: semen est sub foliis, rotundum, velut Pepli semen. Sed neque florem, neque caulem habet: radicem tenuem, & inutilem. Nascitur in petrosis & squallidis locis. Ex his intelligere licet Chamæsyceen Peplo valde attingentem, aut eius speciem aliquam esse. Chamæsyceen Dalechampiū hic appinximus.

## CHAMÆSYCE, Dalechampi.



Chamæsyce Penz.

quæ in agro Mospeliensi gignitur, exili radice, longiuscula, candida, dura, simplicis & singulari: ramulis multis, quatuor digitorum longitudine, in adultis, lacteo succo manantibus: folio Lentis ordine per ramulos disposito, subfœta planta ferè rubescente, acris & feruidi gustus: semine rotundo, exiguo, multis abditis. Chamæsyceen aliā Pena depinxit, quæ Peplo, ac Peplio rarior est multo, nec vsquam in Italia, aut Italia, sed duntaxat in Narbonensis Gallia: olivæ tinetisq; reperitur, plurima, præsertim in aridis & sabulosis, non procul à Mospelio ad patibulum via, & tractibus maritimis. Pulchella tota, & tenera, ramulis & foliis numerosis, humi reptantibus, ex pallido virentibus, dissimilibus



non dissimilibus, sed laetescens, uti duae superiores: simile quoque semen, folliculum, & flores habet, sed cuncta minora. Chamæfyces ramuli in vino triti, ut tradit Dioscorides, vteri dolores sedant, in pello appositi. Tumores, verrucas pensiles, & formicantes tollunt impositi. Decocti & in cibo sumpti alui solvunt. Ipsorum succus idem praestat, & illitus aduersus scorpionum ictus auxiliatur. Valet & ad hebetes oculos, caligines, incipientes suffusiones, cicatrices, & nubeculas cum melle illitus. Plinius non eadem prorsus tradit. Chamæfyce Lentis folia habet, nihil se attollentia, in aridis petrosisque nascens. Claritati oculorum, & contra suffusiones utilissima, & cicatrices, caligines, nubeculas in vino cocta, & inuncta. Vulvae dolores sedat apposita in linteolo. Tollit & verrucas omnium generum illita. Prodest & orthopnoicis. Linteolum pro pello posuit, & de orthopnoicis addidit, quod Dioscorides non habet. Chamæfyce, inquit Galenus, abstergentem simul & acrem vim habet. Itaque acrochordonas, & myrmecias, caules eius teneriores in modum cataplasmatis admoti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle vero crassas oculorum cicatrices detergant. Sed & hebetudinem visus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè & suffusionum principia.

Vires &  
Temper.  
Li. 4. c. 164.

Li. 24. c. 15.

Li. 8. simpl.

## SCAMMONIA.

## CAP. XIII.

SCAMMONIA. planta Graecis dicitur, Latinis similiter Scammonia, Nomina Arabibus Scammonca, & Sachmunia, Italis Scammonca, Gallis Scammonce. *Vide Phlegm. pag. 500.* Radicis liquor Scammonium, Graecis etiam *σκαμμωνιον*, quod recentiores *Forma.* Graeci *σκαμμωνιον*, id est, lacrymam, Officina corrupta voce Diagridium vocant. *Li. 4. c. 165.* Scammoniam tradit Dioscorides ramos multos ab vna radice producere (Oribasius addit, *τρεῖς ἢ τέσσαρες*, id est, tres aut quatuor) tricubitales (Oribasius, *ἢ τετραπύχους*, vel quatuor cubitorum) pingues, *ἐμπάσιοντες τὴν ἡλικίαν αὐτῶν*, ac nonnihil hirsutos (Ruellius legit, *παχύς*, vertitque, & qui nonnihil crassitudinis praeseferant. Sed prior lectio ramulis Scammoniae maxime accommodatur, quam etiam confirmat Serapio, qui ex Dioscoride transcripsit. Scammonca est planta habens ramulos egredientes ab vna radice, quorum longitudo est trium, aut quatuor brachiorum, super quos est viscositas adhaerens manui, & parum borrae, & habet folia pilosa.) Sed & folia hirsuta sunt, similia Helixinae, aut Hederae, molliora tamē, & triangula: flores albi, rotundi, caui instar calathi, graueolentes: radix admodum longa, crassitudine cubitali. (In vulgatis codicibus legitur, *παχέτα ὅσον πῆχυς*, at in veteri *παχέτα ὅσον βραχίον*, & ita legunt Oribasius & Hermolaus, id est, crassitudine brachij. Quae lectio melior est, cum nunquam, nisi improprie, dicatur aliquid esse crassitudine, sed longitudine cubitali, praecipue apud hunc auctorem. Serapio inepte vertit, habet radicem grossam sicut pollex) alba, graueolens, succo plena. Plinius paucis huius delineationem perstrinxit. Scammonium est succus herbae, à radice ramosa, pinguis foliis, triangulis, albis, radice crassa, madida, nauseosa. Nascitur pingui & albo solo. Dioscoridi pingues sunt ramuli, Plinio folia. Illi flores & radix candicant, huic folia. Quod Dioscorides

Cap. 303.  
simpl.

Lib. 26. c. 8.





dixit radicem esse *πρὸς μετὴν, ἢ βαρύνουσαν*, id est, succo plenam & graueolentem. Plinius vertit madidam, ac nauseosam. Matthioli Scammoniam plantam, cuius effugiem hic proponimus, Constantinopoli ad se Viennam missam fuisse ait ab Augerio de Busbecke, ad Tu carū Imperatorem legato, quam curauit illic transplantandam à Bono Baldino Myropola eamq; soli humore restitutam, paulò post viticulas, folia & flores emisisse. Sed eam non oratione, verum penicillo tantum depictam ostendit. Pena anno sexagesimo primo, aut secundo supra sesquimillesimum, Sequinum Martinellum pharmacopœum Venetum ex Syriaco Alepo misisse ait plusquam centum libras glebæ Scammonij Anthiocheni succi cœcreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas, lacryma plenas, seu Diacrydio antiquorum, cum seminibus angulosis, volubilis. Hæc semina tum Patanij, tum Venetijs primo Vere terræ mandata in luculentam volubilem, seu uuluum abiisse, adeo sinuosis similaceis folijs triquetris, vel potius Cissampeli folijs, floribus, facie similis, ut planè cum nostra Cissampelo eadem videatur. Verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryonia radicem æquante, atque teneritudine æmulante, foris pulla, aut cineritia, intus albida carne: cuius fistæ cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radice communis & probatoris Turbith Officinarum. Verum hæc facilius aliquatò frangitur, tamen si perinde gummola succo lacteo turgeat, atque Turbith. Communis etiam Herbariorum consensus Scammoniam vocat volubilem hic depictam, quæ in Mediterranei maris litore,

Scammonia  
maritima  
Monspelienf.

SCAMMONIA mari-  
tima Monspelienfis.



Li. 4. cap. 165.

Lib. 11.

& tota ora Monspelienfi cum Scilla, Peplo, & Pancratio prouenit: quoniam Scammonia folia imitatur, eius modo lacteum succum fundit, Catharticam vim Scammonia, Tithymalo, alijsq; id genus nō multo inualidiorem obtinet. Radice est candida pollicis crassitudine, succosa, in arenam alijs defossaculis multis, bipedalibus, furculosis, rectis: folijs Hederæ, læuibus, mollibus, pallidis: flore quoque albo. Succo lacteo tota planta manat. Quomodo Scammonia succus, cuius usus est, sit colligendus, & syncerus ab adulterato secernendus docet Dioscorides. Colligitur succus capite radice ablato, & ipsa in fornicis formam excavata: confluit enim in ipsam succus, qui conchis de mum excipitur. Alij effosa ad testudinis formam terra, & substratis nucis folijs succum excipiunt, & siccatur extrahunt. Quod ab Orbasio sic declaratur. Alij scrobes in terra mortarij instar effodiunt (*ῥυφὸς δὲ* legit, non, *ῥυφὸς*, id est, instar fornicis) in quos substratis nucis folijs radices abradentes, liquorem effundunt, atque ita siccatur extrahunt. Probatum

qui pellucidus est (*λευκός*, Ruellius ex Plinio, nitidum vertit) leuis, taurini colore, foramina tenuia habens, spongiosus. Talis est qui ex Mysia Asia adfertur. Nec verò solum attendere oportet, si ad tactum linguæ albescat: hoc enim euenit etiam admixto ipsi Tithymali succo, sed magis considerandæ sunt prædictæ notæ: etsi non vehementer linguam exurat, id quod etiam Tithymalo admixto solet contingere. At Syriacus & Iudaicus pessimi sunt, graues, densi, Tithymalo & erui farina adulterati. Scammonij historiam paulò aliter tractauit Plinius. Radix circa

Lib. 26. c. 8.



Canis ortum excuatur, vt in ipsam conflua succus, qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur natione Colophonium, Mysium, Prienenſe: specie autem nitidum, & quàm simillimum taurino glutini, fungosum tenuissimis fistulis, citò liqueſcens, virus redolens, gummosum, linguæ tactu lactescens, quàm leuissimū, cū diluitur albescens. Hoc euenit & adulterino, quod fit erui farina, & Tithymali marini succo, in Iudæa ferè, quod etiam strangulat sumptum. Deprehenditur gustu, Tithymalus enim linguam exalfacit. Quod Scammonium Dioscorides spōgiosum, Plinius fungosum dixit. Præterea citò liqueſcēs, virus redolens, gummosum, linguæ tactu lactescens, cū diluitur albescens, Dioscorides inter bonitatis notas nō recenset. Hic adulterari erui farina, & sine discrimine Tithymali cuiusvis succo, ille Tithymali marini tantū succo retulit, atque quod adulteratum sit, sumptum strangulare, quod Dioscorides non habet. Scammonij facultates nunc sunt explicandæ primū ex Dioscoride. Succus drachmæ Li. 4. ca. 16. vnius, aut obolorum quatuor pondere haustus ex aqua, aut aqua mulsā, purgat per Vires. inferna pituitam ac bilem. Verū ad aluum soluendam oboli duo cum Sefamo, aut alio semine sumpti sufficiunt. Dantur etiam ad efficaciorē purgationē succitres oboli, Ellebori nigri oboli duo, & aloës drachma vna. Fiunt etiam sales purgatorij drachmis viginti succi Scammonia ad sex salis cyathos adiectis. Horū modus est proportionē viriū, integer cochlearia tria, mediū duo, minimus vnum. Purgat & radice drachma vna, aut dua, cum iis quæ dicta sunt. Quidam decoctū ipsius bibunt. Cocta cum aceto, & trita cum farina hordeacea iſi hiadicis fit cataplasma. Succus necat partus in lana vtero appositus. Tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. Coctus autem in aceto, & illitus, lepras exterit. In diuturno capitis dolore cum aceto & rosaceo caput ex eo irrigatur. Qua de re ita Plinius scri- Lib. 16. c. 8. psit. Scammonium quoque stomachi dissolutionem facit, bilem detrahit, aluum soluit, præterquam si adiciantur aloës drachmæ dua obolis eius duobus. Et mox, Bulbi more, nec antè, nec post vtile (vetus quidā codex habet, vsus bimo, nec antè, nec postea vtile. Alius verò: Bimatu, nec antè, nec post vtile: quæ neque ad Bulbum referri possunt, neque Bulbus ad Tithymalum, de quo modò dixit linguam exalfacere.) Dedere & per se ex aqua mulsā, & sale, quaternis obolis. Sed vtilissimè cum aloë, ita vt incipiente purgatione mulsū bibatur. Fit & decoctum radice in aceto ad crassitudinem mellis, quo lepræ illinuntur, & caput vngitur in dolore, cum oleo. Dandi Scammonij, ac sumendi modus longè apertius à Dioscoride quàm à Plinio hic traditus est. Deinde, Scammonio rosaceo & aceto diluto, in vetusto capitis dolore Plinio caput vngitur, Dioscoridi irrigatur, ac perfunditur, qui nec tradidit vsum bimo esse, nec antè, nec post vtile. Certè Mesues viginti annis seruari ait. Galenus Scammonia in simplicium catalogo nō meminit. Paulus verò Scammoniam scribit calfacere, discutere, & biliosa extergere, magisq; eius liquorem, qui iam & phymata dissipat, fortis appositus corrumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cum oxyrrhodino superfunditur. Radix tum ipsa, tum decoctū eius potum purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur. Et alio in loco. Scammonia perinde ac Veratrum purgat, magis Lib. 7. ca. 4. fluam bilem. Cæterū inter omnia quæ purgationes moliuntur, aduersissima stomacho est. Datur igitur iis qui febre carent, & stomacho sunt meliori, ad pondus quatuor obolorum cum sale, aut pipere, aut zinzibere, aut quodam stomacho vili, quod protinus corpus permeat, aut etiam cum melle: item cum gummi quoq; sunt cataporia. Theophrastus, τῆς δὲ σκαμμωνίας, inquit, ὁπότες μόνον χρησιμὸς, ἄλλο δὲ Lib. 9. hist. cap. 22. non est. Id est, Scammonia succus tantū vtilis est, & nihil aliud. In his quæ à veteribus de Scammonio produntur, duo sunt expendenda: eius delectus, & in purgationibus dosis. Laudant enim illi leue, pellucidum, colore quàm simillimum



taurino glutini. At vulgare nostrum squalidum est, & cineritio colore, & aspectu tristiore: quia non succus, aut liquor manans, aut lacryma Scammonia ad nos adfertur, sed succus vi expressus. Scammonia lacrymam, quam Venetiis apud Albertum Martinellum vidit Pena in Syriacis conchis allatam, Colophoniam concolorem, concretionem simili, ex fusco caruleam fuisse ait, cuius coloris non est Scammonium nostrum. Sic differt Meconium ab Opio, quod est manans liquor, seu lacryma Papaveris, flaua & limpidior. Verum cum pura ac mera lacryma Scammonia tam frequenti vsui non sufficeret, succum multum vi expressum ad nos asportari oportuit: cuius maximè delectus habendus, quia nullus nisi variè adulteratus ad nos adfertur. Nam aliquando ex eodem corpore, eadem morbi causa, & eodem planè modo affecto, grana aliquot sumpta facile, & sine vlllo cruciatu, & bilem pituitamque expurgabunt, ex eadem prorsus gleba frusto paruo effracto multò plura grana sumpta minùs euacuabunt, nec sine molestia, & cruciatu. In causa est dissimilis molis concretionis, quæ hic plus, illic minùs, aut lactis Tithymali, aut Lathyridis, aut alterius stirpis valentioris succi accipit: vnde dissimiles purgationes consequuntur. Cum autem veteres, aut drachmam, aut quaternos obolos, aut maiorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum imperant.

## CHAMELÆA.

## CAP. XI III.

## Nomina



AMEAIA Græcis & χαμελαία, Latinis etiam Chamelæa, & Oleago, Oleastellus, Mauritanis Mezereon, & Almezrion, Provincia libus Garoupe. Chamelæa autem, id est, humilis Olea, vel Oleago, vel Oliuella dicta est, ob eam quam cum Olea sortita est similitudinem. Chamelæa, ut tradit Dioscorides, frutex est furculosus, ramis dodrantalibus, foliis Oleæ, sed tenuioribus, dēsis, amaris, quæ gustum mordent, & arteriam deradunt.

Li. 4. c. 166.

Forma.

Lib. 15. ca. 7.

## CHAMELÆA, Matth.



Lib. 24. c. 15.

Lib. 3. hist. cap. 37.

stri baccisq; Quo in loco pro saxoso, foralis legendum furculoso, vel sarmentoso: est enim Dioscoridi frutex φρυγανώδης, nam reliqua, ut Dioscorides, etiam Plinius habet: & præterea baccas & oleum. Eadem repetit Plinius alio in loco. Chamelæa similitudinem foliorū Oleæ habet. Sunt autem amara, odorata in perosis, palmum altitudine non excedente. Matthiæus Chamelæam & Thymelæam copiose in vallis Ananiæ montibus, & Tridentino agro prouenire scribit, & vtramque fructum ferre Myrti baccis similem, qui tamen Chamelæa longior sit quadantenus, & oliuæ formam referat. Vtrique initio virefcit, mox per maturitatem rubescit, denique exsiccat niger conspicitur. Dodonæus, Chamelæa, inquit, in Italia & Gallia Narbonensis incultis, asperis & desertis reperitur, humilis & fruticosa stirps, pedalis, aut altioris magnitudinis, multis ramulis virgulis ramosa, foliis oblōgis, Oleæ similibus, sed minoribus & nigrioribus: flores ex aliis foliorum exigui, sublatei: fructus inde





triccoci, ut in Tithymalo, & Lathyri, primum virides, deinde rubentes cum maturuerunt, qui decerpti nigrescunt, oleosamque pinguitudinem contrahunt oleazum instar, sapore acres & mordaces, faucisque exurentes, veluti folia & cortex, obscuris duris lignosis, piperi similibus: radix lignosa. Huic Chamelææ aliam addit Pena, quam Chamelæam Alpinam incanam vocat, superiori valde similem gustu, facie, viribus: foliis & virgultis ligneis, gracilibus, concoloribus, rugoso cortice amictis, quæ tamen ab illa facile discerni possit, fructu nimirum Mezerei Germanici, Oleastri, aut Philyræ, non tricocco, & foliis summis non ex atro virentibus, sed tenui, mollique & incana lanugine obductis, quemadmodum & florentibus, sed tenues, argenteis, Stramonii similibus, sed minoribus conspiciuntur. Commanducata, non secus ac Mezerei Germanici, grana fauces exurunt: ideoque etiam plebs rusticum piper vocat. Manducata folia lentorem remittunt, uti Sardanella, Thymelæa, & Chamelæa Narbonensium. E Lemani & Allobrogum vicinis Alpibus solum habuisse ait. Chamelæa folia pituitam & bilem purgant per inferna, auctore Dioscoride, præsertim in cataportia deuorata: ita ut dum absinthij cum vna Chamelææ parte misceatur, & hæc aqua aut melle excepta fuerint, per aluum egeruntur. Iisdem foliis tritis & melle exceptis sordida & crustosa vlcera repurgantur. Plinius, Chamelæa, inquit, aluum purgat: detraheo cum melle potio. Folij impositis & vlcera purgantur. De eadem breuiter hæc Galenus. Chamelæa vincentem habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum sordida vlcera, & maxime quæ crustas habent, commodè purgare potest.

Vires &amp;

Temper.

Li. 4. c. 166.

Li. 24. c. 15.



Nomina



RAECIS θυμέλας, sic & Latinis Thymelæa nominatur. Quæ appellatio effigiem naturamq; plantæ quadantenus adumbrat. Videtur enim Thymelæa quasi Tithymelæa dicta, ex Tithymali & Olea mixta facie. Arabes etiam *Mezerion* vocant, eam cum Chamelæa confundentes.

THYMELÆA, Matth.

*Agrostis ab ἀπό α  
ἀδ λίαν ἐναγ  
α ἐνα νυμ ἐν ἄ  
ἐν ἴσιν qui ἐν  
ἐν ἴσιν.*

Forma.

Lib. 4. c. 167.

Locus.

Lib. 13. c. 21.



THYMELÆA, Dodon.



Eius semen κόκκος κνίδιος, id est, granū Cnidium dicitur, Eubœenses Apolinum vocant, alij Linum, quod satiuo Lino frutex hic similis sit. Faluntur qui Granum Cnidium Chamelææ fructum esse putant, foliorum similitudine decepti. Virgas producit longas, vt describit Dioscorides, multas, bicubitales: folia Chamelææ similia, sed angustiora & pinguiora, viscoli & glutinosa dum māducātur: flores albos, & inter ipsos fructum Myrti baccæ modo paruum, rotundum, initio viridem, tandem rubentem, cuius fructus inuoluerum durum est & nigrum, intus album. Nascitur in asperis & montosis locis. Plinius breuiter hæc complexus est. Eri quo nascitur Granum Cnidium, quod aliqui Linum vocant, fruticem verò Thymelæam, alij Chamelæam, alij Pyros achnen, alij Cnethum. Est similis Oleastro, foliis angustioribus, gemmiosis si mordeatur, Myrti magnitudine semine, colore, & specie farris, ad medicinam tantum vsus. Quæ mendosa sunt, & ex Dioscoride sic corrigenda, Myrti magnitudine, semine Chamelææ & specie foris. Thymelæam cum Chamelæa in Ananiæ montibus & Tridentino agro copiose nasci scripsit Matthiolus, vt supra diximus. Eius Thymelæam hic appinximus. Mezerion quidem ille Germanicum potius, eiusque semen, piper rusticum seu montanum appellatum, quam Thymelæam veram cuiusque Granū Cnidium nobis proposuit. Genuinam Thymelæam descripsit Dodonæus in Histo. Stirp. cuius iconem hic posuimus. Felicius prætam dedit in Histor. purgantium: item Clusius, qui eam acuratisimè delineauit his fere verbis. Thymelæa frutex est pollicari interdum crassitudine, cubitalis, aut amplior, qui in multas virgas diuiditur cubitales, pulchras, tenues, rectas, quas vestiunt perpetuò virentia folia, Linum, iora & latiora, mucronata, non cuspidata, vt in Chamelæa, neq; ita fragilia, sed lentiora & gummosum quid præbentia, si dentibus arantur. Flores fert in extremis virgis, candidos, Oleæ fere similes, quatuor foliolis constantes copiosos, racematim fere propendentes, deinde fructum



THYMELAE A vera Clus.  
Dodon. Hist. purgant.



fructum baccarum Myrti interdū magnitudi-  
ne, oblongiorē paulō, per initia virentem, cum  
maturuit rubrū corallij modo, carne succi ple-  
na & aquosa vt in Cerasijs, sub qua latet vnicū  
femen, nigra fragilique pellicula, albam & ferui-  
do gustu medullam continens. Radix lignosa  
& dura, in teneris plātis Raphani modo effor-  
mata, & crasso cortice tecta, lentōque & admo-  
dum tenaci, quemadmodum & tota planta. Flo-  
ret Iulio, & toto ferē Autumno, deinde semen  
profert. Nasceitur locis asperis per totam ferē  
Hispaniam, & plerisque Gallia Narbonensis.  
Quod Pericarpium dixit Dioscorides, non to-  
tius baccæ rubentis inuolucrum intelligit, sed  
inuolucrum seminis in bacca conclusi, cuius  
seminis medulla alba est, & in ea feruor ille que  
situs in grano Cnidio. Que, eodem Dioscoride  
auctore, per inferna bilem, pituitam, & a quas  
purgat, si viginti granorum interna pars biba-  
tur. Verū fauces vrit. Quare cum farina aut  
polenta dari debet, aut in vna acino, aut melle  
cocto obducto deuoranda. Eadem trita cum ni-  
tro & aceto illinitur iis qui egre desudant. Fo-

Li. 4. c. 167.

Vires.

lia, quæ peculiariter Cneoron vocatur, circa messē colligi debent, & in vmbra  
siccata repōni. Qui dare volunt tundere debent, & nervos eximere. Purgat ex ipsis  
acerabuli mensura vino diluto inspersa (legendum enim ἐπιπασσόμενον, non ἐπι-  
πασσόμενον, vt habent exemplaria multa, quæ secutus Ruellius vertit, illitum). Sed  
moderatiū purgat mixta cum lente cocta, & tritis oleribus. Eadem folia trita cum  
vua acerba succo in pastillos redacta reponuntur. Herba stomacho infesta est,  
partis apposita necat. Cocco Cnidio, inquit Plinius, color corni, magnitudo gra-  
no piperis maior, vis ardens. Itaque in pane deuoratur, ne aduat, cum gulani tran-  
sit. Huic vis præsentanea contra cicutam. Siftit aluum. Quæ ex Theophrasto sum-  
pta sunt. ὁ δὲ κνίδιος κόκκος τρογγύλον, ἐρυθρὸν τῇ χροίᾳ, μέτῳ δὲ τῷ πεπεριῳ, ἰσχυρότερον  
ἐκ πολὺ τῇ θερμότητι. Διὸ καὶ ὅταν διδῶσι καὶ αὐτὸν (διδῶσι γὰρ πρὸς κοιλίας λύσιν) ἐν  
αἵματι καὶ τῷ περὶ πλάτους. καὶ γὰρ ἄλλως τὸν φάρμακον. Id est, Granum Cnidium ro-  
tundum est, colore rubrum, maiusq; pipere, sed multo validiore caliditate. Quare  
in potu dantes (exhibent verò ad aluum soluendā) pane aut farina subacta obdu-  
endum id præbent: alioqui enim id fauces adurit. Quod hic exhiberi ad aluum sol-  
uendam vertimus, Plinius sistere aluum non rectè videtur dixisse, cum granum id  
esse & adurentis facultatis. Attentiores in eo loco Plinij legunt: Ciet aluum. My-  
conus herbaria rei studiosissimus fruticem & eius iconem ex Hispania misit, quæ  
Thymelææ speciem esse suspicatur. Frutex hic passim in locis siccis & siluis nasci-  
tur, inquit, maximè in quercetis, altitudine cubitali, ramosus, & circumquaque ra-  
mosos diffundens. Folia eius minima sunt, Myrto similia, sed minora: flos luteus  
minutus, ab ea folij parte, qua caulem attingit, nascens, vt in Chamæpity: radices  
lignosæ, præsertim superiore parte, cortice è nigro rufescente, crassitudine polli-  
ci, non altius in terram demissa, sed per summum cespitem diffusa, flexiles, gu-  
sta valde ingrato, cum acrimonia amaro, & fauces abradente quemadmodum  
Thymelææ Dioscoridis. Totius fruticis odor grauis est, & sapor insauis. Totus  
etiam

Lib. 27. c. 9.

Lib. 9. hist.

cap. 22.

Lib. 7. iiii.



THYMELÆÆ species,  
Myconi.



si mordeantur, & gustu amaro, deinde admodum acri & adurente: flores luteofructu Oleæ similes, oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteofructu Thymelææ ferè, sed nigricante: radix crassa, lignosa. Frequens est in regno Valentino & Granatensi. Martio & Aprili floret. Illic ab Herbariis Sanamunda vocatur, à rusticis *Mierda-cruz*, propter purgandi facultatem, cuius causa rusticis eius regionis apprimè in usu est. Hæc Clusius.

SESAMOIDES. CAP. XVI.

Nomina

Vide sub pag. 400.

Li. 4. c. 147.

Forma.

Locus.

Li. 22. c. 25.

Idem.

Li. 4. c. 147.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

Li. 22. c. 25.

ΣΗΣΑΜΟΕΙΔΕΣ μέγα, & σμικροειδές μικρόν Græcis, Sesamoides magnum, & Sesamoides paruum Latinis, à seminis similitudine dicuntur. Sesamoides magnū, quod in Anticyra Elleborum, vel, ut ait Theophrastus, Elleborinen vocant auctore Dioscoride, quia in purgationibus Elleboro albo miscetur, herba est similis Senerioni aut Ruta: foliis longis: flore albo: radice gracili, inefficaci: semine sesamo simili, gustu amaro. Sesamoidi paruo, quod album vocat Galenus, cauliculi sunt palmi altitudine, folia habentes Coronopo similia, bitutiora tamen & minora. In summo cauliculorum capitula sunt flosculorum subpurpureorum, medio eorum albo, in quibus semen sesamo simile, amarū, folium: radix tenuis est. Nascitur in asperis locis. De quo hæc Plinius. Sesamoides à similitudine nomen accepit, grano amaro, folio minore. Nascitur in glareosis. Deinde de altero. Est etiamnum aliud Sesamoides Anticyræ nascens, quod ideo aliqui Anticyricon vocant: cætera simile Erigeroti herba. Sesamoidis magni semen, ut docet Dioscorides, purgat pituitam & bilem per superna, quantum tribus digitis capi potest tritum, & sumptum cum Ellebori albi sesquibolo in aqua mulla. Potui item semen purgat bilem & pituitam per inferna acetabuli mensura potum cum aqua mulla. Idem impositum cum aqua tubercula & tumores discutit. Eadem res tribus Plinius habet. Granum Sesamoidis datur in vino dulci ad detractiones, quantum



tribus digitis capitur, miscētque Ellebori albi vnum & dimidium obolum, purgationem eam adhibentes maximè infania, melancholia, comitialibus, podagris. Et per se drachmā pondere exinanit. Et Sesamoides paruum detrahit bilem in aqua potum. Semen illinitur igni sacro: discutit panos. Galenus, Sesamoides magnū, inquit, quod & Anticyricus Elleborus appellatur, quia semen eius vt Elleborus purgat, hoc & reliqua facultate Elleboro similis est. Nam & in abstergendo, exaltaciendo, desiccandōque similem illi vim obtinet. Sesamoidis albi semen vehementer amaram qualitatem continet, non solum mediocrem. Calfacit itaque, rumpit & extergit. Herbas istas catharticas Herbarij sibi ignotas esse fatentur. Pena tamen suspicatur Hormalam Syriacam in odoratis depictam ex Lobellio Sesamoides maius esse. Matthiolus verò Sesamoides minus ostendit, quod Cortuso acceptum refert. Pei multi opinantur Sesamoides maius esse eam

Lib. 3. sim.

In cap. 147.  
lib. 4.

**SESAMOIDES** maius  
multorum, Dalech.



herbam, quæ in tota ora Massiliæ & Liguria, Corsica ac Sardinia gignitur, illicque vernacula lingua *Tartouaire* appellatur. Fruticosa est, pe de non altior, radiculis subflauis, gracilibus, tenuibus, si totam plantam spectes, superuacuis: ramis multis, rotundis, densa lanugine villosis, furculosis: foliis Rutæ simillimis, numerosis, hirsutis, candidis: flore in summis ramis copioso, exiguo, candido, densius congesto, intra lanuginem delitescente: semine paruo, nigro, gustu tam feruido, vt si quis herbam mandat, diutius ardere fauces videantur, tam pertinaci vredine, vt nulla oris collutione deleri possit. Minor sane est in Chamelæa, Thymelæa, Laureolæque generibus acrimonia, ac vrendi vis, quàm in hac planta. Hodie impostores, ac quidam ignari quātum malefica sit huius plantæ vis, & corporibus nostris noxia, ex vino albo, vel cicerū decocto, vel elixæ carnis iusculo bibendā propinant drachmam vnā vel alteram, in validissimis naturis, tanta purgandi potestate, vt sæpe ob hypercatharsim sanguis erumpat. Educt autem sic sumpta biliola, pituitosa, aquosa,

id quod & Dioscorides testatur: vt mirum non sit, in Anticyra dictum olim fuisse Elleborum, admisceriq; solitum potionibus ex Veratro albo paratis, vt facilius & citius Veratrum, quod vomitiones magis ciet quàm deiectiones, aluum commo- dius detraheret. Hoc fortasse Elleborum est, quod fructum Sesamo similem edere Theophrastus scripsit, quo in Anticyra purgationes fiebant. Quanquam non solum fructu, sed etiam radice vtile esse scribit: quod negat Dioscorides, qui radicem *ἀντικυρίαν*, id est, imbecillem, siue ignauam esse dicit, seminique purgandi vim tribuit, quam etiam foliis & ramulis inesse experientia docuit. Planta hæc Clusio est Sanamundæ tertium genus, Cortuso Erica Alexandrina, Alfonso Pautio Cneo- rum. Thymelææ congenerem esse, & iisdem facultatibus pollere putat Clusius. Plantam alteram hic etiam depictam Sesamoides minus quidam nominant, non ad Dioscoridis quidem historiam referentes, sed ad eam quam cum superiore comparationem habet originis, saporis, facultatis cathartica. Quidam Phacoides volunt esse Oribasij, ob foliorum cum Lente similitudinem. In maritimis, vt & alteram prouenit, sed Corsicæ magis quàm Galliæ, Liguriæ ve: caule pedali, in ramulos pluri



los plurimos & graciles diuiso, lanugine molli vestitos superioris modo: foliis numerosissimis, minimis, latius virentibus, Lenticulæ similibus, circa ramos densissimè coaceruatis, vt ramorum conspectum adimant, Aizoi acris specie: flore copioso, tenui, candido, per totos ramos foliis intersparso, suauissimi odoris, nec moscho dissimilis, & quasuis acres plantas superantis. Purgat, & eodem humores educit quos Sesamoides maius, sed laboriosius, præsentiorèque

*SESAMOIDES minus,*

*Dalechampij.*



*SESAMOIDES minus,*

*Matthioli.*



nimiæ vacationis discrimine. Eius tusæ ac cribratæ drachmam pisanæ immixtam sorbendam dedit Dalechampius cuidam neruorum distentionibus laboranti Lugduni in publico valetudinario, cui non segnius alius deturbata est, quam si colocinthidem sumpsisset, restitutaque sanitas. Sesamoides minus à Matthiolo possumus Pena approbat, scribitque optimè Cyanis comparari. Folia enim prorsus sunt Cyani parui, incisura & ortu Coronopi, hirsutiora, magis frequens est: flores radiati, prorsus Cichorij concolores & similes superne, subtus capitula ex squamulis compacta Cyami aut laceæ modo habentes: semine interius Sefami: radice Tragopogoni, exiliore. In Narbonensi agri squallidis collibus, etiam herbis ad Ladum copiosè prouenit hæc planta, atque etiam in Longobardia. Huic Matthiolus non rectè Phalaridis flores & capitula affinxit. Hæc ex Pena. Quidam Catanancem priorem esse putant.

EMPE



**E**MPETRON Græcis, & φακοειδὲς dicitur, Latinis Empetrum & Phacoides, & Calcifraga Plinio. Id non descripsit Dioscorides, sed dixit tantum in maritimis & montosis nasci, gustu salso, quod verò propius terreno provenit, amarius esse. Purgat pituitam & bilem, & aquas, si in iure aliquo, aut aqua mullâ exhibeatur. Eadem prorsus Plinius tradidit. Empetron, quam nostri Calcifragam vocant, nascitur in montibus maritimis, ferè in saxo: quo propius mari fuerit, minus salsa est (Deprauata hæc in vulgaris codicibus lectio, sic corrigenda, quæ propius mari fuerit, salsa est) potaque bilem trahit ac pituitas: quo longius magisque terrena, amarior sentitur. Trahit aquam. Sumitur autem in iure aliquo, aut in hydromelite. Galenus scribit Empetrum ad solas purgationes esse utile, bilem ac pituitam educens, gustu salsum esse, quare ad alia quoque vti licere, ad quæ pollet substantia salsa: item nominari Phacoides. Idem planè Aëtius & Paulus ex Galeno exscripserunt, ut vox phacoides vel in Dioscoride, vel phacoides in aliis meritò suspecta sit. Addit Paulus, quia salsum est, exurgendi vi præditum esse. Cum verò Dioscorides, Galenus, atque alij Græci medici ipsos sequentes scribant Empetrum ad purgationes tantum utile esse: Plinius contra his quæ modò citauimus subiiciat, verustate vires perdere, recens vrinas ciere decoctum in aqua vel tritum, calculosque frangere, & qui fidem promisso huic querunt, affirmare lapillos, qui subferuehant vnâ, rumpi: perspicuum est eum, alterum Empetrum Saxifragum dictum cum maritimo Empetro confudisse. De quo Saxifrago, siue Empetro altero, caput extat in multis excusis exemplaribus Dioscoridis, cui calculos vesicæ frangendi, & vrinas ciendi vis tribuitur: quanquā caput hoc inter Dioscoridis notha & adscititia à peritis herbariis referatur. Præterea ex iisdem Græcis auctoribus colligere licet sceniculum marinum, siue Herbam Sancti Petri, Empetrum non esse, hoc loco descriptum, quod quidam credidere: quia ei nulla bilem purgandi, pituitamque facultas inest. Quare diuinare potius, quam certò statuere licet, quæ planta legitimum veterum Empetrum asseri possit. Si tamen cōiecturæ locus sit, Dalechampius Empetrum esse opinatur plantam, quæ à vulgo Narbonensiū Herba terribilis vocatur, cuius capite de Alypo mentionē faciemus, ob violentam in corpore purgando facultatē. Ea nunc in ipso maris litore provenit salsum humorē bibente eius radice, ac tum salso gustu est, ut cæteræ plantæ, quarū radix marinā aquam fugit: nunc in montibus mari vicinis, ut in monte Cestio, vulgò Cap de Ceste prope Agatham, nullo maris succo imbuta, sed tantū obie-



ta eius afflatui, ac tum saluginis experts, gustati perquā amara sentitur. Cubiti est magnitudine, & eo maior, cortice purpurascēte, ramosa, folio Lētis, sed Lētis modo per aequales versus nō disposito, per ramos & surculos nullo ordine prodeūte, supernè viridi, infernè candicante, capitulis in ramorum vertice purpureis & rotundis, Aphyllanthi non dissimilibus. Purgandi vim habet Sefamoide utroque non imbecilliorē. Purgat autē bilem, pituitam & aquas non aliter, quam Tithymalus.

Ccc

califraga quas colas

Nomina ob uen quo pollet

Locus.

Vires.

Lib. 27. c. 9.

PETRON est lapi saxo

EMPETRON qu. in petro

et lapi saxo proveni

Lib. 6. sim. hinc EMPETRON

nomen habet

phax, et lens

phacoides, lens simil

Herbina c. cal. car. ligo  
 Ray pag. 102a



Nomina



ΚΥΣ ἄγριος, Cucumis silvestris Latinis dictus est, & Cucumis erraticus, & anguinus, Officinis Cucumis asininus, Arabibus Chete allimar, Kather, seu Cheta alhamar, Italis Cocomero saluatico, Germanis Wilder cucumern, & Efele cucumern, Hispanis Cogombrillos amaragos, Gallis Coucombres sauvage.

Li. 4. c. 149.

Forma.

silvestrem tradit Dioscorides solo fructu distare à satiuo Cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmenta satiu referre: radice candida, magna.

CUCUMER agrestis,  
Matthioli.

stems, vel bixeros  
forte bixeros, inu:  
candus propter int:  
pider saporem



signari nemo est qui non aperte videat. Is flagella per terram spargit, bicubitalia, minimi digiti crassitudine, rotunda, breuibz aculeis aspera, solida, & anguium modo inflexa. Folia edit ex longis, crassis, & aculeatis pediculis pendencia, in obtusum mucronem desinentia, superne viridia, inferne pallidiora, & crebris intricatisque venis, rugosa, utrinque aspera: flores tota æstate ex foliorum alis, quinque, latis, acuminatis, & flauis foliolis constantes, quosdam steriles, quosdam fecundos. Steriles terna intus trifida veluti complicata, & per ambitum crocea, nec hirsuta stamina habent, nullumque posteriore parte capitulum, futuri fructus rudimentum. Fecundi in medio ternas hirsutas & flauas furculas staminum vice continent: retro hirsutum & oblongum extuberat tuberculum, quod flaccescēte flore paulatim cum pediculo accrescit, donec maximæ glandis magnitudinem superauerit, quod vndique breuibz aculeis armatur, & in maturitate cum spoldere gliscere, & candicare, vel pallefcere coeperit, sponte sua, aut leuiter tactum ex pediculo exilit, & cum impetu oblonga, foris nigra, intus candida semina cum aqueo succo ei aculatur. Radice nititur crassa, rotunda, carnosa, rapo oblongo haud abinili, radiculis multis huc & illuc dispersis. Tota planta vehementer amara est, quæ etiam fertim fructus amarissimus, sola seminis medulla dulcedinem habet, quæ etiam mures alliciat, inquit Cordus. Quare miratur Galenum huic semini amarum saporem tribuere, quod fortasse tantum corticem seminis degustauerit, qui amarus est, non ipsum nucleum, qui propriè seminis appellatione venit. At falso Galenum à Cordo reprehendi Matthiolus arbitrat, quod nusquam scripserit Galenus Cucumeris silvestris semina amara esse, sed Cucumerum semina quædam amara esse, quemadmodum & amygdalæ: nec diserte dixisse Galenum aut satiu aut silvestris Cucumeris semen quandoque amarum reperiri, conicere tamen ex contextu facile esse de satiuo semine intelligere, & lectores admonere voluisse huiusmodi seminum nucleos, qui natura dulces sunt, aliquando soli in quo nascuntur vitio amaros effici. Nascitur Cucumis silvestris in sabuletis, ac rudibus: eligitur in Gallia Narbonensi & Hetruria frequens. Frigidioribus locis feritur in hortis ab Herbariis. Augusto mense floret. Autumno fructum producit. Instillatus foriorum succus aurium dolori conuenit, inquit Dioscorides. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina tuberculo

Locus.

Tempus.

Li. 4. c. 149.

Vires

Temper.

ab Herbariis. Augusto mense floret. Autumno fructum producit. Instillatus foriorum succus aurium dolori conuenit, inquit Dioscorides. Illita ex polenta radix veterem omnem tumorem discutit. Imposita cum resina terebinthina tuberculo



cula rumpit. Ischiadicis infunditur: podagras discutit decocta ex aceto & illita. Eius decocto dentes in dolore colliuntur. Arida farina impetiginem, lepras & vitilignes absterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus seliquioboli pondere, item cortex acetabuli quarta parte, bilem puitamque deiiciunt, praesertim in hydropicis: deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. Radicis selibra in vini, praesertim Lybici, hemina contetur, danturque ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur. Quae postrema sententia sic legitur in vetere codice. Δεξ δὲ τῆς ῥίζης λαβόντα ἡμύβραν μὲν δυοῖν ξεστῶν ὀνύχων, μάλιστα ἀγυπτιῶς γλυκείας, λαβεῖν, καὶ διδόναι ἐκ τούτων καὶ θύσους, γνήσιον ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἕως ἂν ὁ ὄγκος ἰσχυρῶς συσταλῇ. Id est, cum selibram eius acceperis, oportet eam lauigare cum binis sextariis vini dulcis, praesertim Aegyptij, propinareque ex ipso tres cyathos ieiunio trium dierum spatio, donec abunde tumor ipse subsidat. De foliorum & radicis usu medico, idem quod Dioscorides Plinius aperte tradidit. Radix ex aceto cocta podagris illinitur, succoque dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quae psoram & lichenas vocant, parotidas & panos sanat, & cicatricibus colorem reddit. Foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Sed in his quae de Elaterio scripsit, a Dioscoride dissentit. Cucumin siluestrem esse diximus, inquit, multo infra magnitudinem satui. Ex eo fit medicamentum, quod vocatur Elaterium, succo expresso ex semine. Quae in re Plinius Theophrastum secutus est: scribit enim καὶ τὸ σπέρμα τῆς ἀγροῦς τὴν μὲν ῥίζαν ἀλφειῶς καὶ ψάρας βοσκήμασι (legendum, ἀλφειῶς καὶ ψάρας βοσκήμασι, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ σπέρματος, &c. Est enim id, quod Dioscorides ante dixit. Ἐν τῇ δὲ λέξει ῥίζα ἀλφειῶς, λέπτειν καὶ λείψανον σημαίνει, nulla facta pecudum mentione) τὸ δὲ σπέρμα καλεῖται ἐν ποταμῷ τὸ ἐλατήριον. τίλλεται δὲ τὸ φθινόπωρον, τότε γὰρ βέλιον. Id est, Cucumeris silvestris radix vitiliginem & scabiem sanat. Ex semine verò succo expresso fit Elaterium. Legitur Autumno: tunc enim melius. Dioscorides verò ex fructu Cucumeris elaterium fieri docet, ut simul etiam quod in ipso carnosum exprimitur. Deinde quod scripsit Dioscorides. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam cribratos cineres humi inspergant, & medium cauantes triplicatum lintheum obfundunt, per quod Elaterium cum sua humiditate diffundatur, siccatumque in pila conterunt, Plinius non satis expressit. Semen quoque, inquit, cinere conspergitur, ad coercendam succi abundantiam, qui expressus suscipitur aqua caelesti, & subsidit, deinde sole cogitur in pastillos ad magnos mortalium usus. Paulo post de Elaterio, Nec vllum, inquit, ex medicamentis longiore tempo durat. Incipit à trimatu. Si quis recentiore uti velit, pastillos in nouo fictili igne lento in aceto domet. Melius quo vetustius: finitque iam ducentis annis seruatum, ut auctor est Theophrastus, & usque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguunt hoc enim veri experimentum est, si ad motum, priusquam extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Locus Theophrasti, quae Plinius citat, is est πάντων ὁ δὲ τῶν φαρμάκων πλεονέχων διαμένει χρόνον ὅ ἐλατήριον, καὶ τὸ παλαιότατον ἀριστον. ἰατρὸς δὲ τῶν φαρμάκων οὐκ ἀλλοτρίων, ὅδε ψάρας ὡς ἐν παρ' αὐτῶν διακοσίων ἐτῶν, θαυμαστὸν δὲ τῇ διουσίᾳ, διδοῦναι ὅ τινα αὐτῶν δῶρον. ἄλλα δὲ τῆς χρονιότητος ἡ ὑγρότης. διὰ γὰρ ταύτην καὶ ὅταν ἀρρώστῳ τιχέαισιν εἰς τέφραν ὑγρὸν, καὶ ὅδε ὥς ξηρὸν γίνεται, ἀλλ' ἀχρησθέντα ἐτῶν σέξεν, οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἀλλὰ παραμένοντες τὸν χρόνον. (non αὐχμύς, ut in vulgatis exemplaribus legimus) φασὶ δὲ αὐτὸν μάλιστα ὑπερμενένον ἐννοεῖν τῶν φαρμάκων (non ὑπὲρ ἴσων, ut habent vulgati codices) αὐτῇ μὲν οὐκ ἰδιότης τῆς δυναμείας. Id est, Omnium quidem in vniuersum medicamentorum maxime diuturnum est Elaterium, & quod vetustissimū optimum. Itaque medicus quidam, vir haud gloriosus neque mendax, sibi esse Elaterium ducentorum annorum dicebat, virtute mirabili, donatum à quodam. Diuturnae confer-

Lib. 20. c. 11.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Lib. 9. hist. cap. 14.



uationis est humoris copia: eam enim ob causam etiam cum triuerint, in cinere humidum reponunt, ac ne sic quidem siccatur, sed usque ad quinquagesimum annum lucernis admotum eas extinguit. Aiunt autem solum hoc ex omnibus medicamentis maximè purgationem immodicam per superiora efficere. Hæc igitur eius medicamenti propria vis. In his Theophrasti verbis Gaza hæc prætermisit, *φασὶ δὲ μόνον μάλα ἐπιτελεῖν ἀνὰ τοὺς πόρους τοῦ σώματος*. Est autem *ἐπιτελεῖν*, ὁ ὑπερκενθρῶς *μῆκος ἀνθρώπου*, ut Galenus in Glossis Hippocraticis exponit. Dioscorides Elaterium scribit à bimatu ad decennium deiectionibus vtile esse. Theophrastus id mirabili virtute ducentis annis seruatum esse. Scribit idem Theophrastus *σβέννυσιν ποσάγμενον τὸς λύχνους*, quæ Plinius cōuertit, lucernarum lumina extinguit. Contra Dioscorides ait, *προσέχθην λύχνω ἐυκρίεις*, id est, quod lucernarum luminibus obiectum facillè flagret, vel ad lucernā admotum facillè ardeat. Sed potior videtur esse Theophrasti sententia, ut videlicet Elaterium propter humoris copiam lucernarum lumina extinguat, & ut Plinius ait, scintillare sursum ac deorsum cogat. Nam omne humidum, quod pingue non sit, ignis flammam protinus extinguit. Quare Elaterium, in quo humiditas aquea multum exuperat, lucernæ flammam extinguet potius, quàm ardebit admotum, excitato videlicet in humido à calore flatu, id quod experientia confirmari potest. Itaque eum Dioscoridis locum mendo non carere suspicantur viri docti, & pro *ἐυκρίεις* legendum esse putat Cornarius & *καίεται*, id est, non ardet. Elaterium bilem ac pituitam vtriusque parte extrahit, inquit Dioscorid. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in animo est deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & sibi quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine, catapotia dato, postea cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens Elaterium subiectas linguæ partes penitissimè penna oblimo. Quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resoluto, somnum inhibeto. Porro his, qui eximiè vacuantur, continuè vinum & oleum dare conuenit: etenim vomendo restituntur. Quod si vomitiones non finiuntur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Cier Elaterium menses: partus necat in pello subditum: morbo regio medetur cum lacte naribus infusum, à diurnis capitis doloribus liberat. Efficacissimè arginis illinitur cum vetere oleo, melle, aut felle taurino. Hæc & alia quædā Plinius habet. Obscuritates, inquit, & vitia oculorum sanat, genarumque vlcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non attingi vvas ab auibus. Contra phthiriasim, bibitur, & hydropises. Illitum anginas & achoras cum melle & oleo sanat. Et paulò post. Podagris & articulorum morbis decoctum in aceto illinunt, præsentem remedium: lumborum verò dolori semine solo siccato, dein trito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aquæ. Sanat & tumores subitos illitum cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium: sed grauidis abortum facit. Suspriosus prodest, morbo verò regio in nares coniectum. Lentigines ac maculas è facie tollit in Sole illitum. Adiecit & eius modum ex Dioscoridis sententia. Modus proportionē virium à diuidio obolo ad solidū. Copiosius necat. Integer modus, inquit Dioscorides adfert. Galeno Cucumeris agrestis tum fructus, tum fructuum succus, quem vocant Elaterium, tum non minimè radicis, & foliorum, ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, & fortum interimit appositum, ceu alia omnia amarā, & subtilium partium, maximè si quam habeant caliditatem, velut Elaterium: nam summè amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine exaltatiētum. Porro tale protinus digerendi quoque vim habet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidā cum melle, & oleo vetere. Bonum item est morbo regio affectis, fusum

Ibidem.  
Vires &  
Temper.

Lib. 10. c. 1.

Lib. 8. sim.



fulum cum lacte in nares, dolores capitis sanat etiam hoc vsu. Atq; Elateriū quidem eiusmodi est. At radice succus, vt & foliorum Elaterio similem vim habeat, imbecillioem tamen. Sed & ipsa radix similem facultatem habet: abstergit enim, digerit, emollit. Porro cortex potentiū ea desiccatur. Mesues de huius Cucumeris facultate, viribus, noxa, & eius correctione fusius disserit his ferè verbis. Succus ex Cucumeris siluestris fructu laus est præcipua, secunda radice. Is fructus iam absolutus si maturitate palleat, viridisque esse deserit, & amaritudine sit eximia, succūque remittat album & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius, vt sanguinem educat. Succus quidem exeunte Æstate excipitur: radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multū efficacia & celebria recipitur. Succus calidus est & siccus ordine tertio: substantia ignea & terrena constat. Purgat potenter pituitam vomitu, & deiectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serosum quoque excrementum etiam euulso contumax, atque ideo à iuncturis mirificè trahit, præsertim succo & radice. Ob id earum dolorem sanat: ischiadem etiam iuuat apertè cataplasmate impositus, vel clystere iniectus. Radices eius cum absinthio in aqua & oleo percoctæ hemicraniam molestam, & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora fricentur, & si agris radices eadem cum herba trix cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius cum pauculo lacte naribus iniectus idem efficit: excrementa enim cerebri euacuat, & nasi sectorem ab horum putredine ortum persanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, præsertim si sterco caprinum addatur, tumores magnos & duros, & strumas resoluit. Succus quoque & decoctum tum fructus, tum radice hydropem iuuat potu (valenter enim aquas serosas euacuat.) & icterum, & obstructions lienis, & hepatis. Pulvis radice cum melle citricem scædam tenuat, ecchymomata contusionibus succedentia dissipat. Succus radice cum farina fabarum, sordem faciei, & fœditatem cutis illitus terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet & lentigines. Resoluit enim, tenuat, terget, siccatur. Soluit molestè & tardè: aperit obstructa, & ora venarum. Quæ ne aperiat & vlceret hic succus, ac cum torminibus, & anxia molestia vacuet, datur cum Bdellio, vel Tragachantho, vel lacte dulci, recenter mulso, aut mulso & sale: promptius autem purgat cum pauculo sale gemmæ & aromatibus. Succus ex fructibus per maturitatem pallentibus ele-  
menter sine compressionem multa extractus, siccatur vt Scammonium aut aloë. Nonnulli inter siccandam ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt dum siccando cogi incipit. Alij alia immittunt pro variis scopis. Trien-  
nium seruatur, post sex menses vtendus. Noxam autem ab eo corpore impref-  
sam delent aqua hordei, mulsa, vinum, oleum. Datur succus à granis decem ad drachmæ vnius partem tertiam. Pulvis radice à granis quindecim ad drach-  
mæ semissem. Decoctum ab vncis duabus ad vncias quatuor.

Li. 2. med.  
purg. c. 9.

## COLOCYNTHIS.

## CAP. XIX.

ΟΛΟΚΥΝΘΙΣ, θείλος, quasi Cucurbitula, deminuto à κολοκυνθα Nomina  
nomine, nam fructus eius cum Cucurbitæ satiuæ fructu collatus, lo-  
gè minor est, Latinis similiter Colocynthis, & Cucurbita siluestris  
appellatur, Arabibus Chandel, Handel, siue Handal, Officinis Hispanis  
& Italidis Coloquintida, Germanis Coloquint, & Wildekurbisz, Gallis Coliquinte, & Courge  
sauage. Quibusdam Fel terræ dicitur, Arabibus Plantarum mors, quod herbas  
Ccc 3



alias sibi vicinas veneni modo interficiat, vt vicina illi terra adusta videatur. Hippocrates Colocynthidem sæpe συκυνθήν vocat, & σικύην, & συκυνθήν σπύγγην, κολοκυνθίδα τὸ ἐν τῷ, Colocynthidis spongiam, eius interiorē partē, & σικύνθην ἄπυρρον, κολοκυνθίδα ἀδιαρρεῖον, in sc̄tilem Colocynthida, vt Galenus in Glossis exponit. Colocynthis aspera viticulos foliaque per terram strata emittit, Cucumeri, quem hodie Citrulum vocant Officinæ, similia, in mucronem desinentia,

## COLOCYNTHIS,

Matthioli.



Li. 4. c. 174.

Li. 2. c. 130.  
Lib. 2. c. 4.  
Genera.

Lib. 3. c. 41.

Lib. 1. de  
plant.  
cap. 98.  
I.

medulla albissima, rara, lenis & levis: quòque lenior, eo melior: sitq; ex agro laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum languescēte virore ceperit in colorem luteum mutari. Inmutata & his notis destituta, mala: status torminosos & molestissimos excitat, immodicè purgat, vt etiam sanguinem educat, & laxe mortem adferat. Pessima est etiam ac venenosa, quam producit vnica tota vna planta. Quæ planta si loco illò est vnica, multò perniciosior fructum parit, præsertim si locus ille est viginosus, vel puluerulentus, vel thermis propinquus, vel serpentibus abundet. Dodonæus alterum Colocynthidis genus reperiri tradit suprâ à nobis descriptæ haud multum simile, quod viticulis longis, asperis alta scandit, & Cucurbitæ satiuæ modo iis omnibus, quæ obuta sunt, capreolis suis se inuoluit. Folia fert Cucumeri siluestri similia: fructum Cucurbitæ prorsus similem, sed multò minorem, pyri solum magnitudine, & effigie: cortice duro tegitur, viridi, lignoso: intus succo plenus est amarissimi gustus. Hanc Lobellius pingendam curauit. Cordus sex Colocynthidum species recenset, Colocynthidem grandem, oblongam, quæ viticulis multis per terram spargitur, ex intervallo geniculis præcinctis, iuxta quæ capreolos emittit, & singula erigit fo'ia longitudine & latitudine pedali, in tres partes Lupulimodo secta, tactu aspera, & breuioribus aculeis horrida, pedilibus aut cubitalibus teretibus, asperis, concauisque pediculis insidentia. Ab iisdem geniculis radices in terram



COLOCYNTHIS Pyri-  
formis, Lobellj.

in terram demittit tenues, quibus nutriendo fructui succurrit. Flores secus foliorum exortū profert, quibus decidentibus grandis, & humi procumbens exerefeit fructus, longitudine plerumq; dodrantali, ea crassitudine, quam vtraq; manu circum amplecti vix possis. Is primū viridis est, postea candicantibus maculis conspergitur, postremo maturus totus luteo pallet, & circa pediculū eminentibus angulis distinguitur. Dissectus corticem primò ostendit durum lignosumq;, mox flauam cartilaginosaq; carnem, & in medio sex ordines seminum candidorum, oblongorum, acuminatorum, latorū & planorum, in quibus candidus inest nucleus. Radice nititur breui, à qua multæ aliæ candidæ in diuersas partes exeunt, cubitales, & tenues. Hæc planta ad cameras periculis extructas admoda capreolis eas apprehendit, & atregias scenaq; facit. Sapore fructus est amarissimo, & graui odore: seminis nucleus dulcis est. Seritur spectaculi gratia in latis hortorum artis. Altera

II.

gnitudine, asperitate, radicibus, deniq; aliis omnibus similis, & æqualis, demptis duntaxat duobus, quod scilicet folia in quinas partes dissecta habet, & fructus minores, globi instar rotundos, aut modicè planos, colore primū viridi, in maturitate pallido, pulpa, seminum ordine & figura superiori similes. Tertia Colocynthis turbinata, viticulas, capreolos, folia & flores primæ similes profert, & similiter per terram reptat, sed omnes partes tenuiores habet: fructum pyri modo turbinatum, ovo maiorem, in maturitate flauū, & candicantibus lineis per longitudinem distinctum, foris durum, & lignosum, intus fungosa carne plenum, in qua quatuor oblongorum, paruorum, pleniorum, ac candidorum seminum ordines continentur. Radicibus nititur supradictis similibus, sed minoribus: sapore est amaro, ut cetera, similiterq; colitur. Quarta Colocynthis oblonga, glabra, viticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus primæ similis, & æqualis est. Folia tamen quoquo versus dodrantem vix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris, sed non profundis, in tres partes diuiduntur. Fructum habet oblongum, primæ similem, glabrum, minorem, colore primū viridi, in maturitate obscure luteo, ac in pallorem saturatum degenerante, seminum ordine, quantitate, atque pulpæ substantia, colore, ac sapore præcedentes Colocynthidas æmulatur, similiter etiā in hortis colitur. Quinta Colocynthis oblonga, candida, grandis, viticulis, foliis, capreolis, floribus, fructus quantitate, semine, radicibus, asperitate, atque amaro sapore primæ similis est. Solo ferè colore huius fructus ab illius fructu differt: etenim principio virer, mox albicantibus, & inæqualibus maculis, seu nubeculis aspergitur, postremo in maturitate totus albicat. Colitur in hortis supradictarum modo. Sextam Colocynthidem ponit, fungosam illam, & leuem, vulgaremq;, quam descripsimus. Hæc colitur à quibusdam Herbariis in hortis, sed rarissime provenit. In Italia & Hispania, & trans maria in calidioribus locis sponte in aspectu gignitur. Eius flores in æstate, seu fine æstatis apparent: fructus Autumno, siue citius siue maturescunt, & durant integris natura & viribus ad quinque annos.

III.

V.

VI.

Locus.



Li. 7. simpl. Colocynthis, inquit Galenus, gustu amara est, sed quæ amaritudinis illi, dum  
*Vires &* potatur, adsunt opera, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem  
*Temper.* quam validam in se continet: nimirum cum iis, quæ expurgat antè & ipsa per al-  
 uum excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.  
 Li. 4. ca. 171. Dioscorides verò enucleatius eius effectus declarat. Medulla fructus purgatoriam  
 vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha & nitro exci-  
 piantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusa clysteri-  
 bus profunt nervorum resolutioni, coxendicû doloribus, & coli vitiis, ut quæ bi-  
 lem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fætus admo-  
 enecant. Dolorem dentium tollit, si vnâ repurgetur, & in ea luto oblitera acerû &  
 nitrum inferueſcant, eo decocto decocti dentes colluantur. Si aqua mulsâ,  
 aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem  
 & strigmenta alui detrahet. Stomacho supra modum aduersatur. Subdita ex ea  
 balano alui excrementa reiciuntur. Virenti succo vtilissimè ischiadici perfric-  
 cantur. Plinius perspicuè etiam eius vires exponit. Colocynthis vocatur alia (Cur-  
 Lib. 20. c. 3. curbita subaud.) ipsa plena, sed minor quâ satiuâ. (Sic fortasse rectius legas. Vtilior  
 pallida ad medicinam quàm herbacea, medulla fructus per se inanit aluû. Arefac-  
 ta infusâq; clysteribus, &c.) Vtilior pallida, quâdo eius sunt medicina. Herbacea  
 arefacta per se inanit aluum. Infusa quoque clysteribus, intestinorum omnium vi-  
 tiis medetur, & renum, & lumborum, & paralyſi. Eiecto semine aqua mulsâ in ea  
 decoquitur ad dimidias, sic tussienti bibitur obolis quatuor. Prodest & stomacho,  
 farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo regio vtiliter semina  
 eius sumuntur, & protinus aqua mulsâ. Carnes eius cum absinthio & sale den-  
 tium dolorem tollunt. Succus verò cum aceto calefactus mobiles dentes sistit.  
 Item spinæ & lumborum, ac coxëdicum dolores cum oleo, si infricetur. Præterea,  
 mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero adalligata febribus sanare dicun-  
 tur quas Græci periodicas vocant. Hæc Plinius. Ex quibus Cornarius, rectè in-  
 tellectos. Primum duos modos sumendi medullam Colocynthidis in vnum  
 coaluisse, paucis particulis omisis, ut pro *διώαμιν δι' ἑχλῆς ἢ μὲν ἐν τελευτῇ τῆς χαρ-  
 πῆς καθαρίσειν, τέρωδους πολλῆς μὲν ὑδρομέλιτος λαμβανόμενῃ συννίτρω, καὶ σμύρνῃ, καὶ  
 μέλιτι ἐφθῶ εἰς κατὰ πότιον*, sicuti habent publica exemplaria, quæ interpretes secun-  
 ti sunt, legunt, *διώαμιν δι' ἑχλῆς ἢ μὲν ἐν τελευτῇ τῆς χαρπῆς καθαρίσειν, τέρωδους πολλῆς  
 μὲν ὑδρομέλιτος λαμβανόμενῃ, καὶ συννίτρω δι' ἑχλῆς σμύρνῃ, καὶ μέλιτι ἐφθῶ εἰς κατὰ πότιον*.  
 Id est, Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mul-  
 sa sumantur. Sed & si cum nitro, & myrrha, & melle cocto cogantur in catapotia.  
 Lib. 3. ca. 55. Priorem modum apertè tradit Aëtius. Dantur ex medulla eius scrupuli duo in  
 aquæ mulsæ cyathis duobus. Posteriorem docet Plinius, cum ait, Prodest & sto-  
 macho, farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. Alij tamen legere sur-  
 lunt ex Dioscoride, Obest stomacho. Farinæ aridæ pilulæ cum decocto melle sur-  
 muntur. Deinde rectè dixit Plinius, Eiecto semine aqua mulsâ in ea decoquitur  
 ad dimidias. Quod in Dioscoride nonnulli longè aliter intellexerunt, ipsam scili-  
 cet medullam in aqua mulsâ coqui debere. Hoc falsum esse Aëtius perspicuè  
 ostendit. Quod si minùs purgare volueris, inquit, sumito Colocynthidem iustæ  
 magnitudinis, eamque aperito supernè, & semen totum eximito. Deinde quic-  
 quid tomenti speciem præ se fert in ipsâ, rursus citra semen in ipsam indito, & re-  
 pletam ipsam sapa, aut vino dulci vetere, diem ac noctem macerari finito. Deinde  
 excolatum per pannum vinum calefactum bibendum dato. Hoc tamen interell,  
 quòd Dioscorides aquam mulsam, aut passum in ipsâ priùs coquendum, deinde  
 sub dio exponendum præcipit. Aëtius saram aut vinum dulce vetus diem solum,  
 ac noctem



ac noctem macerari sinit. Sic etiam Paulus habet. Colocynthidem semine reiecto, sed quæ medullam referuet, passio implebis, sineq; totam noctem commadefecit, manè passum auferetur, potiusq; dabitur. Qui sanè vsus hodie quoque Medicis frequentissimus est, Colocynthidem, aut alia pharmaca in liquore aliquo macerandi. Infusionem vulgò vocant. Sed præcipuè Medicis scitu necessaria sunt, quæ cum Mauritani ceteri, tum Mesues de Colocynthidis temperatura, viribus, & remediis ex ea aduersus varios morbos, de eius vi malefica, de correctione, præparatione, dosi, & sumendi modo tradidit in libro secundo de purgantibus medicamentis. Colocynthis, inquit, calida est, & sicca, ordine tertio, ignea substantia & terrea per vitionem tenuata, eximiè amara constat. Pituitam & alios humores crassos & glutinosos magis ex profundis partibus & distantibus, vt cerebrum, nervi, musculi, iuncturis, pulmone, thorace, quàm ex venis attractos, vt censet Dioscorides, purgat, (non ita Dioscorides censet, sed pituitam, bilem & strigmenta purgare. Paulus Colocynthidis medullam scribit bilem potissimùm vacuare, & mucofa, non à sanguine tantùm, quemadmodùm Veratrum, & Scammonium, sed & à nervis, & nervosis partibus) ac etiam bilem flauam, vt voluit Humain. Quapropter harum partium morbis mirè subuenit, cephalgiæ antiquæ, dolori cranij totius hemicranij contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquosa fluxioni in oculum, podagræ frigida, ischiadi maximè ac reliquis nervorum iuncturarumq; affectibus: athmati itè ac tussi antiquæ, dyspnœæ ex thoracis repleri angustia. Ac præterea summè omnium prodest colico dolori tam à pituita, quàm à flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc siue sumpta, siue clystere, aut balneo intestinis immissa præstat. Vtero autem imposita fortum necat. Eadem cum aceto forti attrita alphas, lepram, psoram, elephantiam sanat. Oleum denique super calidos cineres incoctum cortici eius inanito, capillos illitu nigrat, eosque ne cadant firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum eius dolorem, ac tinnitum sanat. Eodem oleo & felle bubulo interaneorum vermes necantur, si simul misceantur, & calida ventriculo illinantur. Acetum similiter incoctum collutione dentium dolorem sedat: nec enim, tenuat, terget, digerit. Ne autem cordi, ventriculo, hepati, & ceteris visceribus noceat turbando, subuertendo, violenter trahendo, miscenda sunt quæ has partes roborant, vt mastiche, gallia: misceantur & glutinosa, lubricando citius deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, vt gummi, Tragacatha, Bdellium, & similia, ne amplius vias vlceret per quas ferlocynthidem mulsâ, cui incocta fuerit Ruta, macerabat, siccabat, lenissimè reterebat, & cum aequali portione Ladani in catapotia formabat, vtilia prædictis affectibus. Mesues eam minutissimè forficibus incidit, mucagine Tragantidis, aut Bdellij perlinat, siccât, tenuissimè terit: cum Ladano vel mulsâ, vel mastiche oleo rosato dissoluta in pastillos cogit, citra molestiam purgantes. Quod si noxam corpori impresserit, mulsâ, vel vuarum passarum decoctum cum oleo amygdalino, vel oleo nucum eam abolet. Longam decoctionem sustinet, estque puluerandatur, vtq; viscera celerimè permeet, neque in ipsis ob partium minùs tritarum crassitiem cesset: qua fortasse fit, vt in visceribus pigra retineatur, eaque vlcet, præsertim cum sensu percipi possint eius particulae. Datur à filiis sex ad decem.

Cap. 4.

ALTPVM



## Nomina

*Alvus magis affinis  
hæc de puris hinc  
purge, pelivulæ ex  
folijs aîræ Forma.  
mon.*

Li. 4. ca. 173.  
Li. 5. meth.  
Li. 27. ca. 4.

Li. 5. meth.

Lib. 7. ca. 4

Li. 3. purg.  
cap. 2.  
Cap. 330.  
simpl.  
In cap. 173.  
lib. 4.

**A**LYPVM Græcis, Latinis Alypum & Alypia dicitur, id est, indolens, siue expers doloris remediū, καὶ ἀνὶ φρασιν, nisi quis malit dictū quasi ἄλυνον, id est, salsum vel maritimum, quod secus mare, ut Dioscorides ait, oriatur. Herba est surculosa, inquit ille, subrubra, gracilibus ramulis: tenuibus foliis: flore molli, leui, copioso: radix velut Betæ est, tenuis (Oribasius nec Betæ similem, nec tenuem radicem esse ait): semen velut Epithymi (thymi habet Actuarius.) Nascitur in locis maritimis, maximè Libyæ, plurimè sed & aliis locis vberissima. Plinius, Alypum, inquit, cauliculus est molli capite, non dissimilis Betæ, acre gustatu, ac lentum, mordensq; vehementer & accendens. Actuarius Alypum est Officinarum Turpetum, Turbith Arabibus dictum, quod album vocant. Nam in minoris Tryphera compositione scribit: Si hoc medicamento, pituita deiectionem moliri instituas, Alypum, id est, album Turpetum addas. Et alio in loco, Turpetum, quod radix est Pityusa, & album Alypia, glutinosam, Alypum descripsit, subiunxitq; huius semen atrā bilem per inferna ducere, credere quidam Alypum ab Alypia differre, quæ non atram bilem, sed pituitam vacuet. Verum is aliam radicibus, quas Turpeti nomine donauit, aliam semini Alypi, siue Alypie vim inesse intellexit, neque tamen hanc ab illo differre: quod confirmat Paulus his verbis. Alypi semen infernè atram purgare bilem, pari Epithymi mensura, cum sale, & aceto dictum est: intestina verò, si fidè Dioscoridi damus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio quæ nunc Alypias vocatur. Mesues scribit Turbith radicem esse herba lactaria, foliis Ferulae. Serapio Tripolium Dioscoridi Turbith appellat. Quare difficile est quæ nam sit hodie planta, quæ verum Dioscoridis Alypum dici queat, decernere. Matthiolus plantam hic pictam à Luca Ghino Pisus ad se missam pro Alypo fuisse scribit, sed pingendo depravatā fuisse,

ALYPVM,  
Matthioli.



ALYPVM, Pena, Herba  
terribilis Narbonensis.



*hec figura est ead. cum  
Lupulo pag. 1871.*

ait Pena



ait Pena. Qui nullam habuit quæ æquè bene, imò vllò modo (præter Ferulas) Aly-  
po congruat, siue lineamētis, siue efficacia purgandi, quàm frutex maritimus hîc  
depictus. Herbam terribilem vulgus Narbonensium appellat, de qua capite de  
Empetro diximus. Hanc Hippoglossi Valentini nomine depinxit Clusius, qui  
florentem vidit mensè Februario & Martio in Bætica solitudinibus, & in regno  
Murciano, totòque Valentino. Bæti *Coromilla de frayles*, & *Siempre enxuta*, quòd  
semper arida & exsucca videatur, appellant: Murciani verò & Valentini *Segullada*,  
nonnulli Valentini professores Hippoglossum, quamvis nihil cum Hippoglossis  
Dioscoridis commune habeat, nisi quis fortè ob foliorum cū Rusci foliis affini-  
tatem sic dictum putet. Quæ tamen in hoc frutice circa pediculum sunt oblon-  
giora & angustiora: præterea facultates sunt etiam dissimiles. Eidem Clusio Aly-  
pum esse non placet, cū planè arida sit & exsucca planta. Caterum circūfora-  
neos Bætica Medicos scribit eius decoctum propinare iis qui scabie Hispanica  
laborant, non sine faelici, vt aiunt, successu. Est & hæc planta Parmica, & Coniza  
tertia quibusdam. Semen Alypi, Dioscoride auctore, purgat atram bilem, si men-  
tura Epithymo pari cūm sale & aceto sumatur. Intestina tamen leuiter exulcerat.  
Plinio verò aluum soluit in aqua mulsâ, addito sale modico. Minima potio drach-  
marum duarum, media quatuor, maxima sex. Ea purgatio datur è gallinaceo iure.


Li. 4. c. 173.

Vires.

Lib. 27. c. 4.

## PYCNOCOMVM.

## CAP. XXI.

YCNOKOMON Græci, Latini quoque Pycnocomum vocant. Folia  
habent, vt scribit Dioscoride, Erucæ similia, sed aspera, crassa, & acriora,  
caulem quadrangulum, florem Ocymi, semē Marrubij, (*ωπαρίς* habent  
vulgata exemplaria, alia *ωπαρίς*, id est, Porri, sicuti & Oribasius legit) radicem ni-  
gram, rotundam, pallidam, exigui mali figura, terram olentem. Nascitur in locis  
saxosis. Eadem breuiter Plinius tradit. Aluum soluit & Pycnocomum, Erucæ folijs  
crasioribus & rarioribus, (Hæc vox, rarioribus, Pycnocomi nomenclaturæ repu-  
gnat, sic enim a densa coma dictum videtur. Quare pro rarioribus reponere acriori-  
bus, veteri etiam codice, atque Dioscoride lectionem hanc confirmantibus) radi-  
ce rotunda, lutei coloris, terram olente: caule quad. angulo, modico, tenui: flore  
Ocymi. Inuenitur in saxosis locis. Ex rei herbariæ scriptoribus nullum aut audiui,  
aut legi, qui Pycnocomum verum se nosse asseueret. Quod si quis diligens & in-  
dustrius aliquando repererit, sciat ex Dioscoride & Plinio non contemnendas  
esse eius vires. Semen drachmæ pondere potum, inquit Dioscorides, vim habet  
grauia & tumultuosa insomnia faciendi. Cum polenta positum tumores discuti-  
tutaculeos & spicula infixâ extrahit. Sed & folia imposita tubercula & furunculos  
discutiunt. Radix aluum cluit, & bilem vacuat. Datur drachmarum duarum pon-  
dere in aqua mulsâ. Ex Dioscoride Plinius hæc videtur exscripsisse. Radix eius in  
aqua mulsâ denariorum duum pondere, & aluum, & bilem, & pituitam exinanit.  
Semē somnia tumultuosa facit, vna drachma in vino potum. Rursus, Passim & in  
quacunque parte, ac maximo incommodo nascuntur, qui furunculi vocantur,  
mortiferum aliquando malum confectis corporibus. Remedio sunt Pycnocomi  
folia trita cum polenta, si nondum caput fecerint. Et alio in loco, Spicula sagitta-  
rum extrahit Pycnocomi semen.

Nomina

Li. 4. c. 169.

Forma.

Vide sub pag. 1456.

Locus.

Li. 26. ca. 8.


Vires.

Lib. 26. c. 8.

Li. 26. c. 12.

## EPITHYMVM.

## CAP. XXII.

VON Græcis ἐπιθυμον, Latinis quoque Epithymum dicitur, Arabibus  
Epitimo, Gallis *Teigne de Thym*. Epithymum scribit Dioscorides florem  
esse Thymi durioris, & Thymbræ similis. Habet capitula tenuia, le-  
uia, & in eis caudiculas veluti capillamenta. Plinius magna ex parte  
Dioscoridi

Nomina

Li. 4. ca. 2.

Forma.

Li. 26. ca. 8.

Vide supra pag. 414.



Dioscoridi assentitur. Aluum, inquit, purgat Epithymum, qui est flos ē Thymo Satureiē simili. Differentia, quod hic herbaceus est, alterius Thymi albus. Quidam Hippopheon vocant: stomacho inutilis, vomitiones mouet, sed tormina & inflationes discutit. Sumitur & ecligmate ad pectoris vitia cū melle, & aliquādo Iride.

*EPITHYMV M,*  
*Matthioli.*

Lib. med.  
purg. c. 16.



*EPITHYMV M Gra-*  
*corum & Arabum, Lobelij.*



*Vires.*  
Diosc. li. 4.  
cap. 172.

Aluum soluit à quatuor drachmis ad sex, cum mellis exiguo, salisq; & aceti. Mox aliā de Epithymo subiungit opinionem. Quidam aliter Epithymum tradunt sine radice nasci, tenuis similitudine pili, rubens: siccari in vmbra, bibi ex aqua acerabuli parte dimidia, detrahare pituitam, bilēque. Mesues scribit Epithymū Thymo, Thymbrā, & cuidam speciei Origanī supercrescere Cassuthæ modo. Duplex id esse, Creticum, idemq; præstantius, præcipue capitulis florulentis, subrufum, acre etiam, odoratu absolutum, graue. Alterum Syriacum minus, rufum, ignobilius, vt etiam pallidum, & subcitrinum. Hæc Mesues. Epithymum Arabum, siue id quo hodie vtimur, nihil aliud est, quàm capillaceum quiddam inter sese implicatum, sine radice Thymo innascens, & sese circūuoluens. Quare dubitauere pleriq; Græcorū, an Arabum, siue nostrum idem sit, quod dixerit Dioscorides florem esse Thymi durioris. At certè nostrum, siue Arabum Epithymum, idem planè est cum Dioscoridis Epithymo. Sed scire oportet, vt perspicue docet Penn. Thymum duplex esse. Vnum maius, foliis Thymbræ, aut Hyssopi, cuius surculi capitulis spicatis Stœchadis ritu operiti, floribus ex pulchro purpurascens, atque numerosa fibrarum coma implicatur, cuius vires præstantiores. Hoc ex Syria Venetias asportatur. Alterum vulgare nigrum Plinij, Serpyllum zygis Dioscoridis, in Narbonæ maritimis collibus pulchrum nascens: folio & flore Serpylli, rigidiores, passim etiam Epithymi cincinnis & capillamentis delicatissimis obuolutum. Dioscorides prioris tantum, ex quo prodit hæc fœtura meminuit. Hoc nihil aliud est, quàm capitati folioli, geminatae, quibus aptantur candidule capillamentis instar, coloris fusci, vel rubellitantis. Flosculi interdum candidi, nonnunquam herbacei, Thymo verò vtrique purpurascunt. Altero Epithymo vulgari Thymo innascente vtimur: Syriacum enim rariū. Potum cum melle purgat per inferna pituitam & bilem atram. Priuam predest melancholicis & inflatis acerabuli mensura ad Dracmarum quatuor pondus cū melle, sic, & vt scribit



Scribit Galenus Epithymum Thymi facultatem habere, ad omnia efficacius: ex-  
 ficcare & excalfacere in tertio gradu. Paulus, Epithymum laudatissimum esse re-  
 medium scribit inter ea, quæ atræ bili vacuanda sunt: dari ipsius drachmas quinque;  
 lætigatas ex lactis hemina.

Li. 6. simpl.

Lib. 7. ca. 4.

## CASSUTHA.

## CAP. XXIII.

**R**ECENTIORIBVS. Grævis *καρύδα* dicitur, Latinis Cassytha, vel y, in *Nomina*  
 v, transeunte Cassutha, Herbariis & Officinis hinc deflexa quadam  
 pristini nominis vmbra Cuscutha, *Chassuth*, vel *Cuscuth*, Arabibus.

Quidam, quod Lino maxime sese obuoluat, Podagram Lini vocat, &  
 Anginam Lini, quod quasi cōpedibus id cui infederit illiget, nec vinctum eo fa-  
 cile possit extricari. Galli *Goutte*, vel *Agourre de lin* vocant, Germani *Fulzkrant*,  
 vel *Fladseiden*. De hac veteres Græci nihil, quod sciam, memoriæ prodiderunt.

*Angina Lini*  
*Linum angat*  
*Cuscuth*  
 Li. 6. ca. 4.

Plinius tamen de iis loquens, quæ in alia stirpe viuunt, sicut viscum, Est, inquit, &  
 in Syria herba, quæ vocatur Cassytas, nō tantū arboribus, sed ipsis etiam spinis cir-  
 cumuoluens sese. In cuius vulgaris codicibus Cassytas sine spiritu legitur, libra-  
 riorum fortasse vitio Cassytas pro Cassythas scribentium. In quibusdam *Cadyras*

*quis Cadyras*

habetur, non Cassytas. Quæ vox Cadytas etiam in Theophrasto reperitur, ex qui-  
 bus ista mutuatus est Plinius: scribit enim, ἐν τῇ δὲ βουλῇ καὶ συρμακὸν βολάνιον, ὃ καλεῖται καὶ κα-  
 δύρας, καὶ δὲ καὶ ποτὶ καὶ ἀγρίοις ἐμπερσεῖται καὶ ἀλλοῖς τισι. Id est, & Syriaca illa herbula, quæ

Lib. 2. ca. 23.

Cadytas vocatur, arboribus & spinis, atque aliis quibusdam innascitur. Cassutha,  
 vt depingit Ruellius, herbosus fruticibus adnascitur, eorum adminiculo fultra, ra-  
 dice nulla, sed velut ab alarum sinu prodeunte cirro capillamentōve miræ longi-  
 tudinis, statim ab ortu ramulis sese circumuolvente: quæ iam velut clauiculis nixa,


Lib. 2. c. 131.

Forma.

sensim proserpens herbarum fastigia scandit, & crebris voluminibus opere to-  
 ppiatio per vertices rotata, comas herbarum, complectitur, tam volubilis illi natu-  
 ra est. Foliis vidua cernitur: florem fundit album: semine quoque scætet tenui: cirri  
 diluore rutilant purpura, nonnunquam ex rubro rufescunt, fidibus lyra: um cras-

Locus.

## CASSUTHA, Matthioli.



sitie pares. Non in terra, sed in herbis passim  
 nascitur Cassutha, quas tam spisso sæpius irre-  
 tit contextu, vt tētorij modo herbosum cespiti-  
 tem à sole vindicet. Nonnunquam cacumini-  
 bus impendens stirpes humi deturbat, pro-  
 priamque parentem suis laqueis strangulat, aut  
 continuo materni alimenti succu perducit ad  
 tabem. Hæc Ruellius. Sed vt de Epithymo &  
 Epithymbra, ita & de Cassutha à multis meri-  
 to ambigitur, inquit Pena, suapte ne adolescat  
 radice, atque inde surrecta finitimis platis sese  
 implicet, vnde alimentum vberius naçta, radi-  
 culæ illæ exarescāt. Qua de re ita decernit ille.  
 Epithymo, Epithymbra, atq; Cassuthæ nascēdi  
 & repēdi conditio par. Cassutha enim orta  
 primum & amplexata Vites Narbonenses, tam  
 multis osculis per quandam quasi synastomo-  
 sin earum succum populatur, & genium de-  
 fraudat, vt radices sui muneris minùs iam ne-  
 cessarij oblitæ, feruore arecant & abrumpan-  
 tur (non secùs ac Vrachî exarescunt fœtu exclu-  
 so, & mutato alimenti ductu) pendulis illis

Ddd



Temper.

Lib. 2. c. 131.

*Vires.*

capitulis & flaminibus Cassythæ in Vitium aliarumve stirpium amplexibus rel-  
 ctis, ubi ideo putantur enata: Sic à sese deprehensum in vinctis & femine collecto  
 & fato veram Cassutham produisse asserit. Eam in primo esse calfaciē: ium ordine,  
 & desiccantiam secundo statuendum: quādam enim resipit amaritudinem.  
 Eiusdem vires ex Arabibus hæ Ruellius recenset. Abstergendi naturam obtine-  
 & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iocinoris impedi-  
 menta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit vitia, venas pituitosis atque bilio-  
 sis exonerat humoribus, pellit urinam. Regio morbo subuenit, qui iocinoris ob-  
 structionibus contrahitur. Febribus iis auxiliatur, quæ pueros malè habent: sed  
 vsu nimio stomachum sua adstrictione grauat: verum noxa tollitur, si anisi modi-  
 cum adiciatur. Natura eius flatum bilem per aluū exigere, sed præstantiorem cum  
 absinthio effectum præbet. Hæ quidem & Pœnorum & Arabum sententia facul-  
 tates Cassuthæ tribuuntur, quæ vtique vires illius magis gliscere pollicetur, si pa-  
 rentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quòd hanc forsitan veteres Græci  
 quamuis triuialem, eo nomine subitauerunt, quòd natiuas suæ merito parentis  
 dotes adiciuisset, è sinu cuius vernaculum ebibens humorem aleretur. Nam, vt  
 testatum iidem Arabicæ factionis medici reliquerunt, si calidæ infuset herbas, ar-  
 borivæ, calidam sortietur facultatem, & si incubuerit frigidæ, vim frigidam ven-  
 dicabit. Hæc ex Ruellio. Lobellius etiam scribit Cassutham plantæ, cui immiscetur,  
 vires quodammodo referre. Ideò Cassutham è Lino à Practicis & Officinis  
 præferri, quòd citra calorem minùs astringit, magis emollit, lenit, extergit, & ad  
 euacuationem & discussionem præparat, iocinoris & lienis infarctus à bile & pi-  
 tuita leniendo referat, urinam cietideò morbo regio medetur, febres tertianas  
 quartanas & pituitosas curat, vt Mesues auctor est, flatumq; bilem per aluū ex-  
 purgat, sed efficacius absinthio addito. Epicnides, seu in Vrtica nata: magnam co-  
 piam se vidisse ait Lobellius in agro Sommerfeti Angliæ, quæ vrinis potentius  
 ciendis, & obstructionibus aperiendis est efficacior.

GLANS UNGVENTARIA. CAP. XXIIII.

*Nomina*  
 βαδανος, c. glans.  
 μυροβ. 8. unguentaria  
 hinc μυροβαδανος  
 glans unguentaria  
 Li. 4. c. 164.

Forma

*Locus.*

*GLANS VNGVENTARIA. CAP. XXXIIII.*

*Nomina.*  
βαλανος, *e. glans.*  
μυρον. *e. unguentum.*  
κινε μυροβαλανος  
glans vnguentaria.

*Forma.*  
Li. 4. c. 114.

*Locus.*

**B**ΑΛΑΝΟΣ *μυρε-μυκη* Græcis dicitur. Theophrasto Βάλανος simpli-  
citer, Latinis Glans vnguentaria, Plinio eadem vocis significatio.  
Myrobalanos, Arabibus *Habben*, seu *Ben*, Italis *Ghianda vnguentaria*,  
Hispanis *Auellana de la India*. Fructus effigies triquetra, ut scribit Pe-  
na, & Glandis, præsertim Fagi, æmula, huic generi nomen dedit: oleum verò, quod  
expressione emittit, Myreplica, id est, vnguentariæ nomine à cæteris Glandibus  
distinguit, quòd eo vnguentarij plurimum utatur. Hanc Dioscorides sic descripsit.  
Balano Myreplica fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine nucis Auellanae,  
cuius interior pars expressa veluti amygdalæ amaræ humorem emittit, quo  
ad pretiosum vnguentum pro oleo utuntur. Nascentur in Æthiopia, Aegypto, Arabia,  
& in Petra Iudææ. Præsertur quæ recens est, alba, plena, & quæ facile delibatur.  
Theophrastus verò sic: ἡ δὲ βάλανος ἔχει μὲν τὴν προσομοιοῦσαν ἀπὸ τοῦ χαρπύου, φύλλον δὲ  
αὐτῇ παραπλήσιον τῷ τῆς μύρτης, ὡλὴν ποικιλιέστερον. ἔστι δὲ δὴ μὲν δένδρον ἀπὸ τοῦ  
καὶ ἀμύγεθες, ἔκ ἀφῶς δὲ (Gaza legit, ἔκ ὀρθοφύς, vel ὀρθοφύς) ἀλλὰ περὶ ραμμυῶν, τοῦ  
χαρπύου ὅ τῶς κελύφεισι χρῶν) οἱ μύρε-φοὶ κόπτοιες: δὲ ὡδὲ γὰρ χατῆχός ὁ χαρπύς ποτὶ αὐτὴν  
ἀρχεῖται. ἔστι ὃ δὲ τῶν μεγάλων, καὶ τὸ δὴ ὡς παραπλήσιος τῷ ὁ χαρπύος. ἔχον ὃ ἰχθυόεν, καὶ  
ἀλλοτε χρῆσιμον, καὶ εἰς τὰς ναυπηγίας. Id est, Balano à fructu nomē inditū. Foliū eius  
Myrto simile est, sed oblongius. Arbor est patula & ampla, non recta, sed distorta.  
Fructus corticibus contusus utuntur vnguentarij: odorum enim suavitatem reci-  
nunt: fructus ipse ad id inutilis est: magnitudine autē & aspectu Capparis fructui  
similis.



similis. Materies valida, & cum ad alia, tum ad nauigia utilis. His verbis Theophrastus declarat vnguentarios suis compositionibus addere solitos Balani corticem totum, pro stymmate, siue spissamento, conseruandi odoris gratia, quem ad vsum nucleus est inutilis. Plinius de eadem hæc tradit. Myrobalanus Troglodytis & Thebaidi, quæ Iudæam ab Ægypto determinat, communis est, nascens vnguento, vt ipso nomine apparet. Quo item indicatur & glandem esse arboris, Heliotropio, quæ dicemus inter herbas, simili folio. Fructus magnitudine Auellanae nucis. Ex his in Arabia nascens Syriaca appellatur, & est candida. Contrà in Thebaide, nigra. Præfertur illa bonitate olei quod exprimitur, sed copia Thebaica. Inter hæc Troglodytica vilissima est. Sunt qui Æthiopiam iis præferant, Glandem nigram, ac pinguem, nucleoq; gracili, sed liquore qui exprimitur odori- bus aptiori, nascentem in campestribus: Ægyptiam pinguiorem esse, & crassiori cortice, rubente: & quamuis in paludibus nascatur, breuiorem sicciorẽq;: E diuerso Arabicam viridem ac tenuiorem: & quoniam sit mōtosa, spissiorẽ. Longè autem optimam Petram ex quo diximus oppido, nigro cortice, nucleo candi- do. Vnguentarij autem tantum cortices premunt, Medici nucleos, rudentes, af- fusa eis paulatim calida aqua. Vides in eiusdem arboris & fructus delineatione auctorum veterum discordiam. Dioscorides eam *μυροβάνης*, Theophrastus *μυροβάνης*, Plinius Heliotropij folio esse ait. Cum autem harum folia multum à sese distent, vt in horum aliquo mendum sit necesse est. Fructum Dioscorides nuci Ponticæ assimilât, Plinius magnitudine nucis Auellanae esse ait, Theophrastus fructui Capparis & magnitudine & specie similem. Dioscorides scribit interiorem fru- ctus partem rundi, & velut amaras amygdalas humorem reddere, cui assentitur Galenus, scribens carnis eius succo vnguentarios vti. Theophrastus fructus corti- cibus contrusis eosdem vti, fructum esse inutilem: Plinius vnguentarios cortices tantum premere, sed addidit medicos nucleos rondere. Mesues Balani Myreplicæ fructum alium magnum, alium paruum facit. Magnus, inquit, nucis Auellanae est magnitudine, triangulus. Paruus verò ciceri similis, malus: vterq; tamen medulla leni & vinctuosa. Magnus est præstantior, præsertim Syriacus. Cortice est albo, leni, tenui, medulla intus alba, leni, pingui. Paruus, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & recens, est innocentior. Nullus verò fructum hunc magis

Li. 12. ca. 21.

Li. 6. simpl.

Lib. med.  
purg. c. 12.

GLANDIS vnguentaria siliqua cum fru-  
ctu, Pena.



ad viuum expresit, atque Pena, quem & descripsit his ferè verbis. Siliqua est admodum elegans, palmum longa, ex carinula bifori compacta, teres, rotunda, gracilis, binisq; loculis ventricosa, nempe ima supremaque sui parte qua protuberat, glandem vnã vtroque loculo claudens: summa verò acuto stilo, rostri instar, mucronem protendit, intus subrufo colore, foris pullo cinereoue, & secundum longitudinem striis rugisq; exarata, coriacea tota, flexilis & corticosa, insipida, subadstringens & sicca. Hæc Pena. Glans vnguentaria, auctore Dioscoride, trita, & drachmæ pondere cum posca sumpta, splenem liquat. Imponitur etiã ipsi cum Lolij farina & aqua mulsa. Podagricis itidem. Cum aceto cocta deterit scabiem, lepram: cum nitro vitilignes, & cicatrices nigras. At cum vrina tollit lentigines, varos, maculas à sole contractas, faciei exanthemata. Vomitus mouet: aluum cum aqua multa soluit. Stomacho multum aduersatur. Oleum quod ex ipsa exprimitur, aluum soluit. Cortex eius magis adstringit: τὸ δὲ κύκλον τῆς καὶ ἐνδὲς αὐτῆς

Li. 4. c. 154.  
Vires.



ἐκπίεσμα, id est, interpretare Cornario, Quod verò ex ipsa cōtusa & expresse superest  
 recrementum miscetur smeomatis aduersus scabritias, & pruriges idoneis. Alij  
 ἐκπίεσμα succum verterunt, verum tusa, inquant, & expresse. Superiorem con-  
 uersionem approbat Galenus, qui cum de carnis succo dixisset, subiunxit, ἐκπίεσμα  
 ἢ ὑπὸ δουπον, id est, reliquum quod ab expressione restat, idem quod Dioscoridis  
 Li. 6. simpl. ἐκπίεσμα. Illius de hac tota re verba sunt. Balanus Myrepfica deferretur ex Barbaria  
 regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius sacco, qui facultate calidus est. Reli-  
 quia autem, vnde expressus est succus, terrestres, scilicet & duræ, vincentem ha-  
 bent qualitatem amaram. Sed & admista quædam est adstrictio. Quare extergen-  
 tem simul & incidentem, contrahentemque & stipantem effectum habent. Itaq;  
 ad ionctos, lentes, ephelin, & pruriturum, deinde & ad psoram & lepram conue-  
 niunt. Verum & lienes liquant, iecurque indurefcens. Quod si quis carnem eius  
 drachmæ pondere cum melicrato bibat, medicamentum experietur vomito-  
 rium. Sæpe etiam per inferiora aluum largius subducit. Itaque cum hoc medica-  
 mento vtimur ad viscerum expurgationem, & maximè iecoris, lienisque, ex oxy-  
 crato ipsum exhibemus. Gaudet verò maximè aceto ad actiones externas. Adeo  
 enim efficax est, vt & psoras & lepras detergeat, & multo etiam magis qua his  
 sunt minora, lentes, vitiliginem, ionthos, ephelin, exanthemata, achoras, tum vi-  
 cerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Porro cum illinenda est leni, præstat ad-  
 mistam esse farinarum quampiam exsiccan tem, cuiusmodi est erui & lolij far-  
 na. Hæc Galenus. Mæsus Glans Myrepfica maior calfacit initio ordinis tertij, sic-  
 cat secundo. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculum  
 subuertit, nauisam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vomitu  
 & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso, & flatulento lum-  
 pus, balano, clystere iniectus, cataplasmate ex ipsius medulla, hordei farina &  
 melle appositus, & calore suo neruorum frigidis affectibus, spasmo, tetano, con-  
 tractioni. Tumores quoque dueros, strumas, nodos resoluit cum melle. Hepati au-  
 tem aut leni obstructo, vel durato cum farina lupinorum, & spica confert impo-  
 sita. Ad hæc autem Glans minor, & eius oleum efficacius admouentur. Idem  
 etiam auribus infusum tinnitui, sibilo, surditati auxiliatur: cicatrices fædas, lenti-  
 gines, alphos, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat,  
 aperit obstructa. Parua Glans ad omnia est efficacior, molestè purgat, vires deli-  
 cit, sudoremque frigidum mouet. Ob id non vtenda etiam oleo, nisi emplastro,  
 vntione, cataplasmate. Glans ne ventriculo noceat, facit assatio. Ea enim humi-  
 ditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit, & re-  
 soluit: tuncque solum deiectione purgat. Adiciuntur præterea ipsi, præferim co-  
 quendo, semen anisi & fœniculi. Hodie Officinis & Myropolii, tum ad valen-  
 dinem, tum ad voluptatem ex Glande vnguentaria oleum exprimitur, vt nullo  
 odore iucundum, ita nullo ranore, aut fœtore vnquam veterascens. Quare ad  
 quamlibet odoris suauitatem ac vim, vt moschi, zibetti, ambari integram, ac ve-  
 getam tuendam, omnium oleorum id vnum aptissimum est, nullamque labem  
 aut sordem chirotheis, ac vestibus illinit.

Temper.  
Vires.

MYRO



**R**VCETVS cathartici, de quibus hic agimus, veteribus Græcis Latinisque fuere incogniti, præterquam ex recentioribus Græcis Actuario, ab Arabibus inuenti, & ad leuiiores purgationes frequenter vsurpati, qui omnes generis nomine Auicennæ Dilegi, siue Delegi dicuntur, & Serapionis Hatilg. Tametsi libriorum vitio Hatilg pro Delegi corrupte legi putat Garcias Histo. Aromat. Ind. auctor, quod omnes Medici Arabes illi affirmarint Myrobalanos omnes Delegi nuncupari. Has cum viderent interpretes quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos verterunt, cum pruna, quibus similia sunt, melius vertissent. Ad hæc cum Myrobalani vox Balanum myrepticam significet, id est, glandem vnguentariam, perperam istis fructibus nomen id inditum, quod vnguentis apti non sint. Sunt in vniuersum quinque earum genera: flaua seu lutea, seu citrina, *Azfar* Arabibus dicta. Indica siue nigra, *Afuar*: Quebula, *Quebulg*: Bellerica, *Bellergig*: & Emblica. *Embelgi*. Emblica Senitica sunt Auicennæ, minutæ, & leuiores. Quod docet Serapio his verbis. Myrobalani de Seni sunt ex speciebus Myrobalanorum: habent corticem subtilem, quæ nota Emblicis conuenit. Menses Myrobalanos citreas, nigras, cepulas eiusdem arboris fructus esse quibusdam videri ait, vt immaturi sint citrea, maturi nigra. Cumq; arbor his auctoribus sit bifera, primi partus sunt citrea & nigra, secundi verò cepulæ: aliis diuersarum arborum fructus videri, idq; credi, quod eorum facultates & opera variant. Id confirmat Garcias auctor Histo. Aromat. Indica. Falluntur, inquit, tam ij qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nasci putant, quàm qui flaua & cepula tantum. Nam quinque sunt diuersa arborum genera, & quod magis miretis in regionibus sexaginta aut centum leucis a sese distantibus nascuntur. Nonnulla in Goa & Batecala, alia in Malanor & Dabul. In toto regno Cambayæ quatuor earum genera inueniuntur. Kebula verò in Bager, Decam, Gazarate, & Bengala. Ceterum, quæ in Lusitaniam deportantur, magna ex parte collectæ sunt in regione, quæ est inter Dabul & Cambaya. Nam experientia compertum habemus, eos fructus, quos regio Septentrioni vicinior producit, minùs putredini obnoxios esse. Inuenio autem, inquit Garcias, apud eos hæc Myrobalanorum genera, quorum vsus est in purgationibus leuibus, & sine molestia. Primum, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ Arare vocant, Medici, Aririqui: nobis sunt flauæ. Alterum genus, incolis Rezenuale: nostræ sunt Indica, siue nigra. Tertium genus, Gotim incolis nuncupatum, rotundum: nobis Bellerica. Chepula verò nostræ, quæ pituitam purgant, illis Aretca appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorum genera, quæ illis sunt in vsu medico. Nam quinto genere Anuale ii. nuncupato, nobis Emblico dicto (tametsi apud eos reperiatur) non vtuntur nisi in densandis coriis rhois coriariorum vice, & aramentis consiciendo. Sunt tamen etiam nonnulli, qui iis viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causa. Porro flauæ teretes sunt: arbor Sorbifolia profert. Emblicæ arbor foliis est minutè incisis, Palmæ magnitudine. Inda Myrobalanus octogona est. Arbori folia Salicis similia. Bellericæ arbor foliis est Lauri, sed pallidioribus, & subcineritiis. Ch. bala magnæ sunt, & rotundæ, oblongiores tamen, cum ad perfectam maturitatem peruenerunt, & angulosæ. Arboris folia Persicæ similia. Sunt autem singula arbores Pruni magnitudine, omnesque siluestres, & sponte nascentes, non domesticæ. Cum autem gustu sint adstringente & acido, sorborationis modum apud Indos non inualuit, utpote qui iis non vtuntur purgationis, sed adstrictionis tantum gratia. Nam si purgari velint, eorum decocto vtuntur, & vires.

D d d 3



## MYROBALANI.



Myr.indica,



Myr.flava,



Myr.bellerica,



Myr.emblica,



Myr.chebula,

Lis. meth.

MYROBALANI EMBLICÆ.



& maiori dosē quam nos in Europa. Solent autem his saccharo conditis uti, magno successu. Chebulorum autem maior est gloria. Condiuntur in Bismager, Bengala, & Cambaya, Flaua: Indica in Barecala, & Bengala. Ex his, quod iubere soleo, immaturis stillat: tunc liquor organici elicitur, quem post sumptam aliquā cōferuam adstringentem propino, & syrupo admisceo si quando opus est. Flauas & Bellericas præscribere soleo initio mensis, his qui alui profluuiō, aut stomachi relaxatione laborant: talibus enim cōuenit huiusmodi cibus propter adstrictionem cum pauca aciditate coniunctā. Præterea immaturorum succum in alui profluuiis admodum efficacem esse expertus sum. Hactenus Garcias in Aromat. Indiarum Historia. Actuarius de his ita scripsit. Inter ea, quæ perquam modicè purgant, fructus quidam noti & lignosi censentur, qui à Syria & Agypto ad nos deferuntur: quorum alij Lutei, alij Chebulæ, alij Migri nominantur, omnes communī nomine Myrobalana nuncupati. Dux

aut tres eorum drachmæ lauigatæ purgandi vim obtinent, & priuatim superuacuum capitis humorem exhauriunt. At Lutei bilem flauam euacuant, pituitam Cepulæ, atram bilem Nigræ. Cæterum ventriculum, ac intestina sua adstrictione confirmant, roborantq; Torrefactæ Myrobalani ablutæq; plurimum vis purgatoriae exuunt, sed tenuiorum partium euadunt, exsiccantq; magis. Quare quibus defluxio ad inferiora procumbens molesta est, & intestina vlcera, hæc assuimus, quæ modicè humorem defluentem subducunt, & notatu dignum robur intestini conciliant. Eandem & consimilem facultatē obtinet, quod Empeliliz, & quod Emplitzi barbara voce appellatur. Hæc Actuarius. Duo potissimum Myrobalanorum genera condita ad nos deferuntur. Primum, Kebula siue Chepula, quæ pluris sit, omnium maxima, oblonga, pusilli Limonij, aut Persici effigie, compacta, callosa nigraq; carne, sapore iuglandis condita. Alterum Bellerica minor, rotundior, tenerior edendo. Bellerico citrina similia facie, cute, nucleo oblongo & pulpa, sed fulua, vnde nomen. Inda nigra est, notissima de colore, nuclei expers, callo penè lapideo. Hanc concolorem melancholicum humorem aptius educere putant. Postremo Emblica, potius fragmenta, quam integra pruna, quadantenus triangula, Bellericis minora. Myrobalani, inquit Mesues, medicamenta sunt benigna. Tantū enim abest ut purgando vires deiciant, ut etiā cor, venter, venter, par, corpusq; reliquū cōfirment, cogēdoq; in vnum roborēt: quare vnica his incommodant, qui sunt obstructionibus obnoxij, has enim excitat. Præterea medicamentis acris, & purgādo exoluētibus, ut Scammonio, perfectè corrigēdis restituta, tum qualitate frangit, & purgationem iuuat. Hæc & multò plura lege apud Mesuem de Myrobalanis. Omnium effigies hæc pictura expresit Lobellius, quod de Emblicis & Bellericis hæc literis mādauit. Emblicæ parum refrigerat, siccior dine primo, pituita etiam putri venter purgat, eumq; & cerebrū, neruos, cor, hepar, & partes laxas cōstringendo roborat: ob id tremori cordis cōferunt, appetentiam inuitat, vomitum sustinet, furorē & larratus bilis cohibent, vim animæ rationalem



rationalem augent, calorem viscerum insigniorem, & inde natam sitim extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, graues, osium paruorum. Largius purgant, & rugis ventriculi minùs incommodant, si aqua in sole maceantur, donec humectata tumescant: postea expressæ multà biduo macerantur, igni lento coquantur: ubi coctæ refrigerint, mellis albissimi parte quarta exceptæ reconduntur. Aromatibus, Cinnamomo, Xyloaloë, Cardamomo, Croco, Gallia, & similibus nonnulli condiunt. Bellericæ etiam sunt benignæ, & roborant: frigida primo gradu, sicca secundo, cætera Emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multæ & densa carne, graues. Hæc Lobellius.

## TAMARINDI.

## CAP. XXVI.



EQVE ac Myrobalani veteribus Græcis incogniti fuere Tamarindi ab Arabib<sup>9</sup> nominati, id est, Daçtyli Indi, siue Palmulæ Indicæ: Tamar enim illis daçtylum significat. Sed vt Myrobalanos, ita Tamarindos

Nomina

Lib. 1. c. 28.

Forma: H

Arabib<sup>9</sup> apud Indos  
sunt Tamarindi

Locus.

Cap. 348.  
simpl.

minùs aptè illi vocarunt: quoniam eorum arbor Palmæ similis non est, nec ex Palmarum generibus, vt dicitur, nisi ad effigiem fructus respexerint, quæ daçtylum siue digitum inflexum refert. Garcias in Aromat. Indicorum Historia tradit in Malauar Puli, in Guzarate Ambili nuncupari, eoque nomine reliquis Indiæ prouinciis notos esse. Arbor est, inquit, Fraxini, aut Iuglâdis, aut Castanæe amplitudine, materie firma, non fungosa: ramis foliis multis ornatis, & minutum incisus, palmi magnitudine: fructu in arcus aut digiti incurui figuram efformato. Huius immaturi cortex viret, siccatus verò cinereus est, & facillè auellitur: nucleos intus continet satiuorum lupinorum magnitudine, quodammodo rotundos, sed planos, colore furuos, læues, quibus abiectis pulpæ vsus est, quæ lenta est, & viscida. Illud verò mirum & obseruatione dignum tradit, quòd hic fructus in arbore adhuc pendens, noctu foliis sese inuoluat vitandi frigoris causâ, interdiu verò sese expediat, & è medio foliorum emergat. Acidus est dum viret, ea tamen aciditas suauitate non caret. Nascuntur Tamarindi multis Indiæ locis, inquit idem Garcias. Sed qui locis montosis, & ad Septentrionem versis proueniunt, præferuntur, & diutius incorrupti manent: quales sunt quos Cambaiere & Guzarate gignit. Idem Mesuen reprehendit quòd Tamarindos fecerit Palmæ siluestris Indiæ fructum, cum tota India Palmas non reperias, sed eò deferuntur Palmæ fructus ex Arabia magna quantitate, edunturque sicca, atque etiam in massam compressæ, abiectis ossibus. Garcias vidisse se ait in Cambaya & Guzarate siluestre quoddam Palmæ genus, sed sterile, & longè diuersum à Tamarindifera arbore. Idem Serapionem etiam redarguit, quòd scripserit ex auctoritate Abohanisa Tamarindos in Casarea Aman prouenire: nullos enim in Casarea Aman, quæ est Syria, prouenire certum esse ait Garcias, cum à negotiatoribus ex India deferantur. Nonnulli, inquit ille, Tamarindos à saporis aciditate Oxyphœnicem vocant, quorum sententiam nec probo, nec improbo. Sed quod Lacuna Commentariis in Dioscoridem lib. 1. cap. 126. à Thebaicis palmulis non differre scribit, minimè probo, quemadmodum nec quod eius arborem Palmæ siluestris genus facit, foliis oblongis, & per extremum acutis. Tamarindorum iconem hîc positam Lobellio debemus. Quare quæ de iis etiam prodidit subiungenda. Tamarindorum semina recentia, inquit, Cassiæ quadantenus similia, sed maiora & angulosafacit, pistrinu, compressiora tamen è siliquis carnosiss, & multis fibrarum circuitis implexis quàm Phaseli nostratis maioribus, quales in instructissimis Officinis Antuerpiæ prostant (minimè è palmulis, aut eius generis fructibus, vt multi credidere qui non viderunt) in horto sata G. Driesch, nobis perelegantes arbusculas



TAMARINDI folia, fructus,  
semina, Oxyphænicum perperam  
crednum, Lobellij.

Lib. purg.  
cap. 7.  
Vires &  
Temper.



successum, quàm si syrupo acetoso vteretur: ægros eorum infusione purgare, ut Tamarindorum vicia quatuor aqua frigida, aut stillatitia intybi macerentur tribus horis, facta expressione eximantur, & modico saccharo inspergantur. Euacuans biliosum humorem pituitam incidunt, & attenuant. Indos sine molestia is fole purgare cum oleo nucis Indicæ sumptis: medicos verò folia trita partibus erysipelate affectis imponere.

sesquipalmes saepe pepererunt, quæ hyemis rigoribus periire. Earum vnam pingendam curavit is scriptor, ex qua hanc ex pressimas, foliis vtrinque ex aduerso oppositis, ordine secundum costâ aut pediculi longitudinem, Olundæ filicis modo digestis, virentibus, & gustu acidis, quæ contrahuntur & clauduntur per imbres, etiam ad Solis occasum. De eorum facultatibus hæc ferè Mesues. Tamarindi dactyli Indici medicamentum excellens ac innocens, frigidum siccum ordine secundo (Exemplaria hic mendosa esse censet Garcias, quia Tamarindi refrigerant & exsiccant ordine tertio.) Ob id humorum acrimoniam reprimat, bilem purgat, eiusq; & sanguinis feruorem furoremq; compefcit, febres acutas lenitione egentes & icterum sanat: sitim ac omnem ventriculi hepatisque ardorem extinguit, vomitum sistit. Lobellius etiam refrigerare & exsiccare initio ordinis tertij scribit: picrocholis saluberrimos esse: infusione purgare biliosum humorem, & extinguere: pituitamq; incidere & attenuare, sitim delere. Refert Garcias se illis expurgatis plurimum vti cum saccharo, idque felicitari

EVPHORBIVM, ANTEVPHORBIVM. CAP. XXVI.

Nomina



ΥΦΟΡΒΙΟΝ Græcis, Latinis etiam Euphorbium nominatur, Arabibus *Euforbium* & *Forbium*, Italis *Euforbio*, Hispanis *Alfornia*, Gallicis *Euforbe*. Plinius herbam Euphorbiam nominavit, eius succum Euphorbium. Euphorbium, auctore Dioscoride, arbor est Libyæ acerrimo, quem timentes incolæ ob eximium eius feruorem, ventres ouillos elatos arbori circumligant, & eminens caulem contis incidunt, statimque velur ex vase quodam multus succus in ventriculos effunditur, sed ex vulnere etiam humi spargitur. Sunt autem duo succi genera, vnum pellucidum velur sarcocolla, magis gignitudo erui: alterum in ventriculis vitreum, & compactum. Eligendum est translucens, & acre. Adulteratur sarcocolla & glutine admixtis. Sed non difficile experimentum gustu sumptum, quia vellicata semel lingua feruor diutius permanet, ut quicquid offeratur Euphorbium esse putetur. Eius inuentio tempore Iubæ Regis Libyæ cognita fuit. Eius rei locis aliquot meminit Plinius. Iuba Prolemæi pater, qui primus vtrique Mauritanix imperavit, studiorum claritate memorabilior etiam quàm regno, similia prodidit de Atlante: præterque gigni ibi herbam Euphorbiam nomine, ab inuentore medico suo appellatam. Cuius lacteum

Lib. 3. c. 80.

Forma.

Lib. 5. c. 1.



et eum succum miris laudibus celebrat in claritate visus, contraque serpentes & venena omnia priuatim dicato volumine. Et Euphorbiam è monte Atlante, vltraque Herculis columnas in ipso rerum natura defectu. Et rursus, Inuenit & patrum nostrorum atate Rex Iuba quam appellauit Euphorbiam, medici sui nomine & fratri Musæ, à quo D. Augustum conseruatum indicauimus. Sed Iuba volumen quoque extat de ea herba, & clarum præconium. Inuenit eam in monte Atlante: spectatur foliis achantinis (Lege ex veteri codice & Dioscoride, specie Ferulæ, foliis, &c.) Vis tanta est, vt è longinquo succus excipiat: incisæ conto subditur excipulum ventriculo hædino. Humor lactis videtur effluere, siccatus cum coit thuris effigiem habet. Qui colligunt clariùs vident. Contra serpentes medetur, quacunque parte percussâ, vertice inciso, & medicamento addito. Hæc Plinius. Ex quibus perspicuum est deprauatè in Dioscoride legi, ἐν τῷ τριώλῳ Mauritaniæ, cum Tmolus mons sit Lydiæ in Asia minori, rectèque Ruellium Atlantem legisse ex Plinio. Euphorbium plantam qui representarit, nullus adhuc extitit, quod sciam, præter Dodonæum, ex quo hanc expressimus. Natum fuisse scribit anno 1570. Bruxellæ in horto Io. Boissot viri generosissimi & doctissimi, à quo vnum terræ commissum folium in plura multiplicatum est, & radicem demisit in obliquos ramulos diuarticatam. Ioannes Leo in Africæ historia, ex vno solo, vt ipse nominat, fructu, vigintiquinque, aut triginta quandoque provenire scribit, è quibus maturis & vulneratis succus effluit lacti similis, qui lentorem contrahens concrefcit, & colligitur. Euphorbium istud, vt describit Dodonæus, folia habet oblonga, crassa, virentia, in rotunda ac terete figura angulosa. Cucumerem satium referrent, si non anguli eminentiores, & albicantibus spinis plurimis duplici ferè ordine obsiderentur. Effluit ex his vulneratis liquor vehementer acris, & mordax, facile concrefcens. Succus illitus, auctore Dioscoride, vim habet suffusiones discutiendi: potus tota die exurit: quare melli collyriisq; pro acrimonia ratione admiscetur. Coxendicum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas ossium eadem die eximit: verum eo vtentes oportet linamentis aut ceratis communire carnem ossibus circumscitam. Narrant quidam percussos à serpentibus nihil mali passuros, si incisâ osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, & postea vulnus consuatur. Euphorbium, inquit Galenus, causticæ siue virentis & tenuium partium facultatis est, perinde ac alij multi succi. In his neque alibi, quod legerim, Dioscorides, neque Galenus purgatricis facultatis Euphorbium, vel Agaricum drachmis duabus cum sale modico potum ex aqua, aut in multo obolis tribus. Fusiùs eam explicarunt Aëtius & Actuarius. Euphorbium, inquit, picuitam, sed potius aquas subducit: est autem acutissimum, & maximas vi præditum. Quapropter colicis, & quibus venter frigidior est, exhibetur: aëros vehementer conturbat, sitimque maximè mouet. Quidpiam ex odoratis feruibus ei permiscetur, & trium obolorum pondere ex aqua multa prabetur: sed

Lib. 27.  
proem.  
Lib. 25. c. 7.

In purgan.  
Histo.

Lib. 2.

Vires.  
Lib. 3. c. 80.

Lib. 6. sim.

Lib. 26. c. 8.

EUPHORBIVM,  
Dodonæi.



monie ratione admiscetur. Coxendicum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas ossium eadem die eximit: verum eo vtentes oportet linamentis aut ceratis communire carnem ossibus circumscitam. Narrant quidam percussos à serpentibus nihil mali passuros, si incisâ osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, & postea vulnus consuatur. Euphorbium, inquit Galenus, causticæ siue virentis & tenuium partium facultatis est, perinde ac alij multi succi. In his neque alibi, quod legerim, Dioscorides, neque Galenus purgatricis facultatis Euphorbium, vel Agaricum drachmis duabus cum sale modico potum ex aqua, aut in multo obolis tribus. Fusiùs eam explicarunt Aëtius & Actuarius. Euphorbium, inquit, picuitam, sed potius aquas subducit: est autem acutissimum, & maximas vi præditum. Quapropter colicis, & quibus venter frigidior est, exhibetur: aëros vehementer conturbat, sitimque maximè mouet. Quidpiam ex odoratis feruibus ei permiscetur, & trium obolorum pondere ex aqua multa prabetur: sed



Lib purg.  
cap. 20.

sed præstat vt cum melle cocto in catapotia formetur. Mefues hanc & alias eius facultates recenset his ferè verbis. Euphorbium igneum est, calidum siccum ordine quarto, omnium lacrymarum calidissimum, tenuissimum. Vrit, ruborem excitat, vlcerat, penetrat, terget. Tam valenter agit, vt præ angustia & labore syncopem & sudorem frigidum accersat. Purgat autem præter cætera pituitam crassam & lentam, quantumvis impactam, etiam à neruis & iuncturis remotis, & profundis, sumptum, sed correctum. Idem ex oleo Leucoij lutei solutum affectibus neruorum frigidis, paralyfi, stupori, tremori, spafmo, spafmo cynico, nodis, illitu mirè conducit. Hepatis quoque & lienis tumoribus, & dolori ab intemperie frigida, & flatu, & ei, qui per iuncturas & partes alias turget, occurrit. Puluis eius ex aceto alphas valenter affricus delet: idem sternutamentum valentissimè ciet. Cum oleo de spica illitum occipiti, lethargicæ obliuioni prodest, aquas quoque vacuat. Ventriculo & hepati nocet sua actionis vehementia: ob id minùs tenuiter est re-

intra eaphorbiu

antior et actia  
aduersus symptoma  
ex aduersu e regione  
Anteuphorbiu  
intra eaphorbiu  
de actios e aduersu  
e aduersu e aduersu  
euphorbiu qua l. t. t. t.  
e aduersu

## ANTEUPHORBIVM,

Dodonai.



Forma.

Vires.

niam Euphorbij retundere. Creuisse ait Dodonæus etiam in horto Boissori, quo Euphorbium anno, atque vna cum eodem periisse. An veteres de ea herba literis aliquid mandarint, nondum compertum. Videtur tamen Dodonæo ad Telephij species referri posse.

## ALOE. CAP. XXVIII.

Nomina



MEDICAMENTORVM omnium vulgatissimum & præstantissimum est, quod Aloë, tam herba quàm succus eius Græcis dicitur, Latinis Aloë, Officinis Aloës, Gallis Aloë & l'herbe du Perroquet, à foliorum virore. Quia verò Aloë in maritimis nasci proditur, non abs re quis suspicetur, inquit Pena, nomen illi factum à sale, vel salo siue mari, cuius afflari imprimis gaudet, forte iidem & nonnihil fæledinis foris continet, vt cæteræ maritimæ.



ritima. Sunt etiam qui à crassis foliis, & similitudine, quã cum Semperuiuo habet, Semperuiuum marinum nominent: Dodonæus Semperuiuum amarum Columellæ. Græcorum quoque vulgus Aizoon hodie vocat, quia semper viret: Arabes, Persæ, Turci, teste Garcia in Aromat. Indicorum Historia, *Cebat*. Nam quòd *Laber* à Serapione vocatur (codex meus habet, *Saber*) interpretis errore, aut librariorum negligentia factum fuisse existimat.

ALOE, *Matthioli*.ALOE cum floribus,  
*Matth.*

Siquidem Arabicum exemplar *Cebat* habet, inquit: Guzarate verò & Decan incolæ *Areaa*, Canarini, qui maritimum hunc tractum habitant, *Catecomer*, Hispani *Acibar*, Lusitani *Azure* appellant. Scillæ foliū habet Aloë, vt describit Dioscorides, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, repandumq; *παρ' ἐκείτερα δὲ τὰ μέρη ἔχει ἐκ πλάγιον ἀκύνθια ἀραιὰ ἐξέχοντα, κολλοῦσα*: id est, ab vtraque parte habet ex obliquo spinulas rariùs eminentes, mutilas. Alij legunt, *παρ' ἐκείτερα δὲ τὰ μέρη ἔχει τὰ φύλλα ἐκ πλάγιον ἀκύνθια ἀραιὰ ἐξέχοντα, κολλοῦσα*: id est, interprete Lacuna, folia ex obliquo vtrinque in spinas quasdam retulas longioribusq; intervallis dispositas desinunt. Vel, vt vertit Fuchsius, folia vtrinque gerunt ex obliquis aculeos raros & breues. Quæ Ruellius obscurius & ex Plinij potiùs quàm ex Dioscoridis sensu conuertit, folia vtrinque ex obliquo longioribus intervallis striantur, & in spinulas desinunt retulas truncatq; *Quomodo autem Aloës folia striata dici possint, mox dicemus.* Caulem proferit Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Grani est tota herba odore, & gustu amarissima, radice vna pali in terrâ adacti specie. Nascitur copiosissima

Lib. 3. c. 22.  
*Forma.**Locus.*

in India, præpinguis, vnde succus quoque deferatur. Prouenit etiam in Arabia, Asiâque, & in maritimis aliquot locis, ac insulis, velut in Andro, succo extrahendo non valde idonea, sed ad glutinanda vulnera utilis, si trita illis imponatur. Hæc ex Dioscoride. Hódie plerisque Europæ locis in hortis pensilibus feliciter, non secus ac suis natalibus in sabuleto depacta adolescit florétque. Scribit Garcias in Aromat. Indicorum Historia, Aloën plurimam nasci in Cambaya, Bengala, aliisque multis locis. Caterum laudatissimam esse in Socotora, quæ inde ad Arabes Persas, Turcos, deniq; per vniuersam Europam defertur, eamque ob causam Aloën Socotorinam appellari. Distare autem Socotoram insulam à freto maris Erythræi. 128. leucis: quare non minùs Arabicam quàm Aethiopicam dici posse, quòd altera parte freti Arabia terminetur, altera Aethiopia. Nec verò succum ex Aloë ex-

Lib. 3. c. 22.

trahi



In cap. 23.  
lib. 3. Diosc.

trahi in quadam duntaxat Socotoræ vrbe, vt scribit Andr. Lacuna, sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus excolta est, verum pagos duntaxat habet cum multis gregibus: neque laterculis ad excipiendum succum subterni pauimentū, vt idem auctor est. Esse autem Socotorinam laudatissimam, non solum vulgari fama, sed etiam à celebribus viris se accepisse asserit. Quin compertum se habere ait, Aloën quidem plerisque aliis Indiæ locis nasci, quæ cum Socotorina deferatur Adem, & Gida, inde terrestri itinere Cairum, postea Alexandriam: vel Ormus, deinde Basora, postea Cairum & Alexandriam: facile tamen dignosci Socotorinam ab ea, quæ in Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur, Socotorinæq; quadruplo maius esse quàm eius quæ aliunde adfertur pretium. Inter reliquas autem notas Socotorinam commendari, quod solida sit, & bene compacta: alterius verò partes non posse perfectè coire, quod succus ex diuersis plâtis collectus sit. Quod verò Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India deferri, alij ex Alexandria aut Arabia, non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primum in Indiam delata est. Alexandrinam autem quidam præferunt, quod superioribus annis pleraque aromata Ormus deferretur, deinde Basora, Adem, Gida, inde camelis Suez, quæ in extremo maris Erythræi sita est, & Alexandriam ad Nili ostiū, vnde Veneri petentes ea reliquæ Europæ communicabant: non autem quod in Alexandria fiat Aloë. Nascitur verò nō modò in maritimis, sed etiam desertis Indiæ locis: eam enim se vbique vidisse ducentarum leucarum itinere terrestri per eas solitudines cōfecto. Hæc tradidit Garcias. Ex quibus intelligere licet quænam sit hodie Aloë Sucotrina, & vnde dicta, cui primum locum statuit Mesues, & alij, secundum Hepaticæ seu Persicæ, tertium Armeniæ, quartum Arabicæ. Extat & apud Plinium Aloës descriptio, sed breuior, præter hanc alia quædam habens, quæ apud Dioscoridē nō leguntur. Aloë Scillæ similitudinē habet, maior, & pinguioribus foliis, ex obliquo striata. Caulis eius tener, rubens medius, non dissimilis Anthetico: radice vna, seu palo in terram demissa, graui odore, gustu amara. Laudatissima ex India affertur, sed nascitur & in Asia: non tamen ea vtuntur, nisi ad vltima recentibus foliis: mirificè enim conglutinat, vel succo. Ob id in turbinibus cadorum eam serunt, vt Aizoon maius. Quidam & caulem ante maturitatem seminis incidunt succi gratia, aliqui & folia. Inuenitur & per se lacryma adhærens minis incidunt succi gratia, aliqui & folia. Ergo pauimentandum vbi sata sit censent vt lacryma non absorbeatur. Fuere qui traderent in Iudæa supra Hierosolymam metallicam eius naturam: sed nulla magis improba est, aut humidior. Erit ergo optima, pinguis ac nitida, rufi coloris, strigilis ac iocinoris modo coacta, facile liquefscens. Improbanda nigra & dura, arensa quoque, quæ & gustu intelligitur. Gummi adulteratur & acacia. Quod Dioscorides dixit Aloën folio esse Scillæ simili, crasso, pingui, modicè lato, rotundo, retrorsus pando, ex vtraque parte, non anteriore aut posteriore, sed à lateribus spinulas habere rariùs extantes, & mutilas. Plinius obscuriùs dicit Aloën metallicam nem habere, maiorem, & pinguioribus foliis, ex obliquo striatam, id est, lateribus ex obliquo laciniatis, & veluti striatis cum spinularum eminentiis: alioqui Aloës folia neque parte aduersa, neque auersa sunt striata, neque in canaliculos excavata, vt autopsia ipsa demonstrat. In Aloë inueniri lacrymam per se adhærentem Plinius ait, Garcias in Aromat. Indicorum historia scripsit nullum eius inueniri gummi certum esse, sed interdum aquam quandam viscidam è foliis stillare, at neglectam & nullius vsus. Idem miratur Plinium tradidisse Aloën metallicam supra Hierosolymam inueniri, qui non solum Medicos Iudæos, verum etiam pharmacopœos qui Hierosolymorum incolas se esse asserbant, diligenter interrogarit de hoc Aloën loco. Sed illi constanter negabant vnquam fuisse repertam huiuscemodi Aloën in tota Palæstina. At Plinius id non affirmat, verum fuisse inquit, qui id traderent. Sed

Lib. 27. c. 4.

Lib. 2. c. 1.



Sed & Dioscorides in præfatione totius operis falsum esse asserit quod Niger dixerit Aloën fossilem (metallicam Plinius dixit) in Iudæa nasci. Probat Dioscorides Aloën *ἡπατική*, id est, hepatis speciem præferentē. Plinius iocinoris modo coactam dixit. Deinde adulterari gummi & acacia, quod & Dioscorides ait. Adulterant ipsam gummi, quod deprehenditur gustu, & amaritudine, & odore valido, & quod non dissolvitur ad minimum usque frustum, dum digitis friatur.

Quidam etiam acaciam admiscunt. Hac in re iis auctoribus fidem adhibendam non esse censet Garcias, quod exigua sit iis in regionibus gummi & acacia copia, imò nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepit. Præterea cum nimia sit illic Aloës quantitas, non adulteratur, sed quia negligentiores sunt incolæ in tollendis sordibus, quas hic succus secum trahit, aliàs alia purior, aliàs impurior videtur. Illud verò non negat, quin in alias regiones translata, illic adulterari possit. Dioscorides herbam Aloën gustanti amarissimam esse scripsit, Plinius gustu

In Exam.  
simpl.

amaram. Anton. Musa negat amaram esse, Pena nostræ insignem amarorem non inesse ait, ne quidem recenti ex Hispaniis in Flandriam Angliamque delata, ubi tamen Aloë factitari dicitur. Quinetiam succum nondum solibus percoctum, ut brumæ tempore, minimum amarum esse, idque cæteris multo aqueo succo permixtis euenire, ut ignavius multo per initia sapiant, deinde maturitatem adepta, perfectioris saporis formam acquirant. Sic lactuca menstrua dulcis est, trimestris cum florem & semen profert amara. Portulaca fatua initio, adulta acida.

At Garcias Aloën herbam non amaram gustu deprehendi miratur: nam sæpe degustaram admodum amaram se gustasse asserit: quòque vicinior pars erat radici, eo amariorem illi visam fuisse, extrema autem folia amarore carere visa. Huius diversitatis causa est calum solumque: iis enim feruidioribus herba eiusque succus perfectius excoquantur, & saporem suum, id est, amarorem contrahunt, quod non nisi tempore euenit eidem herbæ succoque in aliis regionibus minus calidis pro-

Lib. 3. c. 22.

uenientibus. Aloës herbæ succi duo genera tradit Dioscorides. Vnum arenosum, quod purissimæ fax esse videtur. Alterum quod iocinoris speciem præfert. Nec sunt audiendi, inquit Garcias, qui succum ex superiori parte plantæ profluentem eo, qui media aut infima parte profluat, præstantiorem putant: nam omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur. Hodie Sucotrinam Officinæ vocant, cui prima laus. Elus singulas libras ducato emunt Venetiis, si limpida & lucida sit, ex rubro flavescent. Quæ verò Officinæ hepatica dicitur, ubiuis infimi pretij est, arenosa verò & purioris fax, iisdem Caballina vocatur. Nunc de Aloës facultatibus tum ex veteribus, tum ex recentioribus dicendum. Aloë, id est,

*calicina Aloë*

Vires &

Temper.

Lib. 3. c. 22.

herbæ succus, vim habet adstringentem, auctore Dioscoride, somniferam (*ὑπνῶσις*), quidam codices Græci non habent) siccantem, densantem corpora, aluum soluentem. Stomachum expurgat duorum cochleariorum mensura pota in aqua frigida, aut repida. Sanguinis reiectiones cohibet, & morbum regium purgat trium obolorum aut drachmæ vnius pondere pota cum aqua. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut melle decocto excepta, aluum soluit. At trium drachmarum pondere sumpta, perfectè purgat. Mixta aliis purgatoriis medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & inspersa vulnera glutinat, & vlcera ad cicatricem perducit, compescitque. Priuatim verò exulceratis genitalibus medetur, & rupta instantium præputia agglutinat (*ἐπαγώγια πρίστων* præputia vocat, eo quod glandi inducantur.) Condylomata rimasque sedis cum passo sanat (Alij codices habent *συν γλυκερίδιον*, id est, cum dulci vino.) Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas sistit: & digitorum reduuis ad cicatricem perducit. Liores & sugillata cum melle delet. Lippitudines scabras, & angulorum in oculis prurigines lenit. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos



Lib. 27. c. 4.

Lib. 6. sim.

fluentes cum vino compescit. Tonsillis, gingiuis, & omnibus in ore affectionibus ex vino & melle prodest. Ad ocularia medicamenta torretur in testa pura ac candente ligulae subinde versatur, donec æqualiter torreatur. Lauatur, ut quod est arenosissimum subsidat velut inutile, & leue ac pinguisimum assumatur. Plinius eadem ferè tradit. Natura eius spissare, densare, & leuiter calefacere. Vfus in multis, sed principalis aluum soluere, cum penè sola medicamentorum quæ id præstent confirmet etiam stomachum, adeò non infestet vlla vi contraria. Bibitur drachma: ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, cochlearis mensura, bis tervè in die ex intervallis, ut res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur cibis. Capillum fluentem continet cum vino aultero, capite in Sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti imposita ex aceto & rosaceo, dilutiùsque infusa. Oculorum vitia omnia sanari ea convenit, priuatim pruriginis & scabiem genarum: item insignita ac liuida, illita cum melle maxime Pontico. Tonsillas, gingivas, & omnia oris vlcera. Sanguinis excreationes, si modice sint, drachmæ pondere ex aqua: si minus, ex aceto pota Vulnerum quoque sanguinem, & vndeunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Aliàs etiam est vulneribus utilisima, ad cicatricem perducens. Eadem inspargitur exulceratis genitalibus virorum, condylomatibus rimisque sedis aliàs ex vino, aliàs ex passo, aliàs sicca per se, ut exigit curatio, mitiganda ac coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit: dysenteriae infunditur. Et si difficiliùs conquoquantur cibi, bibitur à cena modico intervallo. In regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur & pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, ut quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa pennæque subinde versatur, ut possit æqualiter torreretur. Quod Dioscorides dixit, Aloë duorum cochleariorum mensura potam stomachum purgare *μεθ' ὕδατος ἡ ὑγρὰ καὶ ὁρμητικὴ*, Plinius ait bibi ad dissolutionem stomachi in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, & c. ut aquam tepidam verterit *τὴν ὑγρὰ καὶ ὁρμητικὴν ὕδατος*, id est, aquam lactei teporis. Galenus de eadem ita differt. Aloë herba non admodum apud nos provenit. Quæ in magna nascitur Syria, lignosior est, & facultatis imbecillioris: attamen usque adeò desiccare potest, ut vulnera conglutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cælosyria & Arabia, multò est melior. Optima verò Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentum cognominatum Aloë, ad plurimas res propter siccitatem morsus expertem utile. Est autem non simplicis naturæ, sed, ut indicio est gustus, astringit simul, & amara est. Astringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & ventrem, ut puta ex eorum medicamentorum numero, quæ Graeci ab excernendo stercore *ἐκκοτρωτικὰ* vocant. Itaque tertij est ordinis exsiccantium, calfacientium autem aut primi intensi, aut secundi remissi. Verùm & ipsius facultatis misturam attestantur particularia ipsius opera. Nam & gratum stomacho est medicamen, ut si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & vlcera, quæ ægrè ad cicatricem duci possunt, & maximè quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiam eorum inflammationes aqua liquata, & vulnera ad eundem modum glutinat. Contrahit similiter utenti ad inflammationes in ore, naribus, oculis. In summa videlicet vlcere & discutere simul potest, cum hoc ut parum extergeat, quantum esse non modò sceribus puris non sit molestum. Hæc Galenus. Hodie Aloës vsum esse non modò apud Arabes Turcæque medicos, sed etiam apud Indos in purgantibus medicamentis & collyriis testatur Garcias in Aromat. Indic. Historia, tum etià vulneribus carne explendis: in quem vsum plerumque in suis Officinis medicamentum habent, cui nomen Mocebar, ex Aloë & Myrrha paratum: quo etiam plurimum vntur



vruntur in equis curandis, & vulnerum lumbricis enecandis. Medicum se vidisse ait magni Sultani Badur regis Cambaia, ipsa herba Aloë vtrem pro medicamentum familiari, in hunc modum. Folia Aloë concisa cum sale coquebat, eius decoctiones octo propinabat, quæ aluum sine molestia & nocumento subducebāt quater aut quinque. In vrbe Goa Aloë probè tusam, & cum lacte mixtam propinantiis qui vlcere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt vrinas, non sine magno successu, & agrorum commodo: nam illico curantur. Eius vsus etiam aucupibus notus est, qui contracta auium crura ea conglutinant. Similiter in India maturandis phlegmonis idonea. Recentiores, & docti quidem viri, Arabes medicos insectati sunt, quod affirmauerint Aloë venarum oscula adeo referare, vt inde sanguis fluat, eamque ob causam hæmorrhoidibus non conuenire. Sed iis dudum responsum fuit, longa experientia compertum esse Aloë foris admotam ora venarum claudere, & sanguinem sistere, intrò verò sumptam, illis præferri qui hæmorrhoidibus vexantur, sanguinem attenuare, calfacere, deducere ad ora venarum, ipsaque adeo vasorum extrema referare, quod & alij succi multi faciunt, vt Porri, Vrticæ, Myrrhæ, quauis calidi & sicci. Siluius scribit Aloë calore & crassa substantia venas tum hepatis, tum hæmorrhoidas aperire: anastomata enim esse maximè quidem calida, crassa, acria & mordacia, non minimum tamen calida, & crassa, qualis est Aloë: foris verò admotam vasis sanguine fluentibus, ipsum sistere facultate sua adstrictoria, & valde sarcotica. Clusius Aloë à

In Mesu.  
cap. i.  
lib. purg.

*ALOE Americana,  
Clusij.*



vulgari planè diuersam primus, quod sciam, ostendit. Eam & plures alias illi acceptas referere debemus. Multa illi sunt folia, inquit, hominis longitudine, saturatius virentia, læuia, inferiore parte trium aut quatuor digitorum transversorum crassitudine, & valde lata mutuo sese amplectentia, vt in vulgari Aloë & Alphodelis, sensim verò in mucronem desinentia, qui nihil aliud est quàm scina nigricans, crassa, duos digitos transversos interdum longa, & adeo firma, vt Americi pro subula vtantur, cupidisque vice suis telis adaptent. Foliorum latera quæ tenuiora sunt, spinis eiusdem coloris horrent, sed breuioribus, basi latiore, & deorsum recuruis vt in Rhamno tertio, interiore parte fibrosa. Sunt hæc folia succi plena amari, & acris. Ex eorum medio caulem enasci intellexit Clusius (neque enim vidit) brachiali crassitudine, & breuioris lanceæ altitudine: radix est crassa, oblonga, incurua, & veluti internodiis distincta, è cuius geniculis ad latera adnascuntur aliæ plantæ. Primum hanc plantam sibi demonstratam fuisse ait Clusius à D. Ioanne Placa Medico & professo-

Aloë Americana.  
Forma.

re Valentino, primo ab vrbe Valentia lapide in Monasterio D. Virginis sacro, cui cognomen de IESU. Postea aliis etiam locis obseruauit. Erutam autem vidit omnium maxima radice in suburbanis Petri Alemani, duorum ferè cubitorum longitudine, ad cuius latera triginta ferè pumilæ plantæ enatæ erant,



ex quibus detractas duas in Belgium detulit. Earum vna à Petro Coldebergio pharmacopœo fata Aloën produxit, ex qua iconem delineandam curavit, ne quis putet vulgaris Aloës esse. Viuax est, multosque annos durat, radice multipliciter sese propagans, cuius rei gratia, & propter spinarum rigiditatem Indi seu Americi circa agros ferunt, ad eos communiendos, & fures arcendos. Valentini filij *Aguilla* vocabant, id est, filum & acum, quod foliorum extrema spinæ, acus, & fibræ interiores fili vicem præstent, Indi *Magny*, & *Mel*, nonnulli Hispani *Cardon*, ob aculeos. Magno in vsu est apud Indos, vt refert Gomara ad finem historiæ Mexicanæ, cuius verba, quod integram huius plantæ historiã contineant, adscribere hîc libuit ex Clusio. *Mel* nonnullis *Magny*, aliis *Cardon*, arbor est duplici hominis statura, aut altius crescens, crassitudine coxæ hominis, parte inferiore crassior & densior, deinde sursum in pyramidem desinens vt Cupressus. Quadragena illi folia, regularum prope modum amplitudine, & eodem modo canaliculata, sede inferiore crassa, & in mucronem desinentia, lateribus tenuiora, & crassa spina mucronem occupante. Tanta circa Mexico copia nascitur, quanta apud nos vites. Profert spinam, florem, & semen. Ex ea ignem struunt, cuius cineres parando lixiu idonei: truncus loco ligni est: folia regularum aut imbricum. Eam cadere solent antequam nimium adolescat: tum enim radix crassior fit, qua excavata liquor quidam colligitur, qui Serapij modo illic densatur: is aliquantulum coctus mel fit, depuratus saccharum, dilutus aceti, & addito Ocatli (radix est, quam, ob eius præstantiam, Vini medicinam nominant) vinum, illis quidem in vsu, sed parum salubre: etenim caput ferit & inebriat: nullum autem cadauer, nulla impura sentina adeo foetet, atque eorum anhelitus, qui eo vino inebriati fuerint. Ex huius germinibus & tenellis foliis fit conferua. Foliorum prunis assatorum succus recentibus vulneribus aut vlceribus instillatus, breui ea curat. Germinum & radicum succus, cum Absynthij illius regionis succo mixtus, viperarum moribus vtiliter instillatur. Illius foliis paratur charta in vsum sacrificiorum & pictorum, & ex iis lini aut cannabis modo paratis fiunt Alpergates (calcei genus Hispanis admodum familiare, ex funiculis contextum.) storeæ, chlamydes, cingula, funes: denique illis sunt cannabinum filum. Horum foliorum cuspides seu spinæ adeo firmæ sunt & acutæ, vt illis acus aut subula vice sint, eos cum fibris extrahendo. Istis spinis sacerdotes illius regionis in sacrificiis se pun gere solent: etenim cuspis non frangitur, & satis altè penetrat, exiguo facto foramine. Hactenus Gomara. Addunt quidam, Americanos Veneream lueni hac planta curare solitos hoc modo. Eius fragmentum in minutas partesiectum, ollæ canthari aquæ capaci impositum, trium horarum spatio decoquebant, olla prius luto obturata: eam deinde apud ægrum positam aperiebant magna fumi copia inde exhalans multum sudorem excitabat. Aut folium huius plantæ prunis impositum assabant, cuius fumum æger excipiebat: sed adeo vehementes sudores inde excitabantur, adeoque vires collabebantur, vt vix æger ferre posset, tametsi triduo duntaxat vteretur. Ex eorumdem foliorum fibris reticula contextuntur, & indusia conficiuntur. Hæc Clusius.

RHABAR





PVD Arabes & recentiores duæ radices peregrinæ Rha nomine designantur. Quæ res atque vtriusque stirpis ignoratio fecit, vt plerique, num eiusdem plantæ radices essent, ambigerent. Verum rerum inspectio atque accurata collatio totam litem diremit, docuitq; Rha-

*Vide Physic. pag. 166.*

*Locus.*

ponicum à Rhabarbaro plurimum discrepare. Primum Rhabarbari præcis incogniti historiam perscribemus. Nascitur id in montibus Singui ciuitati Indiae propinquis, quæ à frequentissima & ditissima ciuitate omnium, quarum extat memoria, Quinsai quatuor dierum itinere distat. Vtraque verò regionis amplissima, & in multa regna diuisa, quam Mangi vocant, ditionis est. Singui terræ ciuitatem indigenarum lingua significat, Quinsai verò cæli. Quod illinc Rhabarbarum adfertur, Indicum nuncupant. Id autem perpaucum est, tum quia ipsæmet gentes id consumunt, tum quia pauci mercatores, cum quibus sunt cõmercia, eò usque penetrant, tum quia minore sumptu & periculo ex Armeniæ ciuitate, quam Tauris nominant, (Terua prolemai quidam esse arbitrantur, alij Arsamoten Plinij) aduehitur. Gignitur & in Prouincia Scythiæ orientalis Tartarorum Imperatori subdita, quam Tanguth vocant, in montibus oppidis Campion & Succuir vicinis (Succuir Sarangas à Plinio dici quidam suspicantur.) A' Tauris, quæ Armeniæ maioris caput est, ad eas vrbes iter patet centum & octoginta dierum, his stationibus. A' Tauris ad Sultaniam ex ruinis Tigranocertæ adificatâ sex diebus peruenitur. A' Sultania ad Casibin (Cosias esse aiunt) quatuor. A' Casibi ad Veremi, sex. A' Veremi ad Eri Arianorû caput, vt quidam volunt, quindecim. Ab Eri ad Bachora (in Chorasmiis siue Choraxiis oppidum id est, Chorasam prouinciâ vocant. Sunt qui Berdrigeos Plinij esse credunt, alij Bactrianos) viginti. A' Bachora ad Samacand (Margianæ caput nonnulli esse autumant, alij Sogdianorum) quinque. A' Samacand ad Cascar (Commanos Plinij quidam esse volunt, alij Aracosios) viginti quinque. A' Cascar ad Acfu (Atasini sunt Plinij quorundam iudicio) per desertas ac vastas solitudines, viginti. Ab Acfu ad Cuchia, viginti. A' Cuchia ad Cialis oppidum, decem. A' Cialis ad Turfon (fortasse Tagas esse Plinij non male quidam opinati sunt) decem. A' Turfon ad Camul, quod iam prouincia Tanguth continetur, tredecim Hucusque Machometum colunt, idè Musulmani dicti. A' Camul ad Succuir quindecim. A' Succuir ad Ganta, Gandaros Plinio nonnullorum opinione dictos, quinque. A' Ganta ad Campion, sex. Itineris spatia viatorum & mercatores parasangis metiuntur, quas adhuc farsing vocant veteri nomine, sed corrupto. Via facili, nec montibus impedita, nec solitudinibus homines iumentaque siti ac fame necantibus intercepta, octo parasangas, id est, 24. miliaria Italica conficiunt singulis diebus. Nam parasanga tribus miliaribus Italicis proportionem responder. Campionenses ac Succuirini Rhabarbarum sua lingua *Nomina* *Rauend Cini* vocant, quod non rectè quidam nunc *Raued Seni*, nunc *Raued Sceni* appellant. Cuius nominis proprietas controuersiam dirimet inter medicos nostri seculi agitatam, cur ita vocetur, contententibus aliis Sinicum nominatum esse à Sinis extremæ Indiæ populis, aliis Scenicum, vel Sceniticum à Scenitis Arabiæ gente, aliis à Scenitis Parthorum natione, qui Ariæ & Margianæ montes habitant: quæ postrema sententia plus habuit ponderis quam reliquæ duæ, cum Arij, Margiani, Aracosij, & alij populi prouinciæ Tanguth Campionensibusque finitimis communi vocabulo Cini & Maucini etiam hodie nominentur. An verò à Troglodytis Æthiopiæ, quos *Ἰνδοί* Barbaros nuncupasse videtur antiquitas, Rhabarbarum sit appellatum, facile diiudicari potest. Nam Æthiopiam & eius Troglodytas Lusitanorû nauigatio nobis patefecit, quibus in locis nec Rhabar-



barum prouenire, nec inde ad nos mitri cōpertum est. Quod verò in Ægyptum per sinum Arabicum camelis deportant, ex Armuzo, nunc Ormus, & Teredone, nunc Balzera, ad Euphratis ostia sitis, & aliis ciuitatibus Caramania maritima mercatores aduehunt, in ea loca secundo Euphrate, id Barbarum potius nominatum crediderim, ab earum gentium immani feritate, quæ in montibus suis collectum ad nos transmittunt. Quondam enim totus is tractus desertorum vastitate, & tam longo itineris à nobis intervallo diffusus, vix solis nominibus cognitus fuit. M. Paulus Venerus viam, quæ è Carmania ad Tanguth ducit Cobinam, Timochaim veterum Arbelitin, in qua Darium Alexander vicit, Sappurgan, Balac, Thaïcam, Scassam, Balaxiam, Balscia, Chesmur, Comaros Plinij, Vocham, Ocanos Plinij, Caschar distinctè tradidit. At verò Chagi Memer è regione Chilam ortus prope mare Caspium ex oppido Tabas, mercator summe fidei, acutissimique ingenij apud Succairinos & Campionenses emendi Rhabarbari causa aliquandiu commoratus, alteram viam suprâ descriptam, quæ è Terna Armenia cō proficiscuntur, rectam & compediōsam docuit: ex cuius narratione magnam horum partem nos sumpsisse ingenuè fatemur. Rha Turcicum Mesuridem esse cum Rhapontico Græcorum nemini dubium esse debet. Ad ripas fluminū Rha, nunc Volga, Edel, Elatach, (tot enim nominibus appellant,) Borysthenis, nunc Neper, Tanais, nunc Tana, vel Don, id crescit, vt & Acorus. Turca, qui olim vltra Tanaim sedes habuere prope Sarmatas Zygos, nunc Circassos, in partibus illis campis, in quibus nunc Tartari Harmatotrophi, siue Hamaxobi, per Hordas, id est, turmas vagantur palantes & errabundi, Rhaponticum ad exteras nationes mittebant: vnde Turcicum cognominatum. Scribit Pena multis ab

Rha Tur-  
cicum si-  
ne Ponti-  
cum  
Locus.

## RHA CAPITATVM,

Helenij folio.

Forma.



hinc annis Rha ex semine Turcico nonnullos habuisse in hortis Gallia & Flandria quod magno studio cultum ibi viguit, foliis Personata, sed non perinde laeis, longioribus, Helenij vel Verbasci, in ambitu ferratis & fimbriatis, a uersa parte virentibus, a uersa lanuginosis, caulem rectum sesquipedalem & cubitalem amplexis, capite fastigiatum, foris squamulis loricato, ac per maturitatem staminibus purpureis pleno, vt in Cynara, & Cardui purpureis, senariis, dum circa Iunium & Iulium maturuit, Centaurij maioris, vel Cartami, longiore: radix fungosior, maior, & Rhabarbaro similior quam Cœnario. Id pinxerunt Dodonæus & Lobellius. Hinc capitato Rheo valde affine est, inquit Lobellius, quod ex Italico semine alunt horti quidam Belgici: sed folia angustiora multo, acuto Lapathio paria, a uersa parte incana: caulis rectus, capite fastigiatum, squamulis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui cōcoloribus, pleno: semen Cnici siluestris, cōpressum, aggregatum, maturefcit in Belgio: radix Centaurij maioris, fungosior. Hoc ex Lobellio pictum est ciuitatis ad Rhabarbari historiam reuertatur oratio. Succurrit ampla & frequens est ciuitatis ædificiis ornata sumptuosis & magnificis, è latere constructis, augustinis, iniquis, perba delubris, ex saxo & marmore compositis. In planitie iacet, innumere, diuini canalibus rigua. Quare omnibus rebus hominum vitæ necessariis abundat.



serico præsertim, quod illic plurimum Mori nigra foliis pasti bombyces nent. Vites quidem locus is, nempe frigidior, dedignatur. Vini loco potum zytho similem adiecto melle incolæ parant. Cætera, illorum ager Malorum, Pyrorum, Armeniorum, Perficorum, Melonum, Cucumerum fertilissimus est. Rhabarbarum ubiuis in ea provincia gignitur, sed præstantissimum in quibusdam montibus Succur propinquis, editis, saxosis, siluis diuersissimarum arborum, opacis, fontes plurimos effundentibus, terra rubra, crebris pluuiis fontiumq; scaturiginibus riguisq; semper lutosâ. Caulem ab radice profert viridem, palmi altitudine, quem

Rhabarbarum.

RHAPONTICVM alterum  
angustiore folio, Lobell.

RHABARBARVM,  
Matthioli.



circundant: folia multa, palmos duos longa, tamen pro ætate planta longiora, aut breviora, una parte angusta, in summa latiora, rotundata, in terram inclinata, tota habitu lanuginosa, cum adoleſcunt viridia, cum ſenſcunt flauescencia, & humiliora, procubentia. Ex medio foliorum stipula u cauleculus, sine ſurculus prode, flores ſunt, hic illic nullo ordine emergentes, ex candido purpureſcentes, Viola nigra, ſive Martia ſimiles, maiores, odoris vaſidi, grauis & inuicundi. Radix ad duos pedes, terram ſubit, cortice ſulco obducta craſſitudine diſpari, ſicut rami, radices quadam tenuiores, quædam craſſiores, ſed nonnunquam tanta craſſitudine, ut ſi ſuræ & coxæ hominis non cedant. Ex his fibræ multæ radice emittuntur, circumquaque per terram ſe ſpargentes. Planta è terra folia quod à terra ſe, nimirum ante Maij finem, cum illis gentibus Ver incipit, præſentem ſunt, coriandula ſolia, ſucco intorſum reuocato plenior & habilior, adeoq; lene, præſentior radix turgere, ſcilicet radicle primùm reſecantur & reſecantur, inde trunco, elut truncus in fruſta conciditur, qualia videmus in Sepalijs. Eſt autem in radice, venis diſtincta, colore rubro pulchre nitentibus, ſucco luteo, quo reſecata, quo manus inſicit, ſic lento & gluſinoſo, ut contactu ſcilicet digito inſectæ ſaporis tam amari, ut guſtari nequeat. Fruſta protinus radice diſſecta non appendantur, ut ſicceſcãt, ſic enim luteus ſuccus totus effluat, & reliqua, quædam.



& exhausta radix, fieret facultate imbecillior, & bonitate inferior, sed super melis & tabulis disposita, quotidie ter, aut quater inuertuntur, ut quod superne est inferne collocetur: hac enim ratione succus non adimitur, sed in radice veluti coactus & concretus manet, radice nisi confestim ea diligentia adhibeatur, effervescente ac inarescente. Post quartum demum, aut sextum diem pertusa frustra funiculis adactis ligata suspenduntur loco perflato, aëremq; liberè admittente, sic tamen ut folijs radiis non feriantur. Hoc pacto exactis mensibus duobus siccatum Rhabarbarum egregium reconditur. Ex septem plaustris recentis, cum siccatum est, vix restat quod equum oneret. Effossa per astatem radix folijs iam enatis, & adultis velut immatura, nec succo luteo mader, ut quæ per Hyemem effoditur, & fungosa, rara, levis, arida est, bonitateq; ab altera multum superatur. Qui in montia pergunt, ut Rhabarbarum emant, quale effossum est, siue cum folijs, siue absque folijs plaustris imponunt, ac vehes singulas in plana deductas sexdecim Saggiis argenteis vendunt. Cux autem monetæ nullus apud illos usus: argentum vnius Saggi in virgas oblongas malleis ducunt, eas deinde in particulas ponderis vnius Saggi diuidunt, qui valet argenteos solidos Venetos circiter viginti, aureus verò nummum aureum cum dimidio. Id pro moneta est. Emptum mercatores, vti iam dictum est, præparant. Id incolæ, quod admiratione dignum est, nullo in pretio habent, ne effossuri quidem, nisi ab externis mercatoribus eò conuenientibus, & deposcentibus, pretio sollicitarentur. Indi & Chineses mercatores maiorem partem collecti, & præparati auferunt. Cataini ad purganda corpora, & aia medicinæ remedia, id non usurpant more nostro, sed eo tuto, & cum alijs confectio- nibus perquam odoratis mixto, Deorum quos adorant simulacra & imagines sus- fiunt. Multis in locis tanta est huius radices copia, ut pro ligno siccata vane. Quidam tam paruifaciunt, ut equis languentibus, & agris assidue comedendam obiciant. Longè pluris æstimatur Catainis radice Mambroni Cini vocata, cum Rhabarbaro nascens, ad varias ægri tudines laudatissima, ob idque nobilissima, sed ad oculorum morbos præcipuè. Nam ea in cote trita ex rosacea, & assuta, oculorum dolor euertit sedatur. Ad nos eam non conuehant, propterea quod solo nomine celebris, cetera ignota est. Apud Catainos in prouincia Chianfu herba quoque nascitur Chiai Catai nominata, vniuersis eius regionis populis commen- datissima. Foliorum & aridorum & virentium decoctum cyathus vnus vel alter bi- bitur quam calidissimè bibi potest, aduersus febres, dolores capitis, lateris, arthri- lorumq; remedio inter alia efficacissimo, & ad alios plerosq; morbos. Tardiorum quoque ventriculi concoctionem decoctum id sic iuuat, ut eius grauitati ob cau- dum cibum contractæ facillè medeatur, & feliciorum, ac celeriorum concoctio- nem præstat. Ob has nimirum dotes Catainorum quisque hanc secum herbam aliquo peregrinaturus gestat, ut subitis eorum morborum causis occurrat. Tanta ob id est huius plantæ dignitas, ac æstimatio, ut Rhabarbaro plenum succum eius sola vacia gens illa lubentissimè permutet, atque adeo iactet: Per sis, ac Francis si ea planta innotescat, mercatores Rhabarbarum amplius non postulatu- ros. Adue- nas non absque periculo in montes Rhabarbari feraces conscendere narrat le- gendi gratia, nisi eius prouinciæ iumentis vehantur. Illic enim venenatam quan- dam herbam nasci, qua gustata veterinis vngula decidant: equos verò eorum cum ordine secundo potius quam primo, auctore Mesue. Substantia duplici constat, vna aquea, terrea adstringente, in corporis molè cœcreta, profunda, & ignea, a qua rarum efficitur, superficialia, quæ suam terream substantiam aduren- do amaram efficit, ac purgatoriam, & obstructa liberantem. Clemens est & excellens

Mambroni  
Cini ra-  
dix.

Chiai Ca-  
tai herba.

Temper.  
Lib. pug.  
cap. s.

Vires.



excellens medicamentum, multas dotes medicamento purganti maxime expetitas complexum. Huius substantiæ macerando separantur, vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem pituitamque illa vacuat, præcipue à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde natos, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putridas etiam diurnas, dolorem hypochondriorum puncturum. Hac insuper hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarum partium sistit, ex casu quoque aut ictu contusa, rupta, fracta, interna & externa sanat, si eius drachma vna cum mumia granis duobus, & Rubiæ tinctorii grano vno & dimidio ex vino austero bibatur (mumia & Rubiæ non ita valentium medicamentorum mensura hîc est parior, vt mendi suspicio sit, inquit Siluius, præsertim cum Auicenna Rubiæ drachmam vnam Rhabarbaro addat.) Oleum quoque eius contusis & confractis musculis vtiliter illinitur: singultû & dysenteriam sanat, præcipue assum, & cum succo Plantaginis è vino austero potum. Innoxium est Rhabarbarum: omni tempore tutò datur: omni est ætati salubre, atque adeò pueris, & prægnantibus. Efficacius autem agit sumptum ex sero lactis, præsertim caprini, aqua quoq; Intybi, aut Apij, vel Plantaginis cocta & colata maceratum, idq; omnino cum Spica nardiationem eius iuuante imprimis, expressumq;. Quòd si ad liberandas obstructions propinandum est, vini albi puri & odori modicum macerando admisceatur, expressumq; eius tunc sumatur, & cum deterfione ac purgatione opus est. Quòd si post purgationem viscera adstringendo roborari volumus, puluis eius triti datur, si adstrictio magis expetitur, assum datur, si maxima, vltum.

## AGARICVS.

## CAP. XXX.

**ΑΓΡΙΚΟΣ** vel **ἀγρίκος** Græcis dicitur, qui Agaricus Latinis & **Nomina**  
 Agaricum, Mauritanis *Garichum*, siue *Garicum*, Hispanis & Italis *Agarico*, Germanis *Dannenschuam*, quasi fungus Pinorum, aut potius Abietum & Laricum, Gallis *Agaric*. Agaricum gentile nomen sibi addiuit, ab Agaria Sarmatiæ regione, in qua nascitur, teste Dioscoride, vel ab Agaro, quem & urbem, & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolemæus. Appianus Alexandrinus Agaros Scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitam refert: propter quod Mithridates eos apud se habuerit. Agaricum scribit Dioscorides radicem dici Silphio similem, non ita densa superficie sicut Silphium, nam tota rara est. Duo eius genera. Vnum mas, alterum fœmina, quæ etiam præfertur, rectos venarum discursus intus habens. Mas rotundus est, & vndique eadem substantia compactus, *ἡ δὲ συνολοχὸν συμφύει*, cuius videtur sensus esse accommodatior iudicio And. Lacunæ, atque vniformis vndique. Nam cum dixisset Dioscorides, Agarico fœminæ inesse quosdam venarum discursus rectos, assignat postea differentiam in masculo, dicens ipsum esse rotundum, & per omnes partes sui similem, vniformem, atque eiusdem substantiæ & naturæ: id quod inter alia *συμφύει* significare solet. Huic interpretationi adstipulatur Serapio, qui sic vertit. Sed est tota eius substantia continua. Gustus utrique similis, initio dulcis, mox cum salina mader (*ἔστι δὲ ἀνὰ δόσεις*). Nascitur in Agaria Sarmatiæ regione. Quiddam plantæ radicem esse aiunt. Alij in truncis arborum ex putredine, veluti fungos, nasci tradunt. Prouenit etiam in Galatia Asia, & Cilicia, in Cedris, sed friabile & infirmum. Galliarum glandiferæ arbores Agaricum ferunt, inquit Plinius. Est autem fungus candidus odoratus, antidotis efficax, in summis arboribus nascens, nocte relucens. Signum hoc eius, quo in tenebris decerpitur. Et alio in loco, Agaricum vt fungus nascitur in arboribus, circa Bosphoron, colore

Lib. 7. c. 1.  
 Forma.  
 Genera.

Locus.

Lib. 16. c. 8.

Lib. 25. c. 9.



AGARICVS, *Math.*Li. purgan.  
cap. 5.Vires &  
Temper.  
Lib. 3. ca. 1.

Li. 6. simpl.

colore candido. Datur obolis quatuor contritum cum binis cya. his aceti mulsi. Id quod in Gallia nascitur, infirmius habetur. (Alij codices habent Galatia pro Gallia. Et sanè Dioscorides in Galatia Asia nasci dixit. Et hodie in Gallia nasci certum est.) Præterea mas spissior amariorque. Hic & capitis dolores facit. Fœmina solutior, initio gustu dulcis, mox in amaritudinem transit. Agaricus Galeno radix dicitur, quæ trunco innascitur. Mesua verò Agaricus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vetustate iam putrescentium, & erosarum, tanquam earum vel apostema, vel fungus. Est autem is duplex, mas & fœmina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis, & in fragmētis ceu villos nervorum ostendit. Fœmina si rotundior, alba, porosa, & rara valde, & frangi facilis, levis, dulcis primo gustatu, mox amara & styptica, est melior, præcipuè summa corporis sui parte. Nam stipes, quod ligni putrefacti aliquid præ se ferat, malus est, ut erosus Agaricus.

Hodie cum seplasiis omnibus notissimus sit Agaricus, & quotidiano usu tritus, tamen Dioscoridi vix notum fuisse perspicuum est, ut qui radicem dici Silphio similem scribat, deinde hæsitans subiungat, aliis radicem esse plantæ, aliis fungum arborum truncis innascentem quadam putredine. Agari igitur fungum esse certum est, qui præter arbores glandiferas nascitur, præcipuè in Larice, in qua præstantissimum in Ananiensibus montibus se collegisse ait Matthiolus. Vim habet calfaciendi & adstringendi, auctore Dioscoride, efficacem ad tormina, & ad cruditates, ruptaque, & casus. Duorum obolorum pondere datur non febricitantibus ex vino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Datur hepaticis, asthmaticis, in morbo regio, dyssentericis, nephriticis, in vrinæ difficultate, in vteri strangulatu, & in vitiato colore, drachmæ pondere. Tabidis autem cum passo, splenicis cum aceto mulso, stomachicis ita ut est manditur ac deuoratur sine vlla humoris sorbitione, similiter acidum ruçantibus. Sistit sanguinis reiectiones trium obolorum pondere cum aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum dolores & comitalem morbum, si pari pondere cum aceto mulso sumatur. Ducit & menses: fœminis vteri inflatione vexatis vtiliter æquale pondus datur. Rigorem soluit ante febrium accessiones datum. Alium purgat drachmæ vnus, aut duarum pondere potum cum aqua mulsa. Est lethaliū medicamentorum antidotum, si cum diluta vini portione drachmæ vnus pondere sumatur. Serpentum plagis ac moribus trium obolorum pondere cum vino potum auxiliatur. In summa, internis omnibus vitiis conuenit pro viribus & ætate datum, aliis cum vino, aliis cum aqua, aliis cum aceto mulso, aliis cum aqua mulsa. Galenus eius naturam sic declarat. Primū gustui dulcem esse, sed paulo post amarum apparere, & acrimonia quandam speciem temporis spatio inducere, leuiculæq; adstrictionis, & consistentia esse laxa. Quare compositum esse ex substantia aërea, & terrea, à caliditate extenuata, præterea minimum habere essentia aqueæ. Hæc ratione & digerendi vim habere, & crassitudinem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi. Ob id regio morbo laborantes sanare, eos utique qui sic ab infarctu



factu iecoris laborant. Iuuat & comitiali morbo obnoxios eadem facultate. Tum rigores per circuitum recurrentes, ex crasis aut viscolis humoribus natos sanat. Iuuat & demorfo à bestiis frigore ludentibus, aut compunctos, tam foris in affecta parte impositum, tam intrò in corpus sumptum pondere drachmæ vnius cum vino diluto. Est & purgatorium. Hæc Galenus. Hodie Agarico siue simpli, siue in trochiscos coacto in purganda pituita vtimur. Nam, auctore Mesue, pituitam crassam, lentam, putrem, & bilem flauam & atram vacuat, à cerebro, neruis, musculis, sensuum instrumentis, spina dorsi, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, vtero, iuncturis. Ob id medicamentum familiarè à Democrito dictum est, quòd ad omnes partium internarum affectiones conferat: viscera reddit imbecilla: ob id tergentibus miscetur, ne in ea virtus eius altius penetret.

Li. purgat.  
cap. 3.

## HIPPOPHÆS.

## CAP. XXXI.

**N**ENIT & i's quæ lacteum succum fundunt Hippophæes annumerandum. Frutex (inquit Dioscorides) est *φρυγανώδης*, siue surculaceus, vndeque densus & amplius: folia ei oblonga veluti Oleæ, angustiora tamen & teneriora: inter quæ spinæ sicca & candicantes emicant, articulata, interstitio quodam distantes: flores Hederæ corymbos referunt, racematin coherent, sed tamè minores mollisque, & ex albedo partim rubentes: radix crassa & mollis, succi plena, gustu amara, ex qua veluti ex Thapsia succus colligitur. Anguillara radicem refert palmum esse longam vel maiorem, & ex

*vide suo pag. 1440*

HIPPOPHÆS, Dodon.  
ex Cod. Casareo.



hac fracta aut vulnerata succum manare tenuem, lacti concolorem, gustu amarissimum, odore grauem. In maritimis, ac sabulosis, vt Dioscorides scribit, nascitur. Anguillara arenosis & maritimis locis in Peloponneso à se repertum refert. *Ἰπποφάης* Græcis, Latinis quoque Hippophæes dicitur: à Plinio lib. 22. cap. 12. (nisi corrupta vox) Hippophyes. Hippophyes, ait, in sabulosis maritimisq; nascitur, spinis albis: Hederæ modo racemosa est, candidis & ex parte rubentibus acinis: radix succo mader, qui aut per se conditur, aut pistillis farinæ. Extant verò & inter nothas appellationes quædam huius nomina: vt, Hippophanes, Hippion, Echinion, Pelecinon, & Lappago, quæ tamen Aparinæ conuenit: nostra ætate ab indigenis Peloponnesi *ἀργυράνῃ καλαμίῃ*, id est, Spina purgatoria vocatur. Ab Hippophæ differt Hippophæstum, quod tamen & Hippophæes aliqui (Dioscoride teste) appellant: à Plinio Hippope (nisi & hîc vitium) dicitur. Spinæ fulloniæ genus est, absque cauliculo, flore, aut fructu inanibus tantum capitulis, foliis paruis

spinosis, radícula molli & crassa, ex qua cum foliis & capitulis succus exprimitur. E Narbonensi Gallia, inquit Ruellius, Hippophæstum vidimus spinosis capitulis, sine flore, sine cauliculo, minutis inter aculeos foliis candidi. antibus. Debent (Plinio auctore) Hippophæes & Hippophæstum accommodata esse equorum naturæ, neque ex alia causâ nomen accepisse: quippe quædam animalium remediis nascuntur



1706 HIST. OMNIVM PLANT. CATHART. LIB. XVI.  
nascuntur. Est verò Hippophaës, præfertim verò radix ipsius ac succus, calidæ  
siccaq; facultatis, & simul valenter purgantis. Succus syncerus radice huius pi-  
tuitam, bilem, & aquosos humores detrahit oboli pondere: cum farina verò sub-  
actus quatuor obolorum. Saluberrimè autem cum aqua mulsa exhibetur.

In comitiali morbo, vt Plinius ait, vtilissimus. Frutex verò ipse sicca-  
tus tunditur, tritusque cum aqua mulsa exhibetur. Extrahitur  
quoq; succus è radice, foliis & capitulo Hippophæsti, qui  
& ex aqua mulsa pituitam & aquam detrahit, &  
præcipuè comitialibus morbis, neruo-  
rum vitiis, & Orthophncæ,  
vt Dioscorides tradit,  
conuenit.

\* \*

HISTOR





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER DECIMVS  
SEPTIMVS,

In quo describuntur & ad vinum depinguntur Planta Venenata.

PAPAVER. CAP. I.



ATHARTICA, & quantitate & qualitate malefica, graues corpori noxas inuehant, non solum quæ deleteria, vt Thymelæa, Lathyrus, Euphorbiū, sed etiam quæ benigna vocitantur, nisi necessariae conditiones obseruentur. Quare illis venenata ordine subiungenda, quæ principes corporis nostri partes, & virtutes ipsum gubernantes ita opprimunt, atque vincunt, vt necessariò mors consequatur. Vt igitur de Cathartice plantis libro superiore, ita hoc de Venenatis agemus, quas sceleratis, & qui ad hominum perniciem

his abuti voluerint, ignorasse præstiterit: probis autem, & iis qui ad hominum salutem naturæ rerum arcana scrutantur, cognitu hæc sunt necessaria, tum vt doceant homines, ne ab iis imprudentes fallantur, aut si quando per imprudentiam harum quampiam sumpserint, tunc quoque innoxia fiant, atque irrita, tum vt iis succurrant, qui iam noxam sentiunt. His adde, quod morbis quibusdam venena sunt salubria, malefica tamen vi eorum modis omnibus, vel saltem quibus nobis licet, fracta. Venenatas autem non omnes, quæ cognita sunt, hic persequimur. Quasdam enim, vt Taxum, Nerium, Cicutam, Coriandrum, similitudine ducti in alias classes digestimus: sed plerasque, & eas notiores, quale est Papauer, Græcis *μῆλον*, Arabibus *ῥαζα*, & *Chasceas*, Gallis *Pauot*, Italis *Papauero*, Germanis *Mayfomen*, Hispanis *Dormidera*. Officinæ Papaueris nomen retinuerunt: *μῆλον* quidem à *μῆλον* id est, a non operando dicitur, quia vineti papauereo sapore sensus stupefacti; membra nihil queunt agere, vel *παρὰ τὸ μῆλον*, à proceritate, siue longitudine. Multa sunt Dioscoridi Papaueris genera. Vnum est Papauer Rhœas, Erraticum nuncupatum, de quo in Agro diximus. Alterum satiuum, *μῆλον ἡλιερος*, cuius vnum genus est hortense, *μῆλον κρητὸν*, *ῥαζα*, semine albo: alterum siluestre, semine nigro: tertium magis siluestre, Arabibus *Seil*. Hortense vocat Dioscorides quod in hortis frequentissimè seratur, cetera duo siluestria, non quæ non serantur. (Nam non solum in hortis seruntur, sed etiam in campetribus, segetum & leguminum modo) sed quod asperiora sunt tum caulibus, tum capitibus, tum foliis, nec tam domestica, quam hortensia. Præterea est *μῆλον κερποῖς* id est, Papauer cornutum, siue corniculatum, Arabibus *Almacharam*, & *μῆλον ἀφράδης*, id est, Papauer spumeum.

FFF

Nomina

vide *Phlegm. pag. 30*

Genera.



- Lib. 19. c. 8. Plinius multa quoque fecit genera, sed non tam perspicue distincta. Papaueris latini tria genera, inquit: candidum, cuius semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur. Hoc & panis rustici crustæ inspergitur, affuso ouo inharens, ubi inferiorem crustam Apium githq; cereali sapore condiunt. Alterum genus est Papauer nigrum, cuius scapo inciso lacteus succus excipitur. Tertium genus Rhœam vocant Græci, &c. De reliquis generibus Papaueris alio in loco dicat. Siluestrium vnum genus, Ceratitin vocant, nigrum, cubitali altitudine, radice crassa & corticosa, caliculo inflexo vt cornicula. Folia minora & tenuiora quam cæteris siluestribus: semen exile, tempestiuum est mēsisibus. Et paulò post. Alterum è siluestribus genus Heracleum vocatur, ab aliis Aphron, foliis (si procul intuearis) speciem passerum repræsentantibus: radice in summa terræ cute: semine (putrimento). Ex hoc lina splendorem trahunt æstate, &c. Tertium genus est Tithymalon, Meconia vocant, alij Paralium, de quo alio iam diximus. Theophrastus etiam Papaueris siluestris genera annotauit, ex quo Plinius superiora mutuatus est. *ἡ κερατίνη, ἡ ὁ μάλιστά, τὰ δὲ φύλλον ὡς φλόγας τῆς μελάνης, ἥτις δὲ μέλαν. τὰ δὲ χαυλὴ ὁ ὕψος, ὡς παχυαῖον, ῥίζα ὁ βραχέστα, καὶ ἐπιπύλαιος: ὁ δὲ χαρπὸς χαμπύλος ὡς περ τῶν κερατίνων. συλλέγει δὲ περὶ παντοδαμοῦ δὲ καθαίρει κοιλίαν. ὁ δὲ φύλλον ἀργεῖα παροδάτοις ἀφαίρει. φύε δὲ παρὰ τὴν βαλάντιαν, ὅθεν ἡ περὶ ὁδὴν χωρεῖ. ἑτέρα δὲ μέλαν ῥοιὰς χαυλὴν, παρομοία καχεκίᾳ τῶν ἀγρίων. διὸ δὲ ἐσθιέται. ἐν τοῖς ἀργείοις δὲ φύε, μάλιστα ἐν τοῖς κερατίν, ἀνθος δὲ ἔχει ἐρυθρὸν, καὶ ὡς ὁ δὲ ὅσον ὄνυχας τῶν δακτύλων. συλλέγει δὲ περὶ τῶν τελευσιμῶν τῶν κερατίνων, ἐγγλωσσοτέρα δὲ μέλαν. καθαίρει δὲ καὶ τὴν ἑτέρα δὲ μέλαν ἡρακλῆα καλεῖται, ὁ μὲν φύλλον ἔχει ὡς ὁ δὲ ὅσον ὄνυχας τῶν δακτύλων. ῥίζαν δὲ λακύνην, ἐπιπύλαιον, τὸν δὲ χαρπὸν λακύν. καθαίρει δὲ ἀνὰ τῶν ὁδῶν. ῥίζα, χροὶ δὲ τινες περὶ τῶν ἐπιπύλαιον ἐν μελικράτῳ. Id est, Papaueris siluestris multa sunt genera. Vnum Ceratitis, id est, Corniculatum vocatur, aliud nigrum, folium habens Verbasci nigri, sed minus nigrum: caulem altitudine cubitali, radicem breuiem, & per summa terræ sparsam: fructum inflexum veluti cornicula. Legitur citra*

PAPAUER satium,  
Matthioli.



ca messes. Alium purgare potest. Folium argema ouibus adimit. Nascurtur iuxta mare erratico: petrosi. Aliud Rhœas simile Intubo erratico: quare in cibi vsum venit. In aruis prouenit, potissimum inter Hordea. Florem rubrum profert, calicem siue caput vnguis digiti magnitudine. Legitur ante Hordei messem, atque etiam viridius, purgat per inferna. Aliud est Papauer Heracleum, folio Radicula, quo lineæ dealbatur: radice alba per summa terræ hærente: fructu albo. Radix purgat per inferna. Quidam aduersus comitialem morbum vtuntur in vino mulso. Quod hîc dixit Theophrastus Papauer Heracleum (alij vocant Aphron teste Plinio, Dioscorides ἀφρώνες) folium habere Struthi, quod Struthiū Dioscorides vocat, Latini Radiculam, siue Lanariam herbam, Plinius hoc ad passerem auiculā retulit, qui & ipse τρῶδες appellatur, cum tamen mox indicarit Theophrastus, de quo Strutho loquatur, nimirū quo lineæ dealbant. Plinius verò hæc non de Strutho, id est, Radicula herba intellexit, sed ad Papauer Heracleū retulit, ex hoc lina splendore trahere



estate scribens. Papauer satium album proferit rectum, lauem, vnicum, sed alis diuisum, ternum & quaternum cubitorum, quem totū folia ambiunt longa, lata, candida, Scariola hortensis, aut Hyoscyami nigri modo laciniata, tenera, Forma.

PAPAVER satium rubrum fimbriatum, Dalech.



PAPAVER fimbriatum, & cristatum, album, & nigrum. Lobell.



succum lacteum emittentia, qui effusus vna, aut altera die post flauescit: flores in summo caule vel candidos, vel leuiter purpureos, latioribus quaternis sepius foliis: deinde rotundum, magnum & oblongum caput, in quo semen albū. Huius species quædā feritur in hortis flore speciosiore, oris eius cristatis, & fimbriatis, capitis etiam quæ operculo inest corolla, radiolis multis, argutioribus, & dentatim crenato ambitu. Cætera superiori prorsus similis. Papauer fimbriatum, & cristatū albū, & nigrum Lobellius appellat. In calidarum & frigidarum regionum hortis satū maximus huius Papaueris prouectus, præsertim in agris maritimis, aut flatui maritimo obnoxiiis, quibus impendiō delectatur. Est ille duplō maior, niueo candore nitens, & tantō pulchrior flos, quem horti Belgij in deliciis habent ad coronamenta: non sanē alius generis à fimbriato albo, aut nigro satius, nisi florum incisura & laciniis profundis, fecturā perelegantem sortitur, quæ multipla serie maiores & confertiores, Rosarum dehiscientium æmula gratia, visum oblectantes, ipsis Maluæ hortēsis pares floribus cernuntur. Color renidet albus, aut coccineus sanguineus, aut niueo cādore & rubore confusus: interdum ora cristata ex albo purpurascunt. Seminibus me donauit maximæ & optimæ spei non minū peritus quā nobilis Carolus de Croy princeps de Chimay, studiosissimus, & summus stirpium admirator. Papauer satium nigrū, caule & foliis albo proximum, flores promit venustos, rubros, vel colore sanguineo saturo Præoniæ, capita rotunda in quibus semen nigrum concluditur, vnde nigrum cognominatur. Satiū istud etiam horti alunt, capitibus superiori satiūo albo tam similibus, vt non nisi è semine nigricante diffractis illis agnoscant pharmacopœi ipsi qui seuerint. Eius pictura ex Dodonæi Historia stirpium hic exhibetur. Officinis Papauer nigrum magnum dicitur, indoctis Papauer rubrū à florū colore, à Lobellio Papauer spontaneū siluestre, & hortense, semine interdum albo, interdum nigro. Hic etiam appinximus Papauer nigrum satiuū, flore Maluæ hortensis, aut Præoniæ Penæ, & Lobellij, cuius seminis tutior est vsus in syrupo de Papauere, quā Papaueris nigri spontanei,

Lib. 3. c. 80.

In Appéd.



*PAPAVER silvestre,*  
sive *nigrum*, Dodonæi.



In Histor.  
purgant.

de quo mox. Quæadmodum autem albi sativi, ita huius nigri sativi differens quædam species est, quæ florum folia multum fimbriata, & rubro colore nitentia gerit: item capitulorum corollas cristatas, alioqui nec colore, nec magnitudine distat. Præterea inter superius album, inquit Pena, & rubrum indoctis nominatum, etiam quoddam est Officinis notum, quod nulla re discrepat, nisi parvis foraminibus patulis in superna capitis parte, unde elabitur semen. Papaver patulū vocant Pena & Lobellius. Dodonæo Papaver sativum tertium est, caule, foliis, floribus & capitulo minus. Flos ex cæruleo, ac purpureo obsoletum, ac dilutū quendam colorem refert: capitulum quoque rotundum habet, sed maturato semine foraminibus aliquot, quæ parte operculum ipsi insidet, in circulum hiat, facile defluenti semini viam præbens: quod aliis duobus non contingit, quorum ita clausi permanent calices, ut nullum inde semen elabi possit. Hæc Dodonæus. Papaver spontaneum hortense, & silvestre, Penæ, & Lobellij, in hortis provenit, foliis minoribus, floribus dilute rubentibus, ob-

*PAPAVER nigrum sativum flore*  
*Malva hortensis, aut Pœonia, Pen. & Lob.*



*PAPAVER spontaneum silvestre*  
& hortense, Pen. & Lobell.



nigro



nigro utroque lacryma, seu liquor gummosus, tum sponte, tum ex vulnere manat quem Græci *χρὴ ἐξ ὀφθαλμοῦ*, & *ὀφθαλμὸν* vocarunt. Eius colligendi ratio hæc à Dioscoride traditur. Cum ros in eo exaruerit, cultello stellam circūscribere oportet, ita ut ad interna vsque non perforet: à lateribus capitis in directum summā cutē incidere, exeuntem lacrymam digito in concham deradere, & non multò post redire: inuenitur enim concreta, & sequenti die sicca. Oportet autem ipsam in mortario terere, & in pastillos coactam reponere. Præterea ex capitibus vnā cum foliis Meconii, & prælo expressis succū colligunt, quo in mortario trito pastillos effingunt. Meconium id appellatur, opio imbecillius. Quæ sic declarat Plinius. E nigro Papauere opes gignitur scapo inciso (Sic habent vulgata exemplaria, tamen capite inciso legendum videtur, ut caput incidi debeat, non scapus: sequitur enim, nec in alio genere ipsum inciditur caput, & sic habet Dioscorides) ut Diagoras suadet, cum turgescit: ut Iollas, cum deflorescit, hora diei sereni, hoc est cum flos in eo exaruerit. Incidi iubent sub capite, aut calice. Nec in alio genere ipsum inciditur caput. Succus, & hic, & herba cuiuscunque, lana excipitur, aut si exiguus est vngue pollicis, ut lactucis, (Hermolaus legit, aut lactucis, legendū tamē videtur ex Dioscor. aut conchis: succū enim *ἐκ τῆς μύνης* de rasum excipere iubet) & postero die quod magis inaruit. Papaueris verò largior, densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi soporifera modò, verum, si copiosior hauriatur, etiā mortifera per somnum: Opion vocant. His Meconij parandi modum alium subiicit. Cum capita ipsa & folia decoquuntur, succus is Meconium vocatur, multò Opio ignatior. Nunc Papauerum vires explicanda. Papaueribus satius communis refrigerandi vis est, ut tradit Dioscorides. Quare folia & capita in aqua decocta totum somnum accersunt. Bibitur & decoctum contra vigilias. Capita trita & cum lenta cataplasmatibus mixta, erysipelatis & inflammationibus profunt. Oportet autem viridia ipsa tundere, & in pastillos cōformare, siccatoq; reponere, ac uti. Capita per se etiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cū melle dum humor densetur, crassescatq; decocta, eclegma medicamentum efficiunt, dolorē mitigans in tussibus, & fluxionibus arteriæ, & cœliacis affectionibus. Efficacius hoc medicamentū redditur adiectione Hypocistidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritū cum vino bibitur cōtra fluxiones alui, & fœminarū profluvia. In peruigiliis fronti ac temporibus cum aqua illinitur. Opium magis refrigerat, spissat, siccatoq; & medicocri quantitate sumptum dolorem leuat, somnū conciliat, concoquit. Tussi atq; cœliacis affectionibus auxiliatur. Maiori copia haustū nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cū rosaceo perfusum facit. Aurium doloribus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cū tosto oui luteo & croco. Erysipelatis & vulneribus cum aceto: podagricis cū lacte mulieris & croco, sedi pro balano subditū somnū allicit. Erasistratus auctor est Diagoram vsum eius improbare in aurium dolore, & oculorum lippitudine, eo quod visum hebetet, & soporem gignat. Andræas verò ait, si non adulteraretur, excacari eos qui ipso illinerentur. Mnesidemus vsum duntaxat eius olfactū probauit, qui ad somnum conciliandum conueniat. Quæ falsa esse experientia deprehēdit, quū ipsi effectus viriū huiusce medicamenti fidē faciant. Hæc paulò aliter Plinius refert. Diagoras & Erasistratus in totum damnauere, ut mortiferum, infundi ventantes: præterea, quoniam visui noceret. Addidit Andræas non protinus excacari eo, quoniam adulteraretur Alexandriæ. Sed postea vsum eius non improbat, sed medicamento nobili quod Diacodion vocant. Deinde vsum medicum Plinius præscribit his verbis. Satiui albi calix ipse teritur, & è vino bibitur somniculosa. Semē elephatis medetur. Et mox. Semine quoq; eius trito in pastillos, è lacte utitur ad somnū: itē ad capitis dolores cū rosaceo. Cū hoc & aurium dolori instillatur.

Meconii.

Li. 20. c. 18.

Vires &amp;

Temper.

Lib. 4. c. 60.

Li. 20. c. 18.

Ibidem.



Podagris illinitur cū lacte mulierū. Sic & foliis ipsis vtuntur. Item ad sacros ignes, & vulnera ex aceto. Ego tamen damnauerim collyriis addi, multoq; magis quas vocāt lexipyretas, quosq; pepticas & cœliacas. Nigrum tamē cœliacis in vino datur. Satiuum omnino magis rotundat capita. At siluestri longum ac pusillū, & ad

*PAPAVER cornutum,*  
*Matthioli.*


Li. 7. simpl.



Li. 5. ca. 61.

*PAPAVERIS corniculati*  
*species, Dodonæi.*

In Hist.  
purgant.



omnes effectus valentius. Decoquitur & bibitur contra vigilias, eademq; aqua fouet ora. Galenus, satiui Papaueris semen, inquit, mediocriter somnū cōciliat, visu candidam. Proinde papi ipsum inspergunt, tum melle maceratū edūt. Papauer nigrū medicamentosum est, admodū refrigerans. Aliud nigrū omniū est medicamentosissimū, tum semine, tum caliculis, tum foliis, tum succo. Valide enim refrigerat, ad stuporē vsque & mortē perducens: est enim ex quarto & vltimo refrigerantiū ordine. *Mihicor repalitis*, id est, Papauer corniculatū, ab Oribasio & Aëtio Paraliū, ab aliis Papauer siluestre, aut marinū appellatum, ex Dioscoridis descriptione folia habet alba, hirsuta, Verbasco similia, in ambitu ferrata siluestris Papaueris modo: caulē similem florem pallidū: fructum longū, cornu modo inflexum, Fœnigræci fructui similem, vnde nō accipit: semen paruum, nigrum, Papaueris: radicem per summa terræ, crassam, nigram. Nascitur in maritimis & asperis. Id in maritimis Senensibus Crassetano & Orbetellano agro, & circa Herculis portum in Argentario promontorio, itē Adriatici maris litore non longē à Timauo fonte, & Tergesto, saxoso litoris tractu copiosissimum prouenire scribit Matthiolus, atq; etiam in hortis & viridariis feri. Idem Clusius & Dodonæus corniculatū Papauer agnoscunt, quod maius est, inquit Dodonæus. Reliqua Papauera candidis & ambitu infractis, laciniosis foliis satis refert, non tamen lauium, sed nonnihil lanuginosis, instar ferē foliorum Verbasci: caules infirmiores breuioreque multas alas diuiduntur: flores ochri colore luteo pallent, quos excipit nō capitulū, sed tenue, oblongū, incuruūq; corniculū, siue siliqua, in qua semen nigricans: radix subest lōga, crassior. Præter istud vulgare corniculatū Papauer, duo alia obseruata sunt à Clusio & Dodonæo genera. Prius folio est Eruca modo laciniato & alio inciso, vulgari minore & tenuiore, neque adeo candicante, sed hirsuto: caules interdū vulgari non minores, teneriores tamē, & graciliores, procumbentes: flores etiā minores interdū intensio colore rubent, interdū languidiore (præsertim in eo genere quod per omnia est &



PAPAVER corniculatum  
alterum, Clusij.PAPAVER corniculatum  
violaceum, Dodon.

est & minus) nōnunquam etiam pallido sunt colore, mediis foliis ad phœniceum  
vergentibus: cornicula praelonga, quibus veluti opercula quædam insident latius-  
cula, in iis semen nigrum Papauere maius, radix oblonga, candicans. Nascitur in  
agro Salamanricensi iuxta vias & agrorum margines. Floret Iunio, semen Iulio pro-  
fert. In Belgio satum nō nisi Augusto & Septembri floret, interdum etiam serius.  
Minimè autem croceo succo turget, vt quidam putauere. Illud quod florem habet  
pallidum & phœniceum in Viennensi agro sponte nascitur inter Auenas, præser-  
tim quæ secus vias satæ sunt. Alteri folia sunt multò maiora & teneriora, eaque  
minutim admodum dissecta, neq; candicantia, sed viridia: cauliculi tenelli & sub-  
hirsuti: flos superiori non minor, cærulei ex purpureo coloris saturati, & nigra  
Violeæ emuli, fugax admodum, & qui leuissima aura excutitur: huic succedunt cor-  
nicula digiti duntaxat longitudine, plarumq; etiam breuiore, exilia, duriuscula, ri-  
gidiusque hirsuta, in quibus continetur semen exile admodum, colore ex cæruleo  
nigricante: radix tenuis est & inutilis. Inuenitur in multis Hispaniæ locis, sed non  
nisi inter segetes, & Maio mense floret, in Belgio multò serius, & in totum multò  
minus ac tenerius. Hæc Clusius, qui istud postremum Papauer se collegisse ait in  
agro Narbonensi inter Auenas prope Latera oppidum, secus flumē Ledum, à Ca-  
stellanis vocari *Rosetta*, à nonnullis *Amapolas moradas*, id est, Papauer flore violaceo,  
à succi mororum colore. Perperam, inquit Lobellius, corniculata Anemone mai-  
or à Pena dicitur, cuius flos minùs bene expressus in Aduersariis. Corniculati Pa-  
paueris radix, vt tradit Dioscorides, in aqua decocta ad dimidias, & pota, vim ha-  
bet coxendicum & hepatis affectus sanandi: prodest iis qui crassa quædam aut ara-  
neosa cum lotio reddunt. Semē acetabuli mensura cum aqua multa potum aluum  
leniter purgat. Flores & folia cum oleo imposita crustas emarginant: pecoribus  
illita argema & nubeculas repurgant. Postremus est *μικρον ἀρροδον*, Papauer spu-  
meum, aliis Heracleum, vt iam diximus, non perinde vt cætera notum. Caule est  
dodiantali, vt describit DioSCO. foliis admodum paruis, herbæ Lanariæ similibus,

Vires &  
Temper.Papauer  
spumeum.  
Lib. 4. c. 62.  
Forma.



Vires.

Lib. 7. sim.

fructu circa ipsa albo, sed & tota herba alba est, & spumea, radice alba, per summa terra harente. Huius fructus colligitur æstate cum plenè maturuit, & siccatus decedit. Purgat per vomitus, si acetabuli mensura cum aqua mulsâ bibatur: quæ purgatio priuatim comitialibus prodest. Eadem sic breuiter tradit Galenus. Papauer cornutum vim habet incidendi & abstergendi. Itaque radix herbæ in aqua decocta ad dimidias hepaticos affectus adiuuat. Porro folia & flores sordida admodum & contumacia vlcera iuuant: sed ea reiicere oportet veteribus iam repurgatis. Nam tam validè abstergunt, vt puras carnes colliquant. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam vlcibus detrahunt. Papauer Heracleum semen habet pituitam expurgans Opio aut meconio largiùs epoto consequitur vernus cum perfrictione & pruritu vehementi: itaque sæpe inualecente veneno, tanta erumpit prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamentum oleo mulsum sunt post citatam oleo vomitionem acres clysteres, acetumque mulsam cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido. Merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per se acetum. Alia plura remedia tradunt Dioscorides & Auicennas. Corniculatum Papauer cibo & potu eadem inferre consuevit quæ opium, nec aliis expugnatur remediis.

## ANEMONE.

## CAP. II.

Has duas Anemones figuras, quas Pena diligentia nos debemus, propter floris similitudinem, qualis ferè in Papauere spectatur, Papaueris generibus adiecimus, quamuis suus locus esset inter Anemonas alibi descriptas & particulatim explicatas.



NOTISSIMAE verò apud Narbonenses duæ primo intuitu Papaueris Rhœadis florem ostentant, in cultis præsertim, quarum maior folia habet etiam Coriandri diuisura, sed Papaueris Rhœadis modo hirsuta, in caule pedali & sesquipedali: flores, verò ex rubro in purpureum.

ANEMONE maior  
Pena corniculata.



ANEMONE minor,  
Pena.





reum violaceum deficiunt, quos perquam tenellos Papaueris Rhœadis ritu vel lenissimus auræ appulsus celeriter aufert, remanente tereti hirsuto longiore corniculo, cornuti Papaueris non dissimili, sed minore & graciliore: quasi natura alludere voluisset isto descripto ad Papaueris cornuti siliquas, & altero ad Argemonæ glomerata capitula, in acutum fastigiata, non operculo munita, vt Papauera omnia sunt. Minor autem delicatior caule non dissimili, minutiore folio & diuisura quàm Coriandri, valde quàm hirsutis & satis rigidis, hirsuta capitula, flore eleganti relinquente multò minora quadantenus similia Rhœadis Papaueris: semine nigro Hyoscyami: radice pusilla, superiori haud dispari, quibus si tuberculum adesset nullæ notæ deessent: ac si non sint Anemones, sanè vix sint vllæ propiores aut illis, aut Argemonæ, aut non hæ putandæ sint, vel suspicandum capite de Anemone duo genera descripsisse Dioscoridem. Quorum vnum radice sit tuberosa, alterum nō dissimili Rhœadi: quod videntur innuere verba initio, deinde confirmare, vbi discrimen ponit Papaueris, Argemonæ & Anemones, huius tuberculi nulla interim facta mentione, cum tamen maximè oportuit: quare forte idem illi cōtigit, quod Drabæ radici, quæ alicubi tuberosa, aliubi plana & aquabilis visitur. Idcirco à Monspeliceis Medicis verè putantur, frequentèsq; inibi oriuntur in vinetis ac vruetis, præsertim iuxta prædium Præceptoris & harum seduli vestigatoris D. Alsati, qui cum aliis multis opinabatur illam Germanicam & recentiorum Anemonem, stellatis luteis Ranunculi floribus & semine, radice multis bulbulis tuberosis Bulbocastani donatâ, speciè esse bulbosam Batrachij: nā tamen eiusdem flores interdū albi aut purpurei sint, tamen nihil fermè habet tota quòd quadantenus præferat Papauer Rhœas: sunt enim folia Geracij columbini aut Ranunculi, cuius vrentem facultatem itidem habet: quapropter illuc nos referendum duxissemus, nisi à Galeno memorata Anemone luteo flore nos suspensos sententiæ de hac planta magis quàm certos retinuisset.

An Gal.  
Anemone  
lutea ibi.  
narrat rōnes  
eadem sit  
Germani-  
ca.

HYPECOVM.

CAP. III.



**Q**UOD Græci ὑπὲρθεον & ὑπὲρθεον, Latini quoque Hypecoum dicunt. Nascitur, inquit Dioscorides, in segetibus & aruis. Foliū habet Rutæ simile, ramos paruos. Vim habet respondentem Papaueris succo. Plinius eadem planè tradit. Hypecoum in segetibus nascitur, foliis Rutæ. Natura eius eadem quæ Papaueris succo. Galenus Hypecoum vim habere refrigerandi scribit, & ex tertio esse refrigerantium ordine, vt parum absit à Papauere. Herba hæc paucis aut nullis herbariis nota est. Eam tamen quæ hîc picta est pro genuino Hypecoo Matthioli<sup>9</sup> proposuit. In aruis prouenit, foliis Rutæ paulò maioribus, caulibus exiguis, mollibus, hirsutis, in quibus sunt flores, in luteum pallefcentes, etsi prope calicem purpurei spectentur, in quorum medio flocculus erumpit, colore aurum æmulans, visu iucundus. Floribus succedunt capitula tenui inuolucro contecta, in quibus semen concluditur nigrum, asperum, Pseudomelan-  
thio

vide Rhœas  
3m.







simile scuto, & ipse fructus est per ordinem, plenus semine simili semini Papauetis. Niger familiarissimus calidis & frigidis regionibus, vbiuis in Europa gignitur secus vias, locis sabulosis & incultis. Folia profert ampla, longa, lata, cinerea, mollia & flaccida, lanuginosa, laciniata & marginibus altius incisa, crassa, succu-

*HYOSCYAMVS albus,*  
Matthioli.



*HYOSCYAMVS niger,*  
Matth. Luteus, Dodon.



lenta: caules crassos, cubitales & bicubitales, ramosos, quos flores continua serie digesti vestiant, patentibus calathis similes, colore per margines subluteo, discurrentibus vnà purpurascens aliquid venis, in medio verò ex obscuriore purpura nigricantes, quibus calices succedunt rotundi, oblongi, crassi, ventricosi, superius operculati, & aculeati, in quibus semina haud ita magna, colore pullo: radix crassa, prolixa albicat, erutu facilis, & ad anodyna multum utilis, minus foetens & obnoxia putredini, quam reliqua planta, quæ grauis odoris est, caput grauens & somnolentiam inducens. Hunc Dodonæi, Penæ, Lobellij Hyoscyamū nigrū ex Matthio. pictū damus, qui Hyoscyamum simpliciter vocat. Candidus rarior est: quare in hortis Gallia & Belgij feritur & colitur. Is tamen in maritimis rudibus asperis provenit Narbonensis Gallia, præsertim vbi Rhodanus in mare influit. Eadem propemodum facie est & magnitudine qua niger: sed eius folia latiora sunt, rotundiora, molliora, hirsutiora, nonnihil quoque circumrota ac sinuata, quamuis minus: cauliculi breuiore: flores per cauliculos & in summitate candidi, minores, radices læues: calyces non spinosi: semen candidius. Hunc etiam scitè pictum dedit Matthiolus. Is nouam quandam plantā inter Hyoscyami genera à quibusdam numerari scribit, quæ caules edit sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramosos: folia ampla, pingua, tenui pilo referta, mollia, Solani somniferi speciem quandam referentia, odore graui: flores luteos Hyoscyami æmulos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, qui quandam Hyoscyami speciem præferunt: nam & similibus ferè scutulis concluduntur, coronato vndique orificio, & semine intus subflauo. Radice nititur alba, spithamæ longitudine, & digiti crassitudine, numerosis fibris. Hyoscyamum nigrum vocat, Dodonæus luteum, cuius caulis simplicior, inquit, folia indiuisa, minora, lata tamen & oblonga, Solani lethalis, maiora, candidiora, ac molliora: flores in cauliculorum fastigiis inconditi luteo pallentes colore, aliquantò minores quam nigri, vascula ferè similia, sed minora, teneriora,



## HYOSCYAMVS III.

Matthioli.

Histo. put.  
gant.HYOSCYAMVS Peregrinus,  
Dalechampij.Li. 4. c. 64.  
Vires &  
Temper.

pressusque in sole siccatur. Vfus eius ad annum vsque: facile enim primitur priuatim etiam succus ex arido semine calida aqua perfuso, tuso & expresso. Est vero succus hic antedicto prestantior, & magis dolores finit. Herba autem virens confusa, & trimestris tritici farinæ mixta in pastillos conformatur, & reccor

neriora, & spinis carentia, semen pallidius, subflauum, vt Irionis pusillum. Dubium Hyoscyamum Pena & Lobellius appellant. Ego vero plantam istam minimè ad Hyoscyami genera referendam esse censeo, cum vtriusque facultates ex diametro pugnent: huius enim semen est acre, folia acia admodum, & mansa ferorem ori diu inurentia, qui non nisi longo tempore extingui possit, id quod caliditatem insignem testatur. Ad Nicotianam propius accedit, de qua in Peregrinis. Quare perperam à Dodonæo Hyoscyamum Peruvianum appellari puto, nec eius generibus rectè adscribi, quod in eius foliis insignis acrimonia deprehendatur, qua digeruat, resoluunt, discutit, & experientia compertum mihi est. Ea verò ex lida nature, non stupefacientis ac frigidissimæ sunt opera, qualis est Hyoscyami. Plantam aliam hic depictam Herbarij quidam ad Hyoscyami, alij ad Solani species referunt. Herba rara est, & foliorum & fructus figura insignis. In ymbrosis & densis Apennini siluis reperitur, foliis oblongis, per ambitum sinuosis, venosis, ternis ferè simul ex intervalis per caulem prodeuntibus, teretem, digiti crassitudine, fere cubitalem: fructu in caulium vertice rotundo, exiguo malo simili, pruni magnitudine, rubefcente, semine pleno. Vires & eius natura adhuc incogni præteriosissima ac elegantissima: pictura genere (illuminatione vocantur memores nostri (in vetusti codicis manuscripti membranæ, quæ multarum stirpium ita pictarum imagines ostendunt, hæc herba proponitur. Quodius expressa nomine tituloq; Apollinaris Philodæscrit ita dictam notat ab Apollonio Philosopho, qui eam Platoni monstravit, eamq; Graecis vocari Strygnion Malchion (Strychnon Malchion) & Dorigion (Doricnion.) Hyoscyamus semine nigro, & is qui semine est subflauo, auctore Dioscoride, insaniam inducunt, caput scilicet percillant, & noxii sunt. Albus ad medicum usum vtilior: si verò desit, vtendum subflauo. Niger pessimus improbandus. Exprimatur succus ex tenero semine (addit vetus codex τὸ λευκόν, id est, albi Hyoscyami) foliis, & vtriusque, in quem usum tunduntur omnia, ex



& reconditur. (In antiquo legitur, ἡ δὲ χλωρὰ κοπτεῖται καὶ μίχεται σισαμίνῳ ἐλένῳ, ἢ πινύδι. Id est, Herba viridis tusa, & mixta farina Sefami aut Rutæ.) Prior succi expressio, & quod à sicco semine exprimitur, collyriis dolorem lenientibus commode miscetur, & contra acres calidæque fluxiones, dolores aurium & vulvæ vitia: cum farina autem & polenta, contra oculorum, pedum, aliisque inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationem, oculorum fluxionem, vehementes dolores, muliebria profluvia, aliisque sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaveris semine & aqua mulsâ potum. Confert podagris, testibus inflatis, mammis que à partu turgentibus, si tritum cum vino illinatur. Miscetur vtiliter & aliis cataplasmatibus dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus per se, & cum polenta mixta vtiliter illinuntur. Recentia ad mitigandos omnes dolores illinuntur. Tria aut quatuor cum vino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerum modo, & heminæ mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere decodunt, si in colo vlcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta dentes in dolore colluuntur. Plinius eadē fere tradit. Hoc (quartum genus) recipere medici: item rufi seminis. Nonnumquam ante candidum rufescit, si non ematuruit, improbatūque. Et alioqui nullum, nisi cum inaruit, legitur. Natura vini (mendose, legendum enim, Natura veneni, ut sequentia declarant) ideoque mentem caputque infestans. Vfus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & cum caulibus foliisque vritur & radice, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam foliis constat mentem corrumpi, si plura quam quatuor bibantur. Etiam antiqui in vino febrem depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, ut diximus, quod ipsum auribus infusum tentat mentem. Et aliis in locis. Hyoscyamus contra canum mortuus valet, & in vulnera cum melle imponitur. Contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidoro quoque accensi tussientibus. Breuius sic Galenus. Hyoscyamus, cui semen Lib. 8. sim. arum est, insaniam ac saporem adfert: is cui semen mediocriter flavum est, propinquam ei facultatem habet. Verum utrique fugiendi sunt, ut inutiles ac deleti. Caterum cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Hyoscyami epoti noxæ auxiliatur aqua mulsâ copiose data auctore Dioscoride, lacque, præsertim asininum: si Lib. 6. c. 15. desit, caprillū, vel bubulum, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt etiam ad id nucleipinci: item Vrticæ semen, Intubus erraticus, sinapi, nasturtiū, cæpa, allium, & hæc singula cum vino sumuntur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt ut excoquant.

SOLANVM.

CAP. V.

**S**olanis, quæ in hortis vel circa hortos crescunt, in Horto tractauimus, nunc de venenatis. Primum de somnifico siue soporifero, *Nomina* quod etiam Halicacabum nonnulli appellant, inquit Dioscorides. *Vide Thym. pag. 296.* Fruticat id ramis multis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, *Lib. 4. c. 68.* pinguium foliorum Cotoneæ mali similium plenis flore grandi, rubro: fructu ac *Forma.* folliculis crocato: radice magna, subrubro cortice vestita. Nascitur in saxis non procul à mari. Has omnes notas in plantam hinc pictam competere Matthioli birat, ideoque legitimum esse le Solanum somnificum Dioscoridis asserere non dubitat. Numerosis enim ramis fruticat, inquit, densis, furculosis, fractu contumacibus, foliis multis, subpinguibus, Cotoneæ mali haud absimilibus, floribus subrubentibus, caules per interualla verticilli modo amplexentibus: fructu crocato, Ggg



baciæ figura in folliculis hirsutis concluso. Radix subest longa, vegetaque, brachia li quandoque crassitudine, cortice subrubente circumvestita. Nascitur in maritimo tractu, locis plerumque saxosis. Hanc plantam etiam Clusius nomine Solani somniferi descripsit, Lobellius eodem nomine pinxit. Aliam tamen Solani som-

*SOLANVM Somnificum,*  
*Matthioli.*



*SOLANVM Somnificum*  
*alterum, Matthioli.*



Lib. 9. hist.  
cap. 12.

nifici speciem Matthioli propofuit, hîc quoque expreffam, foliis anguftiori-  
bus, venofis, in terram inclinatis, caule angulofo, floribus tintinabuli figura, fube-  
purpurafcentibus, in ambitu denticulatis, & è longo prodeuntibus peritolo, ex qui-  
bus baccæ prodeunt nigrae, aut ex nigro purpurafcentes, vinofæ, minuto femine  
refertæ, quemadmodum & reliquorum Solanorum acini. Hæ viridi quodam ca-  
lice ad medium vſque ferè conteguntur, cuius ambitus coronæ figuram refert.  
Radicem habet grandem, ſtrumofam, teneram, albicantem. Maio menſe fleret.  
Iunio fructum fert. Nascitur in agro Goritienſi Saluatino monte inter ſaxa. Theo-  
phraſtus in deſcriptione Solani ſomnifici nonnihil à Dioſcoride diſſidet, cum  
ſcribit. ὁ μὲν ὑπὸ νύκτις τρύχας ἐρυθρὰν ἔχει τὴν ρίζαν ὡς περ αἵμα, ξηραίνουμένη δὲ λε-  
κὴν, καὶ χερπὸν ἐρυθρότερον κόκκας. Φύλλον δὲ τί τιμῶν ὅμοιον, ἢ μολὴς τῇ γλυκίστῃ, καὶ  
αἰὸς δασύ, καὶ πυθμὴν μέγας. Legendum, καὶ σπιγδαῖον μέγα. Sic Gaza legit, ut vox  
ἐρυθρομένη, quæ legitur in vulgaribus codicibus poſt ξηραίνουμένη irreptitia ſit & ἐ-  
λenda, vel ſuperioribus addenda hoc modo, τὴν ρίζαν ἐρυθρομένην, vel ἐξερυθριμένην, &c.  
atque ita conuertit. Veſicariæ genus ſomnificum radice rubra ſanguinis modo,  
ſed cædida cùm ſicceſcit, fructu rubriore quàm coccus folio Tithymalo ſimili, aut  
malo dulci, ſed piolo. Verùm pro κόκκας, etiam κρόκας legi poſſet, & pro λεκίς τῇ  
γλυκίστῃ, μολὴν κυλινδρῶν. Scribit enim Dioſcorides huius Solani χερπὸν ἐν νεκροῖς κρο-  
κίσθην, id eſt, fructum eſſe in ſiliquis crocatum, & φύλλον ἐμπερὶ μῆλα κυλινδρῶν, id  
eſt folia malo Cotoneæ ſimilia. Quare Theophræſti locus fortasſe hoc modo co-  
nvertendus foret. Solanum ſomniferum radicem habet rubram cùm eſt, vel ru-  
briores modo, cùm inareſcit, cædida: fructum magis rubrum, croci inſtar, vel ru-  
briorem



briorē croco: folium Tithymalo simile aut malo Coronæ, sed densum, & palmi magnitudine. Quæ postrema Gaza omisit. Plantam, quam Herbariorum vulgus Solatrum maius nominat, Officinæ Solatrum mortale, quidam Solanum lethale, Galli *Solane mortel*, Germani *Dolkraut* & *Inkraut*, Veneti vulgò *Herba Belladonna*, Fuchsius & nonnulli eum secuti Solanum somnificum Dioscoridis esse putant. Cap. 264.  
Hultor.

**SOLANVM** *Somnificum, Fuchsi.*



cum, quibusdam non sine magno errore Solanum esse credentibus hortense quod suis plurimum confert, & eas à lethalibus morbis conseruat ac tuetur. De quo non laborandum, sed quid in homine possit considerandum, cum constet pleraque animantibus cæteris esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientia verò compertum fuisse ait geminos pueros statim ex esu a inorū huius Solani mortuos esse. Quod fidē facere potest somniferum esse, præsertim cum tota ferè descriptio illi conueniat, hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Hortensis autem Solani notæ multæ illi non conueniunt: neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborefcens, neq; florem candidum habet, sed spadiceum: fructu verò & floribus ad Solani furiosi historiā accedere videtur, vt suspicio sit horum duorum generum historias esse confusas. Quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundem descriptione nonnihil à Dioscoride variat. Quicquid sit certum est Solani esse speciem, quod forma foliorum satis docet, atque huic vehementem refrigerandi vim, maxime si paulò copiosius sumatur, inesse, vt hoc nomine pro Solanum somnifero eius vsus medicus nullo periculo esse queat. Quod si tamen hæc nonnullis haud satisfecerint, inquit Fuchsius, certè necesse est Mandragoræ speciem fateantur esse tertiam, quam pingit Theophrastus. Hæc ferè Fuchsius, à quo diffinit Matthiolus, nec hanc plantam Solanum somnificum Dioscoridis esse putat, quia fructum non fert in folliculis crocatum, quamuis eius baccæ largius sum præ interimant, & viribus iisdem quibus Solanum somniferum polleant, facie tam posse negat, vt sese distant. Eadem præterea vlla Mandragoræ specie cōprehendit, vt capite de Mandragora fusiùs ostendimus. Quare eam Solani quintam speciem esse antiquis incognitam putat Matthiolus. Eandem Dodonæus nec Solanum manicum, nec Solanum somniferum Dioscoridis, nec Mandragoram morion eiusdem esse arbitratur, sed potiùs Mandragoram Theophrasti. Gælerus Solani genus siluaticum, Germanis *Schaffbeere*, & *Dolmurtz* dictum, Italis *Belladonna*, sponte in Germania, circa siluas, alibiq; locis incultis abundare scribit, baccas aut potius poma cerasorum instar coloris è caruleo nigricantis ferens, radiceq; crassa esse, viuaci proculdubio in hortis futura. Sed ne pueri fructus sua specie inuitantes deuorent vitæ periculo, vt in aliis Solanis, ita in hoc præcipuè cauendum. Quidā, inquit, mortale cognominant. Aliqui Morion esse suspicantur, vel potiùs Mandragoram Theophrasti. Ab hoc siluatico Solano non aliud esse opinatur Solanum somniferum. Tandem hoc adiecit, suum hoc Solanum legitimi quidem, sicut & Mandragoræ, omnibus suis partibus succedaneum esse posse. Cordus Solanum somni-

Lib. 3. hist.  
cap. 20.



# HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,

ferum hodie ignorari scribit. Id tamen certum esse plātam, quam ipse Amarodul-  
cem, Germani *delinger elieber* appellant, huic valde cognatam esse: foliis eni m, flo-  
rum forma, fructa & viribus (quas in seipso expertum esse ait) Solanum referre. De  
hac egimas in lib. de iis que in vicina scandunt. Sed ad Solanum somniferū Fuch-

Forma  
Herbæ Bel-  
ledonna di-  
citur.

Forma So-  
lani mani-  
ci Diosco.  
Lib. 4. c. 69.

Locu.

Lib. 9. hist.  
c. 12.

couple de le-  
uante

Li. 4. c. 68.  
Vires Soli.  
somniaferi.

Lib. 8. sim.

si, aut quintam speciem Solani Matthioli reuertatur oratio. Id in montium sil-  
uis provenit, foliis hortensi Solano maioribus, caudice bicubitali tricubitalique,  
interdum maiore, subrutilo colore, numerosis ramis, alis multis concavis, in qui-  
bus flores oriuntur, longi, Luteæ digitalis floribus proximi, ex lōgo pediculo pen-  
duli, Campanulæ instar cōcaui, colore ex pallido purpurascēte, capillaceis intus  
staminibus. His flaccescentibus bacca suboriuntur, singulæ ex suis pediculis pen-  
dentes, insecto breuiq; caliculo comprehensæ. Maturescētes nigricant, acini vūe  
magnitudine, pellucida exterius cute, vinoso succo refertæ, & numerofo minuto-  
que semine. Radicem fundit longam, crassam, albicantem, succi plenam. Solanum  
manicum, siue furiosum, folium habet Eruce simile, maius aliquatō, satis ad Acan-  
thi folium accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ  
longitudine adolecentes, caput in cacumine oliuæ figura, sed vt Plantani pilule  
hirsutius, verū minus latiusq; : florē nigrum. Postquam eo exiit, racemus exit  
rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus Hedera corymbis,  
vt vnae mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in monti-  
bus vcto perflatis & platanetis. Id Solanū se non vidisse fatetur Matthiolus, quod  
& ceteris Herbariis fortasse ignotum est. De hoc sic Theophrastus. *Ο Νέμανης*  
*εἰς ῥύχινος λέλειπεν ἔχει τὴν ῥίζαν καὶ μακρὴν ὡς πῆχυνος, καὶ κοιλὴν.* Id est, Solanum manicū  
radicem habet eadidam, cubitalem. caua. Et paulò post *ἔχει τὸ ῥῖζον φέρον ὅσον*  
*ὅν ἐν ῥύχινος, πλὴν μετ' ὅν, τὸν δ' ἔχει ὡς πῆχυνος ὡς πῆχυνος, καὶ κοιλὴν.* Id est, q  
*παχυτέραν, ὅσον δ' ἔχει πλάτους καὶ πλάτους.* Id est, folium habet Eruce simile, sed maius, cau-  
lem quatuor ferè cubitos longam, caput Gethyi, maius tamen atq; crassius: simile  
autem est Plantani fructui. Quæ si quis cum Dioscorides habet, *τὴν κεφαλὴν ἐπιτε-  
μένην ὡς πῆχυνος, διασπείραν δ' ὡς πλάτους σφαιρίαν, μετ' ὅν καὶ πλατυτέραν.* Id est, caput  
in cacumine Oliuæ figura, sed vt Platani pilulæ hirsutius, verū maius latiusq; : ex  
quibus intelligere licet in Theophrasto pro *παχυτέραν* legēdum esse *διασπείραν*, si-  
cut & Gaza legit, qui pilosius interpretatus est, vel *πλατυτέραν*, id est, latius. Solanū  
manicū copiose in Ægypto nasci tradit Cordus, vnde ad nos adferuntur eius fru-  
ctus, quos pharmacopolæ *Cuculos de Leuante*, Galli *Coques de Leuant*, id est, Solanum  
Oriētale vocant. Nam Cuculus, inquit, idem est quod Cucubalus, id est, Solanum,  
*Leuante* verò Itali Orientem appellant. Antequam ad nos perferantur hi Cuculi,  
omnino exsiccantur nuclei interiores, & succosa caro quæ corticem ambit. Pisces  
quamprimū eos deglutierint, vertigine corripiuntur, & supini aquis innatant,  
ita vt facillè manibus apprehendi possint. Aliis Cucuti siue Coccati Orientis  
cum Solani huius historia conuenire non videntur. De horum Solanorum facul-  
tatibus nunc dicamus, primū ex Dioscoride. Solani somniferi radicis cortex in  
vino drachmæ pondere potus somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen ve-  
hementer vrinam ciet. Corymbi duodecim hydropicis dantur. Si quid numero  
adiicitur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua multa copiosa potui da-  
ta. Succus (vel, vt alij legunt, *φλοιὸς*, id est, cortex) pastillis inferitur, & medicamētis  
quæ doloris leuamētum præbent: decoctum in vino, si in ore contineatur, dentiū  
doloribus auxiliatur. Radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tol-  
lit. Eadē tradit Galenus. Solani somnifici cortex radicis, si cū vino bibatur drach-  
mæ pōdere, somnū accersit, sed & ad cetera quoq; Papaueris succo persimilis est,  
nisi quod eousq; imbecillior est, vt ipse sit tertij ordinis refrigerantiū, cū hic in  
quarto



quarto sit constitutus. Huius semen vrinam ciendi vim habet, verum si plus duodecim baccis hauseris, dementiam adferet. Plinius valentiorē refrigerandi vim huic tribuit, cum ait. Quin & alterum genus, quod Halicacabum vocat (Legendū ex Dioscoride, Quin alterum genus, quod & Halicacabum vocant) soporiferum est, atque etiam opio velocius ad mortem. Dioscorides dixit soporiferam vim habere opio mitiorem. Laudatum verò à Diocle & Euenore, à Timarchide etiā carmine, mira obliuione innocentia (Lege, mira obliuionis innocentia nempe quam adfert citra perniciem) quippe praesentaneum remedium ad dentium mobiles firmandos (Dioscorides dixit tantum ad dentium dolores valere) si colluantur. Halicacabo vni exceptionem addidere, ne diutius id fieret, delirationem enim gigni eo. Nec demonstranda remedia, quorum medicina maioris mali periculum adferat. Et paulò post. Halicacabi radicem bibunt qui sunt vaticinandi callentes, quia furere ad confirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est, id enim libenter retulerim, aqua copiosa multa, calida potui data. De Manici radice id non tradit Dioscorides, ut dicitur. Theophrastus etiam scribit corticem radici, huius Solani tulsam & in vino maceratam, atque epotam somnum inducere. Solani somnifici Fuchsi, quam quintam Solani speciem esse Matthiolus arbitratur, bacca deuorata homines in veterum inducunt, & in furorem agunt. Aiunt Empirici quidam aquam è tota planta destillatam, duorum aut summum trium cochleariorum mensura haustam, internas viscerum inflammationes extinguere, nullo corporis incommodo: sed à largiore potu abstinendum. Ad erysipelata & alios calidos affectus confert. Contusa folia oculorum palpebrarumque phlegmonas leniunt. Sicca, si in vino horis septem maceretur, & percolatum id vinum ieiunus quis hauserit, à cibo prorsus abstinere, nec vllum vnquam carpere poterit, quoad acetum potauerit: hoc enim vnicum esse mali remedium. Solani furiosi radix, ut scribit Dioscorides, drachmae vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginationesque non iniucundas obuersari. Sed duplicatus hic modus ad tres usque dies mentis alienatione adfert, quadruplicatus interimit. Remedio est aqua multa copiosius pota, & vomitione reiecta. De eodem Galenus, Solanum furiosum, inquit, ad medicationes quae intrò in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor eius drachmae sumptae sint, mortem adferent, si pauciores insaniam. Vna certe innoxie sumitur: ceterum nec ipsa vtile quid obtinet. Verum si foris emplastri modo corpi illinatur, vlcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radice cortex optimus est, desiccans secundo ordine iam completo, & tertio incipiente, refrigerans verò secundo incipiente. Plinius haec de eodem prodidit. Tertio folia sunt Ocimi (in Dioscoridis, id est, eruca, ut iam annotauimus) minimè diligenter demonstranda, remedia non venena tractant: quippe insaniam facit paruo quoque succo (Dioscorides tradit id radice fieri) Quamquam & Graeci auctores in iocum vertere: drachmae enim pondere lufum pudoris gigni dixerunt, species vanas, imaginationesque conspicuas obuersari demonstrantes: duplicatum hunc modum insaniam facere. Quicquid verò adijciatur ponderi, repraesentari mortem. Hoc est venenum, quod innocentissimi auctores simpliciter Dorycnium appellauere, ab eo quod cuspides in praelis tingerentur illo, passim nascente. Qui parcius spectauerant, Manicū cognominauere. Qui nequiter occultabant, Erythron aut Neurythron sicut in vulgatis exemplaribus legitur, emendabit & Dioscoridem illustrabit Theophrastus, ex quo vterque quae de Solano dixit, mutuatus est. Ο δὲ μα-  
νικὸν ἔστι τὴν ῥίζαν καὶ μακρὰν ὡς πήχους, καὶ κοιλὴν διδοῦσαι δὲ αὐτῆς, ἐάν  
πρωτὶ ἁλῶνται

Vires Sola-  
ni manici.  
Lib. 4. c. 69.

Lib. 21. c. 31.







giditas valde efficax. Quamobrem modicum quidem soporem conciliat, largius vero sumptum interimit. Herbarij diuersas plantas Dorycnium esse diuinarunt, à quibus multum abest hic depictum, quod Mōspelienses docti Herbarij pro Dorycnio habent. Gignitur hic frutex in asperis, saxosis, & editis locis non procul à mari, caulibus multis ex vna radice crassa, lignosa, multifida prodeuntibus, cubitalibus, nonnunquam altioribus, flexilibus & lentis Sparti modo: foliis paruis, oblongis, angustis, quaternis simul, per intervalla caules & ramos circūdantibus Erythrodani modo, aut Aparines: flore in summo caulium vertice instar umbellæ ferè circinato, è pallido subnigricante, denso, admodum paruo. Nondum explorata est huius fruticis facultas, ut somnifera sit nec ne diiudicari possit. Gustu insipido est, ut etiam auctor est Pena, & refrigerantis non humectantis facultatis. Idem cum superiore esse puto Dorycnium Hispanicum Clusij, cui ferè simile plantam in regno Valerino, & quibusdam Baticæ locis nasci tradit, cubitalibus & viminis modo obsequiosis virgis, superiore gracilioribus: foliis breuioribus & latioribus, breui pediculo ternis, aut quinis simul iunctis, & ramulos amplectentibus, gustu salso, & nonnihil acrimonia habere: oblongi ramuli ternos, quaternos, aut quinos flores sustinent, medica maiores, colore viridi: alioqui tota planta candida est omnino & incana, magis etiam quam superior.

## MANDRAGORAS. CAP. VII.

**M**ΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ Græcis & Κίρκια, Pythagoræ ἀνθρώπινομορφος, quibusdam ἐν Νίμφαιον, Latinis etiam Mandragoras, & canina, aut terrestris Malus dicitur, Arabibus *laborse* Yabrohae, Officinis & Italis *Mandragora*, Hispanis *Mandracola*, Gallis *Mandragore*. Circa à Circe nomen inuenit, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Antropomorphos à forma humana, quoniam omnes ferè radices Mandragoræ à medio ad imum bifurcæ sunt, ut cruribus hominum similes videantur. Quare si quo tempore fructum ferunt effodiuntur, hominis cui brachia defunctæ effigiem quadatenus representant. Duo Mandragoræ genera, auctore Dioscoride. Mandragoras mas & candidus, & Mandragoras femina, siue niger, tridacis appellatus. His tertium addit Mandragoram nomine Morion. Mandragoras mas siue albus folia à radice capite profert magna Juglandi, aut latifolia Lactucæ æqualia, oblongiora tamen, mollia, læuia ut Betæ, in viridi candicante, & circa radice caput per terram sparsa, secus quæ breues exeunt pediculi, in quibus flores pallidi & foliacei, latiusculo calici insidentes. His singula succedunt poma, rotunda, paruis limonibus æqualia, colore ad dilutum aqua crocum inclinantia, carne succosa, quæ continetur pallida aut cæsia semina, pyri seminibus æqualia, non tamen acuminata, sed modicè plana, & ab vna parte renum instar sima. Radix subest perennis, grandis, longa, crassitudine manum implente, in partes duas sepius distracta, foris pallida, aut in candido subfusca, intus candida, carnosæ, succosæ, & crasso cortice vestita. Odorem tota herba grauem spirat, præsertim poma, quibus succus est aliquantum gustu vinosus, subamarus, tam odore, quam sapore caput grauius. Radix amarescit, simulque subdulcis est. Mandragoras niger, seu femina folia habet maris instar per terram sparsa, minora tamen & angustiora, tenuifolia Lactucæ similia, sed his quoque minora, mollia, odore graui, ac in viridi colore nigricantia, secus pediculi, flores & poma sunt albo Mandragoræ succosa carne seminibusque similia, colore verò paulò pallidior, duplò minora, forbis, aut paruis mespilis notatibus æqualia. Radicem habet perennem, priori substantia & figura similem, sed minorem, in duas aut tres inter sese implicatas partes diuisam, foris nigricantem, intus candidam, quæ sapore prioris radici responderet. Hæc proculdubio sunt Mandragoræ genera, à Dioscoride expressa his verbis. Mandragoras niger, quæ

Nomina

Vide Phlegm. pag. 302.

Matchi. in li. 4. Diosc. cap. 71.

Li. 4. ca. 71.

Genera.

Forma.

Lib. 4. c. 71.





femina existimatur, angustioribus est foliis, ac minoribus quàm Lactucæ, virosis ac graueolentibus, per terram dispersis, atque inter ipsa mala sorbis similia gerit, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus heret bene magnis, binis, ternisve inter se connatis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur. Huius folia magna, alba, lara, lania vt Betæ: mala quàm alterius duplò maiora, colore in crocum inclinante, iucundè cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantùm opiliones soporantur. Radix alterius similis maior & candidior, orbata & hæc caule. His consentanea sunt magna ex parte quæ Plinius tradidit. Mandragoram, inquit, alij Circeium vocant. Duo eius genera: candidus qui & mas, niger quæ femina existimatur, angustioribus foliis quàm Lactucæ, hirsutis & caulibus, (legendum, hirsutis, æqualibus, non, & caulibus: vtrique enim Mandragoræ caules defunt. Prætereà hirsuta folia malè dixit, quasi Dioscorides legisset: neutrius enim folia hirsuta sunt, vt ex Dioscoride liquet) radicibus binis, ternisve rufulis, intus albis, carnosiss, tenerisque, pendè cubi alibus. Ferunt mala Auellanarum nucum magnitudine, & iis semen ceu pyrorum. Album hoc alij Arsen, alij Morion, alij Hypophlomon vocant. Huius folia alba quàm alterius latiora, vt Lapathi satiuæ. Quæ Mandragoræ nigri poma Dioscorides *σῆς ἐμπεπῆ*, id est, sorbis similia facit, Oribasius etià *σῆς* & *ἀχράδibus* comparat: quorum prius ad magnitudinem & formam, posterius ad figuram tantùm referendum videtur. Marcel. Vergil. *σῆς ἐμπεπῆ* legit, id est, ouorum vitellis, vt ipse interpretatur, simil a. Sed & *σῆς* malè legit, & hæc vox, oua, non ouorum vitellos significat. Prætereà omnes probati codices & Oribasius habent. Serapio Mespilum interpretatus est, quod vitiū non Serapioni, sed ipsius interpreti adscribendum. Plinius hæc mala nucum Auellanarum magnitudine esse scribit. Idem Mandragoræ feminae caules tribuit, cum vitrumq; Dioscorides *ἀνδρῶν* esse dicat. Quare Cornarius in Plinio hirsutis, excaulibus legendum esse crederet, nisi rursus sequeretur, Succus fit & ex malis, & c. vt Plinius caulem ipsi omnino attribuat. Nam quæ de Mandragora tradidit, partim ex Dioscoride,

Embl. 66.  
li. 4. Diosc.



ride, partim ex Theophrasto transcripsit, qui etiam in Mandragora caulem agnoscit. τὸν δὲ ἄλλον, inquit, τὰ μὲν ὁμοιότερον τῷ τῷ καυλῷ. ἔχει, καὶ ἀπὸ τοῦ μανδραγο- Lib. 6. hist. cap. 2.  
 lem habent, veluti Mandragoras, & Cicuta. At Theophrasti Mandragoras à Dioscoridis Mandragora plurimum distat. Quod cum Plinius non animaduertisset, ex utroque transcribens, utriusque Mandragoram confudit. Maximam autem Mandragoræ nigri fructus sorbi magnitudine, & pallidos esse dixit: albi verò fructus siue mala duplò maiora, & colore in crocum inclinante depinxit, ac utriusque Theophrastus aperitè Mandragoram caulem habere scripsit, ut ostendimus, ἰδὼν δὲ τὸν καρπὸν τῆς μανδραγοῦ, τῷ μέλανα τε & παρὰ δὲ ὁνῶδῃ ἔναι τῷ χυμῷ, Lib. 6. hist. cap. 2.  
 Id est, peculiarem autem eius fructum esse, quòd niger & Acino vix similis, & vinoso sit succo. Quæ non satis rectè sic conuertisse videtur Gaza. Fructus Mandragoræ peculiaris, quòd niger racematus, vinosusq; suo sapore sentiat: παρὰ δὲ ὁνῶδῃ enim non racematū neque racemosum significat. Nam παρὰ δὲ, παρὰ, ut alibi declarauimus, Ca. de Solan. lan.  
 vix acinum propriè designat, id est, vix fructum, qui ex succo, carne, vinaceis, & ambiente cute constat, non totam vix, siue racemum, vnde παρὰ δὲ vix acino similem Græci intelligunt. Ruellius hunc fructum effigie esse oui, non, ut Theodorus vertit, racemi, apud Theophrastum legendum esse censet, magno errore: integer enim est hic Theophrasti locus. Quare nemo miretur, aut alterutrum auctorem insimulet, quòd tam contraria de Mandragora scripserint. Quisnam autem sit Theophrasti Mandragoras ab Herbariis ambigitur. Cordus tertiam Mandragoræ speciem, quæ priuatim Morion dicitur, Theophrasti Mandragoram esse In lib. 4. Diosc. c. 76.  
 censet. Grandem, inquit, radicem habet, caulem procerum: folia Solani & Mandragoræ nigri foliorum mediam habent figuram. Flores profert nigros, & post hos nigros fructus grandi vix acino æquales, qui vinosum succum emittunt. Vix disse ait hanc plantam in Hesiæ vmbrosis & antiquis siluis iuxta speluncas natâ, Hesiæ Dollkraut dictam, quo nomine Græcorum Morion interpretantur, aliis etiam Schaffbeer, quoniam fructus eius soporem faciunt. Hanc plantam Solanum siluaticum Gesnerus appellat, Itali Bella donna. Quidam, inquit, Solanum mortiferum, aliqui Morion esse suspicantur, vel potiùs Mandragoram Theophrasti, ut in In hort. Germ.  
 superioribus fusiùs diximus. Fuchsius Solanum mortiferum esse arbitratur, vel certe tertiam Mandragoræ speciem quam pingit Theophrastus. At Solanū somniferum non esse ex Matthiolo iam ostendimus: nec Mandragoram Morion re- Ca. de Solan. lan. Cap. 264.  
 cte dici posse (omnia enim quæ de Mandragora suo Theophrastus tradit, ad tertium genus Mandragoræ Fuchsius refert) idem probat, quòd Mandragoras Morion folia ferat, ut scribit Dioscorides, Mandragoræ mari similia, dodrantalia, humi iacentia circa radicis summum. Quibus verbis demonstrat plantam hanc, ut In lib. 4. Dio. c. 69. Lib. 4. c. 71.  
 & cætera Mandragoræ genera, caule carere. Quæ in eam, quæ Bella donna nominatur, minimè conuenient: cum folia emittat horrensi Solano maiora, palmum non excedentia, minimè candicantia, nec humi strata, sed ex caulibus exeuntia, in quibus adnata plurima, bicubitalia, ligni modo dura. Quare planta hæc Mandragoras Morion esse nequit. Dodonæus eam Theophrasti Mandragoram esse censet, ut diximus, sed à Mandragora Morio Dioscoridis distinxit, quam Dioscorides non vidit, ut ex verbis illius colligi potest. Alium, inquit, tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum, foliis albi Mandragoræ minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambiculis, quæ mollis est & candida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Mandragoras provenit in siluis, & obscuris locis. Vtrumque genus frequēs nascitur in multis Italiæ locis, præsertim in Apulia, Gargano môte. In hortis maximè colitur ab Herbariis. Augusto mense

Locus.



*Li. simpl.* mense poma perficit. Mandragoras auctore Galeno vincentem habet qualitatem  
*Vires &* refrigerantem, adeo vt tertij sit ordinis refrigerantium. Verū tamen nonihil etiā  
*Temper.* caloris inest, & in pomis humiditatis. Quare soporem & conciliandi vim habet.  
 Radicis cortex cum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed & desiccet, reli-  
 quum quod intus est imbecillum est. Omnes eius partes ad magnos in medicina  
*Lib. 4. c. 71.* vsus adhibet Dioscorides. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, & praelo subie-  
 cto, qui insolatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depro-  
 mitur, sed aliquantò ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex ad vltim  
 suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæctum ius seruant,  
 cyathosq; vno vtuntur in peruigiliis, & doloribus, & ante sectiones, vstioneq; ne  
 sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus (ὁ δὲ ὀπὸς ποθεῖται σὺν μελιερᾷ),  
 Id est, lacryma, siue liquor cum melicrato potus: ὀπὸς sponte defluit, succus χυλίσια  
 tundendo exprimitur) vt Veratrum per vomitiones bilis atram, pituitamq; extra-  
 hit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ do-  
 lores finiant, pectus quoque emollientibus admiscetur: semiboli potere inditus  
 per se menses, & partus expellit: subditus sedi pro balano somnificus est. Radix ebur  
 emollit, quod senis horis cum eo decoctum sit, & ad accipiendam, quæ effingere  
 optaueris formam, ipsum facile præstat. Folia recentia cōuenienter oculorum in-  
 flammationibus, & collectionibus quas vlcera citantur, cum polenta illinuntur:  
 duritias omnes, suppurationes, strumas, & tubercula discutit: stigmata sine exul-  
 ceratione delent, si quinis senisve diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in  
 muris eisdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus  
 ex melle, aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua dissipat: articulorum  
 cruciatus cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radicis, ad hunc  
 modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo terni  
 cyathi iis qui secari, aut vri debent: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed  
 veterno quodam pressi torpescunt (δυσὶ χυλίσια), quod alio somno oppri-  
 mantur. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex  
 iis succus: nimio tamen odore percussus obmutescunt. Semen malorum potum  
 vulvas purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra sceminarum  
 profluvia sistit. Scarificata, punctisq; multifariam aperta radice erumpens lacry-  
 ma cauo vase recipitur. Liquamētum autem succo lacteo præstantius est. Sed non  
 vbiq; vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Vt tertiam  
 Mandragoræ speciem non nouisse videtur Dioscorides, ita nec eius vires deuorata  
 tradere. Aiunt, inquit, eam in pane, ossa, obsoniōve, drachmæ pondere deuorata  
 vsum rationis intercipere: obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habi-  
 tu, sensus impos, ternis quaternisve ex quo data est horis. Hoc medici vtuntur, eum  
 scindendi vrendique necessitas adest. Antidotum esse aiunt radicem cum Solano  
*Ca. 13. 25.* manico potā. Plinius à Dioscoride & Theophrasto sua mutuatus, vt diximus, non  
 omnino tamen eadem tradidit. Succus fit, inquit, & e malis, & ex caule, deciso ca-  
 cumine, & radice punctis aperta, aut decocta: vtilis hæc velut succus (sic emendat  
 Cornarius ex vetere codice vulgata exemplaria, quæ habent, vtilis hæc vel succus  
 lo.) Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Succus non vbiq; inuenitur,  
 sed vbi potest, circa videmias quaritur. Odor grauis eius, sed radicis & mali gra-  
 uior. Ex albo mala matura in vmbra siccantur. Succus ex iis sole densatur: item ra-  
 dicis tusa, vel in vino nigro ad tertias decocta. Folia seruatur in muria efficacius,  
 alias recentium succus pestis est: sic quoque noxiæ vires. Grauedinem adferunt  
 etiam olfactu. Quæquam mala in aliquibus malis mandantur, nimio tamen odo-  
 re obmutescunt ignari. Potu quidem largiore etiam moriuntur. Vis somnifica  
 pro viribus bibentium. Media potio cyathi vnus. Bibitur & contra serpentes, &  
 ante



ante sectiones visionesque ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnū odore quæsisse. Bibitur & pro Elletoro duobus obolis in mulso. Theophrastus Mandragoræ folia vlceribus cum farina vitilia esse scribit, radicem rasam, & ex aceto subactam ad erysipelata, ad podagricos dolores, ad somnum, & ad amores: dant autem in vino & aceto. Secant orbiculos velut ex Raphano, quos filo transmissos, in musto suspendunt super fumum. Quæ fortasse Plinius exprimere voluit cum dixit. Concisa quoque in orbiculos seruatur in vino. Quæ tamen alio in loco dilucidius expresit. Sed is in publicis exemplaribus valde corruptus est. Igni sacro medetur Aizoum, folia trita Cicuta, Mâdragoræ radix. Siccat in aëre vt Cucumis, &c. Quæ ex vetere codice sic restituit Cornarius. Igni sacro medetur Aizoum, folia trita Cicuta, Mandragoræ radix. Secatur hæc in asses vt Cucumis, primumque super mustum suspenditur, mox in fumo. Dein tunditur in vino & aceto. Agyrtæ & impostores illi circūforanei, qui radices fictitias humana effigie pro Mandragoræ radicibus imperitæ plebi ostentant, ex Pythagoræ Anthropomorpho, quo nomine Mandragoram appellauit, vt diximus, occasione sumpsisse videntur. Cui Columella testimonium accessit, qui vulgi quoque superstitione motus cecinit.

Lib. 9. hist. cap. 10.

Li. 26. ca. 11.

Embl. 55. lib. 4.

Lib. 10.

*Quamuis semihominis vesano gramine facta*

*Mandragoræ pariat flores, matremque Cicutam.*

Illi in Bryonia, Al:hæa, Arūdinis, aliarumque plantarū radicibus adhuc recentibus humanā vtriusque sexus effigiem sculpūt, insertis in ea loca, in quibus pilos exoriri voluit natura Hordei & Milij granis. Deinde eas facta serobe tenui sabulo obruant, vt grana illa radicales emittant, quod euenit viginti summū dierū ipatio. Tum eruant, & radicales ex granis natas acutissimo cultello cōcidunt, itaque aptat, vt capillū, barbā, & carterarū corporis partiū pilos referant. Has sub crucibus & rotis ex vrina supplicis affectorū enatas persuadet, mōstrososque eorū vsus pollicentur. Nec nisi magno vitæ periculo effodi posse nugantur, cane qui effodiat radicales adalligato, & auribus pice obturatis, ne radices clamorē exaudiant effodientes: qua audita illis pereundū sit. Cuius impostura, ac mēdaciū origo ex veterū superstitione fluxisse videtur. Theophrastus enim de effodiēdo Mâdragoræ hæc scripsit. Circūscribunt & Mandragoræ gladio ter, secantque ad occasum spectantes. Iubent & aliū saltantem tripudio circūagi, multaque de veneris vsu & re dicere. Quæ Plinius trātulit h s verbis. Cauet effodiri, contrariū ventū, & tribus circulis antè gladio circūscribunt: postea fodiūt ad occasum spectantes. Matthiolus hanc fabulam, quæ ignaris Mâdragoræ radices effodere volentibus tā opere minatur, ex Fl. Iosepho natā putat, qui etsi de alio radices genere scripsit, ea tamen facili ab impostoribus ad Mâdragoræ radices, detorqueri potuerūt. Hæc sunt illius verba. Vallis, qua ciuitas à parte Septentrionali cingitur, quidā lacus Baaras appellatur, vbi radix eodem nomine gignitur, quæ hāmæ quidē asinilis est colore, circa vespem verò velut in bar fulgurās. Accedentibus, eamque euellere cupientibus facilis non est, sed tam diu refugit, nec prius manet, quā si quis vrinā muliebrē, vel menstrū sanguinē super eam fuderit. Quinetiā tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortē illā ipsam radicē ferat de manu pendente. Capitur alio quoque modo sine periculo. Totam eam circūfodiunt, ita vt minimū ex radice terra sit conditū, deinde ab ea religant eam, illoque sequi eum à quo religatus est cupiente, radix quidem facili euellitur, eas enim postea accipientibus metus est. Tantis autem periculis propter vnam vim capi eam operæ pretium est. Nam quæ vocantur dæmonia pessimorum hominum spiritus, viuis immeris, eosque necat, quibus subuentum non fuerit, hæc cito, etiam si tantum admoventur agrotantibus, abigit. Hæc Iosephus. Sed literatū hominem nullum esse existimo, qui his imposturis & nugis fidem adhibeat.

Lib. 9. hist. cap. 9.

Li. 25. c. 13.

In lib. 4.

Disq. 1. 7.

Lib. 7. cap. 1.

Bell. Iud.

a. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

MALA



**D**IFFERUNT non parum à Malis infans, quæ nostra ætas Æthiopica cognominat: horum stirps caule assurgit subinde cubitali, in duas tréve alas diuiso: foliis latis, ex albido virentibus, angulosis, duriusculis, quibus à media costa, siue neruo spinulæ quædam breues exeunt. Flosculi secundum cauliculos albicant, senum foliolorum, staminibus mediis

## MALA Æthiopica, Dod.



Æthiopica boni succi, &imenti non multum corpori adferunt.

subluteis. Fructus rotundus, striatus, Malo aureo minor ac durior, colore per maturitatem eleganter rubens, supereminente ex quo quodam veluti alterius mali rudimento, quod & ruber, sed dilutius. Peregrinum istud Belgio: semina ex Hispaniis attulit honesta Domina Christina Bertollia vidua clarissimi ac amplissimi D. Ioachim Hopperi. Tandem admodum (sed tamen eodem quo satum anno) ad perfectionem Colonia venit. Malum vocant Æthiopicum, quod ex Æthiopia in Hispaniam primum inuectum existimetur. Veteribus cognitum fuisse difficile fuerit affirmare. Cum Malinathalla, de qua ex Theophrasto superiore cap. scripsimus, nequaquam etiam conuenit. Folia siquidem cum Cyperinis haud conueniunt, cuiusmodi sunt Malinathallæ. Feruntur verò hæc Mala in pinguium carniū iure cum sale, ac pipere cocta inferri, ac edi: ac minùs mali succi esse, quàm insana aut aurea: propterea videlicet, quod duriora, diutiusque asservari queant, nec ita facili uti illa corrumpantur. Sunt tamen nec hæc

## APOCYNVM.

## CAP. IX.

*vide Rhyn. pag. 599.*  
*anida*  
*ga noster*  
*Lea noster*

## Nomina

Li. 4. ca. 76.

Forma.

## Vires.

Li. 6. simpl.

Li. 24. c. 11.

**ΠΟΚΥΝΟΝ** Græcis & κυνομαρον, & κυνομαρον, Latinis Apocynum, Cynomoron, & Brastica canina dicitur. Apocynum quidem & Cynomoron, quod esu canes interficiat, quasi canicida. Cuius hæc extat apud Dioscoridem descriptio. Frutex est longas habens virgas, lentas in summo acutiora, graueolentes, agre fragiles: folia Hederae similia, sed molliora, & liquas fabarum, folli culi specie, in quo semina lanugine obuoluta sunt, dura, parua, nigra. Huius folia cum adipe in panes coacta, & in cibos data, canes, lupos, vulpes, pantheras interimunt: protinus enim coxendices ipsorum resoluunt. Græce legitur, ταυτης τῆς φύλλου σὺν τῷ ἀποποιθῆντα, quod sic Cornarius vertit: Huius folia cum farina subacta in panes coacta, &c. Legendum sanè, σὺν τῷ ἀποποιθῆντα. Est enim salis, farina aqua subacta, & ut pinsatur, macerata, prius quàm fermentescens acescat, vulgò pasta, quod sensus requirit. Galenus, Apocynum aut Cynocrambè, inquit, vocant quidam Cynomoron, quod canes celerimè interimat, sicut Lycocstonum lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum grauius olens, proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desiccata. Itaque illa admodum digerentis est facultatis. De quo aliter scripsit Plinius. Sic & pleuriticos, & omnes lateris dolores Apocyni semen ex aqua (sub. sana) frutex est folio Hederae,




Hederæ molliore tamen, & minùs lōgis viticulis: semine acuto, diuiso, lanuginoso, grani odore. Canes, & omnes quadrupedes necat in cibo datum. At cum Dioscorides nullum Apocyni vsum humano corpori commodum præscribat, & Galenus venenum hominibus esse dicat, & solum foris impositū discutiendi vim habere, meritò suspectum est Apocyni semen pleuriticis ex aqua propinatū. Quare verba hæc, Sic & pleuriticis & omnes lateris dolores ex aqua, ad præcedētia referenda videntur, vt sequatur, Apocynum frutex est, &c. Scribit Matth. olus p'antas duas à Luca Ghino ad f. missas fuisse. qui siliquas duas dono accepit erat è Syria delatas, quarum vni inscriptum erat, Periploca repens, alteri Periploca non repens,

In lib. 4.  
cap. 76.

APOCYNVM, Matth. ali.

APOCYNVM repens, Matth.



quod ita in Syria has plātas nominent. Prætereà has siliquas Rhododēdri siliquis admodum similes fuisse, nisi quod repentis Periplocæ siliqua ea erat longitudine, qua & Rhododēdri, gracilior tamen, alterius breuior. E longiori sata plantā pro- uenisse non modò humi repētem, sed & arbores proceras scandentem, è breui- orē verò aliam, quæ notis omnibus Apocynum refert: vtramque succo turgere, re- pentem albo, non repentem subterocœo. Est & alia in siliquis differentia: cum enim hæc in vtraque Rhododēdri similes sint, in nō repenti tamē simplices, acutiores, rectæ ex vno pediculo proueniūt, in repenti verò binæ, & in origine cōiunctæ, & in sese inuicē inflexæ, nec adeò vt illæ in acutū desinentes. Non negat Pena Apo- cyni descriptioni apprimè quadrare plantas duas non minùs raras quàm elegātes, quas Parauij, & in publico Pisano vireto pridem vidit. Ea ū vtriq; nomē Periplo- cæ erat. Altera nō repens flexibilis erat furculis, viminei, gracilibus, læuib, pe- diculos vtrinque habētibus longiusculos, & exiles, in quibus folia hederacea, mol- lora, viridia, læuia, nitentia, & quàm Vincetoxici rotundiora, nonnihil in summo acuminata: flores tenues, candidi, muscoli, Valerianæ instar aut Drabæ, inter folia exoriantur, succedentibus Augusto mēse siliquis corniculati mucronatis, recti, quàm in Asclepiade maioribus, claudentibus semen nigrius, depressum, pappoia lanugine obductum. Succus flauescit, ingratus, & vti tota planta vi osus. Hæc si

H h h



deuorata necem infert, inquit, Apocynum esse (& huius fore antidotum Vincetoxicum) valde probabile est. Certum tamen exploratumque sibi esse ait, aliis venenis à cane deuoratis antipharumacum fuisse, quæadmodum Thoræ Anthoræ, & Pardalianchis herbam Paridis. Altera Periploca repens prædixioribus & leuionibus vimineis firculis serpit, variisque flexibus arripit & amplectitur obuios caudices Periclymeni modo: folia vtrinque ex aduerso bina, Periclymeni potius quam Hederae æmula, sed apice quemadmodum Vincetoxicum donata: silique solertiore conexione mutuis erant coniunctæ quasi rostris, vna & floris basi, seu calathio, vtrinque repandæ, summis & imis insertæ mucronibus, Rhododendri quadantenus modo. Easdem Periplocas descripsit & depinxit Dodonæus, & ad Dioscoridis Apocyni referendas esse censuit, præsertim priorem. Easdem Lobellius etiâ pictas dedit, & priorem cognatæ figuræ esse & naturæ cum Scammonio Monspeliensi tradidit, succo, viticæ & longo radice reptatu. Sed ab hac sanè diuersum est Scammonium Monspeliense.

In Histor.  
purgant.

## ACONITVM.

## CAP. X.

Nomina  
Li. 27. ca. 3.



KONITON Græcis, Aconitum Latinis. Nascitur, inquit Plinius, in nudis cauitibus, quas aconas nominant. Et ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iuxta ne puluere quidem nutriente. Hanc aliqui rationem nomini attulere. Alij quoniam vis eadem in morte esset, quæ colubæ ad terræ aciem deterendam, statimque adnota velocitas sentiretur. Fabula narrauerit (id declarat Ouidius in Metamorphosi) è spumis Cerberi canis, extrahente ab inferis Hercule, extitisse, ideoque apud Heracliam Ponticam, vbi monstratur is apud inferos aditus, gigni. Idem Ouidius à cauitibus nomen inditum canis his versibus:

Lib. 7.

Ibidem.

*Quæ, quæ nascuntur dura vinacia cote,*

*Agrestes Aconita vocant.*

Lib. 6. ca. 1.

Li. 4. ca. 72.

& 73.  
Genera.

Li. 1. & 2.

Theophrastus ab Aconis, vbi plurimum nascitur, nomenclaturam duxit. Is autem vicus est Perianthynorum, qui ad Heracliam Ponti est. Rursus Plinius alio in loco ait, Portus Aconæ, veneno Aconito dirus. Aptior verò, inquit Pena, fuerit nomenclaturæ interpretatio, si eam ab herbæ succo vel radice, quibus quasi cote specula à venatoribus afficta & subacta celerius subiret, & perniciem adferret, quam si à cauitibus, aut à pago cognomine deducas: tamen si posset etiam à cote deduci, quæ nammodum τὸ γυμνὸν ἀπὸ τοῦ τοῦ γυμνὸν, nō à taxo. Sic enim in Cypripedia Xenophon. ἔστι γὰρ τὸ γυμνὸν, ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ γυμνὸν ἀπὸ τοῦ γυμνὸν. Neque enim iaculari, neque in hominē collimare permittebamus vobis. Dioscorides duo ponit Aconiti summa genera. Vnum, quod Pardalianches vocat, aliqui Cammaron, alij Thelyphonum, alij Myoceton, alij Therophonum siue Therophonum. Alterum Aconitum Lycoceton, quod & Cynoeton, cuius tria facit genera. Vnum quo vtitur venatores, alia duo, quæ in vsum suum vertere Medici, ex quibus tertium Ponticum nominatur. Hic tamen dissimulandum non est, verba hæc, Vnum quo vtitur venatores, & c. in vulgatis codicibus Græcis exarata non esse, sed statim huius Aconiti nominibus locum natalē & descriptionē subiūgi, sine vlla generū distinctione: quæ nec in Oribasio reperiatur, & Marcellus vs spuria respuit. Illud quia enecat pātheras, Pardalianches, quia scæmini sexus animalia tactis genitalibus, Thelyphonum, quia feras omnes Theriophonum nominatur. Camaron verò à radice Camaro marino simili, Plinio auctore. Myoceton, quia procul & è longinquo mures necat. Hoc Lycoceton & Cynoeton, quia priuatim lupos canesque interimat. Plinius de vno & priore Aconito Dioscoridis scripsit, alterum prorsus omisit. Theophrastus de Thelyphono sine Aconiti mentione tradidit ea, quæ ad prius genus Aconiti Dioscoridis pertinent, quæ







malum quidē nullum esse sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, qui nulla diximus  
venena monstrare quale sit Aconitū, vel deprehendendi gratia. Folia habet Cyclo-  
mini, aut Cucumeris, nō plura quatuor ab radice leuiter hirsuta. Radicem modi-  
cam Cammaro similem marino. Quare quidam Cammaro appellauere, alij Thely-  
phonum ex qua diximus causa Radix incuruatur paulū scorpionū modo, quare  
& Scorpionum aliqui appellare. Nec defuere qui Myocetionum appellare mallet,  
quoniā procul & è loginquo odore mures necat. Hæc Plinius de Aconito primo  
Dioscoridis. Theophrastus seorsum, vt diximus, hæc de Aconito à Thelyphono  
diuerso scripsit. Το δὲ ἀκόνιτον γινέται μὲν, ὡς φασι, καὶ ἐν κρήνῃ, ἔν τε ξακύνῳ: παλαιότερον δὲ  
ἀριστον ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ἐν τῷ ποταμῷ. ἔχει δὲ φύλλον μὲν κηρυμνῶδες, ῥίζαν δὲ ὁμοίαν τῷ χυμῷ,  
καὶ τῷ χυμῷ καὶ αὐτὰ τὴν δὲ ἀκόνιτον τὴν θανατηφόρον ἐν ταύτῃ. τὸ δὲ φύλλον, καὶ τὸν καρπὸν  
ἔδεν φασι ποιεῖν καρπὸς δὲ ἐστὶ πῶτος, καὶ ἔχει ἡλίμυλος. βραχέστα δὲ ἡ πῶτα, καὶ ἔδεν ἔχει  
πᾶν τὴν ἀλλὰ παρρησία τοῖς σίτοι. τὸ δὲ σπέρμα δὲ σπυρηνόν. φύει δὲ πανταχῶς, καὶ ἐν  
ταῖς ἀκόνιταις μόνον, ἀπὸ ὧν ἔχει τὴν προσσηγορίαν. αὐτὴ δὲ ἐστὶ κοίμη τις τῶν περὶ ἀκόνιτων. φασι  
δὲ μέγιστος τὸς περὶ αὐτῆς τὸς πῶτος. δὲ νέμεσι δὲ ἔδεν πρόβουλον, ἔδεν ἄλλο ζῶον ἔδεν. σιωπῆσαι δὲ  
τρόπον τινὰ πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ πᾶν τις εἶναι. διὰ δὲ τὸς ἰσχυρὸς ἐν ἐπισκευῇ σιωπῆσαι  
σηπτικὸν δὲ χυμὸν καὶ πρὸς ἄλλα ἀπὸ πᾶν ὁρμῶν, ἔδεν μὲν ὁσθισιν ποιεῖ, ἔν τε ἐν αὐτῷ, ἔν τε  
μελίσσῳ. σιωπῆσαι δὲ, ὡς καὶ χυμὸς πᾶν δὲ ἀναρῆσιν, αὐτὸν δὲ μῆνον, τέλειον, ἔδεν  
ἐν αὐτῷ, τὸς καὶ διὰ ἐν χυμῷ. ἔδεν ἀπαλλάττειν τὸς ἐν πᾶσι χυμῷ καὶ ἀσθῆναι τὸς σῶ-  
μῶς, ῥίπτει δὲ τὸς παραχρῆμα, λυτικὸν δὲ φάρμακον ἔχει ὡς ῥίπτει, ὡς περὶ ἀκόνιτον. ἔδεν  
ἀλλὰ τὸς τοῖς ἐν γαστρὶ βοήθειαν ὁρμῇ. τὸς γὰρ ἐγγὺς ἀνασῶζεν τινὰς μέλι καὶ ἄλλοι,  
καὶ ποιεῖται τισι, πᾶν τις δὲ καὶ τὸς πῶτος, ἔδεν ἐργαζέσθαι. Id est, Aconitum nascitur, vt aiunt, in  
Creta & Zacyntho: plurimū & optimū in Heraclea Ponti. Foliū habet Cichorio  
simile, radicē figurā & colore similem nuci (Sic vertit Gaza, legit enim καρπός, sicut &  
in vulgatis codicibus exarātū est. Dioscorides περιάντης καὶ ἰσχυρὸς, id est, cirris squil-  
larum cōparauit, Plinius Cammaro marino, vnde Cammarū appellatū dixit: vim  
mortiferā illi inesse, folium autē & fructum nihil nocere aiunt. Fructus est herbe,  
non humilis materiæ. Breuis est herba, & nihil superuacui habens, sed similis fru-  
mento: semen autē nō spiceum. Nasctur vbiq;, & non in Aconis solum, vnde no-  
men accepit. Est autē vicus is Periandynorum. Gaudet locis petrosis. Neq; pecus,  
neque vllum aliud animal ipso pascitur. Cōponi id quodāmodo narrāt ad aliquid  
efficiendum, nec id cuiusuis esse. Quare medicos cōponendi ignaros pro putrefa-  
ciente vti, & ad alia quædam: si bibatur, nullum sui sensum inducere, neq; in vino,  
neque in aqua mulsā. Componi verò vt certo tempore interimat, neq; in vino,  
aut tribus, aut sex mensibus, item anno, aliquos etiam duobus annis. Pessimē verò  
illos de vita decedere quibus longo tēpore corpus cōtabescit, facillimē quibus sta-  
tim. Nullum autē huius antidotum esse ex aliqua alia planta audiuius, sed iis qui  
sumpsissent remedia quædā excogitata fuisse: nam incolæ seruasse quosdā melle  
& vino, & quibusdam aliis huiusmodi, sed & hos rarē, atque etiam operosē. Hæc  
Theophrastus. Quæ de Plinij, priorēve Dioscoridis Aconito intelligi nō possunt,  
neque de posteriore, hoc vno dempto, quod vterq; radices τῇ καὶ ἰσχυρῇ comparauit, si  
in Theophrasto pro καρπός rectē καὶ ἰσχυρῇ legatur. Sic enim Dioscorides alterū Aco-  
nitum describit. Aconitum alterum, quod alij Cynoetionum, alij Lycocetionū ap-  
pellant, nascitur plurimum in Italia, montibus Iustinis, præstātius superiore. Folia  
habet Platani, magis tamen incisa, longiora & nigriora: caulem veluti Filix, cubiti  
altitudine: aut maiore, pediculum glabrum: semē in filiquis aliquatenus longiora:  
dices cirris marinarū squillarū similes, nigras, quibus ad luporū venationes vtun-  
tur: nam insertæ carnibus ciuidis, & à lupis deuorata, eos enecant. Hæc solum in  
quibusdā Dioscoridis codicibus reperias, in aliis tria notātur Aconiti Lycocetioni  
genera, vt iam monuimus, quorum tertium dūtaxat describitur, nimirū Quare


Lib. 4. c. 73.

Forma.



Quare meritò docti viri in hoc capite quardā desiderari suspicātur, quibus Dioscorides & Aconitorū duorū hīstoriā, & quomodo tum venatores, tum Medici iis vterentur, declaret, quemadmodū in Pōico nihil horum pratermisit. Nunc Aconita varia ex peritisimīs Herbariis proferamus. Ac primū fuerit Matthioli Aconitum Pardalianches. Planta est, inquit, in nudis & ardeis montium summitatibus cauribūsq; proueniens, vmbrosis tantū locis, foliis Cucameri proximis, ad summum quatuor, iisq; subhirsutis. Caulem edit palmarem, subhirsutum, quemadmodū & foliorum petiolos. Florē non vidit, verū Doronici æmulum esse suspicatur. Radicem edit alabastrī modo splendētē, dum recens est, digiti crassitudine, ex lata origine in acutum desinētem, incuruā, geniculatā, & tota facie scorpionis caudam emulantem. Hanc vidisse se legisseq; affirmat tantū in Ananien-sibus montibus Tridentini agri, locis ferē inaccessis & præruptis. Raram quidem illam esse, & ab aliis fortasse haud visā, quā ab iis quibus videndi copiam fecit, quos multos veritatis locupletissimos testes profert. His tamen fidem adhibere nolunt pleriq; periti Herbarij, nec vlla aut Matthioli asseueratione aut testimoniis persuaderi possunt, vt plantam hanc in rerum

ACONITVM Pardalianches, Matthioli.



natura existere credant: quin potius fictā ac cōmentitiā picturam esse existimant. Imprimis Gesnerus, cuius hæc sunt verba in libro de Lunariis. Matthioli pro Aconito primo delineata imago, planē fictitia mihi videtur: siue ipse ad Dioscoridis descriptionem confinxerit, siue ab alio deceptus acceperit. Quanquā enim ipse hoc Aconitum primū sæpe in Tridentinis montibus se legisse scribat, non tamen fidem apud nos meretur radicis quam proponit forma nimis sane artificiosa, nimiumq; σκορπιος; absque vllis fibris. Idem Gesnerus Toram venenatam (aliqui Lunariā vocant, fortē quod folium ei rotundum & orbiculare sit instar Lunæ plenæ) Aconitum primū Dioscoridis esse asserit, quod foliaria edit ab vna radice, quorū duo extrema minora sunt, & absque cauliculo, medium maius est. Ea rotunda sunt, planē circinata, ea ferē magnitudine, vt diameter duos pollices æquet, in circuitu serrata, solida, albicantiā. A medijs principio cauliculus enascitur, simul & paruum aliud folium mucronatum inde profertur. Radiculæ circiter decē, ceu Napi quidā exigui ab vno omnes radicis capite oriuntur. Eandē plantam ab Anguillara Patauini horti præfecto verū Aconitum Pardalianches iudicari scribit: reperiri in mōte Baldo inter Patauiū & Veronā: oriri etiam apud Valdenses in Alpibus Vnderflumen, & Engronia. In eadē sententia Gesnerus perseuerat in Hortis Germaniæ. Aconitum primū, siue Pardalianches voco, inquit, nō quod Fuchsius pinxit, neq; Doronicū, vt quidam, neque depictā à Matthiolo herba, de qua dubitamus etiam, nū in rerū natura extet, & si extat, an rectē ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris, quod ego in nullam plantā cadere dico. Sed ego Aconitum primū, Toram vulgò

TORA Valdensum, Aconitum l. Diosc. Gesnero.



primū, siue Pardalianches voco, inquit, nō quod Fuchsius pinxit, neq; Doronicū, vt quidam, neque depictā à Matthiolo herba, de qua dubitamus etiam, nū in rerū natura extet, & si extat, an rectē ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris, quod ego in nullam plantā cadere dico. Sed ego Aconitum primū, Toram vulgò

Vide Shyng pag. 335.



Lib. de  
nomis.

Ca. 35. hift.



sum & Vulpinam, alij Herbam Paridis vocant, Germani *Vulff-beer* & *Dolauwz*. Sed Aconitum delineationes hanc eorum speciem non esse arguunt. Præterea deleteriam vim huic inesse plerique negant. Certè antidotis aduersus lethalia pharmaca paratis admiscetur. Dodonæus in Historia stirpium cum Aconitum Pardalianches aliud nactus non fuisset, eius picturam ex Matthiolo mutuatus exhibuit, quam haud veram sed fictitiam plerisque videri diximus, quibus in fine eiusdem Historiæ assentitur, atque Doronicum Romanum Officinarum, Aconitum Pardalianches antiquorum esse asserit. Et in Historia purgantium Aconitum Pardalianches descripsit, quod Pena & Lobellius & Herbarij plurimi Doronicum appellant, cuius etiam radículas passim pro Doronico medicamentorum compositionibus admiscunt. Has testatur Lobellius scripsit à Ioanne de Vræde Rhizotomo sine noxa vlla impunè deuoratas, quamuis canibus perniciosè prodantur. Foliis exit subrotundis, latis, dilutè virentibus, mollibus, tenui lanugine pubescentibus, Hederæ cuiusdā, ac vnus Cyclamini foliorum quidem forma, sed amplioribus, ad Cucumeris folia magis accedentibus, minoribus tamen, & mollioribus: caulis dodrante altior, & ipse lanugine haud carens, striatus, & quasi multiangulus, alioqui rotundus, qui in pauculos diuisus ramulos, ipsis fastigiis flores promit; Chrysanthemi amulos, medio videlicet disco, & orbiculato ambitu luteos, qui in tenues & candi-

Lib. 3. c. 77.

DORONICVM Rom. Aconitū  
Pardalianches antiquorum, Dodon.



ACONITVM Pardalianches  
minus, Matthioli.

ACONITVM Pardalianches,  
Plinij.



Hhh 4

*vide Chrysanth. pag. 327*

*hec sunt aconitum  
et Chrysanth. b. d. d.  
videt pag. 1. 2.*



dos pappos resoluuntur. His subsunt exigua nigricantiæque semina: radiculæ haud magna, candidæ dum recentes sunt, geniculis velut articulatae non rectè descendunt, sed graminis modo per obliquum serpunt, & subinde extuberantes nouella germina protrudunt (ita sese multiplicante stirpe) demissis etiam ab ipsis tuberosis partibus aliquot deorsum concoloribus fibris. Referunt radiculæ exanimatos scorpiones: nam anterior & tuberosior cauliculis proxima, corpusculum cum pedibus, posterior articulata exprime videtur caudam. Theophrastus Thelyphoni, quod idè esse cū Aconito primo Dioscoridis putamus, radicem scorpio similem esse scribit, Dioscorides *ῥίζαν ὅμοιαν σκορπίου ἑρπετος*. Sed fortasse, inquit Dodonæus, dictio *ἑρπετος* redundat, vt cum Theophrasto legèdum sit, *ῥίζα ὅμοια σκορπίου*. Hanc plantam appellat Matthiolus Pardaliaches minus, quod fallò Doronicum vocat. Alia verò huius Aconiti species est, inquit Dodonæus, antedicta paulò maior, saturatius virens, procerior, cuius radix longior minus scorpionem refert. Hanc pro Aconito Pardalianche Plinij Matthiolus pinxit, cui aliud addit, quod Theophrasti Thelyphonū & Aconitum Pardalianches facit. Hoc radicem habet non solum quæ scorpionem integrum referat, sed folia Cyclamini, radicis fibras geniculatas Graminis modo, & similiter sese propagantes, & alios rursus scorpiones exprimentes, ex quibus postea & folia & germina erumpunt. At caules & flores nihil ferè à superiore differre videntur, sunt enim aurei oēs Chrysanthemi modo. Hanc triplicè proximè explicatam Aconiti Pardalianchis differentiam Pena, Lobellus, & plurimi Herbarij pro triplici Doronici differentia agnoscunt, de qua fusiùs tractauimus in libro de plantis quæ in asperis nascuntur. Vni folium hoc venenatum, Plinij Cyclaminum quidam tertium esse volūt, radice piscibus extiosā. Gignitur in niuosis montibus Allobrogum prope oppidulum quod Muram vocant, & in lura cacumine, vel sub ipsa niue statim vt nix liquata est sese attollens, & florescens mensè Maio, vel Iunij principio: radice in appendices diuisa, Rapunculis similes, quod fortassis Plinius ramosum dixit, fibrata, gustus valde acris cū terra primū exit, vnicò folio, crasso, canoso, pallidè virente, venoso, lateribus diuiso, Cyclamino simili, paulò rotundiore: caule tenui, dodrāali: flore Violæ, luteo, cui foliolum alterum subnascitur, non, vt prius, rotundum, sed

ACONITVM Pardalianches  
Theophrasti, ex Matthiolo.



ῥίζα ὅμοια ἑρπετος

LIMEVM Pardalianchis genus  
vno tantum folio, Dalech.



ῥίζα ὅμοια ἑρπετος



LIMEVM alterum  
duplici folio.



fed longum & angulosum. Tam venenata plan-  
ta est, vt cum recēs erutam & lethalem adhuc  
odorem spirantem Herbarius quidam mihi  
comes curiosius & sapius olfecisset, velut  
exanimatus corruerit, vnde & ab eo pisces in-  
terfici posse, animo concipio. Alpinas gentes  
vallis Putæ sagittarum ferrum huius plantæ  
succo tingere compertum est ad ferarum ve-  
nationem, inenitabili letho pereuntibus, quas  
sic vulnerauerint, vt vel gutta sanguinis è plaga  
fluat. Acicula huius succo tincto columbum  
leuiter punctum nos paulò post mori vidimus,  
cùm tam exitiosæ facultatis periculum facere-  
mus. Lineum Plin. cap. ii. lib. 27. quo sagittas in  
venatu Galli tingunt, & ideò venenum cerua-  
rium vocant, quidam esse arbitrantur. Hæc-  
tenus de Aconito Pardalianche. Nam Lycocto-  
num seu Cynoctonum ostendendum, alterum  
Aconiti summum genus, cuius differēcias plu-  
res, quàm recensuerit Dioscorides, hodie norūt  
Herbarij: tametsi ambigua mediæ ve naturæ  
inter Ranunculos, Elleboros & Napellos quædā  
earum esse videantur, vt rectè scripsit Pena. Ho-

rum Aconitorū quædam luteum florem, alia cæruleum, aut purpurascētem pro-  
ferunt. Matthiolus aliquot Aconiti Lycoctoni species proposuit sine vllis descri-  
ptionibus, quòd appictæ imagines eas ad viuum representent. De floribus tantum  
dicit, eos in quarto & nono aureos esse, in reliquis purpureos. Dodonæus in Hi-

ACONITVM Lycoctonum II.  
Matthioli.



ACONITVM Lycoctonum III.  
Matthioli.



floria





istoria stirpium Elleborum adulterinū nigrum siluestrem Fuchsi pro Lycop-  
no primo posuit. In Historia purgant. aliud Lycopclonum maius luteum facit, cui  
folia sunt ampla, vt ipse descripsit, in complures partes confecta, Platani foliorum  
similitudine, sed profundioribus diuisuris, haud *μακρότερα* (vt perperam Diosco-





VENENATARVM  
ACONITVM VIII.  
*Matthioli.*



ACONITVM Luteum  
luteum maius, Dodonai.



LIB. XVII. 1741  
ACONITVM IX.  
*Matthioli.*



ACONITVM Luteum  
Dod. ex Cod. Casareo.



ridis exemplaria legunt) sed *purpurea* id est, minora, resplendentia, ac non raro nigriora, superiore videlicet parte, inferiore magis albicant: caulis bipedalis & quandoque altior rotundus, laevis ad latus nonnihil inclinans, & nequaquam in totum recte assurgens, in ramos diffusus: flores ordine supra inuicem digeruntur, colore pallentes



pallentes subluteo: semen in corniculis nigricat: radices sæpius nigrae, multis cir-  
ris crassis & flexuosis implicatae. In montosis & opacis saltibus, auiisque nemo-  
ribus viret. In hortis Galliae & Belgij colitur. Trium illorum, quorum quædam  
Dioscoridis exemplaria meminerunt, postremum esse censet Dodonæus, Ponti-

*ACONITVM Lycoctonum*  
*luteum minus, Dodon.*



*ACONITVM aliud,*  
*Dalechampij.*



cum dictum. Est Marthiolo Aconitum Lyco-  
ctonum primum. Arabes Stragulatorem adib,  
id est, lupi appellant, Officinae quædam Napel-  
lum luteum, nonnulli Luparia, Germani *Wol-*  
*urtz*, Hispani *Yerua matta louo*, Galli *Tue-loup*.  
Pro deteriore cæteris veneno habetur à venato-  
ribus, qui eo lupos interficiunt, non quòd idem  
nō faciant alia Aconita, sed quia hoc citius &  
certius. Quin nonnullis in locis, inquit Pena,  
adulti flores vel solo manu fauces tumore illi-  
co excitato adurant, & vertiginem cient. Aco-  
nitum Lycoctonum aliud depinxit Dodonæus  
paruum siue minus cognominatū, descripsitq;  
his ferè verbis. Humilis est herba, inquit, præ-  
ter foliorum pediculos cauliculos nullos ha-  
bens: sunt autem hi breues, vix palmum alti &  
tenues, folium verò in singulis vnicum, cir-  
cumscriptioe quidem rotundum, sed instar  
Napelli multifidum, & profundis incisuris ra-  
diatim dissectum, quibus medius insidet folicu-  
lus luteus, forma Ranūculi, quem tamē non ca-  
piculum, sed siliquæ ponē sequatur, parua, tres  
aut quatuor, sursum arrectæ, veluti Lycoctoni.

*LYCOCTONVM ceruleum l.*  
*flore Delphinij, Dodon.*





Radicula subest crassa, tuberosa, prima Anemones amula, quasi geniculis aliquot articulata, gustus admodum acris, ex qua foliorum pediculi exeunt. In Belgij hortis floret, inquit, non raro ipso Ianuario, cum clementior Hyems fuerit: unde Aconitum hyemale siue hybernium illis dici coepit. Aconiti autem speciem esse &

LYCOCTONVM *caruleum*  
*paruum, Dodon.*



ACONITVM *candidum,*  
*αργυρον, Dalech.*



forma foliorum siliquarumque, & pernitiola herbae facultas ostendunt. Matthiolus etiam Aconitum Lycoctonum secundum fecit. Vt Lycoctoni lutei, ita carulei aut purpurascantis aliquot sunt species. Prima Dodonæo est quæ proceris caulibus assurgit, instar Napelli: folia habes variè similiter & creberrimis incisuris diuisa: flores secundum caules superius veluti in longam spicam compositos, è puniceo ac obscuriore colore purpuram æmulantes, forma ferè Floris regij (quem Delphinium multi esse arbitrantur) in posterius videlicet corniculum desinentes: siliquas & semen ut in maiori Lycoctono luteo: radices oblongas, crassas tres aut quatuor, paucis adherentibus fibris. Altera tota externa facie Napellum refert, caulibus videlicet dissectis, siliis & nigricantibus foliis, flore caruleo, hiantes, ex totidem partibus eodem ordine composito, siliquis etiam ac semine omnino similibus: sed radix est diuersa, conifera scilicet effigie, bulbosa, ex cuius media basi cirri multi & fibræ tortiles exoriuntur. Tertium genus cauliculos profert tenuiores, breuioribus, dodrante altiores: folia diuisura Ranunculi aut Lycoctoni lutei, minora tamen: strobili caruleo nitent colore, paulò minores quam Napelli: siliquæ & semina eadè quæ aliis: radix fibrosa, nigricans, adnatis exiguis veluti bulbulis facillè propagatur. Hæc in montibus reperiuntur, unde in Belgij hortos sunt trallata. Primum ac tertium vna cum Napello sæpenumerò aut non multò post, sed secundum multo seriùs floret. Lycoctona esse ex ipsa facie perspicuum est, ac nocendi non minoribus facultatibus prædita. Aliud Aconitum ex Dalechampsio hic depictum est, quod candidum & αργυρον cognominari potest. In opacis excelsum montium iugis provenit, tenuibus & perquam multis radicis fibris, nigricantibus: foliis multis, Geranio aut Aconito luteo similibus, longo pediculo & villosa subnixa: nullo caule, unde αργυρον dictum: floribus principio rubore aspersis, sed cum senescunt albicantibus, duobus aut tribus ex summis foliis prodeuntibus, sex foliolis constantibus, singulis suo pediculo singillarim insidentibus. Semen

In his pur  
gant.



ACONITI *Lycoctoni genus*  
aliud, *Dalechampi.*



Lib. 6. c. 7.  
Aconit. no  
82.

Lib. 13. c. 19.

Cap. 23.

Lib. 6. sim.

videre non licuit. Id cum Dalechampius Gernium album esse suspicaretur, Herbarij quibus naturæ & facultatis huius plantæ indaganda negotium commiserat, venenatam esse, & ex Aconitorum genere asseruerunt. Dodon. in Histo. parg. Ranunculum albo flore vocat. Item aliud ex eodem Aconiti Lycoctoni genus exhibemus, quod in montosis ac gelidis silvis nascitur, lapidosisque cliuis sæpius ad Orientem versis, radice per terram serpente, candida, carnosa, acris, crebris gemmularum nodis scabra: caule sesquipedali, teretissimo, foliis Ebuli, valde serratis, amplioribus, in vno pediculo fere septenis, flore Viola, è puniceo candicante, semine paruo, in siliquis latiusculis. Cum Aconita omnia lethalia sint, quæ mala inuehant, & quæ sit omnium communis mendendi ratio ex Dioscoride & aliis veteribus exponamus. Aconitum statim atque bibitur linguam eduleat cum quadam adstrictione, & ab educatione vertigines, potissimum cum exurgere conantur, inducit, & oculorum humiditates, pectorisque & hypochondriorum gravitate

rem, simulque multi status redduntur. In his, vomitionibus venenum educere oportet, & clystere alium purgare. Vtemur in potu Origano, aut Ruta, aut Marthubio, aut Absinthij decocto cum vino absinthire, vel Erucæ (reclius *Erucæ*, sicuti Paulus & Aëtius legunt, quam *Erucæ*, id est, Sempervivum, ut vulgaria habet exemplaria) aut Abrotoni, aut Chamelææ aut Chamæpityos. Prodest etiamnum ipsis opobalsami drachma una cum melle, aut castorei & piperis & rutæ par pondus cum vino. Et coagulum hædi, aut leporis, aut hinnuli cum aceto. Ferri quoque recrementum, aut ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum igne candens in vino restinctum, ut vinum hoc bibatur. Lixivium item cum vino & gallina coctum, aut cornuum bubulorum iura cum vino sumpta. Dicitur autem Chamæpityos privatim ipsis convenire. His addit Aëtius, eos qui hausere, post dulcedinem & adstrictionem, amaritudinem percipere, constrictionem maxillarum comitari, & oris stomachi morsus, caligare oculos, & subrubentes videri, perseverantemque malotremorem concussim tumoremque totius corporis sequi. Sed eandem medendirationem Aëtius & Auicenna præscribunt. Petrus Aponensis libro de venenis iis qui Aconitum biberunt sphragidem Lemniam commendavit drachmarum duarum pondere ex calida potam, deinde vomitum excitari iubet, à vomitu thetriacam eodem pondere exhiberi, ex vino, in quo incocta fuerit Gentiana, putrefugendum, tamen ad putrefaciendum quædam extra os & sedem aptum est. Herbarum autem radix ad hæc utilis est. Aconitum Lycoctonum esse similis facultatis, sed peculiariter lupos interficere, sicut illud pardos.

NAPOL





ST & Aconiti Lycostoni species, qui à Barbaris & recētoribus Na- **Nomina**  
pellus à figura Napi in radice apparentis vocatur, à Germanis *Blou-*  
*voluurtz*, & *Rappenblumen*, id est, flos rapaceus, à Belgis *Blauw-vuol-*  
*z-wortel*, à nonnullis *Muncks cappen*, id est, monachi cucullus siue cap-

pa monachi, à Gallis *Chapperon* siue *Coqueluchon de moine*. Dicitur & Thora. Caulem **Forma.**  
mittit bicubitalem atque etiam tricubitalem, petiolosque graciles folia ferentes  
Ranunculi maiora, è virore nigriora, supina parte nonnihil albicantia, numerosio-  
ribus altioribusque incisuris diuisa. Flores à medio caule ad summum vsque ordi-  
ne prodeunt, colore cæruleo venusto, cuculli hiantis, aut galeæ patentis speciem  
omnibus suis partibus referentes: quinque enim constant particulis, quarum ma-  
ior & superior cucullo, aut cassidi, capitis cauo operimento similis, duæ medio-  
res latera contegunt, reliquæ inferiores minores sunt, & angustæ, nonnullis ex  
ignis staminibus mediis, villosis, quibus extremis puncta lurida viridiæve insunt:  
ex medio etiam duo paulum inflexi exoriuntur styli, non prius quam eleuetur cu-  
cullus se exerentes, quos sequuntur siliquæ, in quibus semen nigrum, angulosum  
ac minutum, vt luteo Lycostono: radix crassa, oblonga, Napi figura, foris nigri-  
cans, intus candidior. In Alpibus Anania & Rhetia, tum alibi in montibus spon- **Locus.**  
te prouenit. Apud Belgas quandoque in hortis reperitur. Maio aut Ianio. inter- **Tempus.**  
dum etiam serius alsiosis locis floret, semen Augusto dat. Auicenna de Stragula-  
tore adib, & Stragulator leopardi, tum de Napello seorsum tractauit. De Napel- **Li. 2. c. 684.**  
lo verò hæc. Napellus venenum perniciosum, est in summo caliditatis & sicci- **& 685.**  
tatis. Delet albaras linitum, & confectio eius dicta Alberzachali in potu sumpta **Li. 2. c. 499.**  
delet albaras, & similiter confert lepræ. Est venenum destruens bibentem se, ma- **Vires &**  
ior verò portio medietas drachmæ vnius, & secundum me, minus hoc interficit. **Temper.**  
Theriaca verò eius est mus Napelli, & ipse quidē est mus qui eo nutritur. Seman-  
verò (id est, coturnices) ex eo cibantur, & non moriuntur, & ex omnibus confe-

NAPELLVS, Dodon.



ctionibus Diamoschum magis ei resistit. Et alio **Li. 4. fen. 6.**  
in loco. Napellus est de deterioribus. Et acci- **tract. 1. c. 1.**  
dit potanti ipsum, vt apostementur labia & lin-  
gua, & egrediantur oculi eius, & frequens fit su-  
per ipsum vertigo, & syncope: & non excer-  
cere, seu non mouere potest crura, & est oppi-  
dō malum. Et qui euadunt ex eo raro euadunt  
quin cadant in hæticam, aut phthisim, & quan-  
doque facit epilepsiam odor eius. Et eius succo  
imbibuntur sagittæ, & interficiunt quem vul-  
nerant statim. Cura. Oportet vt festinetur ad  
faciendum vomere bibentem ipsum cum de-  
coctione seminis Napi & Rapæ, & detur in  
potu vinum, & butyrum coctum vaccinum,  
dando potum supra potum, & similiter deco-  
ctio corticum glandium cum vino. Deinde cu-  
ra eius principalis est Bezahar, & medicamē de  
musco, & Algeduar (id est, Zedoaria) & Duha  
seu bis mus buha, (id est, herba nascens cum  
Napello, & Napellus Moyſi, animal quod mo-  
ratur in radice Napelli sicut mus, veluti ipsemet  
interpretatur) & theriaca magna quandoque **Lib. 2. c. 533**



confert in eo vsque ad terminum. Et de melioribus rebus est vt in potu detur musculus in fricatione albezahard, aut quantitas drachmæ vnius de medicamine muschi cum siliqua vna muschi. Et existimant quidam quod radices Capparis sunt Bezahar Napelli. Et omnia albezahard sunt bona ei, & propriè illud quod simulatur albumini, & habet fila sicut fila lithargyrij. Et animal nominatum mus Napelli, est contrarium Napello, & destruitur eius operatio cum comeditur ex ipso. Hæc Auicenna. Cuius Napellum esse plantam eam quam descripsimus Herbariis persuaferunt sæua & atrocia illa symptomata, in quæ inciderunt qui sumperunt. Tota quidem pernitiola est admodum, sed radix pernitiolior, adeo vt manu aliquandiu retenta, inquit Matthiolus, quousque concalescat, tenentem perimat. Quinetiam pastores necatos asserit, qui assandis auiculis Napelli caule pro veru temere vsi essent. Immanis illius in necandis hominibus facultatis exempla aliquot idem refert. Eandem evidenti sed perquam miserabili experimento Antuerpiæ olim compertam fuisse Dodonæus auctor est. Cum enim ab imperitis huius inter acetaria illata essent radices, quicunque eas ederunt, mox seuerissimis correpti symptomatis breui interiere. Inter remedia & antidota, quibus tam lethali veneno statim succurrendum, Auicenna murem Napelli radice nutritum refert, qui naturæ huius maleficæ tota substantia aduersetur, & sumentem ab omni liberet periculo. Matthiolus murem Napelli radicibus victitantem à se sæpius inuentum affirmat, qui Napellus Moyfi dicitur ab Auicenna. Petrus Aponensis etiam Napelli bezoar esse scribit murem nascẽtem in radice Napelli, qui exsicandus est, & dandus in potu drachmarum duarum pondere. Sed Antonius Guainerius Papiensis, sua ætate celebris Medicus, in tractatu de venenis hunc non murem esse sed muscas existimat. Refert etiam quendam philosophiæ ac veritatis studiosum sollicitè admodum & diligenter murem huiusmodi quæsiuisse, neque vnquam vel murẽ, vel arrosam etiam Napelli radicem ab eo reperiitam, sed muscas abundè multas folia depascentes inuentas, quas philosophus ille muris loco accipiens antidotum ex eis confecit, quam & aduersus alia, sed contra Napelli venena vtilissimam ac efficacissimam comperit. Accipit hæc terra Lemnixa, baccarum lauri, antidoti Mithridatis singulorum vncias duas, muscas Napelli vigintiquatuor, mellis & olei quantum satis est. In eadem planè sententia sunt Pena & Lobellius, scribentes accliuës montium saltus Rheticarum Alpium Napello abundare. Iunio & Iulio mensibus, cui (omni illic arroso gramine) parit pecus omne, nec ab vllò animali attingitur præterquam à muscis quæ gregatim aduolant, & illi insident, & floribus fortè innascuntur: sunt enim fermè concolorës, maiores quàm communes, alis capitibusque ex lurido viridique vel caesio virente quasi cantharides, vel cincedulæ. Hæc aiunt se attentius obseruasse quidem continenter flores rostello delibantes, caterum murem Napelli frustra diu & multis auulsis plantis quæsiuisse, & an vidissent opiliones percunctatos, vsquæ sibi visum negasse. Quare tum suspicatos Arabas ex *μύζα μύς* fecisse, id est, ex musca murem: *μύζα* enim musca est, *μύς* mus: nullum enim antidotum ex mure parant, ex muscis verò præstantissimum aduersus funestum Tarantæ morsum, & epidemicos morbos. Cuiusmodi hoc. Accipe muscas quæ pastum acceperunt de Napello viginti, Aristolochiæ, Boli Armeni ana drachmam vnam. Nec in vlla planta huic congenere muscæ hæc cæruleæ insident aut victitant. Quo certior est coniectura istum Napellum esse Arabum, & vnum esse ex Dioscoridis Aconitis. Et verisimile est non murem esse qui Napello victitet, sed muscas quæ linctu eius viuunt: nam Aconitum, cuius Napellus est species, mures interimit, atque inde *μυοκτόνον* & *μυοφόνον*, id est, muricida dicitur. Plantam aliam hîc depictâ etiam Napellum vocant Herbarij ob venenatam facultatem, & Napellum leucanthemum seu

in cap. 73.  
lib. 4.

in Histor.  
purgant.

Li. 2. c. 500.  
Lib. de ven.  
enis.



NAPELLVS *racemosus*,  
Dodonai.



mum seu racemosum cognominant. Nascitur in saxosis, gelidis, & niuosis montibus cum Aconitis inter lapides & saxa: radice longa, lata, innumeris fibris nigris capillata, quæ in plerisque id genus plantis sic complicatur, ut retia temere congesta quis iudicet. Sub his fibris veluti sub fornice inter lapides, ex quibus radix proflit, cameratum spatium est, in quo mures occulti sæpius deprehenduntur. Caules multos emit, sesquipediales, glabros, Filicis modo, nodosos, prope radicem nudos: folia Angelicæ similia, gustus amarissimi & abominandi. odoris tetri: florē in caulium vertice albū: fructum Hederæ corymbis similem, qui nouem aut decem acinis constat mollibus, nigris. Narrant montium, in quibus hæc planta frequens est, incolæ, ea sumpta lupos & homines necari præsentissimo exitio. Quidam venenatam esse negant, & Actæam Plinij esse volūt. Actæa, inquit, graui fo-

Lib. 27. c. 7.

caules asperos Actææ tribuit Plinius, quos in hac nostra læues esse diximus. Quidam Plinij codices habent caulibus Anisi, falso. Cornarius legit caulibus angulosis, & Actæam Ebulum appellatam à Plinio videri ait, & apud Paulum Æginetam radicem Sambuci radicē interpretatur. Dodonæus Christophoriana nomine describit, & Aconitis adnumerat, propter periculofam & Aconito similem quam habere creditur facultatem: fertur enim exitialis ac non minus noxia quam Aconitum.

Lib. 3. c. 48.

In Hæbor. pu. gant.

ANTHORA.

CAP. XII.

**Q**UONIAM pessimè consultum humano generi foret, si de venenis ageretur sine remedium declaratione, huic de venenatis plantis libro postremam addemus plantam, quæ cum aduersus venena omnia, tum maximè aduersus Napellum plurimum valet. Ea est Anthora vulgo dicta, quasi Antithora, seu potius Antiphthora, quod Thoræ aduersetur, & eius sit alexipharmacum. Ea, ut ferunt Herbarij, cum Napello vel prope Napellum crescit in Rhetia & Sabaudia alpibus, atque etiam alibi. Taurini Ligures atque Lemani lacus incolæ aduersus exitiale Thoræ venenū diuinitus comparatam esse putant, qui radicem huius copiam Venetias deferendam curant. Caulem pro-

Nomina

Vide Phlegm. pag. 335.

Forma.

Lib. 2. c. 509.



NAPELLVS prior,  
Marthioli.

ANTHORA, sive Anthora,  
Math. Napellus: Moys.



Li. 2. c. 745.

prodesse ad quæ Napellus, ad albaras & ad lepram, & theriacam esse viperæ & venenatorum animalium. Alio in loco tradit Zedoariam illam meliorem esse, quæ cum Napello crescit, atque eius vicinia illius vires retundi. Ex quibus colligere licet Anthoram esse Napellum Moyfi Auicennæ, & eiusdem Zedoariæ. Diuersam tamen Zedoariam habent Officinæ, de qua dicemus in Peregrinis. Amarissima est Anthoræ radix, & non solum Napello & cæteris omnibus venenis aduersatur, sed etiam ad purgationes utilis est: serosos enim & mucosos humores per inferiorem ventrem educit, lumbricos & ventris tineas pellit. Pena & Lobellio auctoribus. Hugo Solerius scribit hanc radicem ad fabæ magnitudinem in iusculo aut vino derafam propinari ad largas durorum corporum per superna & inferna purgationes. Antonius Guainerius in tractatu de peste refert Anthoram magnæ esse aduersus pestem efficaciam. Et quod ad experientiam, inquit, vidi consimilis cum Dictamno virtutis Anthoræ radicem esse. Et est herba quæ iuxta Thoram illam scilicet herbam nascitur, ex qua venenum conficitur, cum quo in Alpibus Salutariorum & Pinarolij capras siluestres venantur. Et hæc radix Anthoræ assimilatur nucleis oliuarum, & est bezoar illius Thoræ, quæ est adeo venenosa, vt omnia animalia sua interficiat venenositate. Hæc ille. In collibus prope Diam Allobrogum ea frequentissima nascitur. Indigenæ vocant *L'herbe du maclou*, id est, herbam colicis doloribus utilem. Radicum geminarum altera quotannis, vt in Cynosorchis, flaccescit: altera fit vegetior. Credit in eo tractu Herbariorum vulgus, marcescentem radicem coli cruciatus excitare, grandio rem & auge scentem sanare.

HISTOR



# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

### LIBER DECIMVS

### OCTAVVS,

(649)

*In quo describuntur & ad viuum depinguntur Planta Peregrinae.*

GUAYACVM. CAP. I.



VLTAE sunt stirpes quæ in remotissimis terrarum oris exoriuntur, tam excellentibus dotibus præditæ, vt iis in tanta nostrarum copia carere nec possumus, nec velimus. Raritas pretium & admiratione auxit, & discendi cupidos veteres Græcos, Latinos, Arabas ad earum notitiam comparandam ita stimulauit, vt maria traicere, in barbaras regiones proficisci, edita cõscendere, per saltus & auia vagari, omnia denique perlustrare, nulliq; labori parcere voluerint. Quare multi quidem multa & præclara de iis literis consi-

gnarunt, sed non omnes omnia quæ viderint, sed auditione duntaxat acceperint: ob id incerta quædam, nonnulla fabulosa tradiderunt. Nunc verò cum regiones multæ illis prorsus ignotæ, & velut alter orbis detectus sit, iisdem discendi stimuloque veriora & certiora de aliis quæ ab illis tradita fuerant, literarum monumentis mādantur. Ex quibus ea promptissimè quæ studioso lectori satisfacere possunt. Sed multas peregrinas platas, quæq; ex iis manant, aliis libris exposuimus, vt in Silua Siliquam cathartica, Ficum Nigritarum, Populum Peruanam, Ahouai, Hauri, & plures alias: in Catharticis Aloën, Rhabarbarum, ordine & quadam cum aliis similitudine id postulante. Nunc de peregrinis arboribus, fruticibus, herbis agemus, quarum fructus, cortices, ligna, radices, semina, succi, resina, gummi magno ac quotidiano nobis vsui sunt. Exordiemur autè à Guayaco omnibus notissimo. Indi *Guayacan* vocant, nos Guayacum, siue Gaiacum, alij Lignum Indicum. Hoc alij Ebenum esse dicunt, aut Buxi speciem, alij alis nominibus appellat. Sed nouum est arboris genus nec in his regionibus aut vllis aliis toto orbe veteribus cognito visum, sed in eo solùm qui nuper inuētus est, quæ sic descripsit Nicolaus Monard. Magna est arbor, Illicis magnitudine, ramosa, matrice magna, nigricante, materie quàm Ebenus durior, cortice crasso, gummoso siue pingui, & cum siccū est lignum faciē decedente: folijs exiguis & duris: flore luteo, cui succedit fructus rotundus, solidus, quo semina continentur veluti in mespilo. Frequens nascitur in insula S. Dominici. Aliud eius genus in insula D. Ioannis de portu diuice postea

Nomina

Forma

Locus



reperitum est, superiori ferè simile, sed minus omnino, & ferè sine matrice, odoratius & amarius superiore, quo vti desiere vt istud vsurparent, ob admirabiles virtutes Lignum sanctum appellatum: experientia enim docuit altero præstantius esse. Quanquam vtriusque facultates in curanda lue venerea maximè sint efficaces: quare ad eam curandam siue coniunctim, siue separatim vtriusque propinatur decoctum. Secundum istud genus videtur esse, quod Pena Palmam aut Palum sanctum Indiæ occidentis vocat, quam speciem à Guayaco diuersam facit, etsi similis esse dicatur, nempe non vassa vt Fraxinus, sed minor, & concolore cortice: foliis Plantaginis, sed crassioribus, minoribus, pinguioribus, breuioribus: fructu iuglandis magnitudine, aluo subducendæ idoneo. Idem Pena Palmæ sanctæ similis ar-

*PALMÆ sanctæ similis arbor.*



boris à naucleris Angliæ, qui ex India redierant, surculos se habuisse scripsit, quos depinxit & descripsit his ferè verbis. Rami sunt grandioris arboris, recti, cortice arboris ludæ, folio Citri carnofo, nudo, quàm Lauri latiore, breuiore, neruoso, in quorum summitate hærent folliculi pallidi, coriacci, circumdati rotunditatis, admodum compressi, aureo nummo Gallico ferè pares: in quorum medio insunt semina lentis effigie & colore, compressiora, gustu amaricante. Hæc ex Pena. Quomodo autem & quando Guayaci vsus primùm innotuerit, ita narrant Hispani quidam magnis doloribus Hispanici morbi, quem ab Inda muliere contraxerat, torquebatur, cuius seruus in ea prouincia medicinam faciens decoctum Guayaci propinauit, quo non solùm à magnis doloribus illum liberauit, sed etiam pristinæ sanitati restituit: cuius exemplo multi alij Hispani eodem morbo infecti curati sunt. Eius morbi curatio Hispani statim euulgata fuit ab iis qui ex ea insula redierant: hinc per totam Hispaniam, inde per vniuersum orbem, quem hæc lues paulatim oc-

cupauit. Atque hoc sanè medicamento nullum aliud aduersus eum morbum præstantius, sic volente Deo, vt vnde manarat morbus, inde remediũ peteretur. Nam primùm ex India occidentali hoc malum duxit originem, præcipuè verò ex insula D. Dominici, quæ prima fuit noui orbis ab Hispanis occupata, vbi morbus hictam familiaris est, quàm nobis papulæ, neque eius contagium magnopere quiscquam reformidat. Hoc autem modo propagatus fuit. Anno à Christo nato 1493. eo bello, quod Neapoli gestum est à Carolo Gallorum rege, Christophorus Columbus ex prima illa profectioe, quam noui orbis conquirendi causa suscepserat, cum rediisset, & inuentis S. Dominici aliisque insulis inde Neapolin (ibi tum Rex Catholicus erat, pacemq; cum Gallorum rege fecerat) viros ac mulieres secum duxisset, comitantibus vltro citroq; exercitibus, Hispani primùm cum Indis mulieribus hac scabie correptis, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde ad Italos & Germanos, postremò etiam ad Gallos serpsit hoc malum, ac inde per vniuersum orbem. Ad huius perfectam curationem nullum aliud præstantius remedium, quàm Guayaci decoctum pro morbi magnitudine, ægri viribus, & totius corporis temperatura à medico præscriptum: est enim eius morbi antidotum, neque eum curat manifestis suis qualitibus. Nam gustus ex Galeni doctrina

*Vires & Temper.*



doctrina in lib. de Simpl. medicament. facultatibus tradita, sicca admodum & calida substantia esse demonstrat, quod amarum sit eius decoctum & acre, ut calidum ad tertium usque gradum esse censetur, & habere partes *ερεργητικές*, nempe subtiles, in quibus acrimonia, & terrestres adustas in quibus amaritudo consistit: quare tantam sustinet decoctione, adeo ut si decies decoxeris, paulo minus amarum, acre & spissum fuerit hoc decoctum quam primum, vixque virtus extrahi possit. Cum igitur iis qualitatibus praeditum sit, non solum iis non curaret hunc morbum, qui ex calida & sicca oritur hepatis intemperie, imò potius exacerbaret. Ex quibus liquet occulta qualitate, & forma specifica, ut aiunt, id agere, quemadmodum & multa alia medicamenta. Conuenit etiam huius ligni decoctum incipienti hydropi, asthmaticis, epilepticis, morbis vesicae & renum, articularum doloribus, omnibus morbis qui ab humoribus frigidis & flatibus proueniunt, & diuturnis, quibus nihil profuerint cetera medicamenta quae in usu sunt quotidiano, praefertim si morbi illi lucem veneream subsequantur. Dentes etiam confirmat & dealbat, si saepius eius decocto colluantur. Qua verò ratione praeparandum sit ligni huius praestantissimi decoctum, quis eius usus, quae eo ventibus victus ratio seruanda, non est quod hic explicemus, cum haec omnia lippis & tonsoribus iam sint notissima.

## EBENVS.

## CAP. II.

**E**BENVS, Graecis, Ebenus Latinis, Arabibus *Abanus*, & *Abenus*, Italis *Ebeno*, Gallis *Ebene*. Ebenus optima, inquit Dioscorides, habetur *Aethiopica* & nigra, nullos habens venarum discursus, factitio cornu laeuore similis, cum frangitur densa, mordens gustu & subadstringens. Satitur iucundo odore super carbones sine fumo. Recens igni admodum ob pinguitudinem accenditur, & trita ad corem rufescit. Altera est Indica lineas albas habens & fuluas, item frequentes maculas: ceterum prior bonitate antecellit. Theophrastus in India tantum prouenire Ebenum scribit his verbis. Ebenus quoque Indiae peculiaris est, cuius duo sunt genera, vnum laudata materie pulchrumque, alterum ignobile. Quod praestantius, rarum, alterum copiosum. Coloris gratiam non recondita acquirit, sed statim sua natura habet: fruticosa est arbor Cytisi modo. Idem cecinit Maro.

Nomina  
Lib. c. xii.  
Forma.

Lib. 4. hist.  
c. 19.

Lib. 2. Geor.

- sola India nigrum

Fert Ebenum, solis est thurea virga Sabais.

Hos secutus Plinius, Vnam, inquit, e peculiaribus Indiae Virgilius celebravit Ebenum, nusquam alibi nasci professus. Herodotus eam Aethiopiae intelligi maluit, in tributi vicem Regibus Persidis e materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Aethiops cum auro & ebore, prodendo. Et mox, Aethiopae forma nuper allata Neroni principi, raram arborem Ebenum Meroen usque a Syene sine imperij per nongenta xvi. m. passuum, nullamque aliam nisi palmarum generibus esse docuit. Accendi eam Fabianus negat: vritur autem odore iucundo. Duo genera eius, rarum id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi: alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India dispersum. Theuetus scribit Indiam ferre & alere tantopere laudatam Ebenum, sed praecipue in insula quam Palmoborre vocant praestantissimam & nigram colligi. Ceterum a Ebenus quae ad nos adfertur legitima sit, merito dubitari potest, quod suffitu nullum iucundum odorem emittat. At hic tempore & longo per maria itinere euanesce & perire potest. Eum Officinae pro Xyloaloe habent. Nec obstat, inquit Pena, quia Officinae Ebenus species sit Guayaci. Nam praedura assule, quae in Officinis visuntur, & aquis merita fidunt, tum pinguedo

Lib. 2. c. 14.

For. lib. 1.  
c. 1.



Vires.  
Lib. I. c. III.

Li. 24. c. II.

Li. 6. simpl.

guedo, quæ exudat igni perinde atque è Guayaco, tum aspectus ipse, tum vires & sapor id testari videntur. Præterea odor ei inest Guayaci, & vires ad eadem quæ Guayacum commendantur. Quod si quis obiciat solam Indiam nigrum ferre Ebenum ex Poëta, respondet Ebena idem euenire posse quod Guayaco, quod nõ modò in Taprobana finitimis ad Orientem & Austrum, sed etiam in India occidua longissimè disita siluestris proueniat. Ebeni facultates has esse scribit Dioscorides. Caliginem oculorum deterget ad veteres destillationes pustulæq; mirum in modum pollet. Si quispiam facta ex eo coticula collyriis vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæve in vino Chio die noctuq; macerata in collyria digerantur. Nonnulli pertrita ipsa excolant. Alij pro vino aqua vtuntur. Vt itur in fictili nouo, donec in carbones redigatur. Lauatur plubi vlti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus cõducit Plinius aliter de eadem re disserit. Non omittetur Ebenus propter miraculum. Scobem eius oculis vnice mederi dicunt: lignoque ad cotem trito cum passo caliginem discutit. (Dioscorides dixit lignum vice cotis ad terenda collyria paratum vtilius esse.) Ex aqua verò radice, albugines oculorum: item tulsim pari modo Dracûculi radices adjecto cum melle. Ebenum Medici & inter erodentia assumunt. Quæ postrema, inquit, ex iis lignis est quæ trita cum aqua in succum soluuntur, vt lapidum nonnulli. Vis ei inest calfaciendi, extergendi, & tenuium partium. Quamobrem quæ pupillas offuscant extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones, & pustulas accommoda sunt.

T H V S. CAP. III.

Nomina  
Li. 2. c. 32.  
Lib. simpl.  
cap. 175.  
Lib. I. c. 70.  
Locus.  
Electio.



RAECIS Μαῦρος & Μαυροῦς, Latinis Thus, Auicennæ Conder, Serapioni Ronder corruptè, Italis Incenso, Germanis Vucrauch, Hispanis Encienso, Gallis Encens. Thus, vt refert Dioscorides, in ea Arabia gignitur quæ Thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere, inquit, malulum Stagonias appellatum, natura rotundum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum verò suffuluum est, & colore liuidum, sed rotundum industria factitant, nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus versant, donec rotunditatem contrahat. Verum huiusmodi Thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui Copiscum vocant, minus multo & fuluius. Est & genus cui Amonitæ cognomen est, alioqui candidum, quod dum molitur, magis stiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere Pini resina & gummi: quod facile deprehendi potest, quod suffitum gummi flammam non eiacularatur, & resina in fumum euanescit, Thus verò statim ardet: idem maleficium odor prodit. Hæc de Thure Dioscorides, cuius historiam fusiùs ex Theophrasto & Plinio describere non iniucundum fuerit. Gignitur Thus præter Arabiam nullis, ac ne Arabiæ quidem vniuersæ, sed priuatim in medio ferè regionis, circa Aramitas pagum Sabæorum. Spectat is locus Orientem æstiuum vndique rupibus inuius, & à dextera maris scopulis inaccessus. Siluarum Thus proferentium longitudo est centum milia passuum, latitudo dimidium eius: quas & Minæi attingunt pagum alium inco-lentes, per quos Thus euehitur vno tramite angusto, à quibus etiam Thus Minæi dictum est: etenim hi primi commercium Thuris fecere, maximèque id exercent. Cæteris Arabibus videre Thuris arbores interdictum est, his exceptis, ac ne Minæi quidem omnes has arbores videre possunt: ius enim in Thus & legendi potestas trecentum tantum familiarum esse dicunt, quæ id sibi per successiõnem vendicant, quæq; ob id sacræ vocantur, quia cum incidunt has arbores, aut metunt, nec

ovs a. ovio, pœu  
ovos, ro. uia  
ma uel pœu  
ul pœu  
pœu  
ovs, dicit. qu  
Lib. 9. hist.  
cap. 4.  
Li. 2. c. 14.

Ni baros, a. Ni bar  
sillo hie Ni bar  
uia, ex villa,  
hinc Ni baros, qu  
Ni baros, qu  
sillo

Thy uero me agnoscere d. a. turbando uide hie. pag. 4. n. 1.



feminarum, nec funerum congressu polluuntur, atque ita religione merces au-  
gentur. Quidam promiscuum ius iis populis esse tradunt in filijs, alijs per vices  
annorum diuidi. Ceterum quāquam prisci Romani in Arabia bella gesserint, ta-  
men arboris Thuris facies à nullo quod sciam, inquit Plinius, Latiorum tradita  
est. Græci quoque variant. Alij enim, vt scribit Theophrastus, folio Pyri minore  
duntaxat, & herbidi coloris prodidere. Alij Lētisco similem, subrutilo folio. Iuba  
tradidit contorti esse caudicis, ramis Aceris maxime Pontici, succum amygdalæ  
modo emitte, talisque in Carmania apparere, & in Ægypto satis studio Ptole-  
mæorum regnantium. Cortice esse Lauri constat: quidam & folium simile dixere.  
Talis certe fuit arbor Sardibus, nam & Asiæ Reges ferendi causa habuere. Qui  
mea ætate Legati, inquit Plinius, ex Arabia venere, omnia incertiora fecerunt,  
quod iure miremur, virgis etiam Thuris ad nos commeantibus: quibus credi po-  
tuit matrem quoque teretem enodi fruticare trunco. Meti semel anno solebat mi-  
nore occasione vendendi. Deinde quæstus alteram vindemiam attulit. Prior atq;  
naturalis vindemia, circa canis ortum flagrantissimo æstu, incidentibus qua ma-  
ximè videbatur esse prægnans, tenuissimisque tendi cortex. Laxatur hic plaga, nō  
adimitur. Inde profilit spuma pinguis. Hæc concreta densatur, vbi loci natura  
poscit tegete palmea excipiente, alibi terra circumspauita. Purius illo modo, sed  
hoc ponderosius. Quod in arbore hæsit, ferro depectitur, ideo corticosum. Au-  
tumno legitur ex æstiuo partu. Hoc purissimum, candidum. Secunda vindemia est  
Veræ, ad eam Hyeme corticibus incisis. Rufum hoc exit, nec comparandū priori.  
Creditor & nouellæ arboris candidius, sed veteris odoratius. Quidā in insulis me-  
lius gigni putant. Iuba in insulis negat nasci. Hæc de Thure veteres literis manda-  
runt, quæ omnia recentioribus non probantur. Primum Garcias per vniuersam  
Indiam Thus minime prouenire certissimum esse ait, & quicquid Thuris hic cō-  
sumitur, & hinc in Lusitaniam defertur, ex Arabia aduehi affirmat. Quare mira-  
tur Dioscoridem & eum secutum Auicennam scripsisse Thus in India nasci. De  
Arabibus tamen minus mirum, qui nigricantem colorem Thuris Indici ex Dios-  
coride, Indum ea ratione vocare possunt, qua Myrobolanum nigrum, Indum.  
Ceterum Thus Arabibus dici *Louan*, idem Garcias auctor est, nomine ex Græco  
deducto, eoque solo nomine ab omnibus vocari, à paucissimis *Conder*. Arborem  
etiam quæ Thus producit *Louan* ab iisdem appellari, eiusque duo esse genera. Vnā  
montanam, alteram in planis nascentem. Montana montibus confragosis proue-  
nit, optimūque & laudatissimum Thus profert. In planis nascentem Thus profert  
nigrum & improbum, quo cum alijs resinis permixto naues picant, vt nos pice.  
Ex arbores sunt Regis, nec cuiquam Thus colligere licet nisi Regis permisso.  
Confluunt eo negociatores ex Aden, Xael, & alijs Arabiæ locis, & cum Rege de  
Thuris quantitate quam aueturi sunt, & de pretio conueniunt, modò laudatum  
sic ac legitimum, quod nos masculum appellamus, ipsi *Melato*. Arbor Thuris hu-  
milis est, & folia habet Lentisco similia, peculiarisque est Arabiæ. Aiunt tamen  
Hispani in nouo orbe etiam Thus inueniri. Sed fides penes eos esto. Cum autem  
optimi Thuris satis vile sit pretium, improbi verò, quod interdum cum optimo  
miscetur, & cui nonnunquam corticum fragmenta inhaerent, multò vilius, id mi-  
nimè adulteratum ad nos deferri putat Garcias. Quis enim, inquit, adulterare vel-  
let, quod tam vili emitur? Theuetus à Garcia dissidet: scribit enim arborem Thuri-  
feram Pinus resiniferas referre, & succum fundere, qui tempore durefcit, & Thus  
vocatur, cum quo granula reperiuntur arenæ aut sabulo similia, quæ Mannam  
Thuris vocant. Multas insulas & regiones huius esse feraces, non solum Arabiam,  
& quibusdam in locis tam vulgarem esse, quàm Aurantiam malum in Galliæ Pro-  
uincia. Thus tamen quod in Arabia crescit, & à Pecher & Fartach regni Aden  
oppidis

Li. 1. Arom.  
Ind. cap. 6.

Nomina

Genera.

Forma.

To. 1. Col.  
mog. lib. 4.



ARBOR Thunbergi,  
Theveti.



men nihil ille, sed sibi relatum à nautis verumque trunci Pino similis sobolem esse. At folium quia rarissimum, neque à quopiam inquam expressum, pictum dedit, magis sciscitaturus sit ne plantæ resinifera, quàm asserturus. Est enim quod raro aliis contigit, ab imo pediculo ad summum usque cuculli verticem duplicatum,

THVRS *lympidi*  
*folium, Penæ.*



Lib. 1. c. 70.  
*Vires.*

oppidis defertur, vt olim, ita etiam hodie praestantissimū haberi, quod à priscis magna cum substitutione colligebatur. Id duplex esse. Vnū quod æstate, & quandiu Sol sub cane est, colligitur, candicans, purum, nitidum, pellucidum: alterum quod Vere, rubescens, pondere, pretio, bonitate & viribus superiore multo infestius, quia illud maturius, & à Sole sub cortice suæ arboris magis excoctum esse videtur. Arabes cultris arbores vulnerant, vt copiosior liquor effluat, quem *Alboucor* vocant. Ex iis arboribus quadam sexaginta Thuris libras, & superius emittunt. Arboris iconem ex Theueto expressimus, & eliciendi Thuris rationem. Thus limpidum & pellucidum, nitorēque ac puritatem succini assectum se vidisse & habuisse scribit Pena, quod Dioscoridis notis quadrabat: nam dum adolebatur suauissimum spirabat odorem, & vulneribus tumoribusque discutiendi vi relictā aliqua adstrictione ad robur partis summo erat auxilio: se Rupellæ à docto Medico Launano gummi istius glebis, arboris fructu & folio donatum. Asferbat rati-

ad nautis verumque trunci Pino similis sobolem eni-  
teque à quopiam vniquam expressum, pictum dedit,  
resiniferæ, quàm asserturus. Est enim quod raro  
ad summum vsque cuculli verticem duplicatum,  
quasi ex geminis tenuibus conflatum tunicis, va-  
gina sesquipalmum longa instar infundibuli hian-  
tis histriionis speciem præ se ferentis, supernè ga-  
leata, quod de floribus Napelli & de Lonchitide,  
non de foliis vllis memorant auctores. Nunc ex-  
plicandæ Thuris vires, & magnæ ac certissimæ ad-  
uersus varios morbos, tum internos, tum externos  
utilitatis. Calefaciendi & adstringendi vi pollet,  
auctore Dioscoride, oculorum caliginem discutit,  
caua vlcera replet, & ad cicatricem perducit,  
cruentâ vulnera glutinat, infrenatque cunctas san-  
guinis eruptiones, etiâ si cerebri membranâ in-  
fluat: vlcera quæ cacoethe vocantur, & sedis & re-  
liquarum partium permulcet tritum cum eo &



tibus in pecto confert, ad cicatrices oculorum, & caua fordésque efficax est, tollus scabris lippitudinibus auxiliatur. Manna Thuri: (Sic micas Thuris concussu elisas vocamus, inquit Plinius) vinum habet eandem quam & Thus, sed inualidiusculam. Fuligo Thuris oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua replet, carcinomata sistit. Galenus distinctius eadem declarat. Thus exalfacit ordine secundo, desiccatur primo, habet quoque adstrictionem pusillam. Sed minimum manifesta adstrictio est candido. Correx eius euidenter adstringit: quare strenue quoque desiccatur, adeo vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum Thus, & minimum habet acrimoniam. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates, multus est eius vsus apud Medicos in hamoptacis, stomachicis, coeliacis ac dysentericis, non tantum illis quae extrinsecus applicantur ipsum admiscentes, sed & illis quae intro in corpus sumuntur. Fuligo eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis quam ipsum Thus, adeo vt ad tertium vsque excessum perueniat. Habet vero etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine & repurgare, & implere quae in oculis consistunt vlcera videtur, veluti & myrrhae & styracis. Hac Galenus. Quod vero Dioscorides dixit Thus in secunda valetudine hautum insaniam mouere, nullus alius Graecorum scriptorum, quod sciam, prodidit. Contra Auicenna tradidit. Thus conferre rationi, ipsamque corroborare, & esse quosdam quibus praecipitur, vt eius infusum bibere assuescant ieiuni, sed eius vsus plurimum dolorem capitis excitare. Id tamen quod ille dixit Thus largius cum vino potum interficere, Auicenna etiam vsus eius plurimum cum vino interficere, similiter cum aceto. Serapio locum Dioscoridis sic conuertit. Et quando bibunt de eo sani, parum meliorat eos, sed si nimis cum vino biberint, inducit maniam, & amplius cum vino occidit.

Li. 7. simpl.

Li. 2. ca. 32.

Lib. simpl. cap. 178.

## MYRRA.

## CAP. IIII.

**MYRRA** Graecis, Latinis Myrrha, Arabibus *Ler Mur*, seu *Mor* appellatur, *Mirra* Italica, *Mirren* Germanis, *Myrrhe* Gallis. Myrrha scribit Dioscorides lacrymam esse arboris quae in Arabia gignitur Aegyptiae spinae non dissimilis, e cuius vulnere defluit lacryma in subiectas regetes, alia circum caudicem concreuit. Deinde genera eius recenset. Dicitur aliqua pedalis, pinguis, quae expressa stacte emittitur. Alia gabirea pinguis, lato & pingui solo nascens, ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est quae Troglodytica appellatur, accepto cognomine a loco in quo prouenit, splendens, subviridis ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quaedam, quae a Troglodytica secunda est, Bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, praeter modum exoleta, nigra & retrofrida. Omnium deterrima quae Ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur Aminae cognomine. Eligenda est recens, squalore obsita, leuis, vndique concolor, quae contracta venas vnguium modo candidas & laeues ostendit, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Plinius cum de Thure scripsisset, haec de Myrrha literis mandauit. Myrrham in iisdem siluis permixta arbore nasci tradidere aliqui, plures separatim. Quippe multis in locis Arabiae gignitur. Conuehitur & ex insulis laudata, petuntque eam etiam ad Troglodytas Sabaei transitu maris. Satiua quoque prouenit, multum siluestri praelata. Gaudet rastris atque ablaqueationibus, melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spina, caudice duro & intorto, crassiore quam Thuris, & ab radice

Nomina

Li. 1. ca. 67.

Forma.

Genera.

μύρρα, α, ιδαν γαρ  
 μύρρα, α, μύρρα.  
 δία πικρα υνγυα  
 ρεδολεα.

Electio.

Lib. 12. c. 15



etiam, quàm reliqua sui parte. Corticem lauem similemque vnedari scabiam alij spinosumq; dixere. Folium Oliuæ, verum crispum & aculeatum. Liba Olusari. Aliqui similem linipero scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuere qui è Thuris arbore vtrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice vique ad ramos qui valent. Sudant autem sponte prius quàm incendantur, Stactem dictam, cui nulla præferat. Ab hac siliua, & in siluestri quoque melior æstiva. Genera complura. Troglodytica siluestrium prima. Sequens Minza, in qua & Atramitica est, & Aularius Gebanitarum regno. Tertia Danitis, Quarta collatitia, Quinta Sembrocena, à ciuitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dalarin vocant. Est & candida non tantum loco, quæ in Mesilum oppidum confertur. Probatum Troglodytica à pinguitudine, & quod aspectu aridior est, foridiorque ac barbara, sed acrior ceteris. Sembrocena prædictis caret viriis ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem probatio est minutis glebis, nec rotundis, in concretu albicantis succi & tabescentis atque fracta candidos vagues habens, gustu leniter amara. Secunda bonitas intus variæ. Pessima intus nigra, peior si est in foris. Hæc Plinius, qui magnam partem ex Theophrasto mutuatus est. Gignitas inquit, Thus & Myrrha in regione Arabum media, circa Saba & Atramita, & Citibæna & Mamali. Nascuntur autem Thuris & Myrrhæ arbores alia in monte, alia in pede montis culturis propriis. Quamobrem alia coluntur, alia minime. Montem istum aiunt esse excelsum, & ningi solitum, amnesque ex eo in pama fluere. Myrrhæ arborem minorem esse Thuris arbore, fruticoseiorémque, caudice duro & contorto iuxta terram, crassiorémque sura hominis, cortice laui, similem Andrachne. Alij qui se vidisse affirmant de magnitudine ferè non consentiunt neutram earum arborum magnam esse aiunt, sed minorem Myrrhæ, humiliorémque eius folium esse aculeatum, non laue, vltimo simile (τοῦ αἰγίου πῆλός τῆς αἰλίας) habent vulgata exemplaria, Plinius legit αἰγίον, id est, Oliuæ crispum tamen, in extremo aculeatum Illicis modo. Alij Myrrhæ arborem Terebintho similem tradiderunt, sed scabriorem spinosiorémque, folium paulò rotundius, gustatu proximè Terebintho. Quidam, sed falsò, Thus & Myrrham ex eadem arbore nasci putauerunt. Hæc de Myrrha veteres prodidere. Ex recentioribus Garcias scripsit plurimam etiam adferri ex Arabia ad nos Myrrham, quæ Indis Bola dictum etiam ex regione Abexim quæ Ethiopix est. Qualis verò sit arbor, quæ eam præfert, aut qua ratione eliciatur, nunquam se scire potuisse ait. Illud addit, quod à quodam mercatore qui in Melinde & Mosambique negociabatur, tum à quodam hominum montanum & siluestre (Bodoms vocant, linguaque pura Arabica, quæ nonnihil ad Chaldaicam, aut Syriacam antiquam accedit, vti ferunt) quod Myrrham in Bratta & Magadaxo terrestri itinere adfert, & è Chaldaea regione sic illis vocata se deferre asserit. Theuetus falsum esse ait quod Plinius Sabæos petere Myrrham scribit à Troglodytis transitu maris: quia tum veterum, tum recentiorum auctoritate regio hæc eo loco sita est, qui mille, aut mille & ducentis leucis ab Arabum regione distet, qui omnium eorum, qui per hæc loca peregrinati sunt, testimonio nunquam tam longas peregrinationes aggrediuntur. Præterea constat nullum esse in Arabia tam diuitem, qui nauim adornare & instruere possit omnibus ad nauigationem necessariis, quæ ad Troglodytas vsque penetret, quorum sit esse creditur inter regnum Cefala, & deserta Paucal, ad altitudinem promontorii Bonæ spei, regionis frigida & ferè inaccessible ob indigenarum barbariam. Ad hæc eos erroris insinuat, qui putant Myrrham locis frigidis & humidis perfectionem suam adipisci, & arbores Thuris Myrrhæque feraces eodem

Lib. 9. hist.  
cap. 4.

Lib. 1. Aro-  
m. Ind.  
cap. 2.



eodem in loco provenire, niuésque iis in locis in quibus nascuntur frequentes esse: nam se vidisse asserit duo penè millia huiusmodi arborum in eadem silua permixtarum. Perinde falsum esse ait Myrrham quam Arabes per mare rubrum in Alexandriam Ægypti camelis important, Indicam esse, cum ipsimet Indi & Insulares Asiatici eam ex felici Arabia petant. Cum verò Myrrha Dioscoride auctore quadantenus viridis sit, pellucida, gustu acri cum amarore, negant plerique Myrrham genuinam ad nos deferri, cum ne in Alexandria quidem vix reperiatur quæ non adulterata sit, qui enim eam vendunt, multis modis corrumpunt ac vitiant, Christianos irridentes qui tam curiosè emunt. Quamobrem quæ publicè venit, tantum abest, ut virescat, pinguis & gummosa sit, ut potius arida sit, exusta, nigra vel pallida, & faciliè in puluerem dissiliat, & gustu vix amara cum acrimonia sentiat. At si talis sit Myrrha quæ passim in Officinis habetur, tamen nos vera non carere certum est: aduehitur enim quandoque quæ legitima, ac probatissima sit, sed ea rara admodum. Pena quod Bdelium putatur certò se scire ait, & à

MYRRA aut Bdelium  
suo furculo spinoso ha-  
rens, Pena.



Rondeletio experimèntis persuasum fuisse optimè viribus Myrrhæ respondere: idèò Myrrhæ speciem esse credit, nec vulgare rationis momentum addit, Londinum allatas fuisse multas peregrinas merces, inter quas plurimos huiusce ligni furculos perquisiuit, solida substantia, cortice duro, nigricante, spinis multis rigidis & crassiusculis horrentes, in quibus multa copia Bdelij congesta, intus forisq; valde amari: cetera Dioscoridis descriptioni admodum similia. Ad id quod de colore obiciunt respondet se vidisse in Officina Gulielmi Driesch pharmacopœi Antuerpiensis fuluam, albescentem, viridem etiam Myrrham. Has eius vires Dioscorides recenset. Calfacit, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vuluam emollit, & prælusam aperit: menses & partus celeriter extrahit cum Absinthio, lupinorum cremore, vel succo Rutæ admota: magnitudine fabæ deuoratur in vetere tussis, orthopnœa, in laterum pectorisq; doloribus, in alui profluvio & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine potum cum pipere & aqua: subdita linguæ liquataque scabritiem arteriæ expolit, obtusam vocem expedit: ventris tinea enecat, contrà grauem oris halitum manditur, & aduersus

§ Dalmat. m. g. c.  
et iugo, hinc § dalm.  
m. l. c. i. c. m. l. c.  
hinc § dalm. m. l. c.  
et g. m. m. l. c.  
m. l. c. i. c. m. l. c.

Li. ca. 67.  
Vires.

Li. 3. sup. pl.

alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illita glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus inflammationibus cum meconio, castorio & glaucio. Ad varos cum cassia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita firmat, oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiam laeuigat. Scribit Galenus Myrrham secundo esse ordine tum exaltescens, tum desiccans. Quare caput vulneribus illitum glutinare ea posse. Inest & amaritudo non pauca, per quam scortum & lumbricos tum enecat, tum eiicit. Inest ei & abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur



medicamentis, quæ ad vlcera & crassas cicatrices præparantur. Eadem de causa inditur & medicamentis quæ ad tussim veterem & asthma exhibentur: non tamen arteriam exasperat, sicut abstergentium nonnulla. Verum adeò moderatam obtinet absterfionem, vt nonnulli eam arteriacis admisceant, tanquam sufficienter exaltaciens & desiccans medicamen, scilicet absterfionem proficientem ab amaritudine nihil verentes.

## CARYOPHYLLVM.

## CAP. V.

## Nomina

**E**TERIBVS Græcis ignotus fuit fructus, qui καρύφυλλον seu καρύφυλλος dicitur, Latine etiam Caryophyllum & Caryophyllus, quod, si verbum verbo reddas, Nucifolium dixeris, quo nomine

longe alia res designatur, nimirum fructus aut fructus rudimentum, qui folio Nuci nihil prorsus simile habet. Nostri, quod clauum modo capitatus sit, Clauus dicitur, *Clou de Gyrosle* & *Gyrosle*, Mauritanis *Cashumfel*, & *Charumfel*, Barbaris Gariophilus, Italis *Carosano*, Germanis *Nagel*, Hispanis *Clauo de especia*. Huius meminit Plinius his verbis. Est etiamnum in India Piperis grani simile, quod vocatur Caryophyllum, grandius fragiliusque. Tradunt in Indico loco id gigni. Aduchitur odoris gratia. Serapio de Caryophyllis scribens Galenum falso citat, cum ex Paulo, vel Galeno recentiore aliquo scripserit illa mutuatus sit. De iis sic Paulus. Caryophyllum non eam habet substantiam, quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flores cuiusdam arboris, festuacei, & nigrescentes, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamarissimi, calidi & sicci in tertio propemodum ordine, qui multiplicis sunt vius ad opsonia, tum ad alia multa medicamenta. Recentiores de iisdem veriora ac

Lib. 12. c. 7.  
Lil. Arom.  
Ind. ca. 21.

## Locus.

& omnibus ferè Indis *Calafur* vocatur, in Maluccis verò *Chanque*. Nomina autem quæ sunt in Pandectario, *Arumfel* & *Charumfel*, corrupta esse putat. Nascitur Caryophyllum in Maluccis tantum insulis, quæ sunt quinque, nec procul nimium à mari, nec etiam locis nimis mari vicinis. Nascitur etiam in Zeilan, nonnullisq; aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor quàm in Maluccis.


## Forma.

Ea est Lauri forma & magnitudine, foliis etiam Laurinis, sed angustioribus, Salicis aut mali Persicæ simillimis auctore Clusio, ramis multis, copioso flore, primum candido, deinde virescente, postremum rufescente, qui induratus est Caryophyllum ipsum, clauum vocant, quod capitatum sit in modum clauum, exsertis quatuor denticulis sese stellatim decussantibus. Prouenit in extremis ramulis Myrti modo. Est autem flos is viridis adeò odoratus, vt flores omnes odoris suauitate superet. Clusius Caryophyllum non florem induratum, sed potius fructus rudimentum esse censet, quemadmodum in malis, pyris, punicis, atque aliis videre est. Nam flos ipse qui quaternis foliolis constat, huic fructus rudimento insidet, multis fibris plenus, veluti flos Myrti ferè. Pediculi oblongi, ex quibus dependent flores, vulgò *Fusti* vocantur. Folia non tam odorata sunt quam Caryophyllum ipsum, sed neque ramus ipsi nisi aliquantum siccati. Colliguntur Caryophylla à decimoquinto

## Tempus.

Septembris vsque in Ianuarium & Februarium, non manu, vt quidam volunt, sed violenta flagellatione: cultores enim flagellant altiores ramos, munito prius circa arborem solo, nullum enim genus graminis sub hac arbore nascitur, omnem succum siue humorem ea attrahente. Decussa Caryophylla biduum aut triduum siccantur, deinde asseruantur, & in Malacam aliasq; prouincias mittuntur. Quæ in arbore hærent & remanent, crassiora fiunt, neq; ab aliis





ab alijs nisi vetustate differunt. Quare non rectè Auicenna hos fructus mares facit. Nascitur ipsa arbor sponte ex decidentibus Caryophyllis. Cum enim huic nunquam desit pluvia quæ fructui alimentum præbeat qui in terram decidit, enascuntur arbusculæ, quæ intra octenniam quidem adoleſcunt, in centesimum verò annum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur. Errant, inquit Garcias, qui Caryophylli & Nucis moschatae arborem eandem esse putant. Nam Nux rotunda ferè folia habet, Pini folijs similia: Caryophyllum folio est Lauri, angustiore. Præterea Caryophyllum deferitur in Bandam insulam procul inde disitam, quæ Nucem profert. Scribit Auicenna Caryophylli arboris gummi facultate simile esse glutini Albotin, id est, terebinthinæ resinæ: quod se vidisse Garcia negarunt qui Ca. yophylla ex Malucis deferunt. Clusius tamen inter Caryophylla, quæ Antuerpiam aduehuntur, ait inueniri interdum gummi ex atro rufescens, odorum sanè, & quod prunis iniectum Caryophyl-

Lib. 2. ca. 31.

καρυοφύλλον γινέται  
καρυα εστίν  
φύλλον. ελίαν  
γινέται ην αὐτὸ φέρεται  
αὐτὸς γινέται.

Lib. 2. ca. 31.

lorum odorem refert. Id fortasse gummi fuerit Auicenna, quod tamen affirmare non audet. In Iaua insula crassiora illa & annotina Caryophylla magis expetuntur, à nobis verò tenuiora, quæ adhuc viridia aceto & sale apud Maluccanos condiuntur, sed ex his teneriora saccharo asservantur, quæ mirum in modum palato grata sunt. Lusitanæ mulieres quæ itlic habitant, ex Caryophyllis viridibus aquam stillatitiam eliciunt, mira odoris suauitate fragrantem, & cordis affectibus vtilem. Nonnulli sudorem mouent iis qui lue venera vexantur, Caryophyllis, Nuce moschata, Pipere longo & nigro. Alij Caryophyllorum puluerem capiti admovent aduersus capitis dolores à frigida causa prouenientes. Mulieres Indicæ atque etiam Lusitanicæ ea mandunt commendandi halitus gratia. Ea, auctore Serapione, iocinori, stomacho, cordi auxiliantur & ipsa roborant. Concoctionem adiuuant, & ventrem constringunt. Eorum puluis drachmarum quatuor pondere sumptus cum lacte venerem concitat. Præterea Caryophylla, ut tradit Auicenna, visus aciem acuunt. nubeculas & argema exterunt.

Vires.

Lib. 5. simpl.  
cap. 29.



## Nomina



Vx, quæ Græcis recentioribus *μοχαράριον* & *μοχαράριον*, & *χάριον* *μυριστικόν*, vel *χάριον* *ἀρωματικόν* dicitur, Latinis etiam Nux moschata, & Nux myristica, Arabibus *leuzhane*, *Iusbagua*, seu *Gianziban*, Gallis *Noix muscade*, Italis *Noce moscada*, Germanis *Moschat nusz*, Hispanis *Nuez de espetic*. Ab incolis eius regionis in qua prouenit Palla, Macis verò Bupalla, in Decan Nux ipsa lapatri, Macis verò Isfol, ab Auicenna Iauisband, id est, Nux Bandensis, Macis verò Befbaf. Vtraque describitur à Garcia & aliis hoc ferè modo. Arbor, quæ Nucem myristicam & Macim fert, Persicæ malo similis est, breuioribus tamen foliis & angustioribus. Fructum adhuc immaturum Macis

Li. 2. ca. 195.  
Li. 1. Arom.  
Ind. ca. 20.

*υπερίκος, οδραν,  
μυριστικόν, unguenta  
quia hoc odoratum*

NUX myristica, Matth.



Locus,

tanquam flos, Rosæ apertæ instar circumstat, maturum complectitur, cui & alius cortex accedit, crassus & densus. Is per maturitatem primum dehiscit, atque tenuiorem corticem, siue membranam ostendit: ea Macis est, Cocci modo rubescens, pulcherrimo aspectu, bene onustis præsertim arboribus. Exsiccata Nuce dehiscit etiam Macis, & flaccescente rubore aureum quodammodo colorem acquirit, cui subest Nux cum ligneo suo putamine seu libro. Adferuntur ad nos Nuces myristicæ sâ charo conditæ, in quibus hæc tria agnoscimus, vesca omnia: extremum illud ac primum operimentum callosum, ut in iuglandibus, plurimum commendatum, quod sit odoratum, grati saporis, morbis cerebri, vteri & neruorum vtile: Macim qui proximè subest, Officinis notissimum, cuius pretiū triplò maius est quàm Nucis ipsius: Nucem, inter quam & Macim ligneum est putamen, siue cutaceus liber, lignosam, odoram, & præpinguem cum recens est & matura. Nascitur hæc arbor in insula Bandam. Inueniri etiam aiunt in Moluccis, sed ea fructifera non

est, quemadmodum nec ea quæ in Zeilam prouenit. Fuit hæc Nux cum suo Maci veteribus Græcis incognita, quamuis Serapio in Macis historia Græcos auctores citet. Septembri mense Nuces certatim legunt incolæ barbari, & quantam quisque potest copiam congerit, illic enim omnia sunt communia. Eligendæ sunt recentes, minimè cariosæ, graues, farctæ, pingues, ita ut adacta acu confestim exeat liquor. Inuenitur quandoque oblongum quoddam genus, mas vulgò appellatum, & à mulieribus alia Nuce longè vtilius existimatum. Noces myristicæ, ut Mauritanii scribunt, siccant & excalfaciunt ordine secundo completo, adstringunt, oris suauitatem commendant, & factorem anhelitus commansæ abolent, lenigines in facie emendant, visum acuunt, ventriculum & iecur roborant, lienem absterunt, yrinam cient, fluentem aluum sistunt, flatus discutiunt, & frigidis vteri affectibus mitè profunt. Ex recentibus contusis & in cacabo calfactis, prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ instar concrefcit, fragrantissimum spirans odorem, neruorum & articularum doloribus diuturnis à frigida causa excitatis vtilissimus, qui & venerem stimulat. Mulcet mirificè Nux myristica aquæ vitæ dolores, si trita decoquatur ex rhodomellis vncis sex, & duabus quousque

Ca. 2. simp.

Electio.

Temper.

& Vires.



quousque aqua euanescat. Nam si huiusce colati liquoris cochlearia tria quotidie dentur ieiunis, & dolor à frigidis oriatur excrementis, aut à flatu, proculdubio iuuabuntur agri. Maximè commendatur eadem ad vteri cruciatus à flatu genitos, hoc modo. Coquitur crassiusculè tusa cum Matricariæ radicibus ex sex vnciis vini albi generosi ad tertias. Percolatur decoctum, & additis Sacchari duabus drachmis propinatur.

## NVX INDICA. CAP. VII.

**N**ON solum inter Palmas; sed etiam inter arbores omnes Palma illa, quæ nucem Indicam fert, palmam obtinet: adeo multa vitæ humanæ necessaria suppeditat, nec est pro dignitate celebrata ne ab ipsis quidem Arabibus: priscis enim Græcis an cognita fuerit, plerique dubitant, in quibus est Garcias, tamen si Strabo eius meminisse videatur. Eius historiam ex eodem Garcia & aliis hic conteximus. Arborē scribit ille à Serapione & Rhase

Li. 16. Geograph.

Lib. 1. Aro. Indic. c. 26.

Nomina

Li. 2. c. 498.

NVX INDICA,  
Matthioli.

Ialarnare, id est, arborem nuciferam dici, Nucem verò Indicam ab Auicenna lausia lindi, quæ nomina in codicibus nostris vulgatis non reperiuntur, sed Neregit tantum, quam Nucem Indicam interpretantur. Vulgò vocatur arbor Maro, & fructus Narel, quod nomen Narel commune est Persis & Arabibus: in Malauar arbor ipsa Tengamaran, fructus verò maturus Tenga, sed viridis adhuc & immaturus Ele-ri, & Goæ Lanha: in Malaio arbor Triccan, ipsa nux Nihor, cui Lusitani nomen Coccho indiderunt, ob tria illa foraminum vestigia, quibus cercopitheci aut similis alterius animalis caput representat. Arbor est vastæ magnitudinis, foliis Palmæ aut Arundinis, aliquantò latioribus, flore Castaneæ, materie fungosa & ferulacea. Fructum parit capitis humani magnitudine, vel maiorem, vel magnis melonibus parem. Eius primus siue extimus cortex primum viridis est, deinde ex atro rufescens, subdurus, crassus, villosa materie compactus. Subest alius prædurus cornu instar, ferè triangularis, qui nucleum siue medullam continet albicantem, crassam,

Forma.

Locus.

crassitudine digitali, sapore dulci, concavam, quæ in cavitare suauem, dulcem & limpidam concludit aquam. Quantò autem tenerior nux, tantò suauior est is liminis suauem, quique interdum acefcet, in inueterascente concrefcit. Gaudet are- ipsa nuxes ex quibus enata plantæ transplantantur, quæ paucis annis adolefcunt & fructifera sunt, præsertim si diligenter colantur. Nam Hyeme cinere aut stercore conspergi volunt, Estate aqua rigari, latiores tamen euadunt, si secus adificiantur, quia videntur luto & sordibus gaudere. Has in duo genera distinguunt, vt tradit Garcias. Alterum enim fructus ferendi causa seruant. Alterum Suræ cogende gratia, quæ est vinum mustum: decocta autem ab incolis Ottraqua vocatur. Sura verò hoc modo colligitur. Præcis ramis vascula alligantur ad liquo-



rem, quem Suram vocant, excipiendum. Eum vt ex altioribus ramis colligant, arborem conscendunt aptatis ad pedes compedibus & laqueis, aut foramina quadam in corpore faciunt, vt facilius conscendant. Hęc Sura distillatur aquę ardentis modo, vinumque extrahitur aquę ardenti per omnia simile, vt etiam pannus lineus eo madefactus non secus ardeat, quàm si aquę ardenti intinctus foret. Vocatur autem stillatitius hic liquor Fula, id est, flos, quod reliquum est Otræ aqua appellatur, admisto stillatitij liquoris momento. Ex Sura antequam distilletur insolata fit acetum satis interdum acre. Sublato priore vasculo, si vulnus in arbore factum Suram adhuc extillet, seruetur ea, & Solis aestu, vel igne densata sacchari modo coit. Id Iagra vocant. Optima censetur quę in Naledina insula nascitur: nõ enim nigricat, veluti quę in alijs regionibus prouenit. Materies ligni cum sit proceræ, ad plurima perquam utilis est, ita vt interdum in Naledina insula naues ex hac arbore fabricentur, atque clauis, molis, velis & rudentibus armentur. Ex ramis qui in Malauar Olla auctore Garcia nuncupantur, fiunt ædium tecta, & nauium tabulata & opercula. Hoc tamen nomine non huius arboris ramos, sed ipsa folia designari scripsit Ferdinandus Lopes in Historia Indica, quibus inscribere solent indices memorabiles & acta publica. Refert etiam simili olla seu folio Arabicis characteribus inscriptam fuisse epistolam, quam Rex Calecut ad Emanuelem Lusitanie Regem dedit, cum eò primum appulerunt Lusitani. Indi istarum Palmarum germinibus vescuntur, nam gratiora sunt palato, quàm aut castaneæ molles, aut humiles Palmæ, quas vulgo *Palmitos*, Itali *Cefaglioni* vocant. Quo autem vetustior est Palma, eo tenerius & odoratius germen producit. At eo sublato perit Palma: quare qui huiusmodi germen edit, non immerito Palmam edere dicitur. Hæc de arbore, nunc de fructu dicamus. Ex eius extimo cortice è villosa materia compacto fiunt rudentes & funes nauibus necessarij, qui incorrupti manent in aqua marina. Ex eodem stupæ loco naues obrurantur & stipantur, ipsiq; stupis prestat, quod putredini minus sit obnoxius, & aqua marina imbutus infletur densaturque. Idem affirmat Clusius, qui omnes rudentes & funes liburnicarum regionum Vlyssipone ex villis Coccorum siue nucum confectos esse scribit præsertim verò earum quę in Indiam nauigant. Sed etiam ex iisdem villis fieri nodosa cingula, magno in vsu omnibus tenuioris fortunæ mulieribus Vlyssipone. Nulla verò ex hac villosa materie fieri aulaa testis est Garcias, id quod tamen persuadere conatus est Lacuna. Ex secundo cortice duro vasa in tenuiorum vsum tornantur, cuiusmodi Vlyssipone & alijs locis se vidisse ait Clusius ex Cocco de Maldina confecta, oblongiora plerumque, quàm quę ex vulgari Cocco parantur, & nigriora nitidioraque. Sed ea paralyticos, si inde bibant, minimè iuuant, vt vulgo Lusitanorum creditum est: nihil enim in hoc fructu est quod nervis conferat præter oleum, de quo mox dicemus, nec ipsi Indi huiusmodi facultates his vasculis tribuunt, nec quisquam alius probatus auctor. Medulla sine nucleo dulcis saporis ne & piscibus vescuntur, non aliter quàm nos pane, nec amygdali dulcis saporis cedit. Ex eadem trita lac exprimunt, cum quo coquitur oriza, non minus suauis quàm si cum lacte caprino decoqueretur, aut ex ea & auium quadrupedumve carinibus edulia parantur, Caril illis nuncupata. Ex eadem exsiccata panem contrahunt. Noces istæ recentes siccata, atque supremo cortice delibata & contracta ab indigenis Copra vocantur, deferunturque in Ormuz, Balagnate, & in alijs regionibus, in quibus minor est earum copia quàm vt exsiccare possint, aut in eas prouincias quę his omnino carent. Suaues sunt, iisque vtuntur tanquàm castaneis siccis, multoque sunt gratiores palato, quàm quę integræ in Lusitaniam deferuntur. Ex iis nucibus duo olei genera exprimuntur. Vnum ex recentibus confusis calida affusa aqua, quibus expressis oleum aqua supernat. Hoc vtuntur, inquit

Vfus.

Lib. r.

Caril.

Cepa.

Olea.

Vires.



inquit Garcias, ad purgandum excrementis ventriculum & intestina: purgat enim leniter & sine noxa. Multi Tamarindorum expressionem addunt: quod utile esse medicamentum sapius se expertum fuisse ait. Si id oleum Auicenna & Serapio intelligunt, cum melioris succi esse dicunt quam butyrum, recte quidem eos sentire Garcias arbitratur, in eo verò falli, quòd ventrem minus mollire aiunt quam butyrum. Alterum olei genus est, quod ex iisdem recentibus siccatis, de ibratis & contractis (Copa vocari diximus) limpidissimum magna copia torculari extrahitur. Id non solum nervis utile, sed etiam oryza coquendæ aptum est. Nervis autem admodum conferre, & nervorum contractionibus, & articularum doloribus antiquis, se expertum fuisse testatur Garcias, ægrum eo inunctum in cupa grandi imponendo, ibique quiescere sinendo concalescitur. An verò lumbricos enecet, ut Auicenna & Serapio tradunt, nondum se expertum fuisse ait. Quod verò ipsam nucem eadem esse facultate præditam scribant, non modò rationi consentaneum non esse, sed quotidiana experientia manifestissimum esse, eius esu lumbricos generari. Id verius quod tradit Serapio ex auctoritate Mesarugie, Cocchi esu fisci alium. Nam alienum à ratione non est, nucem, quæ terrestrium est partium, ventrem constringere, oleum, quod tenuiorum est partium & aërearum, ipsum lenire. Ex ipsa autem arbore nullum oleum elicitur, sed ex Coccho tantum: quamvis Lacuna scribat quosdam in ea opinione esse, ut credant dulce id oleum quod ex hac Palma stillat, Dioscoridis esse Elæomeli. Cocchus, quæ de Maldina appellant, nigro est cortice & niuidiore quam vulgaris, cui figura magna ex parte nec ita rotunda ut vulgari. Medulla interior, quæ siccata dura est admodum & candida, nonnihil tamen ad pallorem inclinans, in superficie rimosa est, & valde potiosa, nullo sapore præstans. Laudatur hic Cocchus, ut auctor est Garcias, sed præsertim eius medulla aduersus venena ab ipsis harum insularum incolis. Et à viris fide dignis se accepisse ait, ad coli dolores, paraly sim, epilepsiam, aliosque nervorum affectus prodesse. A coli quidem doloribus, quod vomitum excitaret, ab aliis verò ægritudinibus liberari ægros, si aquam in nucibus aliquandiu confectam ebiberint, adiecto medullæ momento. Quibus fidem ille non adhibet, ut pote quæ experimentis minimè sint confirmata, nisi quæ tatur medicamentis quorum facultates iamdiu perspectæ sunt, & infinitis experimentis comprobata. Auicenna scribit nucem Indicam calidam esse in principio secundi gradus, siccam in primo: inesse tamen in ea humiditatem excrementitiam: quare recentem humidam esse primo ordine, gravem quidem stomacho esse, sed non mali nutrimenti: oleum è veteri nuce conferre doloribus dorsi & genuum.

Li. 2. c. 498.

c. 218. simpl.

Li. 2. c. 498.

c. 218. simpl.

Cap. 218.

simpl.

In c. 19. lib.

1. Diosco.

Li. 2. c. 498.

## NUX VOMICA ET METHEL. CAP. VIII.

**N** X quæ Arabibus *Leuz alkei* seu *alke* dicitur, Officinis ac Barbaris Nux Vomica: quæ verò *Leuz atrachaha*, Nux Methel seu Nux Methella. Nucem Vomicam Serapio Abraam citans breuiter sic delineat. Est nux colore inter glaucum & album, Aquellana paulò maior, nodosa. Nucem verò Methel hoc modo. Est fructus similis Nuci Vomicæ, cuius semine Ciri semini simile est. Et ex Hacse. Nux Methel similis est Nuci Vomicæ, semine Madragore semini æmulo, cortice aspero, gustu suau. Et Auicenna. Nux Methel inquit, est similis nuci, cortice aculeis crassis & breuib; recto. Nuci Vomicæ similis est eius semine Ciri semini simile est. Lonicerus arbitratur Nuci Vomicæ descriptionem Nuci Methellæ Officinarum conuenire, & contra: ut Nucem Vomicam Officinarum pro vera Methella, & earundem Nucem Methellam pro legitima Vomicam pro vera Methella, & Arabum accipiamus. Amatus Lusitanus in eadem est opinione, quod Nux Methella Officinarum colore sit glauco in album vergente, & ab utroque latere atrollatur tuberculis quibusdam circularibus, oculos imitantibus, tum quod quæ Methella assignantur, nota omnes Vomicæ Officinarum conueniant.

Nomina

Cap. 163.

simpl.

Forma.

Cap. 163.

simpl.

In cap. 161.


lib. 1. Dios.







## ANACARDIVM.



foramina, in cuius raritate est mel viscosum habens odorem. Et sunt qui ipsum masticant, & non nocet eis, & propriè cum nuce. Serapio sic etiam describit. Balador, id est, Anacardus, est fructus arboris, similis cordi aui, cuius color est rufescens, parum ad ruborem declinans, sicuti est color cordis. Intus est res similis sanguini, & id quod administratur ex eo, & deservit ex Sini. Nasçitur ex montibus Siciliæ ignitis. Hunc fructum ex Clu-

Can. 46.  
simpl.

Locus.

Lib. 1. Aro.  
mar. Ind.  
cap. 30.  
Lib. 2. c. 40.  
Temper.  
& Vires.

Cap. 346.  
simpl.

Lib. 2. c. 30.  
Arom. Ind.

sio hic pictum damus. Magna est eius in Cananor copia, auctore Garcia, tum in Calecut, & reliquis Indiae provinciis, velut in Cambaya & Decan. Calidum sic, cumque esse quarto excessu tradit Auicenna, vlcere, adurere sanguinem, & humores, delere radicitus verrucas, vitiligines albas & lepram, sanare alopeciam, commouere calida apostemata partium interiorum, aduersus neruorum affectus a frigida causa ortos & paralytum valere, memoriæ iacturam resarcire, maxime sumpta confectione anacardina, mentem tamen de statu deicere & furorem excitare eius suffitu hæmorrhoides exsiccari. Sed deleteria facultate non carere, humores adurere & interficere. Eius antidotum esse lac vaccinum potum, & oleum ex nucibus expressum. Eadem Serapio tradit, citatque Galenum, qui huius fructus meminerit, cui tamen planè ignotus fuit, atque noxium esse præsertim biliosis & iuuenibus. Quod illi Anacardium calidum & siccum statuunt quarto ordine, alij tertio, Garcias non probat: in virente enim perspicuum est hunc caliditatis & siccitatis gradum deesse, neque rationi consentaneum videri, eo caliditatis & siccitatis excessu constituere quò piper. Nisi fortè, inquit, quod in Sicilia nascitur is sit facultatibus præditum. Præterea deleteria esse facultate negat, quod experientia repugnet. Nam his in regionibus, inquit, e lactis sero maceratum athmaticis datur, & aduersus lumbricos. Adhuc iis viridibus & sale conditum vtuntur in cibariis, oliuarum conditarum modo. Fructu verò siccato caustici

vice vtuntur in strumis, totaque India huus cum calce mixti vsus est ad pannos obsignandos. Anacardij historia à Garcia descripta Clusius & scholias adiecit descriptionem & picturam fructus cuiusdam, siue nucis, quam aliquando Vlyssipponè adferri ait è Brasilianorū regione: *Caious* vocant. Arbor est magna, foliis Pyri (in recens nata Lauri potiùs) fructu oui anserini, forma & magnitudine, qui succo plenus est, veluti id Citriorū genus,

Cap. 61. de  
ser. p. Anie  
ri.

## CAIOUS, Clusij.

MEDIVS.

INTEGR.



quod Limā vocant, quo quidè vtuntur Brasiliani (licet Theophrastus contrà asserat) vt ab iisdem se intellexisse ait Clusius. In extremo fructu prominet nux quardā, renis leporini figura, colore cinereo, interdum ex cinereo rubescente. Duplici hæc nux connecta est cortice, inter quos spongiosa quædam est materia, olei aspersi & calidissimi plena, intus verò nucleum continens, edulem, & Pistacis gustus suauitati non cedentem, pellicula cinericia obductum, quem eximere oportet. Eo leuiter tosto vescuntur incolæ: sic enim gratior est, & venerem stimulare fertur. Acri illo nihil præstantius esse ferunt ad lichenas & impetigines tollendas. Incolæ certè aduersus scabiem vtuntur. Sed illud mirum, primarium fructu nullæ semina continere, & extrema illa nuce earum arborum genus conseruari debere. Nonnulli Anacardiorum genus esse arbitrantur, ob similitudinem acris illius humoris, quem corticibus inclusum habent.

FAVFEL



**Nomina**  
Lib. 1. cap.  
Arom. Ind.  
cap. 23.

**Forma.**

**FAUFEL** Arabibus dicitur, id est *Auellana Indica*, inquit Serapio, *Auicenna Fufel & Fufel*, sed depravatè auctore Garcia, in Malauar *Pac* à vulgo, à nobilioribus *Arecæ*, quo nomine vtuntur Lusitani qui in Indiis habitant: in Gazarate & Decan Çupari, in Zeilan Poaz, in Malaca Pinan, in Couchin Chacani. Arbor quæ fructum hunc parit, recta est, fungosa materie, foliis Palmæ, fructu Nucis moschata, minore tamè, aut iuglandibus exiguis similis, intus dura, & candidis rubentibusque venis respersa, non planè rotunda, sed altera parte sessili: quæ tamen notæ non omnibus *Arecæ* generibus conueniunt. Integitur inuolucro admodum lanuginoso, & foris subflauo,

*ARECA* siue *Faufel*, *Clusij*.



**Locus.**

Cap. 335.  
simpl.

Cap. 335.  
simpl.

**Temper.**  
**& Vires.**

Li. 2. c. 256.

perquam simili *Dactylis* cum maturuit & antequam siccatus fuerit. Hanc nucem probe agnouit *Matthæus Siluaticus*: sic enim scribit. *Faufel* id est, *Auellana Indica*, est simillima *Nuci muscata*, nisi quod pars vna est plana, altera eminentior, ita vt possit stare erecta, sicut calculus qui in ludo dicitur *Pedes*. In cæteris intus & extra *Nuci muscata* similis est, sine odore, & sine sapore. Nascitur inclusa in quadam lanugine simili folliculo serici. Multoties fertur inter alias species à *Calecut*. Et ego vidi ipsum in suo folliculo. Hæc ille. Nascitur *Faufel* plurimum in Malauar, in Guzarate & Decan pauca quantitate, idque duntaxat in maritimis, sed laudatum, præsertim in Chaul, quod defertur Ormuz. Optimum verò provenit in Mombaim insula. Laudatur etiam quod in regione Bacain provenit, atque id defertur in Decan cum eo quod in Gauchin nascitur nigrum & pusillum, durum admodum, postquam siccatum fuerit. Provenit etiam in Malaca, sed tam parua quantitate, vt vix incolis sufficiat: item in Zeilan magna copia, sed cæcidum, quod in eam partem regionis Decan defertur, quæ Catamaluco paret, tum etiã in Bisnaga. Defertur etiam ex Zeilan in Ormuz, Cambaya & insulas Maldinas. Scribit Serapio ex Haboanifa arborem istam in Arabia non provenire, quod de mediterraneis locis & magna ex parte intelligendum esse censet *Garcias*: nascitur enim laudata sed exigua in Dofar & Xael portubus Arabicis. Amat enim hæc arbor loca maritima, mediterranea respuit, alioqui magna diligentia fereretur, quoniam singulis diebus eam edunt cum Mauritani, tum Moalis (genus hominum id est, qui Ali generum Mahometi sectantur) etiam in ieiuniis suis cum à Betre abstinent: mandunt enim *Arecam* cum *Cardamomo* purgandi ventriculi & cerebri gratia. Scribit Serapio ex auctoritate *Isaac Faufel* parum ex calfacere, & paucæ amaritudinis particeps esse. Sed se degustasse *Garcias* asserit, nullumque in eo calorem deprehendisse, verum cum insipiditate adstrictoriam facultatem. Cui consentiunt quæ subiungit Serapio ex aliorum auctoritate, frigidum esse ac siccum, atque adstringens: ob id aduersus calidos morbos valere, doloribus dentium auxiliari, gingivas & commotos dentes stabilire. Quibus accedit *Auicennæ* auctoritas, scribentis *Fufel* refrigerare atque adstringere. Immatuum *Faufel* stupefacit & inebriat, vt refert *Garcias*: idè sic editur à nonnullis, vt vellet





luti ebrij dolorum cruciatus non sentiant. Admifcentur Faufel siue Areca eadē quæ Betre admifceri dicemus, tamen si Betre calidum sit, Areca verò frigida & sicca. Sed & admifcetur Lyrium, quoniam vtrumque gingiuas confirmat, & dentes stabilis, stomachum roborat, & vtile est aduersus sanguinis reiectiones, vomitus

*AVELLANA Indica,  
Matthioli.*



*AVELLANARVM  
Indicarum, Clusij.*



& alui profluuiā. Sic autem parant. Contusam Nucē Faufel in tenuissimas partes cum Lycio & folio Betre, cui sit exemptus nervus, mandunt, sicuti in Betre dicitur, & priorem satiuā quæ cruenta est expuunt, eaque ratione cerebrum & ventriculum expurgant, gingiuas stabilunt. Porciōres ex Faufel, Lycio, Caphura, Ligno Aloës & Ambari momento pastillos componunt, quos mandunt. Garcias ex Faufel viridi aquam stillatitiam vitreis organis eliciebat, qua maximo cum successu in biliosis alui profluuiis utebatur. Nucem Faufel cum suo operimento ex Clusio hic depinximus, qui & aliam vidit nucem oblōgam, quæ Faufel cum suo inuolucro magnitudine æquat, prædura & foris nigricans, quæq; per medium secta Nucem myristicam proximè æmulatur. Fortè Faufel genus erit, aut aliquid simile. Eius quoque iconem hic ex eodem expressimus. Alias Auellanas Indicas à Cortuso dono datas depinxit Matthioli, & descripsit his ferè verbis. Prior tum facie, tum magnitudine differt à Faufel. Conregitur putamine extimo Cardamomi maioris putamini simili, sed duriore, compactiore, & colore magis obscuro, magnitudine iuglandis viridi adhuc putamine tectæ. Eo Auellana concluditur oblōga, vtraque parte acuminata, dorso arcuato, inferiore parte lata ac sessili, ossè cōtectæ duro, læui, castaneæ colore, in quo nucleus concluditur solidus, eiusdem ferè figuræ, tenui albæque membrana obductus, dulci intus medulla, albicante. Altera est superiore longè minor, quæ è suo inuolucro exempta, quod læue mollèque est, colore subpallido, nec folio Palmæ crassius; glandis acuminatæ aut myrobalani flauæ ferè figura est, duro putamine conclusa, quod colore vulgaris auellane oblongum intus nucleum pumilam amygdalam referentem continet. Clusius in Scholiis in Garcia Aromaticorū Indicarum historiam aliquot Auellandarum Indicarum icones cum suis descriptionibus exhibuit. Prior exigua est tribus lateribus elatioribus, atque itidem tribus foraminum vestigiis, vti Coccus conspicua viloso quodam inuolucro velut Faufel ferè tectæ. Altera pollicari est longitudine, duorum verò



digitorum crassitudine, inferiore parte sessilis, rugosa scabritie & cinerea, superna autem & eminentiore parte lævis, subrufi coloris, ita ut animalculum duro corio tectum videatur. Prægnans est, & aliam continet. Huic ferè simile genus inuenitur minus, nigricans, quod à Matthiolo priori generi Auellanarum Indicarum adscribitur. Tertia Mehenbethene nomine à Cortuso missa. Pollicem transversum longa est, forma triangulari, duro & ligneo putamine, fracta tres cellulas ostendens, in quibus nucleus oblongus, albus dulcisque inuenitur. Quomodo autem Mehenbethene nomen illi tribui possit non video, cum Auicenna de Mehenbethene tractans, nihil aliud quàm Græcorum Lathyrum describat.

## SANTALVM.

## CAP. XI.

## Nomina

Lib. 1. Arc-  
mat. Ind.  
cap. 17.

## Genera.

## Forma.

## Locus.

## Electio.

## Li. 2. c. 649.

## Vires &amp;

## Temper.

Cap. 336.  
simpl.

ETERIBVS Græcis ignotum fuit quod Santalum dicitur, Auicenna, Serapioni, atque Mauritanis omnibus corrupto nomine *Sadal*, in Timor insula, omnibusque Malacæ vicinis provinciis *Chandama*, in Canara, Decan, & Guzarate, *Sercanda*, auctore Garcia. Santali tria sunt genera, rubrum, album, pallidum, quod Officina Citrinum appellant. Idem Garcia Santalum scribit in Nucis iuglandis magnitudine assurgere, foliis esse admodum viridibus, Lætici æmulis, flos ex caruleo nigricat, fructus est Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus & facile decidens. In odorem ferunt esse arborem, nisi cum detracto iam cortice exsiccata fuerit. Tria huius genera vno in loco non proueniunt, sed in regionibus multum à se distantibus. In Timor insula vndique portubus abundante plurimum album & pallidum reperitur, & in India ultra Sangem fluium, quem Indi Hanga vocant, item in Verballi portu la- uæ, vehementer quidem odoratum, sed quod breui senescat, debeatque post annum multo ligno adempto odor eiuste uocari, qui in medio est. Præfertur id quod minimum ligni, plurimum cordis habet: rubrum in India intra Gagem, videlicet in Tanasarin, & maritimis quibusdam Charamandel. Hoc à Brasilioligno (quamuis vtrumque sit in odorem) differt, inquit Garcia, quod Santalum rubrum neque dulce est, neque inficit, quæ nota in Brasilio perspicue apparent. At rubrum Santalum vulgare Officinarum sepe inficere comperias. Eius ea in regione, in aqua prouenit, rarus est usus, quod Indi aduersus febres danta xat eo vtantur. Reliquum delubra- niam & Occidentales regiones defertur. Ex eo interdum idola sua eorumque fabricantur: qua de causa crassiora ligna magis expetuntur, maiori- que precio redimuntur. Primum locum tenet pallidum, secundum album, tanta tamen inter vtriusque arbores est similitudo, ut hæc ab illa discerni non possit, nisi ab incolis, qui eas ex- las mercatoribus vendunt. Vtriusque magna copia per vniuersam Indiam absumitur: quoniam omnes ferè eius regionis incolæ, siue Mauritanii, siue Gentiles eo in mortariis lapideis contuso, & aqua macerato, vniuersum corpus inungunt, deinde siccari sinunt, ad æstus corporis tollendos, vel ad odorem conciliandum. Est enim regio calida admodum, & incolæ plurimum odoribus delectantur. Garcia legitimum Santalum citrinum vix in Lusitaniam deferri putat, cum multo pluris apud Indos, quàm in Lusitaniam delatum vendi possit. Ex quibus non sine ratione lignum tantum genuinumne Santalum citrinum habeamus, an potius aliquod aliud lignum odoratum eius loco ad nos deferatur. In citrini tamen penuria, albi & rubri partes æquales præscribendas esse non putat Garcia, sed potius, solum candidum, multo magis enim cum citrino affine est album quàm rubrum. Auicenna de Santalo scribes, Galenum, cui id incognitum fuit, falso citat, statuitque ex multorum secundi ordinis ad tertium usque, siccum in secundo. Serapio similiter ex multorum Arabum auctoritate frigidum in tertio gradu, siccum in secundo: rubrum tamen frigidius esse albo & citrino. Præsertim rubrum humorum fluxum inhibere, erysipela- tis, in flammam



tis, inflammationibus, podagra à bile orta ex succo Solani, aut Sedi, aut Portulacæ  
utiliter illini. Candidum ac pallidum ex aqua rosarū fronti imposita capitis dolo-  
res à bile & caliditate mulcere. Omnia calidis febribus aduersari: epota astuati vē-  
triculo auxiliari. Fiunt ex his & aqua rosarum epithemata, quæ vētriculo admota,  
eius feruorem in ardentissimis febribus extinguunt. Præterea Santalū, auctore Au-  
cenna libro de viribus cordis, cordi amicum est, lætitiā enim adfert, & robur ei  
addit. Quare iis miscetur medicamentis quæ cordi & eius palpitatiōni succurrūt.  
Sed cum Santalū album & pallidum odorata sint, Mauritanorum sententia im-  
probanda, qui Santalum tertio ordine refrigerare prodiderunt.

## A G A L L O C H V M.      C A P.   X I I.

**R**ISCIS Græcis ἀγάλλοχον, recētoribus etiam ἀγάλλοχον & ξυλαλόν, *Nomina*  
Latinis Agallochum & Lignum Aloës, Arabibus *Haud*, *Agalugin*, seu  
*Agalugen*, à Guzarate & Decan incolis, auctore Garcia, *Vd*, quod ex *Lib. 1.*  
Arabibus sumptum videtur in Malaca *Garbo*, selectissimum autem *Acrom Ind.*  
Culambac. De eo sic Dioscorides. Agallochum lignum est, quod ex India, & Ara- *cap. 16.*  
bia deportatur, Thuia ligno simile, maculatū, odoratum, gustu adstringens, cum *Lib. 1. cap. 21.*

quadam amaritudine, cute veriùs quàm cortice vestitur, aliquantum verticolore. *Forma.*

Auicēna duobus diuersis capitibus de Agallocho tractat. De priore, nomine Aga- *Lib. 2. c. 4.*  
lugin siue Agalugin, de altero nomine Xyloaloës. Priore quidē ait Agalugin li- *L. 2. c. 739.*

gnum esse Indicū, aut Asiaticū, odoratū, cute aspera, diuersis & lineis colora- *αγάλλοχον ab αγάλλο*  
ta. Huic adstringēdi vis inest cum pauca amaritudine. Quæ omnia ex Dioscoride *χρον, γυδαο, hinc*

descripta sunt, in quo legit *εργμενον, ευωδης*, quemadmodum & vulgaria exēplaria *αγαλλμασ ολλεραμεν*  
habent, id est, punctis maculatum, odoratum, pro quo Oribasius legit, *εργμενον* *hinc αγαλλοχον, quæ*  
id est, Est igitur odoratum. Deinde easdem, quas Dioscorides subiungit vi- *γυδαο, et ολλεραμεν*

res. Serapio Dioscoridis verba transcribens nec macularum nec punctorum memi- *sed affare est n. and*  
nit, nec Paulus. Posteriori loco Auicēna nomina & regiones enumerat, à quibus *du mediana*

Xyloaloë deportabatur. Sed in omnibus verū & legitimū nō nascitur. Nam quod *Locus . . .*

in promōtorio Comorin, veteribus Cori dicto, & Zeilan inuenitur, lignum odo- *Forma.*

ratum est, quod lignum Aloës siluestre vocarunt, cum tamen non sit. Legitimum *Forma.*

in Malaca & Sumatra nascitur, vnde à Chinenſibus ferebatur. Serapio ex Diosco- *Forma.*

ride & Galeno omnia transcripsit, item multa eius genera, & plurima alia ex Ara- *Forma.*

bibus. Garcias legitimū Lignū Aloës nō nisi in India nasci putat. Ex Arabia qui- *Forma.*

dem adferri potuisse, priùs tamen ex India eò deportatum, vt pleraſque alias mer- *Forma.*

ces. Nam in Arabia prouenire non arbitratur: nec cute vestiri, sed cortice, vt & alia *Forma.*

ligna: neq; verisimile esse pro Thure ad suffimēta substitui, sed potiùs contrā, pro- *Forma.*

Agallacho Thus substitui debuisse, vt pote cuius maior copia fuit: non solemus *Forma.*

enim rariora & inuentu difficiliora vulgaribus substituere, sed contrā. Est autem *Forma.*

Agallochum eodem auctore arbor Oleæ instar, interdū minor. Nec florem nec *Forma.*

fractum vidit, ob periculosā huius arboris diurnam obseruationem, frequen- *Forma.*

ter istic grassantibus tigris. Ramos autem ex Malaca delatos vidit. Ferunt Aga- *Forma.*

lochum recens dissectum nulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum *Forma.*

odoratum, nec cum odorē per vniuersā ligni materiam diffundi, sed in ipsā ma- *Forma.*

terice consistere. Crassus enim est cortex, & ligni materies odoris expers. Non ne- *Forma.*

gat tamen Garcias, quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis hu- *Forma.*

mor matrici sese insinuet, illamq; odoratiore reddat. Sed vt odor Agallocho con- *Forma.*

cilietur minimē putredine opus est: nam tēpore aliud magis, aliud minùs odora- *Forma.*

tum sit, quod multi experientia edocti probè norunt, vt etiam de recens dissecto *Forma.*

statim iudicare possint, siue odoratū futurum, annon. Nam in omni lignorum *Forma.*

genere aliud alio præstātius est. Solent autē Malacæ incolæ Agallochum repur- *Forma.*



*Electio.*

gare antequam mercatoribus vendant. Præfertur multum nigricans, cinereis discurrentibus venis, poderosum, plurimo pingui humore prægnaans. Probatio erit, si igni accensum multum humorem exudet, si in aquam iniectum non sidad: nam solidissimum quodque innatat. Guzarate & Deca incolæ præter supradictas notas, ut magna sint fragmenta requirunt, quemadmodum maiores gemmas & margaritas ceteris præferunt: sibi enim persuaserunt quo maiora sunt fragmenta, eo maiore facultate prædita esse. Fabulam narrant qui Agallochi arborem à nemine visam referunt, quod in terrestri tantum paradiso proveniat, illiusque lignum ferri fluminibus quæ ex eo manant. Hoc verò multo absurdius quod Pandectarius scribit Agallochum Chamelæ adulterari, cum tota ea regione Chamelæ non nascatur auctore Garcia. Illud quidē Serapio tradit ex quorundam auctoritate ramos Agallochifragi, & in flumina decidere, cum iis vehi in eas regiones quas alluunt: præterea lignum Aloës ex arbore sua excisum anni spatio sepeliri, ibique corrodi, ita ut remaneat lignum Aloës purum, nihilque è ligno illo erodatur. Cui Symeō Sethi subscripsit, non alias futurum odoratus scribens, nisi prius marcorem aliquem & teredinem senserit. Quod ait Garcias Auicennam hallucinari cum scribit Agallochum ab incolis elixari, ut omnem odoris vim eliciant, id in nostris exemplaribus non reperitur. Verum Agallochum Officinis omnibus diu ignotum fuit, atque etiam hodie à multis ignoratur aliud atque aliud lignum ei substituētibus: quāquam verum à Lusitanis ex India Vlyssiponem & Hispaniam delatum sit, sed magno aestimatum: sunt interdum ex eo spherulæ precatoriarum, odoris iucunditate, & pretij magnitudine commendabiles. Frequentiores tamen sunt ex quæ ex Xyloaloe sylvestri, cuius ex Garcia meminimus, sunt, tum ex alio ligni genere quod Agallochum proxime emulatur: inodorum tamē est. Venetiis etiam habent institores, inquit Pena, carissimum, & usu probatissimum, gustu astringenti, præsicco, non multum amaro: suffitu suavisimum reddit odorem, & succum aut liquorem pinguem, odore qualem in Ebano vel Guyaco percipias, cui concolor & fortē congenet. Manditur Agallochum, inquit Dioscorides, aut decocto os colluitur, commedandi halitus gratia. Sudores arceat toti corpori inspersum. Pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unius pondere humida stomachi vitia, & imbecillitate feruoreneque mulcet. Si lateris iocinorisque dolor ex cruciatu

AGALLOCHVM siue  
Xyloaloe.



Lib. I. c. 21.  
Vires &  
Temper.

Lib. I. c. 733.

si dysenteria aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest. Agallochum auctore Auicenna calcit atque exsiccat ordine secundo. Facit ad cordis affectus: ob id inter ea medicamenta quæ cordi præsidio sunt ab eodem recensetur.

BALSAMVM. CAP. XIII.

Nomina  
Lib. I. c. 18.  
Forma.

Locus.

Tempus.

Opobalsamum.

num.



RACE' Bān Quor, Latine etiam Balsamum dicitur, Arabibus Balsam Balefma, Belsan, Italis Balsamo, Gallis Baume. Dioscorides Balsamum esse tradit Leucoij, & ut in vulgaris exemplaribus habetur, per racanthæ magnitudine, folio Rutæ proximo, longè cādidiori, semper exurete. In Iudææ solum quadam valle, & Ægypto nasci, differēs scabritia, proceritate, gracilitate: quod igitur tenui & capillacea coma sit, Theriston vocari, quasi demensile, fortassis quod ob gracilitatem facile demeratur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus arborem vnguibus ferreis incidi, manareque è plaga succum siue liquorem quem



quem Cipobalsamum vocant, sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, non plures quam seni septenive congi cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argenti. Theophrastus paulò aliter delineauit his ferè verbis. Balsamū in valle Syriæ nascitur, in horris duraxat duobus, vt aiunt, alterum viginti esse iugerum, alterū multò minorem. Arbor magnitudine est Mali Punicae magnæ, ramis valde multis, folio Ruta simili, sed subcandidiore, perpetuo virente. Fructus similis est Terebintho, magnitudine, figura & colore, valde odoratus, & lacryma ipsa odoratior. Hæc ex plaga colligi tradunt, inciso vnguibus ferreis caudice circa superna, sub sydere cum maximè astus feruet. Colligi verò æstate tota, sed multum non esse quod fluit, vnam enim die concham duntaxat plenam colligi: odorem eius eximium esse & copiosum, adeò vt ex eius tantulo odor longum spatium permeet. Verum sincerū nullum ad nos aduehi, sed cum collectū est atq; permixtum: multarū enim rerum permixtione vitari, & quod in Gracia venditur, sæpe adulteratū esse. Quin & valde odoratas esse huius arboris virgas: & eas quidem amputari quotannis, partim vt reliqua valentiora seruentur, partim vt emolumenti plus comparetur: videri enim eas magno pretio posse. (ex qua Gazæ cōuersione sic legēda Gracia in vulgatis codicibus deprauata. Νένδρα γὰρ καὶ γαίρην καὶ ἐκείτους ἐνι μύλῳ, & τῶν ἄλλων ἐνεχθῆ, ὥς ἐῖς ὑρό- τερα σφίγγει, καὶ πάλῃ τὸν κέρδος εἰσφέρειν, πωλεῖται γὰρ τιμώσ.) atq; huius arborum cultus causam ad imbrem referunt, (Legē, καὶ τῆς ἐργασίας περὶ τὰ Νένδρα χεδὸν τὴν ἀλλαν- τίν, &c.) Continuo enim eum decidere: atq; etiam virgarum amputationem causam quandam esse aiunt, cur arbores magnæ non fiunt. Etenim quia frequenter tondentur virgas tantum producunt, nec in vnū caudicem vires intenduntur. Nullum vspiam siluestre Balsamum esse audiuius: ex maiori horto vasa duodecim impleri, quæ dimidiū congi capiunt. Ex altero verò duo duntaxat. Sincerū vendi duplo ad argentum pretio, adulteratū proportionē mixtionis. Et Balsamum quidem odoris gratia videtur excellere. Plinius quædam alia scribit, alia ex vtroq; mutatus videtur. Sed omnibus odoribus præfertur Balsamum, vni terrarum Iudeæ concessum, quondam in duobus tantum hortis, vtroq; Regio, alterum iugerum viginti, non amplius, altero pauciorū. Ostendēre arbusculam hanc vbi Imperatores Vespasiani. Clarumq; dictū à Pōpeio Magno in triumpho arbores quoq; ductas. Seruit nunc hæc, & tributa pendit cum sua gente, in totum alia natura quā nostri externiq; prodiderūt. Quippe Viti similior est quā Myrto. Malleolis feri creditur, nuper vineta vt Vitis: & implet colles vinearū modo, quæ sine adminiculis se ipsæ sustinent. Tondetur similiter fruticans, ac rastris mitescit, properatq; nasci, intra tertium annum fructifera. Folium proximum Ruta, perpetua coma. Sauiēre in eandē ludæi, sicut in vitam quoq; suam. Contrā defendēre Romani, & dimicant pro frutice est. Seritq; nunc eam fiscus: nec vnquā fuit numerosior aut procerior. Proceritas intra bina cubita subsistit. Arbore tria genera. Tenui & capillacea coma, quod vocāt Eutheriston. Alterū scabro aspectu, incuruum, fruticosum, odoratius. Hoc Trachy appellāt. Tertiū Eumeces, quia est reliquis procerius, læui cortice. Huic secunda bonitas, nouissima Eutheristo. Semen eius vino proximū gustu, colore rufum, nec sine pingui: peius in grano quod læuius atque viridius. Ramus crassior quā Myrto. Inciditur vitro, lapide, ossisq; cultellis. Ferro ladi vitalia odit. (Theophrastus & Diosco. ferreis vnguibus scalpi dixere) Emoritur protinus, eadē amputari superuacua patiens. Incidentis manus libratur artifici tēperamēto, ne quid vitæ corticē violet. Succus è plaga manat, quē Cipobalsamū vocant, suauitatis eximia, sed tenui gutta: ploratus lanis parua colligitur in cornua. Ex iis nouo fictili coditur crassiori similis oleo, & in multo cādida. Rubescit deinde, simulq; durefcit è translucente. (Legēdum, & translucent) Alexandro magno res ibi gerēte, toto die astitit vnā conchā impleri iustum erat. Anni verò fecunditate è maiore horto con-

Lib. 9. hist. cap. 6.

Sicaj dr. Balsamor-

Lani Balsama

ad hoc non inueniuntur

ab Arabib. quib. dicit

Balsamor dicit. ha

m. l. 12. de plant. Hippo

Li. 12. c. 25.



Lib. 16.  
Geogr.

Ibidem.

Lib. 2. c. 81.  
To. 1. lib. 2.  
cap. 3.

Succi E-  
lectio.  
Lib. 1. c. 18.

gios senos, minore singulos, cum duplo repēdebatur argēto. Nunc etiā singularum arborum largior vena, ter omnibus percutitur æstatibus, postea deputatur. Et sarmenta quoq; in merce sunt. Denariis trecētis amputatio ipsa furculusq; vanit. Intra quintū demum annum Xylobalsamum vocatur, & coquitur in vnguentis. Pro succo ipsum substituere Officinæ. Corticis etiā ad medicamēta pretium est. Præcipua autē gratia lacrymæ, secūda semini, tertia cortici, minima ligno. Strabo etiā Balsami historiā sic descripsit. Hierichus est cāpus à montana quadā regione circūdat, q̄ in theatri speciē ad ipsum declinat. Hoc in loco est Palmetū Palmis abundā spatio stadiorū centū, & totū irriguum, & habitationibus plenū, vbi & regia est, & Balsami viridariū. Arbor odorata est & fruticosa, Cytiso & Cerebintho p̄similis. Eius corticē vulnerātes, succū in vasis suscipiunt tenaci lacti p̄similē. Alibi etiam nasci Balsamū testatur, cū scribit. Et apud Sabæos Thus & Myrrha, & Cinnamon nascitur: in ora etiā Balsamū, & quadam alia planta odorata. Auicēna Balsamum in Ægypto nasci scripsit, eandemq; ferē omnia quæ Dioscori. de eo tradidit. Ait Theuetus se vidisse hortum non procul à Cairo Ægypti liquore illo raro & pretioso ex Balsamo arbore profluente celeberrimum, quam Prouincia præfectus adhibitis custodibus diligentissimē cōseruat, vt eius liquorē colligat, quē quorānis ad Turcarū Imperatorem mittat. Itē à Græcorum Patriarcha & vrbis senioribus audiuisse eum qui hodie colligitur, neq; tam oleosum, neq; vulneribus vlcibusq; curādis tam vtilem, quā qui postremi Regis Ægyptij tempore colligebatur. Plures quidem clam Opobalsamū vendere, sed adulteratū. Narrasse Arabas ex historiis Cleopatram Ægypti Reginam ex Iudæa Balsamum primam in Ægyptum trātulisse. Sed huic historiæ vix assentitur Theuetus, quod in alia vulgari Græca lingua cōscripta in Palestina legerit, Traians tēpore Balsami feracia fuisse montana Engadi, & quadā alia Asiæ minoris loca: quāquam re vera cū hæc lustraret, nullam reperire potuerit Balsami stirpem. Præterea Basiliani montis Libani incolæ ex historiis suis referebāt, in quadam mōtis parte quē Solis ortū spectabat, Alexi Græcis imperāte, tantum Balsami colligi solitum, quantū in Ægypto. Sed regione à Turcarū tyrannide oppressa, & exactis inde Christianis, eius liquoris memoriā vnā cum planta ipsa exoleuisse. Ægypti Reges nihil pretiosius habebant, quod Regibus & Imperatoribus Persidis, Catax, Æthiopie, Græciæ, ceterisq; donarēt, siue ad ineundā siue ad confirmādā cum eis amicitiam. Auctor descriptio nis Africæ, in octaua eius parte tradit extra urbē Ægypti Milfruhetich primā in Ægypto à Mahumetanis cōditam ad Nilum, excellētes esse & magnificas sepulchras Regum Ægypti, qui eorum lingua Soldani dicūtur. Ab his sepulchris mille & quingētis passibus stare dignos dictos Almathria, in quibus est hortus vnicā alens arbore, quæ Balsamum producit, nec in toto orbe vlla alia est quā hæc sola. Plātula est in medio fontis instar putei. Nā est procera arbor. Folia eius similia sunt foliis vitis, & parua. Audiuisse se refert qui dicerent, si aqua fontis diminuatur, plantam ipsam siccātā iri. Hortus cinctus est validissimis muris, in quem ingredi nemo potest, nisi maximo fauore aut dono custodiētibus dato. Multa quidē hæc illi de Balsamo. Nullus tamen notis omnibus delineauit eius imaginē, vt verisimile sit eam præsertim veteribus illis incognitam fuisse. Hanc ex amici cuiusdam oratione sic refert Pena: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei coloris, flore pusillo, Iasmini lutei simili, minore, perpetuis virgis. Folia horna exuit mense Decembri, quibus non nisi mense Maio noua substituuntur. In Cairo atque Babylone fata vi get. Decembri mense ramuli præcindūtur, quibus cera oblitæ appenduntur amphoræ, excipiendo aureo liquori, qui moschum sapit. Nunc de tribus plantæ partibus dicamus, vt veras ab adulteratis discernamus, & earum vires perspectas habeamus. Succus probatur, auctore Dioscoride, recens, odoris validi, sincerus, non ad




ad acorem vergens, dilui facilis, lævis, adstringēs, ac modicè mordēs linguam. Sed variè vitiatum misto ab aliquibus Terebinthi, Cypri, Lentisci, Balani vnguēto, item Sulino, Metopio, Melle, aut cerato Myrteo, aut Cyprino liquido, læui. Sed dolus facile deprehēditur. Nam purus in lancam vestem instillatus, si eluatur, neque maculam, neque notam relinquit: vitiatum autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit: Præterea sincerus in aqua, au lacte celeriter liquatur & lactescit, adulteratus olei modo innatat se cōuoluens, & in stellæ modū diffundens, Sincerus tempore crassescit, deteriorq; redditur. Xylobalsamum probatur *Xylobals.* recēs, tenuibus ramulis, fuluum, odoratum, quadatenus Opobalsamum spirās. Se- *Electio.* men eligitur flauum, plenū, grande, ponderosum, mordēs gustu, feruens, modicè *Carpobal* Opobalsamū olens. Adulteratur semine Hyperico simili, quod ē Petra oppido de- *sa. Ele-* fertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore piperis. *ctio.* Efficacissima vis inest succo, & maximè calfaciens, abstergit quæ tenebras oculis *Vires &* offundunt, medetur perforctionibus vuluæ cum cerato rosaceo appositus: mēses *Temper.* quoque secundas & partus extrahit, hor: ores illitu discutit, sordida vlcera expurgat, & cruda cōcoquit: vrinam potu ciēt, ægrè spiratibus prodest: datur in lacte cō- tra Aconitū haustum, ac serpētium ictus. Miscetur acopis, malagmatis & antido- tis. In summa efficacissima vis inest succo, secunda semini, minima ligno. Semen cōmodè potui datur pleuriticis, peripneumonicis, tussi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orihopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpētium morsibus: ad muliebres infusus vtile est: vuluā aperit in defecationibus balnearum decoctū, & humorem euocat. Lignum eadem habet vires, aliquāto minores. Ex aqua po- tum cruditatibus, torminosi, venenatorū ictibus, vullis opitulatur, vrinam cit, ad vulnera capitis cum Iri sicca conuenit, squamas ossium extrahit, & ad vnguento- rum spissamenta additur. Balsamum, vt scripsit Galenus, desiccatur & exalfacit or- *Li. 6. simpl.* dine secundo. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quā ipsa planta, non tamen adeo calidus, vt qui- dam existimant, tenuitate partiū falsi. Porro fructus eius persimilis genere facul- tatis est, cæterum longè in subtilitate partium inferior. Cum hæ tres Balsami par- tes rarissimæ sint, imò potiùs cum his prorsus destitutæ sint Officina, succedanea tria excogitant. Liquori Balsama quæq; sua, quæ vocant artificialia substitu- runt, quorum mirificas vires ad vulnera curanda omnes celebrant, & experimētis confirmant. Xylobalsamū Lērisi furculos, fortasse haud abs re, modò cariosi non sint, sed recentes, nec odorem amiserint: ea enim sunt temperie, nempe modicè calfaciente, desiccante, moderatè etiam adstringente & aromatica, vt horum pul- uis stomacho commodus esse possit. Iisdem qualitatibus dentiscalpia ex iis, dentes & gingiuas purgant & roborant. Hoc Pseudoxylolbalsamū abundat Gallia Narbo- nensis & Italia. Carpobalsamum Offinarum prorsus reiiciendum est, neq; enim Balsami fructus est, sed ignotæ cuiusdam plantæ, vietum, exoletum, inodorum. Quare eius penuria semine Terebinthi, vel Lentisci immaturi vtendum cēset Pe- na, quod eius vires Carpobalsami facultatibus planè respondere videantur. Quin è Terebinthi pullulantibus botris atque flagellis tempore Verno lymphidissimus liquor extillans, odoratissimus, non parū tenax, digerendo, glutinando, dolo- remque mulcēdo eadem quæ Opobalsamum præstare potest: cui suffragatur om- nium consensu: nullum enim Balsamum confecit, qui non Terebinthinam vulga- tam permiscuerit. Quare nullum ille succedaneum aptius arbitratur, cuius partes omnes omnibus partibus, liquori, ligno, semini respondeant, quā Terebinthus genuinus. Hodie ex Occidentali India præstantissimus liquor in Hispaniam de- fertur, quem ob excellentes & admirandas virtutes Balsamum nuncuparunt, veri- illius Balsami quod in Iudæa & Ægypto nascebatur nomine. Quare Balsamum



Inde sim-  
plic. Ind.  
Occident.  
*Forma.*

Indicum siue Occidentale nominetur. Nascitur auctore Nicolao Monard. in Hispania noua arbor Indis Xilo dicta, Punica malo maior, folijs Vrticæ similibus, ferratis & tenuibus. Ex hac duobus modis liquor elicitur. Vno multis incisis vulnerato arboris cortice qui tenuis est. Liquor inde fluens tenax est, subalbidus, & præstantissimus, sed adeo paucus, vt totum sibi seruent incolæ, nec ad nos transferatur. Altero Indis admodum familiari in eliciendis succis ex quauis arbore. Ramos atque etiam truncos arboris assulatim & minutim cōcisos in amplissimū leberem coniciunt, multa affusa aqua. Bulliunt omnia quantum satis sit: sublato igne refrigerari sinant, & conchis oleum supernatans colligant. Id verò est Balsamum quod in Hispaniam aduehitur, & quo illic vulgò vtuntur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitæ asservatur aliam omnem materiam penetrans. Gustu est acuto & aliquantulū amaro, vnde colligere licet adstrictionis particeps esse, calidum & siccum secūdo gradu. Tribus autem modis in vsum medicum recipitur. Aut enim intus sumitur, aut foris illinitur, aut chirurgicis remedijs permiscetur. Intus sumptum manē ieiuno ventriculo asthmaticis vtile est, & vesicæ doloribus, menses cit, vt & pessi modo subditum. Eius quatuor aut quinque guttulæ vino, aut aqua rosacea in cochleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic vt linguam nō contingant (eius enim Balsami sapor in ore diutius hærens forsitan nauseam moueret) veteres stomachi dolores finiunt, eūque roborant: colorem commendat & anhelitum. Locinori prodest, obstructions aperit, & iuuentutem conseruat. Phrificos iuuat, steriliū vterum expurgat pessi modo admotum. Foris calidum cum pluma illitum omnes cruciatus à frigidis humoribus ortos mulcet, præsertim si linteum liquore delibutum apponatur. Oedemata discutit & absūmit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum cerebrum reficit & fouet, omnemq; noxium humorem absūmendo, dolores sedat. Paralyticis opitulatur, cerebro, ceruice, spina, & ea parte quæ paralyti tentata est inunctis. Eadem ratione ad omnes neruorum morbos & contractions vtile est. Stomacho illitum eum roborat, concoctionem iuuat, & flatibus obstructionsq; liberat, sicuti & lienem, quem etiam emollit. Nephritidem & ventriculi dolores à causa frigida & flatibus prouenientes, calidum loco dolenti impositum sanat. Idem præstat pani calido inditum, sicq; appositum. Vrinam cit & expellit illitum. Summo pere laudatur in articulorum doloribus, præsertim coxendicum, quia omnem duriem & tumorem resoluens discutiat. Chirurgicis medicamentis mixtum, mirum quantum valeat. Vulgò in recentibus vulneribus vtuntur: nam statim & sine suppuratione glutinat. His etiam prodest in quibus confusio adglutinationem impedit, quod statim digerat, & reliqua præster quæ ad vulnus glutinandum necesse sunt, vt non abs re pauperum chirurgia ceteri possit. Neruorum iuncturatumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera sanat, modò cranium illesum sit. Denique recētia omnia in quamlibet corporis parte, antiqua verò per se, aut cum alijs eò pertinentibus expurgat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus spina eo calente inuncta, dimidia hora ante paroxysmum, & illico quinq; aut sex guttis eius in vino sumptis modo supradicto, horrores discutiantur, si ter aut quater remedium id repetatur. Hoc Balsamum statim, atque in India innotuit, ab Hispanis vsu receptum fuit, Indorū exempla secutis, hoc succo vulnera sua curantium. Quare in Hispaniam delatū ob admirabiles eius dores magno fuit in pretio: eius enim vncia modò decenarius, modò viginti ducatis aestimabatur, nunc libra non pluris quàm vncia centum ducatis valet. Romam quoque primū illatum in eo fuit pretio, vt vncia centum ducatis venderetur. Deinde magna eius copia ad nos delata cœpit vilescere. Eodem



FRUCTVS Balsami,  
Monardi.

Eodē Nicolao Monardo auctore, ex America Li. de sim-  
sive Noui orbis cōtinenti magna copia defer- pli Occid.  
ri cepit Balsamū aliud per incisionē extractū India.  
ex arboribus iis similibus quæ in noua Hispa-  
nia nascuntur, vbi Balsamū decoctione colligi-  
tur. Sunt autem ex arbores vastæ magnitudi-  
nis, & ad radicem vsque ramosæ, duplici septæ  
cortice, altero crasso, Suberum modo, altero te-  
nui, interno, materiam arborum amplectente.

Forma.

Ex eo quod inter vtrumque corticem est spatium, incisione Balsamum profluit, al-  
ba limpidissimæque lacryma, suauissimi odoris, qui insignes suas facultates sta-  
tim prodit. Idem auctor affirmat eius guttulam, alterius quod decoctione eli-  
citur libia præstare, eiusque arboris fructum se habere, qui pro arboris magnitu-  
dine exiguus est, nempe Ciceris aut Pisi grano non maior, gustus aliquantum  
amari, inclusis extrema siliqua angusta, digitum longa, alba & tenui. Eo fructu  
sepe sutiunt Indi ad capitis dolores & defluxiones. Auctor generalis Indiarum  
Historiæ narrat in India & insula Hispaniola plantam quandam sponte nasci, ar-  
boris magnitudine, vtpote quæ ad duorum  
hominum proceritatem interdum assurgat.

Usus.  
Lib. II. 73.

## BALSAMI folium.



Caulibus est cinereis, foliis viridibus superiore  
parte magis quàm inferiore, grandibus & am-  
plis costa crassiore & elatiore per medium di-  
uisis, foliorum pediculis non virentibus, sed  
rubescens. Fructus est racemosus, longus  
instar manus digitatæ. Acini eius rari, virentes,  
quandoque rubescentes, & qui maturendo  
magis, ac magis rubescunt. Succum ex ea hoc  
modo extrahunt. Cymas & asparagos teneros  
huius plantæ colligunt, alij racemos addunt, &  
ex his succum exprimunt, quem in aqua co-  
quunt ad dimidias, deinde magis ac magis ad  
sapæ aut mellis crassitudinem. Residere sinunt,  
& ad vsum reponunt. Vlceribus & vulneribus  
admovent: sanguinem enim reprimunt, terget, &  
mirificè eis medetur, etiam vero Balsamo effi-  
caciùs. Eius folium hîc ad viuum est expres-  
sum, vtroque extremo acuminatum, sex digi-  
tos longum, latum quatuor cum dimidio. Re-  
peritur in multis locis insulæ Hispaniolæ. Bal-  
samum nouum vocant. Ex eius summitatibus  
destillatur aqua præstantior aqua vitæ, vulneribus vtilissima, & morbis omnibus  
qui à frigore ortum habent, vti dolori ventriculi, aut partis alterius, si diebus  
aliquot bibatur.

MACER.



*Nomina*

Lib.1.c.94.

*Forma.*

Lib. 12. c. 8.

Maxar originis  
 quia dicitur quia  
 maxar vel maxarior  
 ut felix et beatus  
 quia in filia  
 sua nascitur et  
 inde adiectionem  
 et quia felix in  
 ultima producit  
 fectus.

T GRÆCIS μακρί, ita Latinis Macer & Macir nominatur. Auicenna Thalifasar, de quo breuiter sic Dioscorides. Macer est cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens. Ex Barbaria aduehitur. Plinius non plura tradit. Et Macer ex India aduehitur, cortex rubens, nomine arboris suæ. Qualis sit ea incompertum habeo. Plinius & India conuehi Macerem aiunt, Dioscorides ex Barbaria, quæ, Proleptere, in Indo fluuiio insula est, vel vrbs. Illud maiore consideratione diuidit Plinius radicis, alij alterius partis, vel trunci, vel ramorum arboris. Maceris nomine intellexisse videntur. Quis autem sit hic cortex, hodie nec etiam aliunde ad nos aduehitur. Attamen Pena scribit inter corticis magna fragmenta, de quibus dicemus, etiam repertum fuisse eius cuiusdam arbulculæ stipitis imo exemptus, inferiorem sui parte valde concolor esse superiori, sed minus crassus, ferè inodorus, aut quiddam ut Lauri redolens, gustu perparum caloris glutinis ve mixti cum adstringens. Quare Macer videri possit, cum Macer Dioscoridi & Galeno sit, & calfaciat, & arboris cortex esse videatur. Macim autem Officinæ esse, integumentum scilicet Nucis myristicæ, multis rationibus depotest. Est enim Macis tenuis cortex, acris odoratus, & amariusculus. Plinio cortex rubens, radicis magnæ. Præterea vires & facultates plures se disident. Nam Macer gustu valde adstringit, vr Dioscorides auctor contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur. Et Corticis melle decocti vsus ad dysenterias præcipuus habetur. Galeno gustu est multum acerbum, cum leuicula quadam acrimonia odorata, sanè redolens. Videtur itaque ex mixta constare essentia, pleraque terrena, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem valenter detringitque: ob id cœliacis & dysentericis miscetur facultatibus, in tertio consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutram inspicuens. At Macis non ita adstringit, nec tam leui est acrimonia, sed linces satis vellicat, odoratior est, & leuiusculum amarorem cum siccitate, vt dici possit calfacere & siccare in fine secundi ordinis, vel principis. Maceris à Maci discrimen non ignorauit Serapio, qui cum ex Isaac dictum esse Nucis odoratæ operimentum, subiungit aliud esse de quo Dioscorides, scribens Macerem ligni corticem esse siue corium. Item de Maci Nucis odoratæ inuolucro tractauit vno in loco, de Macere quam diuersa re, nomine Thalifasar, alibi. Postremò Dioscorides & Galenacere illa quidem quæ suprâ diximus, literis mandarunt, de Maci verò cognito aromate, ne verbum quidem.

*Vires.*

Lib. 12. c. 8.

Li.7.simpl.

Ca.2.simp

Li.2.c.448

Li. 2.c.687

MALABATHRV M BETRE. CAP. XV.

Nomina

Lib.1.ca.11

*Forma*



*MALABATHRVM BETRE. CAP. XLV.*

**M**ΑΛ'ΒΑΘΡΟΝ Græcis & μάλον, Latinis similiter Malabathrum & folium simpliciter, & folium Indicum. De quo hæc prodit Dioscorides. Malabathrum quidam esse putant Indicæ Nardi folium, decepti quadā odoris similitudine: multa enim Nardum olet, ut Phu, Alarum, Niris. Res autem nō ita habet. Nam Malabathrum folium est sui generis, quod in Indiæ nascitur paludibus, Lentis palustris modo innatans aquis sine radice. Id collectum statim lino transiuitur, & siccatum reconditur. Ferunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus vri. Quod si non acciderit, non ampliùs renasci. Probatur recens, ex nigro candicans, non fragile, integrum, odore



odore caput feriens, quod in sua odoris suauitate diu permaneat, vt Nardum sapore immiscetur, nullo satis gustu. Infirmu verò, & minutim concisum, cariosum, virus olens, improbat. De eodem sic Plinius. Dat & Malabathrum Syria, a bore folio conuoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad vnguenta, fertiliore e usdem Ægypto. Laudatius tamen ex India venit. In paludibus ibi gigni tradit Lentis modo, odoratus Croco, nigricans scabrumq; quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrime situm in vetustate sentit. Sapor eius Nardo similis esse debet sub lingua. Odor verò in vino sufferuefacti antecedit alios. Hic Plinius diuersa Malabathri genera ponit, Dioscorides vnicum. Vnum in India laudatius, ibi in paludibus gigni Lentis modo, quod Dioscorides dixit Lenticulæ palustris modo aquis innatare. Quodam salis gustu, Dioscorides nullo, *μη ἀλμυρὸν*, id est, nauigationis tempore aqua marina non perfusum. Minus probari candidum, Dioscorides probat ex nigro candicans. Auicenna & Serapio quæ de Folio Indo tradiderunt, à Græcis mutuati sunt, qui cum Malabathrum non norint, ex eorum scriptis innotescere aliis non potuit. Quare veram Malabathri historiam ex García hic exponemus. Indi folium siue Malabathrum Tamalapatra appellant, ex qua voce Græci & Latini suum Malabathrum detorserunt, Arabes *Ladgi Indi*, id est Folium Indum, Actuarius à Mauritanis *Tembul* nominari perperam scripsit. Est autem Folium Indum folio mali medicæ simile, angustius tamè per extremum colore viridi, tribus per longitudinem excurrentibus costis (qua nota facile dignoscitur) odoratum, Caryophylla quadantenus redolens, non tam vehementis odoris quam Nardus aut Macis, neque tam subtilis & acuti quam Canella. Non

Li. 12. c. 26.

Li. 2. ca. 253.

Cap. 13.

simpl.

Li. 1. Arom.

Ind. ca. 19.

Nomina

Forma.

TAMALAPATRA  
cum suo ramusculo.



igitur aquis innatat hoc folium Lentis palustris modo, vt referunt Dioscorides & Plinius, sed nascitur in procera arbore procul ab aquis, cum multis aliis in locis, tum in Cambaya. Neque tam val di sunt odoris folia hæc quam Spica Nardi, sed suauioris, neque eo modo colliguntur atque reponuntur quo Dioscorides ait, sed collecta in fasciculos colligantur, atque ita vaneunt. Dilutior viridi colore nitent, nõ ex candido nigricant, & præferuntur integra, quòd facultas in istis melius conseruari credatur. Odore nequaquam caput feriunt, vt reliqua odorata. Plinius in Syria, Ægypto & India nasci tradit, quod cum perquisiisset Garcias à Medicis Memphiticis, Damascenis, & Alepinis, omnes vno ore negarunt in Syria aut Ægypto gigni, neque tam validi esse odoris quam Crocum, neque Nardi esse sapore affirmat. Quod verò huius in vino sufferuefacti odorem alios antecedere scribit, eius tempore verum id esse potuit, cum adhuc ignota essent Berzuinum, Ambarum, Moschus, Calambac, id est Agallochum præstantissimũ, aromata odor-

atissima Hoc folium quale à García describitur, eius Scholiastes ad nos, ipsis etiam tenuioribus ramis interdum adhuc inhærens & integrum adferri ait, quale & hic pictura expresit, gustu Laurini ferè folij. His addit picturam fructus cuiusdam exiguæ glandis ferè forma à Cortuso misit cum hac inscriptione, Fructus Casellæ quorundam sententia, ex aliorum verò sententia, *Tembul* conuolvoli in India. Eum



- Eum quoniam intellexerat aliquando vnâ cum folio Indo ad nos adferri, atque id legitimum esse folium ex Garcie descriptione coniciat. (Nam *Tembul* fructus longè diuersus est, vt in Betre dicitur) pingendum curauit ea magnitudine quam missus est, quem & nos hîc cum folio exhibemus. Falluntur, inquit Garcias, qui Malabathrum Caryo phyllorum folium esse putant: nam regio in qua Caryophylla nascuntur, biennij ferè itinere distat ab ea in qua Malabathrum prouenit. Neque opus fore *ἀλλοτρίον* ait, si diligentiores essent phararmacopœi & Medici Lusitani: tanta enim eius copia exportari posset, quæ vniuersæ Europæ satisfaceret. Eius autem penuria Canellæ foliis vtendum consulit, si ea nanciscantur, sin minus, Spica Nardi, non autem Maci, vt quidam voluerunt, Auicenna Thalissar substituit aut Spicam, Bellunensis autem Thalissar, seu Thalissar, seu Thaleffir interpretatur folia Oliuæ Indæ. Alij dicunt, inquit, quod est lingua auis. Rectius opinor Clusius, qui Thalissar Auicennæ Græcorum Macerem esse censet, de quo Thalissar nomine scripsit Auicenna, vt diximus. Malabathrum, Dioscoride auctore, easdem quas Nardus vires habet, sed omnia efficacius præstat.
- Li. 2. ca. 23.** *Vires.* Vrinam vehementius ciet, & stomacho magis prodest Malabathri vis. Oculorum inflammationibus tritum & in vino feruifacum commodè illinitur, subditum linguæ oris halitum commendat. Vestibus interpositum earum odorem seruat, & ab erosione tuetur. Plinius, Malabathri quoque naturam, inquit, & genera exposuimus. Vrinam ciet, oculorum epiphoris vino expressum vtilissimè imponitur: item fronti dormire volentibus, efficacius si & nares illinantur, aut si ex aqua bibatur. Oris & halitus suauitatem commendat linguæ subditum folium, sicut & vestium odorem interpositum. Folio Indo *Betre* siue *Betle* adeò simile est, vt idè esse credant multi, etiâ qui in India peregrinati sunt. Amatus Lusitanus verumque confundit. Item Odoardus Barbosa, scribens *fluuium* esse *Betelle nuncupatum*, in cuius ripis vici sunt aliquot, & horti amœnissimi ac paradisi, in quibus tanta *Betelle* copia colligitur (folium id est ad mandendum præstantissimum) vt iis nauigia paruula & scaphas onerent, quæ ad alias regiones & maris portus vendèda transuehant. Hoc folium, inquit, Folium Indum vocamus, Lauri folio magnitudine par, eadèque ferè specie. Hederæ modo alias arbores conscendit, & palis radicisque fulcitur. Fructu semineque caret. Folium istud in ore detentum roborandivim habet. Quamobrem Indi omnes tam viri quàm scemina, noctu diuq, domi & foris id perpetuò mandunt ita præparatum. Ex ostreorum testis calcem conciant, in qua aqua dissoluta folium macerant, quibus adiungunt paruula quedam poma (*Areca* vocant) quæ permixta in ore tenent manduntq, nihil deglutientes, præterquam succum qui ex superioribus tribus commixtus elicitur, quæ semper os rufò colore, & dentes nigro inficiunt. His tradunt ventriculum à superuacuis humoribus expurgari atque exsiccari, cerebrum & cor mirè roborari, flatu discuti, sitim sedari, vt nulla apud Indos res maiori sit in pretio. Non solum loco supradicto, sed etiam in tota India magnæ folij huius copia est. Persæ & Arabes *Tambul* vocant. Hæc Odoardus Barbosa. Sed hallucinantur, inquit Garcias, qui Betre folium Indum esse putant, in quo etiam errore se fuisse fatetur. Sed Nizamoxæ Regi medicamentum roborando stomacho iussus componere, cum medicamenta ex quibus constaret enumerasset, adderetq, id folium quod manderet, folium Indum esse, risit ille, & Auicennam ostendit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de Folio & Betre agebat. De Folio quidem loco suprà citato, quod ab multo post, quod *Tembul* vocat corrupto, vt Garcie videtur, vocabulo, quod ab omnibus *Tambul* non *Tembul* vocatur. In Malauar, vt idem Garcias scribit, *Betre* vocatur, in Decan, Guzarate & Canam, *Pam*, in Malaio *Siri*. Nascitur in omnibus India regionibus maritimis Lusitanis cognitris, in continenti non reperitur, nisi è maritimis
- Li. 2. c. 687.**  
**Lib. 1. ca. 11.**  
**Vires.**
- Lib. 2. c. 4.**
- Betre.**  
In cap. 11. di.  
1. Dioscor.  
Lib. Nani-  
gat.
- Forma.**
- Vires.**
- Li. 1. Arom.**  
**Ind. ca. 18.**
- Li. 2. c. 699.**  
**Nomina**  
**Locus.**



emacitimis delatum. Verum quidem in Dultabado, vrbe opulenta, in Decan, in  
 Bishnaga inueniri, sed minori certè quantitate quàm vt ad Persas & Arabes defe-  
 rat. Supra Calaiate, quod octoginta leucis ab Ormuz distat, inueniri haud erit  
 facile. Nam neque regionem frigidam amat, vt ex China, neque solibus nimium  
 perustam, vt Mosambique & Sofala. Est autem Betre, inquit ille, folium simile fe-  
 rè Mali Medicæ folio, oblongius tamen, & per extremū arcū, venas siue costas  
 per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maturum, colore  
 fuluescēte, tametsi mulieres nonnullæ præferunt quod immaturum est, quia ma-  
 iorem sonum edit in ore dum manditur. Corruptur si recens à planta collectū  
 diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quēdam cōtortum, la-  
 ceri caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id sēmen dela-  
 tum Malacam, atque degustatū optimi saporis inuentum est. Seritur autem Vir s  
 modo, addunturq; pedamēta, per quæ repens se sustineat nostratis Hedera modo.  
 Quidam maioris quæstus gratia Piperis, aut Arecæ arboribus id maritant, atque  
 ita pulcherrima vmbacula conficiunt. Multam verò curam & assiduam rigatio-  
 nem desiderat. Betre folium mansum amarum sentitur. Quā ob causam Arecam, *Vfus &*  
 calcem, atque alia admiscēt. Sunt qui addant Lycium, opulentiores Caphuram *Vires.*  
 de Burneo, nonnulli lignum Aloës, aut Moschum, aut Ambarum. Sic autem para-  
 tum, adeo suavis est saporis, orisque halitum adeo commendat sua fragrantia, vt  
 perpetuò ferè illud mandant ditiores, tum etiam alij pro facultatum ratione. In  
 solitudinibus autem & remotioribus à mari locis carè venditur. Ideo fertur Ni-  
 zamoxa singulis annis in id impēdere trigēties mille aureos Lusitanicos. Hæc  
 sunt eorum tragemata, hoc abeuntem donant, atque Rex ipse interdum propria  
 manu potentioribus largitur, aliis verò per manus famali. Sed quia Betre venas  
 habet per folij longitudinem discursantes, vngue pollicis (quæ ea de causa in acutū  
 præsecant, non veluti nos in rotundum) eas eximunt: deinde admisto calcis mo-  
 mento (quæ tum ob exiguam quantitatem, tum quod ex testis ostreorum concre-  
 matis facta sit, nocere non potest) & Areca contusa aut confracta, folium Betre  
 complicant, atque in os iniectum mandunt, priorem illum succum expuentes  
 (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur: deinde alia atque alia  
 folia similiter præparata sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut ipsi ab adstātibus  
 discedentes his foliis præparatis plena bursa sericea abeuntem honorare. Nemo  
 autem discedere sustinet, donec Betre sit donatus: id enim est dimissionis indicium.  
 Præterea opulentiores adituri, hoc Betre manducare pro more habent, vt odore  
 commendent. Est enim apud eos valde indecorum odoratum non habere an-  
 helitum: ita vt si tenuioris fortunæ aliquem cum potentiore fabulari necesse sit,  
 manu ori admota id faciat, ne teter aliquis odor nares alterius feriat. Sic etiam  
 mulieres cum viris congressuræ Betre mandunt, antequam colloquantur, existi-  
 mantque ad lasciuia summam esse illecebram. Omnes eius regionis incolæ  
 sumpto cibo mandere solent, alioqui cibos nauseam prouocatuos aiunt, & man-  
 dere assuetis oris halitum tetrum fieri si abstineant. Solent ab eius vſu aliquot dies  
 abstinere, quibus obierūt sanguine iuncti, & in quibusdam ieiuniis. Ab eius etiam  
 vſu abstinent, & humi se abiciunt Arabes & Moalis, id est, Ali sectatores, decem  
 diebus quibus ieiunant. Auicenna tradit Betre gingiuas confirmare, in quem *Li. 2. c. 699.*  
 etiam vſum semper ab Indis manditur: & paulo post subiicit stomachum ro-  
 borare, ob quam facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigidam  
 facultatem illi tribuat in primo gradu, & exsiccantem in secundo, putat Gar-  
 cias exemplar vitiosum esse, aut (quod docti Arabes arbitrantur) Auicennæ in-  
 temperamenti ratione impositum fuisse. Fit enim plerumque, vt vulgus quæ  
 calida sunt, frigida esse dicat, vt Piper, Cardamomum, Cepam. Calidum autem



& siccum esse Batre ad finem secundi excessus Garcias expertus est, & ex sapore, ac odore iudicauit.

## L A C C A.

## CAP. XVI.

Lib. 2. Cap. 32.




ACCA Officinis, Italis etiam *Lacca*, quibusdam *Lachetta*, Auicenna Luch vocat, & Dioscoridis Pauli; Cancanum esse censet. Scribit enim ex Paulo gummi esse simile Myrrhæ, boni odoris, debetque adhibita cautione sumi. Deinde eos reprehendit, qui Caraben dixerunt esse Laccam, quamuis Carabe nonnullas facultates similes habeat. Serapio ex sententia Dioscoridis & Athabaris (quem nonnulli Paulum putant, quod eius verba transcribat) scribit Laccæ gummi esse arboris in Arabia nascentis, Myrrhæ simile. Deinde ex sententia Rhais, ex celo decidere in ramos arboris Gubera, id est Mespili. Postremo ex Isaac, Lacca, inquit, res quedam rubra, quæ tenuibus lignis inhaeret, saporis suavis. Coquitur hæc, & ex ea panni rubro colore inficiuntur, quam infecturam Kermes vocant. Ex Armenia deferitur. Sed de Lacca longè aliter scripsit, ut recentiores. Amatus Lusitanus tradit Laccam hodie à Lusitanis ex India deferri, rubram, translucentem, infecturis præcipuè expetitam, ex qua etiam Officiuæ compositionem preparant, quam Dialacca appellant. Hanc certum est non gummi esse, nec arboris plantæ, ve alienius lachrymam, sed potius formicarum alatarum stercus, sanguinemve, veluti ceram apum. In Regno igitur Pegu apud Indos, cum terra pluuia, vel arte plus iusto irrigatur, formicæ alata ligna quedam tenuia ab incolis sic disposita conscendunt, in quibus Laccam generant: quia de causâ in Lacca ligna visuntur, quæ proculdubio arboris non sunt Laccam ferentis. Garcias tradit quam Officiuæ Laccam vocant Arabibus, Persis, & Turcis *Loe Sumutri*, quasi dicas Laccam è Samatra, nuncupari, non quod Samatra sit provincia Pegu, vbi plurima Lacca nascitur, finitima, sed quod Arabes & alij in Samatra gigni putarent. Idem nomen seruauerunt incolæ provinciarum Balagrate, Bengala, & Malauar, quia à Mauritanis id didicerunt. Legitimum tamen in his provinciis nomen est Lac, in Pegu verò & Martaban, vbi est præstantissima, Tree, atque istuc à Iamay adferri tradit. Non vocatur Ace, nec Aucusal, ut Pandeetarius scribit, neque Sar, ut corruptè apud Serapionem legitur. Porro incolæ Pegu & Martaban eam Samatram dicebant, vnde Piper in suam regionem reuehebant. Quomodo autem illic nascitur, ita narrat. Vastam arborem illic inueniri, folijs quodammodo Pruni, in cuius furcalis & minutionibus alijsque mis magnæ formicæ in terræ visceribus alijsque locis enatæ hanc Laccam elaborant (ut apes mel conficiunt) materiam ex ipsa arbore exurgentes: hos deinde ramulos ab arbore renelli, atque in umbra siccari, donec deciditibus ipsis Lacca veluti in tubulos cōcreta maneat: inter dum ligni fragmenta ipsi inhaerent. Melior sincera, ligni & fragmentorum expers, deterior cui ligni fragmenta inhaerent. Inuenitur etiam solida & minimè sincera, quæ postea colliquat, & in pollinem redigunt. Hæc vilior, quia multa terram admixtam habet. Non est autem arbor in qua

*Carabe*  
*Tuor an.*  
*via Lysipus*  
*an habet f. l. u.*

Cap. 31.  
simpl.In cap. 32.  
lib. 2. Diosc.Lib. 2. Arom.  
lib. 2. cap. 6.  
Nomina

L A C C A cum suis bacillis.

Cap. 13.





in qua Lacca prouenit, Myrto similis facie, aut magnitudine, vt aliqui putant, sed interdum in Nucis iuglandis magnitudinem accrescit, interdum minor est. Idem refert se in Balagnate vidisse ramulum ex arbore Betifera reuulsum, cui inhærebat Lacca: sed quia exigua admodum quantitate aduersante, cæli temperie prouenit, negligi: multi tamen se vidisse in iis arboribus affirmabant. Formicas autem Laccam conficere perspicuum esse, quod plerumque alæ formicarum Lacca permixtæ reperiuntur. Eligenda Lacca quæ præmansa pulcherrimo colore rubro inficit. *Electio.* Quæ etiam ad nos aduehitur, circa ramulos elaborata est, inquit Clusius, & quavis prædura & exsucca, mansa tamen sputum efficit sanguineum, quod probatis est indicium. Ex his intelligere licet Laccam à Cancamo Græcorum diuersam esse, quod Lacca minimè odorata sit, Cancamum autem ad suffimenta vsurpatur, quod boni odoris est indicium. Quare Auicenna & Serapioni ignotam fuisse qui Cancamum Græcorum esse putarunt, quibus æquè incognita fuit. Non est autem Lacca Myrrha similis, quia hæc in exterioribus ramulis conficitur, & odorata non est, Myrrha ex ipso arboris trunco extillat, & odorata est. Fallitur etiam Auicenna scribens similes illi cum Carabe esse facultates: Carabe enim adstringit, Lacca obstructions aperit. Præterea Laccam in Arabia nasci falsum est, cum in Arabiam ex India deportetur. Neque in Sorbi ramulos delabatur, neque etiam Mespili, vt nonnulli perperam verterunt: cum nullæ sint, auctore Garcia, in vniuersa India Sorbi neque Mespili. Sed nec in Armenia prouenit, nec est Kerme Arabum, cum id nihil aliud sit, quam Coccus insectorius Græcorum. Lacca exalfacit ordine secundo, ventriculum & icur roborat, & ab obstructionibus liberat, ictericis prodest, aquas pellit. Est alia Lacca artificialis, quam insectores vendunt: quæ ex faece brasiliij & croci constat, qua pictores maximè vtuntur in exprimendo colore rubro obscuro.

## BENZON.

## CAP. XVII.

**B**ENZON, vel Belzoim, vel Belzuinum vulgò, Garcia Benini, siue Benzuinum dicitur. Id ille veteribus prorsus incognitum fuisse scribit: neque enim apud Græcos, neque apud Arabas vllus eius descriptio legimus. Auerrhois quidem scribit Belenizan, siue Belanzan, siue petrosam exsicantem & exalfacientem in secundo excessu habere facultatem, stomachum humidum & languescientem exsiccare & roborare, oris odorem commendare, partes corporis confirmare, & venerem excitare: quod nonnulli Beniui esse putant, quibus Garcia non assentitur. Veteribus etiam Iudæis incognitum fuisse ex eo conicit, quod neque David, neque Salomon eius meminerint, qui tantum odores & suffimenta maximè celebrarint. Beniui genera multa Garcia recenset. Vnum à mercatoribus maximè expetitur, quod amygdaloides vocant, quia vngues seu maculas candidas amygdalorum instar admixta habet, & quo pluribus abundat, eo præstatius habetur. Amatus Lusitanus hoc genus Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, omnium præstantissimam esse censet. Maximè prouenit in Sian, & eius cotermina Martaban. Alterum genus nigrius inuenitur in Iaoa & Sumatra, quod vilius est. Est & genus nigrum in Sumatra, è nouellis arboribus profluens, quod ab odore grato Beniui de Boninas vocant: id superiori decuplo carius est. E nouellis autem plantis profluens amygdaloide odoratus esse Garcia, quia gummi multum naturæ suæ fragrantia vetustate amittat, vt ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegantius est, nigrum & nouellum odoratus, vtunque permiscere solent, vt odoris fragrantia etiam elegantiam conciliant. Beniui genera à Chinesibus vocantur *Cominham*, ab Arabibus *Louaniacy*, quasi dicas Thus de Iaoa, quod hæc regio primum Arabibus innotuerit: Arabes

*Nomina**Lib. Arum.**Ind. cap. 5.**Collig. 5.**cas. 6.**Lacca quoniam**uocat. Benzoin. quæ**Ber. quædam, ut dicitur**significat flum. iudi**in p. d. d. d. d. d. d.**Genera. in iudæis**quæ sunt incognita**ut dicitur. Benzoin. per**In cap. 71.**Lib. 1. Diosc.**Locus. flum. iudi**in qua regione eius**maxima quantitas**est. ideo nomen**recepit ab alijs dicitur.**Benzoin.*



Forma.

enim Thus Louan vocare diximus, Gazarate & Decan incolæ *Udo* nominant. Est autem Beniuisera arbor procera, vaila pulchra, vmbra latè diffundens ob ramorum copiam, quos venusto ordine digestos, & in altu sublatos habet. Caudice est crasso, materie pulchra & firma. Folia minora sunt aliquantò Citri, seu Limonera: foliis, non tamen adeò virentia, sed parte auersa candicantia, quæ in maioribus ramis nascuntur, ad Salicis folia magis accedūt, latiora tamen sunt, sed minùs longa. Nascuntur interdum in filuis Malaca. Vulnerātur interdum arbores vt Beniui maiori quantitate effluat, nouellæ, vt dictū est, Beniui de Boninas emittit. Credidēre per multi Laserpitij lacrymam, siue Asam odoratam esse Benzuinū, quorum sententiam Garcias improbat. Nullum enim, inquit, in condimenta vnquā Benzoinum recepisse certum est. Asa verò frequens est vsus in condiendis cibis apud Indos. Deinde maxima pars Lasferis ex India vltra Gāgem (Indi Ganga vocant) aduehitur. Benzoin verò quod in Indiam adfertur, quodq; Amygdaloides dicunt, nascitur in Sumatra & Sian (non in Armenia aut Syria, aut Cyrene) eiusque maxima pars in Indiam conuehitur, deinde in Arabiam, Persiam, & Asiam minorē, atque etiam in Palestinam Syriam, Armeniam, Africam.

## BDELLIVM.

## CAP. XVIII.

Nomina  
Lib. I. c. 69.


Vide sub pag. 1757.

**B**DELLIVM Græcis, *μαλδακων* & *βόλχαν*, Latinis Bdellium. Est, auctore Dioscoride, lacryma Sarracenica, seu Arabica arboris. Probatur gustu amarum, translucidum taurini glutinis modo, intus pingue, facile liquefcens, ligni ac sordis expers, suffitu odoratū, vngui simile. Est etiam bdellij genus sordidum, nigrū, vberioribus glebulis in offas conuolutū, Aspalathi odore, ex India aduectum. Deferunt etiam ex Petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec adeò suffitionibus odoratum. Dioscorides hic solūm gummi meminit, Plinius etiam arboris. Vicina est Baetria, inquit, in qua Bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine Oleæ, folio roboris, fructu caprifici naturæq; Gūmi alij Brochon appellat, alij Malachra, alij Maldacon. Nigrū verò & in offas conuolutū, Hadrobolon. Esse autem debet translucidū simile ceræ, odoratū, & cūm fricatur pingue, gustu amarū citra acorē. In sacris vino perfusum, odoratius. Nascitur in Arabia, Indiaq; & Media ac Babylone. Aliqui Peraticū vocant ex Media aduectū. Facilius hoc & crustosius, amarūq; at Indicū humidius & gūmosum. Adulteratur Amygdala nuce. In nostris Auicēna exemplaribus cōfusa est admodū & inepta Bdellij descriptio. Serapio duobus diuersis capitibus de Bdellio tractat. In priore scribit Molechil de Machi, id est Bdelliū de Mecha esse arborē lunci, quæ maturatur in Mecha, & comeditur, estq; dulcis, cuius cor est Cefilio, estq; ex genere Palmæ. In altero capite de Molochil agit, quod est Bdellium Dioscoridis. Bdellij fructum à Cortuso missum

Lib. I. c. 115.

Cap. 117.  
simpl.Cap. 194.  
simpl.

## BDELLII fructus Cortuso.



rei herbariæ studiosis quem & hic expressimus. Est nucus luglandis magnitudine, aut etiam amplior, triangulari forma, oblongiori tamen, & ad Ficum quodāmodo accedente, odoratus, colore subcinereo, durissimo



risimo putamine, quod pragnans est, & nucleum continere videtur. Bdelium calfacit auctore Dioscoride, & emollit duritias, & turgentia gurgura, humidaq; hernias discutit, cum ieiuna salua dilutum: vuluæ spiracula laxat appositum & suffitu, & partus humiditatemque omnes extrahit, calculos potu comminuit: vrinam mouet, tussientibus & à serpente percussis vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discurrentes spiritus: malagmaris inferitur, quæ contra duritias & neruorum nodos, profunt. Contusum resoluitur affuso vino aut aqua calida. Dilucidius easdem facultates exponit Galenus. Bdelium quod Scythicum nominant, quod sanè & acrius est & resinofum magis, emollientis admodum & efficacis virtutis est. Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur quàm emollientia. Igitur recens & humidum est, & contusum facillè mollescit, ad omnia ad quæ Scythicum idoneum. At quod antiquum est, & gustu admodum amarum, & acre & siccum ab eorum quæ indurata emolliunt mediocritate excidit. Vtuntur autem illis & potissimum Arabico, & ad bronchocelas, & hydrocelas salua marutina ieiunæque subigentes, vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crudorum flatuum discursus, & laterum dolores, & rupturas perfanare.

Temper.  
& Vires.  
Li. i. ca. 69.

Li. 6 simpl.

## CAPHURA.

## CAP. XIX.

**C**APHOR seu *Chasur* Arabibus, recentioribus Græcis καψωρα, vt etiam Latinis Caphura nominatur, Officinis & Italis *Camphora*, Germanis *Campher*, Gallis *Camphre*. Serapio tradit Camphoram de Panzor esse de terra Panzor, id est, de insulis propinquis regioni Sarandin, & quibus annis hunc multa fulgura, tonitrua, & terræ motus, ibi generari multa Camphoram, & contra. Aiunt etiam, inquit, in montibus Indiae & Sim esse arbores Caphura. Deinde scribit ex Isaac, Camphoram deferri ex regione Saffella, & ex regione Calca, & Dhabe hac, & Harigi. Et Camphorâ esse gummi arboris nascentis in partibus illis, & esse gummi maculati coloris rubri, & lignum eius esse album, tenerum, quasi velit fieri nigrum, & Camphoram reperiri in corde ligni arboris, & in interueniis ligni. Meliorem esse quæ Camphora Riach appellatur, quæ sponte ex ligno arboris manat, & coloris est maculati rubri, quæ sublimatur, & fit Camphora alba, Riachina dicta à nomine Riach Regis, qui ibi primus regnauit. Nomen loci Panzor. Secundum bonitatis gradum obtinet Camphora de Sauzen, crassa, coloris obscuri, nec clara sicut Riachina, & vilior. Sequitur Camphora de Carial, fusca, vilioris etiam pretij quàm Riachina. Deinde Camphora Halonichi, fragmenta ligni admixta habens, pinguis, gummosa, ad suffitus vtilis cum Costo, Myrrha & Thure in templis. Omnes hæ species, inquit, clarificantur per sublimationem, & ex his prodit Camphora alba in laminis, figura paropsidum, & vocatur Camphora operata. Hæc ex Serapione. Auicennæ species Camphoræ sunt, Alkanuri, & Ariagie, deinde Alzeid, & Alefcek: & est alba quæ permixta est cum ligno suo. Quidam autem dixerunt quod est arbor magna, faciens vmbra multitudini animalium valde numerosæ, sub qua vmbra consueuerunt habitare aluener, seu aluemer (lupos ceruarios Bellunenſis interpretatur) & non peruenitur ad ipsam arborem nisi in tempore noto anni. Lignum eius sæpius se vidisse ait, quod est album, frangibile, leue, in cuius cavitatibus quandoque continetur aliquid de vestigiis Camphoræ. Hæc ferè Auicenna. Sed de hac tota re multò certius & enucleatius scripsit Garcias. Ac primum *Capur* seu *Casur* ab omnibus Arabibus nominari, quia apud eos literæ p, & f, magnam habeant affinitatem. Quod si à quibusdam aliis alia imponantur nomina, aut mendosa esse exemplaria, aut auctores ipsos ea in re deceptos fuisse censet. Præterea nomina locorum in quibus Auicenna &

Nomina

Cap. 144.  
simpl.

Cap.

Lib. 2. c. 133.

Lib. Aro.  
mat. Ind. 1.  
cap. 9.



*Loc.* Serapio nasci tradunt, magna ex parte corrupta esse. Nam ea, quam de Panzor vocat, est de Pacen in Samatra insula. Pro regione Calca ex qua aduehitur, è Malaca dicere debet, quoniam in Bairros loco Malacæ vicino nascitur. Ea, quam Auicenna de Alfaz appellat, de Sondā esse potest, inquit Garcias, quæ est insula Malacæ vicina. In nostris tamen Auicennæ exemplaribus nō legimus Camphorā de Alfaz, sed Alkanfari, Ariogia, deinde Alzeid & Alefchek, vt supra diximus.

*ne* Est autem Caphura nobile medicamentum, veteribus Græcis ignotum, & solis Arabibus acceptum ferendum, gummi quod in medullium ligni cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id in aliquot lignis se vidisse Garcias affirmat. Principio verò exudat admodum candida, sine vllis rubentibus, aut nigricantibus maculis, non autem organis elicitur, neque ad candorem conciliandum decoquitur, vt Auicenna & Serapio tradidē. Duorum est generum, Caphura de Burneo, & quæ ex China defertur. Caphura de Burneo nunquam ad nostras vsque regiones penetrauit: nec id mirum, inquit Garcias, quia huius libra tanti emitur, quanti centum libræ eius quæ ex China est, quæ secundū est genus, quæ in Europam defertur in panes orbiculares coagmentata, diametri quinque digitorū: quæ cum coagmentata sit, compositum medicamentum, nō simplex, videtur. Caphuræ de Burneo, quæ magnitudine est Milij, aut paulò maior, genera quatuor faciunt Gentiles, Baneanæ, & Arabes qui eam emunt. Nam diuidunt in caput, in pectus, in crura & pedes. Eius quæ ex capite est libra vānit Pardan octoginta. (Est autem Pardan moneta aurea apud Indos genus, quod cō facit decem regales Castellanos.) Quæ ex pectore, aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor, aut summum quinque. Nonnulli curiosiores quatuor instrumenta cuprea sumunt, inæqualibus foraminibus pertusa, per quæ Caphurā transmittunt. Ea quæ per instrumentum maiora foramina continens transmittitur, suum habet pretium, quæ per instrumentum mediocrium foraminum, aliud: sic de cæteris intellige. Multa nascitur Caphura in Burneo, Samatra & Pacen. Quæ ex Burneo adfertur, plerumq; admixta habet lapidum fragmenta, aut gummi quoddā Chonidetos illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdā scobem. Sed maleficiū deprehenditur facile, nullamq; aliam adulterationē nouit Garcias. Nam si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videatur, id ex sordidatū & impuratū manuum contrectatione, aut ex madore contrahi affirmat. Sed facile à Baneanis id vitium emendatur. Nam in panno lineo colligatam, in calidam aquam clam demittunt, additis saponē & Limonum succo: deinde probe elotam in vmbra siccant, sic multò candidior redditur, pondere non multum imminuto. Id ab amico Baneanē fieri vidit Garcias, qui & hoc arcanū docuit. A viris fide dignis sibi relatum fuisse idem Garcias narrat, Caphurā arborem Nuci iuglandi similem esse, folijs tamen candidatibus, Salignis similibus, fructum & florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse vt vtrumque ferat. Illud autem certò se scire, materiem esse cinerei coloris, Faginæ ferè similem, interdum nigriorem, nec eam quidem leuem, aut fungosam, vt ait Auicenna (nisi fortè caducā, aut emortuā viderit) sed mediocriter solidam. Addūt pleriq; vastam & præaltam esse arborem, latissimè sese fundentem, aspectu perpulchrā. Fabulosum est quod ad eius vmbriam omne animalijū genus cōfugere aiunt, vt ferociora animalia deuinent: item quod scribit Serapio largioris huius prouetus augurium esse, cum frequentibus fulgeris cælū coruscat, aut crebro tonitru cōstrepit. Nam cū Samatra insula (quā nonnulli Taprobanā putāt) & circumiacentia loca lineæ Equinoctiali vicina sint, multis tonitribus subiecta sint necesse est, eamq; ob causam singulis diebus imbres, aut leues pluias habēt. Quare singulis annis Caphura abundare debebant. Ex quibus perspicuum est tonitru largioris Caphuræ prouetus causam, aut indicium non esse.

*Forma.*



esse. Nonnullis Caphura ex China composita videtur ex eius parte quæ ex Burneo adfertur. Affirmarunt præterea Garciae panes illos orbiculares qui ex China deferuntur compositos esse, quoniam Caphura de Burneo in Chinam deferretur, incolis expetita, vt eam alteri viliori permisceant. Cui opinioni suffragantur Baneanæ de Cambaya, qui pro arcano dicunt deficiente Caphura de Burneo, solere se eius exigua quantitate cum multa Chinenſi commiscere, eamque falso de Burneo nancupare. Addunt item isti Baneanæ Chinenſem Caphuram compositum esse medicamentum, quod tempore euaporet & corrumpatur, Caphura verò de Burneo minimè. Garciae verò compositum medicamentum non videtur, nisi ex duobus Caphuræ generibus constare dicamus. Quod Ruellius & Matthiolus Lib. 1. c. 26. Serapionem secuti tradunt Caphuram cæteris bonitate præstare quæ à Rege Riach, qui primus eius dealbandæ rationem adinuenit, Riachina dicta est, vix credit Garciae, quia India Reges potentiores sunt, quàm vt huiusmodi mangonio operam dare velint. Rhafis Caphuram frigidam & humidam esse, Auicenna & Serapio, quos plerique sequuntur, frigidam & siccam ordine tertio constituunt. Cum tamen in aquam coniecta flagret, cum sit odorata & tenuium partium, calida videtur ac incidens. In qua etiam sententia se aliquando fuisse ait Garciae, Sed cum experimento didicisset, ophthalmiis & oculorum inflammationibus, atque etiam ambustis impositam non minùs quàm niuem refrigerare, sententiam retractare coactus est. Adde quòd omnes apud quos nascitur frigidam esse asserunt. Neque verò huic sententiæ repugnat, quòd odorata sit, quia ob tenuitatem partium faciliè exhalat odor qui in superficie est. Potest & interdum factitia esse quæ ad nos adfertur, arte & mangonio caliditatem aliquam acquirens. Genuina autem capitis dolores à calore prouenientes illita mulcet, incandescentes inflammationes restinguit, præsertim iocinoris. Circumlitionibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas vulnerum & vlcèrum inflammationes, crysipelata extinguit, aduersus gonorrhœam & albas vuluæ fluxiones efficax est, cum Succino & aqua Nymphaeæ hausta. Idem præstat pubi, testibus & renibus illita, priùs seminis Psyllij spissamēto, vel Omphacio, vel Solani succo probè macerata. Sanguinem è naribus fluentem sistit, aut cum semine Vrticæ immissa, aut cum maioris Sedi & Plantaginis succo fronti circumlita. Collyriis ad calidas oculorum lippitudines vtiliter imponitur. Renibus ac testibus illita venerem extinguit. Scribit Auicenna Caphuram vigilias excitare. Qui autem id fieri potest cum frigida sit ipsius etiam testimonio, & frigida somnum accersant? Somnum certè inducere ait Garciae, foris & intus exigua quantitate vsurpatam. Si quis verò sæpius odoretur, & naribus admoneat, cerebrum exsiccet & vigilias inducere potest. Magni est vsus his in regionibus in quibus nascitur multis in rebus, tum etiam in cibis. Legitimæ probationem hanc esse ait Ruellius. In calido pane ponatur, si humore madeat, sinceræ est argumentum, contrà si perareſcat indita, spuria ac fictitia certitudo est. Nisi diligenter asseruetur in operculatis etiam capsulis nonnunquam euanescit. Turò asseruatur in vase marmoreo aut alabastrino, Lini & Psyllij semine sepulta. Venerias Caphuram omnem eundem important, ibique arte, igne scilicet & vitreis organis elaboratur, vt candescat atque pelluceat.



**I**N Florida Noui orbis prouinci a Galli paucos ante annos ligni cuiusdam facultates admirabiles aduersus varios morbos experti fuerant, quas ab eius regionis incolis didicerant. Hos cum profligassent Hispani, & in similes morbos incidissent, ob prauum succi alimenta, aquarum insalubrium potationes, sub dio dormitiones, à quibusdam qui illic remanserant Gallis illius ligni virtutes edocti, eo vsi sunt, & sanitati restituti. Ob id recens in Hispaniam inuehitur, de quo Nicolaus Monard. hæc ferè tradit. Arbor hæc ab Indis *Pauame* nominatur, à Gallis, quos imitati sunt Hispani, *nescio quam ob causam*

*Nomina*  
*Forma.*

*SASSAFRAS arbor,*  
*Monard.*



*Sassafras.* Arbor est magna, Pini mediocri magnitudine & forma (tamen si minores inueniantur) vnicò trunco nudo: ramis in cacumine expansis, quales habet Pinus repurgata: cortice, quem integit cinerea quadam pellis ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acrised aromatico, nonnihil ad fœniculi saporè accedente, odorato, ita vt parua eius quantitas cubiculum suo odore compleat: materie trunci & ramorum alba, ad cinereum colorem vergente, nõ ad eò aromatici saporis & odoris vt cortex: folio ficulneo, in tres angulos desinente, nouello verò folio Pyri folium æmulante, sed quòd vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, nouellis foliis semper iis quæ decidunt succedentibus, colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit. An florem habeat, adhuc incompertum. Radicibus nunc nunc crassis, nunc tenuibus pro arboris magnitudine, lauibis, sed non ad eò vt lignum, per summa cespitem vagantibus, vt facile euelli possint, quod ferè commune est omnibus arboribus Indicis (imò referunt Hispanicarum arbores

eò translatas steriles fieri nisi in summa terra pangantur.) Cortex radici firmus inheret cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, idèoque radicis decoctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis istic vsurpatur. Nascitur in maritimis, & locis temperatis, hoc est, neque nimium siccis, neq; nimium humidis, vt in portubus S. Helenæ, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridâ haud facile inuenias. Istic verò sunt integræ siluæ, quæ ob suauissimum què spirant odorem, ab Hispanis eò primùm venientibus, arborum Canellæ esse existimabatur, nec immeritò: nam ad eò odoratus est & acris huius arboris, atq; Canellæ cortex, & eosdem effectus præbet, quos Canellæ decoctum. Omnium optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfertur. Arboris & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquantò calidior, ad initium tertij gradus in calore & siccitate accedens. Quibusdam calidus videtur in fine primi gradus, siccus in tertio. Eius decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus interinis roborandis ad tertianas febres & antiquas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitii ex frigidityte ortis, doloribus nephriticis & renum, è quibus calculos eiicit, & flatus discutit: quam etiam ob causam

*Electio.*

*Temper.*

*Vires.*



sem utrum ad conceptionem preparat, & menses ciet. Vomitus inhibet, concoctionem inuat, aluumque subducit. Decocti verò preparandi hæc est ratio. Radicis cum suo cortice assulatim confractæ vncia dimidia in tribus aquæ sextariis, fictili nouo duodecim horas maceratur, lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur, colatur, & fictili vitrato asseruatur. Postmodum iisdem fragmentis tantundem aquæ superinfunditur, decoquitur ad dimidij sextarij consumptionem. Illud verò obseruandum est plus aut minus ligni in decoctionem iniciendum pro morbi magnitudine, viribus & temperamento ægrorum: minor enim quantitate & minus cocta propinatur decocti aqua biliosis quàm pituitosis. Sed frequentius & vulgò quarta sextarij pars decocti prioris tepidi sumitur manè: deinde sudatur, vestis mutatur, nec quisquam eorum qui medicamentum hoc sumplere lecto se continere cogitur. Prandium sit media gallina assa cum aliquot vuis passis & amygdalis. Cœna sit è conseruis conuenientibus morbo qui curatur: potus secundum decoctum. Hoc sic propinatum asserit Nicolaus Monard. se singulari experimento compertum habuisse, vtilissimum iis esse qui pedes & manus ex podagra & chiragra sic contortos habent, vt iis vti non possint. Ad luum item venerem non minus vtile quàm Guayaci aut Chinæ decoctum. Qui tam exquisita victus ratione vti nollent, aquâ simplicem hac ratione decoquunt. Ligni assulatim confracti semuncia plus aut minus pro conditionibus iam enumeratis, in tribus aquæ sextariis coquitur ad dimidias, ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cœna, & interdiu. Qui vino abstinere non norunt, eadem aqua id diluant: etenim saporis & odoris gratiam vino conciliabit. Ligni huius fragrantiam assidue gestare & odorari maximè prodest aduersus pestis contagia, non neglectis alijs remedijs. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, remedium est excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absu- mit. Sed iis qui extenuati sunt & imbecilles non conuenit. Eiusdem fragmentum præmansum eo dente qui dolet, & istic retentum, dolorem sedat. Porro supradictus ligni & corticis vsus in medicinis duntaxat receptus sit, Indi tamen recentia folia trita vulneribus imponunt, & sicca ad alios vsus medicos seruant.

*MOLLE, Arbor.*



*MOLLE. CAP. XXI.*



**R**BORIS in Peru nascentis, quam vocant Molle, plantas duas è semine natas vidit Clusius ante aliquot annos Mechliniæ, quarum historia hanc tradit. Erant, inquit, ea arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folijs pœnatis vt Fraxini, sed multò minoribus, ex viridi nigricantibus, serratis, & sub extremum angustioribus, ab arbusculis reuulsa lacteo succo, eoque lento & viscido & odorato manabant, & ipsa folia trita Fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis non nihil habere videbantur. Fructus ex quo nata sunt, Piperis ferè est magnitudine, oleaginosus, pellicula rubescens tectus, racematim coharens, vt ex eius icone hic expressa perspicere licet.

*Forma.*

Quem



*Locus.*

Quem florem habeat adhuc incertum, nisi quod tradunt quidam minutum esse, Viti similem. Hæc arbor copiosè nascitur in conuallibus & locis planis Peruang regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt, sed Petrus Cieca maximè, qui eius historiam hoc modo exponit prima parte Chronici. Toto hoc tractu conspiciuntur magnæ, quædam etiam parvæ arbores, quas *Molle* appellant incolæ. Folia habent minuta, odore Fœniculi, cortice adeò commendato, vt eius decocto crurum dolores & inflammationes summa cum vtilitate foneantur. Ex ramulis fiunt dentiscalpia vtilissima. Ex eius fructu cum aqua cocto pro cocturæ modo fit vinum, siue potio admodum bona, aut acetum aut mel: tantoque in pretio sunt apud Indos hæ arbores, vt quibusdam locis eas consecratas suis idolis habeant. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causâ ortis auxilio esse, gummi verò eius, quod mumiz modo candidum est, lacte dissolutum oculorum caliginem abstergere.

## LIGNVM AROMATICVM, LIGNVM

*ad Nephritidem.*

CAP. XXII.



SCRIBIT Nicolaus Monard. ligni cuiusdam fragmentum sibi à Bernardino de Burgo pharmacopola fuisse ostensum, Ligno sancto ferè simile, cuius corticis sapor & odor adeò aromaticus est & excellens, vt Nucem myristicam longè superet, imò Canellam odoris suauitate, Piper acrimonia. Magna huius ligni quantitas in monte quodam celsa fuerat & in nauim delata ignis struendi gratia. Vnde perspicere licet quàm multæ arbores & aliæ plantæ in Indiis inueniantur insigni facultate præditæ, cum ignis accendendi causâ tam odoratis & aromaticis lignis vtantur, quorum cortice in puluerem redacto cor & ventriculus roborari, reliquaque membra foueri possint, & aromatum ex Moluccis insulis, Arabiâque & Perside vsque petitorum vires supplere. Mittit etiam noua Hispania aliud quoddam ligni genus crassum & enode, materia Pyri, cuius vsus iam diu receptus fuit in his regionibus ad renu vitia, vrinæ difficultates & incommoda. Postea experimento compertum est eius aquam in iecoris aut lienis obstructionibus vtilem esse. Fit autem hoc modo. Lignum assulatim & minutim concisum in optima & limpidissima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post iniectum lignum aqua cæruleum dilutiorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tametsi lignum candidum sit. Id adulteratur ligno illi simili, quod aquâ croceo colore inficit. Hac aqua qui assidue vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus sine vlla humorum commotione, neque alia opus est victus ratione quàm temperata: aquæ enim sapor non magis immutatur ligni iniectione quàm si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

## FRVCTVS ET CORTEX AD

*Dysenteriam.*

CAP. XXIII.



ARRAT item Nicolaus Monard. ab adolescente quodam Hispano delatum ex Quito prouincia fructum, qui vt ex eius fragmentis (quæ altera parte læuia erant, & lutei coloris, altera aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) conicere licebat, ex magna quâdam arbore natus videbatur. Is ad dysenteriam mirum in modum confert. Quod experimento comprobatum vidit in puella quæ dysenteria miserè torquebatur, cui




cui adolefcens ille fragmentorum eius fructus tenuiffimè tritorum puluerem ex fallatio calicū rofarum liquore hauriendum dedit vefpere, tantundem pofteri diē manē, ftatimq; filii exepit fluxus, ita vt breui puella fanitati reftituta fit. Quis autem effer hic fructus, aut ex qua arbore nafceretur Nicol. Monard. feire non potuit. Idem refert ih Nouo orbe prægrandem arborem foliis cordis effigie, nullo fructu prouenire. Eius corticem digiti craffitudine, aut ampliorem, folidum, durum & ponderofum tenui, candicante pellicula contegi. Is fimilis admodum eft cortici Guayaci, vri Gentiana amarus, adftrictionis, & grati feu aromatici cuiufdam faporis particeps. Magno eft apud Indos in pretio, vt qui eo vtantur aduerfus omnis generis alui profluuii, eius puluerem drachmæ pondere, aut paulò amplius manē propinantes ex aqua conueniente, aut vino craffo & rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obferuatūque in reliquis victus ratio, quæ cuiusmodi morbo neceffaria eft. Eius corticis fragmenti periculum iam bis feciffe af firmat in alui profluuiis inueteratis, magno fuccelfu.

FRUCTVS CHOLAGOGVS, AVELLANAE, *Bilem Juuens*  
 Nuclei pini cathartici. CAP. XXIIII.

**R** VCTVS quidam ex maritimis Nicaragua & Nata (quæ funt in No ui orbis continenti) inuehitur in Hispaniam auctore Nicolao Mo nard. qui ex quadam vafte arbore nafcitur, Caftanæ fimilis, fed cali ce læui, non vt illarum echinato. Eo calice fructus continetur Cafta neis non multum abfimilis, fed fine cortice, & ferè quadratus, in duas partes diui fus, medium intercurfante, & totum deinde ambiente pellicula. Editur hic fructus viridis, aut contufus vino exceptus, fi ficcus, eius puluis ex vino aut gallinæ iufcu lo fumitur: datur etiam toftus vt minus purget. Quocunq; tandem modo fum ptus fine moleftia purgat, obferuatis iis quæ à purgandis obferuari folent, & præ paratis humoribus. Illud verò minimè fílentio prætereundum, pelliculam illam exteriorem & internam abiiciendam effer, alioqui grauiâ fymptomata excitaturam, veluti magnos vomitus, animi deliquia, & periculofa profluuiâ. Calidus eft in primo gradu. Narrat idem Nicol. Monard. Nouo orbe primùm inuento infulam

AVELLANAE  
 purgatices.



D. Dominici quoddam Auellandarum genus mittere, quo fe Indi familiariter purgabant: poftea Hi spanos neceffitate compulfos iifdem fe fe purgare cœpiſſe, non fine vitæ difcrimine. Colore & for ma noftris Auellanis fimiles funt, putamine tenui, coloris fpadicei, triangulares, medulla interiore alba & dulci, fic vt multi dulcedine allekti decepti fuerint. Medicorū vulgus eas Ben magnū vocat, paruum autem quod Ciceris eft magnitudine, ex quo Itali oleum odoratū conficiunt, quod Oleum

*Vires &  
 Temper.*

de Ben nuncupant. Validiffimè pituitam & bilem fupernè & infernè purgant. Nonnulli tamen eorum vehementiam affatione infringe bāt. Coli doloribus præ ſens funt remedium, ftatus difcutiunt, & enematibus iniecta mediocriter euacuāt. Doſis eft à dimidia drachma ad drachmam vnam: fed affandæ funt. Calidi funt temperamenti initio tertij gradus, & ficci in ſecundo. Auellanas has fe vidiffe ait Cluſius. Caterum hanc, cuius iconem hic exhibemus ex Cluſio, lentus & mollis integrit cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc fequitur pu tamen minus folidum quàm in vulgaribus Auellanis, id nucleum continet Auel lane magnitudine, candidum, folidum, Auellanae vulgaris aut iligna glandis fa pore,



pore, tenui membrana obductum. Integra nux altera parte sessilis est & coniunctim binæ nasci videntur, vt interdum castanæ. Transmittit etiam noua Hispania, vt idem Nicolaus refert, Pineorum nucleorum genus, quo Indi se purgant, quos imitati sunt plurimi Hispani. Nostris Pineis nucleis similes sunt, nascentes in strobilis magnis, quales sunt Mayzi spicæ muticæ, molliori putamine, & nigriore quàm nostri, rotundi, intus albi, pingues, & gustu dulces. Bilem, pituitam & aquas valenter admodum purgant, & licet auellanis mitiores, attamen vomitum cient, atque ventrem subducunt. Assi neque tam valenter, neque cum tantis torminibus purgant. Peculiari quadam facultate crassos humores expellunt. Quinque aut sex triti & vino diluti dantur pro virium robore, euacuando humore conuenientibus syrupis præparato, & recta victus ratione obseruata. Calidi in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam præditi quæ siccitatem imminuit.

Pinei nucleis cathartici.

Forma.

Vires.

Temper.

### RICINVS AMERICVS. CAP. XXV.

Forma.



**R**ICINI genus ex America delatum pinxit Clusius, nostrate paulò maius, cuius siliqua triângula quæ semina continet tuberculis asperis caret, lauisque est & cinerei coloris. Ipsum semen nostrati simile, nigrum tamen & non maculosum, Curcas ab incolis nuncupatum. Arbor quoque nostrati similis, nisi ob soli vbertatem in maiorem altitudinem ex

Vires.

*RICINVS Americus.*



crederet. Semen tanta purgandi facultate præditum esse referebat qui Clusio dabat, vt dimidia tantum grani vnus pars sumpta valenter supernè & infernè humores pellat. Ex eodem oleum elici tradit Nicolaus Monard. quod Oleum ficus inferorum Hispani vocant, quia Ricinus Hispanis *Figueira de l'inferno*, id est, Ficus inferorum nominatur. Semine trito & in aqua decocto innatans oleum cochleari colligitur, qui solus modus olei parandi Americis notus est, alios non didicerunt. Duros tumores mollit, discutit. Sanat dolores à frigidis humoribus & flatibus exortos, præsertim ven

tris: ac ideò Anasarcam & Tympanitem curat inuncto ventre, aut tribus vel quatuor guttis sumptum ex vino, aut infuso mixtum. Aquas enim ducit, flatu discutit, pituitam crassam purgat. Doloribus colicis & ilei medetur sumptum, illitum, iniectum clystere. Articulorum morbis à causa non admodum calida natis auxiliatur. Contractos artus molliter distendit. Aurium doloribus confert. Infancium aluum subducit, pube inuncta: lumbricos necat ac eiicit, maxime si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure propinetur. Ad psoras & capitis vlcera manantia valet. Calidum est initio tertij gradus, humidum secundo.

### LAC PINIPINICHI. CAP. XXVI.

Vires.



**L**N omnibus continentiæ oris Noui orbis, vt refert Nicolaus Monard. lacteus quidam succus elicitur ex arbuscula Mali similitudine, quem Indi Pinipinichi vocant: ex cuius ramis recisus lacteus is humor statim manat, aliquatulum densus & viscosus, cuius tres aut quatuor gutta sumpta validissimè per aluum purgant bilem & aquas. Bibitur è vino, aut eius deficcati puluis deglutitur pauca quantitate propter nimiam vehementiam. Illud autem peculiare habet, quod si quis eo sumpto, iusculum, vinum, aut aliud quid iniiciat, subito eius facultas infringitur & cessat. Calidus & siccus est liquor in secundo gradu.

Temper.

COPAL.



**D**Vo resinarum genera multum similia, teste etiam Nicolao Monard. ex Hispania noua afferuntur, quorum vnum Copal vocatur, alterum Anime. Copal resina est admodum candida, splendida, pellucida, magnis offis, Citri conditi & clari similibus, mediocriter suavis. Eam Americi in sacrificiis thuris vice adolebant. Vtilis est ad suffitus in frigidis capitis morbis. Calida ordine secundo, humida primo. Discutit ac emollit. Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit. Vnum rugosum, quod Xolochcolpali vocari dixit, molle, thuri simile. Alterum multum praestantius Copalcahuatl, quod plerique Myrrham existimant. Vulnerata arbore guttatim stillat liquor albus, qui statim concreuit. Anime arboris praegrandis est resina candida, ad thuris colorem nonnihil vergens, magis oleosa quam Copal, granis siue guttis thuri similibus, grandioribus, quae fracta luteum colorem ostendunt resinae modo, & iucundissimum odorem spirant, & accensa facile liquefunt ac consumuntur. Est alia Anime resina orientalis, auctore Garcia, quam Lusitani ex Aethiopia Arabiae finitima in Europam deferunt. Candidior est & nitidior occidentali, magnis item offis adfertur, pellucidis, ita ut nonnulli Carabe seu Succini speciem esse suspicati sint, e quo spherulae precatoriae tornantur. Sed ij vehementer errant. Garcias hanc resinam orientalem, Cancamum Graecorum esse putat. Qua in re Amati Lusitani sententiam secutus videtur in commentariis in Dioscoridem capite de Cancamo, sic scribentis. Est igitur Cancamum gummi quoddam, quod ex Guinea, Minae, Africave, & insulis illi circumiacentibus Lusitani nostri adferunt, Animum appellantes: decidit enim gummi hoc, ut testantur illi, ex proceris arboribus, foeta Myrti habetibus, quod album reperitur, & aliud subnigrum Myrrhae quodammodo per simile, odoratum, quod Dioscorides illis de causis inter Myrrhae species tanquam improbam commemorat, & Minam a terra, vnde praecipue nascitur, eam appellat: quanquam Serapio Aminam nominet, vnde Lusitani corrupta voce pro Minam vel Aminam Animum vocent, & eo mulieres maxime in suffitibus, & Medici contra dolores a frigiditate ortos praecipue vtuntur. Id vero primus asseruit Brisotus Gallus, vir magna eruditione praeditus, qui quum apud Lusitanos ageret, ut inde ad Indos cognoscendarum rerum nouarum cupidus nauigaret, gummi hoc vidit, quod Cancamum esse dixit. Quare cum Cancamo opus fuerit, Lusitanorum Animo vtetur. Idem Amatus capite de Myrrha, Myrrha vel Minam vel Aminam dicta, inquit, hodie quoque in Lusitania, & vniuersa Hispania paucis mutatis literis habetur, ut capite de Cancamo diximus, gummi scilicet Animum appellantes: cuius duo genera habentur, album & nigrum, album Cancamum esse ex Brisotto didicimus, nigrum vero, Minam hanc Dioscoridis Myrrham esse, quae ex proceris arboribus decidit, nullo cogente artifice, aut vulnere in arbore facto. Clusius gummi illius quod Anime vocant, & Lusitanorum nauigationibus in Europam adfertur, tria inueniri genera scribit. Primum fuluescit, & pellucidum est, nobilissimumque; illud succinum crudum emulatur. Hoc Cancamum esse Amatus a Brisotto Gallo edoctus contendit. Alterum genus nigricat, & fere taurino glutinosis simile est, siue illi resina quam Officina Colophonia vocant. Id Amatus Myrrham Aminam Dioscoridis esse vult. Tertium genus pallidum est, & resinaceum, acerrimumque. Omnia vero iucundum in suffitibus odorem spirant, idemque adferunt temperamentum sortita. Posteriora duo degustata magis ficare & amare deprehenduntur. Haec Clusius. Sunt qui Anime verum Bdellium esse putant, ob multas quas habet cum Bdellij historia notas communes, de quibus suo loco diximus. Anime Americum siue nouae Hispaniae colligitur, auctore Nicolao

Vires.

Temper.

Genera.

Lib. i. Aro.  
mar. Ind.  
cap. 8.

Myrrham Animum

Cancamum

In schol. in  
lib. i. Aro.  
Ind. Histo-  
ria.



Monard. ex arboribus mediocris altitudinis vulneratis, non aliter quàm thus ac mastiche. Valet ad suffitus in dolore capitis à frigido, & defluxionibus post purgationes: aëris vitia corrigit, suffitu caput roborat. Miscetur emplastris & ceratis, quæ frigidus humores & flatus discutunt, ac roborant: imponitur capiti & cerebro inualidis, item nervosis partibus. Idem temperamentum quod & Copal. Hoc Anime occidentale Arabinam Myrrham esse putat Hermolaus.

## TACAMAHACA. CAP. XXVIII.

Forma.

Vires.

Temper.

**D**E FERTVR item ex noua Hispania, vt scribit Nicolaus Monard. aliud gummi siue resinæ genus, ab incolis *Tacamahaca* vocatum, quod nomen Hispani retinuerunt. Resina est proceræ arboris Populo similis, quæ fructum gerit similem Pæoniae granis. Elicitur arbore lauciata. Colore est Galbani (nec desunt qui idem esse putant) frustulis tamen quibusdam albis vt in ammoniaco, odoris saporisque ingrati. Suffitu vtero strangulatas mulieres reuocat: umbilico imposita vterum ad suam sedem redire cogit, ventriculum roborat. Ad hos vsus totam ferè mulieres absument. Illita sic adhæret, vt non nisi euasida cùm effectum suum præstiterit excidat. Coquit & discutit mirificè aggritudines ex flatu & succis frigidis natos. Fluxiones sistit: nervorum vuneribus medetur. Denique ad quosvis sedandos dolores nullum aliud præsentius remedium, si ab inflammationibus admodum calidis non oriantur. Sed & iis admodum utilis est in morbi declinatione, ad discutendum qui superest humorem. Callacit in principio tertij gradus, siccat secundo. Præterea vim satis adstringentem obtinet.

## CARAGNA.

## CAP. XXIX.

Forma.

Vires.

Temper.

**E**X continentis parte interiore, per Carthaginem & Nomen Dei Americae provincias deferri scripsit Nicolaus Monard. resinam coloris Tacamahaca, odorisque eiusdem, sed grauioris. Est & liquidior, glutinosior, splendidior, magis oleosa. Lingua Indica *Caragna* vocatur, quod nomen etiam Hispani adhuc seruant. Prodest ad omnia ad quæ Tacamahaca, sed effectum celeriore & certiore. Temperamenti est calidioris. Vulnerata arbore colligitur superiorum modo. Ex eadem Carthagine Noui orbis provincia allatam fuisse ait Caragnam quandam puriorem, & Balsami modo limpidam, superiore multo præstantiorem, viliorem & odoratiorem.

## LIQVIDAMBAR, ET EIVS

## Oleum. CAP. XXX.

Forma.

Vires.

**R**ESINAM odoratam Liquidambar ad nos ex Hispania noua adferri referunt Nicolaus Monard. & Historiæ Mexicanae auctor. Manac ex incisa vasta arbore, quam Americi vocant *Ocoçol*. Huic folium est hederæ, cortex crassus, cinereus, quo secto aut ex cauato Liquidambar hinc. Indigenæ huic corticem contractum admiscunt, quoniam ita suauiores odorem mittit dum vritur. Odor styracis, qui celari non potest, præsertim vbi magna est Liquidambar copia, quoniam in ædes ac vias propinquas latissime diffinitur. Ex ea resina recenti ac pingui in humido loco reposita stillat sponte Oleum pretiosissimum ob maximam odoris iucunditatem. Quidam machinis exprimunt, vt manicis inficiendis vnguentariis vendant. Sed id bonitate ac pretio longè inferius est. Vt præstantissima quæque fraude hominum adulterantur & interpellantur: quidam quæstus causa ex ramis arborum concisis, & in aqua feruefactis Liquidambar innotantem colligunt, altera longè deteriore. Liquidambar



dambar frigidis omnibus morbis opitulatur. Eadem vis & olei sui, sed cum maiore partium tenuitate. Calfacit propemodum tertio gradu.

Temp.

## GUMMI AD PODAGRAM, SVLPVR

Quitensc. CAP. XXXI.

**R**EFERT Nicolaus Monard. se ab Episcopo Carthaginensi dono accepisse gummi genus quoddam (cuius arborem describere non poterat) ex continenti Noui orbis delatum, quo se istic podagrici purgant hoc modo. Istius gummi fragmentum Nucis Ponticæ magnitudine stillatio aquæ liquore totam noctem macerant, postridie manè percolant & exprimunt, eam aquam ad duas uncias hauriunt, neque quicquam cibi sumunt ante meridiem. Eo medicamento purgatur humor qui podagram creat sine molestia. Insuper est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu. Mittit Quitensc. *Vires.* pro uincia Peruana Sulphur viuum præstantissimum, vitri modo pellucidum, colore auri purissimi, cuius fragmentum pusillum lucernæ admotum odorem maximum sulphuris eiacular, fumo viridi permixtum, sed antequam incendatur nullum sulphuris odorem præbet. Huius puluis vino dissolutus, & per aliquot dies vespere faciei illitus (purgato prius corpore) inflammationes curat, scabiem delet oleo rosaceo mixtus. Drachmæ pondere cum oui luteo sumptus, coli doloribus, nephritidi, neruorumque contractionibus & ictero utilis est. Calidum & siccum esse hoc sulphur summo excessu ait Nicolaus Monard. Quare mirum non sine causa videatur eo inflammationes curari. Ex Nicaragua aliud sulphuris genus aduehi idem scribit, colore cinereo, densum, minimè transparens, nihilque cum alio commune habens præter odorem.

## RESINA ABIEGNA INDICA.

Resina Carthaginensis. CAP. XXXII.

**R**EX NOVI orbis continenti etiam asportari tradit Nicolaus Monard. liquorem siue resinam, quam abiegnam vocant, ex arboribus spuris quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt, sed Pino altiores sunt, & Cupressi modo rectæ. In harum arborum cacumine vesiculæ quædam enascuntur nunc magnæ, nunc parvæ, quibus contractis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia ut multi exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant. Ad eadem omnia, ad quæ Balsamo vtuntur: nam vulnera optimè curat, dolores ex materia frigida & flatulenta progenitos mitigat. Item utilis est stomachi vitis ab humore frigido aut flatibus sumpta ex modico vino albo, ut in Balsamo dictum est. Idem Nicolaus Monard. auctor est, nunc etiam mitti à Carthagine Noui orbis provincia, resinam quandam purissimam & odoratissimam, abieгна aut Terebinthina Venera multo præstantiorem, iisdem facultatibus seu maioribus præditam quàm sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit vtiliter iniici neruorum, articulorum pedumque vulneribus, & antiquis vlceribus: magno etiam commode ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt.



Lib. 2. Am.  
Indic. hi-  
stor. cap. 21.

**S**CRIBIT Garcias Mungo semen esse viride, quod per maturita-  
tem fit nigrum, Coriandri sicci magnitudine, pabulum equorum,  
interdum etiam hominum. Guzarate & Decan incolæ in febribus  
hoc modo vtuntur. Febricitans decem, nonnunquam quindecim  
dies cibo abstinere, post quos huius fructus decoctum illi propinatur, in quo non-  
nihil pulpæ remanserit: deinde cortice delibratum Mungo, & Orizæ modo co-  
ctum febricitanti exhibent: panem verò triticeum non nisi post multos dies: non  
quod frumento careant hæ provincie, nam etiam si non stercorentur & colan-  
tur agri, sed superficie tenus duntaxat arentur, nativæ suæ pinguedine & vberitate  
etiam interdum sine pluvia frumentum mense Nouembri sibi creditum, medio  
Ianuario maturum & colligendum exhibent. Nasci etiam ferunt hoc Mungo in


— Lib. 2. c. 488.

Lib. 1. fen.  
3. cap. 7.

Cap. 116.  
simpl.


Palæstina, cuiusque Auicennam meminisse, & vocasse Mese, Bellunensem inter-  
pretem, Mens. In nostris tamen publicis exemplaribus legimus Meisce, (& Pila in-  
terpretantur) & in margine Mes. Mex autem debere dici ab eruditis Medicis  
Arabibus se didicisse à Garcias. Alio in loco putat Auicennam eius mentionem  
fecisse, vbi prohibet auiculas cum Mex edere: in nostris tamen libris non Mex, sed  
Mest ex aratum est. Et Serapio, Mes, inquit, id est, Robilia est granum paruum si-

**MVNGO** similis  
fructus.



cut Orobus magna, viridis coloris &c. Caterum Mungo  
à Garcia descripto optimè conuenit fructus à Clusio de-  
pictus & hic expressus, nisi calidus esset, Mungo verò frigi-  
dus, quantum ex eius effectu colligere licet. Is fructus omil-  
sus à Valerando Duræo, inquit Clusius, ex Ormuz, exiguus  
Piperis magnitudine, rotundus, striatus, qui Coriandri  
grana ita æmulatur, vt primò intuentibus Coriandrum  
videatur, maius tamen & nigrum: membrana superior  
granum continet nigricans calidi gustus. Præterea ex eodem Clusio pusilli cu-  
iusdam fructus ab Alphonso Pautio Medico Ferrariensi missi iconem hinc exhi-

B V N A.



bemus, quem Buna à nonnullis, ab aliis Elicano  
nominari tradit. Est igitur Buna Fagaræ magni-  
tudine, aut paulò amplior, oblongior plerumque,  
colore ex cinereo nigricante, cortice tenui, & ve-  
luti sulcum quandam per longitudinem vtrin-  
que habente, per quem faciliè in duas æquales  
partes diuiditur, quæ singula grana continent  
oblonga, altera parte plana, fuluescentia, gu-  
stu acido. Aiunt in Alexandria potionem quan-  
dam fieri ex iis, vim refrigerandi non mediocrem  
obtinentem.

T V N A

Buna d. forte  
q. Buna e. u. a. affra  
indica culen  
qm. hinc fructus  
chusos. Aff. illi  
solum p. r. a.  
hinc illi a. g. f. r. u.  
q. g. a. u. e. a. g. g. i.  
in ead. significatione unguet.  
a. g. g. i. d. f. l. e. x. a. b. A. d. o. i. n. n. i. s. f. e. r. e. e. u. n. t. s. i. u. e. r. a. b. l. i. s. B. o. r. n. i. s.






VAE ex Indiis occidentalibus aduecta est tam planta hic appicta, quàm fructus, Tune Indis vocatur & Tunas. In maris Peruani insulis, Hispaniola, & aliis, mirabile folium istud spinosum ruri ac sponte oritur, vnico folio, humi ad medium vsque defosso, productis ex sese radicibus, postea folia supernè ex ipso accrescunt, ex iis alia, ita vt continuata serie

Nomina

Locus.

Forma.

FICVS Indica, siue  
Opuntia.



aliis ex aliis prodeuntibus foliis in arborem accrescat sine cortice, sine ramis. Folia ista crassissima sunt, aliquando pollicis crassitudine, ex quibus albae, tenues, longiusculae, acutaeq; prominent spinæ, ex horum etiam summitatibus fructus, nostratibus Ficubus similes, sed crassiores, qui suprema parte in coronæ speciem defendant, colore ex viridi purpurascens, interiore pulpa Ficubus simili, sed adeo succosa & rubente, vt sanguineo succo Mororum modo manus inficiat, & vrinam cruentam multo esu creet, quod multis tum primùm esitantibus & huius effecti ignatis magno aliquando terrori fuit. Ex Indiis folia permultis in locis Hispaniæ, Galliæ, & Italiæ sata flores & fructus prodixerunt, quales se vidisse & decerpisse, & maturas Ficus esitasse testatur Pena: vnà cum ficuum rudimentis in paruo vmbilico calathi balauitij quadantenus effigie emicare luculentiore magnitudine & luteo colore, Ficus maturas Ficum magnam æquare, spinulis in ambitu horridam, cute purpurascens, succo intus cruento, grauis & pulpa ficulneis, sed gustu insuauiore. Hanc Theophras

Lib. i. hist.

cap. 12.

Lib. 21. c. 17.

Ostocollos

Forma.

Lib. 10. c. 1.

ti & Plinij Opuntiam esse, non sine ratione quis suspicetur. Sic enim Theophrastus. παραπλήσιον δὲ τῷ τῷ, μᾶλλον δὲ τὸ πρὸς τὴν θάλασσαν, ἔστι ἐκ τῶν φύλλων ὁμοιογενὲς. ὅσον φασὶ περιὲς ὅσωντα ποταμὸν εἶναι, ὃ καὶ ἐστὶν ἐν ἡδύ. Id est, Huic (Fico Indica) simile est, vel potius quodammodo mirabilius, si qua ex foliis radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse aiunt, quæ & esu suauius est. Et Plinius, Item circa Opuntem (Opus Locrorum Epicnemiorum oppidum lib. 4. cap. 7.) Opuntia est herba etiam homini dulcis. Mirumque è folio eius radicem fieri, ac sic etiam nasci. In iisdem insulis atque etiam in continenti sponte crescit arbuscula superiori valde cognata, quæ Indis Ferruminatrix vocatur, nobis Opuntia Ostocollos dici potest, quod artuum fracturis & luxationibus mirè proficit. Ramos proferit foliis refertos aspectu deformibus, admodum spissis & spinosis, Tune foliis simillimis, vt describit auctor generalis Indiarum historiae. Rami isti folia primùm fuere, ex singulis singula oriuntur, atque ex his alia, quæ demùm indurantur, & mutuo sibi ipsi succedente foliorum sobole in ramos abeunt, ac tandem arboris magnitudinem adipiscuntur, quæ perpetuò viret, caudice in imo & ramis cineritiis, asperis. Fructum fert superiore minorem & spinosorem, purpureum, viscidum, succum remittentem, & ad inficiendos pannos infecturæ tenacissimæ. Folia spinis exemptis trita, & cataplasmatibus modo imposita fracta ossa mirè glutinant & ferruminant. Sed illa prius locis suis aptissimè repo-




ni ac restitui oportet. Nam admotum cataplasma cum agere in partem cepit, ita parti hæret, ut auulsi perdifficile sit. Ea verò sanata statim sponte ex-  
cidit.

ROSA DE HIERICHO, *Loniceri.*

## CAP. XXXV.

Nomina

Forma.



OSAM de Hiericho, siue Hiericunthis, siue Hiericunthinam vocant ab Hiericunthe Palestine oppido. Monachi & muliercula Rosam Maria. Hanc describit Lonicerus fruticem esse Labrafce similem, sed minorem, venosum, odoratum, ramulis duriusculis, colore subflauo, baccis inter se racematim coherentibus, flore violæ candido. Lonicerus & quidam alij Amomum esse falso crediderunt. Quæ de re paulò post dicemus. Crescit haud ita difficile ex semine recenti, auctore Pena: hærent autem semina parua, complura, racematim vna compacta, glumosa, Sorgi minora, & intra fructis cancellatim reticulatimq; implexi glomum contenta. Hac Rosa vtuntur supersticiose mulierculæ ad partus horam cognoscendam. Nam, vt aiunt, in aquam demissa non prius fatiscit, quàm partus nasci incipiat.

## CANELLA, CASSIA, CINNAMOMVM.

## CAP. XXXVI.

Nomina

*inella vulgo quæ  
est in arbor canis*

*Cassia Cypria.*

*Lib. 1. c. 11.  
& 13.*

*Cap. 91.  
simpl.*



VAL. GRÆCIS καϊα & εὐδοκασία nominatur, Latinis Cassia & Canella lignea, Arabibus Selicha, Seliche, siue Selihacha, Italis Canella, Hispanis Canela, Gallis Canelle, Germanis Zimmet, seu Zimmet roezlin. Cassiam autem Erymologicum dici vult παρὰ τὸ καίειν, quasi καυσίαν, ἢ καυσίαν, ἢ καυσίαν. Quod verò Græci καϊναιόμωμον, Latini quoque Cinnamomum dicunt, Plinius etiam Cinnamum, Arabes Darfeni. De utroque seorsum tractauit Dioscorides. Cassiæ multa sunt genera, quæ circa Arabiam aromatiferam nascuntur. Virgas seu ramulos habet crassi corticis, folia Piperis (alij ἵππος, id est, Iridis legunt, & ita Serapio legit.) Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, Coralli æmula, valde angusta, crassa, longa, fistulosa, gustu mordens, & cum multo feruore adstringens (non cum aliquanto feruore, ut Ruellius vertit, est enim ἡ πολλὴ ἀρωματική, quod & Plinius confirmat, à gustu, inquit, quàm maximè mordens) aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis Achy nominatur, ab Alexandria negotiatoribus Daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea & nigricans Zigit cognomine, quæ Rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia cui Mosylitico blasto, id est, germi cognomen est. Reliquæ viles, ut quæ Asyphenum dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui ac rimoso: ut quæ Darca & Citto vocitatur nomine barbaro. Similior huic est Pseudocassia, quàm ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec aromatica sit.



fit, hæreticque medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quadam fistula, mollis, leuis, ramosa antedictæ præferunt. Damnatur candicans, scabra, hircinum virus olens, & quæ nõ habet fistulam crassam, sed scabram & tenuem. Deinde de Cinnamomo hæc scripsit. Cinnamomi genera plura patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamẽ Mosyliticum, quod Calsiæ, cui Mosyliti cognomẽ est, aliquam referat effigiem: sed in eo genere recens, nigrum, ex vinoso in cinereum vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens. Optimi ferè iudicium iucundi odoris proprietate constat: inuenitur enim cū optimo, eoq; quod peculiare est, odor Rutæ, aut Cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadatenus salsum, quod confricanti non citò asperum, & frianti puluerulentum, lauib; tamẽ internodiis appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum, facilis est huiusmodi probatio: namque fragmenta miscellanea quadam esse videtur. Quæ autem melius spirant suæ habitu cum nares primo consuluntur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionẽ impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium a Mosylitico perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum fangosum, candicans, aspectu tuberosum, vile ac friabile, magnam habens radicem, quæ Calsiæ repræsentat. Quintũ genus odore nares feriens, subrufum, & cortice fuluæ Calsiæ simile, tangenti firmum, minùs neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ Thuris, Calsiæ, Myrti aut Amomi odorem spirant, minùs suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicem, vt inutile reicito. Est etiamnum simile aliud, cui Pseudocinnamomo nomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium. Vocatur etiam Zingiber, cum tamen sit Xylocinnamomum, præbens quandam Cinnamomi faciem. Est autem lignosum Cinnamomum, sarmenta longa, robustaque ferens, odore longè Cinnamomo inferiore. Sunt qui Xylocinnamomum, à Cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Plinius recitatis iis quæ de Cinnamomo & Calsiæ fabulosa narravit antiquitas, subiicit, Cinnamomum, idemq; Cinnamum nascitur in Æthiopia Trogodytis cõnubio permixta. Ij mercatores id à cõterminis, vehunt per maria vasta ratibus, quas neque gubernacula regant, neque ibi trahant vel impellant, non vela, non ratio vlla adiuvet, cum omnium instar ibi sint homo tantum & audacia. Præterea hybernum mare exigunt circa brumam, Euris tum maximè flâtibus. Hi recto cursu per sinus impellunt, atque a promontorij ambitu Argeste deferunt in portum Gebanitarum, qui vocatur Ocila. Quamobrem illi maximè id petunt, produntq; vix quinto anno reuerti negotiatores, & multos interire. Cõtrâ reuehant vitrea, ahena, vestes fibulæq; cum armillis & monilib; . Ergo negotiatio illa fœminarum maximè fide cõstat. Ipse frutex duum cubitorum altitudine amplissimus, palmique minimus, quatuor digitorum crassitudinis statim à terra sex digitis furculosus, arido similis. Cum viret nõ odoratus, folio Origani, siccitate gaudes, sterilior imbre, cæduæ naturæ. Gignitur in planis quidem, sed dẽsissimis in vepribus rubisq; difficilis collectu. Metitur nõ nisi permiserit Deus. Iouem hunc intelligunt aliqui: Assabinum illi vocant, quodraginta quatuor boum caprarumq; & arietum extis impetratur venia cædendi. Non tamẽ aut ante ortum Solis, aut post occasum licet. Sarmenta hasta diuidit sacerdos, Deoq; partem ponit, reliquum mercator in nassas condit (melius in naves.) Est & alia fama, cū Sole diuidi, ternasq; partes fieri, dein sorte cremi discerni, quodq; Soli cesserit relinqui, ac sponte cõflagrare. Præcipua bonitas virgultorum tenuissimis partibus ad longitudinem palmi. Secunda proximis breuiore mēsurā, atque ita ordine. Vilissimum quod radicibus proximum, quoniām ibi minimũm corticis, in quo summa gratia. Qua de causa præferuntur cacumina, vbi plurimus

Li. 12. ca. 19.



Lib. 9. hist.  
cap. 4.

cortex. Ipsum verò lignum in fastidio est, propter Origani acrimoniam, Xyl-  
cinnamomum vocatur. Quidam Cinnami duo genera tradidère, candidius, ni-  
griusq; Quondam præferebatur candidum, nunc contrà nigrum laudatur, atq;  
etiam variū præferunt candido. Certissima tamen æstimatio, ne sit scabrum,  
atque inter sese tritum tardè frietur. Damnatur in primis molle, aut cui albet  
cortex. Ius eius à Gebanitarum Rege solo proficiscitur: is edicto mercatu vendit.  
Pretia quondam fuère in libras denariū mille. Auctum id parte dimidia est, in-  
censis, vt ferunt, siluis ira Barbarorum. Id accideritne ob iniquitatē præpotētium,  
an fortè, non satis constat. Austros ibi tam ardentes flare, vt æstatibus siluas accen-  
dant apud auctores inuenimus. Et mox, frutex & Calsia est, iuxtaq; Cinnami cam-  
pos nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cute verius quàm cortice,  
quem contrà ac in Cinnamo leuari & exinaniri pretium est. Amplitudo fruticis  
trium cubitorum. Colos triplex. Cū primū emicat, candidus, pedali mensura,  
deinde rubescit addito semipede, vltra nigricans. Hæc pars maximè laudatur, ac  
deinde proxima: damnatur verò candida. Consecant furculos longitudine binū  
cubitorum. Mox præsuunt recentibus coriis quadrupedum ob id interemptarū,  
vt iis putrescētibus vermiculi lignum erodant & excauent corticem tutum amari-  
tudine (legendum & excauent, cortice tuto amaritudine.) Probatur recēs maximè,  
& quæ sit odoris mollissimi, gustūve quàm maximè feruēs potiùs, quàm lento te-  
pore leuiter mordens, colore purpureo, quæq; plurima minimū ponderis fa-  
ciat breui tunicarum fistula, & nō fragili. Lactam vocant talem Barbaro nomine.  
Alia est Balsamodes ab odore simili appellata, sed amara, ideoq; vtilior Medicis,  
sicut nigra vnguentis. Hæc Plinius, quorum magnam partem ex Theophrasto  
exscripsit: sic enim de Cinnamomo & Calsia scribit. De Cinnamomo & Calsia ista  
referunt. Vtrūque fruticem esse non magnum, sed magnitudine Viticis (ἀμύγδαλον, non  
Amerinæ, vt vertit Gaza) multis ramis constantem & lignosum. Cinnamomum  
excisum in quinas partes diuidi: id optimum esse, quod germinibus proximum  
fuerit, quod ad palmi longitudinem cæditur, aut paulò maius. Secundum locum  
tenet quod sequitur, quod & breuius cæditur. Est & tertium, ac quartum: vltimum  
omnium deterriūm radici proximum, quod minimū corticis habeat: is enim  
utilis est, non lignum. Quam ob causam quod ex cacuminibus decerpitur, omni-  
bus præfertur, quia plurimū corticis habeat. Hæc quidam sic referunt. Alij fru-  
ticolum esse Cinnamomum aiunt: duo eius esse genera, vnum nigrum, alterum  
candidum. De quo hæc fabula narratur, ipsum in cōuallibus nasci, in iis esse serpe-  
tes, morsu necem inferentes, aduersus quos munitis manibus pedibūsq; descen-  
dere, atque ita Cinnamomum legere, quod cū exportauerint, eo in tres partes  
diuiso, cum Sole sortiri, & quæcūque illi sorte obtigerit, eam relinquere, abeuntēq;  
statim eam flagrantem cōspicere. Sed hæc planè fabula est. Calsiam autem ferunt  
virgultis esse crassioribus (σαχυστέπας pro σαλυστέπας rectè legit Gaza) valde neruo-  
sis, nec posse cortice exui, eum verò corticem esse vtilem. Cū virgulta secāt lon-  
gitudine binū digitorum (Plinius habet lōgitudine binū cubitorum) aut pau-  
lò maiora abscindunt, recentiq; bouis corio ea consuunt, vt ex eo & lignis putre-  
scentibus vermiculi gignantur qui lignum erodant, corticem verò non attingunt  
propter amarorem & odoris acrimoniam. Galenus Dioscoridem secutus lib. 1. de  
Anidous multa Calsiæ genera recēset, eamq; cæteris præfert, quæ Zizir cogno-  
minatur, Cinnamomique adeò æmulam esse ait, vt essent suo tempore, qui eam  
Cinnamomi loco venderent. Idem eodem in loco tradit Calsiam se penumerò  
in Cinnamomum transmutari, seq; vidisse eximie Calsiæ ramulos omni ex parte  
Cinnamomum referētes. Contrà vidisse se Cinnamomi furculos Calsiæ prorsus  
per similes, adeò vt asserat pro qualibet Cinnamomi parte in componendis medi-  
camentis



camentis, duas selectæ Calsiæ adhiberi posse. Item describit quoddam aliud deterioris Calsiæ genus, quod iunior Andromachus Calsiam fistulam nominat, quod fistularum modo inanis cauâque sit, & crassi corticis, cuiusmodi in vulgari Cinnamomo frequentissima conspicitur. Eius verò historiam sic persequitur eodem in loco Galenus. De Cinnamomo contraria iis quæ de Opobalsamo diximus, compertum habeo: persuasum namque est mihi ipsum omnium cognitu facilimum esse illis, qui sæpe optimū viderunt. Optimum verò consequi nemo potest, nisi repositum ab Imperatoribus intueatur, sex generibus quodammodò distributum. Siquidem & in hoc ipso, velut & in Calsia, optimi ad deterrimū tam magna differentia est, ut optima Calsia à pessimo Cinnamomo parū distet. Neq; verò Cinnamomi virtus ad vsum apta longo tempore durat: ad triginta siquidem annos, quam à principio vim habuit, integram non conseruat. Nugantur autem qui Cinnamomum ex iis medicamentis esse dicunt, quæ senectutem non sentiunt. Atqui ego non centum, neque ducentū annorum interuentu, sed pauciorum, si quis ad tantum numerum conferat, iam aliquam mutationem vetustiori Cinnamomo factam obseruauit. Quo tempore enim Antonino Imperatori Theriacam parauit, vasa lignea in quibus eiusdem generis Cinnamomum inerat, multa cōspexi, alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianū Imperator fuit, ætate reposita: omniaq; hæc sese & saporis & odoris imbecillitate vehementiaq; tantū superabant, quantum & tempore differebant. Olim ē Barbarorum terris arca cubitos quatuor & medium longa, Romam perlata cū fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoque Marco Antonino Imperatori antidorum quandam composuissē, ipsum cæteris multū præstare deprehendi, adeo ut Imperator quoque ea degustata medicinæ cōcoctionem, velut in aliis fieri solet, expectare noluerit, sed etiam ea vsus sit, nondum integrè duobus mēsis elapsis. Antonino successit Commodus, qui nec Theriacæ, nec Cinnamomi curam vllam habuit, sub quo non solum arboris illius quod superfuerat omne dissipatum est, verū etiam quodcūque post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, ut nunc Imperator Seuerus cū me sibi antidotum eo modo conficere iussisset, quo Antonino cōfeceram, ex Cinnamomo Traiani & Adriani tēpore reposito sumere coactus sim, imbecillioraq; planè visa sunt, & tamen nondum triginta anni intercesserant. Hic tamen optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subiicere volumus, ipsum summo perē bene olere, inexplicabilemque præ cæteris bonum quēdam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multū exhibere, non tamen ita ut mordicando tristitiam palato inferat: colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atque cerulei aliquantum addat. Ex hoc igitur quantum volebam, ut mos mihi fuit, cū accepissem, ramusculos paucos apud me repositui ex apotheca, in quares meas omnes pretiosas seruabam. Verū ipsa combusta, quo tempore & delubrum Pacis incensum est, & hæc & alia quinque Cinnamomi species, quas mihi conquisieram, periēre. Neque itaque cū Severo Imperatori Theriacam componerem, ex Cinnamomo Adriani tempore reposito quod optimum visum est elegi. Superfunt adhuc ibi multa vasa lignea, quæ omnia habent plurimum radicum, vel plurimum ramorum, vel Cinnamomorum differentias: nullum tamen veluti truncus in plures ramos diuisus attollitur, sed Veratri vtriusque figuram præ se fert, atque etiam magis Damasconi, quod ē Creta ad nos adfertur. Quævis autē Cinnamomi species ab vna radice, seu frutex quidam parvus confurgit, emittitq; hæc sex, illa septem virgulta, vel paulò plura paucioraq; non æquali tamen omnia longitudine: verū quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vniuersa autem Cinnamomi natura similis est quodammodò optimæ Calsiæ



Cassia. Hactenus Galenus. Strabo cum Theophrasto, Dioscoride, Plinio, Cinnamomum in Arabia gigni dicit, atque etiam in India, ea scilicet parte quæ ad Austrum vergit. Quia cum hæc Arabiæ & Æthiopiarum Sole persimilis sit, ea omnia, ut ipse ait, gignit aromata, nempe Cinnamomum, Cassiam, & alia, perinde ac illa.

Lib. 9. c. 13. Idem testatur Aristoteles in Historia animalium. In Arabia Cinnamomus avis appellatur, quæ furculos Cinnamomi portare, ac nidos ex iis conficere aiunt. Nidificant in excelsis arboribus & ramis, sed incolæ sagittis plumbatis nidos petunt, atque ira decussum in terra Cinnamomum legunt. Quæ Plinius mutuatus, in Arabia, inquit, Cinnamologus avis appellatur, Cinnami furculis nidificat. Plumbatis eos sagittis decutunt indigenæ mercis gratia. Aristoteli avis non *κινναμωδης* dicitur, sed *κινναμωμος* eodem cum planta nomine. Verum Iulius Solinus de eadem re scribens, avem ipsam non Cinnamomum, sed Cinnamologum appellat, atque etiam addit Cinnamomum hoc pretiis vendi amplioribus, quod magis, quàm aliud mercatores portent. Auicenna & Serapio nihil aliud de Cassia & Cinnamomo literis maderunt, quàm quod ex Dioscoride & Galeno descripserunt. Ex quibus omnibus intelligit studiosus lector, quàm fabulosa, varia, & incerta de Cassia & Cinnamomo à veteribus Græcis & Latinis auctoribus perscripta sint: tam longis enim difficultibusque navigationibus, ex regionibus tum parùm notis perebantur hæc aromata, ut perfectam horum cognitionem sibi comparare non potuerint. Primum Dioscorides succinctè admodum Cassiam dixit esse virgultis crassi corticis, Piperis foliis: Cinnamomi verò descriptionem prorsus omisit. Theophrastus Cassiam & Cinnamomum magnitudine Vitis, multos ramos habere, lignosos. Plinius Cinnamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, palmique minimum, & cætera quæ supra posuimus. Cassiam fruticem esse altitudine trium cubitorum, &c. Galenus arcam Romam delatam fuisse tradit è Barbarorum regione, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio, in quo integra Cinnamomi arbor erat. Quibus indicat Cinnamomum esse arborem. Idem scribit unquamque Cinnamomi speciem, ab una radice, seu fruticem quædam parvum consurgere, adeo ut maiora eius virgulta dimidium Romanum pedem non excedant. Quibus innuit Cinnamomum in parvorum fruticum genere esse. Quid verò sibi vult Galenus cum dicit Cinnamomorum nullum veluti truncum in plures ramos divisum attolli, sed Veratri utriusque figuram præ se ferre, aut etiam magis Damasonij? Ad hæc cum Cassiam & Cinnamomum diuersas arbores esse statuit. Est & illud permittum, quod ait Cassiam sæpe in Cinnamomum transmutari, scilicet; vidisse eximiam Cassiæ ramulos omni ex parte Cinnamomum referentes: contra Cinnamomi furculos Cassiæ prorsus persimiles. Cassiæ genera Galenus recenset eadem quæ Dioscorides: item Cinnamomi sex, à Dioscoride etiam declarata. Theophrastus Cinnamomum in quinque partes diuidit, ut diximus. Eidem & Plinio duo duntaxat Cinnamomi genera sunt, candidum & nigrum. Iam verò prisca illi regiones & natales locos aperte & disertè non designant. Dioscorides Cassiam circa Arabiam odoriferam provenire scribit, Plinius Cinnamomum in Æthiopia, mox subiungens Æthiopes mercari id à conterminis. Quod si apud illos nasceretur, cur ab aliis id emerget? Multò absurdius quod sequitur, Æthiopes eas merces per vastam mariam vehere. Nam si contermini sunt qui vendunt, tam longa navigatione vel opus est, ut nunc, ita & olim à Molucis in superiorem Indiam Cinnamomum gehatur, mercimonium id exercente quæ ad mare rubrum iacet Æthiopum gente, quos Abyssinos vocamus, ob commodam Oceani propinquitatem. Quæ res Plinium fefellit, ut rectè Dalechamplus annotavit. His fabulas addidit non solum Herodotus, sed etiam Theophrastus & Plinius. Fabulosum enim est secutos furculos præfui recentibus coriis bouum, ut iis putrescentibus vermiculi lignum erodant & excauant



& excauent cortice tubo amaritudine. His expositis nunc discutiendum an veram hodie Calsiam habeamus, sitq; ea quæ Canella vulgò vocatur. Deinde an ab ea Cinnamomum differat, an verò genuino careamus. Primum recentiores omnes, qui doctrina & iudicio præstant, censuerunt Officinarum Cinnamomum, vulgò Canella dictum, legitimam esse præcorum Calsiam: cuius genera à Dioscoride & Galeno tradita internoscere poterit is: qui magnâ huius copiam in mercatorum apothecis diligentius perquisierit, & examinauerit. Quare ex Officinis omnibus reiicienda segmenta & frustra quædam, nec odore, nec sapore, nec viribus commendanda, quæ Calsiæ lignæ siue odoratæ vice tum Medici, tum seplasiarij diu usurparunt. Inter quæ cum sint nonnulla quæ præter odorem saporemque quibus ferè carent, Calsiæ Dioscoridis admodum similia videantur, eius Pseudocalsiam esse non temerè quis dixerit: medicamentorum verò compositionibus Xyllocalsiam, id est, Calsiam ligneam, siue Calsiam odoratam postulantibus, Canella nostra adhibeatur. At cum hæc Calsia etiam Calsia fistula nominetur, quoniam ligno exempta tubuli seu fistulæ speciem est, Mauritanique Siliquam Aegyptiam, siue Calsiam nigram, siue Catharticam vulgò dictam etiam Calsiam fistulam vocent siue sua, siue interpretum culpa, cauendum ne hac homonymia decipiamur, præsertim in medicamentis à Mauritanis inuentis, quæ Calsiam fistulam expectant, quæ Siliqua Aegyptia, siue Calsia cathartica, non illa odorata intelligenda est. Quantum ad Cinnamomum attinet, quidam credunt in capsis Canella siue vulgari Cinnamomo referri, fragmenta veri, ac legitimi Cinnamomi reperiri posse ab iis qui & del-gere & distinguere nouerunt. Pena scribit se Calsiam ad Cinnamomum proximè accedentem vidisse in Officina Gulielmi Driesch pharmacopœi Antuerpiensis. Erat verò multorum iudicio furculus ille Cinnamomi, bacillo solido, fractu facili, Cinnamomi cortice obrecto, cui etiamnum cuticula pullo colore obducta fuit. Clusius in Scholiis in Historiam Aromat. Indic. Garciar, asserit se tres vidisse Cinnamomi furculos. Erant ij recti, non enodes, sed nodis quibusdam sine ramulorum vestigiis palmum à sese disitis insigniti. Cortex tenuis, subcinerei quodammodo coloris, iucundi odoris, suavis gustus, sed qui suam acrimonia aliquantulum linguam vellicet. Lignum certè inodorum est & intipidum, non minus quam Salicis ramus, cui perquam similis est. Retinet autem cortex suauem illam cum odoris tum saporis iucunditatem (tamen totis quadraginta aut amplius annis à matre reuulsi sunt ramuli) atque eam etiam maiore, quam nostra Canella. Istud autem hodiernum Cinnamomum neque idem cum Calsia, neque multum diuersum esse certum est, inquit Pena. Nam si vtriusque notas ex Dioscoride perpendas, videbis easdem ferè esse vires, non disparem usum. Si recentioribus assentiaris & exploratoribus, eiusdem arboris non ita diuersas partes esse discas. Quod Galenus innuit, cum dicit Calsiam sæpe in Cinnamomum transmutari, seq; vidisse eximie Calsiæ ramulos Cinnamomum prorsus referre. Cõtrà se vidisse Cinnamomi furculos Calsiæ prorsus persimiles. Quibus tanta horum cognatio significatur, vt Galeni auctoritate freti quidam putent Calsiam & Cinnamomum ex vna & eadem arbore provenire, sed ex diuersis eius partibus, nimirum Cinnamomum ex summis & tenerioribus furculis, Calsiam ex aliis. Alij nos verò Cinnamomo destitutos esse contendunt, idque quod Cinnamomum Officinis dicitur, nihil aliud esse quàm Calsiam ligneam, siue odoratam, quæ vulgò Canella nominatur, quos secutus est Matthiolus, qui contra veterum & recentiorum omnium qui de Cinnamomo & Calsia tractarunt sententiam, Cinnamomum lignum non corticem esse ait. Ex iis recentioribus Garcias horum historiam luculentè describit his ferè verbis. Propter locorum distantiam, inquit, & minus frequentatas has regiones à negotiatoribus, probè cognita Calsiæ historia veteribus non.

Canella Siderina  
qd.  
Canella officinarum  
Sylvestris Calsia  
Sideris. et antiquus.

Lib. I. ca. 15.

in Dictione 171  
Cinnamom.

Lib. I. Arom.  
Indic. ca. 15.



non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam deferebant, Chinenſes erant. Ex Ormuz deinde in Alep emporium totius Syriæ nobiliſſimum ab aliis negotiatoribus transferebatur. Qui verò inde eam ad Græcos deportabant, aut apud ſe naſci, aut in Æthiopia dicebant, mulſiſque cum ſuperſtitionibus cædi diuidique à ſacerdotibus, vt ex Theophrasto & Plinio diximus. Cæterum neque Caſſiam, neque Cinnamomum apud Æthiopes aut Arabes naſci, Luſitanorum navigationibus palam factum fuiſſe ait Garcias, qui totam illam oram circunlegerunt, magnæque ex parte terreſtri itinere peragrarunt: nullam autem Caſſiam aut Cinnamomum ſe viſiſſe affirmarunt. Dicit aliquis Canellam quidem apud eos non naſci, & propterea ab Indis petere: ſed legitima Caſſia & vero Cinnamomo eos non carere, forſe autem à Barbaris & inconditis populis ignorari. Cui reſpondet Garcias, familiares ſe habere eruditos Medicos Arabes, Turcas & Coracones, qui omnes Canellam craſſiorem Caſſiam ligneam appellant. Prætereà nonnullos Luſitanos totam Æthiopiam ſub Ægypto (quam nunc Guineam vocant) non ſolum ſecundum mare, ſed in mediterraneis peragraſſe, alios ab inſula D. Thomæ uſque ad Sofala & Mozambique, & inde Goam penetrantes, pleroſque alios à promontorio Bonæ ſpei (cum naufragium paſſi eſſent) uſque ad Mozambique & Melindam, ita vt vtramque Æthiopiam, ſupra & infra Ægyptum perluſtrarint: nullam tamen ab his conſpectam illic fuiſſe Canellam vel Caſſiam. Neque credendum eſt ipſos incolas tam nobilia medicamenta ignorariſſe, aut tacituros fuiſſe. Nam quemadmodum barbariſſima gens, quæ inſulam D. Laurentij incolit, mercatoribus, qui eò interdum deferuntur, fructum quendam auellanae magnitudine oſtendit, quia Caryophylla redolet, eadem ratione credendum eſt Æthiops Cinnamomum & Caſſiam, adeo odorata aromata Luſitanis demonſtratuſſe. Porro Caſſia lignea Arabibus, Perſis, Indis *Salibacha* vocatur, à vulgo autem Indorum eodem nomine, quo Canella: nullum enim inter Canellam & Caſſiam diſcrimen faciunt. Neque reuera quiſpiam Caſſiam à Canella differentem vidit. Cæterum quòd Canella diuerſa Cinnamomi & Caſſiæ nomina indita fuerint, occaſionem præbuiſſe putat Garcias mercatores Chinenſes, (nam annales vrbiſ Ormuz produunt olim quadringentas naues à China vno eodemque tempore eò appuliſſe) qui cum à ſua regione aurum, ſericum, vaſa murrhina, moſchum, margaritas, cuprum, aliâſque merces eueherent, nonnullas ex eis in Malaca vendebant, Santalum, Nucem myſticam, Macim, Caryophylla, lignum Aloës contra in ſuas naues inferebant. Quæ rursus in Zeilam & Malauar diuendebant, indeque ſumebant Canellam, ex Zeilam, videlicet laudatiſſimam, ex Malauar minùs ſelectam. ſimiliter & ex Iaoa, vnde etiam Piper Cardamomumque euehebant, eaque omnia deinde Ormuz, aut in Arabia oram maritimam perferebant. Interrogati autem iſti Chinenſes, quæ nam eſſent hæc aromata, & vnde adueherent, fabulas illas narrabant quas recenſet Herodotus, vt iis commentis earum mercium pretia augerentur. Cum autem eam, quæ in Zeilam proueniſſet, Canellam ab ea, quam in Iaoa & Malauar ſumpſerant, diſſerre conſpicerent, diuerſa illis indidere nomina, cum tamen eiſdem generis eſſent cortices, pro ſoli caliq; varietate duntaxat differentes, vt plerumque idem fructus pro regionum & caliq; differentia ſuauior fieri, aut à naturali bonitate degenerare ſolet. Ementes ergo incolæ Ormuz eam Canellam à Chinenſibus, Darchini, quod Perſis lignum Chinenſe ſignificat, appellarunt. Deinde Alexandriam vehentes, vt eam Græcis eò conſueſcentibus cariùs venderent, Cinnamomum vocarunt, quod ſignificat lignum odoratum, quaſi Amomum ex China delatum. Deteriori autem Canella, quæ ſcilicet ex Iaoa & Malauar delata eſſet, idem nomen quo in Iaoa appellatur

Nomina

Cinnamomum




appellatur, indiderunt, scilicet *Cais manis*, quod lingua Malaya dulce lignum sonat, duo diuersa nomina eidem rei imponentes. Græci corrupto vocabulo Calsiam dixere. Vñus est Auicenna cum Rhase & reliquis Arabibus vocabulo Persico Darchini, vt plerisque aliis Persicis solet. Nam Canella cuiuscunque generis Arabicè *Quersaa* & *Quersa* dicitur. Reliqua verò nomina apud Arabas corrupta sunt, vt *Darsihahen*, & similia. Vocatur in Zeilam *Cuurdo*, in Malaya, vt dictum est, *Cais manis*, in Malauar *Camraa*. Nam quod Serapio Darchini arborem de China interpretatur, corruptum est, & ab interprete additum. Quare Garcias Calsiam, Cinnamomum, & nostram Canellam, vñum idemque medicamentum esse censet, atque ita depingit. Arbor est magnitudine Oleæ, interdum minor, multis onusta ramis, non iis quidem contortis, sed rectis ferè, foliis colore quidem ad Lauri, forma verò ad Citri folia accedente (non autem foliis Iridis, vt fabulose quidam scripsere.) Floribus candidis, fructu nigro & rotundo, auellanae ferè magnitudine, aut exiguis oliuis simili. Est autem Canella nihil aliud quàm secundus & interior arboris cortex. Nam hæc arbor duplici cortice munita est, veluti Suber, non eo tamen adeò crasso & distincto. Hoc confirmat

canis crassus  
et canis ille  
Forma.

CANELLAE folium & bacillus.

XYLOCASSIA.

ξύλον. lignum



Pena, qui scribit Venetos institores Londini ostendisse corticem pollicem crassum, scabrum, callosum, foris lici aut Oleæ concolorem, interius verò conuexum mollius, superficie, odore, sapore, colore, gustu quadantenus Canellæ vulgaris. Idcirco doctiorum Medicorum sententia, Calsiæ arboris extimum & crassissimum corticem iudicatum fuisse. Similiter adnotauit Clusius in Scholiis in Garcie historiam, interdum inueniri fragmenta, quæ non videntur interior ille cortex, sed omnino superior, cinerea quodammodo pellicula obductus. Exemplum ergo cortex crasso illo & exteriori libro repurgatur, deinde in laminulas quadrangulas sectus humi abiicitur, atque ita per sese conuoluitur, vt vnus rami integer cortex videatur, cum tamen partes sint duntaxat corticis in tubulos digiti crassitudine conuolutæ, truncus verò interdum femoris crassitie



Locus.

L. 1. c. 19.  
Lib. 1. An-  
not.

Cap. 143.

reperitur. Roseum autem illum, siue ex cinereo vinosum colorem Solis calore contrahit: qui non probè paratus, candicans siue cinerei coloris sit, nimis verò Solis ardoribus adustus, niger. Exempto cortice tribus postea annis ab ea arbore abstinetur. Frequentes sunt hæc arbores in Zeilam, solentque vili emi Canella: sed triginta ab hinc annis nemo eam emere potuit præter Procuratorem regionum negotiorum, quem Factorem vocant. Zeilanici minores sunt ex arbores, quæ ignobiliorem Canellam ferunt in provincia Malauar, & in laoa, siue laua, non tamen adeò pusillæ, ut Plinius & Galenus esse scribunt. Sunt verò omnes siluestres & sponte nascentes. Nusquam alibi, quod sciam, inquit Garcias, nascitur Canella, tametsi Franciscus de Tamarā scribat in freto maris Erythræi Cinnamomi arbores & Lauros maris æstu interdum opertas inueniri. At Lusitani singulis annis per mare Erythræum nauigant, nullam tamen eiusmodi arborem se vidisse referunt. Præterea Occidentalis India refert Canellam istic nasci, quod verisimile non esse Garcias arbitratur: eam enim narrat calices glandesque Suberis modo ferre, cum legitima Canella veluti oliuas tantum ferat. Quare alia erit sui generis arbor. Quotquot tamen Historiam Peruanam descripserunt, istius Canellæ, quam in provincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt. Est verò ex eorum descriptione, Canellæ arbor vasta admodum, folio Laurino, fructu racematum coherente, sed qui calice Suberino simili contineatur, amplius tamen & magis cauo, colore nigricante. Huius arboris fructui, foliis, cortici & radicibus (licet Canellæ saporem & odorem habeant) longè calices præferuntur, quorum duntaxat puluis in usu est. Nam si Canellæ modo cum cibis decoquantur, tantum abest ut suauitatem eduliis concilient, ut potius eorum facultas & saporis gratia decoctione euanescat. Horum puluere ad diuersos morbos vtuntur, sed præsertim aduersus coli, intestinorum, & stomachi dolores in portionibus eum propinant. Quamuis autem multæ sint huius generis arbores siluestres, diligenter tamen & magna cura eas in prædiis suis colunt (sic enim culta longè melior) atque in vicinas regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi. Hæc Franciscus Gomara in Historia generali. Nec uti eadem Historia Occidentalis India narrat, in China Canella nascitur, nam è Malaca Chinam cum aliis mercibus deferitur. Intellexit verò Garcias plurimam etiam Canellam in insula Mindanao nasci, & vicinis insulis, sed ex procul à China absunt. Putarunt etiam nonnulli in Alep nasci Canellam, quod apud aliquos auctores scriptum inuenerint Cinnamomum Alepinum. Sed sciunt, non magis istic, quam in Hispaniis nasci. Verum cum ex illis regionibus Ormuz, & inde Alep deportabatur, factum est, ut incorruptam Canellam inde in Europam aduectam ab ipsa vrbe Alep denominarint. Quamuis autem Zeilanica cæteris præferatur, inuenitur tamen etiam interdum ignobilis, qualis est quæ crassiori cortice constat, minusque in turbulos conuoluitur, quod non sit eiusdem anni: quo enim vetustior cortex, eo deterior. Quæ verò in Malauar nascitur, tota ferè est deterior, tantumque à Zeilanica differt, ut centenæ Zeilanicæ libræ decem aureos pendant, Malauaricæ verò libræ quadringentæ vnum duntaxat aureum. Ludovicus de Bartholina in nauigatione sua scribit in Zeilam insula India nasci Canellæ arborem Laurum proximè referentem præsertim foliis: item baccas Lauri modo ferre, sed minores & candidiores. Hæc Canella siue Cinnamomum (nihil enim inter ea discriminis ponit) cortex est huius arboris, cuius ramos tertio quoque anno secant, & cortice spoliant: truncum verò illatum relinquunt. Similiter Odoardus Barboza scripsit in Zeilam India insula nasci optimam Canellam  
locis



locis montosis ex arbore Lauro simili. Arrianus in navigatione maris rubri refert duorum dierum itinere ab Emporio Mordo dicto locum esse Mosillam nuncupatum, in quo maxima Calsiae copia provenit. Idem ait Emporium esse Aromata dictum Orientem versus, in quo nascitur Calsia, Zigir & Afi, hi, & alia aromata. In quam Arriani navigationem is qui scripsit, quod de Calsia & Zigir Canellae generibus ab Arriano proditum est, diligenter expendendum esse annotavit, nempe ea nasci in Troglodytica parte, velut in Aromata & Mosillo, unde mercatores emunt, & ad alias partes transportant. Similiter quod Plinius dixit, Cinnamomum nasci in Aethiopia Troglodytis contermina, quae ob id ab antiquis auctoribus teste Strabone Cinnamomifera appellata fuit, quod etiam confirmavit Ptolemaeus. At nunc tota Troglodytica & Aethiopia probe cognitae, certum est neque Cinnamomum, neque aromatum speciem ullam illic nasci, dempto Zingibere, quod in regno quodam Damute nuncupato provenit. Theuetus partim Garciae assentitur, partim ab eo multum dis-

To. C.  
m. 1. b. 1.  
cap. 7.

ARBOR CANELLAE,  
Theueti.



crepat. Narrat ab insulae quae Monorique dicitur celebriores esse Cavit & Subanin, propè quas optima Canella provenit, quam Malvarici *Cais-mani* appellant, quae vox dulce lignum significat, creditque Theuetus Graecos corrupto inde nomine Calsiam ligneam appellasse. Ac reuera veteres plerique, inquit, existimarunt arborem, quae Calsiam, & eam quae Cinnamomum & Canellam fert, eandem planè esse, quod falsum est, etiam si Garcias id asserere voluerit: tantum enim differt haec ab illa, quantum glandifera arbor à Castanea arbore. Ceterum Canellam Arabes appellant *Quersaa*, alij *Querse*, Zeylam incolae *Cuurde*, in Iavan insula *Cameaa*, in Ormuz *Darchini* dicitur, id est, Lignum Chinesè. Arbor haec in montibus nascitur, Lauro nostrati similis, cuius ramuli duntaxat, & tenuiores furculi stato anni tempore Regis iussu amputantur & vaneunt. Ramulis multum brachiata est, in quorum extremis flores sunt parvi, quibus Solis fervore statim flaccescentibus & delapsis succe-

dit fructus, ferè rotundus, Nucis avellanæ magnitudine, ex cuius nucleo oleum exprimitur, inodorum, nisi sit igni excoctum, quo acri nervos & ceteras corporis partes malè affectas illinunt. Canella quae ad nos aduehitur, secundus est arboris cortex, qui dissectus in sese convolvitur, & colorem mutat. Radix utilis est, nec non succus qui ex arbore manat, illique confert maxime, qui sanguinis ex naribus profluvio obnoxij sunt, orisque halitum commendat. Scire autem licet nullam Canellae arborem, neque in Africa, neque in Asia minore, neque in Peru, neque in Europa provenire, quicquid scribant Plinius & Herodotus. Haec ex Theueto. Superest ut Cinnamomi & Calsiae vires ex veteribus explicemus. Calsia vim habet calfaciendi, inquit Dioscorides, vrinam ciendi, siccandi, & leuiter adstringendi. Convenit ad medicamenta oculorum, quae efficiendae claritatis gratia concinnantur, & ad ma-

Tem.  
C. 1.  
Lib. 1.



lagmara. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum morsus pota auxiliatur. Aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum vitia potu proficit. Fœminis in folio desidentibus aut suffimentis prodest ad dilatationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta Cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis. Cinnamomum omne, eodem auctore, excalfacit, emollit & concoquit, vrinam ciet: tam menses quam partus potum; aut ex Myrrha impostum pellit, contra bestias quæ virus eiulantur, venenæque conuenit: crassitiem extenuat, lentigines & vitia cutis in facie ex melle illitum deterget: contra tussis, defluxiones, hydropem, nephritidem, & vrinæ difficultatem efficax est. Vnguentis pretiosis inferi solet. In summa magni ad omnia vsus. Garcias contra Dioscoridis & Galeni auctoritatem monet rogâque Medicos & pharmacopœos omnes, ne Calsiam duplici pondere pro Cinnamomo compositionibus immisceant. Tum ne posthac Calsiæ loco Canellam deteriorem præscribant, sed selectissima vtantur, cum tanta sit eius copia. Galenus scribit Calsiam exsiccare & excalfacere tertio quodammodo ordine, sed & tenuium admodum esse partium, gustu verò plurimam in se acrem deprehendi, leuiter quoque non nihil adstringere. Quamobrem ob hæc omnia incidere, simulque digerere quæ in corpore sunt excrementa: ad hæc robur etiam instrumentis addere. Idoneam verò etiam suppressis mensibus, cum videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum quod sufficiat euacuari nequit. Cinnamomum verò summè tenuium esse partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem æquè desiccare eorum quæ pari sunt excalfaciendi facultate, propter tenuitatem essentia. Garcias auctor est extillare ex Calsiæ radice liquorem Caphuram redolentem. Sed Rex vetuit radices vulnerari, ne arbores pereant. Prætereà elici aquam vitreis organis ex ipsis floribus, sed quæ fragrantia & odoris suauitate ei cedat, quæ ex corticibus nondum resiccatis elicitur. Vtilis est hîc liquor stillatitius ad plurima. Nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores à causa frigida prouenientes illico lenit. Faciei colorem commendat & oris halitum. Prætereà ad condiendos suauioresque efficiendos cibos perquam idoneus. Ex Canellæ baccis oleum exprimitur, quemadmodum ex oliuis, sebaceum quodammodo & saponi Gallico simile, inodorum, nisi calfactum sit, tunc enim Cinnamomum aliquantum olet, & vtuntur aduersus ventriculi, & neruorum frigidam intemperiem.

PIPER



**V**o d Græci *πέπερ*, id Piper Latini dicūt, Arabes *Fufel* & *Fuful*, Itali *Nomina*  
*Pepe*, Germani *Pfeffer*, Hispani *Pimienta*, Galli *Poiure*. De eo  
 Dioscor. hæc prodidit. Piper arborem tradunt nasci in India, breuem,  
 quæ inter initia prælongum fructū veluti siliquam promit, quod est  
 longum Piper, habens inus aliquid tenui Milio simile, quod tadem in perfectum  
 Piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, racemos emittit grana ferentes  
 qualia videmus. Ea acerbam candidū Piper faciunt, aptū ocularibus remediis, anti-  
 dotis, & theriacis medicamentis. Longum verò vehementius mordet, & subamarū  
 est, quia immaturum decerpitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur.  
 Nigrum verò candido suauius, acrius, ori gratius, & quod non nisi maturum colligatur,  
 magis odoratum, nec non ad condimenta vtilius. Sed candidum & subacer-  
 bum antedictis infirmius est. Piperis radix Costo similis est. Eligendum est gra-  
 uissimum, plenum, nigrum, non valde rugosum, recens, nō furtuosum. Inuenitur  
 etiam in genere nigri, nutrimento destitutum, inane, leue, quod vocatur *brasina*.  
 Plinius, Passim verò, inquit, quæ Piper gignunt arbores, Iuniperis nostris sunt si-  
 miles: quæquam in fronte Caucasus solibus apposita gigni tantum eas aliqui tradi-  
 dere. Semina à Iunipero distant paruis siliquis, quales in Phaeolis videmus. Hæ  
 penitusquam dehiscant decerpæ, tostæq; sole faciunt quod vocatur Piper longum:  
 paulatim verò dehiscences per maturitatem ostendunt candidum Piper, quod  
 deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur. Dioscorides arborem Piperife-  
 ram neque delineauit, neque cuiquam alteri assimilauit. Plinius Iunipero compa-  
 rauit in cæteris haud multum dissentiant. Theophrastus dixit tantum Piper fru-  
 ctum esse, cuius genera duo. Vnum enim rotundum Erui modo, cute carneque  
 constans, sicuti Lauri bacca, subrubrum. Alterum oblongum, nigrum (contra, ro-  
 tundum *μέλας*, nigrum, oblongum *ὑπερῶρον* subrubrum dicendum videtur) semina  
 parua Papaueris continens. Longè hoc validius altero. Auicenna & Serapio, quæ  
 de Piper tradiderunt, ex Græcis exscripsere. At Dioscorides, Theophrastus, & hos  
 secutus Plinius Piperis plantæ formam, ac notas ignorarunt, vt ait Garcias, neque  
 natales locos præter designarunt. Quod minùs mirum videri debet: regionis enim  
 procul disita, ideoque minùs bene cognita, nec perlustrata plantam non inspe-  
 ctione notam, sed auditione tantum acceptam, alienam fidem secuti de se iberant.  
 Illud magis mirum Arabes & recentiores in eundem errorem incidisse. Quare  
 veram Piperis historiam ex aliis referemus. Ac primum, ex Garcia. Maxima, in-  
 quit, Piperis quantitas provenit in Malauar, tota ea maritima regione quæ à pro-  
 montorio Comorin ad Cananor vsque pertingit. Nascitur etiam in Malacæ ma-  
 ritimis, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Provenit similiter  
 in insulis Iauæ vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id in Chinaram regio-  
 nem tantum deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu &  
 Martaban deuchitur. Maxima etiam eius pars quæ in Malauar oritur, in usum ma-  
 colarum cedit, tamen si regio ampla non sit: nonnihil etiam à maritimis eius re-  
 gionis populis absumentur. Pars eius defertur in Balagate bubulis coriis. Et magna  
 copia (quamvis edicto Regio vetitum sit) à Mauritanis per mare Erythræum ex-  
 portatur, id suffragantibus ipsis incolis. Inuenitur etiam Piper supra Cananor, qua  
 Septentrionem spectat, sed adeo exigua quantitate, vt ipsis incolis non sufficiat,  
 & externo importato opus habeant. Etenim non gaudet planta hæc locis desertis  
 ac mediterraneis. Quantum verò distent hæc regiones à Caucaso monte, ex Geo-  
 graphis satis liquet. Piper Maluatica lingua Molanga dicitur, Malacitana, Loda,  
 in Guzarate & Decan, Meriche, in Bengala, Morois, longum Piper quod solum

Nomina

Lib. 2. c. 13.

*πέπερ*; *Dr. παρα*  
*το πέπερ*, *coquo*  
*quia habet vim*  
*conseruand*, *et caro*  
*seruand*.

Lib. 12. c. 7.

Lib. 9. hist.  
 cap. 22.

Lib. 1. c. 49.  
 Cap. 37.  
 simp.


Lib. 1. Arom.  
 Ind. ca. 22.  
 Locus.

Nomina



*Forma.**Li. 8. simpl.*

istic prouenit Pimpilim, Arabibus medicis, tum vulgò *Filfel*. Tamen Auicenna Fulful & Fulfel appellat, quem secutus est Serapio. Seritur Piperis planta ad radices alterius arboris (magna ex parte iuxta arborem Faufel, aut Palmam satam Garcias vidit) ad cuius fastigium vsque sese conuoluendo conscendit, foliis raris, Mali Assyrij effigie, sed minoribus, in extremo acutis virentibus, gustu aliquantum calidis, & folij Betre sapore. Fructus vuarum modo racematim cohaeret, minores tamen sunt Piperis racemi, & fructus ipse minor, semperque virens, donec siccetur, & perfectam maturitatem consequatur, quæ incidit circiter medium Ianuarium. Radix pusilla, nō Costo similis, vt vult Dioscorides, quia Costus radix non est, sed lignum. Verum inter plantam quæ Piper nigrum fert, & eam quæ candidum, tam parua est differentia, vt à nemine quàm ab incolis dignosci possit, quemadmodum Vitem quæ vuam fert nigram ab ea quæ candidam non dignoscimus, nisi cum vuas habent, & eas quidem maturas. Quæ autem Piper longum edit, longè alia est planta, quæq; non plus habet similitudinis cum superioribus quàm faba cum ouo. Præterea Piper longum in Bengala prouenit, quæ regio quingentarum leucarum spatio à Malauar distat, vbi nigrum & candidum gignuntur. Quare Galenus Dioscoridem secutus eandem plantam Piper longum, candidum & nigrum

*ARBOR Piperifera, Thueti.**PIPER nigrum & album.*

proferre falsò credidit. Candidi plantæ rariores sunt, nec nisi certis Malauar & Malacæ locis rarè nascuntur. Condiuntur aceto & sale recentes adhuc, & immaturi Piperis nigri racemi, & vsui afferuntur, cuiusmodi racemos interdum cum Zingiberis radicibus muria conditis Antuerpiæ reperiri ait Clusius, oblongos quidem & graciles, neque ita fartos, vt sunt vuarum racemi, ex quo eorum iconem expressam hic exhibemus. Arabes & Persæ Medici Piper calidum tertio ordine statuunt. Sed empirici cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum Medicorum, frigidum Piper faciunt, vt & pleraq; alia aromata, quæ reuerà excalfaciunt. Solent magnates candido Pipere vti quemadmodum nos sale. Venenis resistere, & ocularibus medicamentis vtile esse asserunt, quod & Dioscorides annotauit. Vis omnium,

*Li. 1. ca. 113.*



omniū, inquit, excafacit, vrinam ciet, cōcoquit, trahit, discutit, absterget quæ te-  
nebras oculis offundunt. Piper horribus febrium periodicis siue potu, siue illi-  
tu subuenit: serpentium moribus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere  
creditur statim à concubitu suppositum: tussi omnibūque pectoris vitii siue  
eclegmate, siue potu succurrit: angina eo & melle vtiliter perunguntur. Potum  
cum recētibus Lauri foliis tormina discutit. Cum vua passā commanducatum pi-  
tuitam à capite elicit: dolores sedat, apperentiam mouet, concoctionem adiuuat  
ad intinctus esculentorum additum. Strumas cum pisce discutit, vitiūgines cum  
nitro terget. Radix ora gustantium accendit, saliuam ciet, lienem reprimat cum  
aceto illita, aut pota. Caput etiam purgat cum semine Staphisagria manducata.  
Garcias candidi Piperis loco, quod calidius est & odoratius, nigrum præscriben-  
dum esse non consulit, nisi in candidi penuria. Similiter nec longum Piper can-  
didi aut nigri loco, cum prorsus diuersæ sint plantæ, & nigrum cum candido

Lib. 2. c. 43

PIPER, Matth.



PIPER Aethiopicum, Matth.



magis conueniat. Idem alius generis Piperis meminit, q. lingua Maluarica à Ca-  
nara Canaricum nuncupatur. Est autem id inane, eoque vtuntur ad pituitam à  
capite eliciendam, ad dentium dolores, & in cholerico affectu. Annotauit Clu-  
sius Scholiastes Antuerpiam inuehi solitum aliud Piperis genus, quod Lusitani  
Pimenta delrabo, id est, Piper caudatum vocant. Sed veritus Rex Lusitaniæ ne  
legitimum Piper alterius inuentione vilesceret, id ampliùs deferri edicto vetuit.  
Erat id Cubebis ferè simile, pediculo subnixum exiguo, rotundum, plenum, ali-  
quantulum rugosum, nigricans, eadem acrimonia qua Piper præditum, aromati-  
cum, racematim coherens. Amomum esse nonnulli perperam existimarunt. Est  
& aliud Piperis genus quod Aethiopicum vocatur, à Serapione Granum Zelim  
& Piper Nigrorum, atq; ita describit. Habzeli, inquit, id est, Granum Zelim, gra-  
num est pingue, magnitudine Ciceris, foris flauum, intus album, boni saporis. Ad-  
fertur ex Barbaria, vbi vocatur Croni, Piper etiam Nigrorum nuncupatur: quan-  
quam reuera Piper Nigrorum sit aliud. Specie Phascolis simile est, sed granis &

Piper Ca-  
naticum.

Piper Cau-  
datum.

Cap. 47.  
simpl.



corticibus minoribus, colore nigro, sapore acri sicuti Piper. Ex regione Nigrorum defertur, & doloribus dentium confert. Hęc Serapio. Hoc Piper sic depictum dedit Matthiolus. Sunt qui perperam Carpesium esse opinentur. Nicolaus Monard. aliud Piper longum Americum depinxit, cuius toto continentis tractu, in

PIPER longum.



quo Nata, Carthago, atque etiam in nouo Regno magnus est vsus. Id oblongum est, maiori acrimonia præditum Orientali, magisq; aromaticum, ac iucundiore odore quàm Capsicum: quinetiam Piperi nigro tum sapore, tum suauitate præferendum. Altc cuiusdam plantæ fructus est, oblongus est, crassitudine quidem funiculi, & dimidij pedis longitudine, veluti granulis multis constans, circa pediculum oblongum, cōtinuo & coniuncto ordine dispositis, veluti in semine plātaginis, quibus ademptis pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturefcit, & nigrescit. Calidus est tertio gradu.

## CARDAMOMVM. CAP. XXXVIII.

Nomina  
Lib. 1. c. 5.

*Cardamomus dr. quini  
aliam ex Amom.  
natura particeps*

Lib. 12. c. 13.

Lib. 1. c. 156.

Genera.

**K**ΑΡΔΑΜΟΜΟΝ Græcè, vt Latine Cardamomum, Arabicè Cordumeni vocatur. Dioscorides de Cardamomo tractans id non describit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimum, qualèque illud sit, docet his verbis. Cardamomum optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoròque deuehitur. In India quoque & Arabia provenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, oclusum farctumq; (Quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput feuens. Plinius de eodem aliter hæc scripsit. Simile his (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur eodè modo & in Arabia. Quatuor eius genera. Viridissimum ac pingue, acutis angulis, contumax fricanti, quod maximè laudatur. Proximum è rufo candicans: tertium breuius atq; nigrius. Peius tamen varium, & facile tritu, odorisque parui, qui verus Costo vicinus esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Quod semine oblongo dixit Plinius, de seminis conceptaculo siue calice intelligendum videtur. Ex quibus verò auctoribus quatuor eius genera faciat, nescio. Dioscorides enim, Galenus & ceteri Græci vnus tantum Cardamomi meminerunt. Quod maximè laudari ait viridissimum ac pingue, acutis angulis, Dioscorides requirit oclusum plenumque, & *δυσόρρωτον*, id est, frangenti contumax, quod Plinius contumax fricanti, vt fortasse legendum sit contumax frianti. Auicenna de Cardamomo duobus distinctis capitibus tractauit. Priore de Cardamomo, id est, Sacola, de quo postea dicemus: altero de Cordumeni, id est, Cardamomo. Quo capite easdem planè vires ei assignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est, de Græcorum Cardamomo Auicennam hîc verba facere. Item Serapio nomine Cardamomo eadem prorsus refert quæ Dioscorides & Galenus de suo Cardamomo. Sed Cardamomumne Græcorum sit quod vulgò in Officinis habetur, id in cōtrouersia est. Matthiolus tria Cardamomi genera ad nos adferri scribit, maius, medium, & minus. Maioris inuolucrum fici faciem refert, materia compactum tenaci, lenta ac laui, Indicæ nucis inuolucro, aut Palmæ elates non absimili, staminiibus multis per longitudinem discurrentibus. Intus semine farctum est subrubro colore, granis inæqualibus, multis intercurrentibus membranibus albicantibus, quibus semina conteguntur, quæ Melegettas quidam appellauere, quòd Milium Indicum referant, quod Itali Melegam vocant, saporis acuti, odoris iucundi ac suauis, vnde Grana Paradisi à multis vocitantur. Medium folliculo contegitur oblongo, triquetro, striatòque, retuso in summitate cacumine, in quo semen conditur, quoque



## CARDAMOMI species, Matth.



quoque obvolūtū, oblongum, pressum, canaliculo quodā altera parte diuidū, multis transuersim intersecantibus lineis, colore ex albo rufescente. Minus folliculo constat breui, facie triangulari, fagum ferē nucleī effigie, obtrusioribus tamē angulis, media intus dissepiente

membrana. Vtrinque semen est altera parte caua linea diuissum, subrotundum & tactu subsasperum. Omnium semen est fractu facile, acre, cum quadam odoris saporeque suauitate, & sine vlla amaritudine. Maius tamen acrius est, & aromatis quid magis respiciens. Minus vt medium acrimoniae vehementia superat, ita & odoris fragrantia. Maius Cardamomum videri possit, inquit Matthioli, id esse quo veteres Graeci vsi sunt, quod suo ē Cardamomo apud Galenum folliculos abiciat Zeno, & quod in Theriaca carmine descripta folliculorum Cardamomi mentio fiat.

Lib. 1. Antidot.

Lib. 7. com. pos. med. loca. cap. 3.

Præterea alio in loco Galenus ex Pamphilo myropola transferens Cardamomi delibrari meminit. At repugnat sapor, in quo nulla prorsus amaritudo percipitur, quæ in Galeni Cardamomo adeo euidens est, vt eo vermes intestinorum necari afferret. Adhæc illius sapor suavis est, nec caput tentat, nec frangenti contumax est, sed dentibus facillimè cedit. Quare maius illud Matthioli Cardamomum, veterum Græcorum Cardamomum minimè fuerit: neque etiam medium, neque minus, id quod ex sequentibus perspicuum fiet, quibus de Cardamomo vulgari Officinarum dicemus potissimum ex Garcia. Quod Cardamomum vocant, inquit, aroma est in India notissimum, ob frequentem eius vsum, cuius etiam magna pars in Europam, Africam, & Asiam deuehitur. Quam verò recte sit illi Cardamomi nomen inditum, alius disceptandum reliquit. Certè Auicenna peculiare scilicet caput de Saccolaa, quod duūm generum esse tradit. Alterum Saccolaa quebit, id est, magnum, alterum Saccolaa ceguer, id est, minus. His nominibus cognitum esse vtrumque Cardamomum cum Medicis Arabibus, tum mercatoribus. In Malabar vocatur *Etremelli*, in Zeilan *Engal*, in Bengala, Guzarate & Decan interdum *Hil*, interdum *Elachi*, idque inter Mauritanos nam a gentilibus indigenis omnium supra dictarum provinciarum *Dore* nuncupatur. Quæ diuersitas & nominum confusio multis errandi occasionem præbuit: alij enim Indicis vocabulis, alij Arabicis vsi sunt. Nam quod Serapio alterum Saccolaa, alterum Hilbane vocat, mendosum est, & Hil duntaxat scribendum. Quod si Bane quis adici vellet, potius Radicendum censet Garcias, quod lingua Canarina magnum significat. At Serapio nomine Hilbane Cardamomum minus intelligit. Nihil igitur aliud est Saccolaa omnium Arabum, aut Saccule Auicennæ, aut Elachi, quam quod vulgo Cardamomum vocant Officinae, veteribus tum Græcis, tum Latinis incognitum, de quo sic Auicenna. Saccolaa quid est? Aliud est magnum sicut Cicér nigrum, quod cum frangitur, interius habet granum album, mordicans linguam sicut Cubeba, in quo est aromaticitas. Et aliud est paruum sicut Lens, aromaticum etiam. Serapio etiam de vtraque huius Cardamomi specie ex auctoritate Isaac fufius agit. Nascitur, & fertur auctore Garcia, leguminum modo, altitudine quandæ summa, cubiti, in quo dependent siliquæ parua granula interdum vsque ad viginti continentes.

Lib. 1. Aro. Indic. cap. 24.

Nomina

Cap. 64. simpl.

Lib. 2. c. 155. Forma.



*Locus.**Electio.*

nentes. Prouenit vtrumq; in India præsertim ab Emporio Calecut vsque ad Cananor: tamen aliis etiam locis Malauar, & in Iaoa nascitur, non tamen adeò copiosum, neque cortice tam candido. Optimum censetur minus, quod odoratus est altero, & facultate maius dici potest. Id veterum Græcorum Cardamomum esse nequit. Nam Galenus scribit Cardamomum non esse tam calidæ facultatis, quàm Nasturtium, sed suauius & magis fragrans cum quadam amaritudine. Quas notas omnes, præsertim amaritudinem Cardamomo nostro non conuenire experientia docet. Dioscorides verò commendat quod ex Comagene, Armenia, Bosphoróque adfertur (tamen si in India quoque & Arabia prouenire dicat) eligendumque plenum, frangenti contumax, gustu acre, subamarum, odore caput tentans. Nostrium contrà in regiones illas deferitur, ex quibus Dioscorides suum deferri scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neque amarum, neque gustu adeò acri vt Caryophylla. Neque vllum ex Plinij Cardamomis cum nostro conuenit, quod fragile esse debet, siliqua candicante, granis intus nigris. Ex iis etiam satis liquet errasse eos qui Capsicon siue Siliquastrum pro Mauritani Cardamomo exhibuerunt. Item eos qui Melegetam Cardamomum Dioscoridis esse putant, nam Melegeta Dioscoridi ignota fuit: quique Cardamomum maius coloris esse cinerei aiunt, Nigellæq; id tertium genus, quod in Officinis habetur, quoniam Nigella in his omnibus prouinciis non nascitur. Quod verò Melegeta Cardamomum minus non sit, satis ex vtroq; genere quod in India nascitur perspicuum est, quorum alterum Cardamomum, vt vocant, maius est, alterum minus, eiusdem tamen formæ, & magnitudine duntaxat differentia. Multi vsus est in his prouinciis in quibus prouenit. Etenim cum Betre (vt iam diximus) manditur, pituitaq; caput & stomachum expurgat, & Serapiis admiscetur. Hæc ex Garcia. Scribit Auicenna Saccola calidum & siccum esse tertio gradu, cum calore adstrictionem illi inesse, præcipuè in cortice. Conferre vomitui & nausæ cum mastiche & aqua vtriusq; granatorum. Serapio verò tradit Cardamomum maius minore minus esse acre, & maiore adstringendi vi præditum, præcipuè cortices & folliculos. Calidum siccumque esse primo gradu, resolueret, ventriculum roborare, concoctionem iuuare, valere ad syncopem & vomitus maximè cum suo cortice & folliculis, cum mastiche, ligno Aloës, succo Menthæ & vino granatorum. Minus eodem gradu calidum, & iisdem viribus præditum, sed subtiliorum partium: quare concoctionem magis iuuare, gutturis, pectoris & ventriculi superuacuos humores magis exsiccare. Græcorum verò Cardamomum, auctore Dioscoride, calfaciendi vim habet. Potum ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum resolutionem. Item ad rupta, vulsa: latas ventris tineas excutit. Ex vino autem potum renibus, difficultati vrinæ, à scorpione ictis, neque non omnibus venenum vibrantibus auxilio est. Cum cortice radicis Lauri epota drachma calculos comminuit: partus suffitu enecat, scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorum spissamenta additur. Galē-

Ruell. lib.  
1. cap. 5.Lacun. in  
5. cap. lib. 1.  
Dioscori.*Vsus.**Temper.**Vir.*

Lib. 1. c. 5.

Lib. 7. f. 6.

nus, Cardamomum, inquit, est facultatis admodum calidæ, non tamen vsque adeò vt Nasturtium, sed quantò suauius, magisque fragrans est Nasturtio, tantò & imbecillius ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneum est, vel ipsum per se illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cum aceto valenter psoras deterget. Apud Indos solo eo aut cum Beitele mixto ad oris fetorem, pituitam purgandam, & stomachum roborandum maxime opere commendatur.

CVBEBÆ.



## CVBEBÆ. CAP. XXXIX.

**N**CTVARIVS κομβέβας fructus vocat, quos nos Cubebas. Arabes Me- Nomina  
 dici *Cubebe* & *Quabebe*, vulgus *Quabebechini*, in Iaoa ubi frequens na-  
 scitur *Cumuc*, reliqui Indi præterquam in Malayo *Cubabchini*. Non  
 est autem nomen huic fructui inditum quod in China nascatur, quia  
 ex Cunda & Iaoa, ubi plurimus est, in Chinam perferatur, sed quia Chineses qui  
 Oceanum Indicum nauigabant, hunc fructum, quem in supradictis insulis eme-  
 rant cum aliis mercibus, in alios maris Indici portus & emporia transuehebant.  
 Siluestris est planta & sponte nascens, neque multorum generum, ut quidam pu- Forma.  
 tauerunt, Malo vulgari similis, minor tamen, foliis Piperis, sed angustioribus, per  
 arbores Hedera, aut verius Piperis modo repens, non Myrti effigie, neque foliis  
 Myrto similibus. Fructus racematim coheret, non ut in vua coaceruatus, sed  
 singulis granis ex singulis pediculis pendentibus. Flos est odoratus. Piperis ge-  
 nus non est, quoniam plurimum Piperis ex Cunda aduehitur, quod nihil differt à  
 Maluatico, hic verò fructus minima quantitate istuc nascitur, qui cum ipsa planta  
 diuersi generis est. Cubebarum rarior vsus est in Europa, nisi in medicamento- Vsus.  
 rum compositionibus: apud Indos verò frequens est earum in vino macerata-  
 rum vsus ad excitandam venerem, tum etiam in Iaoa ad excalfaciendum ventri-  
 culum. Tanto autem in pretio est hic fructus iis in locis in quibus nascitur, ut  
 eum incolæ decoquant, antequam efferri sinant, veriti ne alibi factus nascatur.  
 Hinc fortasse sit, ut corruptioni magis sit obnoxius in Europa. Id quod à Lusi-  
 tanis fide dignis se accepisse ait Garcias, qui longo tempore in Iaoa insula habi-  
 tauerant. Multi Auicennæ, Serapionis, Actuarij auctoritate nixi, Cubebas le- Cubebæ  
non sunt  
Carpesium.  
L. 1. c. 34.  
Lib. 7. sim.  
 gitimum Galeni Carpesium esse censuerunt. Etenim Auicennæ de Cubebis scri-  
 bens, ea omnia ferè exscripsit quæ à Galeno de Carpesio dicuntur. Serapio Myr-  
 tum siluestrem siue Ruscum Dioscoridis, & Galeni Carpesium eodem Cube-  
 barum nomie, eodémque capite descripsit. Actuarius Mauritanorum nomi-  
 na secutus in quibusdam medicamentis Carpesium miscet, quod Barbaris κομβέ-  
 βας vocari ait. At illorum Cubebæ à vulgaribus & Officinarum nostrarum Cu-  
 bebis permultum differunt: neque enim iis Rusci historia conuenit, neque fru-  
 ctus cum sint Galeni Carpesium dici possunt, de quo scribit, λεπτά τε καὶ τὰ  
 χαλκῶν, παρὰ πλῆθος τοῖς ἀνθρώποις τὸ κινναμώμους, id est, tenuia esse sarmenta, Cin-  
 namomi virgultis similia. Et alibi, Carpesium simile esse Phu, non gustu tan-  
 tum, sed & facultate. Nec minùs errarunt qui Cubebas Viticis semē esse asserue-  
 runt, cum vtriusque historia & facultates plurimum dissideant. Cubebæ co-  
 stræ cum odoratæ sint, & præter odoris gratiam gustu acrimoniam & amaro- Tenuis  
est.  
 ris tantillum relinquunt, dicere possumus eas excalfacere initio tertij ordinis, &  
 in fine eiusdem exsiccare. Quare languentem ex pituita ventriculum, vel ex  
 flatibus roborare, pectus à lentis crassisque humoribus expurgare, lienem iuuare,  
 flatu discutere, & frigidis vteri malis auxiliari. Diu cum mastiche man-  
 pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant.

## AMOMVM. CAP. XL.

**Q**RÆCIS ἀμύμον, Latinis etiam Amomum dicitur, Arabibus *Hame-* e. uox India ex quo  
hinc hinc egi de flos  
Nomina  
 nus siue *Hamana*. De hoc breuiter sic Dioscorides. Amomum par-  
 uus est frutex, ex ligno sese conuoluens in racemi modum: florem ha-  
 bet paruum ceu Violæ albæ. Folia Bryoniæ similia sunt. Id in Arme- Forma  
 nia, Media, & Ponto nasci innuit Dioscorides, cum dicit. Optimum Armeniacum  
 aureo Locus.



aureo colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicum, quia in campestribus & aquosis nascitur, infirmius est. Magnum autem & subviride est, tactu tenerum, frutice vinoso, odore Origani (*ὀρυγανίζον* expresserunt vetus interpres & Hermolaus. Codices vulgatiore habent *ωρυγανίζον*, odore Rutæ:) Ponticum verò subrufum, parvum, fragile, racemosum, fructu plenum, & odore nares feriens. Adulteratur herba simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia flore Origani. Plinius de eodē hæc tradit. Amomi vna in usu est, Indica Vite Labrusca (rectius fortasse ex Indica Vite) ut alij existimauere, frutice myrtoso (fibroso Dioscorides) palmi altitudine, carpiturque cum radice, manipulatim leniter componitur protinus fragile. Laudatur quàm maximè Punici mali foliis simile; nec rugosis, colore rufo. Secunda bonitas pallido. Herbaceum peius, pessimūq; candidum, quod & vetustate euenit. Prærium vna in libras. x. l. x. friato verò Amomo. x. l. viii. Nascitur & in Armeniæ parte, quæ vocatur Otene, & in Media, & in Ponto. Adulteratur foliis Punicis, & gummi liquido, ut cohæreat, conuoluaturque sese in vna modum. Est & quæ vocatur Amomis, minùs venosa atque durior, ac minùs odorata: quo apparet aut aliud esse, aut colligi immaturum. Idem quod Dioscorides Amomum Plinius intellexisse videtur, cum Indicā Labruscam esse ait, cui folia Viris albæ tribuit, atque eosdem natales. Theophrastus, Cardamum, inquit, atque Amomum, alij ex Media, alij ex India cum Nardo & reliquis, aut plurimis aduehi narrant. Sed de Amomo magna est inter auctores contentio. Alij verò Amomo nos carere existimant, eiq; ex Galeni præcepto Acorum substituunt. Alij Hierichuntinam rosam Amomum esse contendunt, magno sanè errore, quod folia Bryoniæ non habeat, nec odorata sit adeo ut nares feriat, neque Origanum respiciat, sicuti Amomū. Quidam, inquit Matthiolus, ex Gargano Apuliæ monte pumilum quoddam semen deferunt, colore nigro, odore Melanthij, paululū aromaticum, gustu acre, quod pro legitimo Amomo vendunt. At Dioscorides seminis Amomi non meminit, sed Amomum racemosum, id est, ex ligno se conuoluens in racemi modum dixit. Quare nos vero Amomo carere peritiores censuerunt. Garcias historiæ Aromatum Indicorum auctor, de Amomo scribens narrat se percontatum aliquando à quodam pharmacopœo Hispano, sed religione Iudæo, qui Hierosolymis habitabat, quid esset Amomum. Eum respondisse Arabicā linguā *Hamama* nuncupari, quod pedem columbinum significat, stirpem hanc nouisse, quam tamen apud Indos non vidisset. Postea se euocatum à Nizamoxa Rege in Decan potentissimo, Medicos eruditos tum Persas, tum Turcas, quos semper magnis stipendiis domi alebat, interrogasse num Amomum haberent, dixisse illos istic quidem non nasci, sed inter alia aromata quæ ad Regem ex Asia, Persia, & Arabia conficiendis alexipharmacis perferrentur, Amomum etiam aduehi: cuiusque ramulis se ab eis donatum, id cum Dioscoridis descriptione contulisse, & venustissimè quadrasse, ac, licet iam ficcum, pedem columbinum representasse. Sed eius figuram nec prolixiore oratione, nec pictura Garcias expressit. Eius verò Scholiastes nobis ut hîc picta est exhibuit, ad Valerandum Doræum diligenter & eruditum pharmacopœum Amomi, item Amomidis

Lib. 9. hist.  
cap. 7.

Lib. 1. c. 31.

# AMOMVM & Amomis.



Amomum.



Amomis.



Amomidis nomine ex Ormuz celebri sinus Arabici emporio missam. Neutram tamen cum Plinij & Dioscoridis Amomo conuenire ille putat, nisi id fortè sit quo se Garcias donatum, quòdque pedem columbinum referre asserit. Nam hæc fragmenta, aliquot sunt ramuli, foliolis quibusdam adeò frequentibus onusti, vt ex folis foliis constare videatur (veluti in Tithymalo paralyo videre licet) quæ in extremo ita sunt disposita, vt flosculum aut rosulam efforment. Ramuli isti simul compacti non ineptè pedem columbinum (qualis columbarum est, quæ pedes, vt ita dicam, plumatos habent) referre videntur, nullo tamen singulari odore aut sapore præditi sunt. Cæterum cum auctor hic pedem columbinum memorat, atque etiam Serapio, minimè intelligunt id Geranij genus, quod Herbarij Pedem columbinum vocant, sed Amomum ipsum, vt ex Serapionis descriptione perspicere licet. Quare ineptissimè faciunt, neque ex Serapionis aut aliorum Arabum auctoritate, qui Pedè columbinum vulgarem Herbariorum, Amomo substituunt. Huius vires Dioscorides his ferè verbis explicat. Vim habet calfaciendi, ad tringendi, exsiccandi. Somnum allicit, & illitum fronti dolorem sedat. Inflammationes & meliceridas concoquit & discutit. Iuuat quos scorpius percussit ex ocimo illitum: podagricis confert: inflammationes oculorum viscerumque lenit ex vua passa: ad vuluarum vitia in pessis aut in fesionibus vtile est. Decoctum iocinoris, nephriticis, podagricis potu conuenit. Antidotis miscetur, & preciosissimis vnguentis. Amomum, inquit Galenus, Acoro similem facultatem obtinet, nisi quòd Acorum siccius sit, maiore autem concoquendi facultate Amomum.

Cap. 269. simpl.

Lib. 1. c. 14.

Lib. 6. sim.

ASPALATHVS. CAP. XLI.



ΣΠΑΛΑΘΟΣ Græcis & ἐρυσιςτρον ῥον, Aspalathus Latinis dicitur & Erysisceptrum, Arabibus *Daschichahan*. Aspalathus, vt describit Dioscorides, frutex est lignosus, multis spinis horrens. Nascitur in Istro, Nisyro, Syria & Rhodo, quo ad vnguentorum spissamenta vnguentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubescens, aut purpurascens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est alterum genus candidum, lignosum, inodorum, quod deterius habetur. Plinius non eadem omnino tradit. In eodem tractu Aspalathus nascitur spina candida (& lignosa, Dioscorides) magnitudine arboris modica (Dioscoridi frutex est) flore Rosæ (id prorsus omisit Dioscorides.) Radix vnguentis expetitur (lignum Dioscor.) Tradunt in quocunque frutice curuetur arcus cælestis, eandem quæ sit Aspalatho suauitatem odoris existere, sed in Aspalatho inenarrabilem quandam. Quidam eum Erysisceptrum vocant, alij sceptrum. Probatio eius in colore rufo, vel igneo, tactuq; spisso (rubescens vel purpurascens Dioscor. tactuque denso & graui) & odore castorei. Dioscorides vides habet, id est, odore iucundo. Idem alibi oscitanter Orientalè alium à Rhodio facit, his verbis. Per Hispanias quidem multi & inter odores, & ad vnguenta vtuntur illa (meliùs, alia) Aspalathu vocantes. Est sine dubio hoc nomine spina filuestris in Oriente, vt diximus, candida, magnitudine arboris iustæ. Sed & frutex humilior, & quæ spinosus in Nisyro, & Rhodiorum insulis (legendum ex Dioscoride in Nisyro, Istro, & Rhodiorum insula) quæ alij Erysisceptru, alij Adipatheon, siue Dipsacon, siue Diacheton vocant (fortè meliùs Adipsacon, quoniam locis sitientibus gaudet, & Diareton, id est, eximie magnificæq; virtutis.) Optimus qui minimè ferulaceus (grauis & densus Diosco.) rubens, & in purpuram vergens detracto cortice. Nascitur pluribus locis, sed non ubiq; odoratus. Auicenna etiam à Dioscoride dissentit, cum ait Aspalathum arborem esse crassam, quæ spinas grandis habet, qua vnguentarij ad vnguentoru spissamenta vtuntur. Aspalathu quidam Santalum rubru esse crediderunt. Sed eos falli constat tum ex iis quæ de Santalo

Nomina

Vide Gay. n. 93.

Lib. 1. c. 19.

Forma.

Locus.

Electio.

Lib. 12. c. 14.

Erysisceptrum.

Lib. 24. c. 13.

Diacheton spisso.

Diacheton in Spania.

Diacheton in Hispania.

Diacheton in Hispania.

Diacheton in Hispania.

Diacheton in Hispania.

Diacheton in Hispania.

Diacheton in Hispania.



Aspalathi  
genera.

Lib. r. c. 19.  
Temper.  
Vires.

Lib. 6. sim.

diximus, tum ex multorum qui ad Orientales Indias aliasq; Noui orbis terras nauigant scriptis, qui omnes vno consensu affirmant se continuas Santalorum rectorum & procerum siluas vidisse. Aspalathus verò humilis est frutex, suauiter odoratus, amaricante gustu. Quæ notæ Santalo non cōueniunt, neque enim odoratum est, nisi odorem ex albo pallidōque & aliis aromatis, quibus permixtum fuerit, contraxerit, qui breui euanescit, neq; amarum est. Alij pro vero Aspalatho id vñparūt quod Rhodium Oleastrum appellant, quo olim pharmacopœi Agalochi vice utebantur: cuius materies cum partim nigra sit, partim ex nigro flauo-que venosa, neque rubra, neq; subrubra, præterea cum ex Olearum sit genere, vt Rhodij narrant, in Rhodo insula frequens, & oliuas ferat, cum etiam nullis spinis armata sit, neque detracto cortice rubescat, Aspalathus dici nullo modo potest. Ac, vt verum fateamur, Officinis olim omnibus hodie quoque permaltis inco- gnitus fuit geminus Aspalathus. Verum recentiorum diligenti peruestigatione factū est, inquit Pena, vt tres lignorum differentia nobis innotueriat, quantum quilibet Aspalathi nomine digna sit. Primam vidisse se ait Veronæ, & dono accepisse à do- ctis pharmacopœis Francisco Calceolario & Andrea Bellicoeo, qui eam Thea- cis suis miscuit & doctorum Medicorum Veronensium consilio, fructum illud quod habuit, densum, solidum & compactum esse, quasi ex calissimæ fructus ina- parte resectum, radiatis fibris, graue, colore buxæ, sed saturatiore, suauissimo odo- re & pertinaci, sapore non ita amaro, nec gustu infuauit. Alteram speciem Vene- rias aduectam Rhodo, missam Nicolao Comasco erudito Medico, apud quem tum maximum truncum vidisse, detracto cortice rubentem, Taro concolorem, odore adeo fragrantem, vt quàm latè patebat cœnaculum, eximio imbueret odo- re. Tertiam albicantem foris, intus torulo subflauo, aut citreo, Santali albi & citrii simillimam: Rosam sapore nullam gustanti exhibere manifestam qualitatem, nisi tantillum calidi, quod vix gustu discerni possit. Hanc alij Aspalathi speciem ali- Oleast i Rhodij aut Santali arbitrantur. Aspalathi vires hæc sunt ex Dioscoride. Vm calfaciendi habet cum adstrictione. Vnde decoctum cum vino ad tertia oris vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida narium vlcera infla- ditur, subditum in pecto partum extrahit, aluum sistit eius decoctum, & languinis resectionem potu cohibet: vinar difficultatem inflationēque discutit. Plinius ea- dem ferè tradit. Sanat terra oris vlcera & ozenas, genitalia exulcerata aut carbū- lantia (vlcera sordida & depaſcentia genitalium, Diosco.) item rhagadiam infla- nes potu discutit, & strangurias cortex. Sanguinem reddentibus medetur decoctū eius. Aluum sistit cortex. Dilucidius verò Galenus hæc declarat. Aspalathus gustu quidem acris simul & adstringens est, facultate verò ex dissimilibus constat, nem- pe partibus suis acribus exalfaciens, partibus verò aliis, austeris scilicet, resige- rans. Quare vtriusque ratione desiccat, atque hac ratione aduersus putredines & fluxiones est utilis. Auicenna calidum esse in primo gradu, sicum in fine secundi vsque ad tertium scribit. Cætera ex Galeno & Dioscoride transcripsit.

## COSTVS.

## CAP. XLII.

Nomina  
Lib. 4. c. 15.

Lib. 12. c. 12.



**C**OSTOS Græcis dicitur, Latinis Costus, Arabibus *Coſos* sine *Cost.* Dioscorides eius genera & delectum declarat omnia descriptione. Facellit, inquit, Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate, & secundum locum sibi vendicat Indicus, plenus, & niger, & levis et pe- rula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxæ, & odore feruens. Optimus est re- cens, albus, abunde plenus, densus, aridus, a teredinibus non exesus, hanc præcedit. tia, gustu calidus ac mordens. De eodem Plinius hæc breuiter scribit. Radix & costus



(lege, radix Costi & folium) Indis est maximo pretio. Radix gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutuli. Primo statim introitu amnis Indi in Patale insula duo sunt eius genera, nigrum, & quod melius, candicans. Auicennæ species sunt tres. Arabicus est, inquit, albus, levis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis levis. Tertius est amarus, grauis odoris, qui nominatur garyophyllata. In quo à Dioscoride dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxo, & odore feruentem. Serapio de Costo omnia ex Dioscoride & Galeno exscripsit. Officinæ Arabes secutæ Costum fecere duplicem, dulcem & amarum. Dioscorides tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem ullam fecerunt. Galeno verò omnis Costus amarus est, & ex Græcis qui Costum quendam dulcem esse dicat, reperies neminem, nisi si ex recentioribus sint, qui Arabas hac in re & permultis aliis sint imitati, in quibus est Actuarius, qui dulcis Costi meminit. Hos tamen Pena excusat, quòd Costus dulcis collatione quadam cum acriore & amariore vocetur, vt eadem plantæ radix cum recentior est, mitior multò, vetustior verò amarore & feruore ingratiior facta, amara, aut inamœna dicatur. Aliam huius diuisionis causam ex Garcia in sequentibus proferemus. Vtut sit, Officinarum Costus adulterinus est: neque enim vlla est odoris suauitate, neque gustu mordens & feruidus, neque ita acris & calidus, vt etiam exulceret, vt ait Galenus, sed fusca radix, grauis, inodora, Helenij compacto concretionem ignota. Quamobrem sunt qui Zedoariam legitimam Costum esse contendunt. At hæc minùs odora, minùs aromatica est, gustuque grata. Alij Angelicam nigrum Costum siue Indicum faciunt, propter odorem suauem & insignes vires. Sed non est peregrina planta, imò Europæ familiarissima, nihil aditricionis habens, neque exulcerans. Arabici Costi radices omnibus ad stipulantibus notis se habere Matthiolus ait, à Francisco Calceolari pharmaco- pero Veronensi ad se missas, Indici verò frustum à Cecchino Martinello mis- sum, quod secum ex India detulerat, quæ cum forma tum substantia differunt:

COSTVS Indicus.



quin tamen Costi genera sint non dubitat, cum ex Dioscoride Arabicus ab Indico non pa- rum differat, hic quoque à Syriaco. Arabi- cum tamen alteri præfert. Garcias Costi hi- storiam paulò aliter descripsit. Costus, inquit, Arabibus dicitur *Cost*, aut *Cast*, in Guzarate *Uplot*, in Malaca, vbi eius plurimus est vsus, *Pacho*, & inde vehitur in Chinarum regionem. Græci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt: nam in Serapione & aliis *Chost* & *Chast* corruptum est, legendumque *Cost*, *Cast* & Costi. Huius etsi tria genera veteres consti- tuant, vt diximus, tamen Garcias vnicum duntaxat Costi genus esse tradit, atque se à negotiatoribus perquisuisse Arabibus, Persi- cis & Turcis, vbinam tanta Costi copia consu- meretur, quæ apud eos ex India exportaretur. Respòdisse maximam partem in Asia minori & Syria consumi, atque etiam apud Arabas & Per- fas. Rursus interrogatos an alius quispiam Co- stus apud eos nasceretur, id negasse. Idem per- contactum fuisse à Nizamabuci Medicis, sed ne-

Lib. a. c. 161.

Cap. 308. simpl.

In cap. 15. lib. 1.

Lib. 1 Aro. Ind cap. 35. Nomina

Cap. 308. simpl.

Costige- nus vnum



*Forma.*

gasse se Costum alium vidisse vquam, quam qui ex India ad eos deferretur. Quod autem tam diuersa nomina sortitus sit, in causa fuisse negotiatores putat, qui ex variis regionibus oriundi erant. Quod autem Arabes eius duo genera faciant, amarum & dulce, id euēnit, quod istud medicamentum cum recens est, & incorruptum, nullas amaritudinis sit particeps, candidiusque persistat: cum autem vetustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, fitque nigricans. Describunt autem Costum qui viderunt Sambuci effigie; & Arbuti aut Azimbri magnitudine, (Quid sit Azimbri nescio. Clusius Iuniperum suspicatur intelligi, quod Zimbro Lusitanis sit Iuniperus) florem odoratum ferens. Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo. Inuenitur etiam colore Buxi, cortice pallescente. Tantra odoris fragrantia pollet, ut plerisque nares feriat, & dolorem capitis exciter, gustu nec amaro, nec dulci, tamen iam senescens interdum amarescat: nam recens acri gustu est, ut reliqua aromata. Nasceitur circa Guzarate, inter Bengala, Delli & Cambaya, in Mardon & Chitor. Inde multi currus Vplot, Spica, Chryfocolla, aliisque mercibus onusti aduehuntur in Regni metropolim Amadabar, quæ in desertis sita est, & in Cambayete urbem non procul à mari: vnde postea per maiorem Asiam, aliquam Africæ partem, & vniuersam Europam deferuntur. Hoc vtuntur in multis medicamentis Indici Medici. Nec mirum si eius loco vtuntur adulterino Officinæ procul à Lusitania disitæ, quoniam exigua admodum quantitas in Lusitaniā deferretur. Sed hinc obseruandum est, quod & annotauit Clusius, veterum Costum radicem fuisse, non lignum. Plinius enim radicem dixerat appellauit. Dioscorides cum Helenij Comageni radicibus adulterari scripsit, radicem esse innuit: nam trunci aut rami lignum tantam cum radicem affinitatem, ut radice adulterari possit. At Garcie Costus, ut descriptio indicare videtur, nihil aliud ferè quàm lignum est, suo cortice contectum, antequam Lib. I. c. 22. certè minimùm corticis habet. Et de Pipere scribens Costum radicem non esse, sed lignum asserit. Quare aut veterum Costum non describit, aut Arabum Costus (si is quem describit illorum Costus est) à Græcorum veterum Costo diuersus videtur. Costi genus Antuerpiam è Lusitania adfertur, ut & affirmat Clusius, solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum cinerei coloris. Odorata est admodum radix, violaceum seu irinum spirans odorem, præsertim dum manditur. Ei caulis fragmentum, quod è terra extat, sæpe inherere, conspiciunt, ferulaceum quiddam referens, & fungosam medullam continens, ut

*COSTVS Syriacus,**et Arabicus.*

perspicuum sit Costo Garcie bellè conuenire. Eius iconem ex Clusio, qualis ex sicca radice exprimi potuit, hic appinximus. Paucis ab hinc annis è Syria & Aegypto Venetias aduehi cepit radix Zedoariæ aut Zingiberis effigie, quam Valerandus Douræus materiæ medicæ peritissimus verum Costum esse iudicauit. Radix est intus candida, inquit Pena, lauis, minimè grauis, pollicem crassa, vnciam & sesquiunciam longa, hinc indetuberibus oblongis altrinsecus donata, odora, gustu acri, odore intenso & iucundo Cupressi, aut Cedri Libani quadantenus. Interdum buxæ vilitur, uti vulgata odore & sapore similis, subamara utraque, cætera similes. Inirio nomine Zingiberis siuestris vendebant. Hæc radix si genuinus Costus



Costus non est, inquit Pena, tamen quia radix est, & eximia odoris saporisque acris gratia aromatica pollet, parem Costo laudem & gratiam merito adeptam est. Pictam ex Pena hic exhibemus. Idem Pena duas alias radices Costum admodum similes depinxit à Rupellensi Medico Launao donatas, quas

*COSTVS Moluccensis*  
*corticifus.*



ille à naucleris è Moluccis redeuntibus acceperat. Horum altera maior arboris maiuscula cortex videtur, & figura Sambuci adultioris & cineracei, rugis & plicis frequens, sapore & odore æquè vehementi. Altera minor radice Solani silvestris valde similis, colore pullo diluto, gustu vrente, ut vix ardorem lingua ferre queat. Illis persuasum erat Costi speciem esse, etsi parum odora esset.

Quod ut non inficiatur Pena, ita priorem ut priorem retinet, & hasce ambas Moluccenses minùs odoras iudicio studiosorum sic pictas subdidit. Costo vis excafactoria, auctore Dioscoride. Vrinam ciet, menses pellit,

*Vires &  
Temper.  
Lib. 1. c. 19.*

valvæ morbis tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus vncias duas bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, convulsa, inflationesque ex vino & Absinthio. Venerem ex mulso stimulat, latus ventris tineas pellit ex aqua: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie cum aqua vel melle illitus emendat. Additur in antidota & malagmata. De eo sic Galenus. Costus leuiculam planè amaram, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem, simul & facultatem continet, adeò ut etiam exulceret. Vnde ipso cum oleo perfricant corpus ante accessiones in rigoribus per circuitus redeuntibus. Sic verò etiam in resolutis & ischiadicis, atque in summa in quibus excalescere partem quamvis, aut ex alto in superficiem attrahere aliquem humorem opus est, ad Costum confugitur. Eadem de causa urinas mensesque prouocat: & ad rapta, convulsa, ac laterum dolores conuenit. Porro ob amaritudinem quæ illi inest, lumbricos latos enecat. Ob eandem & ad contractas velut à Sole maculas cum aqua aut melle vsurpant. Inest item flatuosa illi humiditas, per quam & venerem excitat cum vino mulso.

*Lib. 7. sum.*



Nomina

Cap. 172.  
simpl.

Forma.

Locus.

Temper.

Vires.

Caly. Jr. Zedoaria

Li. 2. c. 734.

Cap. 743.

Cap. 736.

Cap. 161.

simpl.

Lib. 7. c. 3.



VAE Officinis Zedoaria, Græcis recentioribus *Q*as Nepa dicitur, iisdem Officinis Zurumbet & Zerumbet. Quæ duæ radices peregrinæ, ex facultatibus potius quàm ex ipsarum plantarum partibus notæ notis, Græcis veteribus incognitæ fuerunt. Quare ex aliis petendæ descriptiones. Serapio de iis sic scribit ex auctoritate Isaac. Zurumbet, id est, Zedoaria, sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ tum facie, tum magnitudine, verum sapore & colore Zingiber æmulantur. Deferuntur ex Chinarum regione. Excalfacit & siccatur ordine secundo. Flatus discutit, & propria quadam facultate impinguat. Post sumpta graue virus animæ, quod allium, cepa, vel vinum excitaauerit, abigit. Venenatorum animalium moribus confert, aluum sistit, vteri abscessus resoluit, vomitiones reprimat, coli dolores à flatu ortos mulcet. Auicenna Zedoariam dixit esse portiones similes Aristolochiæ, minores tamen. Addit meliorem esse illam quæ cum Napello crescit, eiusque vicinitate Napelli vires plurimum debilitari. Aliquantò post Zeduar siue Algieduar Zedoariam esse opinatur. Alio capite Zurumbet ait esse lignum simile Cypero, sed maius, & minus odoratum, easdemque eius vires recenset, quas Serapionem ex diuersis auctoribus suo Zurumbet, id est, Zedoariæ assignare diximus. Hoc tantum distant, quod Auicenna Zurumbet calidum & siccum esse ordine tertio ponit, Aben Mesue apud Serapionem calidum & siccum secundo duntaxat. Hic conferre moribus venenatorum, ille valde conferre moribus venenatorum permittit, ita ut ad Zedoariam proximè accedat. Quibus verbis innuit aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis. Serapio alio capite Zurumbet aliud describit hisce planè verbis. Zurumbet est ex speciebus odoriferis, & propter hoc admiscetur confectionibus aromaticis, & est calidum & siccum prope tertium gradum, & est in virtute sua simile Cassiæ lignæ & Cubebis. Et dixit Cassidonium. Si non habes Cinnamomum, pone pro eo Zurumbet. Hæc se ex Galeno & Paulo transfuisse ait, ne detracta quidem aut addita vna litera. In quibus ut falsò Galenum citat, ita Pauli orationem, qua de Arnabone agit, ad verbum conuertit. Sic enim ille. Arnabo ex aromaticis est, vnde maxime in vnguenta miscetur, ut quod calidæ ac siccæ sit facultatis in tertio ordine, Cassiæ aut Carpesio similis. Vnde etiam Poesidonius (perperam in Serapione Cassidonium legitur pro Poesidonius) Cinnamomo non præsentem, hoc vsum se esse dicit. Perspicue videre licet Serapionem Zurumbet cum Pauli Arnabone eundem statuere. His subiungit descriptionem Zurumbet auctore Isaac. Est arbor magna quæ nascitur in montibus, in Oriente, nullum ferens fructum, folia verò longa in viridi citrina, foliis Salicis similia, ramos eiusdem coloris: odore est Citri, calida & sicca, adstringens. Resoluit & aluum sistit. Inest & ei partium subtilitas. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zurumbet & Zedoariam easdem esse radices, nisi deprauata sint eius exemplaria, item aliud Zurumbet arborem: Auicenna verò diuersas esse plantas, ut qui Zedoariam radices Aristolochiæ radicibus comparat, Zurumbet lignum Cypero nisi hic sit interpretum error, qui Zurumbet Aristolochiæ radicibus, Zedoariam Cypero comparasse debuissent, præsertim cum ei quæ Cypero similis est, easdem prorsus tribuerit vires quas Serapio Zedoariæ, ut ostendimus. Quod & indicat Bellunensis, cum scribit Zedoaria apud Arabes quosdam appellatur Cyperi Indi, quia nascitur in India, & assimilatur Cyperis. Hæc Arabes de Zedoaria & Zerumbet literis mandarunt. Ex quibus expedire oportet, an duæ radices, quæ in Officinis Zedoariæ & Zerumbet nomine veniunt,



naunt, ea sint quibus vsi sunt Arabes. Qui dubitat, imprimis descriptionē competere negant, quod nostra vulgaris radix sit oblonga, laevis, foris candicans, intus ex flauo rufescens, aromatica, amara, figura Zingiberis, valde acris. Matthiolus radicem hanc ob id non esse Zedoariam non censet, quod longa sit: esse enim quasdam radices longas, alias rotundas Aristolochiae similes, quales à Calzolario pharmacopoeo Veronensi se accepisse narrat, quae Zedoariae nomine comprehenduntur, quod eiusdem sint saporis, coloris, & odoris, nec nisi forma differat, ut quemadmodum Aristolochiae, ita Zedoariae duo sint genera, alterum longum, alterum rotundum. Pena & Lobellius hac de re ita statuunt. Zedoariam & Zerumbet ut

**ZERUMBET** Serapionis, & Zedoariae eiusdem radices partes.



nominis, sic eiusdem radices partes esse, nec secus inuicem differre, quam Cyperum rotundum vel longum à suis coherentibus radicibus anfractibus: cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antuerpiae in Myropolio simplicium ditissimo Francisci Pennini. Eoque Serapionem Zedoariam eandem cum Zurubet dixisse, ut quemadmodum Doronicis, Aristolochiis & Oenanthis euenit, variam nancisci radices molem, alias oblongam, teretem, alias orbiculatam & nodosam, sic euenisse Zedoariae, cuius naturae, sicut & nominis particeps est Zerumbet, quia amaror, feruor, odor, color, ingratus vehementior gustus, modus, durities, duratio eadem, & vsus ad colicos cruciatus, praesertim aduersus venena certissimus. Vnde Zedoariae nomen fluxisse ingeniose coniectatur Pena. Indeque videntur Auicenna, Serapio, ac Arabes nonnulli designasse antidota multa, ampliore, ut solent, nominis Zedoariae ambitu, ut quemadmodum Bezardica generatim vocarunt quae vitam tuentur, ita celebrem quandam arborem foliis salignis, odore Citri, eodem Zedoariae aut Zerumbet nomine donarint. Eo etiam significatu Auicenna dixisse meliorem esse Zedoariam, quasi dicat

Li. 2. c. 734.

Antidotum, quae radicibus Napelli adnascitur, eiusque & aliorum venenorum esse Theriacam, qualem se expertum fuisse ait, & copiosam eruisse in variis montibus, quod fabulosum esse Garcias dixit. Ergo triplicem Zedoariam Arabes innuere voluisse Pena existimat, oblongam vulgatiorem ad Cyperum propius accedentem, & huius speciem Zerumbet rariorem nobis rotundam dictam, tertiam egregiam illam arborem, hodie incognitam. Non desunt qui Zedoariam Officinarum Costum Arabicum, vel Syriacum Dioscoridis esse opinentur, quod multa ei Costi nota satis quadrare videantur. Diuersa prorsus Zedoariam nobis enarrat Garcias, quam Geiduar vocat Auicenna, magnitudine glandis, eiusdem ferè formae, colore sub lucido. In regionibus Chinesisum provinciae finitimis nascitur. Ait magno emi, nec facile inueniri, nisi apud circumforaneos quosdam & circulatores, qui peregrinationibus, & stipem emendicando vitam sustinent. Ab his (quod mirum videri debet) Reges & magnates Geiduar emere. Hoc Dioscoridi incognitum fuisse, atque etiam Auicennae. Porro ad plurima utile esse, praesertim aduersus venena, & venenatorum animalium ictus morsusque. Id Europae quoque hodie ignorum esse ex descriptione liquet, nec facile cognosci posse ob has quas adfert causas. Nam

Li. 1. Arom. Indic. c. 13.


Li. 1. Arom. Ind. ca. 44.



Zedoaria nostra nihil minus est quàm hoc Geiduar. De Zerûbet verò hæc tradit. Arabibus, Persis, & Turcis *Zeruba* vocari, in Guzarate, Decan, & Canara, *Casho-rad*, in Malauar *Chua*. Copiose provenit in Malauar prouincia, videlicet in Calecut & Cananor, tum sata, tum sponte in siluosis earund. in regionum locis, vnde à multis Zingiber siluestre dicitur, nec id sine ratione, inquit, quoniam eius folia Zingiberis folijs similia sunt, maiora tamen, & magis aperta, radix Zingibere maior. Radicem erutam ait concidi & siccari, deinde in Arabiam, Persiamq; deferri, in Gida & Alexandriam, inde postea Venetias, & alias regiones transferri. Condiri etiam siccharo, & præstantiorem esse Zingibere candido. Ex quibus ille colligit Auicenna ignotam fuisse Zedoariam, vt iam diximus, solam verò Zerumbam aut Zerumbet cognitum. Cum enim vidisset radices quasdam in frustra rotunda, alias in oblonga sectas ad sinum Persicum vehi, duo genera existimasse, Zerumbam, de quo nomine Zedoariæ prius tractat, & Zerumbet, de quo postea. Hac de caussa folia quæ non viderat prætermisisse, radices quales ex India in alias regiones transferebantur duntaxat expressisse. Serapionis verò emendatos codices scribit addita expositionem Zerumbet, id est, Zedoaria, non habere, sed ab interprete adiunctam, qui differentiam inter Zedoariam & Zerumbam, siue Zerumbet ignorabat. Quæ ex eo perspicue deprehendi ait, quod Zedoariam ex Chinaram regione conuehi dicat Serapio. Certum enim esse Zedoariam in Chinaram regione nasci, ratam autem in India reperiri: Zerumbam autem copiose in India nasci. Sed quid de Zedoaria & Zerumbet sentiendum sit, item de Garcie Zedoaria iam fusius diximus. Reprehendit etiam eos Garcias, qui Pauli Arnabonem eundem esse cum Zerumbet opinantur: quia Arnabo Pauli, arbor sit procera, suauis odore fragrans. Zerumba verò graminea planta. Quæ in re ipsæmet reprehendendus est, cum apud Paulum de Arnabone scribentem nulla arboris mentio fiat, ac ne stirpis quidem, sed ex aromaticis esse, ideo in vnguento addi, & cetera quæ supra posuimus. Annotat Clusius inueniri Antuerpiæ apud quosdam aromatarios Zedoariæ genus, illis *Bloczenuar*, quod tuberosam Zedoariam significat, nuncupatum, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candicans, gustu vulgaris Zedoariæ. Eam radicem quoniam multum cum

ZERUMBET Serapionis, Clusio.

Lib. 7. ca. 5.



Serapionis Zerumbet conuenire Clusio videtur, hic exprimendam ex eodem curauimus.

# TERRA MERITA.

## CAP. XLIIII.

Nomina  
Lib. 1. ca. 4.

Forma.



EGREGIA hæc radix, Curcuma Officinis dicta, Gallis *Terra merita*, Cyperus Indicus Dioscoridis esse creditur. Sic enim ille. Aliud Cyperi genus tradunt in India nasci Zingiberis effigie, quod manducatum Croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem Psilothri vim exhibet. Quæ omnes notæ Curcumæ Officinarum aptissime conueniunt. Est enim radix Zingiberis effigie, crocei intus coloris, quæ manducata croceum colorem reddit, amara, cuius & in psilothris usus est. Sed cum Dioscorides Zingiberi radicem hanc comparet, & reuerà Zingiberi propior sit quàm Cypero, mirum est cur Cyperi speciem fecerit. Quare verisimile est eum quæ de Indico Cypero scripsit, ab aliis auditione accepisse, & speciem Cyperi esse apud quosdam



quosdam legisse, eoque fortasse minùs aptè dixisse, vt annotauit Pena, Zingiberis radices paruas, candicantes, odoratas Cyperi modo. Est enim Curcuma valde exigua cū Cyperis similitudo, cum Zingibere magna. Præterea vires quasdam similes habet (præter croceum succum quem mansu emittit) cum Zingibere, tametsi gustu ingratiore, ingratiore, facultate verò viscera ab obstructione liberandi potiore. Ideò, inquit Pena, cursores & mulierculæ cum Zingibere miscent ad icterū. Vis autem illa psilothri videtur elanguescere, longo temporis & locorum intervallo, atque teredine, cui obnoxia est, minùs tamen quàm Zingiber. Pictoribus & chymistis quàm medicamentis hodie frequentior est, attamen in electarium assumitur Diacurcuma nuncupatum aduersus agritudines inueteratas, hydropem, & cachexiam perutile. Hic non omittendū quod prudenter animaduertit Matthiolus, Curcumam Serapionis non esse eam de qua hīc agimus. Illa enim nihil aliud est quàm Chelidonium Dioscoridis. Quod vel Serapionis ipsius, vel interpretis errore accidit: nam Curcuma neque Mauritanum, neque Græcum est vocabulum. Mauritani enim Chelidonium *Kauroch* vocant: ex quo perspicuum est Curcumam pro *Kauroch* in Serapione deprauatè legi. Quod cū tum Medici, tum seplasiarij non animaduertissent, & cuiusnam plantæ hæ radices essent ignorarent, eas Chelidonijs maioris radices esse crediderunt, ob crocei succi similitudinem, quæ sunt Cyperi Indici. Quare deprauatam Serapionis lectionem secuti, has Curcumam nuncuparunt.

Vires.

In cas. lii.  
Cap. 296.  
simpl.


## CHINA RADIX.

## CAP. XLV.

**C**HINA, vt scribit Nicolaus Monard. Orientalis Indiæ provincia est, Scythijs atque Sericanis finitima. Est Chinarum regio vastissima, vt refert Garcias ab Horto, quæ ad Moscomiam vsque extendi creditur. Li. i. Arom. Ind. ca. 38. Addit Chinenses esse Asiaticos Scythas: & quamuis barbari esse existimantur, in negotiatione tamen, & in artificijs quæ manu perficiuntur esse admodum industrios, neque cuiquam regioni in literarum cognitione cedere: habere etiam leges scriptas Imperatorio iuri similes, & apud eos docti in ætate gradus & præmia, eruditissq; viris Regis, totiusque regni moderationem committi. His addit artem Typographicam tam vetustam apud illos esse, vt omnem hominum memoriam superet, & semper apud illos vsurpatam fuisse. Hæc Garcias. Scuit in tota hac prouincia, atque in lapide lues venerea, cui malo vt succurrerent, benignus Deus radices vsum dedit, quæ apud eos nascitur, à nobis à loco natali China nuncupata, quemadmodum Guayaci Noui orbis incolis, qui eodè morbo infestantur. Scribit idem Garcias plantam ab indigenis vocari Lampatan, trium aut quatuor cubitorum altitudine assurgere, cauliculis tenuibus, quos rara cingunt folia, Mali Assyrij iunioris similitudine radicem palmi lōgitudine, interdum crassam, nonnunquam tenuem, quæ recens enata admodum tenella est, & cruda & elixa mandari potest. Vnicam duntaxat plantam in Goa se vidisse, eamque perpussillam, quæ siccitate periit antequam excreuisset. Si feratur ea radix, iuxta arbores serendam esse aiunt, quoniam Hederæ modo eas scandit & amplectitur. Aliter describit Nicolaus Monard. Chinam Arundinis maioris radici similem esse, nodosam, intus albam, interdum rufescentem, foris rubram. Optimam esse recentem, ponderosam, solidam, pinguem, non cariosam, inspidam. Eius figura ex recentissima, & suis propaginibus adhuc coherente hīc expressa est, quæ demonstrat eam sub terra serpere, ac varijs ex locis teretes, ac lignosos processus emittere, quibus noua radicū aliarum soboles adnascitur, & incrementum capefit, multis & tenuibus alioqui fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit. Est autem grandior & aduolucior radix scabris & inæqualibus nodis tuberosa, cortice obscurius virente Galangæ

Eletio.





Galangæ ferè modo vestita, cum recēs est succulenta, cum exaruit fungosa, & intus laxa, è rubro dilutè pallida, quæ diutius seruata carie & teredine facillè vitiat. Quod si acciderit, mercatores foramina à teredinum erosione aut carie facta obturāt bolo Armenia aqua diluta, velut cæmento quodam, obducuntq; extrinsecus pari fraude totam radicis molem: quæ fraus & natium illius colorem ementitur, & ei pondus addit. Illam præferunt quæ ponderosa est, & quæ quantum in eius arida natura fieri potest, maximè succulenta est, quæ à teredine, carie, putredine est illasa: quibus vitiis obnoxia est, quæ recondita fuit, & in longum tempus seruata. Saporis est fatui, perinde ac Suberis cortex citra omnem adstrictionē, aut oleosa pinguisve substantiæ occursum. Est & eius decoctū prorsus insipidum, nō aliter quàm Hordei integri, colore subrubrum, seu colore vini gilui. Eam ob causam *ἄρωτον* radicem hanc quidam vocauerunt, quemadmodum & olim Græci aquam salubrem omnis qualitatē expertem.

*Locus.*

Nascitur hæc radix in China Orientalis Indiæ regione, vt dictum est, maritimis locis, Arundinis aut Vluæ palustris modo. Nicolaus Monard. auctor est etiam in Occidua India prouenire, seq; vidisse huiusmodi radices alias paruas, alias magnas, in Hispania noua à D. Frâncisco de Mendoza collectas, & recētissimas inde delatas. Decocti ex China radice propinandi, & eius vtendi hæc est ratio. Obser-

*China decoctū.*

uatis iis quæ in omnibus morbis obseruare decet, nimirum natura morbi, anni tempore, regione, sexu, ætate, temperamento ægri, atque exquisitè purgato corpore, radicis vncia minutim concisa fictili nouo imponitur: huic infunditur aqua sextarij tres, maceratur viginti horas fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis accenso ad dimidias, frigescit, colatur, atque in fictili nouo aut vitreo vale affertur. Eius aquæ calidæ vncias decem æger hauriet, duas horas aut paulò diutius sudabit: sudore deterso indusium & lintheamina mundis & calfactis mutabit, postea in lectulo duas aut tres horas perdurabit: deinde vestitus calidè se in cubiculo continebit. Circiter vndecimam prandeat. Prima mensa iusculum sumet, deinde pullum coctum, aut gallinæ quartam partem, aut veruecinam aliquando elixam, aliquando assam cum pauco sale: pro bellariis carnes Coroneorū, aut quid simile. Poterit & simpliciter iusculo passas vuas, aut pruna passa cocta edere. Cum cibis panis bene cocti crustis, aut biscocto vescetur. Potus erit eadem aqua quam ieiunus sumpsit, aut diluor. Si inter pastus bibere velit, eadem aqua cum conferua aliqua propinabitur. Qui igitur hac radice vtuntur, tenui illa victus ratione non egent, qualis in Guyaci vlu requiritur. Abstinentum tamen est à bubulis & suillis carnibus, piscibus, crudis fructibus, tamen ne à piscibus quidem in China regione abstineant, quoniam magni sunt helluones. Aliquando tenera tantum radice Chineses vtuntur cum carne elixa, quemadmodum & nos napiss, aut iapis cum carnibus elixis. Mirabiles sunt eius virtutes ad luis veneræ curationem: efficaciorq; est in inueteratis morbis, in quibus videlicet magni sunt tumores & vl. era maligna, quàm in recentioribus. Nec solum ad eos morbos valet qui cum contagio luis veneræ commune aliquid habent, sed etiā ad tremores, paralyces, articulorum

*Vires.*



articulorum dolores, ischiada, podagram, tumores scirrholes & oedematodes. Strumas etiam extirpat, succurrit ventriculi imbecillitati, inueterato capitis dolori, calculo, & vesicae viceribus. Primum innotescere cepit huius radiceis usus post annum 1555. adferentibus eam in Indiam Chinenfibus quibusdam ea lue infectis, quae interea dum illic negotiarentur curarent. Postea Lusitani reliquo orbi communicarunt.

RADIX CONTRA VENENA, CARLO SANCTO,  
RADIX S. HELENAE. CAP. XLVI.

**X** CHARCIS Peruana prouincia, ita referente Nicolao Monard: radices quaedam aduehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores & ficulnei folij odore. Hispani Indias inhabitantes *Contrayerva* appellant, quasi dicas alexypharmacum, quoniam earum puluis ex vino albo sumptus, aduersus omne venenum, cuiuscunque sit generis, praesentissimum est remedium (vino sublimato excepto, quod sola lactis potione extinguitur) vomitione illud reicere faciens, aut per sudores euacuare. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reiciuntur. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix aromatiem quiddam sapit cum acrimonia coniunctum. Quare calida videtur in secundo gradu. Nicolaus Monardi narrat ante triennium ex prouincia Mechioacan delatam esse radicem quandam *Carlo sancto* dictam, cuius insignes facultates praedicant. Nostro Lupulo similis est, & pertici se conuoluit illius more,

RADIX *Carlo sancto*,  
*Monardi*.



re, quibus si careat, per humum spargitur & diffunditur, folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore graui: neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex quo aliae radices oriuntur digiti maiori crassitudine, colore candicante: cortex qui facile separatur, cuiusque usus est, odore aromatico, gustu amaro cum quadam acrimonia: nervus radiceis cortice spoliatus, multis quasi fibris, seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quae singillatim separari possunt. Nascitur temperatissimis prouinciis Mechioacan locis, solo neque nimium secco, neque humido. Calida & sicca initio secundi gradus. Radiceis cortex manet aliquanto tempore,

*Locus.*  
*Tempus.*  
*Vires.*


re commandacatus, multam pituitam, aliosque humores ex capite elicit, eamque ob causam rheumatismos & capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam e stomacho expellens, sed illius decoctum maxime, cuius gratia ventriculum noxiis humoribus liberat, eamque roborat, purgationem tamen praecedere necesse est. Idem commandacatus gingivis abscedentibus auxilio est, dentesque stabilis, eosque a febricitia & corruptione liberat, orisque halitum commendat: sed postea vino os eluendum ad amaritudinem tollendam. Pulueris exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti, aut Canelle decocto sumpta vulnium obstructionibus libera, menses prouocat, status discutit, purgato prius corpore, & aluo (dum eo remedio vteretur) ex aquis partibus Liquidambar, & vnguenti Diathrae iuncta. Cordis affectibus, his praesertim qui ex vteri sympathia oriuntur, auxilio est puluis vt ante sumptus, aut illius decoctum hoc modo praeparatum. Radiceis minutim concisae drachmae duae in aquae sextario & dimidio coquantur ad dimidias, corticis Cici in puluerem redacti drachmae quatuor, pulueris Canelle drachmae duae statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colantur.

Illius



Istius decocti sex vnciæ singulis diebus manè addito saccharo propinantur, purgato tamen prius vt decet corpore. Eundem puluerem & idem decoctum nonnulli in morbi Hispanici affectibus, atque in epilepsia commendant. Narrat idem  
*Radix S. Helena.* Nicolaus Monard. ex portu S. Helena, qui est in Florida prouincia, adferri radices

*PATER noster, vel Radix  
 S. Helena, Monardi.*



*Locus.*

locis humidis. Sicca initio, calida in fine secundi gradus existimatur. Has radices Indi lapidibus conterunt, totique corpori inducunt balneaturi: quoniam cutim constringunt, & membra, vt inquit, suo grato odore roborant. Illius puluis cum vino haustus in ventriculi doloribus, vrinæ difficultatibus & nephritide commendatur. Hæc planta, sicut annotat Clusius, vt ex eius descriptione facultatibusque colligere licet, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

*PERSEA.*

*CAP. XLVII.*

*Nomina*



*ARBOR* *περsea*. Græcis, similiter Latinis Persea nominatur. Quidam Persion ipsam etiam appellant. Qui hanc arborem eandem esse existimant, & Malum Persicam vulgò notam, de qua iam tractauimus, certè hallucinati sunt, vt ex Theophrasti, Dioscoridis, Galeni, Plinij testimoniis perspicuum fiet. Perseam veram Theophrastus his verbis de-

*PERSEA America,  
 Matthioli.*

*Lib. 4. hist.  
 cap. 2.*

*Forma.*

*περsea, περsea.  
 arbor in persea  
 persens se denotata  
 i persea, seu persea  
 inuentione*



*Li. 1. ca. 146.*

pingit. Est in Aegypto alia arbor Persea vocata, aspectu magna, & pulchra, sed maxime similis Pyro, & foliis, & floribus, & ramis, & tota figura, præterquam quòd hæc folio perpetuo est, illa deciduo. Fructum autem fert multum, ipsumque omni tempore maturum edit, nouo semper veterem occupante. Maturat autem sub Etesiarum flatum. Reliquum cruditer tollunt & reponunt. Est autem Pyro magnitudine par, figura oblongus, Amygdali specie, colore herbidus. Intus nucem habet quem admodum Prunum, sed multò minorem, & molliorem, carnem verò valde dulcem, iucundam, & concoctu facilem: nihil enim lædit eos, qui multum ederint. Arbor hæc radicem excellit tum longitudine, tum crassitudine, tum etiam multitudine. Materia est robusta, aspectu pulchra, nigra Loti modo, ex qua simulacra, lectulos, mensulas, atque alia huiusmodi conficiunt. Persea Dioscoridi arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vtilem, in quo phalangia Cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida



Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamque in Ægyptum mutata natura in cibos receptam. Hæc Dioscor. cum antea alio capite de Persicis egisset. Galenus duobus locis de Persica malo, & Persea seorsum tractat. Persicam, inquit, vidi in Alexandria: ex magnis & ipsa est arboribus. Narrant autem fructum huius apud Persas adeo esse noxium, ut eos qui ederint interimat, qui tamen si in Ægyptum transferatur, fit esculentus, manditurque non aliter quam pyra & mala, quibus etiam magnitudine conuenit. Idem cum dixisset Persicæ folia vincentem habere amarâ qualitatem, & cætera, multo post scribit, Persicæ folia adstringentem vim modicam participare, adeo ut queant etiam nonnunquam viliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi: ac rursus, in sola Alexandria, inquit, Persea arborem vidi, at non in alia Romanis subdita gente. Quidam Persion ipsam etiam appellant, aiuntque in Persis lethalem eius arboris fructum esse, cum tamen in Ægypto innoxius sit. Quare cum Persea historia Persicæ Malo nullis notis conueniat, cum Dioscorides & Galenus diuersis locis de iis tractauerint, scripseritque Galenus se in Alexandria solum Perseam vidisse, Persica verò in Asia, Græcia, Italia notissima esse, aperte demonstrauit Perseam à Persica plurimum differre. Iam verò Plinius Perseam à malo Persica perspicue diuersam facit his verbis. Persicæ arbores serò, & cum difficultate transiere, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat hospitium. Falsum est venenatam cum cruciatu in Persis gigni, & pœnarum causâ à Regibus translatam in Ægyptum terra mitigatam. Id enim de Persea diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, Myxis rubentibus similis, nec extra Orientem nasci voluit. Eam quoque eruditores negauerunt ex Perside propter supplicia translatam, sed à Perseo Memphi satam: & ob id Alexandrum illa coronari victores ibi instituisse, vel ut in manuscripto legimus, coronam victoriæ sibi instituisse in honorem atque sui. Semper autem folia habet, & poma, subnascentibus aliis. Quod autem Plinius hic non ex Perside translatam, sed à Perseo Memphi satam ait, Nicander Perseum Mycenis, non Memphi Perseam plantasse his versibus cecinit.

In Alexi.

Καί τε χαλατὰ φθάνει μετ' ἀργυρίου ἐλαίου,  
Σκληρὸν ἀπὸ περσέως χάρυα βλάστος διὸν ἐρύξει.  
Περσὸς ἦν πόλις ποσσὶ λιπὼν κηφήδα γούαν,  
Λυχὲν ἀποτμήξας ἄρπη γονεὶα μεδύσης  
Πέτα μυκηναίων ἐνιέξουσιν ἀρούρης,  
Κηφῆος νεὰ δώρα.

Quos sic Gorraeus conuertit.

Tunsa quoque interdum quæ Persea protulit ossa  
Palladio noxam depellent mixta liquori.  
Hanc olim Perseus postquam Cephiea liquit  
Arus, & fecunda praeiudit colla Medusæ,  
Cephei noua dona, Mycenis intulit aruis.

Nicander autem hoc loco aduersus cerussæ venenum remedia docens, Persea nunc pro Persicorum nucleis intelligere videtur. Nam Dioscorides contra cerussam pro Persicorum nucleis exhibet. Paulus verò, sicut hic Nicander, ad id laudat, ut ipse Nicander inter Perseam, & Persicam Malum nihil discriminis nouisse videatur, & contra ipsum imprimis dictum esse credibile sit, quod ex Plinio supra memorauimus. Præterea idem Nicander octauum phalangij genus phalanx muscæ circa faces noctu volitanti simile esse ait, & Persea foliis innutriti.

Lib. 6.  
Lib. 5. c. 59.

In Theria.

Τὸ πελιδνὸς περσέως ἐπὶ πόλιν ἐφέει τῶν ἐλαιοῖσι.



Hoc Phalangij genus à Nicandro nominatim non expressum, Cranocolaptam esse scribit eius Scholiastes, quem & κερατοράστην appellari scribit, utroque nomine, ab eo quod caput imperat, sic nuncupatum, quod etiam Dioscorides de Persea tradit, ἐφ' ὅ τὰ λεγόμενα κρανοκόλαπτα, φαλάνγια δ' ἐστὶν (ἐ). Idem Scholiastes hoc loco Sostratum citat, qui scribit Perseam Rhodaceneam vocari, & ex Æthiopia in Ægyptum transplantatam fuisse. ἰστέον δὲ, inquit, ὅτι σφόδρα πολλὸς ἐν τῷ περὶ Βαλίων, ἢ Δακείων τὴν περσεάν, ἢ ροδακηνέαν καλεῖσι, φησὶν ἀπὸ αἰθιοπίας εἰς αἰγυπτον μεταφωθῆναι. At Rhodaceneam ostendimus, nihil aliud esse quam Malum Persicam, & Rhodacena, Persica Mala. Gorræus itidem Nicandri interpres, iis versibus quos modò citavimus subiungit. Persea ossa Persicorum ossa, siue nuclei, eundem habent amaritudinem. Proinde calfaciunt, & detergent. Est autem Persea arbor, à Perseo dicta, & cetera. Ex quibus intelligitur, Nicandri interpretes & Sostratum aperto errore Perseam, & Malum Persicam eandem arborem putasse. Fructus eius figuram hic damus affabre expressam, quem fructum ex Ægypto Dalechampsius habuit, cum Theophrasti descriptione optimè congruentem. Nam pyri maiusculi formam præ se fert (pendebat enim uncias quatuor & semissem) sed statim à superiore parte qua pediculo hæret, multis locis tuberosam, in mucronem obtusum sensim desinentem, colore, cum diu exsiccatus fuerit, qualis erat is quem vidimus, foris saturatè rufo, pulpa semidigitum crassa, dulci, & gustu suavi, intus nucem coercente, totius fructus seu pyri specie, foris rufescentem, intus cornu pellucidi prorsus colore & duritie cum inaruit: in medio eius cauo nucleum nullum vidimus: aquam enim suavem eo concludi putamus quæ tempore absumitur.

PERSEA America, Clusij,  
cum fructu, Dalech.

Lib. 1. ca. 2.

Forma.



Fructus is aliquandiu aqua maceratus mucaginem in ea emisit succumque valde viscidum, & valde suavem. Annis aliquot ante quàm liber Clusij stirpium per Hispanias observatarum prodiiisset, hæc descripsimus: ex quo diuersam, ut arbitror, à superiore Perseam hic apponimus, quam in solo Valentino vnicam vidit in monasterio D. Virginis, cui cognomen de Iesu, primo ab vrbe Valentia lapide. Ex America eò delata fertur. Pyro similis est, in latum diffusa, perpetua coma virens, ramis ex viridi pallescentibus, foliis Lauri latifolia, parte superna virentibus, inferiore cinereis, firmis, nervis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore commendatis, cum adstrictione linguam mordicantibus. Flos illi est Lauri ferè, copiosus, racematim compactus, pallidus, sex foliolis constans: fructus per omnia pruno similis, deinde tempore pyri modo oblongus, nigro colore, iucundo sapore, nucleum cordis effigie continet, gustu castaneæ, aut dulci amygdalæ haud absumili. Vere florentem vidit. Autumno fructum ferre intellexit. Hæc Clusius.

CEREVS





**V**ivs penè portentosa elegancia Naturæ Genus omnem prouocauit in nostratibus plantis admirationem. Nam mirabilitatis opplet spectantis animum & oculos huius rarissimæ venustatis plantæ spectaculum. Eam plebecula effigiei argumento Cereum vernaculè vocauit: hastas enim surrigit quaternas & quinas, nouendecim & vicenûm cubitorum, virgatis & ad normam directis striis, cannulatas: in externis extantibus striarum angulis obtusis exeruntur stellulæ, corneis stilis, radiatim è suo centro quoquoersum minacibus, vno duntaxat prominulo horsum, æquè directo longius: tota quandam effigiaturam, & concolorem superficiem echino Melocacti præfert, sed brachium æquabili ductu æquante, columellæ, aut cerei funalis prælongi instar. Eius è medio & striarum dorsis, anisatim, angustiore ceruice, Cucumeris ventre, surriguntur brachia terna, quasi folia teretia crassa, eundem commensum proportionis & figuram sortita. Intus torulus ligneus, carpi crassitie, obductus est callosa carne, & succo Aloës: gummeo enim turget, perquam amaro lentore: flores in vestigio summo promit, referente qui attulit, digitalis purpuræ fructus: hilari purpura miniata rubet, sicut ferè effigie, gustu non insipido.

PERUVIANA ALIA FACIE ARBORIBVS ITEM  
INNASCENS. CAP. XLIX.



**I**DEM celo & natalibus ramorum arborum Indicarû debemus hanc vnde auulserunt qui Morgano miserunt, cespitem latiore, sessilibus caudicibus incumbit, fibrillis cepaceis radicata: vnde proximè surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferius fermè palmum lata, numerosa, quadantenus Aloës, aut Scyllæ: & superne in ligulas prætenues, mucronatas definentia: purpureum, striatum, concavum. alis donatum scapum Hastulæ regiæ, aut Aloës, duorum & trium cubitorum ambientia, quæ multis glumosis siliculis spicantur, Auenæ situ: magnitudine verò & sericeo tomento candido Apocinum, vel Asclepiadem repræsentant, & semine, sed Conisæ exili gustu salso, ingrato, nitroso, fortè quia in aura maritima adoleuit, vt Aloës illic in sabuletis.





POPVLVS America.



**V**ISCVM Indicum ait Pena in Peruvianis insulis nusquam nisi in ramis & truncis arborum nasci solitum nostratis modo, multumq; adumbrare Sessili, sed transuersim excurrente radice cespitem: gramineis geniculis, & Polypodiis quadatenus, sed albicantibus culmis, ex pallido virentibus, à medio summo tenuis crassioribus, fungosis, striatis, sesquipede longis, in quibus folia semper virent, Visci effigie, sed duplo maiora, crassiora, fungosiora secundum neruum folium medium intercurrentem: circulis vtrinque senis, veluti scalpro impressis, non parum admirandis.

POPVLVS AMERICA.  
CAP. LI.

**E**X NOVO orbe elegantes ramos ac praegrandes mercatores Anglos illinc reuersos attulisse testis est Pena, ex quo effigiem hanc exhibemus. Virgulta sunt aliquantulum flexuosa, & per sesquipalmum palmumque crebra, geniculata, veluti infectione, commissuraque partium nodosa: vnde exeunt, singulo pediculo singula folia, ora exquisitè rotunda, nec vsquam nisi quâ pediculus hæret intercisâ, crassa, rigida, latiora, arboris Indæ, cui flosculi alternatim exeunt, prælongis loculis, stipati acinulis multis, exiguis, planè Populi modo. Quare & hanc Populum Peruvianam vocare illi visum fuit: gustu perquam adstringente, aliquantulum calfaciente, subfalso.

## PALMACEA, SEV ARVNDINACEA PINNATA SPINOSA. CAP. LII.



**S**UNT huius plantæ indidem aduecti rami foliosi, illis affines, nec minus intuenti effigie peregrina: quippe sambucini, aut ferulacei: sunt fistulosi & medullæ pleni, recti, rotundi, octonum aut denum cubitorum: sed per longitudinem triplici cartilagine, digitum lati, pinnati aut alati instar reli: & oris extremis modicè fimbriis sinuatae sunt cartilagines, stellulisque spinosis ornatae, solertis opificis sapientiam arguentes. Alterius etiam illic natae arboris



PALMACEA pinnata  
spinosa.

NERII facie arbor, Pena.

arboris truncum aut bacillum hic proximè exprimendum curauimus qualem vnà accepi-  
mus: quod carpi crassitie est longa hasta & cor-  
tice nigro, densoque vestiur, tuberculis cras-  
sis, senticosis, creberrimis in claua modum  
muricato, solido, graui & præduro ligno.


NERII FACIE ARBOR  
Pena. CAP. LIII.

**A**RBORIS peregrinæ Neriæ facie  
ramulum, cuius perpulehræ sunt  
siliquæ, pingendum curauit Pena,  
& paucis descripsit. Propendent  
siliquæ de ramis & furculis Sambuci palu-  
stris, medullosis, pallidis, pullis, nodosis, sel-  
quipalium & pedem longis vaginis, cuta-  
ceis, vno cohesu septenis aut nouenis, sin-  
gulis gracilem lampetram exprimentibus.  
Intus farciuntur pelliculis cepaceis & tomen-  
tosis, adeò exuium serpentis eminentibus,  
& quiddam cadaueruli anguini simile inuo-  
luentibus, vt pueris terrori sit: consimili flo-  
rum exortu oblongi exeunt caliculi, Herbae  
sanctæ aut Stramonie.

## FAGARA Auicenna. CAP. LIIII.

**M**AHALEB meminit Clusius in Hi-  
storia Aromat. Indicorum de fa-  
gara Auicennæ hæc scribens. Fa-  
gara fructus est Ciceris arietini  
magnitudine, cortice tenui cõstans ex cinereo  
nigricante, cui subest tenue putamen nucleum  
continens satis solidum, & tenui nigraq; mem-  
brana obductum. Integer fructus cum magni-  
tudine tum forma & colore adeò similis est ei

## FAGARA, Auicenna.



quem Officinæ Coccū Indū, Galli Coque de leuant appellat, vt primo aspectu falle-  
re, & pro eo sumi possit. Meminit huius Auicenna, ca. 260. hoc modo. Fagara quid  
est? Granū simile Ciceri, habens granum Mahaleb, & in concantate eius est gra-  
num nigrum, sicut Schehedenege, & asportatur de Sofala. Collocat verò eam in  
tertio calefacientium & siccantium ordine, atque stomachi & hepatis frigiditati  
vilem esse, concoctionemque iuuare, & aluum constringere scribit.




*Forma.*  
Theuctus  
cap. 12. lib.  
sing.  
*Vires.*



VLTAE sunt aliae siluestres & peregrinae plantae admirabiles, quarum nonnulla solis descriptionibus nobis nota esse potuerunt, quod ij qui in exteris illas regiones navigarunt, in quibus proveniunt, earum figuras non expresse- rint. Inter arbores in Regno Senegae una est glandiferarum nostrarum crassitudine, fructum ferens dactylis parem, ex cuius nucleo oleum exprimunt miris virtutibus praeditum. Aquae permixtum croceo colore plane inficit, quo tingunt pocula, ac pileos quosdam ex iunci, vel orizae paleis contextos. Praeterea id oleum odore est Viola Martiae, olei nostri sapore. Quamobrem multi pisces, orizam, aliosque cibos eo coniungunt.

PALMAPINVS, SIVE CONIFERA.  
CAP. LVI.



VLGARIS Palmae congenere esse multas siluestres in sinu Guineae Oceani occidui, quae steriles sunt, nec nisi exilitate à sativis abluunt, Pena intellexit ex mercatoribus Gallobritonibus, qui illuc quotannis ferè commercij causa adeunt. Inter quas & alij Angli inficitores non parum venustam & miram hanc iconem hic expressam ibi oriri illi affirmarunt,

PALMAPINVS  
silvestris.



PALMAPINVS, sive  
Conifera, Pena.



*Forma.*

eiusdemque ramos luculentia conorum foetura onustos attulerunt: quorum arborem quasi quandam ex Palma & Pino hybridam natura ludibunda videtur confluxisse. Lignum ipsum fungosa est Palmae prorsum textura, in villos totum dehiscens, & squamosa cute loriatum, fastigiato termitum numerosis & in orbem exortis furculosis ligulis quadraginta, aut quinquaginta, compactili verticillorum & squamarum serie pyxidatim articulatis, pedem longis, rotundis, parum compressis, quarum singulis commissuris singuli numerosi coni altius inferuntur tricenarii, aut quadrageni, qui mediocrem conum Cedri emulcent, puluillis in quincuncem digestis, reticularibus & imbricatis extuberantibus ventricosis nucis cortice fusco, nitido, polito, crassitie & concretionibus nucis Indicae, intus nucleum glandemve oblongam sesquianciam, aut duas uncias longam, praeduro, & in farinam egre friatili, gustu glandis & castaneae, quae sunt ei genti panis supplementum.

GENIPAT



## GENIPAT. CAP. LVII.

**M**AGNI æstimatur in America arbor, quæ Genipat dicitur, maximè fructus eiusdem nominis causa: non quod est alentus sit, sed quod alios vsus Barbaris præbeat. Arboris folia Nuci iuglandi similia sunt, fructus ferè in ramorum extremo prouenit, aliis aliis impositis mirando quodam modo. Is magnitudine, colorèque Persicis nostris similis est, ex cuius succo vniuersum corpus inficiunt hoc modo. Miseri illi, & bruti homines, cum succum ex hoc fructu aliter exprimere nesciant, illum mandunt, ac si voraturi essent, deinde ore reiciunt, & manibus veluti spongiam exprimunt, ut succum emittat, qui admodum limpidus est. Profecturi igitur illi aut ad stragem aliquam edendam, aut ad inuiscendos amicos, aut ad solenne aliquod, totum corpus hoc liquore madesfaciunt. Is quo magis in corpore exsiccatur, eo magis natuum colorem acquirit, qui vix verbis exprimi potest: est enim quodammodo inter nigrum & coeruleum, siue cum colorem qui vulgò azarus dicitur, medius. Hoc infecti Barbari incedunt, non minùs ornatos sese existimantes, quàm nos nostris coccineis, ac sericis vestibus. Est alia arbor etiam Genipat appellata, cuius fructus maior est, & edulis.

*Forma.*  
Theophrastus  
cap. 32. lib.  
sing.

*Vsus.*

## HYVOVRAHE.

## CAP. LVIII.

**S**ILENTIO non prætereunda arbor, quam ob raras dotes Barbari Hyuourahe appellant, id est, rem raram. Arbor est procera, cortice coloris argentei, ligno rubescente, gustu ferè salso, aut ligni glycyrrhizæ. Corticis mira est virtus, & mirandus effectus. Quare eodem est in pretio apud Barbaros, quo Gaiaicum apud nos. Fuerunt etiam qui Gaiaicum verum esse existimauerint, à quibus dissentit Theophrastus. Quicquid enim similes Gaiaico vires habet, Gaiaicum dici non oportet. Nihilominus Christiani hoc cortice Gaiaici loco vtuntur ad curandum morbum Indicum hoc modo. Corticis huius, qui recens ab arbore sua auulsus lacteum succum emittit, quantum satis sit in particulas concidunt, tres quatuorve horas in aqua decoquunt, donec vini rubelli colorem acquisierit. Hoc decocto quindecim vel viginti diebus vtuntur continuis, cum tenui victu, quæ ratione, ut audio, curatur optimè morbus Indicus, nec is modò, sed quibus aliis, qui à frigidis & pituitosis humoribus pender, qui huiusmodi decocto attenuantur, ac probè exsiccantur. Eundem Americi in morbis vsurpant. Estq; huius potio etiam sanis suauissima. Est etiam aliud in hac arbore præstantissimum, nimirum fructus ipsius pruni nostri mediocri magnitudine, auri obryzi colore, nucleum concludens mirè suauem & delicatam, agris, & iis quibus prorsus deiecta est appetètia vtilissimum. Præterea hæc arbor quindeno quoque anno tantum fructum profert, quod plerisque incredibile videri posset: id tamen affirmare asseueratione possum, quod curiosius perscrutatus sum, didicique à senioribus Americis, quorum vnus arborem mihi ostendit, mihiq; asseruit se toto vitæ tempore ter quaterve solum huius fructum gustasse.

*Forma.*

Theophrastus  
cap. 30.

*Vires.*

## PENOABSOV.

## CAP. LIX.

**E**ST etiam in America arbor Penoaabsou dicta, cortice odoris planè admirandi, foliis Portulacæ, valde spissis, perpetuò virentibus. Fructus edit magnos, grandioris pomum igni, rotundus, orbiculatos, pileuloriorum modo, minimè edules, imò venenatos. Singuli senas nucas habent, amygdalis nostris similes, nisi quod latiusculæ sunt, & magis com-

*Forma.*  
Theophrastus  
cap. 38.



pressa in singulis singuli nuclei conduntur, qui ad sananda vulnera mirificè faciunt, quibus etiam videntur Barbari sagittis icti, aut quouis alio modo in præliis vulnerati, ex his contusis oleum exprimentes rufum, eoque vulnera illinentes.

## PALMA VINIFERA. CAP. LX.

Forma.  
Thevetus  
Cap. II.

Vires,

**P**ROMONTORIUM Æthiopum, nunc Promontorium viride, ut in finitibus arboribus, fruticibusque maximè fructiferis, ita etiam Palmis tum ob aeris naturam, tum summam soli fertilitatem abundat. Est autem ex Palmarum genere arbor pulcherrima, siue proceritatem, siue perpetuam viriditatem, atque alias speciosæ arboris dotes contempleris. Hanc instrumento aliquo incidunt, & aperiunt, tanto hiatu, ut in eum pugnus immitti possit, qui à terra pede vno, aut plurimum duobus absit. Inde manat succus, quem vasis terreis excipiunt ad hiatum vsque pertingentibus. Ex Palma Cichorin eiusmodi succum elici gustu suauissimum postea dicemus. Hinc in alia transfundunt, reponuntque in quotidianam potionem, quam Mignol appellant. Ut autem integrum diutius cōseruent, modicos sales, ut nos in omphacium nostrum, iniiciunt, à quibus consumpto humore crudo & immaturo liquor incorruptus permaneat. Colore verò & consistentia vinis albis Campaniæ nostræ, & Andium similis, gustus suauissimi, ad refrigerandum & ad sedandam sitim, cui incolæ ob continuos & summos æstus maximè obnoxij sunt, conuenientissimus, quique non minus apud eos est in pretio, quàm apud nos vina nostra præstantiora, quamuis eiusdem arboris fructus, qui parui sunt dactyli, sint gustui acerbi, nec edi faciliè possint.

## ARBORES VENENATAE. CAP. LXI.

Thevetus  
Cap. 61.  
lib. sing.

T. Cosm.  
lib. 10. c. 3.

**I**NTER Peru & Canibales multæ sunt insulæ, quæ vnius imperio parent, quem Calsique nominant, in quarum maxima, in qua sapius Rex habitat, Gaiacum arbor copiosissimè provenit. Item alia fructum ferens pile magnitudine visu speciosum, sed venenatum. Huius succo sagittas Barbari imbuunt, iis aduersus hostes in præliis vsuri. Est etiam alia ex qua scarificata succus emanat mortifer: radices tamen sunt esculentæ, ex quibus farinam faciunt qua vescuntur. Hæc in gratiam eorum qui rerum naturæ variorum, novarumque cognitione delectantur, ex Theueto descripsimus. Qui hæc de Baxama tradidit. Ab insula Ormuz decem miliaribus distat ea quæ Queionne nominatur, è regione illius sita, olim Principum quorundam delictis, nunc inculta & deserta, tum quòd magna ex parte diruta sit ob vehementes terræ motus, tum ob viperarum, aspidum, colubrorum, qui colore à nostris valde differunt, atque serpentium omnis generis copiam, quæ illic stabulantur, ex quibus tam venenata & pestilens aura exhalat, ut non solum homines perimat, qui vel ali quantulum moram illic fecerint, sed etiam stirpes ipsas inficiat, in quibus est arbor Baxama, cuius fructus vel minimum degustatus, mox suffocat, id quod ipse etiam umbra præstat, si quis vel quadrantem horæ sub ea moretur. Cum tamen aliis in regionibus eiusdem arboris radix venenorum omnium sit antidotus, illic lethalis, nec non & folium ipsius, & fructus qui Rabuxit vocatur.

## ARBOR FINIVM REGVNDORVM. Cap. LXII.

Lib. Exot.  
Exerc. 15.  
Exerc. 181.

Emert. 181.  
3.

**V**ASDAM alias nobilissimas ex Æthiopia, Arabia, Troglodytica, India, Sarmatia, Scythia plantas ex Scaligero recensendas esse diximus, etiam à navigatoribus, & Historiæ Indiæ scriptoribus memoris proditas. Ab arbore finium regundorum incipiemus. Nominis oblitus Ioannes Balada familiaris meus, inquit Scaliger, qui multos annos Indias per-



dias peragruit, faciem modo narrabat arboris. Paruam esse frequentibus virgulis, veluti Punicā, folium Pruni, fructus qualis Castaneæ cum erinaceo. Intus coccus ruber, quo vtuntur ad tincturas & picturas. Non enim literas habet Mexicij, apud quos nascitur, sicuti neque olium Ægyptij ante Theuth. *Sed in tabellis pictis seruant agrorum facies, finisque prædiorum.* Quæ fuit causa vt eam Scaliger appellarit finium regundorum arborem, donec alius felicior nomen apponat verum.

Forma.

Vfus.

Egyptum.

## MANGA. AMBA. CAP. LXIII.



ST in Malauar Manga arbor Pyri facie, cuius fructus Persico par aut maior. Corticis color viridis immaturo: Augusto mense cum maturitate recipit luteum: simul acquirit splendidum nitore. Caro, vt pruno, mellei saporis. Os intus sicut amygdalo. Immaturo condunt vt oliuas. Amba nomen. Ludou. Bononiensis in Itinerario suo in Calicuto nasci tradidit. Cætera planè eadem habet. Garcias in Aromat. Indico. historia tradit omnium qui apud Indos nascuntur fructuum præstantissimum esse cum quem ipsi Mangas vocant. Colligi in regionibus calidioribus mense Aprili, in aliis Maio & Iunio, interdum tamen Octobri & Nouembri, cæterum pro regionum natura & diuersitate variare etiam saporis bonitate. Habere se in prædio suo quod est in Bombaim arborem huiusmodi fructus ferentem, quæ bifera est. Nam Maio mense fructum fert saporis quidem & odoris gratia excellentem, sub finem verò Autumnii alium superiori magis commendabilem. Colore est is fructus ex viridi rubescens, & odore gratissimus. Exempto cortice editur, aut sine vino, aut generoso aliquo vino maceratus, veluti Persica. Conditur etiam saccharo, interdum verò & aceto, & oleo, & sale, inspersis in eius medullis gingibere & aliis. Nonnunquam editur cum sale, & nonnunquam elixus. Frigidus verò est & humidus, quæ admodum Persica. Eius ossiculis assatis alui profluua sisti aiunt, quod verum esse Garcias deprehendit. Nucleis verò recentibus lumbricos & ventris tineas necari dicunt, quod rationi consentaneum est ob eorum amarorem.

Forma.

Exerc. 181.

Theuet. T.

1. Cosmog.

lib. II. c. 16.

Locus.

## GVANABANVS. CAP. LXIIII.



GVANABANVS arbor Pini stipite, procera, folio magno, oblongo, fructus Melonis magnitudine. Corticis color viridis, splendor Cydonij, digitalis crassitudo. Caro intus candida, dulcedine lactis coacti, semina continet phasiolacea. Generalis historiarum Indiarum auctor tradit fructus corticem viridem tenuem esse vt Pyri, superficiëque squamulis distincta. Hic Guanabanus planè continere videtur cum

Exerc. 181.

6.

Forma.

Lib. 8. c. 17.

GVANABANI  
fructus, Ouiedo.



Ouiedi Guanabano, & vterque ab eo diuersus esse cuius ex Scaligero meminimus. Sic in Historia sua suum describit Ouiedus. Guanabanus procera arbor est, & formosa, folio ferè Mali citriæ virente: fructu pulcherrimo, mediocris Melonis magnitudine, qui tamè interdum in capitis pueri crassitudine excreseat. Cortex huic fructui viridis, & qui quibusdam squamis distinctus videatur, vt strobilus, lauioribus tamen, neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior quam in Pyris. Caro candidissima, saporisq; delicatissimi, quæ facile cremoris lactis instar in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna, Cucurbitarum seminibus aliquanto maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & perustus utilis. Nam tametsi quis integrum Guanabanum deuoret,

Lib. 8. c. 17.



deuoret, nullum inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies. Hæc Ouiedus. Scholiastes verò historiæ Aromat. Indic. Scaligeri Guanabanum eum esse putat, qui superioribus annis ex Æthiopie Mozambique Antuerpiam allatus est fructus crassus, sesquipedali longitudine, cui densus durusque cortex, tenui mollique ut in Cydoniis, sed viridi lanugine obductus, aliquot per longitudinem excurrentibus venis, siue potius sulcis, ut in Melonibus, extrema parte in mucronem desinit, superiori verò quæ è ramis dependet, pediculo inhaeret firmo, duro, & fibroso. Continet hic fructus pulpam candicantem, qua Æthiopes in febrium ardoribus vtuntur sitis sedandæ gratia: iucunda etenim aciditate prædita est. Hæc siccata friabilis est, sic ut digitis trita in pollinem resoluatur, remanente tamen perpetua aciditate. Per hanc sparsa sunt semina renibus, aut Anagyridis legitime fructui simillima, nigro tamen colore nitentia, ac ex umbilico fibris quibusdam suspensa. Huic simillimum, foliis tamen ab hoc diuersis, ex Theueto supra descripsimus nomine ficus Nigritarum.


## MAMEI. CAP. LXV.

Exer. 81. 8.  
Forma.



Lib. 8. c. 20.

MAMEI  
folium.



ra. Pulpæ isti digitalis est crassitudo in maioribus, minor in minoribus pomis.

## GVAIAVA. CAP. LXVI.

Exer. 81. 9.  
Forma.



Lib. 8. c. 19.

V A I A V A est arbor, tum fructus, Mali facie. Sed color fructui cælidus. In quo semen nigrum, minutum, rotundum eximit ipsum ex illo rum natura. Paulò fufius hæc arbor ex Ouiedo describenda. Guayabo, inquit, arbor est Indis omnibus vulgata cognitionis, Aurantiis arboribus magnitudine par, sed ramis rarioribus, foliis minùs viridantibus, paulò latioribus, crassioribus, & venulis eminentioribus. Poma profert aut longiuscula, aut rotunda, alia intus rubra & punicea, alia candida, sed foris omnia viridia, aut lutea cum prorsus maturuerint. Horum quædam sunt magnitudine quæ quæ Palsipoma Galli vocant, quædam minora, pulpa in quatuor



quatuor partes distincta est, quarum singula granulis sunt referta durissimis, quæ tamen quo minus deglutiantur non impediunt, cortex Pyri masticelli cortici similis, eodem modo eximitur, flos quadatenus Aurantiæ aut Citriæ mali florem refert, in quibusdam florum Gelsemini odore, eoq; suauiore. Huius arboris quædam siluestris est, alia satiuæ: fructus esu suauis, concoctu facilis, alui profluuiis utilis, nam astringit, præsertim si paulum immaturus & duriusculus edatur, vt arbor Cayabo, ita fructus Guyaba dicitur.

## BRVSATHAER. CAP. LXVII.



D Chinarum sinum marinæ sunt arbores visenda vastitate: tanta, inquam, vt in eis immensæ magnitudinis aubus stabulari liceat. Etenim tam grandes sunt, vt eis etiam grauiora animalia integra sustollatur, atq; auferantur. Has arbores vocant incolæ Brusathaer: fructus ferunt angustis non minores. Eadem scripsit M. Anton. Pigafetta in Itinerario suo.

Exer. 181.  
10.

## CACHI. CICCARA. CAP. LXVIII.



PINOSA est arbor in Malauar, cuius folium nõ pingunt. Ipsa Cachi, fructus Ciccara dicitur, longitudine pedali, humanæ coxæ Calsitudi-  
ne. Pondus fidem superat. Cortici color primum viridis: maturescens in luteo fuscus. Corpus firmiusculum, compressioni tamen ita cedit, vt frangatur. Temporis quoque suapte natura impatiens. Haud enim ita multo postquam detractus sit, fit rugosum. Totius forma vt Pineæ Nucis. Intus enim camerulæ membranis distinguuntur, vt in Punica. Pulpæ odor suauissimus. Sapor mistus ex Melone moschato, Persico arantio dulci, & melle. Intus poma ducena quinquagena ad trecentena vsque, ficorum tum specie; tum dulcedine, sine cortice, vt aiunt. Membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregentur, vt ouorum vitella. In his pomis fructiculus est alius, figura castaneæ, qui ad eundem quo castanea modum inter coquendum crepitat, esculentusque est. Etiam bobus in pastum datur. Exit è trunco fructus, sicut & lumeiz, id est, Sycomoro inter spinas & frondes: interdum, quod magis mirum est, è radice subtus terra, vnde prodit. Hic longè præstantior regibus dono datur. Legitur mense Decembri. Eadem prorsus scripsit Ludou. Bonon. in Itiner. suo, nascique in Calicut. Eadem etiam Nicolaus Costin. in Itiner. nisi quod non fructus ait bubus pro cibo præberi, sed eorum cortices. Præterea arborem grandi Fico similem esse, foliis diuisis Palmæ modo, ligno buxæ, ad multa utili.

Exer. 181.  
12.

Forma.

Tempus.

## MELO CORCOPALI. CAP. LXIX.



ORCOPAL Indiæ prouincia est, in qua Cydonij magnitudine & foliis arbor. Prægrandem gerit fructum, Melonis figura, eodémque sulcatum modo. Intra quem terna, quaternave grana, acinorum vix facie, acore cerasi. Melo hic & edendo est, & ad medicinas utilis. Eadem Ludo. Bono. in Itiner. Theuerus in Promontorio Comari fertilissimo prouenire tradit arborem Malo Cydoniæ magnitudine & foliis similem, cuius fructum Corcopal vocant, esu gratissimum, gustu suauissimum, quo etiam argotantes vtuntur, quia prauos humores per alium expurget.

Exer. 181.  
13.

Forma.

Usus.

Theuer. 1.

Cosm. lib.

11. cap. 17.

## DARIAN. CAMALANGA. CAP. LXX.



VPERIORI Meloni similis Taprobana, quæ nunc Sumatra, fructus, qui Darian dicitur. Anguriæ magnitudo, cortex viridis. Eius in visceribus quini fructus Arancij quantitate, & figura, sed oblonga: butyri sapore suauissimo. Hæc etiam Nicol. Costi. in Itinerario. In eadem

Exer. 181.  
14.

Forma.

Usus.



eadem Carcopal Camolaga fructus esitatur, sesquipede maior, Cucurbitæ colore. Humi iacet vt Melo. Pulpæ plurimum. Condimenta ex ea vel cucurbitinis, quas Carabassadas Hispani vocant, vel Citriis meliora, atque sapidiora. Eadem Ludou. Bqnon. in Itinerario suo.

## ETTALCH. CAP. LXXI.

Exerc. 181.  
19.

Forma.

Vires.



RANDIOREM Iuniperū quæ Cedrum maximè æmulatur, Harar vocant Arabes, Afri nominant Ettalch. Eius medulla in Numidia candida, in Æthiopia nigra, in Libya purpurea: qua in scobem comminuta dicuntur Afri Medici felicissimo successu vice Gaiaci ad morbum Indicum profigandum vti. Hunc morbum tres nationes, Galli à Neapoli, vbi se inuenisse putant: Itali à Gallis in quibus primum aiunt sese illum conspexisse: Germani ab Hispanis, qui ex India tam pretiosam mercem conuexerunt, nominant. Ego, inquit Scaliger, meritò ac iure Indicum. In descriptione nonæ partis Africæ legimus Ettalch grandem & spinosam esse arborem, foliis Iuniperi, quæ gummi mastiche simile emittit, quo Afri mastichen adulterant, quòd colore & nonnihil odore mastichen referat. Cætera prorsus eadem. Ea prorsus videtur esse Oxycedrus suprâ descripta. Meminit Theuetus arboris Etache, quæ in insula Cuoue prouenit valde spinosa, & Iunipero similis.

## GOR, ARANCIA, LIMONES, AMBULON.

## CAP. LXXII.

Exerc. 181.  
20.



D fluuium, qui Niger dicitur, nullæ arbores fructiferæ præter paucas admodum. Inter quas vna, cuius fructus castanæ similis, sed amarus. Gor vocant incolæ. Ioannes Leo lib. 1. descriptionis Africæ tradit has arbores mirandæ esse proceritatis, satis procul à mari, in continente. In India insula Zeilam cortex Aranciis dulcis est, & suauis. Limones autem proueniunt ibi, sua specie, pusilli, qui nullum porro capiunt incrementum, sapore dulcissimi. Siluestrium Limonū arbores in Syria, Ægypto, Africa, frequentes. pomis admodum exiguis, acidissimis. Aruchet insula fert arborem, cuius è cortice fructus exit candidus, saccharati specie, & magnitudine coriandri. Ambulon ei nomen est.

Exerc. 181.  
24.

*Ambulon uox  
afriq.*

## ARBOR ΜΗΤΡΟΣΙΔΗΡΟΣ. CAP. LXXIII.

Exerc. 181. 27.



RÆCYM fortasse nomen à nobis inditum, inquit Scaliger, plus historiæ conueniet, quàm ingenio nostro. Tam enim est prope mendacium, quàm nos à voluntario mendacio alieni. Animi tamen gratia reponentur hîc. In Iaua maiore aiunt raram esse arborem cuius medulla ferrea sit: exilis illa quidem, cæterum porrecta ab imo ad summum plantæ fastigium. Ex ea frustum qui gerat, ferro esse impenetrabilem. Eadem refert Nicol. Costin. in Itinerario suo, vt & ea quæ sequuntur.

## MUSA ARBOR. CAP. LXXIIII.




ALMARVM quoque generis quidam putant esse arborem illam, quæ in Ægypto Cyproque, & Syria non procul ab vrbe Alep vulgo nominata prouenit, quam qui illuc nauigant Musam appellant, Arabibus vt Serapioni & Auicennæ Musa Maum, & Amusadicitur in Syria Mose. Græci Christianique qui Syriam incolunt, & Iudæi, arborem eam esse aiunt, cuius fructus edit Adam. Quod ridiculum esse scribit Garcias in Aromaticum Indicorum Historia. Id verò multo magis, quod scribit quidam Franciscanus,

Nomina  
Li. 2. c. 491.  
Math. lib.  
1. in Diosc.



scanus, fructum hunc laudabilem Musa vocari, quod Musis dignus sit, aut quod earum sit cibus. Nascitur in Canara, Decan, Guzarate & Bengala, vocaturq; illis Quelli. Nascitur etiam in Malauar, vbi Palan, & in Malayo, vbi Pican, & in ea Africa parte quam Guineam appellant, vbi Bananas dicitur. Arbor est quinum senumve cubitorum proceritate, quæ ex stolonibus alterius seritur, foliis arundinaceis, longè latèque sese diffundentibus, adeò

MUSA arbor.



MUSA cum fructu.



ut ternum cubitorum longitudinem quandoque excedat, latitudine sesqui cubitum æquent, lata crassaque per medium excurrente costa. Ea Aestate vel natura sua, vel solis ardore, sic arcescunt, & veluti torrentur, ut mense Septembri nuda tantum remaneant costæ, decedente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caudice vnico constat sine ramis, squamoso cortice vestitos, Palmæ vel Arundinis modo. Ex vertice germen emergit molli corpore, longitudine ferè cubitali, à quo alia prodeunt, ternum quaternumve digitorum interuallo, ex quibus circumminent fructus parui cucumeris magnitudine, per maturitatem quodammodo flavescentes ficuum instar cortice contexti, eodem quoque modo quo ficus spoliuntur. Substantia pulpæ melopeponibus similis nullo intus osse, neque semine. In principio gustantibus insipidi esse quodammodo iudicantur, nec ita gustatui suaues: sed qui iis vesci per seuerant, magis ac magis in dies oblectantur, occulta quadam saporis suauitate ita allecti, ut nunquam iis saturari posse videantur. Musæ meminit Auicenna, ut diximus, item Serapio his verbis. Musa excofacit in medio primi abscessus, humectat autem in eius fine. Paucum præbet alimentum. Priuatim prodest thoracis, pulmonis, ac vesicæ ardoribus. Aluum emollit, verum liberalior eius vsus stomacho aduersatur, ac iecur obstruit. Quamobrem si quis cum frigidi sit temperamenti ea copiosius vescatur, subinde aqua mulsam, oxymeli, aut zingiber conditum sumat necesse est. Fœtū in utero alit, renibus opitulatur, vrinam ciet, & venerem stimulat. Hæc Serapio. Si Musa hæc Palmæ genus est, quodnam id sit ex tot generibus quæ ex Theophrasto recensuimus, dictu difficile est, nisi quis id esse iudicet, quod Theophrastus in Cypro nasci prodidit, folio cæteris ampliore, & folio longè maiore, magnitudine Mali Punici & figura oblongo. Carolus Clusius in ea est opinione ut existimet Musam Arabum eam esse plantam, cuius Plinius meminit his verbis. Maior alia poma, & suauitate præcellentior, quo sapientes Indorum

Li. 2. c. 491.  
cap. 84.

Vires &  
Temper.

Lib. 2. hist.  
cap. 8.

In Arom.  
Indi. hist.  
cap. 10. li. 2.  
Lib. 12. c. 6.



M V S A Pacouera Theueti.

Lib. 5. c. 15.  
Lib. 8. c. 1.  
Cap. 33. fin.  
Ame.  
Theuet.  
Cosmog.  
T. 1. lib. 5.  
cap. 2.  
*Mauze.*



vt nos uas pensiles eoque sæpe solo tanquam optimo vtuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, adeò vt nisi maxima truncum haberet coxæ hominis crassitudine parem, minima tibix, in cremiorum non in arborum numero recensenda foret. In America semel aut summum bis fructus fert. In Æthiopia & Arabia vicinisque insulis etiam triferæ est. Idem Theuetus in regione Catay nasci arborem refert quæ Photel nominatur Fructu edit magnum, Muzæ Ægyptiæ fructui parem, sed paulò breuiorem: quam ob causam nonnulli ficum Pharaonis vocitarunt. Is præter ceteras dotes, ad sedandam sitim & febrium ardentium æstus refrigerandos perutilis est: folium Plantaginis habet, sed paulò spissius. Arbor octo cubitorum altitudinem vix superat. In ramorum eius vtrique parte fructus provenit, ligno ipsi hærens, sub foliis occultatus, quæ arthritidi mirè profunt.

## NANA. CAP. LXXV.


Theuet.  
cap. 46.  
singul.  
Americæ.



Lib. 7. c. 13.  
*Yayama*  
*Indoru.*

FRUCTUS NANA à Brasilianis nuncupatur, citruli mediocris magnitudine, toto ambitu Pineæ nucis specie, fulcus cum maturuit. Mirè excellent hic fructus tum dulcoris, tum suauitatis gratia quouis saccharo præstantior, non maturus tam insuauis vt os vinceret. Semen nullum profertur, quare surculo feritur. Non nisi conditus ad nos deferri posset, quia post maturitatem diu seruari nequit. Hoc ægri frequentius vescuntur, quàm villo alio cibo. Hunc fructum describere videtur Ouiedus nomine Yayama his verbis à Clusio traductis. Nascitur in Hispaniola, ceterisque vicinis insulis fructus, quem Hispani à Pineæ nucis similitudine Pinas appellant, non quòd eiusmodi squamas lignosas habeat, sed quòd eius cortex simili modo distinctus videatur, tamen non squamatis, sed peponis modo cultello integer auferatur. Vt autem succi bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit, ita color illi pulcherrimus ex luteo virens, paulatim per maturitatem virore euanescente. Odor ei iucundissimus, qualis ferè



NANA fructus, siue  
Yayama.

ferè in eo Persicorum genere, quod à malis & cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inuenit: magnitudo illi vulgaris melonis. Nascuntur verò singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, cui folia oblonga, ex quorum medio profilit caulis rotundus, vnicum ferès fructum, qui post decimum aut duodecimum mensem demum maturefcit. Eo sublato nullus præterea in planta nascitur fructus, ideòque ea velut inutilis abiicitur. In extremo fructus, interdum etiam in extremo caule sub fructu enascuntur veluti germina & turiones quidam, qui fructui magnum addunt ornamentum: hi sunt tanquàm semen: panguntur enim tribus sub terra digitis, sic vt media turionum pars extra terram extet, atque radices agunt, suoque tempore fructum perficiunt. Varia sunt eius genera, quæ pro linguarum varietate diuersis nominibus nuncupantur: tres vero distinctæ species notantur. Prior Yayama ab incolis appellata, altera Boniama, tertia Yayagua. Postrema carne est candida, gustu vinoso, sed acido & acerbo. Boniama carne est candida, gustu dulci, & quodam-

modo fatuo. Yayama reliquis oblongior est, & bonitate illis præstat, carne fuluente, gustu dulci & suauis. Per omnium tamen carnem sparæ sunt fibræ quædam tenuissimæ, quæ tamen palatum inter edendum non offendant, gingiuas tamen lædunt, si quis crebrius eis vescatur. Quibusdam locis nascuntur etiam hæc genera spontè in agris copiose, at quibus cultura accessit longè sunt iis suauiores, & cultoris beneficium abunde penfant. Huius fructus abundantia auctoritatè eius minuit. Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim tantum aut viginti diebus conseruari potest. Hactenus Quiedus. Narrat etiam Theuetus Necumere maris Indici insulam innumeris fructibus abundare, inter quos qui ipsorum lingua Melenken nominatur, magnus est nucis pineæ specie, cortice luteo, quo spoliata carnem & in particulas confectam si degustaueris, saccharum ore continere dixeris cum pauxilla nucis muscata: portiuncula permixtum. Hoc Barbari præferunt ad sedandam sitim vtuntur. Fructui Nana satis similis est, nisi quod Melenken in arbore prouenit Mori ferè proceritate, nigro cortice vestita, folio quadatenus rubescente, longitudine & latitudine folij Angelicæ. Nana autem planta est foliis lunco similis, nunquam ad tantam altitudinem accrescens.

## ARBOR GEHVPH. CAP. LXXVI.

**L**IT Taprobana insula hodie Sumatra nuncupata arborem admirandæ facultatis, vt refert Theuetus, quæ illic Gehuph, in India Cobbam dicitur. Foliis est paruis, quemadmodum & arbor quæ siliquam catharticam fert, ramis breuioribus, cortice flauescente, siue croceo: fructu crassiusculo & rotundo pilæ lusoriæ instar, in quo nuxauellana: par coërcetur, quæ nucleum includit valde amarum, qui linguæ admodum radice Angelicæ saporem refert. Fructus ad sedandam sitim commodissimus.

R r r 2


Cosmog.  
T. I. lib. 12.  
cap. 1.  
Forma.



## ARBOR Gehaph.



FICVS Nigritarum.



## Forma.

Theuctus  
cap. 10.  
lib. sing. &  
T. 1. Cosm.  
lib. 3. cap. 4.  
lib. 8. c. 4.

ni leporino figura simile, magnitudine fabæ. Alij eo simias nutriunt. Sunt qui ex eo maturo, & tempestiuè exsiccatò pulchra monilia conficiunt. Huic arbori similem ferè, sed folio valde diuersam arborem describit Ouiedus in Indica Historia, quam Higüero vocat nomine tetrasyllabo. Arbor est prægrandis, inquit, velut Morus nigra, fructum ferens cucurbitæ rotundæ, interdum verò oblongæ similis. Ex rotundo pateras & alterius generis vasa conficiunt. Materie est robusta, atque

mus. Eo tamen nucleus quamuis amarus longè præstantior: ex eo enim indigena oleum eliciunt, seduloq; cōseruant, quia ad hepatis & lienis dolores maximè confert: quibus doloribus cum affliguntur, primùm dies aliquot parcissimo vtuntur victu: deinde octo dierum spatium oleum sumunt: quo tempore morbus paulatim minuitur, & tandem curatur. Quod si qui oleum sumere noluerint, veluti pueri & mulierculæ, eo ventriculū, spinam dorsī, latera inungunt. Idem articularis morbi, cui huius insulæ incolæ valde obnoxij sunt, summum est remedium. Ex eadem arbore gummi manat vtilissimum. Ex eo enim cum mediocri oleo supradicto dissoluto, cataplasmata conficiunt quæ pellibus illinunt, & partibus laborantibus applicant. Hanc arborem diligenter prope ædes suas, & in hortis colunt.


## FICVS NIGRITARVM.

## CAP. LXXVII.

**N**unc siluestres plantæ dicentur quæ peregrinæ sunt, non illæ quidem in Syria, aut Ægypto genitæ, sed in Nouo, & veteribus Cosmographis incognito orbe, scilicet in America, seu Francia Antarctica, quas illic Andreas Theuctus vidit, obseruauit, aut à peritioribus curiosius didicit, & literarum monumentis consignauit. Ac primùm in Regno Senegæ promontorium est, ab incolis Ialont, à nostris qui primi illuc nauigarunt Cap Verd, id est, promontorium Viride nuncupatum, ab arborum fruticumque toto ferè anno illic virescentium copia. Iuxta hoc promontorium tres sunt paruæ insulæ continenti propinquæ, pulcherrimarum arborum feraces, à nullis tamen habitata. In vna harum provenit arbor quæ folia fert Ficus nostratis similia, fructum pedes duos, aut circiter longum, proportionem crassum, ad longitudinem crassitudinemque Cypriarum cucurbitarum accedentem. Quidam hunc esitant, non aliter quàm nos melones nostros. Intus semen est re-



FOLIUM dictum  
Higüero.



atque apta sedibus, subfelliis, ephippiis, aliisque operibus fabricandis: Mali enim Medicae, aut Punicae materiam esse diceres. Cortice facile delibratur. Folio est oblongo, angusto, in extremo latiore, à quo ad pediculum usque paulatim angustius fit. Indi nonnunquam in aliorum fructuum penuria hoc vescuntur, id est, eius carne, quæ cucurbitæ carni cum adhuc viret, similis est. Corticis color & forma cucurbitæ. Vulgaris est hæc arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & huius Indiæ continente. Priori similiorem fructum non tamen eundem memorat Theuetus, qui in insula Zipangu provenit magno meloni par, cui nomen Chiuef, quod Syriacè ficum significat. Fructus is suavisissimus est, cum manditur mannæ modo in ore liquefcens. Semina intus continet qualia in cucumere nostro reperiuntur, cortice cum maturuit croceo, folio arboris eximie viridi exquiritè rotundo, aureo numo Gallico pari.

Cosmog.  
T. I. lib. 12.  
cap. 20.

AHOVAI. CAP. LXXVIII.



ARBOR hæc in America etiam provenit, ea ferè proceritate qua Pyrus nostra, foliis tres quatuorve digitos longis, duos latis, toto anno virentibus. Cortice integitur candicante, succum album, si ramulus abscindatur, & quasi lacteum fundente. Arbor ipsa concisa vehementer terrum abominandumque odorem spirat. Quare nullus eius omnino apud

Forma.  
Theuetus  
cap. 36. lib.  
sing.

AHOVAI.



Barbaros vsus, ne ad ignem quidem accendendum. Fructum profert castaneæ mediocris magnitudine, album, Græcæ literæ Δ figura.

Vires.

Huic, præsertim nucleo, venenata & mortifera vis inest, quo Barbari ex leuissima quaque occasione vxores iis irati necant, & contrà vxores viros suos. Quam ob causam exteri à Barbaris hos fructus recens collectos, nec precibus, nec pretio impetrare possunt, imò filios suos ab illis prorsus abstinere iubent, priusquam nucleum exemerint, quo exemplo ex corticibus tintinabula conficiunt, tibiisque applicant, æquè bene ac nostra tinnientia. Clusius rei herbariæ peritissimus, & stirpium exoticarum obseruator diligentissimus, cum de Guanabano differuisset, fructus eius iconi, quæ paulò post expressa est, hæc subiicit. Porro apud me seruo ex huius fructus, aut huic similis seminibus, quibus exempta est medulla, lora duo filo xyliño contexta: alia item bina è fructu quodam anguloso. Constant verò singula lora duplici aut triplici filorum xylinorum ordine reticuli modo contextorum, ex quibus de-




Vsus.

pendent vacui fructus eo quem exprimi iussimus modo. His Canibales ad crura alligatis in suis saltationibus uti solent, quemadmodum apud Mauritanos atque etiam Hispanos nolarum & tintinabulorum vsus est: mirum enim quantum hi fructus ex mutua collisione sonitum edant. Posterioris meminit The-



FRUCTVS Higuero,  
ex Clusio.

AHOVAY Theueti,  
ex Clusio.



uetus cap. 36. singular, Americæ: deinde subiungit eadem de Ahouai, quæ hoc capite retulimus: tum icones duas, priorem sine inscriptione, alteram cum hac Ahouay Theueti. Lobellius priorem inscribit nomine fructus Higuero apud Clusium.

## HAIRI.

## CAP. LXXIX.

Forma.  
Theuetus  
cap. 38. lib.  
singul.

Vfus.

Lib. 8. c. 15.



**H**AIRI in America arbor est, folio palmeo, ligno marmori nigro simili, quamobrem multi Ebenum esse existimant: quorum sententiam Theuetus non approbat. Nam Ebeni lignum nitidius splendet. Deinde arbor hæc tota spinosa est, minimè verò Ebenus. Postremò Ebenus in Æthiopia & Calicuto nascitur. Lignum istud ferri modo ad ima aquæ sedit: quare Barbari ex eo enses conficiunt, atque monilia. Adeoque durum ac validum est, ut ex eo sagittæ quasvis ferreas loricas penetrare possint. Fructum edit pilæ lusoriæ magnitudinæ, altero extremo quodammodo acutum. Intus nucleus est niuei candoris. Huic quidam similem fructum nomine Yayama descripsit Ouiedus, de quo suo loco dicemus.

THEBE





Arbor excelsissima est, ramis in sese per transversum insertis, ut non natura, sed arte id fieri existimare possit, qui arborem contemplatus fuerit. Folio est Brasicae, fructu in quibusdam ramis p. dis vnus longitudine, quo apum examina nutriuntur, quae in cauum arboris sese recipientia, illic mel ceramque conficiunt. Mel hoc magno apud Barbaros est in pretio, quod eo aegros alant, cum farina recenti permixto, quam ex siccatis tusisq. radicibus in vsu reponunt. Est animal nomine *Heyrat*, id est, Bestia mellis, fuscum, felis nostri domestici magnitudine, quod vndique ad huiusmodi arbores accurrit, mellis, quod in iis reperitur, avidissimum. Id ea arte ex cauis arborum vnguibus educit, ut apes non laedat, neque ab iis laedatur.

Forma.  
Theuerus  
cap. 11. lib.  
singul.

Usus.

COHYNE.

CAP. LXXXI.



NAMERICA regio est *Morpion* nominata, quam hodie incolunt Lusitani. Ea plurimorum & optimorum fructuum ferax est, eius praesertim quem Nana appellari diximus. In iis etiam est fructus eius arboris quam Cohyne vocant, quae folium habet Lauri, fructum Citrulli mediocris magnitudine, cui sthrutocameli figura qui edulis non est, aspectu

Forma.  
Theuerus  
cap. 14. lib.  
singul.

Usus.

COHYNE.



ramae pulcher, praesertim in ipsa arbore ramis eo onustis. Barbari ex ipso pocula faciunt: praeterea arcanum quoddam, & plane stupendum mysterium. Excavat hunc fructum milio, feminibusve aliis implent. Deinde baculo parte vna in terram defixo, altera in fructum inserto, eum toto ambitu speciosis plumis exornant, singuli que in singulis tuguriis binos ternosve huiusmodi fructus seruant, magnosque habent in honore: quod iis miseri idololatrae diuinitatem quandam inesse existiment, nihilque aliud quod sensu percipiatur adorant quam hoc instrumentum, quod cum tangitur, percussiturve tinnitum reddit: adeoque sunt vecordes, ut cum tinnit, & percussum resonat summum illum Deum esse putent, quem sua lingua *Toupan* nominant, qui loquatur, quaeque ipsis, maxime vero ipsorum prophetis omnia praefagiat. Recitatur eadem Historia à Clusio in scholiis cap. 11. lib. 2. de Aromatib. Indicis, ubi ait fructum huius arboris vocari *Maraka* & *Tamaraka*.



## Nomina

## Forma.

Theue us  
cap. 9. lib.  
sing. & T.  
2. Cefimo.  
lib. 2. c. 1.

*Yorzia vulga*  
*à Jussieu de la rade*  
*Verzina de Jussieu*



**Q**UAE arbor Brasilia, Gallicè l'Arbre du Bresil nominatur, ab America incolis Oroboutan dicitur. Specie est pulcherrima, procera, recta, tam crassa quam quævis alia, foliis Buxo similibus, æquè paruis, sed densis & perpetuò virentibus: cortice cinereo, ligno rubro, maximè eius intima parte, siue corde, quod præstantius est, cuiusque maior copia à mercatoribus coëmitur, ita ut ex tam crasso caudice, quem vix tres homines amplecti possint, nō excindatur matrix hominis coxa crassior. Arbor hæc neque fructum, neque gummi vllum profert. In Barbarorum regione, qui Canibales appellantur, provenit: multò præstantior in regione Morpiu, & promontorio Frie dicto. Inodora est, & infecturis tantum dicata. In eadem America nascuntur arbores quædam ligno luteo, ex quo enses fiunt, aliæ ligno purpureo, ex quo pulcherrima tinctura fieri posset, aliæ ligno candidissimo & tenerrimo, nulliusque apud Americanos pretij.

## ACAIOV.

## CAP. LXXXIII.

*Acaion una Arbo*  
*cara*

## Forma.

Theuct. c.  
61. h. sing.



**P**ARS illa America quæ Anthrophagi illi tenent, quos Canibales appellant, maximam copiam fructuum, herbarum, radicum suavisimarum, earumque arborum producit, quas Acaion vocant. Est autem arbor Acaion folio Pyri nostra, paulò magis acuminato, & extremo rubescente. Fructum edit pugni magnitudine, oui anserini figura, ex quo nonnulli positionis genus quoddam parant: quanquam is edulis non sit, sorbo nondum maturitate perfectam adepto gustu similimus. Huius extremo adnascitur veluti nux, maioris castaneæ magnitudine, leporini renis figura. Nucleus inclusus esui suavissimus est, modò ignem leviter attigerit. Cortex oleo totus mader, gustu acerrimo, ex quo Barbari maiorem olei copiam, quam nos ex nucibus nostris, elicere possent. Illic aliæ reperiuntur arbores quarum fructus perniciosi sunt, in quibus est illa quæ Haounay nominatur.

DRACO



**I**N INSULA à Lusitanis Madera dicta, veteribus incognita, crescit arbor auctore Theueto, ab incolis & Lusitanis Draco dicta, quæ statot  
anni tempore optimum gummi fundit, quod sanguinem Draconis  
appellant (rectè ne an secus, dubitat) perforato arboris stipite propè

Cosm. T. I.  
lib. 3, ca. 11.

DRACO. arbor.



FOL. IV M arboris sanguinis Draconis.



radicem satis lato & profundo hiatu. Praterèa fructum profert luteum, cerasi nostratis magnitudine, refrigerando corpori, & leuandæ siti, in febre, ac in summis ardoribus utilissimum. Succus is siue gummi, simile est, inquit, Cinnabari, sed diuersitate nascendi distat: illud enim liquor est, hæc fossilis, & ex Africa solum deferretur, magnoq; constat, quoniam vix reperitur, quæ pictorum intentis coloribus satisfaciât. In ea tamen re statuenda multum hæsitat. Hoc enim gummi sanguinem Draconis esse haud diffusetur, etsi ratio id admodum non suadeat, nisi Africa barbari, vnde primum deferrebat hic liquor, arborem hunc fundentē, lingua sua Draconem appellarint: non audet tamen affirmare plantam quæ hoc gūmi emittit, eam esse quæ in Africa nascitur, cum figura differant. Tandem vtrumque idem esse illi persuadent facultates & vires planè eadem, vt ab iis didicit, quos diligenter percontatus est. Sed nemini dubitandum sanguinem Draconis arboris siue gummi, verum esse Cinnabari, quod nos hodie ex insulis Canariis, quæ olim Fortunatæ dictæ sunt, habemus, quodque Officinæ sincerum & minimè adulteratum vocant sanguinem Draconi in lacrymis, à factis, quod in offas panis modo cogitur, distinguentes. Prius illud etiam Dioscor. sanguinem Draconis à quibusdam existimari dixit, de quo & Pinius hæc falsò tradidit. Milton vocant Græci minium, quidam Cinnabari: vnde natus error Indico Cinnabaris nomine. Sic enim appellant illi sanies Draconis elisi elephantorum morientium pondere, permisto vtriusque animalis sanguine. At Cinnabari minium non est, sed liquor arboris quæ diximus, neque sanguis siue sanies Draconis & elephanti: iam enim priscorū temporibus Arrianus in Periplo nouit Cinnabari lacrymam esse arboris. Et Cadamostus in libro Nauigationum narrat in insula Portus sancti, vna ex Canariis, colligi sanguinem Draconis, qui lacryma est arboris, quæ statot anni tempore ferro vulnerearetur, ex qua plaga anno proximo fluebat gūmi, quod athenis decoctum & defæcatum, sanguis efficitur, quem

Li. 5, c. 109.

Lib. 33, c. 7.

Cap. 4.



*FOLIUM arboris Dra-*  
*conis ex Indiis delatum.*



*Vires.*

Lib. ca. 109.

*FRUCTVS Sanguinis*  
*Draconis.*

Lib. r. stirp.  
Hispa. c. 1.

*Forma.*



quem Draconis appellant. Fructum edit Cerasi  
instar, gustu suauem, coloris carulei (aliis lutei)  
Eius insula incolae siluam Draconum vocant,  
& aduenas eam adeutes huiusmodi nomine per  
iocum deterrent. Pena eius arboris folium de-  
pinxit, quale hic intueri licet, ex Occiduis In-  
diis delatum, coriaceum, cui simile aut par lati-  
tudine aut crassitudine vix vllum est. Ex Palmae  
congenere arbore euulsum videtur: quin ipsa to-  
ta textura asserem bicubitum latum, quater-  
nos, aut quinos cubitos longum refert, regulae modo  
fornicatum, media secundum longitudinem co-  
sta, semidigitum crassa, carinatum, superna ora  
quasi praesectum esset, margine digitali, tenuio-  
re, duriore clauditur. Vniuersum folium a sum-  
mo ad imum in villos quadatenus similes iis qui  
obducunt nucem Indicam, aut capillitium texen-  
dis funibus aptum discerpitur, quemadmodum  
totum est tectoris aedium & stercoris accommo-  
dum. Vim habet sanguis Draconis auctore Dios-  
coride, haematite lapillo eandem: conuenit ad  
oculorum medicamenta, verum efficacius: ma-  
gis enim adstringit, & sanguinem cohibet: am-  
bustis igni & papularum eruptionibus excepta  
cerato medetur. His quae dudum de hac arbore  
commentati fueramus, adiungere libuit ea, quae  
de eadem Clusius obseruauit & nuper edidit.  
Hanc arborem primum Olysiopone se vidisse  
ait, anno salutis humanae, 1564. post monaste-  
rium D. Virgini sacrum, cui nomen a Gratia,  
monachis ignotam & neglectam. Est Draco  
procera arbor, inquit, Pinum procul intuentibus  
referens, adeo aequales semperque virentes ra-  
mos habet. Huic truncus crassus, valde scaber,  
multis ramis dehiscens, octo aut nouem bicubi-  
tales ramos aequales & nudos sustinet, qui rursus  
in summo finduntur in alios ternos aut quater-  
nos ramos cubitales, aut paulo ampliores, bra-  
chialisque crassitudinis, etiam nudos, ex quorum  
capitibus folia prodeunt cubitalia, & emi-  
pollicis latitudine, in medio densiora, & emi-  
nentiore quodammodo costa, veluti Iridis fo-  
lia, tenuia & rubentia in lateribus, mucronem  
plane referentia, semper virentia. Fructum pro-  
fert colore flauescens, sapore aliquantulum  
acido, magnitudine exigui Cerasi. Ex trunco per Caniculam aestus humor emanat,  
qui in rubram lacrymam densatus, sanguis Draconis appellatur, ob ipsam ar-  
borem Draconem. Materia trunci firma est, ferrumque difficile admittit, quod ve-  
luti fibris transversim & oblique excurrentibus confert. At rami cum multo suc-  
co praegnantes sint, facile cadi possunt. Haec Clusius, qui folium quale Olysiopone  
vidit,



vidit, descripsit Pena multò grandius & habitius, ex India delatum. Iis fabulam, opinor, affinxit Nicolaus Monardis, cum scripsit ex Noui orbis cōtinenti allatum ab Episcopo Carthaginiensi fructū arboris ex qua manat lacryma illa, quam sanguinem Draconis vocant, cuius fructus sublata cute illico Dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, vt à peritissimo aliquo artifice in marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore hianti, spina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conspicuis. Id quod in fructu eiusdem arboris se vidisse negat Clusius, qui fructum asserit se habuisse Cerasi magnitudine, rotundum, laeuem, tenui pelle contextum, quā sublata nucleus totus osseus conspiciebatur, sine vlla animalis, nedum Dracunculi effigie. Adhuc idem Nicolaus arborem scribit esse cortice satis tenui, & qui facillè incidi possit, cui prorsus repugnat à Clusio tradita descriptio.

Lib. simpl.  
Occid.In Schol.  
in Nucl.

## AGNVS SCYTHICA, BORAMETZ. CAP. LXXXV.

**S**UPERIORA ludum putes, prout est admirabilis Tartaricus frutex, inquit Scaliger. Tartarum horda primaria Zauolha est, vetustissima nobilitatis commendatione. In eo agro ferunt semen, seminis melonis similitum, sed minus oblongum. Ex eo satu planta exit, quam Borametz, id est, Agnum vocant. Crescit enim agni figura, ad pedum ferè ternum altitudinem: quem pedibus, vngulis, auribus, toto capite, præterquam cornibus repræsentat. Pro cornibus pilos gerit singularis cornu specie. Obducitur corio tenuissimo: cuius detracti vsus ad tegmina capitum incolis. Ferunt internā pulpam gammari referre carnes. Ceterum è vulnere quoque sanguinem manare. Dulcedine esse admirabili. Radicem humo exertam furrigere ad vmbilicum vsque. Illud miraculi fouet magnitudinem. Quandiu vicinis obsidetur herbulis, tandiu viuere, quasi agnum in læto pascuo. Absumptis illis tabescere, atque interire. Idq; non solum vel casu, vel tractu temporis, sed etiam experiundi gratia, subtractis, atque ablatis euenire. Quin illud auget admirationem, appeti à lupis eam, non item ab aliis bestiis, quæ carne vescantur. Hoc quasi condimentum, atq; intritum, ad fabulæ & agni allusionem. Illud scire velim, inquit Scaliger, ab vno stipite quatuor disita crura cum suis pedibus, quæ possint prouenire atque produci. Eadē Sigismundus Liber refert in suis cōmentariis De rebus Maschouitarū.

Exer. 184.  
29.

Forma.

## ARECA PALMA SCRIPTORIA, TAL,

Arbor maximis foliis. CAP. LXXXVI.

**E**ST Palmæ species gracilior, procera, foliis læuissimis. Inter quæ racematim hærent poma, nucum magnitudine, alba. Fructus is pro bellariis manditur à potentioribus. Areca nomen est. Fertur in mercatus, magna æstimatione recens. Seruatur & in modum palmularum siccata. Vartomanus Areca vocat arborem, fructum Coffol, Ludouicus Romanus lib. Nauigat. 5. cap. 7. Chofolo vocat, Garcias lib. 1. cap. 25. Historiæ Aromaticum Indic. Faufel & Arecam, de quo multò plura suprà hoc ipso libro diximus. Sunt & humilia Palmeta, inquit Scaliger, folio tam politæ superficiei, vt eo pro chartis vtantur ad scribendum. In Prouincia Mangi arbore est Tal nomine, folio grandi quod chartæ vsum præbet in tota India. Fructus profert magnis Napis similes. Quod cortici subest tenerum est, dulce, esu gratum: cortex tamen melior & suauior à quibusdam Vguetal nominatur. Nicolaus Costinus prodidit haud procul ab vrbe Cæli reperiri vniones. Ibidem nasci arborem sine fructu, cuius folia sex brachia sunt longa, totidem lata, adeò tenuia, vt compressa comprehendì manu possint, quibus chartæ vice vtuntur ad scribendum, & ad pluuiam

Exer. 185.  
6.

Forma.

Vfus.

Exer. 186.  
Nic. Cost.

icine.

Forma.

Theuer. T.

1. Cosmog.

lib. 1. ca. 23.

In iciner.

Forma.

Vfus.



pluuiam accendam: folio enim expanso, tres quatuorve in itinere ita operiuntur, vt pluuias non metuant.

GUIABARA, COPEY. CAP. LXXXVII.

Lib. 8. ca. 13.  
& 14.  
**Nomina**  
**Forma.**



LIAS duas papyraceas arbores hîc describimus ex Ouiedo, quæ in insula Hispaniola proueniunt. Minor *Guiabara* Barbaris dicitur, Hispanis *Uuero*, ab *vua*, quod pro fructu vuas ferat. Materia est rubescens, rotunda, densa, atque ideò optima, præsertim ad carbonem ramis expansis. Vuas edit rarius sparsas, atque à sese disitas, rosæ aut mori concolores, exigua earum parte esculenta: nam acini sunt auellanæ nucis magnitudine,

FOLIUM *Guiabara*.



FOLIUM *Copey*.



nucleum tam crassum cõcludentes, vt parum carnis superfit. Folij figuram hîc depictam videtis, ab aliarum arborum foliis planè diuersam, atque ideò memoratu dignam: maximum palmæ manus magnitudine par est, dempto pediculo. Id Hispanis in insula Hispaniola & finitimis bellum gerentibus papyri & atramenti vsum præbebat: tota enim hæc regio charta ad scribendum & atramento prorsus caret. Folium istud viride est, aliquando rubrum, crassum & æquè spissum ac duo *Hederæ* folia simul iuncta. In parte tam prona quàm supina literas pingebant acicula, aut stylo aliquo, modò recens esset, & eodem die decerptum, quæ candidæ apparebant, aut ita diuersi à folio coloris, vt faciliè legi possent: neque enim folium literas transmittit, & costa per medium eius excurrentes etsi crassiuscula sit, tamen venulæ ab ea deductæ sunt tenues: vt scribentis manum nihil aut parum remorentur. Altera papyracea arbor *Copey* nuncupata in eadem insula crescit, *Guiabara* procerior, folio specie quidem simili, sed duplò maiore, crassiore, & ad scribendum aptiore cum acicula, aut stylo aliquo, venulæq; exiliores sunt quàm superioris, & minis scribenti impedimentum adferunt. Quamobrem cum Hispaniolam & cæteras insulas Hispani subiugarent, iis foliis chartarum lusoriarum vice utebantur, quod in iis Regum, Reginarum, equorû, & aliorum huiusmodi figuras faciliè imprimebant, nec faciliè rumpantur.

ARBOR FOLIIS AMBVLANTIBVS.

CAP.

LXXXVIII.

Pigafet. in itin.  
**Forma.**  
**Vis mira.**



IN SVLAE Cimbubon vicina est alia, in qua nascitur arbor, cuius folia, cum in terram deciderint, gradiuntur perinde ac si viuerent. Ea Mori foliis multum similia sunt, parte vtraque binos pedes breues, & acutiusculos habent, quibus abstractis sanguis minimè manat. Statim atque folium quis attigerit, illud mouetur & abit. M. Anton. Pigafetta octo dies vnum in scutula habuit, quod cum tangeret, circa scutulam ibat: nullaque alia re quàm aëre viuere existimabat.



**I**N medicamentis & stirpibus Indicis nobis incognitis non abs re fore duxi, inquit Garcias lib. 2. Arom. H. st. cap. i. initium facere ab arbore quadam, quæ nō nisi à Solis occasu usque ad eius ortum floret, interdum minimè. Arbor est Oleæ magnitudine, foliis Pruni similibus, flore noctu (dum scilicet floret) odoratissimo, nullius quod sciam vsus propter tencritatem, nisi quod florum pediculis, qui lutei sunt, huius vrbs incolæ vtuntur cibus tingendis, siquidem Croci modo inficiunt. Et volūt etiam nonnulli aquam stillaritiā florum, oculis vtilem esse admoto li. eo panno hac intincto. Peculiaris est hæc arbor Goæ, quam è Malaca allatam asserūt. Eam sane nusquam alibi per Indiam vidi. Hanc Goæ *Parizataco*, in Malayo *Singadi* vocant. Arboris *tristis* nomen illi inditum, quòd duntaxat noctu floreat. Fabulantur autem indigenæ, Satrapæ cuidam nomine Parizataco elegantem fuisse filiam, quæ cum Solem deperiret, eam ille compresserit. Cum verò postea illam relinqueret alterius amore irretitus, Parizataci filia præ amoris impatientia sibi ipsi mortem conscuerit. Ex cuius crematæ cineribus (nam adhuc vrantur in hac regione cadauera) hæc nata est arbor, cuius flores adeò Sol exhorrent, vt eum videre non sustineant. Hactenus Garcias. Pretium verò opere fuit audire quæ de eadè p. antea Christophorus Acolta Africanus, Medicus, refert. is igitur libro Aromatum & medicamentorum in Orientali India nascentium, Arboris Tristis natales & qualitates ita describit, & quam damus icone representat. Nonnullis Indiæ locis, præsertim verò in Malabar frequentissima nascitur arbor quedam, magnitudine & forma fere Pruni, multis prædita ramis tenuibus, & cæta per spacia nodulo distinctis, è quo vtrinque singularia folia enascuntur Pruni foliorum magnitudine mollia & lanuginosa parte auersa, quemadmodum fere Saluæ folia, & viridia non nihilq; aspera parte interiore, nō adeò serrata in circuitu, vt Pruni folia, neque tam multis venis prædita. E singulorum foliorum sede nascitur pediculus quinque capitula summa sui parte sustinens, quæ quatuor foliolis subrotundis cōstant, è quorū medio quinque flores exiliunt candidi, elegantes, Aureæ mali floribus magnitudine & figura pares, tenuiores tamen, elegantiores, & odoratores, pediculo magis ad rubrum quàm ad flauum colorem tendēte, quo in illis regionibus edulia tingunt, quemadmodum apud nos vulgò fit Croco: fructus magnitudine lupini est, viridescens, cordis effigie, per medium secundum longitudinem sectus, continens in utraque parte quoddam receptaculum, in quo semen occluditur, magnitudine seminis Ceratij siue Siliquæ, cordis effigiem retinens, album, tenerum, membrana subuidente tectum, non nihil amarum. Vocatur hæc arbor in Canariis *Parizataco*, in Malayo *Singadi*, in Decan *Pul*, ab Arabibus *Guari*, à Persis & Turcis *Gul*. Res est profecto obseruatione dignissima, conspiciere hanc elegantissimam arborem nocte pulcherrimis, suauissimeq; olentibus floribus onustam & hilarem, & simul atque à Solis radiis illustratur, non modò flores omnes in terram abiicere, sed totam arborem cum suis foliis quodammodo marcidā apparere. Inter omnes sanè quos vnquam odoratus sum flores nullum meo iudicio memini cum hoc comparandum, præsertim initio dum quis repente locum ingreditur vbi hæc arbor est constitutam postquàm manu contacti sunt, exiguus & euanidus est odor. Indigenæ istos flores correficere censent, sed amariusculi sunt: nam recenter ex arbore collectos & in cibus degustari, & nonnullam amaritudinem semper deprehendi. Gentiles etiam medici eius semen inter medicamenta correficientia recensent. Multi proteges, tribuni, atque alij priuati hanc arborem in Lusitaniam transferre voluerunt, sed irritò conatu. Noui etiam quosdā qui semē cōmodo tempore collectum

Forma  
ex Gar-  
cia.

Nomina

Acoste  
descriptio

Nomen  
clature  
varia.

Odor.

Florum  
vires.



## ARBOR Tristis, Acoſta.

ARBORIS Tristis rami  
cum flore & fructu, Cluſij.

Mogli.

ris Indicæ cuius flores odoratiſſimi aperiuntur, & oriente Solè decidunt: quibus  
notis maxime ad arboris Tristis hiftoriam accedit.

& maturum, vaſculis ſigulatis vitratis atque bene obturatis, item argenteis, pyxidibusque ligneis in Luſitaniam detulerunt, ibique cum omni cura & diligentia ſeuerunt, ſed nunquam naſci voluit. In Malabar autem & Goa, locisque vicinis cum tanta facilitate naſcitur, vt quilibet rami in terram depaſti comprehendant. Hæc ille, vt Hiſpanica eius quidem verba interpretatus eſt Cluſius. Qui & ipſe harum rerû ſtudioſiſſimus, quæ ab ornatiſſimo viro multiſque peregrinationibus claro, Dn. Fabio Mordente Salernitano, qui aliquot annis Goæ viciniſque in India locis vixit, familiaribus ſermonibus acceperat, quia publicè omnibus communicauit, eorum te hîc etiam uſu & voluptate fraudare nolumus, præſertim cum ex rami cum ſuis floribus ab ipſo expreſſis collatione cum Acoſtæ delineatione facta, non parum tota huius plâæ hiftoria illuſtreſcit. Aſurgit, inquit, ea arbor interdum ad trium hominum altitudinem, iuſtâque craſſitiem acquirit: ramos habet multis alis concauos, & foliis Myrti foliis quàm ſimilimis onuſtos: in tenerioribus ramis naſcuntur flores pediculis ex foliorum interna ſede prodeuntibus inhaerentes, copioſi, hoc eſt, terni, quaterni, aut plures ſimul ſerè congeſti, candidi, laſmini floribus formæ magnitudinèque pares, foliisque mucronatis, vt illi, conſtantes, ſed pleniores multiplicique foliorum textura, odoris fragrantiffimi, & haud multum à laſmini florum odore diſſimilis. noctu autem ſolent ij flores explicari, & oriente Sole, ſimulatque ab ipſis radiis illuſtrari incipiunt, ilico decidere, vel antipathia quadâ, vel præ nimia ſucci tenuitate, quem ſolares radij abſumunt: nam quos Sol non attingit, diutius in arbore hæreſe ſolent. Studioſè verò colliguntur ij flores propter odoris fragrantiam, & vitreis organis odoratiſſima ex illis aqua elicitur, quæ aqua de Mogli dicitur aſſerente Fabricio, quoniâ Malauarica lingua arborem Mogli vocant, floresque idem nomen mutuari ſunt. Eius fructum obſeruaffe negat: quem verò adpingi iuſimus, ſub finem anni 1579. miſſus eſt Vienneniſi cuidam mercatori pro fructu arboris

FICVS





ADMIRATIONE prorsus dignum est, quod se ab eodem Fabricio Clusius accepisse ait de arbore, quam Ficum Indicam ipse appellat: quàmque nos, ut ab illo depicta est, hîc representari curauimus. Sed quandoquidem, inquit, in Indicarum arborum narrationem incidimus, silentio minime premendam duxi miraculo verè dignam eam arborem, de qua idem Fabricius apud me verba fecit. In magnam altitudinem vnico trunco eoque admodum crasso assurgere solet: ramos deinde in omnia circum latera expandit, qui tenues quasdam fibras siue filamenta (qualia in Cuscuta vulgò nuncupata conspicimus) coloris, dum recentia sunt, cerei siue aurei demittunt. Iis, ubi terram attigerint, firmantur, nouamq; quasi prolem generant: etenim magnam crassitiem paulatim acquirunt, & veluti in nouos arborum caudices transeunt, qui novos rursus summa sui parte in latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deorsum missis sese propagant. Sic alij deinceps rami in infinitum, ut interdum vnica arbor suis propaginibus integrum seicè miliare Italicum in ambitu occupet, sitq; difficile, quæ primatia sit arbor, siue omnium istarum prolium parens diiudicare, præterquàm ex trunci amplitudine, quæ nonnunquam in matre tanta est, ut trium virorum vlmis vix apprehendi queat. Verùm non modò inferiores rami similes fibras spargunt, sed etià in arbore summi: ideòque vnica arbor densissimam siluam efficit. Sub eas autem arbores aditum sibi paraturi incolæ, fibras iam in truncos conuersas, tenuiores scilicet, excindere solent, atque ea ratione veluti concamerationes & umbracula facere arcendi caloris gratia: adeò enim densis ramulis reliqui maiores rami luxuriât, ut Solis radij nulla ratione penetrare queant: imò concavi istarum fornicum multiplicésque sinus scindunt inæqualiter inde resultatè aëra, quæ causa est ut Echo multis in locis ter atq; etiam sæpius humanas voces reddat. Vidit verò, qui mihi referebat, interdum octingentos aut mille viros, quo in numero ipse fuisset, vnus huiusmodi arboris umbra tegi atq; affirmabat terna etiam hominū milia sub tali arbore latere posse. Folia fert in nouellis ramis Mali cotonei foliis similia, supernè viridia, infernè candicantia, & lanugine, uti illa, pubescencia, quæ mirum in modum ab Elephantis expectantur, ideòque in eorum pabulum cedere solent. Fructus extremi pollicis articuli magnitudine, ficubus exiguis similis, colore foris & intus sanguineo, granisq; uti vulgares ficus, plenus, dulcis quidem & edulis, verùm saporis minus grati quàm illæ: nascitur autem inter folia, quemadmodum vulgares ficus, hoc est in nouellis ramis, qua parte folia illis inhaerent. Provenit in insula Goa, locisque vicinis.

Forma.

Ficus Indica mira amplitudo

FICVS Indica.



Fructus.

An veteribus cognita fuerit.

Dispicendum superest an veteribus cognita non fuerit hæc arbor, cuiusve historia literarum monumentis tradita, quandoquidè illam Indiæ partem Alexandri Macedonis victoriæ Europæis etiam hominibus aperuerunt. Q Curtius lib. 9. Histor. rerum ab Alexandro gestarum, refert, Alexandrum Poro rege, & Hydaspæ amne superato, ad interiora Indiæ processisse. Siluas



Ficus Indi-  
ga Plinij.

Indica ar-  
bor admi-  
rabilis.

Ficus Indi-  
ca Theo-  
phraſti.  
Cap. 12.

autem fuiſſe prope immenſum ſpatium diſſuſas, proceriſque & in eximiam alti-  
tudinem editis arboribus vmbroſas: pleroſque ramos inſtar ingentium ſtipitum  
flexos in humum, rursus qua ſe curvauerant erigi, adeo vt ſpecies eſſet non rami  
reſurgentiſ, ſed arboris ex ſua radice generatæ. Plinius verò lib. 12. naturalis Hiſt.  
cap. 5. de Indicis arboribus agens, in hæc verba ſcribit. Ficus ibi exilia poma habet.  
Ipla ſe ſemper ſerens, vaſtis diſfunditur ramis: quorum imi adeo in terram incur-  
uantur, vt annuo ſpatio inſigantur, nouamque propaginem faciant circa parentē  
in orbem quodam opere topiario. Intra ſepem eam æſtuant paſtores, opacam pa-  
riter & munitam vallo arboris, decora ſpecie ſubter intuenti, procūlve, fornicato  
ambitu. Superiores eius rami in excelſum emicant ſiluofa multitudine, vaſto ma-  
tris corpore, vt ſexaginta pedes pleræq; orbe colligant, vmbra verò bina ſtadia  
operiant. Foliorum latitudo peltæ effigiem Macedoniæ (quæ à Xenophōte He-  
deræ folio comparatur) habet: ea cauſa fructum integens creſcere prohibet, rarūſ-  
que eſt, nec fabæ magnitudinem excedens, ſed per folia ſolibus coctus prædulci ſa-  
pore, dignus miraculo arboris. Gignitur circa Aceſmem maximè æmnē. Meminit  
& lib. 7. cap. 2. Hæc (inquit) facit vbertas ſoli, temperies cæli, aquarum abundantia  
(ſi libeat credere) vt ſub vna Ficu turmæ condantur equitum. Strabo item Geo-  
graph. lib. 5. ſimilem etiam arborem deſcribit: tametſi nullo nomine inſigniat, his  
verbis. India multas quidem admirabiles arbores fert, è quibus eſt, cuius rami ad  
terram propendent, foliis non minoribus clypeo. Oneſicritus curioſius ea perfe-  
quens quæ ſunt in Muſicana terra Indiæ auſtraliſſima, refert arbores quaſdā ingē-  
tes eſſe, quarū rami cū ad duodenos cubitos creuerint, reliquū incrementū pro-  
num faciant, deſlexi quouſque terram contingant, deinde terram ſubeant, ac radi-  
ces agant veluti traduces, mox rursus in truncum exeant, à quo poſtquā aucti fue-  
rint, eodem modo ſteſtantur, & aliam propaginem efficiant, rursusque aliam: &  
ſic deinceps, vt ab vna arbore longum vmbra culum fiat, tabernaculo multis co-  
lumnis nitenti ſimile. Ex quibus deſcriptionibus facile cuius colligere licet, eam  
arborem, de qua nobis inſtitutus eſt ſermo, illos auctores intelligere voluiſſe. Sed  
diligentiùs preſſiùſque Theophræſtus, qui Alexandri coætaneus fuit, quiq; haud  
dubiè eorum narrationes curioſè exceperit, qui ſub Alexandro in Indica expeditione  
militarunt. Is enim ſimili planè modo, paucis duntaxat notis variatibus, Ficum  
Indicam deſcribit, qualis illa arbor eſt, cuius hiftoriam ex Fabritij narratione de-  
dimus. Plantarum igitur hiftoriæ lib. 4. cap. 5. ſic ait. Indica autem regio arborem  
Ficum vocatam ſortitur, quæ è ramis radices demittit ſingulis annis, vt primo  
volumine retulimus: demittit autem nō ex nouellis, ſed ex anniculis, atque etiam  
vetuſtioribus. Illæ ſe terræ coniungentes, ceu ſepem circum arborem faciunt, ita  
vt veluti tabernaculum condatur, quo etiā morari homines ſolent. Radices autem  
naſcentes euidentiffimè à ramis diſcernuntur: ſunt enim candidiores, hirtæ,  
(δασύται) tortuoſæq; binæque fronde foliatæ (διφύλλαι) Item arbor comam ſuper-  
nam laſciuam gerit, (ἐχὼ δὲ τὴν ἀνα κόμην πολλήν) totaq; fornicato ambitu pulchrè  
orbiculatur, & magnitudine vehementer excellit: quippe vmbra bino ſtadio fa-  
cere fertur: & craſſitudine caudicis pleraſque vltra quàm ſexaginta graduum  
(ἑξήκων, pedis veſtigiorum) orbem colligere, magnā verò ex parte quadraginta.  
Folium pelta nō minus habet, (potiùs ad ſimilitudinem quàm ad amplitudinem  
referenda hæc comparatio) fructum admodum paruum, magnitudine ciceris, ſi-  
cui ſimilem: quamobrem Græci Ficum eam arborem appellabāt. Paucos verò ad-  
modum fructus fert, non tantum pro arboris magnitudine, ſed etiam omnibus re-  
bus. Naſcitur arbor hæc circa Aceſmem æmnem. Hactenus Theophræſtus. Cū  
itaque tam multis notis Ficus Indica à veteribus deſcripta, cum admirandæ huius  
arboris in India naſcentis (cuius nomē vulgare ſibi excidiſſe ſerio dolet Fabricius)  
hiftoria



historia conueniat, eo audaciùs illi Ficus Indica nomen indidi, præsertim cum illam ipsam esse certò mihi persuadeam. Garciam autem illius nullam mentionem facere inter tot exoticas arbores locis Goanæ insulæ vicinis nascentes, quarum descriptiones in Aromatum historia aspersit, satis mirari nequeo. Nos porro iconem ex Fabricij narratione, quam concinnè ex ipsius etiam iudicio fieri potuit, adumbrare iussimus in studiosorum rei herbariæ gratiam. Cæterum cum hac arbore cognationem habere videtur, quam Ouiedus Indicae historiae lib. 9. describit his verbis Latinè ex Italico expressis. Mangle arbor est inter eas quæ in occidentali India vulgò nascuntur selectissima, cum ad ædificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia opera. Crescit vlginosos locis, littore maris, & ripis fluminum torrentiumq; qui in mare dilabuntur: folia habet Pyri maioribus foliis similia, crassiora tamen, & aliquantùm longiora: siliquas duorum palmorum longitudinis aut maiores, crassasq; Cæsiae solutius fructui pares, fusci coloris, pulpam medullæ ossium similem continentes, qua Indi aliorum eduliorum penuria vescuntur: etenim satis amara est, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego eius nihilominus esu in morbum incidere, licet adeo delicati palati non sim, nec ab iis cibis abstinere in penuria soleam, quibus alios vefci video: imò etià nulla vrgente penuria degustare soleo, ut commodius describere queam: eaq; ratione hunc fructum degustavi, sed brutorum animantium & siluestrium hominum potius cibus est. Admiranda est eius natura, plurimæ enim simul crescunt, multive eius rami deorsum vergere & in radices conuerti videntur: nam præter plurimos quos erectos folisque onustos atq; ab inuicem sciunctos ut reliquæ arbores habet, multis etiam aliis cum crassioribus tum tenuioribus aphyllis sese ad aquam vsque demittentibus, & sub terra aut arena radices figentibus prædita est, qui vbi apprehenderint, alios ramos sursum vergentes proferunt: non enim minùs firmiter hærent quàm primarius arboris truncus, sic ut arbor multis caudicibus simul connexis constare videatur, egregio sanè spectaculo, & singulari huius arboris natura.

Magle, historia.

ARBOR FARINIFERA. CAP. XCI.

ab effectu.



NOTISSIMA est & omnium ore celebrata nobilis illa Francisci Drake Angli recens vniuersi orbis circumnauigatio. Is cum superioribus annis ab ea expeditione reuersus, felicibus auspiciis in Angliam omnium stupore, nec minori cum fauore & gratulatione appulisset, Carolus Clusius, qui ea in insula tunc temporis fortè agebat, & ipse rerum nouarum audiendarum studio & cupiditate incensus, his, qui eundem in illa nauigatione comitati erant, sese ut applicaret operâ dedit, adq; ipsum adeò præfectum Drake sibi parauit aditum: à quo exceptus perhumaniter, quorum addiscendorum desiderio tenebatur, omnia ea beneuolè & pleraq; alia scitu dignissima ipsius ex ore accepit, quæ cum eiusdem comitû & grauiù alioquin & fide dignorum relatione omnino consentirent. Horum ego omnium, tum aliorum quorundam exotico- rum fructuum, quos in Britannica ista peregrinatione acquisiui, breues descriptiones, & nonnullorum etiam icones in rei herbariæ studiosorum gratiam exhibere, inquit, volui, non minùs grates eis futuras sperans aliis lucubrationibus priùs in lucem à me editis. Hæc de nouis suis plantarû aliquot descriptionibus Clusius, quas nos pro instituto nostro ex Notis, quas in Garciae Aromatum historiam post tertiam editionem idem conscripsit, desumptas ipsius Clusij verbis aliquot capitibus hic apposui: quibus Arboris, quâ Farinifera vocat, Fructus Beretini, Cacao, Vvinterani corticis, Drakenæ radicis, Variorû præterea fructuû peregrinarum iucundissima continetur historia. In Tarenate ergo, inquit, insula

Beretini fructus historia.



ARBORIS Farinifera,  
Panis fragmenta.

Æquatori proxima ad Arcticū polum vergente nascitur arborea quædam planta, cuius truncus humanæ coxæ crassitiem æquat, decem pedum altitudinem attingit, summo fastigio in orbiculatum caput Brassicæ capitatæ instar extuberans, in cuius medietullo natura quandam candidam farinam produxit ad illius insulæ homines tenuioris fortunæ sustentandos: eam etenim diligenter colligunt, deinde adfusa, siue inspersa potius modica aqua fermentant, pin-sunt, & in formulas quasdam coctili latere constantes immittunt longa serie, atque prunis accensis circūquaque admotis & superetiam impositis coquunt. Sunt verò ij panes siue placenta interdum palmares, vnciali crassitie, quibus illius insulæ incolæ calidis & recentis coctis vescuntur: at ubi induruerunt tepida aqua macerantes pulvis modo edunt. Insuper saporis esse, cum degustare, hic panis mihi visus est: verū iniectione Piperis aut Cinnamomi momento cum saccharo, nonnullis delicie esse queat. Eiusmodi panis bina fragmenta qualia nostri Morgani opera accepi, hac tabella exprimi curauimus.

## FRUCTVS BERETINVS. CAP. XCII.

Arboris  
Beretini  
Forma.

IN EADEM insula celsissimas inuenerunt arbores Quercu maiores, foliis laurinis, crassis, splendentibus, & minimè in ambitu serratis, quæ oblongiusculum fructum ferunt, exquisitis ilignis glandibus similem, nullo tamen calice, ut ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo, interdum atro, tectum, nucleum continentem oblongiusculum, candidum, nullo (dum induruit) manifesto sapore præditum, tenui membrana tectum.

## FRUCTVS Beretinus.

Fructus  
Vfus.

Similibus arboribus abundat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delati sunt: à cuius in collis illarum arborum fructum, quem prius non attigerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum elixo, aut in farinam cōtuso, & pulvis modo cocto & inspissato, alterius cibi penuria cum in ea insula, tum in naui famē sublevarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Eum porrò fructum, cuius iconem hac tabella exprimimus, cum C. V. Dn. Richardo Garth Cancellaria Londinensibus Primicerius,

Papyrus  
ex laua.

vir insigni pietate & doctrina præditus, atque humanissimus, & optimè de me meritis, tum noster Morganus, mihi liberaliter communicarunt. Eorundem generis scriptura perinde atque vulgari papyro excipi queat. Eum in laua insula aliarum mercium permutatione Drake comites acceperant.

CACAO



## C A C A O . C A P . X C I I I .

**C**ELEBREM etiam per vniuersam Americam multiq; vsus fructum, Perùana provincia litora legentes, secum detulerunt, *Cacao* appellatum, cuius cum luculenta descriptio apud Benzonem extet, qui miles aliquot annis Noui orbis provincias peragravit, ipsius verba, vti ab Urbano Caluete Latina facta sunt, hic subicere libuit. In Nicaragua Noui orbis provincia pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolæ, neque vlli alteri Indiæ parti concessum. Pyri nostri specie ferme est, ligno in eiorum rotundo, nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis: arbor procera, exiguis foliis vestitur. Hispani cum primum eam provinciam subegerunt, propter vberissimam omnium rerum ibi repertam copiam, eam Paradisum Mahumetis nuncuparunt. Duo inter cetera fert hæc tellus nulli præterea Indiæ regioni concessa, excepta Guatimala, Hondurensis provinciæ & Mexici finibus, totoque nouæ Hispaniæ tractu. Vnum pauonum quoddam genus est, qui in Europam translati vulgò Gallinæ Indiæ vocantur. Alterum, id quod *Cacauata* vulgò vocant, quod monetæ vsus illis præbet. Id fert arbor modica magnitudinis, nec nisi calido loco & opaco viuut. Simul ac sole tactum est contabescit: itaque ferè in siluis vmbroso & humido loco feritur: neque id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editiorem plantant: quæ simulac adulescere cœpit, eius cacumen ita concinnant aptantque, vt adulta ea arbor Cacauatem inumbret, defendatque ita ab aestu, vt Solis radiis lædi non possit.

Pomū Nīcaragur.

Paradisus Mahumetis.

Cacao historia.

## C A C A O .



Fructus amygdalarum specimen referens, filiquis quibusdam velut cucurbitis includitur, crassitudine & latitudine Cucumeris, annuo spatio matur rescit. Maturas eas ubi legere, excussis folliculis fructum super sterculis expallum ad solem exponunt, donec humorem exudaerit. Potum ex eo confecturi, in testa fictili ad focum exsiccant: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, contusum & commolitur, fustumque in pateras (quæ cucurbitæ specie è certis arboribus per omnem Indiam enascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo pipere, quali vulgò vtuntur, condiunt, eoque in potu vtuntur. Porcorum ea veriùs col-

luies quàm hominum potio. Quum eam provinciam peragrarem, plusquàm integrum annum ab tali lora abhorruui: sed quum mihi vini copia non esset, ne semper aquam bibere cogerer, alios invitari didici. Ea calia sapore aliquantum amaro, satiat & refrigerat corpus, minimè tamen inebriat hæc præcipua & carissima merx earum regionum est: neque quicquam aliud Indi maiore in pretio habent, vbi quidem in vsu est. Hactenus Benzo. Amygdalæ planè similis est hic fructus suo putamine exemptæ, membrana tectus tenui, nigra, nucleo, qui in binas aut ternas partes diuidatur, subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingrati gustus: quare non mirum est, si qui primum degustant à potione ex eo confecta abhorreant, ego profectò puram aquam longè prætulerim. Eam tamen claris hominibus propinant, vt nos aromatites vinum solemus, referentibus his qui pauculos fructus retulerunt, è quibus binos habui.



Vvintera-  
ni corticis  
historia.

Forma.

VVINTERANVS cortex.

Vires.



DRAKENA RADIX. CAP. XCV.

Drakenæ  
radicis hi-  
storia.

Forma.



SEMENCIALI plerunque crassitu-  
dine prælongaque hæc radix est,  
subinde in nodos & inæqualia  
capita extuberans, & in summis  
capitibus, veluti è crassis squamis contexta,  
Dentariæ enneaphylli (quam in Pannonicis  
describo) modo, foris nigricans, & rugosa du-  
ràque cum resiccata est, intus alba: fibris tenui-  
bus sparsim nascentibus prædita, interdum  
maiusculis fractuque contumacibus, è quibus  
alij nodi depèdent. Nullo manifesto odore pol-  
lere deprehendi: sed gustu nōnihil adstringen-  
te & linguam exsiccante initio esse videtur, de-  
inde diutius præmansa, tenuem suauemque  
acrimoniam in ore relinquit. Magnam affinita-  
tem habere videtur cum Radice S. Helenæ, de  
qua D. Monardes in lib. Simplicium è Nouo or-  
be delatorum. Sed cum M. Elior qui Dn. Drake  
comes fuit, Hispanos in Peru maximo in pretio  
habere, nec pretio redimi posse referat, ab illis  
que didicisse folia præfens venenum esse, ipsam  
autem



autem non modò illius, sed reliquorum etiam venenorum antidotum esse, atque cor & vitales facultates roborare, si pollinis modo trita, manè ex pauxillo vino albo hauriatur, ex aqua verò febris ardores mitigare. Earum facultatum ratione, valde conueniret cum radicibus venenis aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes: in his tamen aromaticum saporem & caloris gradum desidero quem iis radicibus tribuit. Ipse Drake sanè cùm mihi eas, quas hîc exprimo, cum Perùano lapide Bezar donaret, summæ esse æstimationis apud Perùanos asserbat.

VARIÏ FRUCTVS PEREGRINI. CAP. XCVI.

**D**ONATOS sibi ab amicis, cùm Londini esset anno 1581. peregrinos aliquot fructus, refert idem Clusius. Horum, inquit, maior ex eo genere est, quod in annotatiuncula ad caput 26. lib. 1. Historiæ Aromaticum secundo loco descripsi, sed longè amplior, utpote qui ternas uncias longitudine superet, crassitie vnam, altitudine duas ferè æquet, alioqui forma & colore eidem planè similis: nempe crasso cortice seu putamine constans, inferiore parte sessili, rugoso, scabrøve & cinereo, superna autem & gibba læui, subrufo, vel potiùs spadiceo, ita vt animalculum duro corio tectum videatur. Prægnans est, & nucleum intus continet duas uncias longum, vnam latum, geminum, extrema parte simul coherentem, tenui cinereâque membrana tectum, materie firma vt amygdalæ aut castanæ recentes, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore satis iucundo prædita, & gustu non ingrato. Eum accepit Lusitanus quidam mercator Petrus de Frias nuncupatus à prouinciâ Peru Prorege, pro fructu illius arboris in Nouo orbe nascentis, ex qua Balsamum elicitur, cum ipsò Balsami oleo. Verùm, si D. Monardis descriptioni credendum est, longè minor est Balsami fructus. Consule finem capitis 8. ipsius Hist. Simplic. ex Nouo orbe delatorũ, quam pridem Latine fecimus. Alter nucis iuglandis ferè magnitudine est, extrema parte latiuscu-

Balsami  
fructus.

II.

BALSAMI fructus.



lus, totus rugosus, atque vt nucis iuglandis putamen inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus: leuis est & minimè ponderosus, tamen si admodum solidus sit, & saxeâ duritie præditus, nec minùs in aqua subsidat quàm lapis: confractus crasso durissimòque cortice constareprehenditur, & nucleum candidum, succulentum, grati saporis, iucundique odoris, oleum ferè Macis referentis continere, in binas partes sectum & tenui candidaq; membrana diuisum, alia insuper paulò crassiore firmiorèque inclusum. Eiusmodi ante plurimos annos Antuerpiæ inter aromata inuentos memini. Magnam similitudinem habet tertius cum prima nuce in adnotationibus ad 26. cap. 1. lib. Hist. Aromaticum descripta, sed paulò minor est, angulosus, niger, crassioribus quibusdam firmisque villis ipsi incumbentibus & firmiter inhaerentibus obseptus, altera parte tribus foraminum vestigiis insignitus, quorum tertium maiusculum est & infra spectat. Præduro putamine constat, & prægnans

III.



*VARIII fructus  
peregrini, Clusij.*



*Alij fructus peregrini Clusij.*

pulcherrimè exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, ut maiores nonnulla gal-  
læ levis, & aquæ impositus supernatans, duro putamine constans, ac nucleū con-  
tinens. Tertius, illo minor, & mediocrem nucem auellanam non excedens, or-  
bicularis ferè, nisi infima parte paulò angustior in triangularem veluti cuspidem  
desineret, colore alteri similis est, & tamen levis, in aqua subsidens & inum pe-  
tens, duro crassoque putamine constat, & nucleum candidum tenui fusca mem-  
brana

pragnans est, nam concussus crepitat & soni-  
tum edit. Quartus, nucis auellanae magnitudi-  
ne, & eiusdem colore, putamine duro, veluti in  
duas partes diuiso, nucleum intus continens.

Similes aliquando Granatæ in Hispaniis accepi  
ab Ill. Dn. Didaco ab Stuniga, recēs ex Africa  
(*Elpenon de Velez* arce ab Hispanis occupata) de-

latos, nucleum cōtinentes album, dulcem: quas  
ad Vnguentariæ nucis genus aliquod referen-  
das existimabam. Quintus, duntaxat nucleus

est suo putamine siue cortice exemptus, firmus,  
tenui membrana fusca & multis venis distin-  
cta, firmiterque ipsi nucleō inhaerente rectus:

ipsa materies firma est, candida, pulpæ nucis In-  
dicæ siue Cocci similis, nullo quidem odore  
prædita, sed satis grato sapore. Calidum in pri-  
mo gradu, aut secundi initio arbitror. Sextus,

orbiculari ferè rotunditate & tanquam torno  
elaboratus est, ouo passerino minor, flauus om-  
ni ex parte, nisi in altera extremitate subfusca

macula insignitus esset, solidus, lapideæque du-  
ritie, & in aqua subsidens. Priores quinque à  
Iacobo Gareto iuniore Aromatario, viro inte-

gerrimo accepi: sextum ab humanissimo do-  
ctissimoque viro Dn. Ioanne Rizio Serenæ Re-  
ginæ Angliæ Elizabethæ pharmacopœo, qui

multis beneficiis dum Londini essem me affe-  
cit. Eum verò à C. V. Nicolao Rasio accepisse  
fatebatur. At postquam Viennam redij, inter

multos exoticos fructus, quos, ut alia pleraque  
rariora, suis capsis inclusos adseruo, alios inueni  
quos à nemine adhuc descriptos existimo.

Rem itaque minimè ingratam studiois me fa-  
cturum arbitratus sum, si illorum breues descri-  
ptiones, atque icones superioribus adicerem.


Prior, alteri iam memorato non admodum dif-  
finitus est, sed minor, & Ponticam nucem non  
excedens (tamen iuglandi ferè æquales videre

meminerim) laevis, splendens, cinerei coloris, &  
saxeæ duritiæ præditus, licet in aquam demersus  
supernatet, inæqualis aliquatulum, & compres-


sus, ut pisca quæ in eadem siliqua nata sese mu-  
tuo contigerunt. Alter, ovalis, Iudaico lapidi  
magnitudine par, & eius formam exceptis stris



brana rectum continet. Virumque hunc anno humanæ salutis 1579. Londini natus sum à nostro H. Morgano, qui ex ea Nigritarum in Aphrica regione quæ vulgò Guinea appellatur, & circiter quinque gradus ab æquatore distat, eodem anno delatos afferebat: eam ob causam initio subsequenti anni, maiorem vnum,



.VIII.



.IX.



.XI.

& minores duos, quorum alter suo putamine exemptus erat, terræ in fictili credidi: sed neuter natus est, quemadmodum nec sequentium nonnulli, quos cum in Belgio, tum hæc terræ commisi. Quarto sphaerica penè est figura, III. magnitudo ferè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis vndique oblitum, coloris flavescentis, linea eminentiore transversum secante, quam, ut in iuglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror. Quinto planè sphaerica est v. forma, magnitudo vulgaris globuli bombardici, putamen eiusdem cum superiore coloris, & perpetuis similiter tuberculis, at non adeò crassus oblitum, nullaque linea cinctum. Sextus, VI. officinarum Nuce vomica maior est, planus idem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulò eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima verò, quinque grana inter se disincta, & veluti ipsi impressa ostendens, mespilorum setaniorum officulis non valde ab similia, quæ exempta, satis alta lacuna-

rum vestigia relinquunt. Totus linea duritie præditus est. Septimi forma etiam VII. plana est, sed à superiore discrepans, rugosa & nonnullis locis intumescens, color ex cinereo nigricans, qualis in nonnullis *Caious* fructibus, quorum iconem & historiam libro Aromatum cap. de Anacardio dedi. Is per medium sectus nulla grana, sed splendentem quandam nigrumque succum iam coërentem & induratum duntaxat continere deprehenditur: itaque inter fructus potius vitia quam inter fructus numerandum censeo. Hos omnes cum *Acacia* veræ siliquis & seminibus, parvis quibusdà cochylis, & aliis quiscquiliis in Piperis repurgatione & delectu aliquando inuentos memini. Sequentes verò olim nouo orbe delatos ex Hispaniis accepimus. Octauum, Pinci alicuius generis nucleos esse existimo, adeò nostratis pincæ nucis VIII. sine strobili nucleos referunt, licet plerumque nostris sint & longiores & crassiores: durum similiter putamen & idem color. In nono quædam est varietas: nam IX. alter altero maior & amplior est, licet color & forma propemodum eadem. Planus est & oblongiusculus, altera parte lator, altera angustior, glaber & læuis, totus fusci aut interdum spadicei coloris, nisi linea quædam candicans, qua parte suo fructui adhæsit (nam altero inclusus fuisse videtur) varium faceret: prægnans est, & sonitum edit. Hi duo *Peritas del Peru*, id est, acinorum Peruanorum nomine insignes missi fuere. Decimus *Cassia solitaria*, aut *Cerati* semen magnitudine X. æquat, cui etiam forma persimilis est, sed tumidior aliquantum, & colore differens, qui in hoc egregiè rubet ut in *Oxyacanthæ* fructu, solidus & durus, atque in aqua subsidens & immum petens: siliqua aut alio fructu inclusam fuisse arbitror. Unde nonnisi *Alates* accepi. Postremum locum occupabit Phaliosus ille colore XI. *Ala omne* simili, hoc est, ex spadiceo nigricante, sed planiore longioræque forma, hi lo non admodum magno, cuius ad epistolam Petri de Osma Nicolao Monardes inscriptam,



inſcriptam poſtrema editione memini, quique Diuo Maximiliano II. feliciffimæ memoria Cæſari ex Hiſpaniis miſſus fuit, *Haba de India muy larga*, id eſt, Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua merſus imum petit.

## CORV.

## CAP. XCVII.

Locus.



Nomina

Forma.

Temper.

Vires.

IN prouinciis China, Iapan, Malaca & Bengala, inquit Chriſtophorus Acoſta, præter Macer arborem, de qua nos huius libri cap. 14. naſcitur duæ alia: arbores plurimū inter ſe differētes, ſed quæ iſdē facultatibus cum Macere ſint prædita. Harum prior (de qua hoc capite agemus) vocatur in Malabar *Curodapala*, & *Curo*, in Canariis *Coru*, à Brachmenis *Cura*. Eſt vero hæc arbor pumila: Malo aureæ ſimilis, cui etiā perſimilia habet folia, ſed quæ medium neruum craſſiorem habeant, aliis octo aut nouem in latera excurrentibus: ſſos luteus eſt, odoris ſerē expers: radicis cortex diluto virore præditus eſt lauis & tenuis, qui ſi frangatur aut vulneretur, multo lacteo ſucco manat, lentiore & magis viſcido quàm qui ex ſuperiore fluit, guſtu inſipido, amaritudinis tamen alicuius particeps, frigidus & ſiccus, plus tamen ſiccitatis quàm frigiditatis poſidens, in quo ordine Medici illius prouinciæ etiā conſtituunt. Huius vi-  
rentis corticis ſucco, licet admodum ingrato, plurimū vtuntur incolæ cum gen-  
tiles tum Chriſtiani ob admirandos quos præbet effectus in omni genere proflu-  
uij, cum in lienteria tum in diarrhœa & dysenteria è quacunque cauſa prognata. Luſitani tamen Medici methodum in eo exhibendo ſeruant. Vtuntur etiam eo ſiccò veluti priore: ſed prioris cortex longè præſtat. Diſtillant verò atque vtun-  
tur in hunc modum. Corticis in puluerem triti vncias octo, ammeos, apij, co-  
riandri ſicci, cumini nigri nonnihil toſtorum & in puluerem redactorum ſingu-  
lorum drachmas tres, corticum Myrobalanorum Cepulorum drachmas ſeptem, butyri vaccini non ſaliti vncias duas, lactis acidi quantum ſatis eſt ad pulueres iſtos excipiendum, ſumunt in diſtillatoriam ollam vitream (ſi delicatioribus pa-  
ratur) aut vulgarem (vt maxima ex parte fit) imponunt, & ſtillatitium liquo-  
rem eliciunt, cuius quatuor vel quinque vncias cum aqua auellana Indicæ, vulgò  
*Arecæ* nominatæ, aut aqua è pediculis roſarum vncias duabus propinant alui  
profluuiò laborantibus, (interdum, ſi neceſſitas virgeat, trochiſcos de charabe vel  
de Lemnia terra admifcent) ſemel in die, vel bis ſi opus ſit, illico autem poſt eius  
ſumprionem, orizam cum oxygala exhibere ſolent. Clyſteres etiam ex eo confe-  
cti præſertim ſub noctem iniciuntur. Licet verò hic liquor admodum commen-  
dabilis ſit, longè tamen præſtantior eſt Maceris cortex viridis, licet multò ingra-  
tior, & ſumptu difficilior. Vtilis etiam hæc eſt radix ſeu cum oſiæ decocto ſum-  
pta, ſiue inuncta aduerſus hæmorrhoides & ani ſciſſuras. Foliorum eius cum Ta-  
marindorum foliis decoctorum vapore crura tumentia viliter ſouentur: ipſo au-  
tem decocto madentes panni commodè in tympanite applicantur.

## PAVATE.

## CAP. XCVIII.

Nomina



Forma.

LITERA iſtarum ſtirpium, tertium videlicet genus earum quæ ad al-  
ui profluuià vtilis ſunt, vulgò in Malabar dicitur *Pauate*, à Brachme-  
nis & Canariis *Vaſaveli*, à Luſitanis *Arbol contra las erisipelas*, hoc eſt,  
Arbor eryſipelas curans. Frutex eſt non admodum ramofus, foliis ſi-  
aut nouem pedum altitudinis, cui rara ſunt folia, Mali aureæ minoribus foliis ſi-  
milis, excepta appendice qua carent, vtrimque eleganti virore prædita: ſſos exi-  
guus, candidus, quatuor foliolis præditus, è cuius medio exit alba fibra cuſpide  
viridis inſignis, odore ſſoris Periclymeni, cui procul aſpicientibus perſimilis vide-  
tur, ro



PAVATE, *Acosta*.

tur, rotundum semen, lentiscini magnitudine, ex viridi nigricans, & ubi maturuerit nigrum. Caudex & rami cinerei sunt coloris, radix alba & insipida, cum nonnulla tamen amaritudine, odoris propemodum expers. Tametsi utilis sit *Vsus.* hæc planta aduersus alui profluvia, quemadmodum superiores duæ, cum illis tamen minimè comparari potest, quandoquidem imbecillior est: itaq; qui superiores nouit, ea haudquaquam utetur in alui profluuiis, at in curando duntaxat omnis generis erysipelate, & eo præsertim quod è mera bile ortum est: etenim insigni virtute aduersus hunc morbum pollere deprehensum est. Teritur & maceratur huius plætæ truncus siue radix orizæ decocto (*Cane* vocant) aliquot horis quiescere sinitur ut aceſcat hæc aqua: erysipelas deinde ea inungitur, bibendæque propinatur sufficiente quantitate bis in die, purgato prius ventriculo. Eadem ratione præbetur radix orizæ decocto macerata iis qui iecoris inflammatione laborant, & febrium ardoribus: addito autem succi foliorum Tamarindi memento

vulnerum labia circumquaque inungi solent ad inflammationes prohibendas, & humorum defluxus cohibendos. Quoniam verò iis in prouinciis multò maiore quantitate hoc tertium genus quàm secundum *Coru* nuncupatum crescit, incolæ eo utuntur.

MAMBV, siue arbor Tabaxir.

CAP. XCIX.




**N** VENIUNTUR interdù hæc arbores siue arundines, vocatæ *Mambu*, in quibus nascitur Tabaxir, tantæ amplitudinis & crassitiei ut ex *Ampl-*  
*tudo.* ea cymbas faciant, quæ binos viros capere possint, non quidem eas excauantes, sed relictis solum duobus internodiis excidentes. Conscendere verò solent similes cymbas bini Indi, iique nudi (nam nudos incedere in iis regionibus moris est) sederéque singuli in eius extremitatibus, iunctis cruribus, tenentésque singulis manibus remos trium aut quatuor palmorum longitudinis, quibus eas cymbas impellunt tanta dextertate, ut etiam aduerso rapidoque flumine summa celeritate nauigare possint, quæadmodum meis oculis conſpexi in flumine Crāganor, in quo plurimus est vsus cymbarum ex hac arundine confectarum, quoniam qui eis vehuntur securiores sese existimant à Crocodilis, quos illi *Crocodili:*  
*Caymanes* vocant, magno numero in eo flumine versari solitis. Nam cum ij ferocissimi sint, sæpenumero in naues maiusculas & minusculas impetum facere solent, ut eos qui illis vehuntur apprehédant. Si enim



aut in flumine, aut in litore hominē, bouem, bubalum, aprum, porcum, aut quodcumque tandem aliud animal comprehendere possint, illico deuorant. Indigenæ autem affirmant nāquam compertum esse, ut eos qui cymbis ex Mambu confectis velintur appetant, sed sæpenuerō conspectos esse natantes proxime illas, at tamen eas præterire sine noxa.

## LIGNVM MOLVCCENSE. CAP. C.

Forma.



Nomina

Vfus.


Virus.

**I**NVENITVR in Moluccis arbor quædam domestica Mali coronæ magnitudine, cuius folia Maluæ vulgaris foliis sunt similia, fructus vero anellans, sed minor, molliore cortice & nigricante. Seritur coliturque in hortis diligenter, nec alibi facili inuenias: tanti enim ab incolis æstimatur, ut peregrinos ne ad eius quidem conspectum admittant. Incola *Panaua* appellant. Cum verò istic Regis nomine gubernaret prudētissimus & animosissimus Dominus Ludouicus de Tayde, ipsius nomine hæc arbor dicta fuit, quoniam ille primus nobis eius insignes facultates aperuit. Accidit enim ut nobilis quidam Lusitanus, Henricus de Lima vocatus, dum in Moluccis versaretur, animaduerneret quanta cura & diligentia incolæ hanc arborem colerent, quantique æstimator, atque ideo illius facultates apprimè intelligere cupiens, nonnullas tandem edoctus est. Nactus igitur trunci huius arboris partē, eam obtulit Proregi, bonarum rerum, & naturæ secretorum studiosissimo, itaque medicamentum valde necessarium, cognitūque dignum, & nostris hominibus hætenus inauditum. Anno autem sexagesimo primo supra millesimum & quingentesimum interrogans me Prorex, an aliquid de hac arbore inaudissem, aliquot eius facultates retuli quas ab aliis didicissem, conquerēs arborem nondum licuisse videre: tum ille eius quod habebat fragmento me donauit, imperans ut cum iudicio & ratione experirer, nec vllius vitam periclitarer, deinde rerum successum illi significarem: quod me facturum recepi. Eius itaque ligni periculum feci, cum in nonnullis agris quorū curam habebam in nosocomiis, tum in variis morbis qui in longa navigatione plerumque oriri solent dum in Lusitaniam redirem, partim adiutus facultatum relationibus quas intellexerā, & vtendi methodo, partim iis quæ nobilis ille in Moluccis didicerat. Illius semen iam antè videram mihi donatum ad aues capiendum: etenim eo in aucupiiis vtuntur non modò in illa regione, sed etiam in multis Indiæ prouinciis, ad quas eius rei gratia venale deferitur. Eius pauxillum cum oriza cocta mixtum auibus siluestribus exponunt: quæ degustāt, illico decidunt sopitæ & stupide, quæ verò auidius id edūt, moriuntur antequam illis auxilium præberi possit, quod est, ut frigida caput perfundatur. Graculi omnium citissimè eo degustato extinguuntur. Nunc ad salubrem huius arboris materiem accedamus, cuius pauxillum hodie plurimi facio. Intus sumptum, aut foris appositum, omnibus venenis resistit. Intus assumitur magno commodo ex aqua rosacea vel vulgari, auiūque iusculo eius pulueris apta quantitas pro necessitate, & ægri natura, modò decem grana non excedat, sed infra id pondus consistat. Ad viperarum, Regulorum (qui serpentes pileati appellantur, & admodum noxi sunt) aliorūque similibus aspidam aut serpentum morsus bibitur hic pulvis ex aqua, ipsiq; moribus pulvis inspergitur. Eadem ratione præbent in vulneribus quæ a sagietis toxico illitis facta sunt, quibus illius regionis incolæ plurimū vtuntur. Puluerem verò ex hoc ligno sibi parant lima & pelle marinæ canicula confecta, aut tenui aliqua ferrea lima. Robustissimo cuique dimidiū eius scrupulus ex aqua limpida tepida aut rosacea, aut gallinarum iusculo tepente, summo mane datur: cœna autem diei præcedentis parca esse debet euacuat enim omnes humores, præsertim crassos, lentos, & melancholicos: conuenit quartanis, diuturnis, febribus con-



bus continuis, iliatis, colicisq; doloribus, flatibus, hydropisi, arenulis, renum calculis, vrinæ difficultatibus, seuissimæ colericæ passioni, aliisq; morbis, veluti acticulorum & tibiæ inueteratis doloribus, scirrhis & scrofulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam deiectam reuocat: & si nimia fiat euacuatio, bibat æger dimidium cyathum *Cania*, hoc est, decocti orizæ, aut auiculam comedat: subito cessabit, quod sanè multa laude dignum est. paucisq; medicamentis vulgare, ut in potestate sit medici aut ægri, purgari quantum cupierit. Huc accedit quod neque factorem, neque tedium, neque metum dum sumitur pariat, possitque sine diætæ obseruatione, etiam iis qui sua negotia foris peragunt, propinari, uti ex iis deprehendi qui vnà mecum eadem naui vehebantur, nullum sentientes incommodum, tamen si dum purgarentur nulla diætā vterentur, viuerentq; solutissimè. Obseruari etiam illius præstantiam in inueteratis capitis doloribus, hemicrania, apoplexia, aurium tinnitu, arthritide, ventriculi & vteri affectibus & asthma. Propterea fidens illi plurimum, sapius in diuersis naturis, ætatibus & locis, feliciter vsus sum, & sine vlla molestia, nisi quod in biliosis naturis, calidisq; ventriculis nonnihil molestia pareret donec cibum sumerent, & in nonnullis vomitum excitaret: sed biliosis hunc puluerem nonnunquam dedi syrupo acetoso aut carambola condita exceptum, aut in catapotia cum saccharo rosato efformatum. Exhibendus est summo mane, neque cibis aut potus concedendus donec purgati sint quantum necessarium videtur, tum demum cyathus iusculi gallinarum tepidi datur, dimidiaq; aut integra hora post conceditur pullus gallinaceus, & paululum vini aqua bene diluti, deinde toto illo die potu abstinere ad cœnam vsque, quæ parca erit, & facilis concoctionis. Subsequenti die sumitur saccharum rosatum cum aqua buglosi, aut borraginis, aut communi, atque iniicitur clyster ad aluum eluendam. Solet verò interdum in nonnullis ani pruritus & excoriationem excitare, atque in aliquibus (sed paucis admodum) hæmorrhoides. Hæc sunt quæ de hoc ligno Panaua conspexi & intellexi. Nunc verò in illis regionibus magnus est eius vsus, tantaq; æstimatio, ut sine metu in multis morbis supra enumeratis vsurpent. Ego bis illud sumpsi in coli dolore & hemicrania, mihiq; salutare esse deprehendi. Ceterum cum propter eius insignes facultates incolæ plurimi faciant, easq; quantum in ipsis est, celare nos studeant, quæ proculdubio longè plures sunt quam quas nouimus, sperandum est temporis (quod omnia reuelat) successu reliquarum, quæ nobis adhuc ignotæ sunt, notitiam nos consequuturos: easq; in libro quem præ manibus habemus fideliter enarrabimus, si, antequam in lucem prodeat, intellexerimus.

## MORINGA. CAP. CI.

ENTISCI magnitudine est Moringa, cui persimilia habet folia: pau- Forma.  
cis prædita est ramis, eamque ob causam exiguam præbet vmbra-  
multis nodis scæter, adeoq; fragilis est, ut facillimè cum ipse frutex, tū  
rami confringantur: folia saturatiùs virent, viuidiq; sunt coloris, sa-  
poris vero foliorum napi: fructum fert pedalem, raphani crassitie, octo angulis  
insignitum, colore dilutiore inter viridem & cinereum, intus candidum, medullo-  
sum, & in certa recepracula distinctum, quibus continentur rotunda semina. Er-  
no similia, virentia, & admodum tenera, sed sapore quàm folia aciore. Editur hic  
fructus cum carnibus coctus, aut alio modo paratus. Huius arboris radix Vnicor-  
ni, & lapidis Bezar vices supplet, veraque theriaca est qua vulgò incolæ vtuntur  
cum aduersus omnis generis venena, tum morsus serpentium maximè noxiorum,  
vulgò *Culebras de Capillo* dictorum, aliorumque insectorum, & virulentorum ani-  
malium, cum intro sumpta, tum foris applicata. In colerica quam vocant passio-



## MORINGA, Acofta.

Locus.

Nomina

Negundo mas.

Negundo femina.

Forma.

Temper.  
& Vires.NEGUNDO mas,  
Acofta.

ne singularis efficaciam esse deprehendi. Miscetur remediis melancholicos humores purgantibus: & probè nota est elephantiasis laborantibus, quorum plurimos eius continuo usu sanari perhibent. Abunde nascitur variis Indiae locis, sed praesertim tota prouincia Malabar, secundum flumen Mangate, ubi admodum luxuriat, multosque fructus profert, qui vulgò in foro venduntur perinde atque fabae in Hispania. Arabes & Turcae *Morian* appellant, Persae *Tame*, Guzaratenfes *Turina*.

## NEGUNDO. CAP. CII.

**D**VAE arbores multis Indiae locis, praesertim verò prouincia Malabar inueniuntur, in usu medico adeò commendatae, ut multis morbis viles esse deprehendantur. Earum prior mas censetur, & à Canarinis *Varalo Nigunda* appellatur, Amygdalae magnitudine, foliis superne virentibus, inferne hirsutis, foliorum Salviae modo, & in ambitu serratis, quae procul aspicientibus Sambuci foliis similima videntur. Altera Negundo femina nuncupata, aut *Norchita* à Lusitanis, vulgò in Canarin *Nyergundi* dicitur: in Balagate *Sambali*, in Malabar *Noche*: vtraque verò tam mas quam femina Arabibus, Persis & Decan incolis *Bache* vocatur, Turcis *Ait*. Eadem magnitudine qua prior assurgit, folia verò habet ampliora, rotundioraque, neque in ambitu serrata, foliis Populi albae perquam similia. Vtriusque generis folia Salviae odore & sapore referunt: degustata tamen magis amara & acris deprehenduntur: in plurimis foliis parte auersa summo mane inhaerens conspicitur spuma quaedam candida, quae nocte ex illis emanat. Vtriusque flos cinerei coloris est, plurimumque ad Rorismarini florem accedit. Vtriusque fructus admodum similis est Piperi nigro, acris gustus quidem, sed minimè virentis uti Piper, ac Zingiberi propemodum par. Arborem moderate calidam faciunt, & semini paulò plus caloris tribuunt. Folia, flores, fructus contusa, aut in aqua decocta, vel in oleo fricta vtiliter imponuntur omnibus doloribus ex quacumque causa prouenientibus: praesertim articulorum doloribus ex frigida causa natis, atque in tumoribus & contusionibus, mirabiles praebet effectus. Vlcibus etiam vetustis folia trita imponuntur felici successu, quando quidem eorum materiam digerunt, eaque emundant & ad cicatricem perducunt, modo corpus non sit impurum. Et sanè in vulneribus, apostematibus



NEGUNDO *famina,*  
*Acosta.*



NIMBO, *Acosta.*



tibus & contusionibus adeò vtilem experiuntur, vt chirurgorum operam minimè requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore vniuersum corpus lauant: tantàque inuasit persuasio apud illas, Negundo folia, flores & fructus vtilia esse ad iuuandum conceptum, vt cum qui contrarium persuadere conetur, lapidibus obruturæ sint. Obstetricibus etià, quas illi *Dayas* vocant, apprimè nota est hæc arbor. Adeò frequens est huius arboris vsus ad medendum in illis regionibus, vt nisi Deus præcisos ramos multiplici fœtura renasci faceret, iam diu fuissent consumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc essent: sed quò magis præciduntur rami, eò feliciùs renascuntur, perpetuàque fronde virent.

NIMBO. CAP. CIII.



LIA est arbor medico in vsu admodum commèdata à Christianis & Gentilibus, reliquisq; earum Indiae prouinciarum incolis, rara tamen admodum: sed qui eam cognoscunt *Nimbo* appellant, Malabarenses *Bepole*. Magnitudine est Fraxini, cui procul aspicientibus persimilis videtur: folia vtrinque viridia sunt, nec ab altera parte incana lanugine pubescunt, in ambitu serrata & mucronata: rami multis foliis luxuriant, floribusque abundant exiguis, albis, quinque foliolis constantibus, flauis in medio staminulis, Lotiq; siluestris siue Trifolij odorati odorem referentibus: fructus est paruis oliuis similis, subluteus, cortice admodum tenui præditus, nasciturq; ex ramulorum alis. Huius arboris folia nonnihil amaricant, saluberrimàque sunt trita & cum succo limonũ imposita vulneribus sordidis, cuniculosis, callosisq; cum hominum tum iumentorum: digerunt enim, emundant, sarcotica sunt, & ad cicatricem perducunt. Foliorum item succus perutilis est siue per os sumptus solus, aut ex vino, aut aqua, aut gallinæ iufculo, siue vmbilico impositus solus, aut cum fellis bubuli momento, aut aceto, aut aloë, ad necandos & expellendos omnis generis lumbricos: quamobrem familiare admodum, & per-

*Nomina*

*Forma*

*Temper.*  
*& Vires*

quàm salubre medicamentum est omnibus illius regionis incolis, præsertim Malabar prouinciæ, quoniam lumbricis valde sunt obnoxij. Magnus est etiam eorum vsus tum florum & fructus in articulorum doloribus, tumoribus, membrorum debilitate, & apostematibus. Oleum item ex eius fructu expressum, multo



est in vfu in neruorum doloribus. Eoq; vulnera, neruorum puncturas, & contra-  
ctiones curant Malabarenfes.

## I A C A. CAP. CIIII.

**Nomina** **Forma.** **I A C A, Acoſta.** ASCITVR arbor in nonnullis Indiae infulis fecundum aquas, quae  
licet nullum medicum vsum praebeat, propter amplitudinem tamen  
& fructus elegantiam minimè praetermittenda est. Eam Malabaren-  
ſes *Iaca*, Guzaratenſes *Panax*, Canarini *Panaſu*, Arabes *Panax* & *Iaca*  
nuncupant, Perſae mutato p. in f *Fanax*. Vasta est arbor, foliis palmaris ampli-  
tudinis praedita, dilute virentibus, neruo crasso &  
duro per longitudinem excurrente: malum fert  
non è germinibus aut foliorum ſede, quemad-  
modum aliae arbores, ſed ex ipſo trunco maio-  
ribusque ramis naſcens, longum, craſſum, ob-  
ſcurius virens, craſſo duroque cortice tectum  
vndique veluti adamantum cuſpidibus ſepto,  
quae in ſpinam breuem, viridem, nigròque acu-  
leo praeditam deſinunt, admodum ſimilem Du-  
rionis ſpinæ, ſed minimè acutam aut pun-  
gentem, tamen ſi minitari videatur. Horum fru-  
ctuum minimus eſt maximæ cucurbitæ ampli-  
tudine atque etiam maior, praefertim in Mala-  
bar, vbi praſtantes naſcuntur: nam qui in  
Goa proueniunt, minores & peiores ſunt atque  
magis inſipidi. Cum maturus eſt hic fructus,  
bonam odorem ſpirat, cuiusque duas diſcretas  
coſtituunt, vnâ *Barca* appellatam, & praſtanti-  
orem, alteram *Papa* aut *Giraſal* dictam, minùſque  
bonam: deprehenditur poſtrema ex mollicie,  
quoniam ſi manu apprehendas, digitis cedit.



Fructus  
duo gene-  
ra.

Vires.

Præſtantiffimi verò fructus pretium quadra-  
ginta maravedis non excedit, hoc eſt, paulò plus regali caſtellano. Per longi-  
tudinem ſecti hi fructus, intus candidi, & denſa carne praediti apparent, ac velu-  
ti in capſulas aut receptacula diuiſi, plena caſtaneis longioribus & craſſioribus  
quàm ſint dactyli ſive palmulae, cinerea tunica tectis, & intus albis caſtanearum  
vulgarium modo, guſtu terreſtri & aſpero, ſi virides edantur, multòſque ſtusus  
generantibus: at ſi vti Hiſpanicæ caſtaneae aſſentur, guſtu ſapido & venerem ex-  
citantibus, ob quam ſolam rem plebs frequentius vti ſolet. Sunt autem ſingu-  
lae hæ caſtaneae pulpa flauſcente & aliquantulum lenta inuolutæ, & pulpa Dur-  
rionis nonnihil referente, tamen ſi ab eo differat. Grati ſaporis eſt, praefertim quæ  
in Iaca *Barca* cognominata continetur, optimi Melonis pulpæ admodum ſimi-  
lis: dura tamen concoctionis eſt, & admodum grauat ventriculum: atque, vt  
illarum provinciarum medici aiunt, ſi in ventriculo corrumpatur, noxios & ve-  
nenofos humores generat: quique frequentius hoc fructu veſcuntur, facile in  
peſtilentem illum & peſſimum morbum *Morxi* appellatum incidunt.

DI





Rvctvs est in Malaca adeò grati saporis & odoris, vt reliquis qui in ea provincia gignuntur, tametsi plurimi sint & boni, præterendi videantur. Cuius præstantia, & quoniam Doctor ab Ota illius etiam meminit capite de Datura, licet eum non videret, me impulit vt de eo scriberem tanquam oculus testis, tametsi in medicina nullum locum obtineat. Vocatur hic fructus in Malayo (quæ provincia est vbi gignitur) *Duriam*: ipsius flos *Buaa*: arbor ipsa *Batan*. Prægrandis est hæc arbor, materie valida & solida,

Nomina

DVRIONES, *Acosta.*

Forma.



crasso cinereoque cortice recta, multis ramis luxurians, & copiosum fructum præbens: flores habet ex albo nonnihil flauescētes: folia, dimidij palmi longitudine, duorū aut ampliū digitorum latitudine, in ambitu tenuiter serrata, parte externa dilutiū virentia, interna verò saturiore virore, & quodammodo ad rufum tendente prædita: fructum Melonis magnitudine, denso cortice septum, eoque multis breuib; crassissq; & pungentibus aculeis horrente, foris viridi & velut striis quibusdam quemadmodū Melo secundū longitudinem distincto: intus verò cōcamerationes quatuor secundū longitudinē habet, singulas tria aut quatuor receptacula cōtinentes, quibus singuli fructus insunt admodū cādidi vti lactis pingue, magnitudine oui gallinacei, gustu suauiore odoratioreq; quàm sit cōdimentum illud ab Hispanis *Manjar blanco* appellatum, nō tamen adeo molles aut glutinosi: nam qui cādore illo non sunt præditi sed flauescūt, putridi sunt, aut aëris iniuria pluuiæ corrupti. Optimi censentur qui tres dūtaxat fructus in singulis corca-

Fructus  
delectus.

merationibus, deinde qui quatuor obtinent: nam qui quinque habēt, improbi censentur, quemadmodū & illi qui fissuras aliquas habēt: non solēt verò in singulis malis plures quàm viginti fructus cōtineri, iūq; singuli inclusum habēt nucleum, mali Persici nucleo similem, non rotundum, sed oblō giuseulū, gustu insipido, quique guttu exasperet, veluti mespila viridia, propterea nō eduntur. Calidus & humidus est hic fructus: & qui edere volunt, pede leuiter comprimere & frangere solent propter spinas quibus obsitus est. Qui nunquam his fructus ederunt, cū primum illos olfaciunt, videntur putridas cepas odorari: sed postquàm degustarunt, præ reliquis cibis bene olere & sapere censent. Est verò tanta in existimatione, apud eos qui gulæ dediti sunt hic fructus, vt putent neminem eo posse saturari, propterea varia dant illi epitheta. Memini videre quædam Epigrammata ab eleganti Poëta in laudem eius conscripta: quæ (si hic locus ferret vt adscriberentur) non dubito quin lectori plurimū essent placitura. Tanta tamen est huius fructus in Malaca abundantia, vt singuli non plaris quàm quatuor marauedis veneant, præsertim mensibus Iunio, Iulio, & Augusto: nam reliquis præciū intenditur pro hominum arbitrio. Admiratione porro digna est Betele cum hoc fructu antipathia quæ profectò tanta est, vt si quis in nauem Durionibus plenam, addēve aut concamerationem, vbi obseruentur, aliquot Betele folia reponat,

Temper.  
Usus.

Pretium.



corrumpantur & putrescant omnes. Et, sicut ex Durionum immodico esu ventriculus inflammetur & grauetur, folio Betele supra ventriculum imposito, subito mitigatur inflammatio, tumorque tollitur. Et, si à Durionum esu ingeratur aliquot Betele folia, nullam noxam sentiet, quantumvis multos ederit. Inde fit, tum etiam ob eius gustum suauem, ut vulgò dicatur, neminem eorum esu posse satiari.

## MANGAS.

## CAP. CVI.

Forma.



ASTA hæc est arbor & multis ramis prædita, fructumque fert magna ex parte anserino ouo maiorem, nonnullis interdum Indiæ locis binas libras, aut ampliùs pendentem. In eadem verò arbore persæpe colore differentes isti fructus conspiciuntur: alij enim dilutè virent, alij flauent, quidam etiam ex viridi rubescunt: grati admodum saporis odorisque est, & quando non est corruptus, Duracinis Persicis (quæ à carne firmiore flauaque

Locus.

MANGAS, Acosta.

Nomina

similis a PM  
Ambo a Turcis.

Temper.

Et Vires.



Mangas  
siluestre a  
lud genus.  
Vires.

Melocotonea vulgò appellantur) præstat. In multis prouinciis nascitur, uti in Malabar, Goa, Guzarate, Balagate, Bengala, Pegu, Malaca, aliisque Indiæ locis, & in Ormuz ubi reliquis præcellit. Nominatur *Mangas*, in Canarin *Ambo*, à Persis & Turcis *Ambo*: permanetque in arbore ab Aprili in Nouembrem usque interdum, pro locorum natura & situ. Edicitur hic fructus in laminas sectus aut sine vino, aut vino maceratus. Conditur etiam saccharo ut commodius adseruari possit, atque interdum cultello aperitur, & in eius meditullium zingiber recens, allia, sinapi, sal, cum oleo & aceto insperguntur, ut vel cum oriza edant, vel oliuarum conditarum modo. Saliunt etiam & elixant, atque in forum venalem proferunt. Frigidus & humidus est, tamen si vulgus calidum constituat, & multas mordicationes in eorum qui vescuntur ventriculo parere affirmet. Quin & indigenæ medici calidum faciunt, & vituperant, dicentes serpiginem, erysipelas, biliosas febres, phlegmonas, & scabiem generare. Quod fortè accidit ab eius in ventriculo corruptione: sed eo tempore quo inuenitur hic fructus, propter immoderatum æstum, in similes morbos incidunt etiam nonnulli qui illo abstinant. Antequàm probè maturus sit, gustu adstringente est, & ea pars quæ ossiculo vicinior est, acerbior: sed maturus dulcis & sapidus est. Præduro putamine, vndiquaque tomèto, aut duris fibris transversim & oblique excurrentibus operto tegitur nucleus longiusculus & crassiusculus, magnitudine iligneæ glandis, candidus & candida cute tectus, gustu amaro dum crudus est, ideòque aduersus lumbricos & alui profluvia vilis: tostus verò iligneas glandes sapit. Inuenitur etiam huius genus sine ossiculo, paulatim admodum gratum. Aliud eius genus siluestre reperitur *Mangas brauas* nuncupatù, adeò præsentis veneni, ut indigenæ illo sese mutuo perimant: nam si quis paululum ederit, ilicò moritur: interdum oleum admiscet ad exacuendam eius vim, utque celeritè perniciem adferat: sed quocumque tandem modo sumptum, adeò celeritè perimit, ut hætenus nullum sit repertum antidotum ad eius vim compescendam. Dilutè viret, & aliquantulum splendet, lacteo succo abundat, paucèque



paucâque carne præditus est, nam crasso cortice solummodo integitur ossiculum prædurum & cartilagineum, Coronei tamen mali magnitudine est. Per vniuersam prouinciam Malabar prouenit copiosè hæc arbor, domestica siue satiuâ minor, breuioribusque & crassioribus foliis. Pueri his fructibus, aureorum malorum loco sese mutuò petere consueuerunt.

## ANANAS SILVESTRIS. CAP. CVII.



LTIVS assurgit Nanâ à nobis descripta suprâ huius libri cap. 75. quæ Ananas silvestris nuncupatur: namque truncum habet hastæ magnitudine læuam admodum, rotundum & Mali aureæ crassitie, spinis horridum: folia spinosis cuspidibus prædita, & per ambitum molli-  
bus spinis septa. Singulæ arbores secundû radicem summa tellurè magnam folio-  
rum comam fundunt, maiorum quàm quæ in arbore sunt, quæq; procul intuenti-  
bus Aloës foliis similima videantur, tenuiorum  
tamen, pluribus spinis horridorum, & dilutè vi-  
rentiû: adnatis se propagat, aliæq; stirpes ex aliis  
enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum  
ambitu quos egregiè muniunt. Rami foliorum  
simul glomeratorum capita proferunt flauen-  
tium admodum, & tenerorum, suauissimi odo-  
ris, quæ nihil aliud sunt quàm flos ipse: ex horû  
singulis spica prodit Arundinis spicæ non absi-  
milis, sed crassior, cōpactior, & elegantior, odo-  
re Cedri. E ramis dependent fructus, *Ananas*  
*bravo*, id est, Ananas silvestres dicti, quoniâ cum  
domesticis nonnullam habeant similitudinem,  
Melonis magnitudine, coloris rubri elegantis  
& oculos oblectâtis, toti in partes diuisi quem-  
admodum cupressini strobili, seu nuces exsic-  
catæ, sed tuberculis foris obsiti, vt procul spe-  
ctantibus magni pinei strobili appareant. Ca-  
pitum teneriora folia seu flores crudi eduntur  
carduôsque sapiunt, sed exiguum alimentum  
præbent. Fructus (quem pauci degustant) sapo-  
re vtcumque suauis præditus est, adstrictionis ta-  
men austeræ, & palato parum gratæ particeps.

Forma.

ANANAS silvestris, Acofta.



Succi plena est tota planta cum suis radicibus. Huius sex vel octo vnciæ ex saccha-  
ro summo manè sumptæ præsentissimum certissimumq; censentur esse remediû  
aduersus iecoris & renum calores, renum vlcera, purulentas vrinas, & penis exco-  
riationem: nam magna ex parte post tertium diem sanantur. Vtilem etiam in  
diabete esse ferunt: at non sum expertus. Arabes admodum laudant aduersus eos-  
dem morbos & erysipelas: & *Queura* vocant, quemadmodum in Decan, Persæ  
*Ananasa*, & *Angali* florem (qui caput illud foliorum odoratum est) Arabes  
*Chuxtaid*, Persæ *Pixcoxbutch* dicunt: Turcis est ignota. Habere hanc plantam ali-  
quot notas non dissimiles Aloë Americanæ, annotat Clusius.

Dir.

Nomina

CARAMB



Nomina

Forma.

Fructus.

Vsu.



**F**RUCTVS quem Malabares & Lutaniani *Carambolas* appellant, in Decan *Camarix*, in Canara *Camarix* & *Carabel*, in Malayo *Bolimba*, & à Persis *Chamaroch* dicitur, nascitur in arbore Cottonæ magnitudine, foliis Mali, paulò longioribus, coloris viridis saturatoris, & gustus amaricantis: floribus parvis quinq; foliolis constantibus ex albo rufescētib; nullo quidem odore gratis, sed aspectu elegantibus, & gustu oxalidis acetoso. Ipse verò fructus masculi oui gallinacæ magnitudinem æquat, oblongus, flavescens, atque veluti in quatuor partes diuisus, sulcis illis paulò altius impressis magnam gratiam addentibus: in meditullio continet semina tenera saporis aciditate palato grata. Multi vsus est in medicina & in cibis: namque maturum exhibent in biliosis febribus, & saccharo conditum syrupi acetosi loco præbent. Canariini eius succo, cum aliis medicamentis istic nascentibus, collyria parare solent ad oculorum

nubeculas tollendas. Obstericæ (quæ illis *Daya* dicitur) vidi fructu sicco & in puluerem contrito, & foliis Berele videntem ad secundinas à partu expellendas, fetumq; mortuum educendum. Eius etiam muria conditi frequens est vsus, cum gratissimi sit saporis, & appetentiam excitet.

## IAMBOS ACOSTÆ.

## CAP. CIX.

Forma.

Fructus.




**L**IVS est in India fructus, qui ob aspectus elegantiam, suauemq; odorem & saporem, tum etiam ob eius in medicina vsum, dignus est cuius historiam hic apponam. Arbor verò quæ hunc fructum præbet, vasta est, maximam Malum auream quæ in Hispaniis nascatur æquans, multis ramis in latum expāsis, multamq; umbram præbentibus prædita, aspectuque pulcherrima, caudex maiorēque rami cinereo cortice integuntur: folia pulcherrima sunt, læuia, palmū aut ampliùs longa, crassiore nervo per longitudinem, multis autem obliquis venis in latera excurrentibus, parte superna saturatiùs, inferna verò dilutiùs virentia: flores ex rubro purpurascētes, viuidi admodum coloris, multis staminibus in medio præditi, aspectu pulcherrimi, gustu capreolorum vitis simili. Fructus magnitudine est Pyri quod à Rege cognomen accepit, eiusque duo sunt genera: vnus enim adeò obsecrè rubet vt niger videatur, magna; ex parte osciculo caret,



carer, & succi bonitatem præstat: alter ex candido rubescit, & osculum continet album, durum, non admodum rotundum, osculi quod in Persico malo est magnitudine, læue, & candida hirsutaq; membrana tectum, qui licet superiori bonitate cedat, dignus tamē est delicatissimorum etiam hominum palato. Vtiusque odor suauissimam rosam refert, frigidus & humidus est, & admodum tener, cortice adeo tenui & molli tectus, ut cultello auferri non queat. Altē suas radices terræ insigat hæc arbor, & post quartum annum sit fructifera: fructū sapius eodem anno perficit, & nunquam sine flore aut fructu conspicitur, cum iidem rami floribus, fructu viridi & maturo semper ferē onusti sint, decidentibusque quotidie floribus (sic ut solum rubro colore tinctum quandoque videatur) noui subnascantur, fructusque alij primum nascantur, alij matureſcant, alij iam maturi colligantur. Succula arbore maturi facillē decidunt: comprehensi verō rami ad fructus colligendos, facillimē ab arbore reuelluntur. Ante reliquos cibos initio mensæ edi solent atque interdū. Malabares & Canarini hunc fructū *Jamboli* vocant, Lusitani isti *Nomina* habitantes *Jambos*, Arabes *Tupha*, Indi, Persæ *Tuphat*, Tūci *Alma*: Lusitani arbore *Jambeiro* appellant. Flores & fructus saccharo condiri solent, usq; frequenter vtuntur in biliosis febribus, & extinguenda sitis gratia.

MALA INDICA, ACOSTAE. CAP. CX.



**M**AGNA est arbor multis foliis & floribus prædita, & copioso fructu: folia minus rotunda sunt Mali foliis, tametsi ea æmulentur: supernè saturatè virent, infernè candicant & pubescunt uti Saluie folia, gustu adstringente: flores exigui, candidi, quinque foliolis constantes, inodori. Fructus Iuiubis, seu Ziziphis similes, alij aliis maiores & suauiores, nunquam verò tam probè matureſcentes ut conseruari queant & in alias regiones transferri uti Zizypha, & perpetuò non nihil adstrictionis retinentes: vnde colligitur minimè pectori vtiles esse quemadmodum Zizypha. Huic arbori nomen est in Canara *Bor*, *Nomina* in Decan *Ber*, & in Malayo *Vidaras*, apud Lusitanos *Mançanas de la India*, id est, Mala Indica. Præferuntur fructus in Ma'aca nati Malabaricis: sed iis adhuc præstantiores quos Balagate profert. Conspicitur hæc arbor æstate alatis formicis perpetuò onusta, quæ in ramis eius Laccam elaborant.

JAMBOLOINS. CAP. CXI.

**H**VIS arboris materies cortice integitur coloris ferè eiusdem cum Lentisci cortice: folia Arbuto similia habet, sed Myrti virentis foliorum sapore: fructus Cordubēsisbus oliuis maturis similes, adstringentis gustus, & fauces contrahentis. Nullum vsum in medicina obtinent, sed eduntur cum oriza cocta, nam appetentiam excitant. *Vulgus Jamboloins* appellat.



**A**LIVS est fructus, *langomas* nuncupatus, Sorbis fere similis colore, & immaturis prunis sapore: quibus & arborem similem habet. (sed spinis obsitam) & folia & flores: Nascitur cum sponte in agris, & in hortis etiam colitur. Fructus licet maturus digitis prius emolliendus est

AMBAKE, *Acosta.*

antequam edi possit: attamen adstrictionem illam haud mediocrem, nequaquam adhuc deponit: eaque de causa illius usus est ubi adstrictione opus habent.

AMBAKE. CAP. CXIII.

Forma.



Nomina

*Ambake indianum.*

PINEI nucleu Malvacani, *Acosta.*

**C**RASSA magna est hanc arbor, foliaque habet luglandis foliis magnitudine respondentia, sed non eius formæ, dilutius virentia, & minus venis elaborata, quæ illis magnam gratiam addunt: flores exiguos candidos, fructus luglandis nucis magnitudine dilutius virentes, & cortice quam illa leuiore: odoris grauis & gustus acerbis dum adhuc virent, coloris verò flauis in maturis, gratioris odoris, & gustus grata aciditate commendabilis, medullam continente, cartilaginosa & duram, è duris nervis oblique intertextis constantem. Hanc arborem appellant Canarini *Ambake*, fructum *Ambakes*, Persæ *Amberech*, Turci *Harb*, Lusitani *Ambares*, quemadmodum Canarini. Propter fructus gratam aciditatem eum omphacij, seu agrestis loco cibis admiscerent: maturum ex sale & aceto edunt, excitat enim edendi appetitum. Indi aduersus biliosos humores vtilem esse perhibent. Sale & aceto conditus, diu conservari potest.

PINEI NUCLEI MALVACANI.  
CAP. CXIII.

Forma.



Usus.

**L**ITVR in hortis quibusdam Malabar, tum etiam in nonnullis silvis sponte nascitur arbor magnitudine Pyri, cuius folia inferne diluto virore prædita sunt, supernè autem sauro, admodum tenella & mollia, quæ gustata valde acia deprehenduntur, & linguam diu vellicant: fructus triangularis, auellane magnitudine, interius in multa receptacula distinctus, in quibus semen est album, solidum, rotundum, Pineo nucleo suo putamine exempto par. Eo fructu frequenter vtuntur Indi, cum in curandis quibusdam morbis, tum etiam in suis nequitis. Binos eiusmodi nucleos tenui membrana quæ illos contegit



contegit liberatos terunt, & clysteribus vulgaribus admiscet aduersus schiaticam, & vrinæ difficultatem: seu propinant cum gallinæ iusculo ad educēdos putridos, lentos, crassosq; & frigidos humores, & asthmaticos curandos, aduersus quē morbum plurimum commendant, & frequenter vtuntur. Ex aqua tritis impetigines inunctæ primum tamen diligenter confricatæ & abraſæ, probè & breui temporis spatio curantur: sed admodum vrunt, vt experientia didici. Improbæ etiam mulieres illarum prouinciarum suis maritis parum aquæ, quatuor grana siue nucleos edendos præbent vt eos interimant. Vulgò appellatur hic fructus *Pinones de Maluco*, hoc est, Pinei nuclei Malucani, quod istic frequentes sint arbores hunc fructum ferentes, multūsq; & familiaris admodum sit illius vsus in purgationibus: à Canarinis *Gepalu*.


CHARAMEI.

CAP. CXV.



VIUS arboris duo sunt genera. Vnum Mespili amplitudine, foliis Pyro similibus, dilutè virentibus, fructu auellanis simili, admodum flauo, eleganter in multos angulos desinente, sapore Omphacij, & grata aciditate, quem vel immaturum vel maturum, vel sale conditum vulgariter edunt. Alterum genus eiusdem est magnitudinis, foliaq; habet

(CHARAMEI, *Acosta*.



Malo minora, fructum verò priore maiorem, cuius decocto cum Santalis aduersus febres vtuntur Canarini Medici. Crescit in siluis & montibus procul à mari disitis. E primi generis, quod secundum aquas nascitur, arboribus, seligunt Decanini & Canarini eam quæ longius à mari abest: eius radicis corticem (cui lacteus succus inest) quatuor digitorum longitudine sumentes cum drachma sinapi probè terunt, & asthmaticis exhibent: valenter enim purgat per aluum & vomitum. Quod si immodica subsequatur euacuatio, Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel aceti Canarini haustū sumunt (quod nihil aliud est quàm aqua decoctionis orizæ vno aut altero die reseruata donec aceſcat, Canarinis aceti vices præbens, & medicum vsum præstans) & si profluuium nō cessat, ægris caput frigida abluunt. Magnus est horū Charameis vsus in illis prouinciis, & ad orexim ciendam edere solēt immaturos, maturos, salitos, vel sale & aceto conditos vt antè dixi, aut aliis eduliis quibus aciditatem conciliare volunt admiscēt. Vocantur in Canara, Decan, & vulgò Chara-

Forma.

Locus.


Vires.

Vsus.

Nomina

meu, Arabibus, Persis & Turcis *Ambela*.

ARBORIS CORTEX AD RHEVMATISMOS UTILIS. CAP. XVI.



ICOLAVS Monardes lib. 3. Historiæ simplicium medicamentorum ex Nouo orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, Peruani cuiusdam corticis, quem ad rheumatismos ab Indis efficacissimè adhiberi ait, his verbis meminit. Inter reliqua mihi ex Peru missus est crassius quidam cortex, quem ex vasta arbore Vlmo simili cū amplitudine tum



*Locus.* forma detractum ferunt. Nascitur ad ripas fluminis cuiusdam vigintiquinque leucis à Lima distantis: nec alibi in India facillè reperiatur. Indi capitis defluxionibus, rheumatismis, aut alioqui capitis grauedine laborantes, huius arboris corticem in tenuissimum puluerem comminuunt, & naribus imponunt: humores enim insigniter educit, quæ ratione liberantur: quod verum esse nos ipsi experti sumus. Secundum caloris gradum excedere videtur.

## PACAL.

## CAP. CXVII.

**A**D EIVSDEM, inquit idem, fluminis ripas nascitur altera arbor, quam Indi *Pacal* vocant, iam descripta multò minor. Huius ligni vlticineribus cum sapone mixtis, Indi ad tollendos lichenes etiam fœdissimos vtuntur, cum qui in capite nascuntur, tum qui reliquas corporis partes occupant: sed & vetustas cicatrices emaculare dicitur. Paululum huius ligni etiam accepi, cuius facultates experiemur.

## CACHOS.

## CXVIII.

*Forma.* **M**ISSVM præterea sibi idem Monardes fuisse ait plantæ semen, plurimè apud Indos æstimationis, *Cachos* vocatæ. Nascitur arbusci modo, insigni virore prædita est, folio rotundo & tenui: fructu fert Malo insano similem, altera parte sessilem, altera turbinatum, cinerei coloris, grati saporis & acrimonie expertis, minutum admodum semen continens. Inuenitur duntaxat in Peruanis montibus. Magnæ est apud Indos, vt dixi, æstimationis, ob insignes facultates. Nam vrinas ciet, arenulas & calculum in renibus pellit, quodque præstantius est, illius vsu calculum in vesica comminui ferunt, si mollis adhuc sit, vllisque medicamentis comminui queat: eiusque rei tam multa proferunt exempla, vt admirationem mihi pariat: nam ea est mea opinio, vesicæ calculum haudquaquam expelli posse, solamque exemptionem illius remedium esse, nullum autem medicamentum adeò efficax esse, vt eum confringere valeat: aiunt tamen illius semen tritum ex aqua aliqua ad eam rem vtili sumptum, calculum in lutum dissoluere, quod excretum denuo concreseat, & in lapideâ duritiem conuertatur. Adolescentem vidi, cui hoc obtigisse scio. Is cum vesicæ calculo torqueretur, idque à lithotomis qui calculum deprehenderant intellexissem, & ex symptomatis quæ patiebatur agnoscerem, hominem veris initio ad fontem qui de petra cognominatur ablegauit, vbi cum duos menses hæsisset, à calculo liber rediit, & omne lutum, quod paulatim eiecerat, denuo in lapideâ fragmenta concretum secum in charta detulit. Pauculum semen quod habemus terræ commitemus, & si nascetur vtetur, vt eius facultates quas in hoc morbo adeò prædicant experiamur.

## FRUCTVS SVB TERRA NASCENS.

## CAP.

## CXIX.

*Forma.* **M**ISSVS eidem etiam est ex Peru fructus sub terra natus, pulcher admodum aspectu, & grati saporis, qui & radice caret, neque aliquam plantam profert, aut ab vlla planta producit, sed solummodo sub terra nascitur quemadmodum tubera: dimidij digiti magnitudinem æquat, rotundus est & contortus, & affabre elaboratus, coloris spadicei, nucleus intus continens, resonantem dum siccus est, amygdalæ similem, cortice fusco, intus album & in duas partes diuisum vt amygdala. Grati saporis est, & auellanam gustu refert. Inuenitur apud flumen Maranon, nec vsquam alibi per vniuersam Indiam

*Locus.*



Indiameditur recens & exiccatus, sed torrerī praeſtat: apponitur ſecundis menſis beſſariorum loco, quoniam ventriculam admodum exſiccet & roborat: ſed ſi liberalius edatur, capitis grauedinem generat. Eum admodum aſtimant cum Indium Hiſpani, nec immerito, quoniam eos qui ad me miſi ſunt deguſtans, grati eſſe ſaporis deprehendi. Temperatus eſſe videtur.

FRUCTVS LEVCOMA NVNCVPATVS.

CAP. CXX.



RBORIS etiam fructum inde accepit, quem Indi *Leucoma* nuncupant: ſimilis eſt noſtrati caſtaneae cum colore, tum magnitudine, tum etiam ſeſſili illa & albicante parte quam caſtanea obtinet. Præguans eſſe videtur, ſed quoniam binos duntaxat accepi, confringere nolui, cum alterum ſeuerim & non prodierit, alterum in aliud ſationis tempus ſeruem. Arbor in qua provenit vaſta eſt magnitudinis, materiaq; firmæ & robuſta, folia Arburi obtinet. Fructum edulem gratiq; ſaporis eſſe aiunt, & alui profluuiâ ſiſtere quoniam adſtringit: temperatum aſſerunt.

Forma.

Arbor.

SAPONARIAE SPHAERVLAE. CAP. CXXI.



ASSVLA ipſi præterea miſſa ſuit ſubere contexta, plena ſphaerulis admodum rotundis & nigris atque ſplendentibus, ſic vt ex Ebena confectæ viderentur. Ea verò conſtabant ex fructu in pumila arbore naſcente magis incurua quam recta, veluti Ruſcus, cuius folia filicium ſimilia. Ferunt ij frutices rotundum fructum nucis magnitudine lenta quadam pulpa tectum, qua ſublata relinquitur ſphaera quædam maximè rotunda, coloris nigri, adeò dura, vt niſi malleo, aut alia quapiam re ſolida & dura confringi queat. Saponis vicem præbent hi fructus, quoniam ſi binis, aut tribus cum calida aqua veſtes eluantur, multò nitidiores redduntur, quam ſi ſaponis librali pondere elotæ forent: plurimam etenim ſpumam excitant, eoſdemque effectus præbent quos ſapo, paulatim liqueſcentes, donec ſola ſphaerula ſuperſint, quæ nucleus ſunt huius fructus: perforantur deinde hæ ſphaerulae, ſuntque ex iis precariae coronæ adeò elegantes vt ex Ebena confectas dicas, tum diutini uſus, quoniam diſſiciliter confringuntur. Eſt verò is fructus adeò amarus, vt nulla quadrupes, aut avis eum deguſtent. Aliquot ex iis terræ credidi, quæ enatae ſunt, foliaq; geſtant admodum elegantia, & viridia: fructum ſuo tempore prolaturas exiſtimo, paruula enim adhuc ſunt planta. Deſcribit quoque hunc fructum Ouiedus Indicæ Hiſtoriae lib. 9. quod & ad Monardem annotauit Cluſius. Sūt, inquit Ouiedus, in hiſ inſulis (Hiſpaniola videlicet) & cōtinenti quædam arbores, quæ à precariis ſphaerulis & à ſapone cognomen acceperunt, quarum folia Filicis folia nonnihil reſerunt, licet minora ſint. Ceſſæ ſunt & formoſæ, fructum ferentes auellanae, aut ceraſij magnitudine, corolla inſignitum, minimè edulem, qui ſole exſiccatus ſub ſuaum colorem retinet, is oſculum intus continet globulo bombardario æqualem, rotundum, nigrum, at ſi ſolis radiis opponatur, ſubruſum, quod ſemen exiguum & amarum habet. Ex hiſ oſculis perforatis fiunt precatoriae corollae, non inegantiores quam ſi ex Ebena confectæ eſſent, imò iis præſtant, cum quòd leuiore ſint, tum non adeò fragiles. Fructu integro cum aqua calida panni expurgantur perinde atque ſapone: at ſi quis frequentius eo vtatur, pannos vitæ & corruptos mel duntaxat neceſſitatis cauſa eluiſſe ſufficiat. Pulpa oſculum ambiens ea eſt quæ ſaponis vicem præbet.

Arbor.

Fructus.



Exerc. 181.

28.

Forma.

ἡ ἄνθος, καὶ γὰρ  
ἡ ἄνθος, ἀνθὺν  
ἡ ἄνθος



Lib. 25. 27.

Lib. 4. hist.

cap. 3.

Li. 13. ca. 10.

CTONVM circiter pedum est arboris proceritas, quæ nascitur in  
prouincia Pudifetam. Ea rerum accessum videtur sensu percipere.  
Appropinquante homine, aut animali, ramos constringit: receden-  
tibus pandit. Hoc vero simile est. Idem quoque spongiam facere  
confessum ac receptum est. Quare nemo nescit, genus hoc à Philosopho zoo-  
phytum appellari. At hæc etiam tactum præuenit, tum sensu, ut putant, tum sui,  
ut palam videtur, subtractione. Quapropter aut afflatum percipere dicendum  
est, aut radice propter soli motum, compressionem, agitationemve. Hac de caus-  
sa nominant incolæ Arborem pudicam. De eadem scribere hæc videtur Garcias  
in Atomatum Indic. Historia. Nascitur in Malauar planta miræ naturæ: nam si  
quis manū admoueat, illico contrahitur. folia Polypodij, flores verò luteos habet.  
Nullus veterum huius, quod sciam, mentionem fecit. Eam verò intelligere vide-  
tur qui Americam descripsit: quoniam in Peru prouincia plantam nasci asserit,  
cuius folia solo contactu siccantur. Sunt qui putant eandem à Theophrasto de-  
scriptam his verbis: ὁ δὲ δίδοντι φύλας πρὸς μέμφιν (lege ὕλημα, ut & Gaza) ὅτι καὶ  
φύλας καὶ βλαστῶν, καὶ τὴν ὅλην μορφήν ἐχὼν ἐν τῇ ἰδίᾳ, ἀλλ' ἐστὶν ὁ συμπαῖνον πρὸς αὐτὸ πᾶν  
ἡ μὲν γὰρ πρὸς σφῆν ἀνθώδης ἐστὶν αὐτῇ, καὶ ὁ φύλλον παρόμοιον τῷ πτερίδι (Gaza legit  
πτερίδι, id est, Filicibus, Plinius πτερίδι, id est, pennis) ὅταν δὲ τις ἐλθῇ τῶν κλωνίων, ὡς περ  
ἀφ' ἡμῶν ὁμοῦ τὰ φύλα συμπαῖνται φασί (Gaza legit ἐπαμειβόμενα, sed legendum  
ἀραμειβόμενα, vel φαυλίζόμενα) ἕτα μετὰ τινὰ χρόνον ἀναβλάσκει τὸ πάλιν, καὶ γὰρ ἄλλῃ. id est,  
Nascitur peculiaris quædam arbor circa Memphim, non foliis vel ramis, vel tota  
forma peculiare quid sortita, sed euentu: facies enim eius spinosa, folium Filici si-  
milit, ut vertit Gaza, vel pennis, ut Plinius: sed cum ramulos quispiam contigerit,  
folia veluti arefcentia & languescientia contrahi aiunt, deinde paulò post ad vitam  
redire, & virere. Quæ Plinius sic conuertit. Siluestris fuit circa Memphim regio,  
ram vastis arboribus, ut terni nequirent, vel circumplecti, vnus peculiari miracu-  
lo, nec pomum propter, vsumve aliquem sed euentum. Facies enim spinæ, folia  
habet ceu pennas, quæ tactis ab homine ramis cadunt protinus, ac postea re-  
nascuntur. Huic arbori affinem herbam prodidit Apollodorus Democriti disci-  
pulus, quam iccirco Aeschynomenen appellabat, quia admotam manum refu-  
geret foliorum contractione.

## PAPYRVS.

## CAP. CXXIII.

Nomina

Lib. 1. c. 98.

Lib. 4. hist.

ca. 9.

Locus.

Forma.

Vide Theophr. hist.  
4. 4.

Vfus.



ΠΑΠΥΡΟΣ Græcis, Latinis similiter Papyrus, Arabibus Burdi, siue Bardi.  
Dioscorides Papyri ut vulgò cognitæ descriptionem prætermisit. Theo-  
phrastus & natales & faciem quadatenus delineauit, & varium eius vsum  
exposuit. Nascitur Papyrus, inquit, non in altis gurgitibus, sed ad duos circiter cu-  
bitos profundo vado, alicubi etiam minore. Radix crassitudine est carpi robusti  
hominis, longitudine decem cubitos excedente. Crescit super terram ipsam, radi-  
ces obliquas in imum demittens tenues & densas. Sursum Papyros producit, trian-  
gulos, quaternum ferè cubitorum magnitudine, quos in multas diffundit partes,  
coma inutili, inualida, fructu prorsus nullo. Radicibus pro ligno vtuntur, non  
ignis solum gratia, sed ad diuersi generis vasa ex ipso conficienda: multam enim  
materiam habent, bonamq. Papyrus ipse ad multa utilis est: ex eo enim nauigia  
fiunt, ex libro vela tegetesque texunt, vestes quoque sciam, itragula, funes, alia plura. Ac  
externis quidem notissimæ sunt chartæ (βιβλία dicit scapi tæniæ, ex quibus char-  
tæ fiunt, scapos ipsos παπύρους, aliquando plantam totam παπύρον, aliquando cau-  
lem) maximè verò suppeditando alimento plurimum confert: mandunt enim  
incolæ



incolæ Papyrum & crudū, & elixum, & assū, succum deuorāt, & quod mansum est expiunt. Talis igitur est Papyrus, & tales vsus præbet. Nascitur & in Syria circa lacum in quo & Calamus odoratus, vnde & Antigonus nauium funes faciebat. Eadem ferè Plinius tradit ex eodem Theophrasto. Papyrus ergo nascitur in palustribus Ægypti, aut quiescentibus Nili aquis, vbi euagatæ stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitum, brachiali radice obliquæ crassitudine, triangulis lateribus, decem non ampliùs cubitorum longitudine in gracilitatem fastigiarum (legendum videtur ex Theophrasto, Brachiali radice obliquæ crassitudine, decem non ampliùs cubitorum longitudine, triangulis lateribus. Theophrastus tamen radicem carpi robusti hominis crassitudine esse ait, longitudine decem cubitis maiore.) thyrsi modo cacumen includens (sic Gaza reddidit quod Theophrastus *κόμην* dixit, Strabo *χρίστην ἐ'χοντες ἀρχέστην, ἀσθενήν*, quod aptius conuertisset, Comam siue iubam inutilem habent & inuolidam: thyrsus enim à coma differt.) Semine nullo, aut vsu eius alio quàm floris ad deos coronandos. Radicibus pro ligno incolæ vtuntur, non ignis tantum gratia, sed ad alia quoque vtensilia vasorum. Ex ipso quidem Papyro nauigia texunt, & è libro vela tegetesque, necnon & vestem etiam stragulam, ac funes. (Ex biblo Theophrastus eadem texti scripsit, nimirum ex Papyro siue Papyri caule, id est, caulis tenuis & philuris, non autem libro siue extimo cortice. Sed omisit Plinius mortalibus maximè necessarium humanis plantæ vsū à Theophrasto positū, nempe ex biblo texti biblia, id est, chartas etiam externis notissimas, cum Græci longè plura chartis tradiderint, quàm ipsi met Ægyptij, apud quos Papyrus nascitur, memorabilium rerum monumenta faxis, obeliscis & pyramidibus inscribere soliti.) Mandunt quoque crudum decoctumq; succum tantum deuorantes (Dioscorides & eum secuti, vt Pierius in Hieroglyphicis, falsò putarunt radicem *ἐ'χον τρυφιδόν τι*, id est, alimenti non nihil præbere, ideoq; Ægyptios *διαμασσωμένους ἀποχυλίζειν*, mandere exugereq; succum, το διαμασσωμένα ἐπιπύσινους. Nam præter Theophrasti perspicuam hac de re narrationem, Herodotus in Euterpe apertissimè refert Ægyptios Papyri è palustribus collectæ annua messe partem superiorem præcisam in alios vsus quàm alimento rum vertere, inferiorem autem cubiti longitudine & mandere & comesse, eximia quadam suauitate, cum in luculento furno torretur. Ante fruges inuentas priscis Ægyptiis vsitatissimum & frequentissimum eum cibum fuisse ex Oro cognoscimus: scribit enim Ægyptios antiquissimam, & omni memoria priorè originem suam significantes, Papyri fasciculum pinxisse, quoniam eo primum vescerentur.) Nascitur & in Syria circa quem odoratus ille Calamus lacum. Neque aliis vsus est quàm inde funibus Rex Antigonus in naualibus rebus, Sparto nondum communicato. Nuper & in Euphrate nasci circa Babylonem Papyrus intellectum est eundem vsū habere chartæ. His subiungit Plinius chartarum genera, earumq; conficiendarum rationem explicat, oratione quidem satis obscura & perplexa, vt in re antiquissima, & nobis ignota, quam ex doctissimis eruditissimis Dalechampij in Plinium obseruationibus, & ex Guilandino perspicuam reddere & enucleare conabimur. Preparantur, inquit Plinius, ex eo (Papyri scapo) chartæ, diuiso (scapo) acu in prætenues, sed quàm latissimas philuras (rectius fortasse longissimas, Guilandinus mauult latissimas.) Principatus medio (subaudi Papyro, ex vetusto codice, mediis scilicet philuris) atque inde scissuræ ordine. Hieratica (idest princeps & primaria) appellabatur antiquitus religiosus tantum voluminibus dicata, quæ ab adulatione Augusti nomen accepit, (ablutione ex vetusto codice & Isidoro, Hieratica, inquit, subcolorata, Augustea facta abluendo candidior,) sicut secūda Liuiæ à coniuge eius. Ita descendit Hieratica in tertium nomen. Proximū Amphitheatricæ datum fuerat à confecturæ loco (Guiland. Arthritica, ab

Lib. 13. c. 11.

Lib. 13. c. 11. & 12.



Lib. 5. c. 10. Arthribica præfectura, cuius meminerunt Strabo, Ptolemæus, Stephanus. Arthribin etiam memorat auctor. Quidam Amphitheatricem dici potuisse suspicantur, quod in Amphitheatris Ægypti, Alexandriaeque; potissimum, à concursu populi vacuis cōficerentur, ut solent mercenarii opifices in locis publicis à vulgi turba non occupatis artem suam exercere. Fortassis & id Romæ factum in aliquo Amphitheatro, unde nomen. Excepit hanc Romæ Fannij sagax officina, tenuatamque curiosa interpolatione principalem fecit è plebeia, & nomen ei dedit. Quæ non esset ita recurata, in suo (nomine) mansit Amphitheatica. Post hanc Saitica ab oppido (Sai) ubi maxima fertilitas (Papyri suba.) ex vilioribus rametis (philuris) propiorque etiamnum & cortici Tæniotica à vicino loco (Guillandinus legit Tanica à Tani ciuitate, hodie Damiatra) pondere iam hæc non bonitate vanalis. Nam Emporetica inutilis scribendo, inuolucris chartarum, segestriumque; mercibus vsum præbet (Quidam legunt stegestrium, ἀπὸ τῆς ἐγῆς, σκεπάζειν, καὶ ἀλύνειν. Varroni tamē segestria dicuntur stramenta è segete, quibus lecticas inuoluebant, ut ab imbre. puluere, & externis quibusvis iniuriis defenderent. Alij quævis ἐνδύματα & inuolucra sic appellari putant, quod iis segerantur, seponantur ac separantur quæ occultant. Sunt etiam segestria vela aut tegumenta cilicia, ex pilis caprarum aut hircorum contexta Procopio lib. 2. belli Persici, & Suida. Suetonius in Augusto, segestrio aut lodicula inuolutus, non ut vulgò sesterio. Cuiacius 13. Obseruat. ideo à mercatoribus cognominata. Post hanc Papyrus est, extremumque; eius scapo simile, ac nefunibus quidem nisi in humore vile. Vetus codices habent extimū, quod probat Dalechampius, pro extimo ac supremo cortice. In hoc Plinij loco Guillandinus Turnebum acriter insinuat, tres chartæ species inuehentem, Hieraticā, Augustam, Liuiam, cum una eademque sit Ægyptiis dicta Hieratica, quoniam religiosis & sacris tantum voluminibus dicata esset, Romanis adulatione prima Augusta, adulatione secunda Liuia, ut obscurius & ignotius, ordinēque tantum tertium eius nomen fuerit Hieratica. At qui totum hac de re Plinij sermonem diligentius expenderit, Turnebum & Ruellium à Guillandino iniuste reprehensos fuisse iudicabit. Cum enim chartarum genera pro latitudinis differentia recenseret perspicue plures eius species constituit. Emporeticæ digitos sex esse vult, Saiticæ pauciores novem, Amphitheatricæ novem, Fannianæ decem, Hieraticæ vndecim, optimis vero duabus, id est Augustæ & Liuianæ (ut paulò post ostendimus) tredecim. Præterea Augustā & Liuianā eandem non esse apertissime demonstrant hæc Plinij verba. Augustæ in Epistolis auctoritas relicta. Liuiana suam tenuit, cui nihil è prima erat, sed omnia è secunda. Hæc ad Guillandini opinionem refellendam, tuendamque; Turnebi & Ruellij sententiam satis valent, sed multò magis quæ sequuntur, in quibus ex Dalechampi iudicio & deprauata quædam corriguntur, & obscura declarantur. Verba Plinij sunt. Texuntur omnes tabulæ madentes Nili aqua. Turbidus liquor vim glutinis præbet, cum primo supina tabula scheda adlinitur, longitudine Papyri, quæ potuit esse sefegminibus (alias segminibus) vtrinq; amputatis. Transuersa postea crates peragitur. Premitur (al. às premuntur) deinde prælis, & siccantur Sole plagulæ, atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitatis diminutione ad deterrimas. Nunquam plures (philuræ subaud.) scapo quàm vicenæ. Hic Guillandinus Turnebum & Ruellium ignorantia accusat, quod locum non intellexerint, nec viderint tabulas hinc dici Papyri schedas, quæ auulsæ compinguntur, non autem asseres philuris subditos, super quibus glutinantur. At contra hi recte, ille perperam sensisse videtur. Nam dum charta fiebat, necesse fuit tabulâ subici, super qua distenderentur rectæ & transversæ philuræ, quæ glutino, vel aqua Nili turbida committerentur, quod Plinius his verbis indicat. Texuntur omnes tabulæ madente Nili aqua: sic enim ex manuscripti codicis fide legendum censet Dalechampius. Idem



Idem ex iis verbis perspicuū fit (cum primo supina tabula scheda adlinitur). Quæ sic accipit Guilandinus, cum primo scheda, id est, philura adlinitur & insternitur tabula supina, auferēdi casu, id est, exporrecta in longum eadē philura. Quod sanē repetitionis genus insulsum minimē cōuenit succinctæ Plinij breuitati, cum presius dici potuisset & aptius (cum primo supina scheda adlinitur) quibus verbis nihil clarius, nec cōgruentius esse potest. Supinam schedā idem exponit recto situ positam, quomodo Liuius supinas manus dixit erectas, matronis in publico dolore ad cælum & Deos tendētib. Dalechampus verò supinā schedam interpreta-  
tur, cuius pars quæ in scapo vergebat introrsum, cum super tabula distenditur, extrorsum vertitur, nec tabulæ lignum tãgit: sic enim posita, quia mollior, humidior ac tenerior est, facilius superinectā aliam amplexatur & retinet. Idē Guilandinus legēdum putat (trãfuerſa postea cute peragitur.) At manuscripti codicis integritas vulgatam lectionem nihil immutadam esse suadet: cōmodius enim & cōcinnius appellari nō potuit chartarum textus, quàm cratis nomine, ob rectas transuersasq; philuras sibi mutuò superincubentes, quæ cratis vel clatorū figura est. Porro plagula est chartæ iam cōfectæ, ac suis philuris, siue schedis, siue ramentis textæ velut lamina, quam chartæ nostræ ex linteis tritis cōfectæ folium vulgus vocat. An verò in apricis locis chartæ siccarentur an vmbrosis & perflatis, nō est indignum scitu quod id pertineat ad Plinij literam vel emēdandam vel cōfirmandam. Verum id quidem est, quæ solo a quæ humore glutinatur disilire, cum vapore solis inarescūt. At quæ luto pingui, aut pollinis flore aqua diluto coherant, solis tepore & æstu, atq; adeo ignis calore tenaciùs cōmittuntur. Itaq; qui chartas densas libris compingendis, aut tegēdis mercibus cōficiunt, vbi prælo chartæ quadratam plagulam satis presserint, insolatu siccāt, & librarij voluminū quæ consuntur posteriora glutine oblita, vel igni admouēt, vel soli exponunt, vt citiùs resiccēntur. Quamobrem & olim chartas insolatu durari siccariq; solitas vero absimile nō est. Deinde Plinius  
Lib. 13. c. 12.  
chartarum species ex latitudinis differentia, & earum ordinem exponit. Magna in latitudine eorum differētia, tredecim digitorum optimis. Duæ detrahūt Hieratica, Fanniana denos habet. Et vno minùs Amphitheatica. Pauciores Saitica: nec malleo sufficit. Nam Emporetica breuitas sex digitos nō excedit. Præterea spectantur in chartis, tenuitas, densitas, cādor, læuor. Primatum mutauit Claudius Cæsar. Nimia quippe Augustæ tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis. Ad hoc trãsmittens literas lituræ metum adferebat aduersis, & aliàs indecoro visu per trãslucida. Igitur & secundo corio statumina facta sunt è primo subtegmine. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēſura, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehendit vitium, vnius schedæ reuulsione plures infestāte paginas. Ob hoc præclara omnibus Claudia: Augustæ, in epistolis auctoritas relicta: Liuiana suam tenuit, cui nihil è prima erat, sed omnia è secūda (cui nihil primum erat, sed omnia secūda, ex vetusto codice.) Scabricia læuigatur dēte cōchæve, sed caducæ literæ fiunt. Minùs sorbet politura charta, magis splēdet. Rebbeat sæpe humor incuriosè datus, primoq; malleo deprehēditur, aut etiam odore, cum fuerit indiligētior. Deprehēditur & lentigo oculis, sed inserta mediis glutinamētis tænia, fungo Papyri bibula, vix nisi litera fundente sextantum inest fraudis. Alius igitur iterum texendis labor. Glutinum vulgare è pollinis flore temperatur feruente aqua, minimo aceti aspersu. Nam fragile gummique fragilia fiunt. Diligentior cura molli panis fermentati colato aqua feruente. Minimum hoc modo intergerij: atque etiam Nili lenitas superatur. Hæ sunt ex Plinio Chartarum species. Prima est latitudinis decem digitorum, quales sunt Augusta & Liuiana: alia enim esse nō potuerunt quàm hæ, ab adulatio-  
ne Augusti & Liuiæ principem locum nactæ, reiecta in tertium bonitatis & nobilitatis locum Hieratica, quæ secunda est digitorum vndecim. Tertia Fanniana, de-



cem. Quarta Amphitheatrica, nouem. Quinta Saitica, pauciorum nouem, nempe octo, quæ nec malleo sufficit, vel quod tam angusta sit, ut malleum qua parte ferit, latiore non admittat, vel tam fragilis sit, ut malleo percussa disrumpatur. Sexta Emporetica, sex digitorum. Taniticam cortici propiorē, & venalem pondere non bonitate in hoc censu non reposuit. Hæ fuerūt chartarum differētiæ dum vixit Augustus, mutata postea à Claudio. Nim iam enim Augustæ tenuitas tolerādis non sufficiebat calamis, quo minùs pertunderent ac perforarēt, & transmittens literas, id est, literarum atramētum, lituræ metum afferebat auersis. Sic enim legēdum ex vetusto codice. Nam aduersa charta est exterior, & oculis nostris obiecta, quam scribētes intuemur, in qua calamus properat. Auerſa posterior, & à tergo posita. Litura verò effusi sparsiq; atramēti in bibula charta est macula, ei similis quam penna scripturam delētes inducimus. Apparet certè ea magis in auersa chartæ facie, illuc subeunte atramēto, ut cum aduersa iam aliquid scriptum est, in auersa maculis nigris fœdata præterea nihil pingi queat. Igitur & secundo corio statumina facta sunt, è primo subtegmine. Vetus codex habet, Igitur & secundo corio stamina facta sunt, ut primo subtegmina, sensu nihil discrepante, etiā si statumina legamus. Stamen id est quod colo obuolutum mulieres nent. Est & in textrinis filum telæ directum, intra quod subtegmē siue trama currit trāsuersim. Statumen verò ridica siue palus quo vitis fulcitur. Auctoris ergo sensus est. In charta Claudij sicut primo corio è rectis philuris cōfecto additum est secundum velut subtegmē siue trama ex schedis trāsuersis textum, sic huic impacta pro tertio corio siue stamina siue statumina sursum è rectis philuris composita, velut in primo corio. Auxit & latitudinem. Pedalis erat mēſura, & cubitalis macrocolis. Sed ratio deprehēdit vitium, vnius schedæ reuulsiōe ampliores infestāte paginas. Sic vetustus codex. Macrocola ἀπὸ τῶν μακρῶν κολλῶν dicta putat Guilandinus, Dalechampius ἀπὸ τῶν μακρῶν κώλων, à longis velut artubus, & mēbris. Mensura pedalis & cubitalis, id est, sesquicubitalis harum chartarum an in lōgitudinem an in latitudinem exporrigeretur, Plinius non statuit: in latitudinem potiùs existimat Dalechampius, de latitudine enim hīc agitur: & scapi Papyri, vnde schedæ distrahebantur, nota est lōgitudō ex superioribus, circiter quatuor pedum, quæ ad pedis vel cubiti mēsuram contrahi nō potuit: quamuis μακροκώλη nomē longitudinem potiùs indicet quàm latitudinem. Cum autem vnius schedæ reuulsiōe ampliores vel plures infestari paginas dixit, docet nos plagulas chartæ cōfectæ, siccatæ, malleatæ, læuigatæ plicari solitas in paginas, ut sit & in nostris linteis, quæ quo complures essent, magis scriptura conturbaretur ac læderetur, si quis vnā philuram vel improbitate ac malitia, vel corruptam ac vitiosam exemisset. Augustam epistolis laudatam testatur Martialis, salutatricēque vocat.

Lib. 9.

*Marcus amat nostras Antonius Attice musas,*

*Charta salutatrix si modò vera refert.*

Ex his pro æstimationis ac pretij ordine, & latitudinis varietate, quoniam parferè esset omnium longitudo, chartas numerare, & in suis classibus recēdere possumus. Augusti tempore Macrocolas primas, pedem aut sesquipedem latas, Augustam & Liuiā optimas, digitos tredecim, Hieraticam vndecim, Fannianā decem, Amphitheatricam nouem, Saiticam, & quam omisit auctor Taniticam pauciores, nempe septē vel octo, Emporeticā sex: quas omnes anteiuit & bonitate & dignatione Claudia, principatu Claudij texta, ex duobus staminibus siue statuminibus, & interiecto vno subtegmine optimis, nempe Augusta & Liuiā aliquāto latior, ut suspicari licet, ad digitos quatuordecim vel quindecim. Ex his cuius perspicuū esse potest, Guilandinum non rectè affirmasse Augustam & Liuiā, Hieraticam eandē esse chartam. Hīc nō sunt omittēda chartarum vitia quatuor, quæ auctor



auctor ponit, scabritiam, rebellem cōtumaciam, lentiginem, tēniam vnā vel plures. Scabritia, inquit, lanigatur dēte, &c. Id est, Scabritia remediū est dente vel concha politura, moderatione tamē adhibita, ne vehemētius atteratur. Nam quamuis ex cōplanatione & erugatione splēdeat magis, fulgenteq; nitore oculis placeat, validiore tamē attritu nō forbet atramētum sed respuit, & si quæ literæ appictæ sint, instabilis & fugax est scriptura, nec permanet. Alterum vitium est rebellio. Rebellat humor incuriosē datus, cūm artificis operæ & studio reluctatur pertinaciū, nec omne corij spatiū ex aequo rigat & oblinat, sed alicubi subsistit copiosior, alicubi parcius affunditur, vnde plagarum fit inæqualis & superficies, & resiccatio. Nam cūm probē curatam, subactam, tractatamq; chartam esse putat artifex, neq; quicquā aliud operæ suæ præterea desiderare, tum cōtra eius spem vitium id detegitur, & tanquā recrudescit, quod eius diligētiæ negotiū faciat. Itaq; retexēda charta, & eodē labore domanda, atq; peruincēda quo prius. Malleo deprehēditur id vitium, aut quod percussam laceret, aut quod eminentiora tubera, depressioresq; lacunas plagarum inæquali percussu tundat, & inuenusta deformitate tulas ostendat. Prodit eam labē etiā odor, charta præsertim negligētiū prælo cōpressa & siccata, mucidus fœtidusq; putrescente ac situm olente humore, qui nec prælo est elisus, nec in solatu dissipatus. Deprehēditur & lentigo oculis, &c. Lentiginē in charta Plinius appellat naxos, sordes, decolores punctorum notas, & maculosas velut aspergines, quæ fiebāt dum cōpingerētur coria, si quid illaberetur impurius, quod

PAPYRVS *Aegyptia,*  
*Pena.*




natiū colorem inquinaret, aut si quid in schedis cōtortum & conglobatum chartam infusaret. Oculis id cognoscebatur, vel conspecta statim charta, si macula in aperto forēt, vel ad solem explicata, si altius insiderēt (Sed inserta mediis glutinamentis tēnia.) Quartum ac postremum vitium est tēnia, non, vt Guilandinus arbitratur, philura vel scheda, sed oblongus & angustus in plagulis ductus, nullo glutine, aut pingui humore litus & opertus, in quo sola Papyri fungosa & bibula raritas absque villo tectorio calamis scribētium occurrit, & literam siue atramēti picturam dum haurit diffundit. Quod nec ictu mallei, nec oculorū conspectu exploratum sed scriptura tantum, tum picta litera liquecēs vtraq; parte cōbibitur, & tam aduersam quā aduersam partem inquinat. Hæc de Papyro & veterum chartis ex Plinio & Dalechampij observationibus studioso lectori fortasse nō iniucunda exponere voluimus. Papyrus Niloticam siue Aegyptiam ex Aegypto delatam, & qualē describunt Theophrastus & Plinius, Pena in horto Pisano florentem se legisse ait, quam Cypero cōgenerem facit & similitimā, verū elegantiorē multo, iuncea, arundinaceo vetriquetra caule, medulla farcto tomēticia, stipitibus multis, proceris, lanibus, nitidis surrectis, senū, interdum septenū cubitorum altitudine, quibus ad imum tantū folia insunt Cyperi aut Sparganii repanda, radicibus arundinaceis, fibrosis, floribus valde speciosis, luculentam in ambitu cæsariem referentibus, numerosis gracilibus thyrsulis, dēso & æquali comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferulæ in modum collectis, nō vt in Cypero sparsis, quos circa ortum ambiunt radiatim foliola



foliola multo minora illis quæ sunt ad imū, vt in Cypero. Quare veri simile est, inquit Pena, hanc veram esse Theophrasti Papyrū, cuius descriptio apud Plinū neq; mutila, neq; ex duabus diuersi generis cōfusa, nempe hac Ægyptia, & Babilonia, vt cetera Pena, sed eadē planē est quæ apud Theophrastum, vt supra citatos vtriusq; locos cōferenti facili innotescet. Præterea cū scribit Pena Plinū vsum tum funium tum chartæ obscuri ius tradētem his verbis, Texuntur omnes tabula madere Nili aqua, quod de funibus quis fortē interpretetur, inquit: & mox, Turbidus liquor vim glutini præbet, &c. cū scribit, inquam, medulla gluten in chartas duci solitum innuere videri. Ad hæc cū antē dixerit caulis medullam tomentitiam tūsam, glutinifq; in speciem subactam, ductam olim fuisse in bractæas Papyraceas, quæ mutuo sibi appressæ folia crassiora cōstabant, scribendo apta, quemadmodū etiam sit ex laciniis linei panni cōtusi, & in candidum redacti, neq; chartarum præscarum, neq; nostrarum conficiendarum rationem intellexisse videtur. Neq; enim medulla vlla Papyri in laminas ducebatur, quæ mutuo appressæ folia cōticerent, sed scapi Papyri phidura super tabula exporrigebantur rectæ & transversæ, ex quibus plagule & charta fieret, vt prolixè & dilucidè ex Plinio declarauimus. Neque panni linei in gluten rediguntur, vnde charta nostræ fiant, sed ex lineis pannis tritis & aqua dissolutis folia compinguntur, quæ postea glutine accepto solidescunt.

*Vires.* Nunc de medico Papyri apud veteres vsum dicamus. Ad aperiendas fistulas, inquit *Lib. 8. c. 8.* Dioscorides, madefacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatus, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Cremata Papyri cinis nomas cū omnium partium, tum oris maximè cohibet: verū id melius combusta charta præstat. Quæ verò addit de radice Ægyptiis alimenti non nihil suppeditante, id iam refutauimus. Galenus de eadem ita scriptum relinquit. Papyrus ipsa quidē per se in vsum medicinæ non venit, at macerata aut vsta utilis efficitur. Igitur oxycrato vinōve macerata recetia vulnera glutinat, maximè in circulum circumposita. At vsta medicamentum est exsicicans, velut & chartæ combustæ cinis, nisi quia infirmior est quàm Papyrus. Plinius, cognata in Ægypto res est Arundini Papyrus, præcipuè utilitatis cū inaruit (Dioscorides prius madefacit, & imbuit, mox circumdato ligno constringit, quoad cludendas fistulas tantum dixit Dioscorides) & intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas. Charta quæ sit ex ea, cremata inter caustica est. Cinis eius ex vino potus somnum facit (de ea re nihil planè Dioscorides) ipsa ex aqua imposita callum sanat.

## IVNCVS ODORATVS. CAP. CXXIIII.

*Nomina*  XOINOS & οχίνος ἀρωματὶς Græcis, Latinis Iuncus odoratus, Cornelio Celsō Iuncus rotūdus, vt distinguat à Iunco vulgari & Cypero, Iunco triangulati. Officinis Squinanthum, dielione ex οχίνος & ἀρωματὶς, id est, ex Iunci flore deprauata, quo Schoenanthi nomine olim vocabatur a multis temporibus Galeni à præstantia roseæque fragrantia, Serapioni Adher, non Adcher, vt in excusis codicibus legitur, Anicennæ Adhar, non Adchar, Hispanis *Paya de la Mequa*, siue *Paya de Camellia*, Gallis *Pasture de chameaux*. Dioscorides locos natales, & præstantioris notas potius, quàm totam eius figuram descripsit his ferè verbis.

*Locus.* Iuncus odoratus in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonicum cognominant, alij reuchin: pellimus ex Africa. Ligendus est rufus, recens, floribus rebus, tenuis, purpurascens, fistilis, qui manibus confricando rose odorem emittit, ignem mordacitatis ad linguam. Breuius hæc Plinius dixit. Ob id & odorati Iunci medicina quoniam

*Præstantia*

*Lib. 21. cap.*



quoniam & in Syria Cœle ( vt sue loco retulimus) nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa, cognomine teuchites, proximus Babylonius, pessimus ex Africa, ac sine odore. Est autem rotundus, vinosæ mordacitatis ad linguam. Syncerus in conficando odorem rosæ emittit, rubentibus fragmentis. Quæ si cum Dioscoride conferas, quedam manca, alia perperam notata perspicies. Neque enim ex Dioscoride Iuncus ex Nabathæa teuchites cognominatur, sed Babylonius. Quare sic Plinij locus explendus videtur. Laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin, pessimus, &c. Est autem *τέχος, ἀγγέλον*, vas, vnde *τέχης χόινος*, quod vasis afferretur. Neque vinosam mordacitatem Iuncus huic inesse ait Dioscorides, sed linguam mordere *μὲν πολλῆς πυρώσεως*, id est, cum multo fernore: neque rubentia fragmenta, sed *χρῆματι ἐμπόρῳ*, id est, fissilem & purpurascentem. Quod uterque de rosæ odore dixit, id negat Garcias: nam tritum quidem ait iucundum odorem spirare, sed non rosæ: annotatque Dioscoridem in his aromatis sæpe incertis comparationibus uti. Auicenna duo Iunci genera statuit, vnum Arabicum, & boni odoris, alterum in Agiami natum, quo vocabulo Damascum ait intelligi Garcias. Alij Iuncum Agiami accipiunt Iuncum vulgarem, de quo Dioscorides lib. 4. vt eo capite Auicenna duo capita Dioscoridis commisceat, vnum de Iuncus odorato, alterum de Iuncus vulgari, qui locis humidis nascitur: nam Agiami exponit Bellunensis natum in loco humido & palustri. Illud verò æquè absurdum quod subicit ex Dioscoridis auctoritate, Iuncum odoratum duarum esse specierum, quarum vna est quæ non habet fructum, altera quæ fructum habet nigrum: neque enim Dioscorides ita distinxit, neque fructus Iunci odorati vliam meminit. Serapio ex Abobanisa tradit Iuncum odoratum radicem habere similem Chulem, latiore tamen, cum minoribus tuberibus, ramulos tenues, qui fructum ferunt similem floribus Arundinis, sed gratiorem & minorem. Quid autem Serapioni sit Chulem nescio, nisi fortasse sit gramen, aut herba vulgaris Græcis *ωβὴ* dicta. Pandectarius

Lib. 2. cap.

591.

Cap. 42.

Cap. 158.

*IUNCUS odoratus,*  
*Marthuli.*



*SCHOENANTHI flores,*  
*Lobellij.*



Vocat



In cap. 16.  
l. b. 1.

Forma.

Lib. 1. c. 34.

Locus.

Lib. 1. c. 34.

Nomina

Lib. 1. Anti.

vocat Chulem herbam capillarem. Recētiore accuriatius & magis signatē Schœnanthi speciem expresserunt. Matthiolus, qui se arculam florum Schœnanthi plenam habere ait, folia ei Caricis vel Zeæ tribuit, robustiora tamē, sursum spectantia, ex quibus culmi genticulati, & in horum summitate flores exeunt odorati. Radix subest ima parte villosa odoratāque, sed odor tempore perit. Clusius in scholiis in Garcia historiam refert natas sibi fuisse lunci odorati plantas ex semine Italia misso. Is teneris multis culmis assurgit, tenerioribus foliis quā Gramen, siue *roz*, quam plurimū refert, linguam mordicantibus iucunda & aromatica quadam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant odorem, sed in quo Rosæ odor non appareat: nam manducata potius Rosæ præsertim saccharo conditæ odorem æmulari videtur. Nullum protulit florem, quod seriū prouenerit. Radix fuit numerosa, capillacea, non, vt dixit Serapio, nodosa, gustu feruido & aromatico. Tandem frigoribus perit, vt annua planta esse videatur. Eius iconem ex eodem Clusio hīc proponimus, cui addidit Lobellius flores spicatum ē glumis secundum caulem Lilij ritu hærentes, quos etiam hīc appinximus. Nascitur in Mazcate & Calaiate Arabiae prouinciis maxima copia Garcia teste, non aliter quā Gramen vulgare in Hispania, quo pascuntur animalia. Ab incolis vocatur *Sachbar*, à nonnullis *Haxis cachule*, id est, herba lotoria, siue lotionibus idonea. Aliis etiam nominibus Arabes Schœnanthum nuncupant, vt Auicenna Adhar, Serapio Adher, vt diximus, quos sequuntur Arabici omnes & Persici Medici. Florem verò vocant Foca, Persæ qui ad supradictas vsque prouincias pertingunt, Alaf, quod herbam significat. Apud Indos Herba Mazcatensis appellatur. Sunt qui Paleam de Mequa vocant, alij Pastum camelorum, nec immeritò. Non sunt tamen istic adeò frequentes cameli, vt totum gramen cum floribus depascantur. Sunt enim etiam asini, muli, equi, boues, capræ & oues, quæ nullum aliud pabulum norunt, quā hunc luncum. Quare non temere scribit Galenus nescire se quomodo Schœni anthos, id est, lunci odorati florem vocent, cum floris copiam non admodum suppedit. Nam etsi tota adferatur herba, sunt tamen eius superiores partes à camelis sæpe depastæ: vescuntur enim ea, & delectantur maximè, non quòd tantus sit illic camelorum summitates depascentium numerus, vt nullus vnquam flos nobis compareat, sed quòd trunca sæpe adferretur herba, nempe radix, folium, caulis, flores autem ferè nulli, quemadmodum hodie videas in emporiis magnam plantæ copiam, flores autem per paucos, tum quia plurimæ illic animantes iis vt cæteris graminibus vescendo summitates absumunt, tum quia flores papposi tenuésque facillè dilabuntur. Huic florum paucitati accedit institorum negligentia, qui nullos adferunt, medicis hos non postulantibus, quòd eorum vsus desierit. Defertur quidem in Indiam in medicum vsum vsurpandus. Maxima tamen copia in fasciculos colligatos nauibus inferunt equarij mercatores, vt equis substernant, ne stercoris & vrinæ pædore offendantur: nam simul atque maduerit in mare abiiciunt, & recentem substernunt. Refert idem fasciculos aliquot secum aduehere solent, quos in India vendunt. Refert idem Garcias se in insula Dio vili emississe multos lunci fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aromatibus mitteret, nullum tamen florem se vidisse. Sed nec ab incolis in pretio habebatur, nec eius vllus apud eos vsus nisi in lotionibus: eo enim se & iumenta sua lauant. Arabes verò & Persæ Medici ad medicamenta duntaxat vsurpant. Schœnanthum nostrum ex Alexandria Ægypti ad nos aduehitur, eò importatum ex locis antedictis. Sed in eo deligendo diligentia magna est adhibenda: id enim palearum quarundam & herbarum festucis impostores adulterant. Ad hæc ne vetustate vires amiserit diligenter expendendum. Hæc enim vitia multis persuaserunt Schœnanthum Officinarum spurium & illegitimum esse. Sed falsum



luntur illi, quoniam tum descriptio, tum vires perspicue eos refutant. Nam quod radices primum medico vsui conuenientes illi non inesse contendunt, sed capillorum modo tenues, deinde paleas ipsas nullam gustantibus acrimoniam relinquere, postremo Schœnanthum vulgare Iuncum non proferre, sed calamos geniculatos Tritici vel Hordei modo, in iis vehemēter errant: siue enim tenues sint radices, siue crassæ, nihil ad historiam attinet, modò iis viribus præditæ sint quæ eis tribuuntur, quibus idè destitutæ non sunt quòd sint capillacæ, nam Dioscorides eas non descripsit. Quod Schœnanthum nostrum acrimonia careat, id falsum est: id enim quod vetustate euandum & exoletum non fuerit, linguam mansu vellicat. Quod Iuncum ferat, non calamos quos ferre debeat, aperte Dioscoridi refragatur, scribenti: *χρῆσις δὲ τῶ ἀνθρώπου, καὶ τῶν καλῶν, καὶ τῶν βίβης*, id est, vsus est floris, calamorum, & radice. Illud verò absurdissimum, Galangam Iunci odorati radicem esse, cum Galanga auctore Garcia in China nascatur, quæ bis mille leucis ab Arabia distat, & plurimum à Iunco odorato differt tum foliis, tum radice, nec nisi sata proueniat, Iuncus autem sponte nascatur, nec feratur. Alij aliis rationibus nostrum Schœnanthum vt adulterinum improbat. Primum quòd caulem Cyperi non habeat, vt Dioscorides in Cypero testatur: deinde quòd radices nostro Phu similes non sint: præterea quòd antiquis florum, caulis, radicum vsus tantum fuerit, non foliorum, quibus hodie tantum vtuntur: adhuc quòd in nostro Schœnanthi tum caule tum radice nullus prorsus calor percipitur, nec sapor, sed in foliis quibus Dioscorides non vtitur. Quæ facillè refelluntur. Dioscorides enim Cyperi caulem nulla adiectione dixit esse *ῥιζὸν χοίνω*, id est, similem esse Iunco, vulgari scilicet. Quare Ruellius perperam caulem Iunci odorati vertit. Cum enim Dioscorides Schœnantho calamus tribuat, Cyperi autem caulis calamus non sit, nec rotundus, nec geniculatus calami instar, sed angulosus, vt ad huius discrimen Iuncus ille odoratus rotundus cognominatus sit à veteribus, quoniam pacto Dioscorides capite de Cypero ei Iunci odorati rotunditatem assignasset? Idem nuspiam Phu radicem Schœnantho similem dixit: sic enim capite de Phu, *ρίζα δὲ ἡ μὲν ἀνωτέρα πρὸς δακτύλῳ μικρὸ τὸ πᾶχος, πλάγια δὲ ἐπιρρίζα* Lib. i. c. 10. *ἔχει καὶ ἀπὸ τοῦ χοίνω, ἡ μέλας ἰσχυρὸς*. Id est, radix Phu superior digiti parui crassitudinem æquat, ex obliquo fibras seu radículas habens Iunci & Ellebori nigri modo. Hic fibras radice Phu fibras radice Iunci simpliciter comparat, vt hic quoque Ruellius malè Iunci odorati verterit. Quod autem Schœnanthi nostri caules & radices minimè in medicina vsurpentur, sed folia duntaxat, nò euenit, quòd partes illæ sapore, odore, viribusque careant, (sunt enim omnes odoratæ & efficaces) sed quia post Dioscoridis tēpora incuria Medicorum ita inualuerit vsus, proculdubio reuocandus, vniuersæque planta vtendum in posterum, quod testatur Galenus his verbis. Ego quidem mihi testis esse possum, habere me nunc ad manus aliquot Iunci odorati plantas, quarum calami ac radices non minùs sunt acres quàm folia. Quare qui Schœnanthi nostri natales ac facultates diligentius examinauerit, id ex Arabia in Alexandriam, inde ad nos importari ex negotiatoribus certò intelliget, ac legitimi facultatibus præditum esse testabuntur Medici omnes, qui id sæpe in medicamenta vsurparunt. Eas autem facultates Dioscorides ita declarat. Iunci odorati floris, calamorum, radice est vsus. Vim vrinæ ciendæ habet, menses pellit, inflationes discutit, caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit, concoquit, & venarum spiracula aperit: flos eius in potu utilis est sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris & renum. Miscectur antidotis. Radix adstringentior est: idè fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis drachma vna cum pari pondere Piperis per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium foras vrile est. Plinius aliter de iis Lib. 21. c. 8.



scripsit. Discutit inflationes, ob id stomacho utilis, bilémque & sanguinem reiicientibus. Singultus se dat, ructus mouet, urinam ciet, vesica medetur. Ad muliebres vsus decoquitur, opisthotonicis cum resina arida imponitur. Dioscorides florem dantaxar stomacho vilem esse dixit, & sanguinem tantum reiicientibus. Quod Plinius ad muliebres vsus decoqui, ille decoctum ad inflammationes vuluarum feminis insidentibus utile. Vterque urinam ciet. Reliqua, quæ Plinius habet, Dioscorides prætermisit. Galenus de iisdem hæc prodidit. Schæni anthos modicè callacit, modicè etiam adstringit, nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quare urinam mouet, mensesque ciet, adhibitum siue in forum, siue in potionem. Prodest & stomachi, & fecoris, & ventris inflammationibus. Magis adstringit radix. Flos calidus est. Porro in omnibus sui partibus, in aliis magis, in aliis minus gustantibus apparet adstrictio. Quare hæmoptoicorum medicinis admiscetur. Hæc Galenus. Et si in Officinis verus odoratus fuscus reperiatur, tamè odor & sapor adeò euauerunt, viridesque tempore ita imbecilles factæ sunt, vt putent nonnulli hunc non aliam esse plantam, inquit Pena, quàm quæ passim in Adriaticis frequens, & nonnunquam in mediterraneis, litoribus, & sabuleis occurrit, planè specie, magnitudine, culmòque concolori similem luncum odorato: meminisseque ille hanc sibi obtrusam à pharmacopœis Venetiis & Monspelij, qui affirmarent veri esse congenerem. Verùm ab illius præstantia longius abest, quàm Campana vulgaris à Calamo aromatico deinde folus est gramineis, & longè dissimilem florem profert. Conicere possit quispiam luncum esse odoratum, quem in Campania inuentum memorat Plinius.

Lib. 8. sim.

Maximus  
Iuncus gra-  
mineus fo-  
lis Schæ-  
nanthi.

## CALAMVS AROMATICVS. CAP. CXXV.

Nomina

Lib. 1. c. 17.

Cap. 269.  
Simpl.

Lib. 1. c. 17.

CALAMVS aromaticus,  
Matth. 21.

Vide Symp. pag.  
39.

Lib. 1. c. 22.



ΚΑΛΑΜΟΣ ἀρωματικὸς, Latine Calamus aromaticus, potius quàm odoratus. Auicenna & ceteri Arabes omnes Callab & Aldirira vocant. Callab enim Calamus est, Aldirira ex aromaribus. Dirire enim idem quod aroma. Serapio corrupto vocabulo Haisabel derire. De hoc Dioscorides sic breuiter. Calamus aromaticus in India nascitur. Melior est fuluus densè geniculatus, & qui in assulas multas frangitur plena araneorum fistula, albicans, viscidus in mandendo, & alstringens cum aliquà acrimonia. Et Plinius, Calamus, inquit, in Arabia nascens, communis Indis atque Syriæ est: in qua vincit omnes, à nostro mari centum quinquaginta stadiis. Inter Libanum montem, aliumque ignobilem, non (vt quidam existimauere) Antilibanum in conualle modica iuxta lacum cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus & Iuncus odorati gignuntur. Nihil ergo à ceteris sui generis differunt aspectu. Sed Calamus præstantior odore statim è longinquo inuitat, mollior tactu, meliòrque qui minus fragilis, & qui assulose potius quàm Raphani modo frangitur. Inest fistula araneum, quod vocant florem (aliàs, araneus, quem vocant florem.) Præstantior cui numerolus (aliàs, numerosior.) Reliqua probatio, vt niger sit (Dioscoridi κίρρος, id est, fuluus.) Damnatur aliubi (quidam legunt, alius.) Melior quo breuior & crassior,



crassior, lentiusque in frangendo Quæ ferè ex Theophrasto Plinius transcripsit. Lib. 9. hist. cap. 7.  
 Sic enim ille. Calamus & Iuncus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum  
 & alium quendam montem paruum (ignobilem Plinius dixit) in conualle parua,  
 non, ut quidam dixerent, inter Libanum & Antilibanum. Etenim inter hos campus  
 est amplius & pulcher, quem Aulonem vocant. Vbi verò Calamus & Iuncus pro-  
 ueniunt, lacus magnus est, iuxta quem palustribus siccatis isti enascuntur. Occupant  
 locum triginta stadiis ampliorem. Virides nequaquam esse videntur, (Sic legit Ga-  
 za, ut & vulgata exemplaria, & *δοκῶσι δὲ χλωροί*: Guilandinus legit, *ἐκ δ' ὧσι δὲ*  
*χλωροί*, id est, virides inodori sunt) sed siccati facie nihil ab aliis differunt. Locum  
 ingredienti protinus odor sentitur, non tamen longius expirat, ut quidam refe-  
 runt. Sequitur in Græco, *ταῖς προσφερομένοις εἶναι πρὸς τὴν χώραν*: quæ omisit Gaza &  
 reuera deprauata sunt, ac sic restituenda. *ταῖς προσφερομένοις ναυσὶν πρὸς τὴν χώραν*, id  
 est, à nauibus quæ eò cursum tenent sentiri. Hic enim locus à mari pluribus quàm  
 centum quinquaginta stadiis abest. Sed Arabiæ regionis afflatum odoratum esse  
 aiunt. Hæc Theophrastus, qui quæ de loco illo narrat, ex aliorum sermonibus &  
 fide narrat. Is campus est, auctore Guilandino, vallis quem interfecat Iordanus.  
 Lacus verò Genesareticus, D. Matthæo mare Galilee, D. Ioanni mare Tyberiadis.  
 Serapio & Auicenna magnam partem eorum, quæ de calamo tradiderunt, ex  
 Græcis describere. Quæ omnia quia graphicè Calami aromatici partes omnes  
 non depingunt, dubitandi occasionem præbuerunt, num radices, quæ passim in  
 Officinis prostant hoc nomine, pro legitimo Calamo habendæ sint. Brasauolus has  
 pro vero calamo habet. Fuchsius easdem veri Calami aromatici radices esse putat.  
 At plures, iisq; rei herbariæ peritissimi, has vulgares radices Acori veri radices esse  
 statuerunt, & perperam in Officinis pro Calamo usurpatas fuisse. Qui non solum  
 odore, ceterisq; facultatibus, sed etiam natura & tota effigie ab Acoro dissidet. Pri-  
 mum quæ Calami feruntur esse radices, Iridi persimiles sunt, geniculatæ, reflexæ,  
 subalbida, acres, odore præstantes, & ut ait Galen. etiam subamara. Deinde folia  
 quæ nonnunquam cum planta ipsa adferuntur, planè sunt Iridis. Quæ omnia Aco-  
 rum planè referunt, quale Dioscorides depinxit. At Calamus verus eodem auctore  
 re fuluus est: assulatim frangitur, tubum arundinaceum seu fistulam habet araneo-  
 rum plenam, lentus est in mandendo, adstringens & subacris. Ad hæc ex Arundinũ  
 est genere Theophrasto & Plinio testibus, id quod etiam ipsum nomen demon-  
 strat, atque etiam ipsius caulem seu arundinem non radicem in medicum vsum  
 assumi. Sed vulgaris Calami radix, quæ Acori esse probauimus, neq; assulatim fran-  
 gitur, sed transuersim Iridis, vel Raphani modo, neq; fistulam seu arundinem fert,  
 sed caulem Iridis, graciliorem tamen, & longiorẽ, neq; adstringit, neque subacris  
 est, sed planè acris, neq; amaritudine caret auctore Galeno, quæ Calamo vero de-  
 est. Garcias Calamum aromaticum quo Officinæ in Lusitania videntur, eundẽ esse  
 asserit cum eo qui in India magno est vsui tum viris, tum mulieribus, & iumentis. Lib. 1. Aro. Ind. cap. 32.  
 In Guzarate vocari ait *Vas*, in Decan *Bache*, in Malabar *Vazabu*, in Malayo *Dirim*  
*guo*, in Persia *Heger*. Seritur, inquit, per vniuersam Indiam, plurimus verò in Guza-  
 rate, & Balagnate, Goæ etiam, ubi multus est eius vsus, in hortis satus prouenit, sed  
 perpaucus. Sciscitatus est Garcias à multis Coracone incolis & Arabib⁹, num apud  
 eos nasceretur Calamus: item an esset eis cognitus, eoq; vteretur. Negarunt omnes  
 apud se inueniri, nisi ab Indis aduectum, probeq; sibi cognitũ, utpote cuius apud  
 eos plurimus esset vsus. Non falli tamen eos ait qui Arabicum vocant. Nam ex  
 India in Arabiam defertur, & inde in alias regiones, neq; qui Alexandrinum ap-  
 pellant, quoniam hinc Alexandria, deinde Barut & Tripolim Syriæ defertur. Is ve-  
 rò quo se in India vti Garcias ait, radix non est (pusilla enim est eius radix) sed ip-  
 sius Calami cum aliquatula interdum radice parte fragmentũ. Ex iis perspicuum



est, Calamum, cuius meminit Garcias, longè alium esse à Calamo Officinarum nostrarum, quin potius eius Calamum legitimum videri à veteribus descriptum. Quare quāplurimi in ea perseverant sententia, Calamum nostrum vulgarem Acori esse radices, nosq; legitimo Calamo carere. Quem si quis nactus sit, sciat has eius vires ex Dioscoride. Calamus aromaticus urinā potu ciet: quare cū Graminis aut Apij semine coctus & potus, utilis est hydropicis, nephriticis, stillicidio urinæ, ruptisq; Menses & potu & appositu pellit: tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina hausto per arūdinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffusionibus, malagmatifq; odoris gratia cōmiscetur. Ex Galeno. Calamus leuiculam quādam adstrictionem, ac minimam acrimoniam habet. Magna ex parte essentia eius terrena est & ærea, in frigiditatis caliditatifq; cōiugatione temperata. Quamobrem moderatè urinam mouet, & facultatibus, quæ icori & stomacho imponuntur, misceri potest. Tum in fomenta quoque vteri, quæ phlegmone gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, admiscetur. Habeatur igitur secundum ordinis eorum quæ exalfaciunt & desiccant, valentiùs tamen desiccant quàm ex calfaciant. Inest quoque ei quādam partium tenuitas.

## ZINGIBER. CAP. CXXVI.

Nomina

Lib. 2. c. 154.



RACIS voce barbara *ζινγίβερ*, & *ζινγίβερ*, & *ζινγίβερ* dicitur, Latinis Zingiber & Gingiber, Arabibus *Zingibel*, Italis *Gengeuo*, Germanis *Ingher*, Hispanis *Gingivre*, Gallis *Gingenure*. Dioscorides vsum potius quàm plantæ speciem expressit his verbis. Gingiber sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens, qua virente ad multa perinde atq; nos Ruta vritur, & in primis potibus & eduliis admiscet. Huius radices Cyperi modo parvæ sunt, candicantes & odoratæ, atq; Piper sapore imitatur. Eligi debent quæ teredinem nō senserunt. A multis tamen ob id cōdiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Breuiùs etiam Plinius de Pipere scribens. Nō est, inquit, huius arboris radix, ut aliqui existimauere, quod vocat Zimpiberi, alij verò Zingiberi, quāquā sapore simile. Id enim in Arabia atq; Troglodytica in villis nascitur, parvæ herbæ radice candida. Celeriter ea cariem sentit, quāvis in tanta amaritudine. Dioscorides omis-  
sa reliqua delineatione, radículas tantum memorat ut Cyperi, cui tamen admodum similes nō sunt, & maiores, nec pendulæ Cyperidis ritu. Plinius dixit tantum parvæ herbæ radicem esse candidam. Quare ampliorem eius descriptionem ex Garcia & aliis hic ponemus. Zingiber, ut docet Garcias, appellatur Arabibus, Persis, & Turcis, *Gingibil*, non *Lengibel*, ut corruptè legimus in Serapione: in Guzarate, Decan, Bengala cū adhuc recens est & viride, *Adrai*, ficcātū verò *Sucte*, in Malabar tam viride quā ficcū, *Imgi*, in Malayo, *Aliaa*. Est autē Zingiber foliis Iridi aquaticæ aut Gladiolo (nō Arundini) similibus, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmorum altitudine, radice etiam Iridis, multò minore quā Cyperi, nō serpente, ut volunt quidam, nec admodum acri, præsertim eius quod in Bacaim natum

Lib. 12. c. 7.

## ZINGIBER, Pena.

Lib. 1. Aro.  
Ind. c. 41.

Nomina

Cap. 326.  
simpl.

Forma.





natum est, ob nimiam quæ in ea exuperat humiditatem. Ludouicus de Barthema scribit erui radicem quatuor, & octo, & duodecim vnciarum pondo, neque enim omnibus eadem est amplitudo: caulem trium, aut quatuor palmorum longitudine: cum eruitur Zingiber, relinqui internodium in scrobe, terræque operiri, seu semen eius radicis proximo anno producturæ alium fructum, id est, Zingiber. Et Antonius Pigafetta narrat in insula Thidore nasci Zingiber, idq; recens edi panis modo, quod recens acre non sit veluti est siccum. Arborem non esse, sed paruum plantam, quæ caules ferat palmum altos, Arundini similes, folia item similia, sed angustiora & breviora, quorum nullus vsus, sed radicis tantum quæ est Zingiber. Nascitur id in omnibus Indiæ prouinciis cognitis, semine aut radice satum. Nam quod sponte nascitur, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum est Maluaricum, Arabibus & Persis maximè expetitur. Secundum locum obtinet, quod in Bengala crescit. Tertium, quod in Dabul, & Bacain, totæque ea ora maritima. In solitudinibus & mediterraneis vix inuenitur, neque inde ad nos adfertur. Prouenit etiam in insulis D. Laurentij, & Comaro, quæ Æthiopix sunt conterminæ. Vnde sumpta occasione dixere nonnulli apud Æthiopes & Arabas nasci. Galenus è Barbaria conuehi scripsit. Si per Barbariam Indiam intelligit, inquit Garcias, rectè quidem. At si per Barbariam eam Africæ partem, quæ hodie Barbaria nominatur, malè. Dioscor. in Troglodytica Arabia nasci tradidit. At apud Troglodytas quidem & Æthiopes nascitur, sed adeò exigua quantitate, ut vix incolis sufficiat, in Arabia verò minimè: nam ad Arabes ipsos importatur. Quod idem dixit Zingiber primis eduliis admisceri, id verum esse confirmat Garcias, quod idem hodie quoque apud Indos obseruetur. Hæc etiam radix minutim concisa, & aliis herbis admixta, in acetariis additur cum aceto, oleo & sale: ac etiam cum carnibus ac piscibus coquitur. Quare rectè Dioscorides dixit Zingiber cibo conueniens esse, & cum condimento assumi, excafactoriam vim habere, & concoquentem, aluum leniter mollire, stomacho utile esse, efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offundunt, in antidota addi. Quod autem aluum mollire ait, id intelligendum si recentes & teneræ adhuc radices edantur, multa adhuc in iis humiditate aluum molliente, & lubricante: nam vetustiores & exhausta humiditate siccæ aluum potius adstringunt. Galenus de iisdem hæc prodidit. Zingiberis radix utilis est, quam utique ex Barbaria ad nos conuehant. Excafacit potenter, sed non primo statim occurso velut Piper. Vnde sanè & minùs esse subtilium partium quam Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes, & celerrimè actu ut illud fieret calidum. Apparet enim adhuc illaboratam, & crassorem quandam ei inesse substantiam, nec eam siccam & terrestrem, sed humidam potius atque aqueam. Quo fit ut faciliè perforetur, cum scilicet excrementitia insit humiditas. Hæc Galenus. Succulentæ adhuc & recens conditæ radices ex Indiæ variis locis adferuntur maximè commendandæ, longè minùs verò hæc quas iam siccas, & vi emolliente exoletas, lixiuio maceratas saccharo condiunt Veneriis. Describit paulò aliter Christophorus Acosta Zingiber, qui in Novis orbis regionibus simplicium cognoscendorum studio peregrinatus, oculis multa & ipse subiecit, in quibus non rarè ei cum Garcia & aliis non satis conuenit. Planta hæc igitur est, ut is vult, ad trium quatuorve cubitorum altitudinem assurgens: folia habet quam similia foliis Lachrymæ Iob, seu Milij Solis: caulis crassitudine Asphodeli, quam & Hastulam regiam appellant. Tota foliorum quodam quasi congestu velut compacta est, ut humiles Arundines virides referre illam velledicas. Radices eadem ferè Lirij Cardeni siue Iridis radicibus. Frequentissima tota India Orientali nascitur, veluti in Bengala, Dabul, Becain. Fert & vniuersa prouincia Malabar, ubi eius longè est maximus prouentus. Zingiber quod boni-

Locus.

Electio.

Lib. 6. sim.

Lib. 2. c. 14.

Vires.

Temper.

Lib. 6. sim.

Zingiberis  
ex Acosta  
descriptio.

Forma.

Locus.



ZINGIBER, *Acosta.*

tate præstat, è semine vel radice, vti illi qui terræ mandant visum est, prouenit. Sed & pleiisque locis non solum, sponte nascitur, mediterraneis tamen rarum, maritimis copiosius. Toto anno viret. Id vt asserant, Decembri & Ianuario mensibus legunt, siccant, terræque pingui & argillaceæ operiunt, vt obturatis ea poris & foraminibus quibus id totum ocellatum est, difficilius corrumpatur: recentius enim ingesta humo perdurat, conseruatque quod habet humoris, atq; ita à teredinibus tutius defenditur. Eriamnum viride gustatum leniter adurit, minutq; quam cum siccum est mordicat: quoque vda magis & humecta sunt in quibus nascitur loca, eo minus retinet acrimonia, qua viceversa molestius est quo sicciora illa magisq; inopia aquarum sitientia. Primis mensis virens adhuc commendatur, & dapes vice acetarij inchoat. Neq; edendi modò causas affert, stomachum acut, verum etiam aluum sollicitat, eiusque idem profluvia ex cruditate orta sistit. Hæ radices saccharo condiuntur, bene

contusa prius, multisque aquis macerata & elota quo magis magisq; dulcescant. Quæ verò ex iis tempestiue lecta sunt, diligenter accurata, mundata, præparataq; antè quam saccharo incoquantur optimè sunt, gratiorisq; gustus, & cum maduntur, teneriores: vt quæ filamenta in ore relinquunt & amaricant, mala. Improbat idem Dioscoridis & Galeni sententiam de Zingiberis locis natalibus, quod & iam ex aliis antè notauimus. Neque magis illi assentitur, eius radices Cyperi modo paruas tradenti, cum planè, inquit, cum nostra icone conueniant. Neq; verò est, addit, quòd aut minoris faciat, aut reiiciat quisquam Zingiber quod terra obductum videat, quasi id eo consilio factum sit, vt prauis & carie corrupti vitia ea arte dissimulentur & obtegantur. Alia longè est eius ratio, quam vt vel hac de causa, vel quo inde aliquid ad pondus accedat, ita procurent: nempe ea quam iam retulimus, conseruandi gratia. Hæc quidem de Zingibere Acosta. Alia porro est radix Zingiberi cognata, quæ Zingiber fuscum & Mechinum Officinis dicitur. Id nò solum à Zingibere differt quòd eo immaturius sit aut improbius, vt etiam declarat Pena, sed potius specie & concretionem (caret enim fibris & filamentis) perspicuitate, fuscedine, soliditate & acriore gustu, nec teredine exedi solita. Id etiam conditur. Ex eo dem Pena pictam exhibemus raram Mechini speciem, & nuper adferri ceptam. Vulgatum Zingiber aut Mechinum refert, sed elegantiore aspectu, colore Mechini, cortice Zingiberis albi, sed squamato geniculato, & ferè articulatò veluti Doronicum, aspectu pellucido, gustu quam Zingiberis multò acriore & sicciore, carie non exeso.

## MECHINVM,

*Pena.*Mechinū  
rarius.

GALAN



**Q**UAE recentioribus Græcis γαλάνγα, vulgò etiam Galanga dicitur, veteribus incognita videtur fuisse, nisi Arabes, ut ait Pena, Galaticum Acorum, quod cæteris Dioscorides præfert, in Galange, siue Galangæ nomenclaturam deprauarint, ut qui fortè Galangam Acori speciem esse putarent. Arabes omnes *Calungiam* vocant. Quare Serapio & Mauritani omnes corruptè *Kalungen* & *Galungen* scribunt. Est autem Galanga duplex. Vna minor, odorata, quæ ex Chinæ regione in Indiam, inde in Lusitaniam defertur. Eam incolæ *Lauandon* appellant. Altera maior, crassior priore, ignauior tamen, & viribus infirmior. Nasçitur in Iaua, & ab incolis *Lancuaz* nominatur. Tamen in India *Lancuaz* vtraq; appellatur. Serapioni & Auicennæ, auctore Garcias, non satis perspecta fuit vtriusq; Galangæ historia. Nam Serapio nec maioris, nec minoris meminit, & ineptè describit. Est vena, inquit, in crassitudine Cæsiei lignæ, & cortex eius est ruber, & interius eius est puluerulentum. Auicenna diuersis capitibus de Galanga scripsit. Vno nomine *Calungiam*, dicitque frustra esse inuoluta rubra & nigra, quibus hæsitans subdit. *Mesangne* dicit esse *Casurudar* ipsum, de quo *Casurudar*, siue, ut Garcias vocat, *Caserhendar* alio capite dixerat, & *Galangam* ex *Mesangne* interpretatus est. Sed quo nomine *Galangam* minorem, siue *Chinensem*, quæ præstantior est, quo item maiorem *Iauanensem*, quæ ignobilior, intelligat, non exponit, cum tamen hæc ab illa non solum facultatibus, sed etiam forma differat, ut ex descriptionibus perspicuum fiet. *Galanga* maior binum ferè cubitorum altitudine attollitur, foliis mucronatis, cuspidis lanceæ modo, ut ait Garcias, vel, ut Pena, foliis Iridis aut Xyridis, nigricantibus, angustioribus tamè, flore candido, radice crassa, nodosa Arudinis modo, vel Acori palustris vulgaris, ut ait Pena,

Nomina

Vide Phytog. pag. 37.

Genera.

Li. 1. Arom.  
Ind. ca. 40.  
Cap. 332.  
simpl.

Li. 2. c. 314.

Li. 2. c. 192.

Forma.

GALANGA maior & minor, Pena.



Galanga maior.



Galanga minor.

ex fusco intus forisque rufescente. Minor duorum palmorum altitudine fruticat, foliis Myrti, ut ait Garcias, quibus à Galanga maiore plurimum dissidet, quam alioqui radice nodosa, & similiter colorata (nisi quod minor est) viribus, odore, sapore, colore & nomine proximè refert. Hæc aliis Cyperi species, aliis Acori videtur. At quamuis radices aspectu, duritie, odore, sapore, & nonnihil figura Cyperum longum repræsentent, certè folia, si Myrti sunt, ab utroq; illorum plurimum distant. Non defuere etiam qui *Galangam* Acorum Dioscoridis esse cõtenderunt. At diligens radicum inspectio & collatio faciliè ipsorum sententiam refellet. Nam Acori (quod verum ac genuinum nos habere demonstraui-mus) radix est albida, odora, amaricans etiam te-

ste Galeno, fractu facilis, colore & concretionem Iridi similis. *Galangæ* radix ex fusco intus forisque rufescit, frangenti est contumax. Præterea reclamant vires. Minor enim odorata est, sapore admodum acri, adeò ut mansa Piperis vel Zingiberis modo linguam & fauces vellicet, aromatico, minimè amaro: crassior viribus est imbecillior, colore etiam dilutiore, minùs odorata, adstringit, quæ vis Acoro non inest. Quare Iridi aduersus vuluarum vitia substitui non potest, quod tamen requirunt Dioscorides & Galenus. *Galanga* itaque calfacit & exsiccat ordine tertio. Ventericulum roborat, eius dolores vel à frigore, vel à flatibus ortos sedat. Naribus admota refrigerato cerebro utilis est: ore retecta anhelitum commendat.

Temper.  
& Vires.



Facit & ad cordis palpitationem. Coli dolores mulcet, si à flatibus proueniant. Prodest flatuosis vteri affectibus: venerem roborat, refrigeratos renes calfacit. Denique frigidis omnibus morbis aduersatur. Multò verò ineptior est eorum opinio, qui Galangam Schœnanthi radicem esse volunt. Nam Schœnanti radix inutilis est, Galanga vtilissima ad ea omnia quæ diximus. Adhæc Schœnanthū in Mazcare, Calaiate Arabiæ provinciis nascitur, Galanga in China & Iaua, siue Iaoa regionibus procul ab Arabia remotis. Age verò, quando vsibus humanis hoc medicamentū apprimè necessariū est, dignūmque vel eo quod pharmacopola in suis officinis perpetuò habeant, cum superiore descriptione nouam Acoſtæ etiam hîc conferre libet. Habet enim nonnulla quidem illis non dissimilia: sed multò consideratione digniora ea sunt, à quibus, nobis ex illorum auctoritate traditis, omnino dissentit. Indicta & iisdem quædam haud prætermittenda refert, quæ nos vnà cum ipsius quam vides Galangæ iconè eo libentiùs mutuabimur. Verba eius, Aromatum historia, hæc sunt. Duplex est Galanga. Vna minor & odorata, quæ cum Rhabarbaro ex Chinarum regione in Indiam aduehitur, & inde in Lusitaniam defertur, incolis *Lauandou* dicta. Altera maior, plurima nascens in Iaua

Galangæ ex  
Acoſtæ hi-  
ſtoria.

Genera.

Forma.

Nomina

Vsus.

G A L A N G A, Acoſtæ.



& Malabar, cuius descriptionem, quod maiore sit in vsu, hîc damus. Ea duorum cubitorum altitudine crescit, nonnunquam amplior, fecundiore præsertim solo: folia habet Orchidi Dioscorid. lib. 3. descriptæ similia, longiora tamen & latiora, supernè saturatiùs infernè dilutiùs virentia: caulem ex foliorum inuolucris constantem, vti in Orchidum generibus: florem candidum, inodorum: semē exiguum, neglectum, radicem secundum caput crassam & bulbosam, reliqua ex parte Zingiberi similem, sed maiorem, nonnunquam capitula Hastulæ regię modo proferentem. Seritur radice quæ mirum in modum sese propagat. Appellatur à Canariis & Brachmenis (quibus maximo est in vsu cum in hominum tum iumentorum morbis, quique eam ordinariè cum Oriza, vel piscibus, vel in acerariis edunt) *Caccharu*, ab Arabibus *Caluegian*, in Iaua *Lancuax*, in Malabar *Cua*. Adeò autem vulgaris est apud Malabarentes huius radicis vsus, vt non modò in medendis morbis eam vsurpent, sed in farinam etiam cōuertant, ex qua Cocci seu nucis Indicæ lacte, nonnun-

quam Sura, au Iagra excepta, certum quoddam panis genus pînsunt in tenuium placentularum formam: *Apas* vocant. In deliciis est hic panis, præbentq; i s qui ventriculi debilitate, & frigidityte laborant, in alui doloribus, vteri affectibus & vrinæ difficultatibus: quo postremo in morbo miram eius efficaciam experiuntur, siue ob humores crassos & pituitosos, flatūsve, aut arenulas in vtereribus aut collo vesicæ congestas, vrinæ difficultas orta sit, vel etiam ex carnis excreſcentia in ipso vesicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum hunc panem, deinde haustum Nîmpa (quæ veluti aqua ardens est): concedunt, in inguinibus verò supraque pubem & collum vesicæ folia Nymphææ decocta in aqua semacerata atq; adhuc calētia applicant. Cluſius tamen, qui illa Acoſtæ hætenus Latine cōſuetudini tradidit, neque Acoſtam, neque Garciam ab Orta sibi ſatisfacere in Galangæ maioris



maioris descriptione, ait: praesertim si ea, qua Europae Officina vrantur, legitima est Galanga maior. Etenim eius radices maiorem similitudinem habere cum Iridis (folia duntaxat foliis Iridis similia facere Penam supra retulimus) quam cum Asphodeli aut Zingiberis radicibus. Sib q; omnino persuadet, Galangam nostram maiorem Iridis genus esse, huic fortè simile, quod ipse in sua Pannonicarum stirpium historia primum posuit. Nihil tamen statuit.

PETVM.

CAP. CXXVIII.


**P**ETVM AD MODVM hortis omnibus magno est ornamento, ita facultatibus insignibus celeberrima est herba, quam Petum ab Indis vocari refert Theuetus, Nicolaus Monard. *Picielt*, Ouiedus in Hispaniola *Nomina* insula *Petbecenue*. Hispani *Tabaco* nominarunt ab insula quadam eius nominis, in qua frequentissima reperitur. Galli, quod Ioannes *Nicotius*, regius

aliquando in Lusitania orator, eius semen primum ad Reginam Regis Galliae matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbam Reginae nuncuparunt. Alij Herbam sanctam ob admirandas eius virtutes. Alij *Buglossum* antarteticum. Ad magnam altitudinem assurgit, & Limoniam malum aequat: in Gallia, Belgio, Anglia, trium cubitorum est proceritate, saepissime quatuor aut quinque cum maturè semen satum fuerit in calidioribus tractibus Aquitaniae & Linguagothiae: caule recto, crasso, multis & gradibus ramis brachiato, tam pingui, maxime cum adoleuit, vt melle illitus videatur: foliis numerosis, longis, amplis,

Forma.

*Buglossum antarteticum*  
*in quo folia Peti*  
*quae folia bugossina*  
*petunt et melle*  
*in ignis dantur*

NICOTIANA sive  
Tabacum.



Symphyti magni foliis latioribus, & rotundioribus, Personatae vel Hippolapathi satui satis similibus, carnosiss, pinguibus, aliquantum hirsutis, colore viridi dilutiore, iniucundo odore, acri admodum gustu cum quodam lentore. Florem fert in summis ramis copiosum, oblongum, tubae modo cauum, extrema parte latum & pentagonum, ex albo dilute purpurascens. Huic succedunt caliculi sive capitula oblonga, exigua, semine plena ex rufo nigricante, pusillo, Papaueris multò minore. Radix est satis crassa, multifida, lignosa, intus crocea & amara, quae facile cortice suo spoliatur. Alterum Tabacum minus pinxit Lobellius, foliis Hyoscyami lutei mucronatis, angustioribus, pediculo haerentibus, floribus minoribus aliquantò, non absimilibus, saturatioribus & purpurantibus. Item aliud minimum. Dodrantalis est herba, facie non diuersa, eodè etiam feruido vrentèque gustu. Flosculi Hyoscyami lutei multò minores, ex flauo herbacei. Folia Doronici aut Plantaginis angustifoliae, minora & angustiora Pulmonariae. Radix pusilla, fibrata. Nascitur Petum plerisque Indiae locis, humidis & umbrosis, & exulto lauiq; solo. Non multis ab hinc annis ex Hesperiae Indiae nouo orbe, Lusitaniae, Galliae, Belgij, Angliae facta fuit inquilina. Scribitur illic omni tempore. In frigidioribus regionibus Augusto aut Septembri serenda, quia semen exiguum diutissime sub terra latet antequam germinet: deinde à primis

Tempus.



*SAN A sancta, siue Tabacum minimum, Lobelij.*

Temper.  
& Vires.



frigoribus laeditur. Semel autem sata, & semen ad maturitatē cum perduxerit, seipsam deinde ferit, nec opus habet alia fatiēne. Floret in calidioribus regionibus Iunio & Iulio mensibus: semen Septembri maturefcit. Foliorum duntaxat vsus est, eaq; vt allernari possint, auctore Nicolao Monard. filo traiecta in umbra suspēduntur, & siccantur: deinde iis aut integris, aut in puluerem tritis vtuntur. Calidam esse & siccam plantam hanc in secūdo gradu idem Nicolaus Monard. tradit, idēo calfacere, resoluerē, abstergere, & aliquantū adstringere, vt ex sequentibus facultatibus colligere licet. Folia eius, inquit, calfacta & imposita cephalae & hemieranīe præsenti sunt remedio, si morbus à causa frigida, aut à flatibus ortus fuerit. Sæpius verò sunt repetenda ad perfectam vsque curationem. Sunt qui caput oleo florum Mali arantie prius inungunt. Idem remedium tetano vtile est, & totius corporis doloribus ab eadem causa ortis. Dentium dolores à causa frigida non modò finit dente prius deterfo aliquo linteo eius succo delibato, & pilula ex eius folio confecta denti indita, sed etiam ne putredo serpat prohibet. Pectoris vitis, vt rufi veteri, asthmari, & similibus ex frigido humore prouenientibus morbis, foliorum decoctum ex aqua, & eclegina ex eius decocto vtilia sūt. Serapium ex saccharo & foliorum eius decocto paratum, & parua quantitate sumptum, putres humores ex pectore eiicit. Asthmaticis interdum fumus corū ore exceptus opitulatur: sed necessarias euacuationes præcedere oportet, si morbus inducias dederit. Sub cineribus calfacta folia, & sordida non excusis cineribus, calidāque sæpius imposita dolori ventriculi qui fit à frigida causa, aut à flatibus in ipso generatis auxilio sūt. Viridia folia alij manibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi & lienis obstructionibus folia paxillo aceto intrita, diuq; illita vtilia sūt: quibus deinde folia calefacta aut lineus pannus succo foliorū calenti intinctus superimponuntur. Foliorum inopia puluis communi vnguento obstructiones aperienti excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu illinitur. Indicæ mulieres in puerorum, atque etiam grandiorum stomachi cruditatibus valde commendant. Nam ventre prius inuncto oleo lucernarum, & foliis sub cineribus calefactis, altero regioni ventriculi, altero tergori, quā ventriculum spectat, impositis, eas cruditates cōcoquunt, & aluum emolliunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes ventris tineas expellit foliorum succus cum saccharo coctus & depuratus parua quantitate sumptus. Umbilico tamen etiam folium tritum imponendum, & aluus enemate eluenda. Nephriticis doloribus folia sub cineribus, vt dictum est, calfacta, & quā calidè fieri potest apposita, magnum adferunt doloris leuamentum, idem remedium quoties opus fuerit repetendo. Commodè etiam clysteribus iniiciuntur, atque etiam fomentationibus & emplastris admiscētur. In suffocationibus vteri folia probè calfacta, & umbilico vteriq; regioni imposita præsens adferunt remedium. Quod si animi deliquium subsequatur, eorūdem fumus naribus obiectus illico illas liberat. Quod remedium Indicis mulieribus adeò vulgare est, vt ea de causa huius plantæ folia diligenter afferuent.



afferunt. Articulorum doloribus (si ab humoribus frigidis, vel non nimium calidis fiant) efficacissimè folia calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus intinctus: humores enim digerunt & resoluunt, ideoq; tumoribus etiam oedematosis, foliorum succo calido prius elotis, vtilissimè imponuntur. Perniones sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit. Venenis & toxico perniciosissimo, quo Cannibales sagittas inficiunt, hac ratione resistere didicerunt Hispani (nam ante sublimatum vulneribus inspergebant.) Cum Cannibales ad D. Joannem de portu diuite nauigarent, Indos & Hispanos nonnullos qui illic erant, telis suis venenatis conficiebant, plerosq; vulnerabant, qui cum sublimato carerent, à quodam Indo edocti sunt Tabaci succum expressum vulneribus imponere, deinde folio ipsius trita. Illico sedati dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent: tandem veneno superato vulnera curata. Eadem de causa venenatis pestiferisque carbunculis imposta crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsusque venenatorum animalium plurimum conferunt. Recentibus vulneribus imposta sanguinem sistunt, eaque glutinant. Quod si maiuscula sint, vino prius eluantur, & labiis vulnerum coniunctis succus foliorum inspergendus, & ipsa folia trita supra vulnus alliganda: postmodum reliquisq; diebus sequentibus eadem facienda: victusque ratio necessaria obseruanda. Vetera vlcera gangrænaeque succus instillatus, & folia trita imposta detergunt, curant, & ad cicatricem perducunt, purgatio videlicet prius corpore, & missione sanguinis, si necessaria fuerit, facta, obseruata etiam conueniente victus ratione. Porro non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus experientia ipsa docuit. Nam per vniuersam Indiam frequentia vlcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quæ facillè ob summam regionis humiditatem putrescunt & vermibus scatent, quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti. Sed cum magno illic varietate, plerumq; quod vulneribus inspergebatur, plurius costabat, quam animal quod curabatur astimari potuisset. Quare Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam usum ad putrida, foetida, vermibusque scatentia animalium vlcera transtulerunt, atque adeò compererunt succum eius instillatum non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoque Indi Tabaci folia semper circumferunt. Scribit Nicol. Monard. se quendam nouisse narium vlcere laborantem, è quo sanies manabat non sine contagij suspicionem, consuluisse quæ foliorum huius plantæ succum instillari, à secunda instillatione vermes multos excidisse, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum fuisse vlceris, sed quæ erosa erant non restituta. Illius etiam foliis impetigines & capitis scabies confricantur. Fuit ista planta ab Indicis sacerdotibus celebrata ad responsa danda. Etenim moris erat apud Indos sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momenti negotiis consulere. Sacerdos consultus istius plantæ folia sicca vrebat, & eorum fumum tubulo quodam in os excipiebat, deinde quasi in ecstasi quandam raptus cadebat omni motu priuatus, & sic aliquandiu permanebat. Discussa eius fumi facultate ad se redibat, referebatque negotium cum damone contulisse, responsaq; dabat ambigua, vt, vt cunque euentus succederet, illis facillè persuaderet, sic se prædixisse, eoque modo Barbaros illos miserè decipiebat. Vulgus etiam Indorum eundem fumum per os & nares excipit animi gratia, cum somnia videre, & extra se quasi rapi volunt, atq; etiam de suorum negotiorum euentu ex insomniis quæ illis apparuerint pronuntiatum. Præterea Indi oneribus ferendis, aut aliis laboribus defatigati eiusdem plantæ fumum hauriunt, & illico quasi mente alienati conuult, excitati verò resocillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eadem vtuntur scis famisque sedanda



sedandæ gratia hoc modo. Testas cochlearum quarundam vrunt, & terunt calcis modo: huius & foliorum æquas partes mandunt diu, donec ex vtriusque massa fiat, quam in pilulas piso maiores conformant, in umbra siccant, & in vsum reponunt. Facturi iter per desertam, in quibus neque cibum, neque potum inuenturos se putant, eas pilulas secum deferunt, ex quibus vnâ inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent: ea absumpta aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluerint triduanam interdum, aut etiam quadriduanam: quo tempore neque famem sibi molestam esse, neque sitim asserunt. Horum exemplo naucleri plerique istinc redeuntes gestant pusilla infundibula ex folio Palmæ, aut storea confecta, quorum vni extremo inserta sunt conuoluta & comminuta huius plantæ folia siccata: istud igni accendunt, atque altero extremo hianti ore quantum plurimum possunt, inspirando fumum hauriunt, vnde sibi famem sitimque sedari, vires instaurari, spiritus exhilarari asserunt: sopiriq; iucunda ebrietate cerebrum dictitant, incredibilem pituitæ copiam plerumq; educi. Sunt qui eius folia singulis diebus manè à ieiunis mandi iubent, vt podagra liberentur, quoniam multam pituitam in os attrahunt, eamque in partes inferiores defluere prohibent. Carolus Stephanus in Prædio rustico experientia comprobatum esse scribit, folia strumis vtiliter illini, eiusq; stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Panacea quædam est ad omnis generis morbos. Quidam Nicotianæ speciem esse putant plantam, quam Hyoscyamum luteum vocant, quia vidissent non paucos huius fumo hausto temulentos fieri. At non rectè sentiunt, quia Nicotianæ fumus, vt se expertum fuisse ait Pena, non citò inebriat, nec frigore dementat, vt Hyoscyamus, sed quodam aromatico vapore ventriculos cerebri imbuat.

## ZARZA PARILLA. CAP. CXXIX.





**Nomina** X NOVI orbis, siue Americæ prouinciis etiam prodiit Zarza parilla, & Chinæ radici successit: eique laudem eripuit, quod non nisi cariola & longa vectura euasida, atque marcida ad nos peruenire soleat Zarzam parillam Hispani, qui primi eius vsum in Europam ex Peru inuexere, breuiore itinere, atque ideo integrioribus viribus ad nos transmittant, ad multos variosq; morbos præstantissimum medicamentum. Qui primi illic viderunt, Zarzæ parillæ nomen indiderunt propter magnam similitudinem quam habet cum Zarzæ parilla Hispanica, id est, Smilace aspera, quasi dicas Rubi viticulæ, nec Hispanis, inquit Matthiolus, Zarzæ parilla aliud est, quam Rubus viticulosus: *Parra* enim Hispanis vitis dicitur, *Parilla* viticula, & *Zarzæ* rubus. Eius apud indigenas nomen spinosam vitem Latinis significare, Lopus Lusitanus auctor est. Planta est, vt describit Nicolaus Monardes, quæ multis radicibus nittitur, duos cubitos, aut eo amplius longis, colore cinereo dilutior, tam altè interdum demissa, vt qui integras eruere velit, ei profundè admodum fodere opus sit, ramis nodosis & lignosis, qui facillè desiccantur: florésne an fructum proferat, ignorat. Hac quæ in Hispania noua prouenit, multò meliorem & efficaciorē postea protulit prouincia Honduras, à superiore differentem, quod illa candidior est ad pallorem accedens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior atque crassior.

**Electio.** Deligitur nigrior, recens, non cariola, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa: nam quæ cariem sensit, & dum frangitur puluerulenta est, inutilis existimatur. Gustu insipidam esse ait, & sine acrimonia, nec eius aquam hordeacea sapidiorem. Hanc credunt multi nihil aliud esse quam Smilacem asperam Dioscoridis: quibus assentitur Matthiolus eiusque sententiæ auctorem citat Lucam Ghinum, qui se vidisse affirmat apud Florentiæ Ducem Zarzæ parillæ integram plantam



ZARZA parilla,  
Matthioli.

ZARZA parilla,  
America.



plantam ex Hispania delatam, quæ omnibus suis partibus ac notis nihil ab aspera Smilace differebat, imò nihil aliud esse censuit, quàm genuinam Smilacem asperam. Id quod paulò post experientiaprehendit, quia asperæ Smilacis radicum decocto multos curauit lue veneræ affectos. Idem quoque ab aliis factitatum fuisse, præsertim Romæ. Alij diuersas plantas esse contendunt, maximè Pena, de harum differentia differens his penè verbis. Smilacis radices geniculatæ sunt, articulatis segmentis, candidæ, foris nitentæ, Graminis aut Arūdinis vallatoris modo. At in Zarza parilla ab vno radices trunco magno, præduro, strumoso, rugosissq; capitibus hinc inde, subtus, vt in Asparago, vel Rusco oriuntur numerosa eiusdè coloris flagella, æquabilia, & sine geniculis, vel nodis recta, flexilia, cortice duriusculo, pullo, magis striato in longitudine, interdum vicenū pedum, farinacea intus medulla, non ita ingrata, sed viscida, nonnihil emplastica, amaricante, nec tamen calorem prodente. Quare perspicuum est non magis esse radices Smilacis, Rubi, Clematidis alterius Viornæ dictæ, quàm sint Cinnamomi, vt nec arbores quædam tum Indiæ Orientalis, tum Occidentalis sunt nostra Laurus, tamen si hæc eadem quæ illæ præstent. Neque si Colutea similima est Sennæ, ideo statim eadè astruenda. Idem de Zarza & Rubo dicendum. Nam stipites Zarzæ ex eodem radices grandi & capitato nodo, lignoso, intus flauescente, Aristolochiæ rotundæ tuberose magnitudine & colore exeuntes, pollicem aut maximum Rubum crassitie superant: sed præduri lignosiq; crebros nodos admodum exstantes circa articulas commissuras crebriorum vncialium, frequentiumq; interuallorum, atque aculeos aduncos deorsum versus nonnihil depressos & rigidos habent, & Rubo valde similes sunt aspectu potiùs quàm Smilaci. Verum gustu non sunt adstringente, sed fermè insipido, nec vt radices emplastico, eoque minùs efficaci. Folia intellexit ille ab amicis qui viderunt non multum abesse à Smilaceis. Hæc sunt Zarzæ parilla à nostratibus aliquatenus similibus discrimina. Nicolaus Monard. illam ca-

Temper.  
& Vires.

Yyy



In cap. III.  
lib. I.

lidam & siccam esse in secundo gradu tradit. Primum circiter viginti ab hinc annis nobis innotuit. Hodie in multis morborum generibus frequens eius est usus, videlicet in defluxionibus, flatibus, frigidis vteri morbis, & aliis plurimis, modo acuti non sint, aut iis febris accesserit. Certum est tamen iis qui calida præsertim hepatis intemperie laborant, non convenire: nimium etenim excalfacit: sed ventriculos frigidos fouet, & flatu mirifice discutit. Vis illi excalfaciens, & extenuas, inquit Matthiolus, & quæ valenter sudorem prouocet. Valet autem non solum ad luem veneream curandam, sed ad quosvis articulorum dolores, ad omnia cutis vitia, ylcera contumacia, lichenas. Auxiliatur iis qui cedemate laborant. Peculiariter verò frigidis capitis & cerebri affectibus medetur. Hac Indos sic vti solitos refert Nicolaus Monard. Zarzæ parillæ selibram minutim concisam aqua macerant, dein in mortario tandiu tundunt, donec in muccaginem quandam resoluantur, quam deinde colant & exprimunt. Eius liquoris ita expressi satis capacem cyathum calidum manè hauriunt, deinde stragulis sese operiunt, & duarum horarum spatio sudant. Quod si interdum sitis urgeat, idem liquor illis est potus. Sub noctem alium eiusdem calentis cyathum hauriunt, & tantūdem temporis quantum manè sudant. Hic ordo triduo integro obseruatur, vt nihil aliud edant, aut bibant, præter eum humorem expressæ Zarzæ parillæ. Eadem ratione præparatam ait Nicolaus Monard. se plerumque initio propinasse, multoquæ melius sic morbos curasse quàm nunc, cum ob sæculi nostri delicias eodem quo Guyacum modo propinetur. Videlicet duæ eius vnciæ lotæ, confractæ, & minutim concisæ in nouum fictile cum tribus aquæ sextariis iniiciuntur, 24. horas macerantur, obrurato fictili coquuntur lento igne è prunis accenso, quoad sextarij duo fuerint consumpti, refrigerantur, colantur, & fictili vitrato, aut vase vitreo reconduntur. Eadem deinde Zarzæ parilla fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fictili vitrato asseruatur. Purgatus æger vt decet, manè decem vncias prioris decocti hauriet, sudabit duas horas: deinde omnia ea perficiet, quæ in sumendo Guyaci aut Chinæ decocto facienda præcipere solent. Similiter etiam tenui victu vtetur, habita semper virium ratione. Nam post sudores vnas passas, pruna cocta, amygdala, & panem biscoctum edet. Si vires imbecilles fuerint, conceditur usus carniū pulli asini, aut auicularum montanarum, & de secunda aqua biber. Quindecim dies, aliquando viginti, nonnunquam triginta, interdum quadraginta huius medicamenti usum continuabit pro morbi magnitudine & virium robore. Matthiolus eius vncias quatuor in libris quindecim aquæ (in quibus 24. horas macerata prius fuerint) decoquit ad dimidias. Pena non minoris quantitatis instituenda esse decocta censet, quàm decem aquæ librarum ad vncias duas, vel tres, vel quatuor radicis: nam citius, ait, diffarit aqua ( nisi in diplomate decoctum faciendum præceperint ) quàm radicū vires bulliendo eductæ fuerint: radicis enim corculum lori instar durum tam citò vires non deponit. Nicolaus Monard. cum vncias duas in tribus aquæ sextariis, id est, in libris quinque decoquendas decernit, de recentiore, opinor, intelligit, & quæ, quod succulenta satis & tenera adhuc sit, facilius aquæ vires suas impertiat, quàm quæ ad nos longiore itinere defertur, & ob id magis arida & exsucca cum sit, longiore tempore, atque ideo in copiosiore aqua decoquenda: paucior enim aqua longiore decoctione exhalaret.

PEREBE





**P**N TERTIO volumine nauigationum, libro vndecimo generalis Historiæ Indiarum, legimus in insulâ Hispaniolâ locis multis copiosissimam nasci herbam, quam Perebecenuc vocant, mirabilis aduersus vlcera efficaciam. Multa folia fert, in extremo acuminata, lanceolâ ferro similima, vt natura nobis indicare voluisse videatur herbas curandis

Forma.

PEREBECENVC.



vulneribus ferro factis perutiles. Folia ista satis tenuia sunt, viridia, & in summo cæsia, petioli quibus sustinentur similiter cæsi coloris. Quædam folia sunt non acuminata, sed rotunda, sed & hæc & illa coloris sunt ex cinereo cæsi. Flores edit rubros & lógos in umbella Fœniculi modo, sed magis dispersos, tenues. Ad hominis proceritatem tota planta assurgit, admirandi effectus: facillè enim & citra dolorem vlceribus omnibus medetur, etiam si cacoëthe sint & admodum contumacia. Huius manipulum in aquæ sextario decoquunt, quoad tertia pars supersit. In eo decocto penè refrigerato lineum pannum intingunt, quo vlcus abluunt, exsiccato herba crude succum infundunt, aut linamenta succo intincta admovent. Id bis die repetentes facillè vlcera quantumuis magna curant, non autem vulnera recentia manu illata.

MECHIOACAN. CAP. CXXXI.




**I**N INDIIS maris Oceani prouincia est quadraginta miliaribus supra Mexicum, Mechioachâ dicta, cuius præcipua & fecundior pars vernacula Indorum lingua *Chimucila* nominatur, ab Hispanis totius regni nomine *Mechioacan*. Omnium harum Indiarum auri & præterea a genti fertilissima regio est: præterea temperato & salubri fruitur aëre, multarum & salubrium plantarum feracissima, adeo vt has ob causas vicini Indi ægri eò se transportandos eurent, morborum remedia quæsituri, & sanitatem recuperaturi. Ad hæc frumento, fructibus, siluestribus animalibus abundat: multi in ea aquæ dulcis fontes scaturiunt, quorum nonnulli optimorum piscium copiam alunt. Quare incolæ cæteris Indis vegetiores, alacriores, melius colorati degunt. Hanc subiugauit Ferdinandus Cortesius anno salutis humanæ 1524. quò statim appulerunt Franciscani, & monasterium condiderunt: cuius primas cum longo & periculoso morbo affligeretur, & Gazoucin Cacique, id est, dominus totius regionis medico suo Indo curandum tradidisset, quòd iam summam cum Franciscano illo amicitiam contraxisset, cõsiderato morbo dixit medicus curatum iri ægrum, si radicis cuiusdam farinam vellet sumere, quàm recuperandæ sanitatis auidissimus Franciscanus perlibenter cum modico vino sumpsit, qua ita purgatus sine dolore & molestia vlla fuit, vt eadem die melius habuerit, atque tandem sanitati pristina restitutus fuerit. Huius exemplo cæteri Frãciscani, atque Hispani quidam cum in morbos incidissent, eodem remedio sæpius vsi sunt, tam felici successu. vt iis visum fuerit cæteris fratribus qui in Mexico erant tam excellens remedium communicare: vnde rursus ob mirabiles effectus, eius fama per nouam Hispaniam & omnes Indias ita peruagata est, vt spretis Rhabarbaro, atque aliis vltatis remediis, hac sola radice in purgandis ægris vterentur. Hinc in Hispaniam, inde in

*vide Physic. pag. 590*



Nomina

Forma.

MECHIOACAN,  
*Dodonei.*

Electio.

Temper.

Vires.

Galliam, Germaniam, Italiam delata est. Nomine totius prouinciae, in qua prouenit, Mechioacā nominatur, ab Indis vulgò Rhabbarum Indicum. Nicolaus Monard. plantam vidit Hispali apud Franciscanos ex ipsa prouincia Mechioacan delatam, multis ramis luxuriantem, supra terram expansis, colore cinereo, qui vicinas perticas, aut pergulas scandunt, & multiplici nexu amplectuntur, foliis rotundis in mucronem desinentibus, secundū pediculum amplis, fibrosis, adeò verò delicatis, vt humore carere videatur: fructu Coriādi sicci magnitudine, racematim coherente, qui Septembri maturescit: radice crassa, Bryoniae modo, vt non defuerint qui eandem plantam esse putarent, aut saltem ei congenerē. Sed multum differunt: nam Bryoniae radix & viridis & sicca admodum acris est, Mechioacan verò insipida, & sine acrimonia vlla. Pena quoque eos qui sunt in ea opinione perinde falli censet, atque illos qui Laurum, Cinnamomū, & Smilacem asperam Zarzam parillam, aliāque multas exoticas eadem specie cum nostratibus faciunt. Eam radicem ab Hispanis acceptam sic ille pingendā curauit. Ea integra ad nos rarò defertur, sed in laminas grādes & taleolas confecta, ex quo magnam esse radicem, solidam, & sine matrice. Hanc, inquit Pena, non visam qui nosse cupit, intueatur Bryoniae radicem: sunt enim cortice eiusdem coloris, rugis & ferè magnitudine iisdem. Sed huius taleolae transversim sectae siccandi causa, intus multis circulis à centro ad ambitum parallelis distinguuntur, madendo sapore farinaceo, nec acri-odore non ingrato est, ceterū albida & friabilis vt Bryonia. Optima recens, non cariōsa, intus candida: vetustior enim nigrescit, foraminulenta, cariōsa & leuior euadit. Milij semine obruta seruatur, aut lino picato siue resinato inuoluta. Calida videtur esse primo gradu, sicca secundo, constareque partibus subtilibus aëreis cum quadam adstrictione. Pituitam maximè & aquas euacuat: iterum, cephalæam, strumas & epilepsiam curat: veteres defluxiones sistit, articulorum, coli, & renum doloribus utilis est. Conuenit etiam vteri doloribus, asthmatis, tussi veteri, & lue venerea vexatis. In febribus diuturnis, compositis, phlegmaticis, quotidianis, erraticis, iis quæ ex viscerum obstructione pendent commodissimè datur, in ardentibus & acutis minimè. His assentitur Pena, qui huius radices puluisculo solo drachma pondere, ex vino albo aut iuscūlo propinato commodissimè qualibet die, hora & atate, nulla



nulla molestia, aut incommodo, quinquies, sexies, aut septies flauas hydropicorum aquas eductas, pituitasve quasuis se comperisse affirmat. Molestus non est huius radice vsus, quia nullius ingrati saporis particeps est: ideo pueris, senibus, & iis qui cetera medicamenta auersantur utilis. Eius autem sumenda ratio talis est. Præparatis humoribus qui euacuandi fuerint, purgato etiam corpore enematis & sanguinis missione ex medici consilio, huius radice leuiter confusa puluis vino albo maceratus, aut aqua Anisi, Fœniculi, aut Cinnamonomi (si quis à vino abhorret) summo mane propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo rosato cathartico. Post sumptum hoc medicamentum brevis somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione datur iusculum, ac paulò post cibus, qualis dari solet iis qui purgantur. Fiunt nonnunquam ex eodem puluere catapota Coriandri sicci magnitudine cum syrupo aliquo, vel electario. Auctor est Nicolaus Monard. in potestate esse medici, aut eius qui Mechioacan sumperit, eam quàm velit humoris quantitatem purgare: sumpto enim iusculo, vel quouis alio cibo, eius vim purgatricem illico sisti atque infringi, id quod negant alij, quoniam ei opinioni quotidiana experientia refragatur. Alia nunc ex continenti adfertur radix Mechioacan, quæ circa Nicara-

Genera.

*FLOS Mechioacan,  
Monardis.*



gna & Quito nascitur, vbi diligenter colitur, & magno in vsu est ob admirandas eius vires, longè præstantior ea quæ ex noua Hispania deferri consuevit, cuius, flos semen, & ramuli etiam delati sunt. Erat verò is flos quasi Mali aureæ, quinque folijs constans maioribus, è cuius vmbilico protuberat calix, siue vesicula quædam auellanae magnitudine, membrana tenui aperta, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana Ciceris magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido contine-

bantur, quæ molli & spongiosa terra commodè nascuntur. Mittit etiam Promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechioacan genus siluestrius, quod graua symptomata excitat, vt vomitus immodicos, tormina, alui profluvia. Quam ob causam Scammonea nuncupatur, sed nemo periculo semel facto vitur. Simile est alteri cum folio tum sarmenis, tum radice, sed per omnia minoribus: ipsa etiam radix acrimoniae non nihil habet. Memorat Petrus Cieca in prima parte Peruanæ Historiæ in prouincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenues quasdam radices digiti crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aquæ sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aquæ partem ea nocte absumi. Ex ea quæ supererit aqua, qui tres uncias sumperit, adeò benigne purgatur, ac si Rhabarbaro purgaretur, & aliquoties periculum se fecisse scribit, magno purgatorum commodo.

Radix  
Quim-  
baya.



T.1. Cosm.  
lib.3.ca.2.

Forma.



rudine. Ea in morbis curandis vtuntur, perinde ac nos Guayaco.

R

EFERT Theuetus in vtraque ora fluuij Senega multa esse Regna, praesertim in ea quæ meridiè spectat, Regnum Mely, in ea quæ Septentrionem, Regnum Tombotu. In his periti sunt Medici multi, quos *Bisfrans* appellant: morbus qui illic frequentius grassatur *Borozaïl* nominatur, aut *Zail* Æthiopum lingua, qui ex immodica venere, cui multum obnoxij sunt, ortum habet. Genitales partes potissimum is occupat, in homine Asab, in fœmina Assabatas nominatas. Ad huius morbi curationem decoctis multis vtuntur, sed potissimum decocto herba, quæ *Achanaca* dicitur. Huius folia bifurcata & acuminata sunt, Brassicæ amplioris foliis similima, sed non ita crassa, & tenuiore costa. In horum medio fructus nascitur, oui magnitudine, colore luteo, quæ *Alfard* nuncupant, alij *Lefach* nomine serpentis cõcoloris. Fructus is magno apud eos est in pretio. Tota planta tibie hominis crassitudine. Ea in morbis curandis vtuntur, perinde ac nos Guayaco.

## FABÆ PURGATRICES. CAP. CXXXIII.

Forma.

NOMINE Dei & Carthagine continentis provinciis Fabæ purgatrices nascuntur, vt narrat Nicolaus Monard. quæ nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, qualis est Ceparum tunica exterior, illas per mediū intersecante, quæ cum cortice abiicienda est, alioqui tanta vehemētia supernè & infernè purgans, vt in vitæ discrimen sumentem coniciat. Assandæ verò sunt, vt illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuēda. Datur hic puluis vino, aut saccharo exceptus ad cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine molestia bilem, pituitam, & serosos humores multò leuius & facilius quàm superiora medicamenta purgat. Dantur hæ Fabæ in febribus diuturnis, in coli doloribus, & articularum morbis. Dosis assatarum esto à quaternario numero ad senarium, pluriusve aut pauciorum pro egi viribus. Clusius aliquot peregrinos fructus se accepisse scripsit Fabæ purgatricis nomine, sed nullum habuit qui Fabæ purgatrici à Nicol. Monard. descriptæ conueniret. Quare potius inter Phaseolos recensendos putauit. Prioris iconem hanc exhibuit. Orbiculari fermè est forma, sed planus vtrinque & quodammodò puluinus, digiti vnus crassitudine, duorum verò latitudine aut ampliore, vno latiore aliquantulum cauo, quo videlicet hilus esse solet, & siliquæ in qua continetur adhæret: cortex durus & lignosus, lauis, ex rubro

Phaseolus  
Ind. Clus.FABÆ Purgatrices,  
Monard.



ex rubro nigricans : quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vt sunt omnia Phaseolacea, sapore primū quali sunt omnia ferē legumina, sed illico linguam mordicante & acri : quo fit vt purgandi facultate præditus esse possit. Nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem quale vulgò *Locus.*

*PHASEOLVS alter*  
*Indicus, Clusij.*



*PHASEOLVS Brasili-*  
*anus, Clusij.*



pingi solet imitatur: idcirco à quibūdā Cor D. Thomæ nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieca prima parte Chronici. Alter Phaseolus vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, hilo prominente, & renis formam minimè referente. Idē Clusius cū Vlyssipone esset, habuisse se scribit aliud Phaseoli genus ex Brasilia Americæ prouinciæ delatū, admodum recens, pollicari latitudine, crassum, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili. Eiusmodi quatuor aut quinque siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur. Flore traditur ex rubro pallescente. Clusius iuniore duntaxat plantam vidit è semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferē similis erat, nisi quod minora erāt, & auersa parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obfiti. Brasiliani *Macoma* vocant. Similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes ex Africæ Mauritania delatos se vidisse Clusius ait. Lobellius se


*SILIQVA Phaseoli Bra-*  
*siliani, Lobel.*





vidisse & habuisse scribit purgatrices Fabas, & Phaseolos, quales expressit Clusius. Siliquam etiam pictam dedit, quæ dodrantis est, admodum elegans, duas uncias lata, quaternis & quinis loculis ventricosa, carnosæ, corticosa & coriacea, siliquæ Carobiæ vulgò dictæ concolor, innumeris rugis exarata, qualis icone delineatur.

*PHASEOLI parvi ex  
America.*



Idem Clusius vidit nō procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostrati adeò simile, vt nostrum putares. Pergulas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo: at siliquæ scabræ sunt, breuiiores, & duplò latiores quàm nostri vulgaris: fructus exiguus, pisi vulgaris magnitudine, intus niger, nisi qua parte siliquæ adhæret, quæ candida est. Brasiliensis frequentem esse aiunt, & Lusitanis istic habitantibus Faba braua, id est, Fabam siluestrem nuncupari. His appinxit Lobellius Phaseolos paruos ex America delatos.

*HERBA IOANNIS INFANTIS, GVACATANE,  
Hordeolum. CAP. CXXXIIII.*

*Forma.*

*Vires.*




**Q**VI in Hispania Noua primi militarunt, eamque subiugarunt, herba quadam vsi sunt in curandis vulneribus, vt refert Nicolaus Monard. quam primus ostendit Indus quidam Hispani famulus nomine Ioannis infantis, à quo illa nomen accepit. Exigua est planta, foliis exalidis, aliquantulum villosis. Viridis præmanfa aut trita, vulneribusque imposita sanguinem sistit atque conglutinat. Neruorum aliorumque partium vulnera digerit & mundat, tandem ad cicatricem perducit. Iisdem viribus pollet sicca in puluerem redacta. Idem Nicola. Monard. refert ad se missam fuisse ex Hispania Noua plantulam quandam sine radice (Indi Guacatane nuncupant) nostro Polio montano haud absimilem, sed inodoram. An florem, an fructum proferat, ignorat. Ad hæmorrhoides commendatur hac ratione. Eius plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioqui ex aqua hæmorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur. Dolores ex frigore & flatibus

*Forma.*

*GVACATANE,  
Monardis.*

*Vires.*



ortos in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissimo eius puluere inspergatur, & pannus lineus superimponatur: nam illico adhærebit cerati modo, nec inde amouebitur nisi dolore sedato. Eius puluis leuibus vulneribus impositus præsertim inguinum, ea mundat, & ad cicatricem perducit. Præterea narrat Nicola. Monard. ad se perlata esse cum aliquot aliis plantis ex Hispania Noua, semina cuiusdam plantæ, quæ *Cenadilla* istic vocatur, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum Hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis quibus semen includitur, sed minus, & Lini semine neuiquam maius, verum longè aliis facultatibus præditum. Etenim nunquam auditum est aliquam aliam plantam adeò vrente & caustica vi præditam, ita vt vbi cauterium præbeat effectus, quos non modo sublimatum, sed etiam ignis præstare posset. Etenim vermes in vlceribus necat, putridaque vlcera expurgat puluis eius sensim inspersus, maiore minoræve quantitate



## HORDEOLVM M. Monard.



insignibus facultatibus donata, quæ cum tempore *συν ὁσῶ* innotescant, diligentia & industria illorum, qui non sibi se, sed in commune natos meminerunt.

## HETICH AMERICVM.

## CAP. CXXXV.



**H**TERNAS etiam quasdam hortenses plantas adscribamus atque in primis Hetich, quæ radix est Rapis magnis, quales apud Lemoices nascuntur, similes, cuius duæ reperiuntur species eiusdem crassitudinis. Vna quæ coctura flavescit, altera quæ albescit. Vtraque folium habet Maluæ, semen nullum. Quare barbari Americi ipsam radicem in taleolas concisam pangunt, quæ sic copiosissima provenit. Hanc magno cuidam prophetæ (Chariabe prophetam vocant) acceptam referunt, qui puellæ cuidam obuius dono dedit, eamque ferendi, utendique modum docuit, itaque successit, ut ad posterios continuato eius usu, nullo ferè alio nunc vescantur cibo, sitq; iis adeò vsitatus, ac nobis panis, cum antea, ut narrant, herbas, radicesque siluestres beluarum more depascerentur. Hetich Oetum esse Plinij putat Dalechampius, pro quo apud Theophrastum mendosè legimus Vingum. Sic Plinius. Mandunt & Oetum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theoph. verò. *ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἐν ἀργύρῳ καλλυμένον εἶγγον, (aliàs ἕϊτον) τὰ μὲν γὰρ φύλλα μεγάλα, καὶ ὁ βλαστὸς αὐτοῦ ῥαχὺς, ἢ ὁ ρίζα μακρὰ, καὶ ἔστιν ὡς περ χαρπὸς, διαφέρει τε, τὸ ἐσθλὸν, καὶ συλλέγουσι δὲ ὅταν ὁ ποταμὸς*

Nomina

Genera.

Forma.

Lib. 2. cap. 11.  
Lib. 1. hist. cap. 11.



ποταμὸς ἀποβῆ, ἑφονὶες βωρύς. Id est, Similiter & quod in Ægypto Oetum appellant. Folia eius magna, germen breue, (non, vt Gaza, pusillum) radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum annis in alueum redierit, eo quæ deorum aras coronant. Quæ Theophrastus folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

## MANIHOT.

## CAP. CXXXVI.

Forma.


Vfus.

Lib. Hist.  
cap. II.

**L**IA radix hæc est, brachij crassitudine, pedis vnus & dimidij, aut pedum duorum longitudine, sæpius tortuosa, & obliqua. Hanc emittit frutex parvus, quatuor pedes circiterve altus. folia habet ei plâta quæ vulgò ab herbariis Pata leonis dicitur similia, in ramusculorum vertice sena septenave, quorum singula dimidium pedem longa sunt, tres digitos lata. Barbari ex radice, quam Manihot appellant, hoc modo farinam faciunt. Radices siccas siue recentes tundunt, siue radunt lato arboris cortice plurimis durissimisq; lapillis confetto. Dein incerniculo cribratas in vase cum aqua igni imposita commouent, ita vt hæc farina in grumulos coëat, mannæ granatæ similis, quæ recens optima est, & plurimum succi corpori suppeditat. Huius parandæ negotium totum mulieribus committitur, perinde ac viris indignum. Scire autem licet à regione quæ Peru dicitur, Canada, & Florida insulis, tota continente inter Oceanum & Magellanicum, scilicet in America, & eorum regione qui Canibales appellantur, vsque ad fretum Magellanicum, id est, quater mille miliariorum spatio, nullum cibum vsitatiorem frequentiorémque esse, eaque farina cum carne & piscibus omnes vesci, non aliter quàm nos pane, admirando quodam modo, nunquam admoventes manum ori, sed procul longioréque quàm pedis vnus spatio, magnaque dexteritate in os conientes, ac Christianos irridentes, si aliter comedant. Quidam Arachidnam Theophrasti, Manihot esse putant, Igname verò, de quo proximo capite agitur, eiusdè τὸ ἀραχιδνὸς siue ἀράχω δημοτὸς,

## MANIHOT.

## nomen uocabulis TVCA.



non



non, ut apud Plinium legitur, Aracidnam, & Aracum. De quibus hæc Theophrastus. *διον αἰτε τῆς ἀραχίδης καὶ τῆς δμοῦς τῶ ἀράκω. φέρει γὰρ ἀμφοτέρω καὶ ἑλκώτιω τῆς ἀνω καὶ μίαν μὲν ῥίζαν τὸ ἀρκώδες τὸ το παχέαν ἔχει, τὴν δὲ βάθους. τὰς δὲ ἄλλας, ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς, λεπιοτέρας, καὶ ἐπ' ἀκρῶ, καὶ χυζομένας πολλὰ χη. φιλεῖ δὲ μάλιν χροῖα τὸ ὑφαίμα. φύλλον δὲ δολέτερον ἔχει τούτων, ὅδ' ὅμοια τοῖς φύλλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἀμφιγυρεῖ μᾶλλον ἐστὶ. καὶ φαίνεται θημύσιον.* Id est, veluti Arachidnæ radix, cuiusque quod Araco simile est. Vtrumque enim fructum fert non minorem eo qui in supernis plantæ partibus nascitur. Et radicem quidem vnam carnosam & crassam, quæ in altum demittitur, ceteras, in quibus fructus, tenuiores, & summo cespite & quaquaversum diffusas. Locis gaudet arenosis. Neutrum folium habet, neque foliis quicquam simile, sed potius quasi utrinque fructum edant, quod mirum videtur. Plinius. Aracidna quidem & Aracos cum habeant radices ramosas ac multiplices, nec folium, nec herbam ullam, aut quicquam aliud supra terram habent. Satis igitur conuenit historia radicis, nisi Theophrastus scriberet neutrum folium habere, neque foliis quicquam simile. Nam vtrumque radicem vnam habet crassam & carnosam, quæ in profundum recta descendit, alias præterea tenuiores, in summa terra, multifariam diuisas, quibus fructus, id est, noua soboles, inhaeret ac innascitur, ut in herba quam Dodon. Chamæbalanon vocat. Auctores huius sententiæ aiunt peregrinæ utriusque plantæ historiam Theophrasto sua commentanti parum integra fide recitatam fuisse.

Lib. 5. c. 39.

## IGNAME, BATAT, AGIS. CAP. CXXXVII.

**I**N Brasilia, & Hispaniola insula vocata, *Batat* dicitur quod in terra Themistitam *Agis*, in Sancti Thomæ insula, *Igname*. Radix est Napi figura aut Rapi, nigro cortice, infernè sparsa quasi in brachia. Ei castaneæ sapor, sed suauior ac tenerior. Sub cineribus assa atque elixa vescuntur. Medullæ color haud vnus omnibus. Itaque in species varias digesserunt. Prima est quæ ab Hispanis *Igname cicorero* dicitur. Sola hæc annum durat incorrupta: quocirca in naues imponunt pro comæatu. Tres præterea species, temporis omnes impatientes. Excellentissimo sapore illa quæ nascitur in agro Benim. Quæ à Manicongo minùs nobilis. Vltimo in pretio lutea est, colore quasi Carotæ dictæ. Eius satio mira, quippe non radice feritur, sed talea sicut Olea. Sarmenti fructum fissum in partes aliquot, modò quidpiam corticis seruatum sit, deponūt, ridicam propter pangunt. Eius namque stipes aduoluitur Lupuli more. Folium ut Citrio, aquè nitidum, sed minus ac tenuius. Quinto mense mæsis tempestiua. indicium ubi folia siccantur. Radix ut Arundinis, aut Dracontij, quaternas quinasve soboles edit. Siccata seruant. Hæc Scaliger. Eadem planè reperies apud auctorem navigationis ad Insulam S. Thomæ. Primus opifex qui ad panis vicem accedere iussit hanc radicem, eiusque vsum supplere famelicæ regioni, cauit & id, ut non in futuram mensem radix auulsâ fereretur, sed in annonam potius seruata, cederet pactorum samentorum fructificationi: vnde soboles succresceret in futurum prouentum.

Forma.

Genera.

Exerc. 181.

17.  
Scalig. ibi.

## BATATAS Cusij. CAP. CXXXVIII.

**S**CRIBIT Pena ad Sisarum non parum accedere radices illas quæ in insulis Nouo orbe non procul disitis suapte sponte oriuntur. *Batades* vernaculè tum indigenæ tum Hispani illic vocat, Angli *Potades*, quibus illi tum ut cibo, tum ut veneris irritamento frequenter vtuntur. Singuli bulbi teretes, oblongi Napuni utrinque obtusum æquant, color pulchellus illis foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener quasi Milij delicatioris, aut Fabæ fresæ, eoque gustu insulsa sint nisi condiantur: cum sale, aceto, & oleo

Batades.

Forma.



*Ignames.* oleo interdum eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis. Hisce congeneres sunt & persimiles quæ ab Hesperia, Æthiopia, & Guinea afferuntur, Ignames vocatæ: folia vtrisque hederacea & maluacea esse dicuntur. De his plura in horto diximus. Integram tamen plantæ iconem & historiam ex Clusio adscribere operæ pretium fuerit. Veteribus plāta hæc ignota fuit, ideo nullum nomē Græcum aut Latinum proditum. Hispani & indigenæ, vt diximus, vocant Battades, atq; etiam Camotes, & Amotes, quidam etiam Aies, tamen si nonnihil, vt aiunt, inter se differant, sitq;

*BATATAS, Clusij.*

Battatas radix longè & suauior & tenerior. Tria plantæ huius gênera in Betica se obseruasse ait Clusius, colore externo inter se differentia, arque etiam gustus suauitate. Nam aut cortex externus rubescit siue purpurascit (& hoc genus præstantissimum censetur) aut pallet, aut candidus est: omnes verò radices intus albæ. Producit autem Cucumeris satiui modo sarmenta, per humum sparsa, satis crassa, & succulenta, & læuia, in quibus folia vtrumq; carnosæ, ex viridi caducantia, Ari foliis, seu potius Spinachij haud dissimilia: radix dodrantalis est, Raphani prægrandis nonnunquam amplitudine, vtrinque obtusa. Sponte nascitur in Nouo orbe vicinisque insulis, vnde primum in Hispaniam delata est: nunc verò multis

*F A A L I M,*  
*Theueti.*

*Cosmo. T.*  
*lib. 4. c. 7.*

Beticæ maritimis locis seritur in taleolas dissectæ: principatum autem obtinet Malacæ nata Editur ab ipsis incolis aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in deliciis, ob saporis iucunditatem & teneritatem, præsertim si in cineribus cocta, & exteriore pelle repurgata, & in taleolas secta ex pauxillo vino, stillatitiiq; rosarum liquoris & sacchari momento edatur.

*F A A L I M Theueti. CAP. CXXXIX.*

**E**LEONIO, vt narrat Theuetus, foliis præsertim similis est herba quæ Faa lim vernacula lingua nuncupatur in Mombaze insula, olerum optimorum & simplicium medicamentorum omnis generis feracissima, atq; eorum potissimum quæ venenis serpentium omnium, quibus regio hæc abundat, aduersantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus comorsis à serpente partim in aquis, partim in terra degente, quam illic *Alefah* vocat: cuius morsus adeo lethalis est, vt nisi statim succus huius herbæ admoueat, necesse sit hominem interire.

*LIGNO*



**B**INAE stirpes tradente Acoſta in Malabar inueniuntur plurimùm diſſimiles cum forma, tum naſcendi modo, vno tamen eodemq; nomine nuncupatę Lignum Colubrinum, quod ſingulę mirum, in modum vtilis ſint aduerſus colubrorum morſus. Prior naſcitur Hederae modo, colore Dracunculi maioris, ſiue Serpentaria: folia illi ſunt Bryoniae ferè ſimilia, integra tamen initio, neruoq; prædita per longitudinem excurrente, & quinque aut ſex venis in latera vergentibus: ſucceſſu temporis accedunt exigua foramina, quę paulatim cum foliis incrementum ſumunt donec tandem omnino folia ſcindant, eaq; vitis foliis ſimilia reddant: conſpiciuntur enim interdum in eadem ſtirpe folia integra, alia exiguis, nonnulla maioribus foraminibus prædita, omniaq; adeo inter ſe diſſimilia, vt minimè eiufdem plantę folia eſſe videantur. Tantam verò habet hoc lignum cum colubro ſimilitudinem, vt qui non norit, aut de die viderit, ſi ad Lunę ſplendorem noctu conſpiciat, viuum colubrum eſſe exiſtimet. Vulgò cenſetur præſtantiffimum remedium aduerſus colubrorum & viperarum morſus: incolę ſanè, dum in agros tendunt, magna ex parte circumferre ſolēt hoc lignum (ſunt enim in ea prouincia multę viperę, varięque ſerpentũ genera) aiuntque ſolo eius odore ſerpentes fugari: & ſi dum colubros venantur, eos attingere hoc ligno queant, ilico rumpi & extingui. Altera admodum breuis eſt & tenuis,


LIGNVM Colubrinum

I. Acoſta.



LIGNVM Colubrinum

II. Acoſta.



triaq; ſolummodò folia habet mollia, leuia, ſaturatiùs virentia: florem aut fructum non conſpexi, nec quenquam inueni qui ſe vidiffè aſſereret: radix oblonga & tenuis eſt, minimo digito minor, hinc inde nonnunquam extuberans, & ſumma telure ſerpens: exterior eius cortex valde tenuis eſt & cinereus, nullo, dum guſtatur, maniſeſto ſapore præditus, deinde tamen guſtum in ore relinquens ſuauem, & vt Moſchus odoratum. Fiſſus eſt vndiq; hic cortex, & ſponte ſeſe expedit ab alio craſſiore flauoq; cortice ſubtus naſcente, qui odorem Loti ſilueſtris ſiue Triſolij odo-

Zzz



*LIGNVM Colubrinum,*  
*Acosta.**Vires.*

rati vulgaris refert, & saporem Glycyrrhiza dulcior-  
rem: præmansus autem odore admodum suavi, nec  
iniucunda mordicatione, momentanea tamen prædi-  
tus esse deprehenditur. Ipsa materies lignosa est, candi-  
da, dura & insipida: folia Napi saporem referunt: ger-  
men producit hæc radix supra terrâ circiter quatuor  
vncias longum, in caput extuberans. Nomen huius  
plantæ apud Canarinos est *Duda Sali*. Trita radix cum  
aqua rosacea aut vulgari, vel cum vino (indifferenter  
enim vtuntur) præsens certumq; asserunt remediũ ad-  
uersus omnis generis serpentũ morsus. Plurimus etiã  
eius est vsus in febribus continuis, tertianisq;, syncope,  
ventriculi debilitate, & cordis tremore: daturq; aduer-  
sus omnis generis venena. Multi mihi sanctè affirma-  
runt dummodò manu hanc radicem tenerent, nullos  
serpentes, vel alia similia virulenta insecta formidare,  
& certissimum esse serpẽtes & viperas eius aspectum  
minimè ferre posse, sed fugere, celerrimèque in aliam  
partem sese proripere, si quis ante serpentes eam pro-  
iiceret. Perutilis etiam censetur iis quibus anhelitus ab  
ore vitato aut dentibus corruptis fœtet, modò eam  
continuò mandant, dentiumq; cauis gestent. Prouenit  
locis humidis, & inter arbores, præsertim verò secun-  
dum eas quæ *Angelins* nuncupatur, nec procul à mari. Inuenitur & tertium Colu-  
brini ligni genus in eadem prouincia, vastæ arboris magnitudine, de quo in alio  
libro agemus. Neutrum verò, inquit Clusius ad superiora Acostæ, horũ ligni Co-  
lubrini generum cum Garcie ligno colubrino cõuenire faciliè animaduertet, qui  
vtriusque descriptiones diligenter conferet. Secundi verò generis Garcie descri-  
pti fragmentum quinque vnciarum longitudinis, quòdque, vt coniicere licebat,  
duarum vnciarum crassitudinem æquarat, mihi nõ modò ostendit Londini anno  
1581. C.V.D. Hector Nunez Medicus Lusitanus, sed etiam dimidia eius parte libe-  
raliter donauit. Eius porrò materies firma est, candida, venis quibusdam distincta,  
nõ dissimilis Fraxini ligno, cortex autem qui eam integrit candicans, & quasi cine-  
reus. Vtraque verò, si quis degustet, amaro sapore prædita esse deprehenditur. Eius  
fragmenti iconem lectoris oculis subiecimus.

## DATVRA.

## CAP. CXLI.

*Genera.*

**I**TA sunt huius plantæ genera, quorum quo frequentius vtuntur,  
primo loco describemus: eius enim adeò vulgaris est vsus, vt pauca  
sint meretrices, quæ inter sua *κρυπτα* illud non recondant, ob eas  
quas postea subnectemus causas. Primũ Althææ magnitudine cau-  
lem habet, nec admodum illi dissimilem, in plures tamẽ ramos diuisum: folia cum  
magnitudine tum forma Stramonie foliis similima, verũ magis in circuitu ser-  
rata, vtiferè Xanthij folia: flores albos, Smilacis læuis (quam Hispani *Correguela ma-  
yor*, hoc est, Conuoluulum maiorem appellant) floribus omniño respondentes:  
fructum Stramonie, rotundum, nucem Iuglandem magnitudine æquantem, viri-  
di colore præditum, & spinis mollibus, minimèq; pungentibus vndique septum,  
plenum semine Lenticulæ simili, eiusdemq; coloris, cordis humani effigie, gustus  
amari: radicem albam, Raphani odore, quæq; si diu naribus admouearur, sternuta-  
menta ciēt, cuius cortex nonnihil amaricat, minùs tamen eo qui caulem & ramos  
ambit.



DATURA, *Acosta.*

ambit. Nascitur vmbrosis locis, & secundum *Locus.*

aquas. Nomen huic plantæ in Malabar est *Vn-*  
*mata caya*, in Canara *Datiro*, apud Arabes *Mara-* *Nomina*  
*na*, apud Persas & Turcos *Datula*, apud Lusita-

nos *Datura* & *la Burladora*, hoc est, faceta. Litera-  
 ti pleriq; atq; etiam maxima pars Medicorum  
 istic degctium, legitimam Nucem Methel Ara-  
 bum esse censent, frigidamq; excessu tertio, & sic *Temper.*  
 cam secundi fine constituunt. Mala inualuit cõ- *& Vires.*  
 suetudo apud impudicas mulieres, vt huius fe-

minis in puluerem triti dimidiam drachmā ex  
 vino, aut alia quæ magis arridet materia præ-  
 beāt: miser qui eum hausit diu velut mente alie-  
 natus remanet, aut ridens, aut eiulans, aut dor-  
 miens, plerumq; etiam alteri colloquens & re-  
 spondens, vt interdum etiam sana mente prædi-  
 tum esse credas, tamen si mentis non sit compos,  
 neque eum agnoscat cum quo sermones cõfert,  
 & colloquij habiti planè sit immemor, postquā  
 ad se rediit. Sunt verò nonnullæ adeò exercitatae  
 in hoc medicamento exhibēdo, idq; sic tempe-  
 rare norunt, vt ad certas, easq; quot velint ho-

ras, quibus id propinant, mentem adimant. Multa sanè eius rei exempla, quæ vel  
 ego ipse vidi, vel ab aliis audiui, huc adducere possem, sed cū ad rem nihil faciāt  
 prætermittenda esse duxi: illud solum addam, neminem qui simile sumpssset, ne-  
 catum vnquam comperisse, tamen si nonnullos conspexerim per aliquot dies per-  
 turbatos ferri, quod fortè acciderat ob immodicam quantitatem exhibitam: quæ  
 si fuerit nimia, interimit, quoniam hoc semen perniciosā qualitate non caret, li-  
 cet Gentiles ad prouocandas vrinas cum Pipere & folijs Berele id exhibere soleāt,  
 & perutile esse dicant. Ego verò nunquam obseruaui, nec experiri volui, cū alia  
 medicamenta ad eam rem vtilia non desint. Porro si ad eorum qui hoc semē hau-  
 serunt curam euocentur Hispani Medici, medicamēta vomitum cientia exhibēt,  
 vt quidquid in ventriculo hæsit reiiciant, acres deinde clysteres iniiciunt ad eua-  
 cuandum, fortèq; ligaturas adhibent ad diuertēdum, tum etiam cucurbitulas ad-  
 ponunt & venam secant. Gentiles verò Medici & Christiani indigenæ cū a cu-  
 curbitulis & venæ sectione abhorreant, nihil aliud quàm vomitum prouocant,  
 fortèq; ligaturas & fricationes adhibent, quæ si non sufficiant, balnea ex aqua ca-  
 lida præscribunt ad eliciendum sudorem: porro à vomitu vinum propinant, cui  
 Piper & Cinamomum admiscunt. In cibis verò audaciores sunt Hispani: namque  
 euacuata materia gallinas edendas præbent, & vinum dulce, aut passum exhibent.  
 Radicis Daturæ drachma ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia  
 insomnia, & miræ rerum facies obuersantur. Semine verò per noctem in aceto  
 macerato, deinde exactè trito, vtiliter illinuntur herpes miliares & erysipelata  
 serpentina: nam breui sanantur. Quantum ex superiore Daturæ primæ descriptio-  
 ne colligere licet, eandem esse cum Turcorum, qui Constantinopoli viuunt, *Tatu- Tatula.*  
*la*, cuius vsus illis perquàm familiaris est, existimat Clusius. Reliqua duo genera  
 facie & fructu superiori ferè respondent, sed flores colore variant: etenim secundi  
 flores, licet forma priori sint similes, colore tamen flauo sunt, & secundum pedi-  
 culum nonnihil rubent: tertiij flores Hyoscyami floribus magis accedunt. Cæte-  
 rum neutro ex postremis duobus vtuntur, nisi ad necem inferendā. Nihilominus



tamen Brachmenes Medici ex secundi semine (quod floribus est flauis) cataportia faciunt, granorum Piperis magnitudine, magnæ sanè efficaciæ ad sistenda alui profluuia, quibus adiuncta sit febris ardens, atque etiam in dysenterijs. Fiunt verò hunc in modum cataportia. ꝯ. feminis secundi generis drachmam vnam, Piperis nigri & longi, Sandali albi, Atincar, radicem *Bisa* (adfertur ea ex Bengala & Patanne montibus) foliorum Banguæ, singulorum dimidiam drachmam: omnia ista diligenter cum aqua terunt in marmore, quo pictores suos colores terere solent, deinde cataportia efformant, è quibus exhibent quantum commodum videtur. Mea est cum aliis plerisque opinio, vt nucem Methellam Stramonie fructum esse credam, qui per omnia similis est fructui Daturæ: atque si nonnihil ab eo differt, id locorum varietati adscribendum cenfeo.

## BANGVÆ. CAP. CXLII.



BANGVÆ simile ferè est Cannabi, cuius Dioscorid. lib. 3. meminit. Caulem habet quinque palmorum longitudine, quadrangulum, colore dilutius virente, fractu contumacem, nec adeò concanum, vt cannabinus caulis, cuius cortex non minus quam illius in fila diduci potest: folia cannabina superne virentia, inferne incana lanugine pubescètia, gustu terre-

## BANGVÆ.



## Nomina

auctore Dioscoride loco suprà dicto Cannabis calida & sicca est, & genituram extinguit. Dicitur Arabibus *Axi*, Persis, Decan & plurimarum aliarum regionum incolis *Banguæ*, Turcis *Asarath*. Sed & hoc Banguæ, vt scribit Clusius, plurimam affinitatem habere videtur cum Turcorum Constantinopoli degentium *Asiæ*, quo ad varios effectus vtuntur: nonnulli etiam vescuntur excitandæ venis gratia.

HERBA



## HERBA VIVA. CAP. CXLIII.

**N**ONnullis Asiæ locis planta quædam inuenitur, vulgò *Herba vi-*  
*ua* nuncupata, à circumforaneis illis *logues* appellatis *Herba amoris*, ab  
 Arabibus & Turcis *Sulu*, & à Persis *Suluque*. Exiguam habet radi-  
 cem, è qua supra terram exiliunt octo ramuli duos digitos longi, fo-  
 liis vtrinque in ordinem digestis & inter se respondentibus onustis, quæ plurimum

Nomine

Forma.

## HERBA VIVA,

Acosta.



Locus.

ad Erui tenella folia accedunt, nec dissimilia  
 sunt foliis prioris Polypodij, cuius iconem La-  
 cuna exhibet lib. 4. cap. 187. sed longè tenuiora,  
 & vtrinque læuia, & grato virore oculos pa-  
 scentia, vti Tamarindorum folia: è medio radi-  
 cis capite exiliunt pedunculi (nam caule caret)  
 quatuor, singuli suum florè sustinentes flauum,  
 aspectu pulcherrimum, minoribus Caryophyl-  
 leis similem, sed sine odore. Nascitur calidis &  
 humidis locis. Adeò mira est huius plantulæ na-  
 tura, vt eam humana ratio assequi nequeat.  
 Nam cum maximè viret, gratissimæque est aspe-  
 ctu, si quis illà apprehendere cupiat, illicò folia  
 contrahit, atque sub tenues ramulos recondit:  
 si verò apprehendat, subito adeò marcida con-  
 spicitur, vt exsicari putet: sed quod maiore ad-  
 miratione dignū est, si manum retrahat, illicò  
 nitorem recuperat, & toties marcescit aut reui-  
 rescit quoties comprehenditur, aut manus ab  
 ea retrahitur. Mihi autem relatum est Philo-  
 sophum quendam in Malabar, dum nimis cu-  
 riosè huius plantæ naturam obseruare cupit,  
 amentem esse redditum. Plantam ego conspe-

xi, eamque cum suo cespitè, ipsam minimè contingens, erui, & in hortum quen-  
 dam transtuli, vbi permansit, at fatuum minimè vidi. Interrogat à me nonnulli  
 indigenæ Medici, an aliquas huius plantæ facultates perspectas haberent, illam-  
 que in vsum medicum adhiberent, affirmarunt vtilem esse ad virgines corruptas  
 in integrum ( si credere fas est) restituendas & ad reconciliandum amorem miræ  
 esse efficaciam. Gentilis Medicus, & pro ea regione satis doctus, cum adeò cupidum  
 cognoscendi huius herbæ facultates conspiceret, ait, vnā se edocturum adeò  
 compertam & certam, vt ceruicem pro pignore deponeret, nisi eam sic se habere  
 comperirem. Nempe vt illi cuiuspiam mulieris, qualiscunque etiam status, nomē  
 modò indicarem, se effecturum vt illa in omnibus mihi obsequeretur, dummodò  
 ex ipsius præscripto herba vterer. Sed conditionem respui quādoquidem res adeò  
 illicita esset. Nihil igitur aliud post diligentem inquisitionem de hac planta intel-  
 ligere potui, quā apud Gentiles, præsertim verò Brachmenes Canarinos & Io-  
 gues in magna æstimatione esse. Quodam die mihi accidit plantas conquiriti  
 non procul à flumine Mangate, vt Gentilem quendam humi sedentem, & verba  
 quædam obinmurmurentem, tanquam oraret, fortè conspicerem, quem cum com-  
 pellassem, nihil respondit, sed meo interpreti, quem comitem duxeram, manu  
 duntaxat innuit: is hominem intelligens, celeriter sese inde proripuit, meque se-  
 cedere iussit, inquit, Gentilem illum incantatorem esse cuiusdam illius regionis  
 Capitanei quem *Caymal* appellant, & istic sortes iacere supra Herbam viuam, id



fieri solere repurgato prius circa ipsam plantā solo ad hominis longitudinē, recitariq; quædā concepta verba, & expectari primā aūc aut rem animatam quæ istā plantā prætergrederetur dum verba obmurmuraret, cuius sanguine (si cōprehendi posset) perluenda esset, sin min⁹ alterius eiusdem speciei, idq; cum multis ceremoniis, quas prætermitto, cū indignæ sint vt scriptis mandentur. Conspexi deinde istam plantam siccam inter supellectilem mulieris prostitutæ pudicitia.

## HERBA MIMOSA. CAP. CXLIII.

Locus.

Forma.

Nomen.



LI A planta inuenitur in quibusdam hortis, quinque palmorum longitudinis, & vicinis arbutis aut parietibus incumbens, tenui caule, eleganti virore prædita nec admodum rotundo, per interualla exiguis & pungentibus spinis obsito, foliis superioribus haud absimilibus, Filicis fœminæ foliis minoribus. Gaudet humidis & petrosis: & *Herba mimosa* nuncupatur, quoniam manu admodum lenescit & marcescit, manu verò remota pristinum virore recipit, sed non adeo celeriter vt prior. Naturam habet plurimum ab Arbore tristi differentem: nam singulis noctibus Sole occidente senescit & siccatur quodammodo, sic vt contabuisse videatur: oriente verò Sole vigorem denuo recipit, quantoque Sol magis feruet, eo magis virescit, totoque die folia ad Solem conuertit. Odore & sapore est Glycyrrhiza: vulgoq; ab indigenis folia manduntur aduersus tulsim,

ad pectus repurgandū, & vocem clariorem: renum etiam doloribus vilis esse censetur, & recentia vulnera glutinat. Multis notis (annotat Clusius) hæc planta cōuenit cum Fœnogræco siluestri Tragi, siue Polygalo Cordi & Glycyrrhiza siluestri Gessneri, cuius folia & radices degustata Glycyrrhizā sapunt: nam eius folia noctu interdū contrahuntur (quod in multis leguminaceis plātis vsu venit) at spinis caret caulis, nisi pro spinis sumere liceat tenues illas & mucronatas appendices sedū foliorum alatorum inhaerentes.

## HERBA MALVCANA. CAP. CXLV.

Forma.

Nomina.



VORVM aut trium cubitorum longitudinem adquirit hæc planta, nonnunquam etiam locis vberioribus & humidis, quinque cubitos superans, eleganti virore prædita, caule tenui, tenero, nonnihil conuoluto, imbecillo, & nisi vt lasminum pergulis sustineatur, humi sese diffundente, quemadmodum Hedera, & multos ramos spargente, qui subinde radices agunt vt Mentha & Melissa phyllon, adeoque serpunt, vt planta sola vel ramus transpositus breui temporis spatio magnum locum occupet: folia habet renella & mollia, in ambitu serrata, magnitudine & forma Sambuci foliis respondentia: florem croceum Chamameli flori admodum similem, paulo tamen maiorem. Toto anno virescit & luxuriat. Vulgo nuncupatur Remedium pauperum, & Destructio Chirurgorum, Canarini *Brungara aradua* appellat, id est, quæ flore est croceo. Frequenter videntur cū in Maluco (vnde primam originem traxisse creditur, quod illic abunde nascatur, & plurima admisceatur chirurgicis remediis) tū in omnibus Indiæ prouinciis, in quibus diligenter colitur, & in pretio habetur, nec iniuria. Coquuntur huius plantæ folia in oleo, & cum cera inspissantur



tur vnguenti modo. Mirificè curat id vnguentum omnis generis vlcera cùm recentia tum antiqua, etiam si sanguinolenta, sordida, cuniculosa, maligna & putrida sint: mirè esse efficaciam deprehendi in tibiærum vulneribus inueteratis, & recentibus vulneribus. Alia est præterea huius stirpis vtendæ ratio. Eius enim caulem & ramos superiore cortice denudant, & sumunt membranam illam tenuem quæ media est inter exteriorem corticem & caulem, quæq; facili, vt in Cannabi, reuellitur: eam oleo nucis Indicæ madentem, ipsius plantæ foliis inuoluunt, & sub

*MALVCANA*, *Acofta*.



cineribus calidis recondunt: vbi incaluerit & emollita fuerit, conterunt, & recentibus cruentisque vulneribus imponunt seu grandia sint, seu minora: & paucis diebus non sine admiratione conglutinant absque vlla inflammatione aut apostemate: lenit enim dolorè, sanguinisq; fluxum cohibet, breuiter, nullo alio medicamento adhibito omnino ad cicatricem perducit: singulare etiam perhibent esse remedium aduersus neruorum punctiones, & vulnera. Eodè præterea modo adhibetur in apostemate aperto ad emundandum, carnem generandum, & ad cicatricem perducendum: item in inueteratis vlceribus & cuniculosis, in quibus ea solummodò trita interdum apponitur. Porro quoniam ista remedia huius plantæ certissima sunt, vulgariter iis vtuntur in vniuersis illis prouinciis, & magna habent in æstimatione: multi præterea alij qui inde nauigant vnguentum ex hac herba cum oleo & cera confectum, secum efferre solent, tantam fiduciam in eo collocantes, quasi omnia chirurgica remedia, apud se haberent: itaq;

quacumq; occasione in qua chirurgorum opera requiri posset, subito ad vnguentum ex herba Malucana confectum confugiunt, tanquam indubitatum remedium.

*SARGAÇO.*

[CAP. CXLVI.]

**N** CELEBRI illa nec minùs metuenda nauigatione *del Sargaço* (sic *Locus.*) enim totum illud Oceani spatium à decimo octauo gradu ad trigessimum quartum ab æquinoctiali ad Septentrionem tendens, qui in Indias nauigant, appellant) cōspicitur profundum & spatiosum aquor rectum herba quadam *Sargaço* nuncupata, palmum longa, tenuibus ramulis in glomos conuoluta, foliis angustis, tenuibus, & dimidiam vnciam longis, in ambitu admodum ferratis, colore subrufo, gustu insipido, siue insensibili mordicatione prædito, qui potius ex aquæ salugine contractus, quàm ipsi plantæ innatus videatur. Ad singulorum foliorum exortus inhaeret semen rotundum vt granum Piperis vani & vacui, tenui corallio albo, interdum autem corallio rubro & albo omnino elaboratum, tenerum admodum dum primum ex aqua educitur, & durum si exsiccare sinatur, sed propter tenuitatem admodum fragile, salsa aqua plenum. Nulla radix in hac planta cōspicitur, sed sola rupturæ vestigia apparent, atque in profundo arenosoq; maris aluco nasci, tenuisque radices obtinere credibile est, tamen nonnulli opinentur rapido aquarum, quæ ex multis insulis in Oceanum influunt, cursu istam herbam euelli & simul trahi. Cùm eam opinionem pertinaciter tueretur nauculus illius nauis qua vehebat, subortaque esset inter nauigandum hoc mare malacia, quantum acies oculorum extēdi potuit, id vndiq;

*Forma.*



SARGAÇO, *Acosta.*

Vires.



ista planta contectum vidimus, demissisq; nonnullis iunioribus nautis qui eam herbam à naui propellerent, aquamque repurgarent, apertè conspeximus eius herbar glomios simul implexos ex alto mari emergentes, vbi demissa bolide nullus fundus tentari potuit. Hæc planta aceto & sale condita eiusdem saporis est cum Crithmo, siue Fœniculo marino, & in eius penuria sumi posset, tum etiam Capparum loco à nauigantibus edi. Iussi illam recenter è mari sumptam capris quas in naui vehebamus obici, & auidè sanè vessebantur. Nullas eius facultates comperi, sed quidam è nostris nautis vrinæ difficultate laborans, & arenulas crassosque humores eiiciens, crudam eam & coctam fortè edit, quoniam illi bene saperet paucos post dies affirmavit mihi, magnum ex illius esu se sentire commodum, secumque detulit, vt peracta nauigatione in continenti vteretur. Considerandum Clusius admonet, an non sit Lenticula marina ferratis foliis Lobellij, cuius iconem inter marinas stirpes ad Obseruationum calcem exhibet.

## GRANADILLA.

## CAP. CXLVII.

Nomen.

Forma  
planta.

ALIVS mihi ex continenti herbar fructus est (ait idem) quæ in Peruanis montibus, vbi sponte nascitur, *Granadilla* appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum nostris Malis granatis habet, nam eiusdem ferè est amplitudinis, atque etiam coloris, quando maturus est, nisi quod corona careat: nunc in siccatu, sonitum edit semen intus oclusum, quod Pyri semini simile est, aliquantò maius, tuberculis quibusdam eleganter elaboratum, & aspectu iucundum: pulpa candida est & saporis expers. Planta hunc fructum ferens Hederæ similis est, eodemque modo repit & scandit quocunque loco ponatur. Elegans est cum fructu onusta cõspicitur, propter eius amplitudinem: florem habet albæ Rosæ persimilem, in cuius foliis aliquæ veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciuntur, quas magna diligentia istic pictas existimes: eam ob causam elegantissimus est flos. Fructus ipse sunt Granatula iam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiuntur vt oua, & liquor ille cum magna voluptate sorbetur cum ab Indis, tum ab Hispanis: nec etiam si multos forbeas vllam ventriculi grauedinem sentis, sed potiùs aluum emolliri. Herba rara est, quæ duntaxat vno in loco inuenitur. Fructus temperatus esse videtur, & aliquantulum humidus.

## FLOS SANGVINEVS. CAP. CXLVIII.



SEMIEN ex Peru delatum terræ commisisse, vt eius elegantiam potiùs conspiceret, quàm quòd vlla medica facultate præditus esset, scribit Monardes. Ipsa planta duos circiter palmos assurgit, ramis rectis, quos ambiunt rotunda & tenuia folia admodum virentia: flores in summis ramis nascuntur aureo admodum colore fulgentes, quinque foliis cõstantes, in quo



in quorum singulis sanguinea & maximè rutilans macula impressa est, oblongo cucullo extremos flores occupante & longè prominente. Elegans est flos, ad pen-  
siles hortos exornandos aptissimus: nam & semine & surculis faciliè nascitur.  
Gustatus eodem sapore & odore quo Nasturtium esse deprehenditur: insigniter  
calidus est.

PAYCO.

CAP. CXLIX.



ED & herba quædã ipsi ex Peru missa est, istic Payco nūcupata, cuius  
folia Plantaginis foliis cū forma, tum colore sunt similima, quæ  
siccata, admodū tenuia sunt, & gustata valde acria calidāque de-  
prehenduntur. Eius puluis ex vino sumptus, nephreticum dolorem è  
flatibus, aut frigida causā prouenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri  
in modum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum  
esse ipsa experientia didicisse testatur.

Vires.

HERBA AD RENVM MORBOS  
UTILIS.

CAP. CL.



LIA item, inquit, missa est, admodū utilis ad renum affectus è cali-  
da causā natos, illito parti dolenti eius succo cum rosaceo vnguento  
mixto, & foliis ipsius plantæ superimpositis. in erysipelate & inflam-  
mationibus succus impositus valde confert: nam inflammationem  
tollit, & dolorem mitigat. Sunt verò ea folia quasi Lactucæ primū enatæ &  
tenuioris, similiq; virore præditæ, quæ gustata insipida deprehenduntur, sic vt  
herba perfrigida videatur.

LACTVCA SILVESTRIS PYMILA  
CAP. CL.



LIA præterea herbam attulerunt, Lactucam siluestrem vocatam:  
cuius folia Lactucæ foliis sunt similia, ex atro virentia. Vires idem  
subiungit. Dentium enim, ait, dolorem tollit foliorum decoctum,  
& diutius in ore, quā parte dentes dolent, retentum. Idem præstat fo-  
liorum succus dentium cauis instillatus, herba trita superimposita. Sapore admo-  
dū amaro est: calidiorem existimo, quā in primo gradu.

HERBA AD RVTVRAS UTILIS.  
CAP. CLII.



AVLVVM cuiusdam plantæ sibi idem missum fuisse narrat, cuius  
formam, quòd ob siccitatem omnino contracta & comminuta esset,  
obseruare non potuit. Hanc, inquit, scribunt miram habere facul-  
tatem in rupturis cū puerorum tum adutorum, & rem ita se habe-  
re asserunt. Ea vtitur Indus quidam recenti contusa & rupturæ imposita, adhibi-  
to deinde miro quodam ligaturæ genere: quoniam etiam sine braccis non minùs  
firmiter ligati incedunt, quā si braccati essent, vt mihi retulit quidam qui simi-  
li morbo liberatus erat eius plantæ & ligaturæ vsu. Talem ligaturam (si adeo fir-  
ma sit vt ille referebat) solam sufficere posse existimo, nulla herba aliā re im-  
posita: quoniam hīc quendam Cordubensem conspexi, qui omnes herniosos sola  
ligatura curabat, nullis adhibitis braccis: quod verissimum est, & hīc adhuc viuunt  
qui ab eo curati fuere.

VERBE



Locus.

Forma.

Vires.



CRIPSIT mihi (verba sunt Monardis) nobilis ille vir ex Peru, secundum flumina è montibus eorum regnorum delabentia plurimam Verbenam crescere, illi quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, qua Indi in multis morbis curandis vtuntur præsertim aduersus omnis generis venena, & in his qui in cibis toxicum aut simile aliquid hauserunt. Nobilis quædam matrona ex Peru rediens mihi asseruit se multis annis ægram fuisse, cumque plurimorum medicorum opera vñ fuisset, Indum tandem quendam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat, Verbenæ succum depuratum illi propinasse, à cuius vñ post paucos dies lumbricum eiecisset (colubrum ipsa nuncupabat) hirsutum, pede longiorem, crassum, cauda bifida, deinde omnino conualuisset. Ipsam porro nobili cuidam viro in Peru, qui continuè ægrotabat, singulis diebus manè eundem succum saccharo permistum sumere persuasisse, (ita enim ipsa hauserat ob amorem) illum deinde plurimos lumbricos reiecisse longos, tenues, atque inter cæteros vnum albi cinguli instar longissimum, & tum demum integram valetudinem recepisse. Id postea consilium plurimis aliis qui malè affecti erant, & lumbricos habere suspicio erat, dedit, qui omnes sumpto Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecerunt, & sanati sunt. Illud remedium adeò certum affirmabat, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi grauitatem philturum, aut medicata pocula hausisse diceretur, quiq; epoto Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reiecisset, quæ medicata pharmaca esse asserabant, deinde conualuisse. Quod verò ad incantationes & medicata pocula attinet, quod ego vidi hîc subiiciam. Ioannis de Quintana Dueñas primarij ciuis famulus vomitu reiecit me præsentem magnum tenuium & spadicorum capillorum glomum, adseruabatque in papyro inuolutos plures alios quos binis horis antè euomuerat: quibus reiectis nulla amplius molestia torquebatur, præter eam quam vehementer vomitus induxerat. Ioannes Langius Medicus Germanus vir doctissimus refert mulierem se vidisse plurimùm de ventriculi dolore conquerentem, reiectis multis vitri & murrhinorum vasorum fragmentis atque piscium spinis, sanitatem esse adsequutam. Aliud simile exemplum refert Beniuenius, libro de Morbis mirandis. Sed quod maiorem mihi admirationem parit, est: Agricola, grauissimis ventris doloribus afflictum, cum nullis medicamentis mitigari dolor posset, sibi cultro guttur præcidisse: eius deinde cadauer cum secuissent & aperuissent, inuentam in ventre fuisse magnam similibus capillorum, quales superiorem vomitu reiecisse dixi, quantitatem, & ferrea fragmenta. Has ego res dæmonis præstigiis tribuo: nam ad naturalium classem referri minimè possunt. Clusius tamen non dissimilia superioribus, nec minùs mira, duo exempla affert, ne quis tantum illa Monardi credat. Accepisse verò primùm se ait à Francisco Zinnig Serenis. Principis Matthiæ Archiducis Austriæ, &c. pharmacopœo cum in sua arte peritissimo, tum diligentissimo: alterius ipse est testis. Lucas Farel, inquit, eiusdem Principis coquus, qui primùm apud D. Mariam Hungariæ reginam, deinde apud Margaretam Parmensem ducem in simili ministerio fuerat, singulis interdum annis, nonnunquam semestribus, vel trimestribus interuallis, per annum eiecit tenuem quandam lentamque materiam, angusti cinguli instar oblongam, candidam & crispam, non eam quidè continuam & integram, sed quam per fragmenta sex, duodecim, atque etiam quindecim vñs longa eximere cogitur. Solet verò ante symptomata plerumque grauem in pectore sub dextra mamilla dolorem perperi, quem vt leuet, aggregatiuis catapotiis corpus purgat, eamque, quam dixi, materiam



materiam excernit, tum demum morbo liberatur. Is verò, quoniam plerumque tanta capitis grauedine afficitur, vt domo egredi, aut quoquam prodire nequeat, ex quorundam consilio Verbenæ radicem collo appensam gestat. Et mox de capillorum eiectis glomis. Simile, inquit, exemplum ante multos annos accidere memini lreconsulto N. Vlierden celebri apud Antuerpianos causarum patrono, qui certis anni temporibus materiam in multos veluti muliebrum capillorum glomos congestam per aluum excernere solebat, qua reiecta melius habebat: nam alioqui macilentus pallensque semper cùm esset, aduersa valetudine ante ista symptomata plerumque corripiebatur.

HERBA MORTEM AVT VITAM IN MORBIS  
PRAEVENIENS. CAP. CLIIII.

**A**NNO 1562. Comite de Nieua in Peru commorante, in eius familia mulier quædam illi inferuens maritum habuit graui morbo decumbentem, cuius causa cùm ipsam admodum tristem Indus quidam primarius conspiceret, interrogauit an scire cuperet, vtrum ex eo morbo periturus esset, an superstes futurus maritus, herbarum ramum se illi missurum, quem in mariti sinistra manu poneret, eamque deinde diutius comprimeret: nam si superstes futurus esset, quamdiu eam herbam manu teneret, alacrem & letum, sin moriturus, mœstum & anxium fore. Missum ab Indo ramum marito in manum dar, comprimeréque iubet: sed illicò tanta mœstitia & anxietas ipsum oppressit, vt illa, metuens ne subito extingueretur, ramum ex manu tolleret & abiiceret: is deinde paucos post dies extinctus est. Cupienti mihi, inquit Monardes, an ista vera essent perscrutari, nobilis quidam, qui multis annis in Peru vixerat, certum esse affirmabat, & vtitum esse apud Indos in ægitudinibus id facere, quod sanè magnam mihi admirationem attulit.

COCA. CAP. CLV.

**S**CRIBIT idem, cùm tam multis annis celebrem illam apud Indos plantam, quam *Coca* nuncupant, & tanta cura & diligentia serunt, atque colunt, quoniam omnes eam in quotidianos suos vsus & oblationes conuertunt, videre cuperet, ad se perlatam esse. Est verò *Forma* ea, vt tradit vlnæ magnitudine, foliis Myrti paulò maioribus (quæ veluti aliud folium simili forma in meditullio delineatum habent) mollibus, dilutiùs virètibz: fructu racematim coherente, vti Myrti fructus rubente quando maturescit, eiusdemque magnitudinis, quando verò plenam maturitatem adeptus est, nigricante: tum verò herbarum est mæsis, quæ collecta in canistris, aliisque rebus, ad exsiccandum reponitur vt melius conseruari & in alias partes transferri queat: nam è montibus in alios montes defertur mercimonij gratia, proque aliis mercibus commutatur, vestibus, gregibus, sale, & aliis rebus, quia illis pro pecunia est. Reconditur semen in Mastiche, atque inde exemptum alibi seritur in terra bene culta, per suos ordines & series, vt apud nos Fabæ, aut Pisi. *Usus* Vulgaris est eius vsus inter Indos ad multas res, tum ad eas quæ ad iter necessariae sunt, tum quæ ad voluptatem in suis ædibus seruiunt, hoc modo. Conchyliis, aut ostreorum conchas vrunt, & calcis modo comminuunt: folia deinde Cocæ dentibus atterunt, & subinde puluerem illum Conchyliorum vstorum admiscunt, & simul quasi fermentant, vt tamen minor sit calcis quàm foliorum quantitas: ex hac massa trochiscos, seu or



feu orbiculos conficiunt, & ficcandos exponunt. Quando iis uti volunt, vnum orbiculum in ore sumunt, eumque exugunt, subinde in ore nunc hac, nunc illac versantes, & quamdiu possunt retinentes, vno absumpto alium sumunt, deinde tertium, sic pergentes toto tempore quo iis in longis itineribus conficiendis opus habent, præsertim si per loca fiant, vbi nulla, aut cibi, aut aquæ copia est, quoniam horum orbiculorum sorbitione, famē, sitimque sibi leuari, & vires sustentari asserunt. Si duntaxat voluptatis gratia uti volunt, solam Cocam mandunt, eamque in ore versant, donec omnis facultas absumpta sit, deinde aliam sumunt. At si inebriari, aut aliquantulum extra se rapi, & veluti mente alienari, Cocæ Tabaci folia admiscunt, atque simul mandunt & sorbent: ea ratione extra se feruntur veluti homines ebrii, magnam voluptatem inde capientes. Et profectò res admiratione non caret, inquit, conspiciere quàm isti Indi oblectentur mente & sensu quasi priuari, quandoquidem eius rei gratia Cocam cum Tabaco fumant, aut solum Tabacum, ut in secundo huius Historiæ libro de Tabaco diximus. Hæc Monardes. Sed & Benzo lib. 3. cap. 20. Cocæ in hanc sententiâ meminit, Peregrinè profecturi (de Peruanis loquitur) rubro quodam bitumine faciem oblinunt, herbamque ore clausam (Cocam ipsi appellant) velut panchrestum quoddam pharmacum circumferunt. Quippe eius præsidio freti, integrum diem, nullius nec cibi, nec potus egentes iter faciunt. Atque hoc quidem herbæ genus, earum rerum, quibus mercaturam exercent, præcipuum est.

## TVBULI AD ASTHMA UTILES.

CAP.

CLVI.

**Q**UAE DE Tubulis quoque ad asthma vtilibus, qui ex Hispaniola adferuntur, narrat eodem lib. simpl. medic. 3. Monardes, nullius melius quàm ipsius verbis, ut ea Clusius interpretatus est, intelligere potes. Aduchuntur è noua, inquit, Hispania Tubuli quidam Cannarum, interiore & exteriori parte quodam gummi illiti, quod meo iudicio Tabaci succo infectum est, & caput tentat: eo, ni fallor, cannam inungunt, utq; tenax est, firmiter inhaeret, colorisque nigri est, induratum autem non est tenax: incenditur Tubulus ea parte qua bitumen est, altera verò in ore sumitur, fumusque excipitur, qui omnem pituitatem & purulentos humores è pectore educit: eo verò vtuntur cum asthma se premi & veluti suffocari sentiunt. Primatem quendam, qui sapius asthma laborabat, eius vsu plurimum vtilitatis consequutum obseruavi: simile commodum ante ex Tabaci fumo percipere solebat: propterea aio Tabaci succum admixtum esse oportere: tutum autem vtriusque esse vsum ipsa experientia in multis docet. Nonnullos ægros & asthma vexatos ex India redeûtes obseruavi Tabaci folia viridia mandentes, & succum inde promanantem sorbentes ad purulentas materias expellendas, qui licet inebriarentur, plurimam tamen vtilitatem sensisse apparebat cum ad pus, tum ad pituitam pectori inhaerentem propellendam. Mirum est quàm insignes & variæ Tabaci facultates singulis adhuc diebus deteguntur: nam præter eas, quas secundo libro descripsi, tantumdem adhuc proferre possem, quas postea & referentibus aliis intellexi, & ipse obseruavi.

BALSA





A P P E N D I X  
HISTORIÆ GENERALIS  
PLANTARVM: CONTINENS

IMAGINES QVARVMDAM RARIORVM,

& paucis cognitarum, quæ è longinquis  
regionibus missæ fuerunt.



G. R. L E C T O R I.

**U**VM iam hac Plantarum generalis historia excusa propemodum tota esset, hinc inde alia quadam rara & paucissimis notæ, vel earum imagines, missæ ad me fuerunt: quas nullo modo ante, quamvis nulli nec labori nec sumptui parcens, nancisci potueram. Huius etiam boni quum te participem facere in hac ipsa editione, potius quàm alij referuare vellem (etiãsi hoc plerique mihi suaderent, ut isti mora longior non afferretur) eas quoque plantas, quàm fidelissimè & exactissimè fieri potuit expressas, in hanc Appendicem redegi: quum in sua quæque classe locum una cum cæteris habere non possent, utpote iam excusis. Quamobrem non est quòd dubites quin omnium plantarum, siue stirpium (id est, herbarum, arborum, & aliorum quæ illis nominibus comprehenduntur) veras iconas liber hic tibi sit exhibiturus: non solum quarum ab ullo scriptore facta mentio fuit, sed & quarum insuper notitia ad plurimos qui diuersas regiones incolunt, peruenire potuit: qui antea incognita fuissent. Siquæ tamen præter has omnes in manus meas venerint, ne is quidem te priuabo, simulque sumptu te non grauabo. Neque enim eas in alia totius operis editione, sed seorsum in secunda Appendice tibi dare decreui.

D E C A N E L L A.



**C**ANELLÆ arbor mali autææ amplitudine est, non *Forma.*  
nunquam maior, interdum minor, ramosa admodum,  
cuius teneriores rami recti sunt: folium Laurino simile,  
latius tamen, colore dilutiore, & minus siccum, tribus  
neruis insignitum: flos candidus, odoris propemodum  
expers: fructus siluestris oleæ baccis par, virescens initio,  
deinde rufescens, & ubi plenam maturitatem consequi-  
tus est, niger atque splendescens (quo tempore colligi *Tempus.*  
debet) ossiculum intus continens siluestribus oliuis simile, similique carne prædi-  
tus, ex qua exstillat oleaginosus quidam liquor subuiscēs, odore baccarum Lauri,  
sapore acri cum pauxillo amarore coniuncto. Præditus verò est hic fructus  
sessili parte paruo calyce, læuiore minùsque crispo quàm sint ilicis calyces.

A A A a



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,  
CANELLA A Coste.

Locus.

Vires.



Harum arborum magna est frequentia in sil-  
uis prouinciæ Malabar: sed præstantia & odo-  
re longè sunt inferiores iis quæ in Zeylan in-  
sula nascuntur. Stillatius Canellæ liquor  
vitreis aut plumbeis organis extractus is præ-  
fertur, qui è viridi cortice, præsertim radi-  
cum, minutim inciso eductus est: etenim non  
modò corroborat & stomachi imbecillitatem,  
colicæ dolores ex frigida causâ prouenientes  
lenit: sed urinam cit, & oris anhelitum com-  
mendat: utilis est præterea iecoris, splenis,  
cerebri & neruorum ægritudinibus, atque  
in syncope cardiacisque affectibus confert:  
venenis resistit & virulentorum animalium  
morsibus, menses mouet, & vteri affectibus  
prodest, vomitiones cohibet, & appetentiam  
excitat: valet item ad spasmos, & comitiales  
morbos: atque vt summam dicam, aperit,  
incidit, digerit, calefacit & corroborat. Eli-  
citur etiam liquor ex Canellæ floribus, sed lon-  
gè minore quantitate, minùsque præstans su-  
periore.

D E M A C E R E.

Locus.

Forma.



**N**ASCITVR quibusdam Orientalibus insulis, præsertim verò in pro-  
uincia Malabar, in insula S. Crucis regni Cochîn, tum in ripis flumi-  
nis Mangate & apud Cranganor vasta quædam, & multis ramis  
prædita arbor Vlmo multò maior, cuius folia in longitudinem sex  
aut septem uncias longa sunt, duas lata, exteriore parte dilutius virentia, interiore  
satura. Ea non alium florem, non alium fructum habere creditur præter semen  
quoddam denarij magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flauo, sapore verò  
amygdalæ, aut nuclei persicorum malorum, tenui & candida tunica tectum, quod  
vesica quadam ex tenuissimis duabus simul iunctis & transparentibus membra-  
nis constante includitur: ea autem vesica in medio folio nascitur aliis magnitudi-  
ne non dissimili, sed cuspidè obtusiore, & circa pediculum angustiore, colore  
medio inter rubrû & fuluû, inæquali, & multis fibris à pediculo ad extremitatem  
recta linea ductis, crispo & rugoso, haud absimilis illi quæ in Vlmo nascitur, paulò  
tamen latior & planior. Succo lacteo prædita est hæc arbor vtî Morus, radicibusq;  
habet Ilici persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas & cortice  
tectas crasso, aspero, scabro, duròque, cinereo foris colore, interius albo & lacteo  
succo prægnante dum recens est, flauescente autem dum sicca est, & admodum  
adstringente: & licet succus ille cum adstrictione non nihil mordicet, breui tamen  
evanescit hæc veluti insensibilis mordicatio. Arenosa & humida loca amat, &  
reliquas ferè plantas circûnascens enecat. Nomen vulgare huius arboris apud  
Lusitanos est *Arbore de las camaras*, & *Arbore sancto*, hoc est, Arbor dysentericæ, &  
Arbor sancta: ab indigenis Christianis *Arbore de sancto Thome*, id est arbor D. Tho-  
mæ, & *Macruyre*: à Medicis Brachmenis *Macre*, apud quos summo in pretio est  
arboris cortex. Radicis cortice recèti trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto,  
omnis generis dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes Me-  
dici, cum Brachmenes tum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis sicci &  
in

Nomina

Temperam.

Vires.



in puluerem redacti semunciam per noctem macerant in quatuor vncijs feri lactis, eumque bis in die propinant manè & vesperi, deinde medicamento sumptu orizam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinæcos coctos, maceratos & tritos in oriza decoctione statim agro exhibent: interdum si necessitas virgeat, opium admiscunt roborandi medicamenti causa: solent verò etiam Arabes cuiuscunque generis alui profluvia opio nuce moschata admixta curare. Huius item radi-

## MACER A Costa.



cis usus salutaris creditur ad vomitus cōpescendos, & ventriculum roborandū cum aqua Mentha & maltices puluere. Rogatus Brachmenes quidam medicus mihi familiaris, virque probus, boni iudicii & magnæ existimationis apud omnes ciuitatis S. Crucis regni Cochin incolas cum gentiles tum Lusitanos, quod illius fideli opera sæpius usi essent, ut bona fide exponeret istius corticis quem *Macre* vocant facultates, in hæc verba respondit: Si vos Lusitani hunc corticem probè nossetis, inultò pluris illum faceretis quam Piper: Sed quoniam istic in Lusitania eius facultates ignoratis, idcirco contemnitis. Pulvis quem in omnis generis alui profluvio ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percontaris conflatus est. Eius magnam quantitatem tibi ostendere domi possem, quam in Bengala & Iapan sum missurus. Sitne verò inutile medicamentum, tu ipse qui illius effectus plerumque conspexisti, iudicare potes. Hunc corticem etiam ostendi rhizotomo cuidam *loque* (genus quoddam hominum est cir-

cumforaneorum qui peregrinando pœnitentiam agere sese profitentur in illis regionibus) petique ut quid esset (tametsi probè nossem) significaret: respondit ille, eum se querer, cuius arboris cortex esset se demonstraturum, ostenditque arborem quam antè sciueram & addidit, Apud nostros homines appellatur *Cura santea macre mista garul*, hoc est, *Macre* ab Angelis ostensum hominibus ad ipsorum salutem. Subiunxit insuper istius corticis apud ipsos usum esse in compescendis vomitibus, aluique profluvii sistendis, plùsque pollere huius radice portunculam, quam magnam quantitatem corticis Myrobalanorum aut *Arece*, eamque præstantiorem esse *Coru Malabarico* de quo proximè dicemus. Referebat præterea *Macre fructum* omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo vterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus, nec inebriari posse. Magna disceptatio est inter Neotericos, an Græci *Macin* & Arabes *Macerem* nouerint. Negari non potest quia multo plura medicamenta nunc nouerimus quam veteres: inficiari etiam non possumus, pleraque illis cognita fuisse, de quibus dubitamus. Nam certissimum est, Græcis probè notum fuisse *Macer* de quo dubitamus, & quod plerique adhuc ignorant: nesciuisse autem *Macin* & nucem moschatam nobis adprimè nota, ut ex eorum scriptis constat. Galenus simplicium lib. septimo *Macerem aduehi* ait ex India, constare essentia pleraque frigida & terrestri, paulula verò frigida: conferre sua adstrictione aduersus dysenterias & cruentas excreationes. Dioscorides verò, *Macer* qui ex Barbaria aduehitur, est cortex flauescens, crassus, & gustu perquam adstringens, qui contra cruentas excreationes



Diosc. lib. 1.  
cap. 24.

Plin. lib. 12.  
cap. 8.

bibitur, dysenterias & alui fluxiones. Quæ facultates inueniuntur in cortice iam descriptæ arboris, non in Maci odorato nucis moschatæ operculo, quod calidum siccumque est in fine secundi gradus, aut initio tertij, tenuitumque partium & leuissimi amaroris, pauculæq; adstrictionis particeps: itaque certum est vtrumque loqui de cortice nostræ arboris, non de Maci quod illis ignotum fuit. Admonuit me præterea medicus quidam Regis Cochîn, ne dubitarem quin hic cortex Auicennæ Macer esset: magnæque inscitie esse de re tam aperta disceptare: huius etenim *Macre* facultates, eis, quas suo Maceri veteres tribuunt, persimiles, facile id demonstrare. Plinius etiam Macer, inquit, ex India aduehitur, cortex rubeus radice magnæ, nomine arboris suæ: Minimè verò nos mouere debet quòd Dioscorides ex Barbaria Macerem aduehi asserat, quem Plinius & Galenus ex India deferri scribunt: idem enim illis accidisse potest in hoc medicamento, quod in Cinnamomo & Calsia, vt (quoniam ex peregrinis & longinquis regionibus ad eos adueherentur) eorum natales non fuerint probè cogniti. Ait tamen Ptolemæus: Quædam in Indo fluuii insula vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facile comportabatur Macer: vel quòd afferretur ex Arabia eo maris sinu qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur. Cui suffragatur Strabo, Omnia, inquit, quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Macis & Maceris differentia Auicennæ probè fuit cognita, quippe qui Macim odoratæ nucis inuolucrum cap. 456. & Macerem radice corticem capit. 694. sub titulo Talisfar descripsit. Non igitur etiam fuit Serapioni, qui ex auctoritate Isach, Macim esse nucis odoratæ operimentum dixit, diuersum ab eo cuius Dioscorides meminit, quippe qui scriptum reliquerit, Macerem esse ligni corticem siue corium. Liqueat itaque Macim & Macerem differre inter se qualitate, substantia, figura, planta & regione, quandoquidem Macer radicem arboris cortex in Malabar nascitur: Macis verò nucis Moschatæ operimentum, in Banda, longissimè inter se disitis. Tamen si Monachi qui in Meslen commentarios scripserunt, asserant non differre, suam negligentiam ista ratione proponentes. Vulgaris admodum huius corticis Maceris est vsus in omnibus nosocomijs prouinciarum Chinæ, Iapan, Malacæ & Bengala, in dysenterijs, alui profluuijs, & sanguinis reiectionibus, cuius causa ex Malabar vique petunt.

#### DE NUCE MOSCATA.

Locus.



Nomina

N insula Banda nascitur arbor quæ Nucem moschatam fert, colligiturque ad externos solitam. Alunt & quasdam generis eius arbores Moluccæ, & Zeilan insulæ, verum humiles, fructuque tam paucos & pusillo vt nihili sit. Bandenses Pala vocant, Macim verò à Macere diuersum, Buna Palla: Decanenses Iapatri, *Macim Iayfol*: Arabes *Seygar*, & *Iauziband*, id est, Nucem Bandensem, Macim vero *Thalisphar bubese*, vel *Besbaça*, id est Nucis corticem: Persæ arborem ipsam, *Drach*: Turcæ, *Agache*: oleum Macerinum Arabes *Geuzifami*, Turcæ *Geuziat*: Persæ, *Geuzi erugaant*. Assurgit in Pyri vel Persicæ magnitudinem hæc arbor, rotundiore folio quam Pyri, in extremo acuto: fructu Pyris simili, aliquanto rotundiore: cortice foris cornoso, subduro, quem pro nihilo ducunt Bandenses, tamen si quidam eo vescantur ob astringentis saporis incunditatem, condito sale & aceto, Lusitani verò Nucem adhuc immaturam integram condiunt saccharo. Nuce iam matura cortex ille carnosus ac externus in multas partes dehiscit, ac tum sub eo videtur Macis, colore perquam eleganti rubescens: acuti odoris, ac saporis, membrana reticulatim texta.



NUX MOSCATA,  
A Costa.



textâ, interioris Nucis proximè calycem ambiens, & sic agglutinata, ut tubercula in solido Nucis putamine elata repræsentent. Macis color à ficcata & purgata Nuce reuulsi, minus ruber, quam in ipsa prius arbore. Abditur Maci Nucis interioris putamen, quo rupto Nux detegitur, nunc amplior, nunc ottrigosa, quam recentem si dispartiantur, apparet intus candida medulla, languidioris acrimoniæ, quam Nucis reliquum corpus. Vertitur autem spatio temporis in Nucem ea medulla, & eadem cum Nuce fit. Grandiores India longe pluris facit quam nos, & charius emit. Ex hac Nuce paratur oleum Brachmanibus, & Indorum medicis valde laudatum, ad vteri & neruorum frigidos morbos, quemadmodum & ex Maci. Eligenda Nux moschata recens, grauis, pinguis, humore plena, minime pertusa. Emendat illa & tollit fœtorem anhelitus: visum acuit: roborat ventriculum, & hepar: adiuuat cibi coctionem: flatus dissipat: aluum cohibet: vrinam prouocat: maculas faciei delet: vteri morbis prodest: splenis duos tumores lenit, & emollit, itémque hepatis: impetigini medetur.

Vires.

CARYOPHYLLUS, A COSTÆ.



ARBOR Caryophyllos proferens magnitudine & forma Lauri est, sed superiore parte magis ramosa, minore & angustiore folio: copiosos fert flores, initio candidos, deinde virides, cum nunc in fructum efformati sunt, at ubi maturuerunt, rubros, qui deinde collecti & siccati nigrum colorem contrahunt: nascuntur ficus modo sparsim per ramos ad foliorum basim bini, terni aut quaterni simul iuncti, vel vnici interdum. Dicitur Arabibus, Persis & Turcis Caranful, ipsa arbor Siger, foliū Varagua. Paulus Ægineta acres illos constituit, calidos & siccos ordine tertio: alij duntaxat secundo. Ventriculum, iecur & cor roborant, concoctionem iuuant, vrinas cient, aluum cohibent, oculis instillati eorum aciem exacuunt, nubésq; extergunt: & quatuor drachmarum pondere ex lacte sumpti venerem extimulant.

Forma.

Nomina

Vires.




## DE PIPERE.

*Genera.* **P**IPER aliud domesticum, cuius vsus est, aliud siluestre, quod ob amarorem negligitur. Domestici planta sarmentosa est, scanditque hederæ modo, arboribus quas nancisci potest sese circumuoluendo: *Forma.* nodis per intervalla prædita, ad quos folia nascuntur Betele foliis similia, parte interiore saturè virentia, exteriori dilutiora; cuspidè mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilu-

## TIPER NIGRVM,

A Costa.

*Temper.*  
*& Vires.*



tustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigium sese circumuoluendo scandere soleat.

## DE AVELLANA INDICA.

*Forma.*

**A**MODVM procera est hæc arbor rectaque, tenuis, rotunda, & fungosa materia: folia habet longiora latioraque quàm Palma quæ Cocos seu Indicas Nuces fert, ex summa arbore nascentia, inter quæ prodeunt tenues virgæ paruis floribus onustæ, albis & ferè inodoris, quæ deinde in fructum *Areca* nuncupatum efformantur, Nucis iuglandis magnitudine, minimè tamen rotundum, sed oblongum oui gallinacæ exigui modo, exteriori cortice admodum virente, dum recens est, & , vbi maturuit, admodum flauo, vt longè spectantibus veluti dactyli siue palmulæ maturæ appareant: materia molli & tomentosa constat hic cortex, continétque inclusum fructum Castanæ grandioris magnitudine, altera parte similiter fessilem, candidum, durum, rubris venis plenum, quem incolæ edunt. Eum adhuc virentem sub are



AVELLANA INDICA,  
A Costa.



sub arena condere solent, ut melior gratiorque  
esui fiat: vulgo autem edunt cum foliis *Betele*:  
confringunt etiam, folique exponunt & siccant,  
(tum *Checeni* appellant) eoque plurimum utun-  
tur tum in cibo, tum in lotionibus adstringen-  
tibus: & cortice, seu involucri dentes repur-  
gant. Cum vero adeo fungosa huius arboris sit *Vfus.*  
materia, frangitur difficulter: idcirco virga  
duorum digitorum crassitudine ex hac arbore  
parata Crocodilum cum in aqua, tum in terra  
facile retinere potest, si per eius fauces tranf-  
mittatur (ea etenim ratione illos venari solent)  
ut saepe conspexi.

DE PALMA INDICA,  
quæ & Elephantis.



RAEALTA est hæc arbor, & recta, *Forma.*  
nec admodum crassa, præsertim in  
fastigio: nam ab infimo ad sum-  
mum paulatim gracilescit, & colo-  
re cinereo est: truncum à radicibus ad fastigium  
usque parvis quasi gradibus circumdant, qui

ascensuris scalarum vicem præbeant: flos Castaneæ similis: fructus vero integer  
capite humano maior, forma oblongiore, triangulari, & colore viridi admodum  
diluto. Tamen si *Narel* huius arboris nucem vulgo appellant cum Persæ tum *Nomina*  
Arabes, negant tamen Persæ legitimum esse nomen sed *Nargel* dicendum: ipsam  
arborem *Darach* Persæ vocant, Arabes *Siger Indi*, Turci autem arborem *Agach*,  
fructum *Cox Indi*: Brachmanes arborem nuncupant *Maro*, nucem *Naralu*.  
Ex hac arbore ex insulis de Nalediua fabricantur naues, atque clavis, malis, velis, *Vfus.*  
rudentibus aliisque armamentis necessariis instruuntur: instructæ iam, mercibus  
ex eadem arbore conflatis onerantur, oleo, vino, aceto, saccharo nigro, fructibus  
aqua, & ardente aqua vulgo vocata. Ex eadem arbore extruuntur ades cum suis  
tabulatis satis firmæ: atque eiusdem ramis, (quos *Ola* dicunt) contegunt imbri-  
cum vice, nam imbres commodè arcant. Ex iisdem ramis tecta comparant ad  
regendas hieme naues, quæ in portum deductæ, remulco deinde in terram tra-  
hantur. Istarum porro Palmarum duo genera constituunt: Vnum enim *Suræ* *Genera.*  
cogendæ gratia deligunt, ea est veluti vinum mustum, quæ ignibus decocta in  
licorem transit vino similem, incolis *Orraca* appellatum, alterum fructuum geren-  
dorum causa adseruant. Colligitur verò *Suræ* in hunc modum: Aliquem e ramis  
cerebro vicinior præcidunt, duorum pedum longitudinem relinquentes, ad  
quem vascula ampla, oris tamen angustî, illis *Caloins* nuncupata, colligant: per  
hunc ramum præcisum exstillat arbor *Suram* iam memoratam, qua organis distil-  
latoriis imposita, ignis vi aquam eliciunt ardentem, purior, illis *Fula* dicta, hoc  
est, flos, facilius igne incenditur quam nostra aqua ardens, siue vinum adustum:  
altera *Orraca* nuncupata non item: sed huic purioris aliquantulum admiscere  
solent. *E Suræ* antequam ignibus decoquatur, soli exposita, fit acetum satis inter-  
dum acre, tamen si neque Mentha, neque cortex arboris Myrobalani iniciantur,  
quæ medicamenta plerumque admisceri solent ut acetum acrius reddant. Exem-  
pto primo vase *Suræ*, exstillat alia, quæ ignis vel solis caloribus inspissata, Saccha-



## PALMA Elephantis

A Costa.


Locus.



Vires.

CYCLOPHERA Math.

Temper.



Vfus.

est, frequentiorem huius nucis vsum, lumbricos generare: cui morbo totius provincie Malabar incolæ admodum obnoxij sunt. Externo illo primoque cortice siue operimento crasso, foris læui, intus verò tomentoso dum rescicatus est, fiunt rudentes & alij funes nautici, vt in Hispaniis ex sparto. Tomentum illud Malabares Cayro vocant, magni apud eos vsus, nam quoniam aqua marina non corrumpitur,


rum fit incolis *Iagra*, appellatum: præstantior censetur, quæ in Nalediua colligitur, quàm quæ in Malabar. Fructus recens sub primo illo crasso viridique operimento, alio cortice nigro præditus est, medullam tegente, qui recens antequam nigrum colorem contrahat, tener & candicans est, editurque cum sale, vel sine sale, vel cum aceto & pipere interdum, atque gustu est Cinaræ: cum verò iam nonnihil indurari cœpit, Cardui caput sapit. Medulla cortici adhærens tenera & dulcis est, continetque multam aquam limpidam, suauem, nec fastidium aut nauseam sua dulcedine parientem quæ vulgo in solis ardoribus bibitur. Frequens est huius aquæ sub dio refrigerata, atque etiam *Iagra* vsus aduersus iccoris renumque nimios calores, purulentæque materiæ per virgam excretionem: refrigeratur verò hæc aqua in sua nuce viridi *Lañã* appellata: diu conseruatur, nam toto anno inueniuntur istæ nuces virides, quarum nonnullæ interdum tres aut quatuor libras siue pintas aquæ continent. Postquam iam indurata est hæc nux, duriorémque medullam contraxit, remanet in cõcauitate limpida quidem aqua, at non adeò dulcis vt prior: nucem tum vocant Malabares *Eleni*. In annotinis nucibus muratur hæc aqua in rotundam quãdam substantiam mali instar, candidam, spongiosã & leuem, sapore dulci. Medulla nucis recentis tenera alba & dulcis, sola editur ab incolis aut cum *Iagre*, hoc est, Saccharo è *Sura* confecto, vel cum *Auelã*, pulmento ex Oriza in aqua cocta, deinde trita & probè sole exsiccata: editur item cum piscis quodam genere siccatum ex insulis de Nalediua aduecto, simili ferè bubulis carnibus fumo induratis, *Comalamasa* appellat, bonumque condimentum est ad bibendi appetentiam prouocandam. Ea verò mixtura non modò incolis in vsu est, sed ab ipsis etiam Lusitanis expetitur. Ex eadem medulla lac conficitur Amygdalino simile, ad edulia parãda vtile. Solibus exsiccata hæc medulla vocatur *Copra*, suavis est, reconditur, illisque perinde in vsu est, atque nostris Europæis castaneæ siccæ.

Vulgo creditur, & experientia comprobaturum



pitur, stipantur eo omnis generis naues: itaque illis populis vsum præbet lanæ, xyli, stuparum, lini, & sparti. E secundo nigròque & duro cortice, qui à nostris *Cocco* dicitur, ab incolis verò *Xareta*, fiunt scutellæ & alia vasa potoria in tenuiorum vsum. Fiunt etiam ex eo vstulato carbones auri fabris vtilis, qui in iis provinciis periti & industrij, nec admodum sumptuosi reperiuntur. Solent enim suum opificium proclamantes compita circuire, secum deferentes viceolum, malleolum, & duo cæla, cannæq; tubulum palmari longitudine manu tenentes quo focum incendunt. Ij in ædes admissi, vasa ex auro & argento conficiunt, pro eorū qui ipsos euocarunt arbitrio. Fiunt ex huius Palmæ foliis petasi maiores & minores ad Solis ardores & imbres arcendos idonei: textuntur etiam storeæ & alia pleræque. *Coccus* porrò de *Nalediua* cognominatus adeò commendatur ab ipsis incolis, & à *Malabarësis*, non modò à plebe, sed à Regibus & Principibus viris, vt in omni fere morborum genere ad eum confugiant tanquam ad sacram anchoram. Fiunt in eam gratiam ex illo pocula quæ auro vel argento excipiuntur, & in nauium tritemiumq; figuram efformantur, ad aquam bibendam, in quam ex catenula medullæ ipsius Cocci fragmentum pendere sinunt: sibi que certo persuadent, illis, qui aquam ex similibus poculis hauriunt, nullum venenum nocere posse, futuròsque immunes à multis morbis, in quos memini multos incidere, qui ex iis poculis bibere soliti erant. Et licet omnem diligentiam adhibuerim, nunquam tamen obseruare potui, similia pocula aliquem ex morbis curare, ad quos vtilia esse creduntur: potius igitur arbitror tantam laudem obtinuisse à vulgi opinione. Nonnulli ex huiusmodi vasculis bibere soliti, mihi affirmarunt sese experientia didicisse iecur incendi, renes noxam contrahere, & calculum generari: nihilominus tamen magnū est eorum pretium, longeq; pluris æstimantur iis locis vbi inueniuntur, quàm aliis procul inde disitis: nam interdum eiusmodi Noces nudæ, neque auro aut argento exornatæ quinquaginta aut amplius aureis nummis æstimantur. Nigrior autem, nitidior, longior, maiorque est hic *Coccus* quàm aliæ noces Cocci communis.

## TAMARINDUS, ACOSTAE.



**S**UNT Tamarindi fructus elegantis & aspectu pulchræ arboris, Castanæ aut Ceratiorum arboris magnitudine, multis ramis prædita, & foliis latam vmbra præbentibus, materie solida admodum: folia filicis femine (quam Hispani *Helecho*, Cantabri *Aristora* appellant) foliis persimilia, dilutè virentia, valde elegàtia, gustu acido, gratòque, è quibus condimentum fit (*Salsam* vocant) perinde atque è petroselino: flores candidi, Auræ mali floribus admodum similes forma exteriori, & odore: attamen octonis foliis constant, quorum quatuor interiora alba sunt & crassiora velut Mali auræ florum folia, quatuor verò exteriora tenuiora, & bina ex his eleganti neruo radiata: è medio flore quatuor enascuntur stamina corniculorū modo inflexa, candida & tenuia. Fructus admodum similis est Ceratiis foris virefcentis initio, deinde per siccitatem cinereus, continens ossi-  
cula

Forma.



cula rotunda Calsiæ solutiæ modo aut paruis Lupinis similia, dura admodum, & colore nitido terreo, haud quaquam flauo, quemadmodum nonnulli referunt: his non utimur, sed sola pulpa quæ nonnihil lenta & viscida est, iucunda tamen aciditate grata, tametsi nonnulli indigenæ asserant osicula assata & in pollinem redacta ex oxygala in alui profluuiis utiliter exhiberi: facile auellitur hic fructus, & etiam sponte decedit. Folia sub noctem sese contrahunt, suumque fructum amplecti solent, qui si desit, sua virgulta & ramos complectuntur: summa verò aurora sese explicare incipiunt grato spectaculo: hæc trita partibus erysipelate infectis imponunt, atque etiam circa phlegmonas ad arcendum qui influit humorem: iisdem cum sale Ormuziano phlegmonas resoluunt, & cum cineribus ex Cambaya pituitosos & melancholicos tumores. Vocatur hic fructus in Canarin *Chincha*, osicula verò *Chincharo*, in Malabar *Puli*, & in Guzarate *Ambili*: Arabes, Persæ, Turci *Tamarindi* vocant, osicula *Abes*, arborem *Siger Tamarindi*. Præferuntur qui in locis montanis iisque Septentrioni obuersis nascuntur: vñ verò compertum est, huius arboris umbram sub ea dormientibus non minus noxiam esse, quàm arboris iuglandis.

## DE RADICE CHINÆ.

Nomina

Locus.

Forma.



Ocatur hoc excellens medicamentum in Chinaram regione *Lampatan*, in Decam *Lampaos*, in Canarin *Bonti*, ab Arabibus, Persis & Turcis *Chophchina*. Nascitur abundantissimè in Chinaram regione: inuenitur tamen etiam in Malabar, Cochin, Cranganor, Coulan, Tannor, & aliis locis. Planta est multis tenuibus spinosisq; sarmentis prædita, similis asperæ non absimilibus, quorum maxima minimum manus digitum crafsitie non superant, foliis plantaginis latifoliæ magnitudine: radices pugnum nonnumquam æquant, interdum minores sunt, solidæ, graues, candidæ, interdum etiam rube-

## RADIX CHINÆ,

A Costa.

Vires.

Temper.



scentes, & multæ sæpenuerò simul coherentes. Plurimus est huius radices vsus in omnibus Orientalis Indiæ prouinciis ad varios morbos: quin adeò innoxia censetur, vt eam sumētibus, tametsi nullam victus rationem obseruent, sed liberè carnibus & piscibus vescantur, nihil incommodi adferre credatur. Vulgaris tamē quæ in Chinaram Indiæ prouinciis obseruatur, sumendi huius radices decocti consuetudo est, vt radices vncia vna, additis radicibus Apij duabus drachmis decoquantur lento igne & sine fumo, in decem & sex aquæ libris ad sex librarum consumptionem reliquos decem in fictili vitriario adseruant, sumuntq; singulis diebus recens decoctum, quoniam facile corrumpitur, nec ultra diem obseruari potest. Eius verò tepidi manè sumit æger plenum haustum, duabusq; horis in lecto remanet, postea surgit, duabus autem horis ante cœnam totidem haurit, interdum de eodem frigido bibit. Plerique tamen etiam dum sua negotia exercent & nauigant singulis diebus manè & vespere duas eius radices in puluerem redactæ drachmas ex vino, aut ipsius radices decocto



CROCUS INDICUS,  
A Costa.




decocto felici successu bibere solent. Organis etiam ex hac radice recenti, aqua elicitur, delicatioribus admodum familiaris: attamen & ab aliis magna quantitas absuitur, quoniam illi plurimum adunt non modo in morbis à D. Orta enumeratis, sed etiam in hemicrania, in herniis humoralibus, & vëtosis, in colli, vesicæ & penis callis, eorundemque vlceribus, venerem etiam admodum excitare creditur: decoctum tamē ipsa stillatitia aqua præstantius est. Optimè conferuatur radix, si Pipere contracto inuoluatur.

DE CROCO INDICO.

**M**AIORA latioraq; habet Crocum *Forma.*  
Indicum folia quàm Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scille, dilutiora tamen & tenuiora, caulē habet ē foliis simul implicatis, & sese mutuo amplexantibus constantem: radicem foris Zingiberi similem, intus croceam. Præter nomina *Nomina*  
ab Orta enumerata, apud Arabes etiam *Curcuma* dicitur, apud Turcos *Saroth.*

DE MUSA, SEV FICV INDICA, A Costa.



**D**ECEM & octo aut viginti Palmorum magnitudine hæc pulchra & *Forma.*  
elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticū sibi mutuò incumbentium coniunctione constat, & humani crucis crassitiem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorū grato pabulo: foliis nouem palmorum longitudine, duorum cum semisse latitudine, neruo satis crasso per longitudinem excurrente, & transversis fibris in latera sparsis, parte superiore saturis, inferiore dilutioribus: ex huius arboris fastigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congestorum in modum pinei strobili coloris rufi: deinde vnicū ramum fert humani brachij crassitie in multos nodos diuisum, ē quorum singulis decem aut quatuor decem dependent Ficus, ita vt nonnunquam ramus centenis aut ducentenis ficibus onustus conspiciatur. Hos in diuersas species distinguunt *Locus.*  
Lusitani prouinciam incolentes: nam *Cenorins* appellant qui admodum flauent, laues, longiusculi, gratique saporis sunt, & odoratiore: *Chincapanos* verò qui virescunt nonnihil, longiorēque sunt, uique etiam grati saporis. Laudantur præterea qui in *Cofula* nascuntur, *Aethiopibus Inninga* dicti. Legitimum autem nomen apud Arabes & Persas



*Nomina* & Persas (vt è præstante medico Persa in Ormuz nato intellexi) est *Mous*, non autem *Musa* aut *Amusa*: arboris verò *Daracht Mous*. Reliqua nomina ex Garcia petenda. Semel dumtaxat feritur hæc arbor, nam ex eius radice aliæ enascuntur: singulæ verò vnicum (quemadmodum retuli) fructuum ramum gestant, qui, dum maturi sunt, rescinditur, plantamque ipsam sponte exficari sinunt, tanquam in posterum inutilem, aut amputant, in domesticorum Elephantorum pabulum.

*Vsus.* Nonnulli interiora tenerioraque, antequam explicentur, folia, florumque thyrsum Pipere, Zingibere recenti, allio, sale & aceto condiunt, & capparum modo edunt. Folia verò quoniam amplissima, mollia frigidaque sunt, substernere ad accumbendum in æstu solent: & ambustis nonnunquam imponunt. Ruellius huius fructus meminit ex auctoritate Theophrasti & Strabonis.

## DE ANANAS.

*Locus.* **P**ERGRINVS est hic fructus, & ex prouincia S. Crucis in Brasilia primum in Indiam Occidentalem, deinde etiam in Orientalem Indiam delatus, in quibus nunc vberimè provenit. Citrij verò mali

*Forma.* minoris magnitudine est, admodum flauus & odoratus cum probè maturus est, adeò vt prætereuntes ex odore dignoscere queant ædes in quibus sit: succulentus & gratissimè saporis, procul intuentibus cinara videtur, sed pungentibus aculeis caret. Singulæ stirpes Cardui edulis magnitudinem æquant, vnicumque malum gestant in medio quasi caule, & circa eum multas alias proles, quarum nonnullæ etiam suo fructu præditæ sunt. Qui itaque fructus maturos colligunt, proles ilicò terræ mandare solent: è quibus singulæ deinde stirpes proueniunt suo malo onustæ, vti mater, quæ intra annum spatium colliguntur. Eius radix carduo eduli perquam similis est, sed & folia non sunt disparia, tametsi ad *Ananas* siluestris folia magis accedant. Vulgo *Ananas* vocant: Canarini verò *Ananasa*. Cum primum in Indiam illatus est hic fructus, singuli decem ducatis, aut paulò amplius æstimati sunt: nunc verò propter abundantiam (tametsi neque sapore neque odore primis cedant) vix duobus regalibus Castellanis veneunt. Hactenus in medicum vsum non est receptus, sed solummodo ob saporis gratiam commendatur. Calidus & humidus est, editurque maceratus in vino vti Persicum malocotoneum, & facilis est concoctionis, nimius tamen eius vsus inflammationes parit quemadmodum Duriones Malacenses.

## ANANAS A Costa.



Si medius secetur, & partes denuo coniungantur, vniuntur vti cucumeres: perfossus verò cultello, si in vulnere vnus diei aut noctis spatio cultellus relinquantur, inuenietur tota ea pars quæ in vulnere hæsit absumpta.

## DE CARCA



## DE CARCAPVLI.

**C**ARCAPVLI Malabaribus, *Garcapuli* Canariis, vastæ magnitudinis arbor est, fructum ferens malo aureo cui cortex exemptus sit, magnitudine & forma similem, ex grumis omnino constantem, (sed non separabilibus ab inuicem ut in malo aureo) tenui, læuique & splendenti cortice tectum; non admodum sicco, colore pallido, at ubi maturuit

CARCAPVLI A Costa.



aureo: gustu admodum austero, sed quadam adstrictione grato. Eo vtuntur in cibis, magnaque apud incolas eius est laus in curationibus: sed inter omnes quæ experientia comprobata sunt primas obtinet profluuij alui cuiusq; generis constrictio; in iis præsertim qui nimio veneris vſu hoc malum contraxerunt: editur verò aut ipse fructus maturus, aut eius succus cum oxygala sumitur, aut illius exsiccati puluis: cum oxygala autem mixtus & cocta oriza, mirificè appetitū deiectum reuocat. Vtilis etiam est eius succus, & exsiccati puluis in oculorum caliginibus & suffusionibus. Familiaris est eius fructus puluis obstetricibus, eum enim puerperis exhibere solent ad pellendas secundas, & ad purgationes, atque lactis vbertatem præstandam, tum etiam ad facilitandum partum magna, vt aiunt, efficacia. Succus eius cum aliis plantis mixtus vngui maioris digiti pedis imponitur eodem latere quo quis aut caliginem, aut suffusionis initium in oculo habet, vtilémq; esse perhibent. Transfertur hic, fructus siccus ex Malabar in alias prouincias.

Forma.

Vires.

Temperam.

## DE BETRE.

**R**EQUENTISSIMO in vſu est apud Indos Betre: ab instituto igitur alienum non erit, si hoc loco eius mentionem fecero. Betre masticeum, amarum inuenitur: eam ob causam ei Arecam admiscunt, & calcis momentum, sicque præparatum suauissimi esse saporis affirmant. Mihi sanè cùm primum degustauī, propter amarorem ita displicuit, vt ab eo tempore semper abhorruerim, nec vnquam degustare potuerim. Sunt qui addant Lycium: potentiores verò & opulentiores Caphuram de Burneo, nonnulli lignum aloës & Moscum aut Ambarum. Sic autem paratum adeò suauis est saporis, orisque halitus adeò commendat sua fragrantia, vt perpetuo ferè illud masticeum opulentiores, tum etiam alij pro facultatum ratione, tametsi non desint, qui Arecam cum Cardamomo aut Garyophyllis masticeant. In solitudinibus autem & remotioribus à mari locis caro venditur. Ideo fertur Nizamoxa singulis annis in id impendere trigefies mille aureos Lusitanicos. Hæc sunt eorum traginata, hoc abeuntem donant: atque Rex ipse interdum propria manu potentioribus elargitur, alijs verò per manus famuli sui quem *Xarabdar*, aut *Tambuldar* vocant. Sed quia Betre venas habet aut costas secundum folij longitudinem excurrentes, vngue pollicis (quem ea de causa in acutum præfecant, non, veluti nos,

Temper.

BBBb



in rotundum) eas eximunt, deinde admisto calcis momento (quæ ob exiguam quantitatem & materiam vnde conflata est, fit enim ex ostreorum testis concretis, nullum nocumentum adferre potest) & Areca contusa aut contracta, folium Betre complicant, atque in os iniectum masticant, priorem illum succum expuentes (quod tamen nonnulli non faciunt) qui cruentus videtur, deinde alia

*BETRE, Garcia ab horto.*



*Vus.*

atque alia folia simili modo præparata suble-  
quenter sumunt. Solent aliquem dimissuri, aut  
ipsi ab adstantibus discedentes his foliis præ-  
paratis plena bursula sericea abeuntem hono-  
rare. Nemo discedere sustinet, donec Betre sit  
donatus, id enim dimissionis est indicium.  
Ceterum opulentiores aliquos adituri, hoc  
Betre masticare pro more habent, vt odore os  
commendent. Siquidem apud eos summæ in-  
ciuitatis est odoratum non habere anhelitum:  
ita vt si tenuioris fortunæ aliquem cum po-  
tentiori fabulari necesse sit, manu ori opposita  
id faciet, ne teter aliquis odor alterius nares  
feriat. Sic etiam mulieres viris congressuræ,  
Betre masticant antequam colloquatur, existi-  
mantq; ad lasciuiam summum esse illectamen-  
tum. Omnes huius regiones incolæ id, sumpto  
cibo, mandere solent, alioqui cibos nauseam  
quodammodo mouere aiunt: & masticare af-  
fueris, oris halitum tetrum olere, si quando ab-  
stineant. Solent ab eius vfu per aliquot dies ab-  
stinere, quibus obierunt sanguine iuncti, & in  
quibusdam ieiuniis. Ab huius etiam esu absti-  
nent, & humi se abiiciunt Arabes & *Moalis*,

hoc est, Alii sectatores dicti, decem diebus quibus ieiunant. Fabulantur autem isti  
Alii sectatores, siti se morituros conclusos in quadam arce, multasque præterea  
*Locus.* fabulas addunt. Nascitur Betre in omnibus Indiæ regionibus maritimis Lusitanis  
cognitis: nam in continenti non reperitur, nisi è maritimis allatum. Verum qui-  
dem est in Dultabado, vrbe opulenta in Decan, & Basnagua inueniri, sed minori  
certè quantitate, quàm vt ad Persas & Arabes deferatur. Supra Calaiate, quod  
oëtoginta leucis ab Ormuz distat, inuenire haud erit facile. Nam neque regionem  
frigidam amat, vt est China, neque solibus nimium adustam, vt Mosambique &  
*Nomina* Sofala. In Maluar vocatur Betre, in Decan, Guzarate, & Canam Pam, in Malaio  
Siri. Hallucinantur qui Betre folium Indum esse putant: in quo errore etiam ver-  
satus sum, cum primum in Indiam appuli. Sed sententiam mutare coactus sum  
postea, à Nizamoxa, quem Nizamaluquo vocant, euocatus: cui medicamentum  
roborando stomacho iussus componere, ea simplicia quæ medicamentum ingre-  
derentur enumerari, addens, id folium quod masticaret, Folium Indum esse. Ad  
quam vocem, risit ille (siquidem hoc vocabulum intelligebat) & Auicennam  
mihi ostendit Arabica lingua conscriptum, qui diuersis capitibus de folio &  
Betre agebat. Ducète simo enim quinquagesimo nono capite lib. 2. de Folio Indo,  
*Cadegi Indi* illi nuncupato scribit, & septingentesimo septimo capite lib. 2. de Be-  
tre, quod ille *Tembul* vocat corrupto, vt mihi videtur, aliquantulum vocabulo,  
quod ab omnibus *Tambul*, non *Tembul* dicatur. Huc adde, quod si quem Arabem  
Æthiopem perconteris, qui vocetur Betre, statim *Tambul* dicet. Auicenna lib. 2.  
cap. 709.



cap. 709. gingiuas confirmare est auctor, in quem etiam vsum semper ab Indis masticatur, & paulò post subiicit, stomachum roborare, ob quam facultatem etiam ab Indis expetitur. Quod autem frigidam illi facultatem tribuat in primo gradu, & exsiccantem in secundo, putauerim exemplar vitiosum esse, aut (quod eruditi Arabes arbitrantur) Auicennæ, in temperamenti descriptione, impositum esse, sit enim plerumque vt vulgus erret in temperamenti dignotione, vt pote cui Piper, Cardamomum, Ceba sint frigida. Calidum autem & siccum esse Betre ad finem secundi excessus, ipse expertus sum, & sic ex sapore & odore coniiicio. Est autem Betre folium simile ferè Mali medicæ folio, oblongius tamen & per extremum artius venas, siue costas, vt diximus, per longitudinem excurrentes habens. Optimum censetur bene maturum, colore fuluescente, tamen si nonnullæ mulieres præferant quod immaturum est, quippe quod maiorem sonum edat in ore dum masticatur. Corruptitur, si recens à planta collectum diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quandam contortum, Lacerti caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delatum Malacam, atque degustatum optimi saporis inuentum est. Seritur autem Viris modo, addunturque stipites & pedameta per quæ repens se sustineat nostratis Hederæ modo. Quidam maioris quæstus gratia Piperis aut Arecæ arboribus id maritant, atque ita pulcherrima vmbracula conficiunt. Multam verò curam, & assiduam rigationem desiderat.

Forma.

DE NARDO INDICA.

**N**UNC affirmare possum, multò plura aromata, maiorique quantitate, & minus adulterata ad nos adferri, viliorique emi, quam antiquitus fiebat: quod nunc Lusitanorum nauigationibus Indiæ nobis aperta sint, ipsæq; regiones, quæ aromata gignunt, longè cultiores nunc sint, quam Veterum tempore fuerunt. In eorum numero Nardum repono quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur, licet interdum aut maris humore sibi ascito situm contrahat, aut senio sua teolentiam illam amittat, qua initio prædita erat. Vocatur autem Nardus incolis (nam Græcum & Latinum nomen notum est) *Cahzgara*: Auicennæ lib. 2. cap. 646. & omnibus huius tempestatis Arabibus *Çembul*, quod est Spica, & *Çembul indi*, id est, Spica Indica: eadem ratione, quam nos Spicam Celticam vocamus, illi *Çembul rumim* appellant. Quod autem corruptè Matthæus Syluaticus cap. 640. *Simibel* & *Sumbel* protulerit, mirum non est, cum is linguam Arabicam ignorarit: nisi malimus tempore paulatim corrupta fuisse vocabula. Ceterum nascitur Nardus in Mandou & Chitor prouinciis, Regni Delli, Bengala, & Decan vicinis, iuxta flu. Gangem, quem incolæ *Ganga* appellant, & sacrosanctum existimant, ita vt morituri regni Bengala incolæ hoc flumine mergi se iubeant, sed pedibus duntaxat. Sunt in eo flumine certa idolorum delubra, ad quorum cultum cateruatim confluunt Mercatores è Guzarate & regno Decan, magnæque donaria in hæc idola conferunt, inde redeuntes sanctificati, vt ipsi sibi persuadent, imò potius à cacodamone obsessi. Porro non sunt diuersa Nardi genera: sed vnicum duntaxat mihi notum genus, id scilicet quod ex iam memoratis locis adferri diximus. Prouenit quidem in monte quodam, qui altera parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quem scilicet Occidentem sita est Syria multis regionibus ab India discreta. Sed tamen multis aliis eius regionis locis nata prouenit, non facillè enim sponte nascitur. Neque vna præstantior est altera: Spicamve habet alia altera multò longiorem. Certè radix est, spargens supra solum breuem virgulam seu caulem circiter tres palmos longum, cum longissimus, atque alias insuper virgulas multò breuiiores: in summa

Nomina

Locus.

Genus.

Forma.



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,  
*NARDVS INDICA,*  
*Garcia ab horto.*



Li. 12. c. 12.

Lib. 1. ca. 6.

*Pisum* vocari. Nam cum multis in India annis Medicinā exercuerim, & non modò versatus sim cū omnis generis medicis Asiaticis, sed etiā Regibus & Principibus familiaris fuerim, nunquā tamē hoc Pisū videre mihi cōtiguit, aut eius nomen audire. Id genus quod Sepulueda *Satiech* & *Satiach* appellat, id esse puto, quod ex *Satigūā* adfertur, celeberrimo regni Bégala portu & Emporio ad fluuij Gágis ostia.

radice spicæ producuntur, item aliæ per virgulas. Tali enim modo venditur in Cambayete, Asurate & Gogua, aliisque portibus marinis, vnde mercatores Arabes & Persæ petunt: potissimā tamen partem ab indigenis absumi ferunt. Inuenitur interdum sordida & pulueru lenta, villis ipsius plantæ in pollinem redactis. Emitur tamē ab iis quos dixi mercatoribus, & eo puluere manus eluere intelligo. Hac vnica Nardo quæ iuxta Gagem oritur, quamq; in Occidentē exportat, vtuntur medici cū Indici tū Turci, Persæ & Arabes. Nā quod ex ingēti pretio quo antiquitus, teste Plin. emebatur, inferre volūt, nostram Nardū non esse legitimā: obiectiōi me satis respōdisse arbitror, cū dixi Indias nunc magis apertas & cognitās esse, quā tēpore Pl. fuerint, & ipsa aromata maiori copia ad nos adferri. Ceterū fabulosū omnino iudico quod And. La. suis in Diosc. cōmētariis scribit, Nardi vsū apud Indos esse periculosū, quoniā ex ea fiat veneni quoddā gen<sup>us</sup> mortiferū, quod nō modò haustū, sed etiā cuti in sudoribus inspersum, hominē illico iugulet, idq; toxicum

ACONITVM TARDALIANCHES PRIMVM.




Locus.

**P**RÆCESSIT inter Aconitorum genera Pardaliāchis figura, qualē Matth. exhibuit, verissimā, & certissima, quamuis falsā ac cōmentitiā esse quidā existimarint, sed mutila, radice tantū picta cum foliis. Ego integrā nactus à seplasiario Treuorensi, in cuius horto plantæ aliquot multis iam annis viuūt, & vigent, controuersiam pertinaciorem de hoc Aconito, quod his oculis conspexi, iactatam inter Gesnerum ac Matthiolum viros præstantissimos, clarissimos, doctissimos, vt dirimā, Matthiolo fidem suam, quæ labare videbatur, asserui, & plantam ostendi, minimē decurtatam, adiectis pauculis, quæ totam historiam reddant locupletiolem, ac illustriorem. Nascitur copiose in Allobrogibus, haud procul à primario cœnobio Carthusianorum, in confragoso & arduo mōte, quem ideo Scalas nominant, vulgò, *les Eschelles*, ob angustos tramites in saxo velut gradibus excisos, per quos




per quos in cacuminis fastigium conscenditur. Primo veris clementioris accessu *Tempus.*  
caulis exit, antequam folia prodeant, ut in petasite officinarum, & Bechio, palmū  
altus, opertus candicante lanugine. Foliola quatuor, bina ex aduerso ferè sibi op- *Forma.*  
posita, extant in caule, quorum alterum altero paulò demissius est. Flos densus, ac  
velut congestus in globum, gracilibus peciolis insidet, caulis verticem ambi-  
bus, ex subluteo pallefcens, arctis in cuiusque flosculi medio complusculis apici-  
bus, subluteis. Diuanescente ac dilapso flore, emergunt folia, hirsuta, ferè quatuor,  
huc illuc diducta, tenui pediculo subnixa, venosa, supernè virentia, infernè abdi-  
cantia, & tomentosa, punctis quamplurimis notata, rotunda ferè margine. Subest  
radix, nodis articulatis siue geniculatis multis compacta, similis caudæ Scorpio-  
nis, prorsus ea specie quam Matthiolus delineauit, ac expressit. Quo sapore linguā  
feriat, taceo, non ausus illius mortiferæ venenatæq; herbæ gustum explorare.

## DE GVAYAVAS.

 Rbor cuius fructus est Guayauas, apud Indos & Hispanos celebra- *Forma.*  
tissimus est, mediocris magnitudinis, ramis sparsis, folio laurino, flo-  
re candido aureæ mali floribus simili, aliquanto tamen maiore, odo-  
rato: facile nascitur quocunque loco feratur, adeoque luxuriat & ser-  
pit, ut in terræ vitiorum nomine habeatur, nam plurimorum agrorum gramen  
quod depasturi essent greges corrumpit nimio uti rubi implexu: fructus nostris  
malis similis est, eorum magnitudine quæ ab Hispanis *Camuesas* vocantur, viridis  
in initio, & per maturitatem aureus, pulpa interiore alba, interdum etiam rosea: diui-  
sus quatuor concamerationes autem: vascula habere conspicitur, in quibus semina  
reconduntur, mespilorum seminibus similia, durissima, colore fusco, omnino *Vires.*  
osseæ, medullæ & saporis expertia. Fructus edi solet prius dempto cortice, palato  
gratus est, sanus & facilis concoctionis: viridis in alui profluuiis utilis est, nam  
valde adstringit: præmaturus aluum soluit: at medius, hoc est neque immaturus  
neque præmaturus, si assetur, valentibus & ægris confert, nam ea ratione para-  
tus, sanior est gratiorisque saporis: præstantior autem is est quem domestica &  
cultæ arbores ferunt. Foliorum decocto Indi vtiliter tumentia crura lauant, eodē *Locus.*  
lienis obstructions tolluntur. Fructus frigidus esse videtur, propterea febricitan-  
tibus assatus datur. Vulgaris est per vniuersam Indiam.

## BALSAMVM TOLVTANVM.

 DVEHITUR ex Continentis quadam prouincia inter Carthaginem *Locus.*  
& Nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata, Balsami quidam liquor,  
maximarum virium, & præstantissimum omnium quæ hætenus ex  
iis regionibus attulerunt, medicamentum. Arborēs e quibus colligi-  
tur pumilis Pinis sunt similes, multos ramos quaquauersum spargentes, foliæque *Forma.*  
Ceratiæ similia obtinentes perpetuò virentia: præferuntur domestica & in cultis  
nata. Colligunt verò hunc liquorem Indi vulnerato & inciso arborum cortice  
qui tenuis & tenellus est, suppositisque, & arbori adnexis veluti quibusdam co-  
chlearibus e cera nigra in illis regionibus nata confectis, quæ emanantem e vulne-  
ribus liquorem excipiant, quem deinde in alia vascula ad eam rem parata effundūt:  
id verò feruentissimo sole fieri necesse est, ut liquor facilius emanet, nam noctus  
ob frigiditatem nihil effluere: erumpit etiam interdum ex ipsis arboris nodis & alis  
nonnihil liquoris, qui cum exiguus sit, & in solem decadat, perit. Porro apes quæ  
ceram istam conficiunt, nigra sunt, eamque in terræ hiatibus & cauernis subter-  
raneis elaborant. Plurimam autem huiusmodi ceram in Hispaniam deferri vidi,



qua ad paranda funalia utebantur: sed ob tetrum quem eius fumus spirabat odorem vetitus fuit eius vsus, postea tamen in medicamenta receptus. Etenim perutilia ex hac fiunt cerata ad mitigandos dolores è quavis causa frigida prouenientes: nam tumores resoluit, & plurima alia commoda præstat. Ceterum Balsameus hic liquor apud Indos maxime celebris est, ob insignes eius facultates, à quibus edocti deinde Hispani, cum miros eius effectus animaduernerent: pro re maximi pretij inde in Hispaniam detulerunt, magno illum istie redimentes, nec abs re, quandoquidem mihi præstantius esse maioribusque facultatibus pollere videtur eo qui è noua Hispania aduehitur. Colore rubro ad aureum tendente est, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, glutinosus admodum, & vbicunque reponatur firmiter inhaerens, sapore dulci & grato, nec si sumatur nauseam mouente quemadmodum reliqua Balsama, odore excellentissimo, & limonum fragrantiam quodammodo referente, sic vt vbicunque reponatur, abscondi non possit, sed suo odore locum gratiorem reddat: etiam paucillum in vola manus attritum, suauissimum spirat odorem vt Iasmini ferè. Eius facultates insignes sunt, quoniam incisione elicitur, quemadmodum olim Balsamum in Ægypto, ad eadem omnia ad quæ illud celebrabatur, efficax. Omnia recentia vulnera, curat consolidat, glutinaturque labra, nec materiam purulentam in iis exoriri sinit: quodque maius est, nullum cicatricis vestigium curatis vulneribus relinquit, si eorum labra probe iuncta fuerint, quapropter in faciei vulneribus singularis est, quandoquidem ea sine purulentæ materiæ generatione curat, nec vestigium vllum relinquit. Primum autem emundandum est vulnus ab omni spurcicie, & vino eluendum, deinde eius labra probe vnienda, Balsamumque sub tepidum illinendum, & lineus pannus duplicatus eodem Balsamo intinctus superimponendus, atque ita colligandus, vt labra hiare nequeant: postmodum victus ratio sit tenuis, secreturque vena si necesse sit: quarto demum die soluatur ligatura (nisi symptoma aliquod ante soluere cogat) & vulnus consolidatum inuenietur. Quod si singulis diebus vulnus curare necesse sit, lineum pannum Balsami liquori intinctum subinde adponendo glutinabitur: etenim eius facultas est prohibere, ne materia in vulnere generetur. Præsertim verò utile est in vulneribus in quibus fracta sint ossa, exemptis prius iis quæ separata sint fragmentis, & reliquis intactis, quoniam Balsami facultas ea expellet, vulnusque sensim consolidabit. Miræ etiam virtutis est in articulorum vulneribus, & neruorum sectionibus, omnibusque puncturis, etenim ea curat, atque à contractione liberat, ne partes inutiles fiant & motu priuentur. Altè penetrantia & cuniculosa vulnera curantur huius Balsami albo vino mixti per syringam iniectione, & post ternas deinde horas eius eductione: idem fit in vulneribus punctim inflatis, semel in die mediocriter calidum iniiciendo. Vtile præterea est in contusionibus, reliquisque chirurgi operam requirentibus, modo nulla insignis inflammatio adsit: ea verò conuenientibus medicamentis subblata, balsami est vsus. In morbis chirurgi operam minimè requirentibus plurimum prodest, veluti in asthmate, haustis eius aliquot ex albo vino guttis: capitis dolore è frigida causa progenerat lenit, lineo panno eius liquori intincto, capiti circumligato: & temporibus adpositum, omnem defluxionem cohibet, in oculos præsertim, eorumque dolores leuat, calidum admodum cerebro impositum dolorem tollit, roborat, & paralyti remedio est. Vbi sunt eo nonnulli phthisici, manè aliquot guttas è manu lambendo, magnūque senserunt commodum, quoniam pectus egregie expurgat. Aliquot eius guttæ ex aqua vitæ calida initio rigoris in quartanis, aut tertianis diuturnis & importunis sumptæ, viles sunt, sed etiam ante frigus eodem balsamo feruenti oleo rutaceo permixto ceruices inungendæ. Si quis ab orificio vetriculi ad vmbilicū vsque inungatur, venter



trculus roboratur, & dolore liberatur, languens cibi appetentia excitatur, concoctio iuuatur, flatus discutiuntur: at longè maiore efficacia istud molitur, si æquales balsami & olei nardini compositi vel simplicis partes misceantur, & facilius etiam illinitur. Longa experiètia apud Indos probatum est, eos qui Hydropicorum in morem tument, si hoc balsamo æquis partibus cum vnguento aperituo mixto ventrem illinant, lienis regionem præsertim, magnum leuamen sentire: quoslibet tumores & œdemata cuiuscunque partis corporis resoluit: omnes dolores à frigida causa promanantes etiam diuturnos tollit emplastri modo applicatum, & continuè delatum donec sponte decidat. Eisdem effectus præbet calidè adpositum, lineoque panno, qui aqua vitæ selectissima & calefacta madeat superimposito, ubi sunt flatus siue in ventre, siue in alia corporis parte, magnæ est etiam efficacæ in nephritico dolore, si feruës cum aliis oleis ad eum morbum vtilibus mixtum illinatur: contractorum neruorum dolorem lenit, & si persûmos æstus illo illinantur & fricentur, eos relaxat: parotides seu scrophulas tum cæcas tum apertas curat. Alias præterea multas facultates obtinet hic mirabilis liquor, quæ me latent, sed quas intelligere potui, vniuerso orbi notas facio, vt adeo præclaro medicamento & tam insignibus viribus prædito ( quibûsque longè plures & maiores tempus detegeret) quilibet vri queat. Donatum se ait Clusius pauxillo simili Balsamo à suo Morgano sub suum è Londino discessum anno 1581.

# PLANTARVM AEGYPTIARVM ET

*Syriacarum eiconica figura, & historia summa diligentia*

*& cura descripta à Leonardo Ravvol*

*Medecina doctore Augustano.*

642

## KALI ARABVM PRIMVM GENVS.



**P** RIMVM genus Kali Arabum ab illis *Usnen*, ab incolis verò regionis, quæ hanc Plantam fert *Schinan*, nominatum: ex cuius cinere Sapo fit, & vitri liquandæ inflandæq; materiæ nitrosa massa: (quam Galli vocant *Soude*.) Hæc Planta furculosa est, multisque veluti ramulis tenuibus venustè dispersa, in summis virgis hinc, illinc, nodulos multos edit, sub quibus folia emergunt angusta, tenuia, acuminata, (quæ forma, & facultate, minori Kali respondent,) infernè candida, supernè cinerea. Hæc non de foliis tantum, sed tota Planta intelligenda.



## KALI ARABVM secundum genus.

Forma.



LETERVM genus Kali, multos quoque ramulos spargit, & genicula plurima: Radicem habens crassam, lignosam, cinerei coloris.

## CONYZA SYRIÆ.

Locus



IRCA ciuitatem Tripolin, in Prouincia Syriæ, in multis locis gignitur, crescitque planta, quam Dioscorides, Græci & Latini Conyzam nominant. Ex cuius radice cauliculi multi gignuntur ad longitudinem pedis, quorum alij sese erigunt, alij vero, & maior copia, in terram se humiliant, & prosterunt: ex quibus postea, nouæ radiculae succrescunt, quæ rursus alios caules recentes producunt, vt possint transponi. Folia huius Plantæ sunt longa, Oliuæ similia, pingua, aliquantulum hirsuta. Odoris non exigui, suauis sament, quæ sicut & flores Conyzae maioris sunt similes.

KALI ARABVM  
secundum genus.

## CONYZA SYRIÆ.



## BRASSICAE MARINAE GENVS.

Nomina

Locus.

Forma.



IN Hortis, & locis incultis, & desertis, prouenit, Brassicae marinae genus, seu Soldanellæ, quod ab incolis Meudheudi à Rhafæ, libro ad Almanforem, Corigiola nominatur, Germani Brassicam marinam, sua lingua, in vniuersum Mierkoil appellant. Planta hæc crescit in arida & sicca terra, & locis arenosis, habetque radicem tenuem, huc illucque per terram diffusam. Folia eius sunt oblonga & parua, non vt in vulgari, rotunda, sed euntibus in latera venis, tanquam virgata, ad pediculum cui insident, latiora, & quadrata, in summo veluti crenata. Flores ex turbinatis capitulis emergunt, qui cum adolefcunt, in quinque foliola sese expandunt.

BRASSI



BRASSICAE Marina genus.



FICVS CYPRIA.



FICVS CYPRIA.



EXTRA Ciuitatem Tripolin, conspiciuntur variae arbores, & inter alias, *Locus.*  
 multa à Græcis Sycomori, ab Arabibus verò Mumeitz nominatæ, harū  
 Dioscor. & Theophrastus, duo ponunt genera, quorum alterum Ficus *Genera.*  
 Ægyptia dicitur, alterum verò Cypria dicitur, à loco denominatæ, ubi hæ copiosè  
 proueniunt. Huius Cypriæ nempe, quæ & in Syria frequens, arbores sunt magnæ,

**PLANTA RARA**  
*Plantagini longè similis.*



*Forma.* proceræ, ut etiam nonnullæ altitudinem Mori  
 candidæ assequantur. Cuius folia & iis similia  
 sunt, nisi quod paulo sint rotundiora, & in am-  
 bitu minimè serrata, quater in anno fert fructus  
 suos non in caudice ipso & ramis grādiōribus,  
 sicut Ægyptia, sed grominibus, ex hisce nascenti-  
 bus. Ficubus similes, minores tamen, Pruni  
 magnitudine, dulciōresque. Qua de causâ, cum  
 minus esui apti, viliores habentur. Inopi tamen  
 plebeculæ venales exponuntur. Amant valles,  
 & loca plana.

**PLANTA** rara Plantagini similis.



Escriptionem Plantæ addere nolui, ne  
 ob vires occultas, quas attribuit Diosc.  
 Veneficis innotescat, & in abusum ve-  
 niat, quæ non tantum hac præcipua nota, quod  
 eiusdè primæ speciei folia arescētia, ad formam  
 vnguiū Milui exanimati, sese cōtrahunt cogno-  
 scenda, sed & reliquis omnibus, quas attribuit  
 Diosco. Eam ob causam, illam tantam nomine,  
 Græcis characterib⁹ impresso, inscribere volui.

CYPRVS



# HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM, CYPRVS GRÆCORVM.

Nomina

Locus.

Forma.

Vfus.



re, tingunt. Ex radice huius arboris trita, vel vsta, Arabes Spodium parant, cuius Auicenna capite 17. meminit.



Idemys quoque arborem nostram in Germania *Eynholtz* seu *Mundholtz* nominata similem: à Latinis *Ligustrum*, ab Arabibus & Mauris *Alcanna* seu *Henne*, à Græcis nunc publico & communi vocabulo *Schemma* nominatur. Ex Aegypto, & præcipue ex Cayro, vbi copiosa prouenit, eò defertur. Hanc Turci & Mauritani, propter gratum & suauem odorem Muscho similem, quæ flores exhalant, diligenter in vasis custodiunt, & Hyeme, ne frigore pereant, in cubiculis, & subterraneis locis, seruant. Flores eius sunt pallidi, subflauo, duobus digitis longiores & tenelli, quatuor foliolis paruis constant. Ramuli flori concolores extant, quibus acuminatis leuigatis dentes purgant, & in eum usum, vendunt. Folia tota Hyeme durant, ex quibus, Succo Citriorum madefactis, liquorem eliciunt & recondunt, quo vngues digitorum, & capillos infantium, festis diebus, rubro colore, vt etiam equorum iugas & caudas, Turcarum more, tingunt. Ex radice huius arboris trita, vel vsta, Arabes Spodium parant, cuius

## PLANTA LACTARIA.

Forma.



Nomina

& *Sabeam*, ab Arabibus vocatam, cuius, Rhasis, sæpius mentionem fecit.



AVD procul ab Horto quodam, oblata nobis est incognita Planta Lacte turgida, cuius flores & folia, deciderant: Alta illa fuit cubitos duos, extrinsecus à summo ad radicem usque scabra, nõ quidem tota, sed hinc inde scabrities illa apparet quam pictura ostendit. Sicca & intus concaua, Sambuci modo: coloris è flauo virentis, multos habuit ramulos, recta sursum se attollentes veluti arundinaceos tubulos, compactos, non geniculis, sed scissura aliqua manifesta, ac si studio cultello esset facta, in interiore parte apparente, quæ ramis grandioribus inferuntur minores, separatim fusos, intus Lacteo succo plenos, qui succus acrius pungit, quam Tithymali lac, aut Esulæ. Ab Tucolis, nomen eius, quamuis sæpe percunctatus sim, scire non potui. Tandem, vt ex multis signis & coniecturis cognoscere licuit, iudicauit, hanc Plantam esse Xabra, & Camarrorum Rhasis, *Tanagant*,

PISTACIA



MELANTZANA ARABUM.

**V**IDIMVS quoque Plantam, Melantzanam, ab Arabibus *Melongena*, *Nomina*  
 seu *Bedengia*, nominatam, trium generum, colore distinctorum,  
 nempe Cinereo, Flauo, & ferè Purpureo. Fructus oblongos, cur- *Forma*;  
 uos, longæ cucurbitæ similes, procreat, & cuiuscunque generis  
 sunt, inter se forma non discrepant.

MELANTZANA NIGRA.

**M**ELANTZANAE nigrae, duo genera, Mauri vocant *Bathleschain*.  
 Fructus longus, altus, aliàs rotundus, colore nunc atro, nunc sub- *Forma*.  
 nigro, cortice læui, & procul intuenti, splendido, qui, vt Auerrhoes  
 inquit, salubrior est coctus, quàm crudus.

MELANTZANA,  
*Arabum Melongena.*



MELANTZANA  
*Nigra.*



SECACUL ARABVM, PASTINACA STRIACA:  
*Germanis Gerelen, siue Siferis Species.*

**E**XTRA Halepi hortos gignuntur duæ rara plantæ, quæ quia, in vul-  
 garibus cibus commendantur, inter Hortenses poni, numerarique  
 debent. Harum altera quam Arabes nominant *Secacul*, extra urbem *Locus*.  
 Halepi, in locis opacis & sub arboribus, & in segetibus, reperitur.  
 Radice læui, fragili & tenera, foris coloris cinerei, & intus albi. Carne lenta, molli, *Forma*.  
 & tenera. Ei crassities, digiti, sesquidigiti longitudo, pro fibris sunt, quædam tuber-  
 cula,



cula, parua rotunda, instar verrucarum, grati, & dulcis saporis, qualis est nostræ Pastinacæ flauæ, cui carne, caule & umbella valdè similis est, sed floris colore flauo, qui in Pastinaca nostra, candidus est. Radices, circumferanei seplasiarij, vèrè, filo connexas, & asseruatas, publicè, multas magnâq; quantitate vendunt, & distrahūt.

## PLANTA SPINOSA, MAVRORVM ALHAGI.

Nomina

Locus.

Forma.


Temper.

**P**LANTA rara Spinosa, Maurorum, *Alhagi*, *Agul*, & *Algul*. In eius fronde, præcipuè apud Persas, colligitur Manna, quam illi *Trunshibin*, Arabes verò *Tereniabin* & *Trunghin* vocant, multis spinulis rubris ea liquata manum tractantis, pungentibus. Circa ciuitatem Halepi, Plantæ spinosæ multæ, nascuntur cubito altiores, ramulis teretibus, & rotundis quamplurimis, multis tenuibus & molliusculis hinc, inde, spinis rigentibus. Spinæ quibus riget Planta hæc, sunt subcinerei coloris quemadmodum & folia, quæ Polygono sunt simillima sed siliquulas habet rubras, quæ & semina eiusdè coloris continent, quibus etiam hæc Manna scater. Floræ purpureæ, ex capitulis paruis & rubris, quibus oriuntur siliquulæ, scorpiodi, vel Coluteæ Scorpiodes simillimæ. Intus eiusdè coloris semina concluduntur. Radix mediocriter longa, fusca. Folia longiuscula, Gramini vel potius Polygono similia, cinerei coloris, circa spinularum radicem exeunt. Sicut Cuscuta variis sese implicat plantis, ita hæc spinam illam fere totam circumuolutam reperi. Temperamento, calida & sicca, incolæ, decocto horum foliorum, corpus purgaturi vnius manipuli decoctum, in aqua fontana, pauca paratum, bibunt. Manna, quæ his arboribus illabatur, *Tiri-miabin* à *Costa* vocat, cap. 66. & *Carduis* insidere, scribit.

## SECACUL ARABVM,

*Pastinaca Syriaca.*

## PLANTA SPINOSA,

*Maurorum Alhagi.*

SAFSAF



APPENDIX.  
SAFSAF STORVM.

25



**H**oc rarum genus Salicis, extra ciuitatem Halepi nascens incolis Salsaf nominatur. Multæ hæc arbores ibi crescunt, magnitudine inæquales, sed trunco, ligno, ramis similes Betula, & præsertim virgis, quæ longæ, prætenues, flexiles, pallentis, subfluui, aut sublutei sunt coloris, quibus insunt folia oleagina, supernè virentia, infernè candicantia, Vitis similia, & in caudice, ramisq; grandioribus germina, instar Ficus Cypriæ. At non sunt illa sine foliis, è quibus in Vere prodeunt, flosculi tenues, molles, & lanuginosi, populi albi, pallidi, & iucundi odoris. Incolæ hos flosculos, eo quòd nullum ferat fructum, auellunt & colligunt, aquamq; ex illis igne eliciunt, cordi roborando conuenientissimam & valentissimam. Has arbores Arabes vocant *Zarnab*, & *Zarnabum*, vt Rases cap. 353. & Auicenna ca. 749. Serapio verò cap. 26. comuni nomine *Zurumbeth*, prout ex eorum scriptis co-

Forma.

gnosimus. Arbor hæc non videtur esse Ziziphus Cappadocia, quam etiam eodem ferè loco sub nomine Seisefun describo. Siquidem hæc quæ & in Syria frequens, fructifera, illa verò cuius supra mentione facio, sterilis est. Præterea memini me & Ziziphi speciem aliam describere, folio 461. Hæc æporici mei, quam & in finibus Tyri & Sidonis reperi, quæ videtur omnino respondere Paliuro Theoph. Ibi, qui præterea quid cupiet plura inueniet.

MORGSA NI STORVM.



**P**LANTAM hanc raram, Syri Morgsani vocant, aspectu pulchram, ac elegantem, valde virentem, mediocriter crassam, & frondosam, radice longa, minimè succulenta, sed sicca ligniferæ modo, ex qua cauliculi aliquot erumpunt. Foliis rotandis Cappari similibus, vtrinque binis semper, & eodem ortu, vt in Faba. Inter hæc prodeunt flores, intus rubri, extrinsecus albi, quibus succedunt siliquæ oblongæ, quales Sesamj: Plantæ toti ingratus inest sapor odorque grauis, incolæ illa vtuntur lumbricis necandis, & depellendis. Quo autem nomine Veteres illam appellarint, dubitant, imò nesciunt. At ego, ex descriptione, & facilitate illius suspicor esse Ardifrigi Auicennæ, & Andirian Rhafis.

Forma.

Vfus.

CCCC



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,  
ANEMONES GENERA.

Forma.



Genera.

ASTRAGALVS DIOSC.  
vulgo Christiana radix.

Forma.



**A**NEMONES genera, floris rosei, lutei, purpurei varietate, distincta, aspectu pulchra, quæ Arabes Sakaick vocant. Iisdem locis nascuntur genera aliquot Anemones venusta ac insignia, vario floris colore, aliàs rubro, aliàs purpureo, nonnunquam luteo, quæ incolæ communi nomine Sakaick appellant cognomen addentes è floris colore sumptum, Sakaick achmar, Sakaick alfar, Sakaick aserach, id est, Anemone, rubra, purpurea & lutea.

ASTRAGALVS DIOSCORIDIS,  
vulgo Christiana radix.

**R**EPERIVNTVR iis in locis, Astragali genera duo, alterum foliis parvis Hedyfari, siue Securidacæ, aut quomodo quidam pronuntiant Securidacæ: alterum, quod descriptioni Dioscoridis omnino responderet, ac idcirco mihi verus Astragalus esse videtur. Frutex est exiguus, radice fusca, longa, magnitudine Raphani grandioris ex qua prodeunt cauliculi nigri, ipsa radice duriores, alij in terram inclinantes, alij in altum assurgentes, fastigio, velut in cornua diuisi, gustu dulci, cum mediocri siccitate & adstrictione. Cauliculorum qui è radice nascuntur, & in terram flectuntur, idem est color, longitudo verò digitalis. Ex iis spissi veluti ramuli diffunduntur, in quibus folia Lentis aut Orobi, ex aduerso, bina semper, novem fere aut undecim. Flos, purpureo, fusco & caruleo, distinguitur. Semen, in folliculis densis & carnosus, flatu distentis, Coluteæ modo, continetur. Depictæ radici non dedit proportionem, quamvis enim exigua sit Planta, minor tamen longè apparet in eicone, quàm in viva.

CHON



APPENDIX.

27

CHONDRILLÆ, ALTERUM GENUS  
DIOSCORIDIS.

**N**ON Agris cultis, & terræ aggeribus nascitur secundum genus Chon- *Locus.*  
drillæ Dioscoridis, radice rotunda, satis crassa, lævi, nigra, aut fusca,  
cum in altum excreuit, forma & crassitie vnus digiti. Longitudine *Forma.*  
digitorum quinque, ac interdum octo, tanquam bulbofo, infernè  
tuberculo, Castaneæ simili, quod Lacteam succum fundit. Ex summa radice, cau-  
liculi ferè tres oriuntur, folia Graminæ, longa, tenuia, multa in terram flexa, flos  
luteus, ac flauus, auriculæ Muris similis, inter illa prodit: florum cuique suus est  
pediculus.

CHONDRILLÆ ALIVD GENUS  
DIOSCORIDIS.

**N**ON procul ab iis locis quæ memorauimus, in Agris lapidosis & aridiori- *Locus.*  
bus, prouenit alterum genus Chondrillæ Dioscoridis, superiori,  
quam descripsimus, radice & flore similis. Foliis vero, quæ sola dif- *Forma.*  
ferentia est, latioribus & crassioribus, colore cinereis, & ferè talibus,  
qualia nos in Holoftio Mompelij vidimus.

CHONDRILLÆ,  
alterum genus Dioscor.



CHONDRILLÆ,  
aliud genus Dioscor.



CCCc 2



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,  
CHRYSOGONVM DIOSCORIDIS

Forma.



**C**HRYSOGONVM Planta rara, inter Segetes, ad cubiti altitudinem confurgit, quam flore, caule, & tuberosa radice, quæ intus rubea, Leontopetalo valde similem comperi, differunt tamen inter se, eo quod Chrysogoni caulis, exilior & tenuior est, in plures veluti furculos diuisus, à se inuicem separatos, in quorum vertice aureus flos emicat, coronis aptus, formosior, & copiosior, Verbasci quàm in Leontopetalo maiores. Exeunt ex radice superiore parte, quæ è terra profilit, tres aut quatuor ferè furculi. Plerumque quatuor apparent, nec memini me tres reperisse: fili modo tenues, in quibus folia sunt ex aduerso vtrinque bina, obscurius virentia, humi strata, in summo & extremo, qua parte latiora sunt, Quercus modo dissecta.

LYCOPSIS DIOSCORIDIS.

Locus.

Forma.



**I**N eodem agro, vidi plantam raram, Cynoglossi genus, & vt arbitror veram Lycopsin Dioscoridis, radice rubra, caule recto, bicubitali. Foliis multis, asperis, duris, Rubi modo, aut Sylvestris Cynoglossi scabris, propè radicem in orbem circumiectis & distentis, superiori parte caulis, non sic dispositis, sed hinc inde è caule prodeuntibus, & in summo & vertice acuminatis, furculis paruis, tenuibus, numerosis viginti, aut pluribus, nudis, folioq; nullo vestitis, vt in Echio. In horum summo, flores purpurei micant, exiles, extrinsecus minimè diuisi, intrinsecus verò in sex foliola dispartiti, vt in Sylvestri Bethonica.

MAURO



## MAVRORVM RHASVT, ET RVMIGI.



**D**ESCRIPTAE Lycopsidi, vicina fuit planta rara, & nobis incognita, quam Incolæ Rhafut & Rumigi nominant, odoris exiguus, sed haud quaquam gratus. Ramulos habet albicantes, plerunque quatuor, aliquando plures, prope radicem, fili modo, valde tenues. Folia circiter septem, vel octo, tenuia, mollia, cinerei coloris, ex aduerso bina, ab utraque parte sita & inuicem sibi obiecta, magnitudine, longitudine, & incisuris, florenti Filici similia, nisi quod adnatas habent, ad exortum suum, Lacinias duas, velut auriculas quasdam rotundas, omnino folij principio coherentes & coniunctas, ut in Salvia minori. Quaparte, folia cauliculo adnexa sunt, exeunt flores Aristolochiae similes, aliquanto maiores, colore magis fusco, & longiore pediculo subnixa. Radix longa, satis profunde demissa, gustu amara, unde cognoscimus, eam siccare, & nonnihil calfacere. Plantam hanc non in-

Forma.

commodè ad Aristolochias referri posse existimo.

## TRAGIVM ALTERVM DIOSCORIDIS,

Secudes &amp; Sucudus Auicenna.



**I**N CA riuiolos & aquosa loca, nonnunquam & in Montosis, frequenter nascitur Tragium alterum Dioscoridis. Radice longa, tenui, candida, ex qua prodeunt lignosi tanquam surculi graciles, digito non longiores, à quibus consurgunt folia multa simul longa, quæ rursus multis foliolis à latere utrinque dispositis cinguntur, Saxifragiæ rubræ, Trichomanis modo, paulò longioribus. Cuiusmodi in Aspleno apparent, quæ lanuginosa, præsertim minora, quæ inter alia oriuntur. Flores huius Plantæ iam primum tum temporis incipiebant apparere, ita ut nondum potuerim illos exactè cognoscere. Flos violaceus & fuscus, cui figura stipatus, sui & peculiaris pediculi fastigio, euehitur. Incolæ hanc plantam Secudes appellant, quo nomine & Arabibus fuit cognita præsertim Auicennæ, cap. 679. qui facultatem illi astringentem attribuit, & Dysentericis vtilem esse tradit. Aliam

Locus.

Forma.

Vfus.

tamen Plantam suprà descriptam, Secudes Arabum esse, quidam potius existimant.



HISTORIÆ GENERALIS PLANTARVM,  
LILIVM ALBUM SYRIACVM.

Forma.



DIVINGENDAM his Plantis duxi  
raram Lilij albi speciem, & ima-  
ginem, pingendam, quam Phar-  
macopolæ ciuitatis Halepi, nar-  
rant in locis aquosis prouenire. Caulis proce-  
rus est, crassitie & colore Lilio nostro similis,  
sed latior, præcipuè circa verticem, qua in par-  
te, latitudinem, trium digitorum excedit.  
Vndique quantum porrigitur emergunt, folia  
tenuia, longiuscula, tenella, & quæ faciliè deci-  
dant. In eius summo fastigio aliquot flores  
candidi, nostratibus, similes visuntur. Hanc  
Plantam, quidam esse volunt Liliū à Theo-  
phrasto memoratum, lib. 4. cap. 9. Cæterum  
de Stratiote aquatico Theophrasti, verba in-  
telligenda sunt, cuius meminere, Athenæus  
lib. 14. & Plinius cap. 15. lib. 24.

GARAB MAVRORVM.

Forma.



Vires.



ARAB Maurorum, rarum & pe-  
regrinum Salicis genus, è quo  
Aphronitrum, Salem Petræ vo-  
cant optimum fit igniario pulue-  
ri parando, quo in bellicis tormentis, pilis ex-  
cutiendis vtuntur. Appicta Plūta rarum & exo-  
ticum genus est Salicis. Incolæ apud quos na-  
scitur, etiam nunc veteri Arabum nomine  
Garab vocant. Hæ Arbores non multum se in  
altum attollunt, sed humiliores huc illucque  
diffundunt virgas crassiores, & firmiores, quàm  
nostrarum Salicum, idèoque minus vegetas, &  
ad ligaturas aptas, cortice luteo vtumque pal-  
lescente, quem & folia habent, quæ ad Palmum  
longa, duos digitos lata, in ambitu serrata.  
Attriplicis modo duos digitos longis, qua no-  
ta ab aliis Salicibus differunt: modicè quod ob-  
seruare potui, sicant & adstringunt folia. De  
fructibus & floribus, (quorum Auicenna cap.  
326. & cap. 686. meminit) quoniam ego, tum  
temporis nec vidi, nec quicquam al. unde co-  
gnoui, nil certi scribere possum.

TRIONON



## TRIONVM THEOPHRASTI.



**T**N agris Planta rara gignitur, ob altitudinem facile spectabilis Sesamo non dissimilis, sed caule longiore & crassiore. Foliis asperioribus circa extremum, in tres partes à sedistantes & separatas, fisis, quod in Sesami foliis Salici, longitudine & colore similibus, non conspicitur. Ex imo foliorum, eo quòd certis interuallis prodeunt, emergunt Flores, aspectu pulchri, foris, lutei coloris, cum rubentibus uiculis, intus verò, purpurei ad fuscum vergētes, in quorum medio extant parui torulei, quibus post florum lapsum, vascula succedunt in modum siliquarum, longitudine ferè & crassitie digiti, extrinsecus aspera, & in summo acuminata, intrinsecus in quinque veluti loculos diuisa: quibus continetur digestum semen omnino Pisis simile seminibus Maluæ, vel Ibisçi, quod pro Abutilo Auicennæ habetur. Planta hæc ab illis, *Lubie Endigi* id est, Indicus Phaseolus vocatur: ni fallor, puto esse Trionum Theophrasti, cuius ille sæpe mentionem facit.

Forma.

Nomina

## TEREBINTHVS INDICA, prior Theophrasti.



**T**N officina pharmacopolarum, Terebinthi fructus passim venduntur gustu pistacii simili. Incolæ iis vescuntur vbique, vt nostri Germani Auellanis. Ego cum manderem, lenē salsedinem in iis cum mediocri siccitate, deprehendi. Arabes *Botin*, Persæ *Therbaick*, nominant. Horum duo sunt genera, magnitudine distincta, maiores quidem Arabes, vt differentiam indicent, *Botin quibir*, id est, magnos, minores, *Botin Sougier*, id est, paruos, appellant. Maiores, figura similes sunt nostris Pistaciis, mediocri magnitudine, non tamen sic longi vt Pistachia, sed globosi magis. Minorum ea est magnitudo, vt quæ Pisi habitioris, forma turbinata, vt Cordis, siue Milij Indici, quorum magnus est in Perside, Mesopotamia, & Armenia prouentus. Quæ hos fructus profert Terebinthi, vbique hic nascuntur, folio, aliàs longo, vt in Terebintho nostrate, aliàs maiore & rotundiore, quale est Pistaciorum sequentis arboris depictæ, quibus folia sunt sub-

Nomina

Genera. c

Locus.


Forma.

longa, vt in Terebintho nostrate, non vt in Pistachiis rotunda: ita vt hæc primo intuitu, dignosci hisce possint.



*RIBES ARABVM, cum suis Capreolis.**Locus.*

N editissimis locis montis Libani, præter Scortzoneram, luteo flore & Tulipam, sub flauis Ribes veram, ego quoque reperi, sed Autumno incommoda Plantis inuestigandis anni parte, sine flore, ac

*Forma.*

semine, duobus tantum foliis recenter enatis, asperis, rotundis, Petasiti similibus, pediculo quidem breui, subnixis, sed crassiusculo: radice satis longa, magna, dura, incurua, rugosa, colore fusca, saporis, odorisque ingrati. Gaudet humidis & opacis locis. E iuncea huius plantæ Capreolis, extrinsecus scabris, & ruvidis, supernè virentibus, infernè rubris, quod etiam tradit Serapio. Caulibus fructu & foliorum pediculis, succus acidulus exprimitur, vt ex nostratis Ribes vua & acinis, quo Rob Arabes parant, viris primariis, ac ditioribus, quod in magno pretio habetur.

*TRAGACANTHAE ALTERVM GENVS.**Locus.*

IGRESSIS à monte Libano in descensu occurrerunt tria Tragacantha genera. Quorum primum, cuius doctissimus vir Carolus Clusius meminit, verè videtur esse simillimū. Alterum illo quidem humilior, forma tamen, aspectu & habitu, haud dissimile, nisi quod flores flauescunt, ex rotundis & subflauis, tanquam vasculis exeuntes, & per tenues furculos, vtrinque impari exortu, sint dispositi. Tertium est altitudine & statura simile secundo, ramos habet densos, oblongos colore, fusco in quorum vertice, capita multa subalba visuntur, qualia sunt Poterij cū floribus, purpureis & speciosis.

*Genera.**Forma.**RIBES ARABVM,  
cum suis Capreolis.**TRAGACANTHAE  
alterum genus.**MEDIVM*



*MEDIUM DIOSCORIDIS, VEL  
MINDIVM RHASIS.*

**V**LTERRIVS progrediendo, in locis obscuris, vmbrosis & opacis, *Locus.*  
inter arbusta, vidimus Medium Dioscoridis, seu Mindium Rhasis,  
insigni proceritate, Violæ Marianæ, Dodonæi, simile, foliis Planta-  
ginis minoris, valdè Laciniatis, à se inuicem multum separatis, flore *Forma.*  
lato & amplo, purpureo, nonnihil albicante, foliolis octo reclusum & apertum,  
cingentibus. Maturum semen videre & colligere, non licuit. Historiæ Dioscori-  
dis prorsus hæc planta, conuenire videtur.

*BACCHARIS DIOSCORIDIS.*

**P**LANTA hæc, quam pro Bacchari Dioscoridis nos ostendimus, fru-  
tcosa est, altitudine cubitali, foliis lanuginosis & albicantibus,  
Verbasci modo, eo minoribus, quæ veluti exulta, sima sui parte,  
sine pediculo, caulem amplectuntur, vt in Nicotiana siue Tabaca.  
Flos in ima parte, & summis virgis nitet, purpureus, subalbicans, densus & valde *Forma.*  
stipatus, qualis Elichrisi, vel auriculæ muris, seu Pilosellæ Fuchsi. Radicem effo-  
dere non potui. Ea si Veratro similis est, & odorata, vt videtur esse, prout ex pau-  
cis fibris in illa relictis apparet, veram Dioscoridis Baccharim esse iudicarem.

*MEDIUM DIOSCORIDIS  
vel Mindium Rhasis.*



*BACCHARIS  
Dioscoridis.*



CCCC 5



## GINGIDIVM DIOSCORIDIS.

Forma.




GINGIDIVM illud nostrati haud absimile est, sed folio fœniculi tenuiore, gustûque amariore, quàm sylvestris Pastinacæ nostratis, cui in cacumine umbella alba, & in medio purpureû quiddam apparet è quibus semen prodit, quod altera parte inter squamulas, quibus, quasi corolla circumdatum, extuberat forma rotunda Coriandri, minori tantum, quo maturescente, tota sese contrahit umbella, radix parua, candida. Ex his scilicet notis Gingidium Dioscor. esse ego censui.

## MAVRORVM BELLAN, FORTASSE

Sanguisorba spinosa.

Locus.



Forma.

RVTEX in declivi montis Libani parte nascens, surculis compluribus cubitalibus, foliis tenellis, longiusculis, in pediculis ordine ex aduerso positis, supernis vtcunq; virentibus, infernè cinereis, nostræ Pimpinellæ, Sanguisorbæ similibus, cui hæc Planta, tam forma, quam viribus, altringente nãmque & exsiccante, videtur admodum respondere. In summis ramulis eminent spinæ, è quibus aliæ deorsum, aliæ ad latus, quamplurimum autem sursum spectant. Ex iis tempore Veris præsertim eminentioribus, flosculi prodeunt, è viridi pallentes, stellati, quibus succedunt baccaë albicantes, magnitudine Piperis, cum rubore nonnihil conspersæ, racematim coherentes, vt in vuis Ribes nostratis, quibus similes sunt. Bellan Incolæ nominant, quidâ Hippophaën Dioscor. esse existimant, sed, quod in multis descriptioni non respondet, inter Pimpinellæ, Sanguisorbæ species videtur recensenda.


Nomina

## GINGIDIVM,

Dioscoridi.

## MAVRORVM BELLA

fortasse Sanguisorba spinosa.



BEHMEN



BEHMEN ABIAD ARABVM,

Id est, BEHEN ALBVM.



ELEGANS  
genus Limonij.



**A**D radices Libani, umbrato solo & aquoso, gignitur verū Behen album Arabū, quod etiam hodie incolæ, Behmen Abiad vocant, ut Behen rubrum, Behmen Ackmar: ea planta, instante iam Hyeme, ferè interierat, multis ramulis & foliis exsiccatīs & arefactis, verūm alio loco, noui ramuli & surculi extiterunt, ut *Tempus.* Ve. is tempore germinare solent. Folia, magna, longa, spissa, qualia Oxylapathi. In horum ima parte, folij Laciniæ quatuor, ex aduerso binæ: at quæ ex caule superiori nascuntur, longitudine cubitali amplectuntur illum sine pediculo, ut in Perfoliata vulgari, & Smyrnio Cretico. In caulis fastigio, surculi prominent, cum foliis minoribus, oblonga, flaua, squamosa capitula sustinentes, è quibus prodit flauus quoque flos. Radix longa, geniculata nullis capillata fibris, serpit instar Glycyrrhizæ, quæ æmulatur & forma & crassitie, sed intus alba potius, quàm flaua. Quod autem scribit Aui-cenna huius Plantæ radices contrahi & corrugari, conspicitur id quidem, in crassis & inueteratis, non in gracilioribus, & nuper enatis.

ELEGANS GENVS  
LIMONII.

**I**N opacis & humidis locis nascitur elegans genus Limonij, decem aut duodecim foliis, Asplenio similibus. Radice oblonga, extrinsecus fusca, intus rubra, duobus aut tribus ramulis, inter folia exorientibus, cubitum altis, in quorum vertice multi surculi emicant, cum tribus foliis longis & tenuibus, quæ illos circumdant, flore purpureo aspectu pulcherrimo, flores & surculi siccandi vim habent. Eos mensis apponunt, incolæ pro acetariis, folia tantum. *Vires.*

SCHEHA



## SCHEHA ARABVM, ABSINTHII GENVS.

Locus.

Forma.



IRCA Bethlehem prouenit, copiosum Absinthij genus, foliis cinereis, quale est nostratis; ramulis tenellis multis, in quorum vertice, semen copiosissimum est grauis odoris, qui nauseam moueat, etiam valde molestam, gustu acré, salum, amarum. Hanc Plantam Arabes *Scheha* vocant. Semen huius minutissimum est, semen Zina, lumbricis necandis vtilissima; quamobrem semen contra vermes Mercatores, qui vendunt & emunt, nuncupant.

FINIS APPENDICIS.





# INDEX APPENDICIS

HISTORIÆ GENERALIS  
PLANTARVM.



Conitum Pardalianches primum. pag. 16.		Maceris Bracmenici facultates.	3
Ananas à Coste.	12	Macer Dioscoridis.	ibid.
Anemone, & eius genera.	26	Macer Galeni.	ibid.
Asragalus Dioscoridis, & eius genera.	ibid.	Macis & Maceris discrimen.	4
Auellana Indica à Coste.	7	Maurorum Bellan siue Sanguisorba spinosa.	4
B		Medium Dioscoridis vel Mendiū & hāsis.	33
Balsamum Tolutanum.	17	Melanzana, Arabum Melongena.	23
Baccharis Dioscoridis.	33	Melanzana nigra, & eius genera.	ibidem
Behmen abiad, siue album Arabum.	35	Morgani Syrorum.	25
Betre Garcie ab horto.	13	Musa à Coste.	11
Brassica Marina genus.	20	N	
C		Nardus Indica Garcie ab horto.	15
Canella à Coste.	1	Nux Moschata à Coste.	4
Carcapuli eiusdem.	13	P	
Caryophyllus eiusdem.	5	Palma Indica, quæ & Elephantis, & eius genera.	7
Chondrilla Dioscor. alterum genus.	27	Palma Indica nux Persis Narel & Nar- gel.	ibidem
Chondrilla eiusdem aliud genus.	ibid.	Piper nigrum à Coste, & eius genera.	6
Chrysogonum eiusdem.	28	Piperis serendi modus.	ibidem
Coccus Palme Indica cortex.	9	Planta rara Platagini similis.	21
Conyza Syria.	20	Planta Lactaria.	22
Crocus Indicus à Coste.	11	Planta spinosa, Maurorum Albagi.	24
Cucuphera Matthioli.	8	R	
Cyprus Gracorum.	22	Radix China à Coste.	10
F		Rhasut Maurorum vel Rumigi.	29
Ficus Indica à Coste.	11	Ribes Arabum cum suis Capreolis.	32
Ficus Cypria, & eius genera.	21	S	
G		Safsaf Syrorum.	25
Garab Maurorum.	30	Scheha Arabum, Absinthij genus.	36
Gingidium Dioscoridis.	34	Secacul Arabum, Pastinaca Syriaca: siue Si- serij species.	23
Guayauas.	17	T	
K		Tamarindus à Coste.	9
Kali Arabum primum genus.	19	Terebinthus Indica prior Theophrasti, & eius genera.	32
Kali Arabum secundum genus.	20	Tragacantha alterum genus.	ibid.
L		Tragium alterum Dioscoridis.	29
Lilium album Syriacum.	30	Trionum Theophrasti	31
Limoni elegans genus.	35	F I N I S.	
Lycopsis Dioscoridis.	28		
M			
Macer à Coste.	2		



## LECTORI

**N**onnulli negligentia crimen pertimescentes sub librorum finem Errata subiicere dubitant: ego autem aliam sequutus viam, malo delicta pagin in his impressis admitta, Erratis ipsis ad calcem adnexis & representatis, libere ingenuèque profiteri, quàm hæsitantem, suspensum, & in erroribus perquirendis sollicitum tenere Lectorem, utq; facilius exactusque, suo loco & tempore, menda quæque emendare & corrigere possit. Vale.

ERRATA PRIMAE PARTIS.

*Prior numerus paginam, posterior lineam indicat.*

Repono, procul. pag. 30.	Self. ibid. 86.7	coqui debe. ibid. 86	secutarius & improbus.	alas. 816.45
lin. 4	hispis nō siliqua. 86.7	spatij modo stratos.	Phoxis fol. & 38	& mulis. 816.45
Gallis. 32.48	nilos. ibid. 14	71.14	416.18	constant. 827.7
corbelle ex cacis. 31.30	Acheronte. ibid. 10	Cientibus. 372.37	474.12	aur Delphinium. 806.9
Serbus vocat. Gallie. 36.9	itili, ibi. 23.48 & 28	Centaurea. 375.16	474.24	Hedera. 809. in lēm. 2
Cedria itaque. 38.9	Ruellii. 87. vt	Hispanico spatro. 377.48	481.35	Erythrodan. 817.4
ex alterum redundat.	Pontō flemen tunc Refti-	flore, femine. ibid. 48	481.35	817.4
ibid. 45	na. 88.43	de amari & idem. 179.13	ibid. 35	817.4
repullat. 43.31	aymoy. 59.4	nafeit. ibid. 17	ibid. 17	817.4
Boëmis. ibid. 41	gdyra. 59.39	mauris, delendū. 181.41	ibid. 17	817.4
mores. 44.2	gdyra. 59.39	procumbens. 181.41	ibid. 17	817.4
Boëmia. 45.12	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 47.1	Phillyrea confidit qua	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 48	Phillyream atque ita	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 49	femper. ibid. 43	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 50.29	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 51	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 52	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 53	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 54	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 55	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 56	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 57	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 58	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 59	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 60	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 61	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 62	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 63	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 64	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 65	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 66	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 67	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 68	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 69	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 70	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 71	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 72	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 73	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 74	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 75	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 76	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 77	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 78	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 79	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 80	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 81	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 82	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 83	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 84	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 85	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 86	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 87	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 88	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 89	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 90	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 91	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 92	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 93	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 94	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 95	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 96	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 97	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 98	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 99	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 100	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 101	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 102	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 103	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 104	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 105	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 106	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 107	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 108	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 109	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 110	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 111	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 112	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 113	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 114	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 115	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 116	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 117	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 118	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 119	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 120	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 121	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 122	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 123	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 124	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 125	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 126	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 127	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 128	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 129	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 130	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 131	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 132	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 133	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 134	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 135	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 136	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 137	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 138	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 139	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 140	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 141	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 142	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 143	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 144	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 145	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 146	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 147	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 148	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 149	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 150	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 151	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 152	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 153	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 154	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 155	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 156	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 157	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 158	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 159	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 160	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 161	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 162	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 163	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 164	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 165	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 166	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 167	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 168	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 169	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 170	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 171	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 172	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 173	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 174	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 175	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 176	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 177	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 178	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 179	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 180	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 181	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 182	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 183	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 184	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 185	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 186	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 187	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 188	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 189	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 190	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 191	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 192	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 193	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 194	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 195	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 196	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 197	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 198	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 199	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 200	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 201	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 202	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 203	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 204	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 205	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 206	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 207	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 208	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 209	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 210	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 211	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 212	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 213	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 214	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 215	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 216	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 217	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 218	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 219	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 220	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 221	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 222	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 223	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 224	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 225	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 226	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 227	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 228	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 229	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 230	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 231	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 232	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 233	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 234	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 235	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 236	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 237	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 238	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 239	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 240	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 241	ibid. 48	181.41	ibid. 17	817.4
ibid. 242	ibid. 48	181.41	ibid. 17	



*Prior numerus paginam, posterior lineam indicat.*

*F I N I S.*









# INDEX HISTORIÆ

## PLANTARVM LOCVPLETISSIMVS,

LATINVS, GRÆCVS, ARABICVS, GALLICVS,

ITALICVS, HISPANICVS, GERMANICVS,

BELGICVS, BOEMICVS,

ANGLICVS;

Quo non arborum modò & fruticum, subfruticum, herbarum, radicum, corticùmque, verùm etiam fructuum, succorum, lacrymarum, oleorum, aliorumque id genus nomenclaturæ ordine alphabetico diligentissimè recensentur, appositis fideliter suo quoq; loco paginarum arithmeticis numeris: vt nullo labore summa eorù omnium capita, quæ fusè libris his totis xviii. explicantur inueniri possit.



<b>A</b>	<b>BALZEMER</b>	<b>Acacia.</b> 160. eis duo gene ra. <i>ibid.</i>	<b>Acetum ex malis.</b> 289
	<i>Persis, quæ</i>	<i>&amp; 161. 162.</i>	<b>Achanaca</b> Thueti. 1904
	<i>Senna vulg.</i>	<b>Acacia, omnis acrimonia prorsus</b>	<b>Achillea.</b> 772
	<i>go. pag. 218</i>	<i>expers.</i> 163	<b>Achillea montana, Pene.</b> <i>ibid.</i>
	<i>Abhel, Sabi-</i>	<b>Acacia vera æthiops.</b> <i>ibi.</i>	<b>Achillea sideritis, Matth.</b> <i>ibid.</i>
	<i>ne aut gene</i>	<b>Acaion.</b> 1846	<b>Achillea sideritis Dioscor.</b> 1278
	<i>rus ipsius fructus est, non luni-</i>	<b>Acanos Plinij.</b> 1480	<b>Achras. i. papee sylue.</b> 308
	<i>peri.</i> 184	<b>Acanthice Mastiche.</b> 64	<b>Acidula.</b> 602
<b>Abies.</b> 53		<b>Acanthis.</b> 575	<b>Acilaci Græcis hodie quid.</b> 24. 26
<b>Abietis album, Æthiops Græcis.</b> 54		<b>Acanthium.</b> 1445. Matth. 1446	<b>Acinus quid.</b> 598
<b>Abietis lacryma.</b> <i>ibid.</i>		<b>Acanthium montanum Dale-</b>	<b>Acinus.</b> 912. Matth. <i>ibid.</i>
<b>Abiga unde dicta.</b> 1161		<b>champi.</b> <i>ibid.</i>	<b>Acinus, siue Clinopodium sylue-</b>
<b>Abrotonum odoratum humile,</b>		<b>Acanthium Spine alba alterum</b>	<b>str.</b> <i>ibid.</i>
<b>Lobellij. 939. Indorum, eius-</b>		<b>genus.</b> 1462	<b>Aconitum.</b> 1732
<b>dem.</b> <i>ibid.</i>		<b>Acanthium spina alba syluestris,</b>	<b>Aconitum aliud, Dalech.</b> <i>ibid.</i>
<b>Abrotonum.</b> 936. <i>famina &amp;</i>		<b>Fuchsy.</b> 1466	<b>Aconitum candidum Æthiops, Da-</b>
<b>mas, Matth. 937. femina</b>		<b>Acanthus &amp; Acatha.</b> 1442. 1443	<b>lechampi.</b> 1743
<b>&amp; mas, Dodonæi.</b> 938		<b>Acanthus sativus Matth.</b> 1443	<b>Aconitum lycoctonũ II. &amp; III.</b>
<b>Abrotonum femina Fuchsy, Ab-</b>		<b>Acanthus syluestris, Carduus</b>	<b>Matth. 1739. IIII. eiusd.</b> 1740
<b>sinthium Ponticũ Dodon.</b> 945		<b>pratensis, Tragi.</b> <i>ibid.</i>	<b>Aconitum v. VI. VII. Matth.</b> <i>ibi.</i>
<b>Abinthium.</b> 940		<b>Acanthus syluestris Dalech.</b> 1444	<b>Aconitũ VIII. &amp; IX. Mat.</b> 1741
<b>Abinthium vulgare.</b> 943. <i>Pon-</i>		<b>Acanus quid.</b> 1453	<b>Aconitum lycoctonũ luteũ maius,</b>
<b>ticum, Matth. ibid. Ponticum</b>		<b>Acarna, Carlina syluestris minor,</b>	<b>Dodon. ibid. minus eiusd.</b> 1742
<b>Tridentinum, Herbariorum,</b>		<b>Clusij.</b> 1484	<b>Aconitum lycoctonum Dodon. ex</b>
<b>Lobel. ibid. Seriphium seu</b>		<b>Acarna Theophrasti, Anguillare,</b>	<b>cod. Cesareo.</b> <i>ibid.</i>
<b>marinum, Matth. ibid. Seri-</b>		<b>Lobellij.</b> <i>ibid.</i>	<b>Aconiti lycoctoni genus aliud, Da-</b>
<b>phium Aegyptium, Mat.</b> 944		<b>Acarna Valerandi altera.</b> <i>ibid.</i>	<b>lecham.</b> 1744
<b>Seriphium Dodonæi. ibidem.</b>		<b>Acer, vel Aceris, &amp; eius genera.</b>	<b>Aconitum monococcon Cordi.</b> 1312
<b>Seriphium verũ, Pene &amp; Lob.</b>		<b>94. &amp; 95</b>	<b>Aconitum pardalianches Diosco-</b>
<b>ibid. Ponticum Dodonæi.</b> 945.		<b>Acer album.</b> 220	<b>ridis, Fuchsy.</b> 1312
<b>arborescens, Lob. 946. album</b>		<b>Aceris radix.</b> 95	<b>Aconiũ pardalianches Dod.</b> 1203
<b>capitulis scabris, eiusdem. ibi.</b>		<b>Acetabulum.</b> 1608	<b>Aconitum pardalianches, Mat-</b>
<b>angustifolium Dodo. ibid.</b>		<b>Acetabulum alterum.</b> 1322	<b>thioli.</b> 1735
<b>Abutilon Auicennæ.</b> 592		<b>Acetosa Officinarum.</b> 605	<b>Aconitum pardalianches minus,</b>
		<b>Acetosa rotunda vulgi.</b> 602	<b>Matth.</b> 1737



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Aconitum pardalianches</i> Plinij.	1638	<i>Agis.</i>	1909	<i>Alcea vulgaris</i> Lobellj.	1593
<i>ibid.</i>		<i>Aglaophotis.</i>	855	<i>Alchymilla.</i>	1175
<i>Aconitum pardalianches</i> Theophrast ex Matth.	1638	<i>Agnum quidem esse censens</i> Theophr.	133	<i>Alchymilla.</i>	1281
<i>Aconiti noxe.</i>	1744	<i>Agnus Castus officinarum</i>	280	<i>Alchymilla.</i>	1322
<i>Acopos.</i>	105	<i>Agnus Scythicus, Boramerz.</i>	1849	<i>Alchymilla.</i>	1100.1101
<i>Acorum &amp; Acorus.</i>	1617	<i>Agrestia omnia propemodum sui generis domesticis valentiora sunt.</i>	530	<i>Alchymilla.</i>	1104
<i>Acorum verum, Matthioli</i>	1618	<i>Agrestia omnia hortensibus aciora &amp; siccora.</i>	1544	<i>Alchymilla.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Acorum cum flore Robini, regis Francorum Herbarij.</i>	1618	<i>Agriacantha.</i>	1480	<i>Alchymilla.</i>	1436
<i>Acorus luteus falsus, Matthioli.</i>	1619	<i>Agrifolium officinarum.</i>	46.146	<i>Alchymilla.</i>	1073
<i>Acori veri radices perperam necne in officinis pro Calamo versurpate.</i>	1889	<i>Agrimonia officinarum.</i>	1251	<i>Alexadrimam &amp; ite vocat Plinius quam Theophrastus Idam</i>	191
<i>Acori radix.</i>	1893	<i>Agriocardamum.</i>	665	<i>Alga.</i>	1569
<i>Acorna.</i>	1483. Theophr. <i>ibid.</i>	<i>Alhouai. 1843. Theueti, ex Clusio.</i>	1844	<i>Alhaut herba peregrina.</i>	157
<i>Actaea Plinij, Ebulus nec ne sit.</i>	269	<i>Alibales.</i>	1128	<i>Alica 184. unde dicta 183: ex quibus frugibus fiat <i>ibid.</i> &amp; 186</i>	
<i>Acula.</i>	712	<i>Alinga seu biga.</i>	1159	<i>Alica gypsum &amp; arenam miscere soliti veteres.</i>	387
<i>Aculeosa.</i>	1473	<i>Alinga adulterina Clusij.</i>	1161	<i>Alum.</i>	264
<i>Aculeosa. 1480. Aculeus.</i>	1435	<i>Aizoon, Ionis Barba officinis.</i>	194.1128	<i>Alumina Dioscoridis quorundam falso.</i>	1358
<i>Acutella.</i>	447	<i>Aizoon dasiphylum, Dalechampi.</i>	1133	<i>Alk l.</i>	1377
<i>Acus muscata.</i>	1275. 277	<i>Aizoon minus, siue Semperuium minus Dodonai.</i>	129	<i>Alleluia Officinarum.</i>	504
<i>Acus pastoris.</i>	7.2	<i>Aizoon minus, siue Semperuium Dodonai.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alleluia.</i>	1354
<i>Acus pastoris.</i>	1275. 1277	<i>Aizoon minus Matthioli, idem cum proximo.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alliaria siue Alliaria. 911. Matthioli &amp; Dodonaj.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Adacra.</i>	959	<i>Aizoon minus semina Fuchsi.</i>		<i>Allium.</i>	1545
<i>Adelphides Palme.</i>	354	<i>Crausula minor seu Vermicularis.</i>	1130	<i>Allium anguinum Matthioli.</i>	1547
<i>Adiantum.</i>	1208	<i>Aizoon minimum repens, tertium Dioscoridis.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Allium caninum Dodon.</i>	1501. 1511
<i>Adipos Palma in Aegypto.</i>	365	<i>Aizoon Telephium Dalechampi.</i>	131	<i>Allium iuncum.</i>	1544
<i>Palma fructus immaturus.</i>	366	<i>Aizoon vulgi hodierni Grecorum.</i>	1296	<i>Allium sativum &amp; silvestre Matthioli.</i>	1546
<i>Adonis flos.</i>	841	<i>Alabastrites.</i>	1296	<i>Allium vrsinum latifolium Fuchsi &amp; Dodonaj.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Adonis siue Anthemis, Matthioli.</i>	970	<i>Alabastrites altera.</i>	1140	<i>Allium vrsinum Matthioli.</i>	1546
<i>Adoreum.</i>	374. 375	<i>Alaternus Clusij.</i>	158. 159	<i>Alnus.</i>	95. 96. 97
<i>Aegilops.</i>	10. 403. 405	<i>Alba spina.</i>	139	<i>Alnus nigra baccifera.</i>	97.
<i>Aegilops Dodonai.</i>	406	<i>Albucum siue Albucus.</i>	1588	<i>Aloe.</i>	1692
<i>Aegilops Idarum.</i>	3 & 6	<i>Alburnum Plinio quid.</i>	216	<i>Aloe Americana, Clusij.</i>	1697
<i>Aegilops Lobellj &amp; Pena.</i>	406	<i>Albus Spinus.</i>	134. 135	<i>Aloe Matthioli.</i>	1693. cum floribus <i>ibid.</i>
<i>Aegilops secunda Matthioli, radice &amp; folijs diuersa <i>ibid.</i></i>		<i>Alcanna officinar. 252. quanam illa arbor sit.</i>	25	<i>Alopecurus Dodonai.</i>	431
<i>Aegilops Plinij.</i>	1625	<i>Alcanna radices officinarum.</i>	1100	<i>Alopecurus graminum Dalechampi.</i>	431. 432
<i>Aera.</i>	416. 417	<i>Alcea.</i>	593	<i>Alopecurus montana.</i>	1357
<i>Aeraria.</i>	1480	<i>Alcea Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Alopecurus Plinij.</i>	430
<i>Aethiops.</i>	1305	<i>Alcea officinarum.</i>	497	<i>Alopecurus Theophrasti.</i>	641
<i>Afrodilus Officinarum.</i>	1588	<i>Alcea peregrina foliis sequa.</i>	595	<i>Alpine.</i>	1232
<i>Agallochum 1769. siue Xyloaloe.</i>		<i>Alcea Veneta Dodonai.</i>	594	<i>Alpine corniculata Clusij. 12. 2. &amp; 1534</i>	1232. 1233
<i>Agallochum verum officinis signatur.</i>	1770	<i>Alcea vesicaria.</i>	595	<i>Alpine lutea.</i>	1232
<i>Agasticum.</i>	11	<i>Alcea villosa <i>ibid.</i> Dalechampi.</i>	594	<i>Alpine maior Dodonaj.</i>	1232
<i>Agaricus 1703. vel Agaricum.</i>				<i>Alpine minor siue minima, Dodon.</i>	1233
<i>Agaricus Matthioli.</i>	1704			<i>Alpine Matthioli.</i>	1232
<i>Ageratum.</i>	777			<i>Alpine maxima.</i>	1233
<i>Ageratum secundum &amp; tertium, Matthioli.</i>	778			<i>Alpine media, siue minor Dodon.</i>	1232
<i>Ageratum aliud quorundam <i>ibid.</i></i>				<i>Alpine maior Fuchsi.</i>	1232. 1233
<i>Ageratum Dalech.</i>	1184			<i>Alpine muscosa.</i>	1232. 1233
<i>Ageratum Ferulaceum Dalech. <i>ibid.</i></i>				<i>Alpine nodosa Dalechampi.</i>	234
<i>Ageratum purpureum Dalech. <i>ib.</i></i>				<i>Alpine purpurea.</i>	1231. 1233



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM.

<i>Aline repens</i> , Clusj.	1429	<i>Ameos Officinarum</i> .	694	<i>III. IIII. eiusdem</i> .	843
<i>Aline serena</i> .	1234	<i>Amerimonon</i> .	1128	<i>Anemone V. Matthioli</i> .	844
<i>Althea</i> .	589	<i>Amerina salix</i> .	274	<i>Anemone hortensis</i> Tragi.	ibid.
<i>Althea altera</i> Matthioli.	592	<i>Amerina duplex</i> .	278	<i>Anemone I. Dodon. latifolia</i> .	845
<i>Althea arborea</i> Lobellj.	593	<i>Ammi</i> .	694	<i>bel. &amp; Clusj.</i>	845
<i>Althea fruticosa</i> , Clusj.	ibid.	<i>Ammi Fuchsi</i> .	695	<i>An mune II. Dod. tenui fol.</i>	111.
<i>Althea liguosa</i> Dalecham. 592		<i>Ammi Matthioli</i> .	ibid.	<i>Clusj. sine Gogamifolia, Lobel</i>	ibid.
<i>Althea palustris</i> , Pene.	102	<i>Ammi vulgare</i> .	436	<i>Anemone I II. Dod. angustifo-</i>	846
<i>Althea Theophrasti</i> .	592	<i>Amomum</i> .	1813	<i>lia, Clusj.</i>	846
<i>Altercum, siue Altercangenum</i>		<i>Amomum &amp; Amomis</i> .	1814	<i>Anemone latifolia prima, Clusj.</i>	ibid.
<i>Azabum</i> .	1716	<i>Amomum Plinij</i> .	600	<i>Anemone I III. Dodon. multi-</i>	ibid.
<i>Alum. seu Alus</i> .	1074	<i>Ampeloprasum Matthioli</i> .	1543	<i>plex rubra Clusj.</i>	ibid.
<i>Alum.</i>	1174	<i>Ampeloprasum, siue Porrum syl-</i>		<i>Anemone V. &amp; V I. Dodon.</i>	847
<i>Alumen catinum</i> .	1378	<i>ue tre Lobellj.</i>	1544	<i>Anemone latifolia, flore multipli-</i>	ibid.
<i>Alpum &amp; Alpia</i> .	1680	<i>Ampelos agria</i> .	1414	<i>ci, Clusj.</i>	ibid.
<i>Alpum Matthioli</i> .	ibid.	<i>Amurca</i> .	346	<i>Anemone trifolia, Dodonai. ibid.</i>	
<i>Alpum Pene</i> , <i>Herba terribilis</i>		<i>Amygdale ex amaris ut dulces</i>		<i>Anemone tenuifolia, flore multi-</i>	848
<i>Narbonensis</i> .	ibid.	<i>fiant.</i>	316	<i>plici, Clusj.</i>	970.
<i>Alysson quorundam, Cyristi facie</i> .	262.	<i>Amygdale presumpsa ebrietate</i>	318	<i>Anemone, fos venti.</i>	970.
<i>Alyssum</i> . 1141. <i>Dodonej</i> ibid.		<i>prohibent.</i>	318	<i>Anemone corniculata maior Pe-</i>	na. 1713. 1714. minor eius. ibid.
<i>Dalecham. ibid. Matth.</i>	1142	<i>Amygdalum duo genera.</i>	316	<i>Anemone Gaeni lutea lib. 2. var.</i>	848
<i>minus Dalecham.</i>	ibid.	<i>Amygdalarum facultates.</i>	317	<i>rons an eadem sit germanica.</i>	175
<i>Alyssum Italicum, perperam</i> .	1183	<i>Amygdalus.</i>	316	<i>Anethum.</i>	691
<i>Alyssum Germanicum Echiorides</i>		<i>Amygdalus prima omnium flo-</i>	317	<i>Angelica.</i>	724
<i>Lobellj.</i>	1143	<i>ret</i>	317	<i>Angelica sativa Matthioli. ibid.</i>	
<i>Alyssum Trigonum Dalecham-</i>		<i>An. lum è Siligine.</i>	375	<i>Angelica sylvestris Fuchsj.</i>	728
<i>pij.</i>	ibid.	<i>Anacardium.</i>	1764	<i>Angelica sylvestris Dodon. ibid.</i>	
<i>Amamelides.</i>	99	<i>Anagallis.</i>	1236	<i>Angelica sylvestris Matthioli.</i>	ibid.
<i>Amaracus.</i>	881	<i>Anagallis aquatica</i> 1090 <i>Dodo-</i>		<i>Angina Lini.</i>	1683
<i>Amaracus siue Maiorana, Mat-</i>		<i>nei ibid. altera Lobellj. ibid.</i>		<i>Anguria.</i>	619. 620
<i>thioli. 882. tenuifolia, eiusd.</i>		<i>Anagallis quatica Dodon.</i>	1146	<i>Anguria, Citrus officinarum.</i>	625
<i>ibid.</i>		<i>Anagallis mas</i>	126	<i>Anime.</i>	1791
<i>Amaracus Fuchsj.</i>	ibid.	<i>Anagallis femina.</i>	1217	<i>Anisum.</i>	692
<i>Amar dulcis.</i>	1138	<i>Anagallis lutea Lobellj. ibid.</i>		<i>Anonis.</i>	447
<i>Amar dulcis.</i>	1413	<i>Anagallis Dioscorid. Laburnum</i>		<i>Anonymos.</i>	993
<i>Amarago.</i>	561	<i>necne</i>	103. 104	<i>Anonymos.</i>	270
<i>Amarantus.</i>	870	<i>Anagallis. 105. Ananas sylvestris.</i>		<i>Anrecon.</i>	264
<i>Amarantus angustifolius, Lobel-</i>		<i>1871</i>		<i>Anteuphorbium. 1690. Dodonai.</i>	1692
<i>lij.</i>	871	<i>Anaxuris.</i>	600	<i>Anthemides.</i>	968
<i>Amarantus holosericeus, Lobel.</i>		<i>Anchusa.</i>	1100	<i>Anthemis chrysanthemos Dodo-</i>	969. Pene & Lobel. ibid.
<i>ibid.</i>		<i>Anchusa prima Matthioli</i>	ibid.	<i>Anthemis eranthemos, Dodonai.</i>	970. Dalechampi.
<i>Amarantus luteus.</i>	779	<i>Anchusa II. Matth.</i>	1101	<i>Anthemis eranthemos, siue Con-</i>	970
<i>Amarantus purpureus Matthio-</i>		<i>Anchusa III. Matthioli.</i>	1102	<i>solida regalis Fuchsj.</i>	970
<i>li.</i>	871	<i>Anchusa lignosior Pene.</i>	ibid.	<i>Anthemis leucanthemos. Mat-</i>	969
<i>Amarantus tricolor.</i>	540	<i>Anchusa lutea Dalecham. ibid.</i>		<i>thioli.</i>	969
<i>Amarina.</i>	133	<i>Androsaces.</i>	1361	<i>Anthemis leucanth. niuca An-</i>	969
<i>Ambra &amp; Ambo.</i>	1870	<i>Androsaces alterum, Matthioli.</i>	1362	<i>glorum, flore multiplici.</i>	969
<i>Ambore, Acosta.</i>	1874	<i>Androsacem.</i>	1153	<i>Anthemum foliosum.</i>	438
<i>Ambilj in Guzarate quid</i>	1689	<i>Androsamum.</i>	1156	<i>Athenois Mespilus.</i>	198
<i>Amblatum Cordj.</i>	1296	<i>Androsamū album Dalech.</i>	1157	<i>Antheram qui flores Rosarum ap-</i>	126
<i>Ambrosia.</i>	1128	<i>Androsamum Dodon. II. Fuchsj.</i>	1156	<i>pellant, errant.</i>	1588
<i>Ambrosia.</i>	1147	<i>Androsamum Matthioli.</i>	1156	<i>Anthericus.</i>	2
<i>Ambrosia prima, Matth.</i>	1148	<i>Androsamum aliud Dodonai.</i>	1157		
<i>Ambrosia altera Matth.</i>	ibid.	<i>Andryala maior Dalechampi.</i>	593		
<i>Ambrosia horrensis procerior, Lo-</i>		<i>Andryala minor Dalechampi.</i>	ibid.		
<i>bellj.</i>	ibid.	<i>Anemone</i>	841		
<i>Ambrosia montana Dalechampi</i>		<i>Anemone I. Matthioli. 842. II.</i>			
<i>ibid.</i>					
<i>Ambubicia.</i>	555. 556				
<i>Ambulon.</i>	1838				



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Anthora.	1747	Apium, & Apium hortense, aut sativum.	700	Artemisia prima vulgaris.	950
Anthora. sive Anthura Matth.		Apium montanum.	701	Leptophyllos montana. ibid.	
Napellus Mosi.	1748	Apium montanum, Dalech. ibid.		tertia Leptophyllos, Pene. ibi.	
Anthoxanthos.	603	Apium palustre, Fuchsy. ibid.		Monoclonos alia. 951. Mono-	
Anthriscus, Plinij.	791	Apium palustre, Matth. ibid.		clonos quorundam, aliis Am-	
Anthyllis.	1148	Apium risus, seu Apium sylvestre.	1028. 1029 1032. & 1036.	brodia. ibid. Marina, Lob. ibid.	
Anthyllis. 1180. Plinio Anthyllis,				Artemisia Tragantes, aut Tague-	
alijs eodem referente Anticel-				tes.	955
lion.	ibid.	Apium saxatile.	702	Articoccus. 1436. Articulatus. ibid.	
Anthyllis claviculata.	492	Apium sylvestre, Dalech.	700	Arum.	1596
Anthyllis II. Herbariorum.	1149	Apium sylvestre, Dodonai.	701	Arum Ægyptium cum flore,	
Anthyllis altera Italorum, Lo-		Apocynum.	1730	Myconi.	1598
bellij.	1150	Apocynum Matth. 1731. repens,		Arum, Matthioli. 1597. aliud mi-	
Anthyllis maior.	509	eiusdem.	ibid.	nus, eiusdem.	ibid.
Anthyllis marina Narbonensis,		Apalium Eubæensium.	1666	Arundo.	985
Alsines folio, Pene.	1381	Apollinaris.	1715	Arundo domestica Matthioli. 999	
Anthyllis marina altera Narbon.		Apronia vitis.	1411	val'atoria, Dodonai. 1000. pa-	
Pene.	1382	Aprona Punica.	303. 304	lustris Matthi. ibid. epigeios.	
Anthyllis montana.	1150	Aqua ex Ligustri floribus.	255	ibid. minima.	1001
Anthyllis Porthandie lentifolia,		Aqua ex Sambuci floribus.	266	Arundo seu Cinna Indica, Cla-	
Pene.	1381	Aquifolium.	46. 146	ssij. ibid. Dalechampi.	ibid.
Anthyllis prior Dodonai.	1380	Aquilegia, sive Aquilina.	820	Arundo saccharifera.	1002
altera, eiusdem.	ibid.	Aquilegia minor, Dalech.	821	Asa officinarum.	731
Anthyllis Valentina, Clus.	1381	Aquilina plenis & multis flori-		Asa fetida magnus apud Indos	
Anticricon Sesamoides.	1668	bus, Lob.	ibid.	usus.	733
Anticyrus elleborus.	1669	Araba seu Arabis, sive Draba. 663		Asarina, Matthioli. 915. Lobelij.	
Antipathes, sive corallium ni-		Arabis, seu Draba, Dodon. seu		ibid.	
grum.	1376	Thlippi Creticum.	664	Asarum 913. Matthioli.	914
Antirrhinum.	1379	Arabi, seu Draba, Matth.	ibid.	Asarum muri.	1134
Antirrhinum magnum Dodon-		Asarum cum flore Miconi, an-		Ascalia.	1440
nai.	1141	gustifolium.	1600	Asclepias 1144. Asclepias nigra	
Antirrhinum parvum Dodonai,		Arista quid.	377	Dalechampi.	1145
sive Orentium.	ibid.	Aristal. h. e. a.	589	Ascyron, Ascyron, Ascyroides,	
Antirrhinum Matth.	1340	Aristidia qua, & cur dicta.	428	1151.	
Antirrhinum II. & III. Matth.		Aristolochia, Aristolochia Offici-		Aspalathus.	1815
ibid. 1111. eiusdem.	1341	narum.	976	Aspalathus I. Monspeulanus.	
Antirrhinum Tragi.	1342	Aristolochia femina, sive rotun-		283.	
S. Antony herba.	136	da.	977	Aspalathus II. Hispanus, quibus-	
Aspargia.	562	Aristolochia longa Matth. Clematis,		dam alter scorpius.	ibid.
Aspargia Dalech. Heracium mi-		ris, Pene & Lob.	ibid.	Asparagus.	609
nus primum Dodon.	ibid.	Aristolochia rotunda Dod. & Clu-		Asparagus spongiam in radicibus	
Asparina.	1330	ssij. 976. longae eorundem.	977	habet.	610
Asparina Plinij.	1142	longa Fuch. ibid. Sarracenia		Asparagi marini species quorun-	
Aspate Dalech.	561	Dod. Clematis prior, Clus. ib.		dam.	1393
Asphaca.	478	Clematis Dodon.	978	Asparagus sativus.	610
Asphaca vera, Vicia Matth. ibid.		Aristolochia rotunda quorundam		Asparagus sylvestris Matthioli.	
Asphaca Dalechampi.	562	herbariorum.	1293	ibid.	
Aspharca.	158	Armeria.	808	Asparagus sylvestris & petreus.	
Aspharca quare Plinius non me-		Armeria Vetonica coronaria. ibi.		1473.	
minere.	ibid.	Armeria prima Dodonai, sive Ca-		Asperula acerulea, Lobelij.	870
Asphorosodon.	1545	ryphyllus minor sylvestris, Lo-		Asperula Dodonai, sive Asper-	
Asphyllanthos. 864. primum, se-		bellij.	ibid.	gula.	523
cundum, tertium.	ibid.	Armeria secunda sive sylvestris,		Aspharion.	1588
Asiana Brasica.	519. 523	Dodonai.	809	Asphodelus.	
Asiana recentiorum quorundam.	1430	Armoracia, sive Armoracii.	634	Asphodelus bulbosus, Galeni. 1589	
Asiastrium.	957. 1027. 1037	Arnabo Pauli.	1822	Asphodelus luteus, Dodon.	1590
Asy vires & temperam.	704	Arnoglossum.	1554	Asphodelus luteus minor, Lobel.	
Asy ischias.	638	Arrestabotis herbariorum.	447	Asphodelus minor, Dodon. & Clu-	
Asyos. 1595. Matthioli.	ibid.	Artemisia.	949. & 1148	ssij.	1589
Fuchsy.	1596	Artemisia cinerea.	1383	Asphodelus palustris.	993
		Artemisia fetida.	576	Asplenium.	1215

Asplenium



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Asplenium magnum</i> & <i>sinest</i> quorundam r. centiorum. 1121	<i>Arbor Paradisea.</i> 110	<i>Atriplex sylvestris</i> III. <i>ibid.</i>
<i>Asplenium sylvestre.</i> 1125	<i>Arbor Syrtica, Lotos</i> 348	<i>Auellana Indica.</i> 1766. <i>Matthio</i>
<i>Aspris Macedonum.</i> 3. & 6	<i>Arbor tinctoria.</i> 1832	<i>li.</i> 1767
<i>Aster Atticus</i> 859. <i>Matthio</i> i. v. n. 860	<i>Arbor tristis</i> 1851. <i>Acosta.</i> 1812	<i>Auel' ana.</i> 319
& <i>alter.</i> 860	<i>Arbor vite, Thuis genus.</i> 60	<i>Auellana cathartica.</i> 1789
<i>Aster Atticus supinus, Clusij.</i> 861	<i>Arbores cortice in orbem detracto</i> necantur, excepto <i>Subere.</i> 23	<i>Auellana nucis in us.</i> 10
<i>Aster Conyzoides, G. Sneri.</i> <i>ibid.</i>	<i>Arbores infelices quæ dicantur.</i> 180	<i>Auel' anis omnibus non idem sa-</i> <i>por.</i> 319
<i>Aster luteus.</i> 1349	<i>Arbores peculiares habet Syria.</i> 335	<i>Auena.</i> 403
<i>Aster luteus, sine Oculis Christi</i> <i>minor.</i> 1135	<i>Arbores steriles aliquot.</i> 80	<i>Auena herba.</i> 404
<i>Aster luteus, alter Oculis Christi</i> <i>minor.</i> <i>ibid.</i>	<i>Arbores sylvestres quibus folia non</i> decidunt. 41	<i>Auis lingua officini. Semen Fra-</i> <i>xini dicitur.</i> 85
<i>Aster montanus hirsutus, Pena.</i> <i>ibid.</i>	<i>Arbores venenatae.</i> 1834	<i>Auricula leporis.</i> 416. 740
<i>Aster montanus. ibid. luteus.</i> 1134	<i>Arboris cortex ad rheumatismos</i> utilis. 1875	<i>Auri u' a muris</i> 1232. 1317. <i>Mat-</i> <i>thioli</i> <i>ibid.</i> al. era. <i>Dodon. ibid.</i>
<i>Aster non Atticus Tragi.</i> 1312	<i>Arboris tristis rami cum flore &amp;</i> <i>fructu, Clusij</i> 1812	<i>Auricula muris Tragi.</i> 565
<i>Asterias sine Stullaria, Dalecham-</i> <i>pi.</i> <i>Apresca.</i> 1342	<i>Arborum ex surculis conche ana</i> <i>tifera.</i> 1397. 1198	<i>Auricu a vrsi, Myconi.</i> 837
<i>Astragaloides Lobellij.</i> 488. 489	<i>Arborum variarum in materia diu-</i> <i>turni as.</i> 14	<i>Azfar.</i> 1596. 1687
<i>Astragalus.</i> 1346	<i>Archangeli a. 1246</i> <i>Arbutus.</i> 115	
<i>Astragalus fortis Clusij.</i> 1348	<i>Archangelica Dodonai.</i> 706	
<i>Astragalus Matthioli.</i> 1147	<i>Archanita Herbariorum.</i> 1604	
<i>Astragalus purpureus.</i> <i>ibid.</i>	<i>Archuellion.</i> 1101	
<i>Astragalus quorundam.</i> 1596	<i>Arcinum, &amp; Arctio alterum.</i> 1014	
<i>Astragalus Syriacus Lobellij.</i> 148	<i>Arctium.</i> 1306	
<i>Astrantia nigra.</i> 1268	<i>Arction quorundam Dalecham-</i> <i>pij.</i> 1307	
<i>Astrantia nigra Gesneri.</i> 1636	<i>Arction Dodonai ex codice Casa-</i> <i>reo.</i> 1307	
<i>Astylis, vel Astylus, Lactuca.</i> 545	<i>Arcturus.</i> 1306. 1307	
<i>Asuar.</i> 1687	<i>Aeca sine Fausel, Clusij.</i> 1766	
<i>Asyla.</i> 1237	<i>Arca Palma scriptoria, Tal, ar-</i> <i>bor maximis foliis.</i> 1849	
<i>Athanasia.</i> 955	<i>Argemone, seu Argemonia.</i> 440	
<i>Athanasia, seu Tanacetum, Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Argemone capitulo longiore.</i> 440	
<i>Athanasia leucanthemos.</i> 1147	<i>Argemone minor, capitulis bre-</i> <i>uioribus.</i> 440	
<i>Atinia Plmi.</i> 80	<i>Argentina.</i> 1047. 1064	
<i>Atractylis.</i> 1467. 1468	<i>Arica.</i> 375. 389	
<i>Atractylis flore purpureo.</i> <i>ibid.</i>	<i>Arisarum.</i> 1599. prius & alterum <i>Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Atractylis marina Pycnocomon</i> <i>Pene.</i> <i>ibid.</i>	<i>Atractylis quorundam.</i> 1450	
<i>Arabis seu Draba altera, Pene &amp;</i> <i>Lobellij.</i> <i>ibid.</i>	<i>Atractylis quorundam Matthio-</i> <i>li.</i> 1468	
<i>Arachus.</i> 479. 480	<i>Atragona Theophrasti.</i> 1408	
<i>Aracus Galeni.</i> 451	<i>Atramenti scriptorij optimi con-</i> <i>ficiendi ratio.</i> 1617	
<i>Arantia.</i> 1838	<i>Atriplex, Feslo Atriplexum.</i> 535	
<i>Arantia sine Aurantia mala non</i> <i>sunt Celsiana.</i> 288	<i>Atriplex Hispaniensis.</i> 543	
<i>Arantia sine Aurantia Poma.</i> 301	<i>Atriplex marina s. s. 517.</i> 552	
	<i>Atriplex sativa.</i> 535	
<i>Arbor Brasilia.</i> 1846	<i>Atriplex sylvestris I. Matthioli,</i> <i>prime editionis.</i> 535. 536	
<i>Arbor farinifera.</i> 1855	<i>Atriplex sylvestris I. Matthioli,</i> <i>et oblongo folio, secunda editio-</i> <i>nis.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Arboris farinifera panis fragme</i> <i>ta.</i> 1856	<i>Atriplex sylvestris II.</i> <i>ibid.</i>	
<i>Arbor finium regundorum.</i> 1874		
<i>Arbor foliis amoulanibus.</i> 1850		
<i>Arbor Goh. ph.</i> 1841. 1842		
<i>Arbor Iuda.</i> 216. 220		
<i>Arbor p. 1842. 1843.</i> 1838		
<i>Arbor Noui orbis, ex qua Balsa-</i> <i>mum.</i> 1775		

<b>B</b> <i>aaras radix.</i> 1729	<i>Baccar, Baccarus, Baccaris</i> <i>Officinarum</i> 913
<i>Baccharis</i> 913. <i>Matthioli.</i> <i>ibid.</i>	<i>Baccharis Monspelienfium, ony-</i> <i>za maior &amp; Matthioli.</i> 917
<i>Baccharis Monspelienfium &amp; Mat-</i> <i>thioli que.</i> 1045	<i>Baccifera arbores.</i> 35
<i>Baccifera arbores.</i> 35	<i>Balani.</i> 364
<i>Balani.</i> 364	<i>Balanitis ca. tanea.</i> 31
<i>Balanitis ca. tanea.</i> 31	<i>Balanus terrestris.</i> 1347
<i>Balanus terrestris.</i> 1347	<i>Balanus Myrepticæ.</i> 366
<i>Balanus Myrepticæ.</i> 366	<i>Balaustium quid 304. eius gene-</i> <i>ra ibid. vites.</i> 305
<i>Balaustium quid 304. eius gene-</i> <i>ra ibid. vites.</i> 305	<i>Ballaria.</i> 814
<i>Ballaria.</i> 814	<i>Ballota.</i> 1152
<i>Ballota.</i> 1152	<i>Ballote crispa.</i> <i>ibid.</i>
<i>Ballote crispa.</i> <i>ibid.</i>	<i>Ballote crispa maior.</i> <i>ibid.</i>
<i>Ballote crispa maior.</i> <i>ibid.</i>	<i>Balsamine sine Balsamina.</i> 629.
<i>Balsamine sine Balsamina.</i> 629.	<i>Balsamina cucumerina punicea.</i> 629
<i>Balsamina cucumerina punicea.</i> 629	<i>Balsamina Fuschij.</i> 631
<i>Balsamina Fuschij.</i> 631	<i>Balsamina Matth.</i> 630
<i>Balsamina Matth.</i> 630	<i>Balsamine offi. inarum.</i> 676
<i>Balsamine offi. inarum.</i> 676	<i>Balsaminum, seu Balsamina fa-</i> <i>mina, Matthioli.</i> 60
<i>Balsaminum, seu Balsamina fa-</i> <i>mina, Matthioli.</i> 60	<i>Balsamita.</i> 677
<i>Balsamita.</i> 677	<i>Balsamita Dodonai.</i> 678
<i>Balsamita Dodonai.</i> 678	<i>Balsami folium.</i> 1775
<i>Balsami folium.</i> 1775	<i>Balsami fructus.</i> 1819
<i>Balsami fructus.</i> 1819	<i>Balsamum.</i> 1770
<i>Balsamum.</i> 1770	<i>Balsamum Alpinum.</i> 270
<i>Balsamum Alpinum.</i> 270	<i>Balsamum crispum, Lobellij</i> 672
<i>Balsamum crispum, Lobellij</i> 672	<i>Balsamum Indicum sine Occide</i> <i>tale.</i> 1773. 1774
<i>Balsamum Indicum sine Occide</i> <i>tale.</i> 1773. 1774	<i>Balsamum Italicum vulgare.</i> 192
<i>Balsamum Italicum vulgare.</i> 192	<i>Balsamum nouum.</i> 1775
<i>Balsamum nouum.</i> 1775	<i>Batatas Clusij.</i> 190. 1910
<i>Batatas Clusij.</i> 190. 1910	<i>Batis.</i> 767



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Bangu.	1914	Betula vel Betulla.	92	Brassica rubra aliquot species.	523
Baptifecula.	436	Bifolium siue Ophrys Plinij.	1260	Brassica sativa alba vulgaris, le-	
Barba capræ.	1080	Bipinella seu Bipinula.	1087	uis sativa.	520
Barba hirci.	1078	Bislingua.	208	Brassica sativæ genera.	520, 521.
Barbarca.	650	Bismalva officinarum.	590	522, 523, 524	
Barbarea, vulgi.	1094	Bistorta, 1285. Matthioli. ibid. ma-		Brassica sylvestris.	524
Barbarica.	806	ior. ibid.		Brassica sylvestris duæ species Cor-	
Bardana minor.	1056	Bistorta quorundam falso.	1082	di.	525
Basilica minor Gemma.	1561	Blaptifecula. 436. Blataria. Matt.		Brassica tenuifolia laciniata.	523.
Basilicum sylvestre quorundam.		1305.		524	
912		Blechnon.	1222	Brassica tertium genus Fuch.	524
Bardana officinarum.	1054	Blitum.	538	Bria sylvestris.	179
Batat.	1909	Blitum album maius.	538	Britanica. 1081. vera, Dalec.	1082
Batisfole.	436	Blitum rubrum maius.	539	Britanica Dioscoridis.	1285
Batrachium.	875	Blitum rubrum minus.	ibid.	Britanica Plinij.	1320
Batrachium.	1027	Bolbocastanum 773. mas Trallia-		Briza.	395
Batrachium Apuleij.	1029. 1034	ni ibid. femina, Dalechampi.		Bromus herba Lokellij.	404 405
Bauca officinarum.	719	ibid.		altera sterilis eiusdem.	ibid.
Baxama arbor.	1834	Bolbocastanum grandius, Dodo-		Brunella.	1310
Bdellium.	1757. 1782	nei. Bunium.	774	Brusbaer.	1837
Bdellij fructus Cortuso.	ibid.	Boleti de quercu.	10	Bruscum.	95. 166
Bdellij secundum genus.	368	Bombax officinar.	221	Bruscum officinarum.	242
Bechion.	1049. 1050	Bonama.	1841	Brutes arbor.	183. 184
Bechium.	879	Bonifacia.	208	Bryon.	1083. 1314
Bedegar. Sepalsiariorum.	127	Bonus Henricus planta. 602. vi-		Bryonia.	1194
Behen album 1186. rubrum. ibid.		res.	608	Bryonia & Bryonias Colu.	1409
Behen album Salmantinum.	817	Boramez.	1849	Bryonia nigra.	1411
Behenrubrum seplasiarum, falso.		Borassus.	362. 367	Bryonia nigra quorundam.	1605
1024		Borda.	1380	Bubonium.	859 860
Belleregi.	1687	Borraga 578. nostra, veterum est		Bugla & Bugula.	1075
Bellis 853. maior, Fuchsj.	ibid.	Buglossum.	ibid.	Buglossa, & Buglossum.	578
Bellis cerulea Pena.	85	Borrage minima, Herbariorum.		Buglossum Anarcticum.	1895
Bellis lutea Dalechampi.	1349	581		Buglossum magnum siue Italicu,	
Bellis maior, media, minoris spe-		Botrys.	952. 1147. 1148	siue Romanum.	582. 583
cies tres, Matth.	84	Branca vrsina.	1443	Buglossum minus siue Dod.	580
Bellis sylvestris minor.	85	Branca vrsina aculeata Lobellij.		Buglossum minus sylvestre Dodo-	
Ben album officinarum.	683	1445		nei.	ibid.
Ben magnum & paruum.	1789	Brassica 518. unde dicta ibid. Bra-		Buglossum siper vites, Pena.	81
Benedicta.	685	ssica agrestis genera.	524. 525	Buglossum silvestre.	1104
Benzoin.	1789	Brassica curculumam sedet.	529	Buglossum sylvestre Matth.	589
Berberis officinarum.	134. 137	Brassica alba crispa.	520	Buglossum vulgare.	579
Berucoca.	207	Brassica Asparagodes Da'echamp.		Bulapathum.	601. 605
Beta.	531. 1255 1261	522		Bulbina.	1502. 1503
Beta agrestis Lathus dici potest.		Brassica canina. 1	628. 1730.	Bulbine Plinij.	1511. 1512
601		Brassica campestris Clusij.	525	Bulbi proprie qui dicantur.	1501
Beta candida.	531. 532.	Brassica capitata albida.	521	Bulbi esculenti genus minus Do-	
Beta erythrorrhizos Dodonæi.	532	Brassica capitata polycephalos.		donei. Hiacinthus Matth.	1502
533		ibid.		minus eiusd.	ibid.
Beta nigra.	531. 532.	Brassica crispa Tragi.	523. 524	Bulbonac seu Bulbonac officina-	
Beta ruscifolia Dalecham.	532.	Brassica marina toto genere dif-		rum.	805
533		fert à Brassicis, nec aliud quā		Bulbus.	1500
Beta romana.	531	nomen commune habet.	526	Bulborū genera multa olim nota	
Beta rubra vulgarior Lobellij.	532	Brassica marina, Soldanella offi-		nobis hodie incognita.	1501
Beta rubra Matthioli.	533	cinarum.	ibid.	Bulbus æstivus Dalech. Tiphym	
Beta sylvestris, Plinij.	1024	Brassica marina sylvestris, monof		Theophrasti.	1503
Betonica.	1282	permos Pena.	527	Bulbus agrestis & strangulato-	
Betonica aquatica.	1316	Brassica nigra Dodon.	523	rius.	1570
Betonica rault.	1318	Brassica Pompeiana, aut Cypria,		Bulbus eriophorus Dodon.	1504.
Betonice species altera Fuchsj.		Brassica florida Dod.	521. 522.	Clusij.	ibid.
806		Brassica pratensis.	1444	Bulbus marinus crinitus.	1505
Betre, siue Berle.	1778	Brassica Raposa.	522	Bulbus parv' unisoli? Pena.	1505



INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Bulbus siluestris Fuchsy & Do- donei. 1502	Calamagrostis Lobellij, vulgo Le che. 434	Cannabis mas. 497
Bulbus vomitorius Matth. 1503	Calamintha. 904	Cannabis femina. ibid.
Bumelia Fraxinus. 82	Calamintha II. & III. Diosc. 907	Cannabis siluestris Dalech. 497
Buna. 1794	Calamintha aquatica, Matt. 606	Cannacorus quorundam. 1001
Bunias à Bunio plurimum differt 644	Calamintha montana Matt. 805.	Canfrabrica Plinij. 1426
Bunium. 774	altera eiusdem. ibid.	Caphura. 1783
Bunium Dioscor. Dodonei. 773	Calamintha montana præstantior Pena & Lobellij. ibid.	Capillaris. 1211
Buphtalmum. 862	Calamintha II. incana, Lob. 906	Capillus Veneris. 1108
Buphtalmum. 1128	Calaminthe. 675	Capita Rostrum quid. 126. 128
Buphtalmum alterum, Pena. 863	Calamita. 115. 116	Capnos. 1191
Buphtalmum, Dodonai. 863	Calamus aromaticus. 1888. Matt. ibid.	Capnos alba latifolia, Lobellij. 1294. 1295
Buphtalmum Dodo. & Anguil. lar. 1638	Calamus aromaticus officinarum. 1618	Capnos Fabacea radice, Pena & Lobellij. 1294
Buphtalmum verum, Dalech. 863	Calathiana Viola. 824	Capnos tenuifolia Clusij. ibid.
Bupleuron. 435	Calathiana Verna, Dalech. ibid.	Capparis. 155
Bupleuron alterum latifolium, Lobellij. 436	Calceolus Maria. 1146	Capparis l. gumifosa. 456
Bupleuron Dodonei. ibid.	Calcitragia Plinij. 1671	Capparis vires & v. us in medic. 156. 157
Bupleuron Plinij. 694	Calcitrapa offic. 1473	Cappares præstantissime ex Ale- xandria Aegypti Venetias af- feruntur. 157
Buprestis Plinij. 436	Calendula. 811	Caprificus. 335
Bursa pastoris. 1097	Calix. 1100	Caprificus. 1086
Butomum Theophr. 159	Callion. 596	Caprifolium. 1427
Butomus, Dodon. 1018	Callitriche Plinij, quorundam. 1021	Caprio a. 414. 413
Buxi radices in Gallia Narbon. 95	Callitriche Plinij, quorundam. 1091	Capella. 660
Buxus, seu Buxum. 165	Callitrichon. 1209	Capiscum. 631
Buxus aspinus. 1471	Calomaha. 699	Capiscum Brasiliannum Clusij. 633
Buxus, quod quidem voluit, Gaia cum non est. 166	Caltha hortensis. 811	Capiscum latum Dodonai. 632
	Caltha palustris. 1049	Capiscum rotundum Dalech. 633
	Caltha palustris quorundam Her- bariorum. 1013	Caput galinaceum Be'garu. 489
	Caltha poetarum. 811	Caput monachi. 564
	Camomilla fatua seu inodora. 345	Caput simæ quorundam. 1341
	Camomilla ferida & canin. 1344	Carabe. 1780
	Camomilla & Camomilla Roma- na. 9. 8	Caragna. 1792
	Camomilla vulgi & officinarum. 1344	Carambolæ Acoffa. 1872
	Camos. 1343. 1344	Carbunculario. 418
	Campana siue Campanula ceru- lea siue hortensis. 826. 817. mi- nor rotundifolia, Lobellij. ibid	Cardamine. 658
	lutescens maior, eiusd. ibid lu- tea limfolia, Pena. 828	Cardamine Actij, 665
	Campanula siue Cernicaria Fuch- sy. 1197	Cardamine altera siue Simfibriu. 659
	Campanula pratensis. 824	Cardamine IIII. Dalech. minima aquatica. ibid.
	Camphorata. 1200	Cardamine V. Dalec. odorata. ibi. & 660
	Camphorata maior. 1364	Cardamine trifolia Lobellij. 660
	Camphorata minor, Herbar. 1179	Cardamomum. 1810
	Canaria Plinij. 426	Cardamomi species Matth. 1811
	Cancamum Græcoru' Garcia. 1791	Cardiaca Herbariorum. 1119
	Candela regis & Candelaria. 1298	Cardiaca. 1249. Matthioli. ibid.
	Canella. 1796	Cardopatum. 1452
	Canella arbor, Theueri. 1805	Carduncellus Pena. 1469
	Canella folium & bacillus. 1803	Carduus Anaxos Septentrionalis, Lobellij. 1454
	Canina lingua. 1261	Carduus aculeatus. 1438 lacte. ibi.
	Canirubus, seu Rubus canin. 111	Carduus altilis Cynara siue capiti- bus acuta, Dodon. 1440
	Canina. 998	
	Cannabis. 496	







# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Ceraserum facultates.	313	176	Chamefyce, Dalechampij.	ibid.
Cerasus.	309	Chamaeris, seu alia perpusilla	Chamele Alpina incana, Pe.	1665
Cerasus quando primum, unde,		Iris latifolia, Lobelij.	Chamele Dodonai & Montspeliæ	
& à quo in Italiam inuicta.		Chamaelonis duo genera.	sum vera.	ibid.
ibid.		Chamaelon. 1452. albus & niger.	Chamelea 1664. Matthioli.	1612
Cerasus Trape suntia.	350	ibid.	Chamelea Germanica.	210
Ceratia.	113	Chamaelon albus quare à quibus-	Charamei.	1875
Ceratia Plinij, quorundam.	1047	dam Ixia dicitur.	Chelidonia Actij.	1192
Ceratonia.	112	Chamaelon albus Matth.	Chelidonioides.	1112
Ceratonia syluestris.	220	Chamaelon exiguus Tragi. Dale-	Chelidonium maius.	1249
Cercis.	216	champ.	Chelidonium maius Matthioli.	
Cercis filiquata Theophrasti.		Chamaelon niger verus Dalech.	1250	
220		py.	Chelidonium minus.	1048
Cerebrum in Palma. 367. 368. 369		Chamaelon niger Matthioli &	Cher officinarum.	683
Cereus spinosus.	1829	Fuchij.	Chermes Arabum & Græcorum	
Cerithe Plinij.	1145	Chamaelon niger alter, Matth.	Coccus Baphicidem.	29
Cerofolium, Gorgid multorum,		ibid.	Cherulla.	722
Cherophyllum Matthioli.	711	Chamaelon Salmanticensis, Pli-	Chia simpliciter (nempe Resina)	
Ceruasamina.	6. & 7	nij.	pro Massiche.	63
Ceruas.	6	Chamaelonta Officinarum.	Chiai Arab. herba.	1702
Cerucaria Fuchij.	1197	Chamaelonta Plinij, quorundam.	Chiliodynamis.	1186
Cerucaria Gesneri.	1164	1049	Chinaradix.	1823. 1824
Cerui ocellus.	720	Chamaelinum, siue Linum perpu-	Chironium.	1286
Ceruisia.	402	fillum.	Chironium Theophrasti.	1273
Cestrum.	1282	Chamaemelum.	Chondrilla.	557. 558
Cetrach & Ceterach officinarum.		Chamaemelum maritimum.	Chondrilla, Chondrillon, & Chon-	
1215. ubi præstatissimum	1216	Dalechampij.	drile.	566
Cherophyllum 710. Cherophyllum		Chamaemelum sylvestre.	Chondrilla prior Clusij.	568
nostrum, quorundam.	791	Chamaemelum sylvestre, Dodon.	Chondrilla rara purpurea, Lobel-	
Chalcios.	1480	1345	ly.	567
Chalcetum Plinij.	554	Chamaemelum vulgare siue syluc-	Chondrilla prior Matthioli.	566
Chalcis arbor.	111	stre Matthioli, siue Anthemis.	Chondrilla altera Matth.	ibid.
Chamaeete, Sambini species.	266	1344	Chondrilla viminea viscosa Pe-	
Chamaebatos Tragi, Rubus Ideus		Chamaemepitus.	ne.	568
non spinosus.	124	Chamaemyrsine.	Chondrus quorundam.	893
Chamaebatos, seu humilis Rubus,		Chamaemyrsine quorundam Da-	Chondrus qui optimus.	388
Humirubus Gazæ.	12	lechampi.	Chonidretos, gummi species.	1784
Chamaecrasus.	201	Chamaenerion.	Christophoriana Dodonai.	1747
Chamaecrasus.	310	Chamaenerium.	Chrisaa.	876
Chamaecrasus altera.	311	Chamaepeuce Cordi.	Chrysanthemum latifolium Do-	
Chamaecrasus montana.	200	Chamaepeuce Cordi non sine erro-	danei.	1358
Chamaecrasus.	1309	re.	Chrysanthemum Matthioli.	873
Chamaecrasus Orihasij.	422	Chamaepeuce maritima. 1393. Da-	Myconi.	ibid.
Chamaecrasus quorundam.	1309	lechampi.	Chrysanthemum Peruvianum, si-	
Chamaecrasus.	940	Chamaepeuce Plinij Campherata	ne Planta maxima.	874
Chamaecrasus Tragi.	1164	minor Dalech.	Chrysippea Plinij, quorundam.	1085
Chamaed. phne.	210. 212. 213	Chamaepeuce quorundam.	Chrysocarpos Hedera	1419. 1420
Chamaedrops.	163	Chamaepitys.	Chrysocome lanuginosa Dalech.	
Chamaedrys.	162	Chamaepitys. 1159 prior Matthio.	py.	1125
Chamaedrys montana Dalecham-		ibid.	Chrysocome Dioscoridis.	685
pij.	1164	Chamaepitys altera.	Chrysocome Germanica.	1344
Chamaedrys famina Dodon.	1163	Chamaepitys prima, Dioscoridis,	Chrysolanum Dodon.	602
Chamaedrys vulgaris, mas Fuch-		Præ. & Lobellij.	Chrysomela.	290
sy.	162	Chamaepitys tertia, siue altera	Chrysotales.	1128
Chamaedrys vulgaris famina		Matthioli.	Chulem.	885. 1886
Fuchij.	1163	Chamaeriphes, seu Palma humilis	Ciborium, aut Cibolium.	457.
Chamaedrys Matthioli.	1162	Matthioli.	460	
Chamaedrys altera Matth.	1163	Chamaerops Plinij.	Cicera.	471
Chamaefil. x. marina Anglica, Lo-		Chamaerops Tragi.	Cicerbita.	571
bellij.	126	Chamaefyce arbor.	Cicer. 461. eius genera.	ibid.
Chamaefysia peregrina Clusij.		Chamaefyce.	Cicerula.	ibid.
		168. 1660	Cicer.	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Cicer Fruinum quorundam</i>	462	<i>Cistus folio S. p. su. hi, Clusij. ibid.</i>		<i>Coca.</i>	1021
<i>Cicer orobiaum.</i>	462	<i>Cistus folio thymi, Clusij. ibid.</i>		<i>Coccalon vocant Coni fructu.</i>	43
<i>Cicer sativum.</i>	461	<i>Cistus annu' uterque Clusij. 226.</i>		<i>Cocchos.</i>	1761
<i>Cicer sylvestre I. Dalech.</i>	464	227		<i>Coccos.</i>	364
<i>Cicer sylvestre I. Dalech. ibid.</i>		<i>Cisti duo, Pena.</i>	232	<i>Coccos.</i>	27
<i>Cicer sylvestre Matthioli.</i>	463	<i>Cisti Ledi genera decem, Clusij.</i>		<i>Cocci insectorij arbuscula Mat-</i>	
<i>Cicer sylvestre Pena.</i>	ibid.	231. 234. 35. 236		<i>thioli.</i>	28
<i>Cichoriacea.</i>	554	<i>Cistus marinus, Dalechampi.</i>		<i>Cocci nisi tempestiue legatur, vi-</i>	
<i>Cichorion.</i>	566	1361		<i>tia ibid. aut probe accretur.</i>	
<i>Cichorium bulbosum.</i>	1392	<i>Citonia Malus officinar.</i>	290	<i>Coccus baphica.</i>	29
<i>Cichorium Constantinopolitanum</i>		<i>Citrugo.</i>	957	<i>Coccus à Trimefino, quod appel-</i>	
<i>Matthioli.</i>	559	<i>Citria, Citrea Citromela.</i>	298	<i>lam, differs.</i>	ibid.
<i>Cichorium faridum.</i>	577	<i>Citria mala Theophrasti seculo in</i>		<i>Co hlearia.</i>	1320
<i>Cichorium luteum Dodon.</i>	562	<i>ciboru' usum nō venerat.</i>	299	<i>Co hlearia Britannica, Dodonaei.</i>	
<i>Cichorium strumosum Myconi.</i>	559 560	<i>Citria cruda incibus hodie cū car-</i>			
		<i>nis asatis.</i>	301	<i>Cochlearia Britannica, Lob.</i>	1320
<i>Cichorium sylvestre Pena.</i>	557	<i>Citri mali an apud antiquos fa-</i>		<i>Cochlearia, Dodonaei.</i>	ibid.
<i>Cici.</i>	1630. 1631	<i>cta fuerit mentio.</i>	299	<i>Coffo vel Choffolo.</i>	1849
<i>Cicuta.</i>	788	<i>Citrium, Mali Medica fructus.</i>		<i>Coggygia Theophrasti, siue Cog-</i>	
<i>Cicutaria.</i>	760	301		<i>gyria.</i>	193
<i>Cicutaria 789. alba, &amp; rub. ibid.</i>		<i>Citrus Officinarum.</i>	625	<i>Cohyne.</i>	1845
<i>Cicutaria latifolia fatidissima cū</i>		<i>Citrum, Thuion Homeri Macro-</i>		<i>Coix. 1624. Myconi.</i>	165
<i>flore, Lobel.</i>	790	<i>bin.</i>	61	<i>Coix Theophrasti.</i>	1179
<i>Cicutaria altera latifolia fatidif-</i>		<i>Clematis species.</i>	832. 833	<i>Colchicum anglicū Lobellij.</i>	571
<i>sima sine flore, Lobel. y. ibid.</i>		<i>Clematis.</i>	976. 977	<i>Colchicum i phemerum.</i>	1570
<i>Cicutaria maxima fatida, Lobel-</i>		<i>Clematis altera Betica. 1433. 1434</i>		<i>Colchicum Illyricum, siue Graecū</i>	
<i>lij.</i>	790	<i>Clematis altera minor longifolia,</i>		<i>nō venenatum, Lobellij.</i>	1174
<i>Cicutaria palustris, Lobellij.</i>	1093	<i>Lobellij.</i>	1434	<i>Colchicum montanum cum flore,</i>	
<i>Cincinnati.</i>	1209	<i>Clematis altera vrens.</i>	1171	<i>Clusij.</i>	1572
<i>Cineraria.</i>	1383	<i>Clematis III. Matthioli.</i>	1407.	<i>Colchicum montanū minus, Clu-</i>	
<i>Cinna.</i>	420 424	1408		<i>si.</i>	ibid.
<i>Cinnabari.</i>	1847	<i>Clematis prior.</i>	211	<i>Colchicum Orientale Matthioli.</i>	
<i>Cinnamomi vice, Sabine duplū</i>		<i>Cleoncium.</i>	930	<i>1571. alterum eiusdem. ibid.</i>	
<i>substituitur.</i>	184	<i>Clinopodium ibid. prius, &amp; alte-</i>		<i>Colocasia 457. &amp; Colocasion vi-</i>	
<i>Cinnamomū 1796. &amp; Cinnamū.</i>		<i>rum Matthioli.</i>	931	<i>res.</i>	461
<i>Circaea.</i>	1413	<i>Clinopodium sylvestre.</i>	912	<i>Colocyntha.</i>	614
<i>Circaea 1338. Dalechamp.</i>	ibid.	<i>Clymenum Discor. quorundam.</i>		<i>Colocynthis 1675. Matthio. 1676</i>	
<i>Circaea Tragi.</i>	871	366		<i>Colocynthis species sex Cordi.</i>	
<i>Circium.</i>	1726	<i>Clymenum Matthioli.</i>	470	<i>1676 1677</i>	
<i>Cisium.</i>	59	<i>Clymenum minus.</i>	1357	<i>Colocynthis Pyriformis Lobellij.</i>	
<i>Cisium.</i>	582	<i>Cnicus.</i>	1449	<i>ibid.</i>	72
<i>Cisium Anglium.</i>	583 584	<i>Cnicon.</i>	270	<i>Colophonias Resina.</i>	1285
<i>Cisium Dodonaei.</i>	583	<i>Cnicorum.</i>	1667	<i>Colubrina.</i>	1601
<i>Cisium aliud Dodonaei.</i>	ibid.	<i>Cnicorum.</i>	1363	<i>Colubrina.</i>	1601
<i>Cisium Germanicum Loniceri.</i>	58	<i>Cnicorum album Dalechampi.</i>		<i>Columbaris, Columbaria, Colubi-</i>	
		<i>ibid.</i>		<i>na</i>	1334
<i>Cisium luteū Sequanorum. 1483</i>		<i>Cnicorum album Matthioli</i>	1364	<i>Columbina.</i>	820
<i>Cisium maius singularibus capi-</i>		<i>Cnicorū aliud Theophrasti, Mat-</i>		<i>Colus Iouis, Lobellij.</i>	966
<i>tulis.</i>	584	<i>thioli.</i>	1365	<i>Colutea scorpioides.</i>	217
<i>Cissarion.</i>	231	<i>Cnicorum Alfonso Pantij.</i>	1669	<i>Colutea testicaria.</i>	214
<i>Cistus seu Cistius.</i>	221. 223	<i>Cnicorum nigrum Mycon.</i>	11364	<i>Colymbades Olinae quae.</i>	344
<i>Cisti species.</i>	869	<i>Cnicorum nigrum quorundā.</i>	1201	<i>Colytea &amp; Colutea diuersae plan-</i>	
<i>Cisti voces.</i>	224	<i>Cnestrum.</i>	1666	<i>tae.</i>	215
<i>Cisti maris species quinque, Clu-</i>		<i>Cnicinum Triphyllum.</i>	504	<i>Colytea tertia Theophrasti.</i>	220
<i>si.</i>	ibid. & 225. 226	<i>Cnicus.</i>	1449	<i>Comarus.</i>	196
<i>Cistus femina, eiusdem.</i>	226	<i>Cnicus alter, Clusij.</i>	ibid.	<i>Comarus.</i>	613
<i>Cistus albus folio, Clusij.</i>	ibid.	<i>Cnicus sativus, Matthioli ibid.</i>		<i>Comoricha Illyrici gentibus dici-</i>	
<i>Cistus albus folio Hami, proce-</i>		<i>Cnicus sylvestris prior, Atracilis</i>		<i>tur quam Philycam Graeci vo-</i>	
<i>rior priore, Clusij.</i>	ibid.	<i>Dalech.</i>	1450	<i>cant.</i>	257
<i>Cistus folio Lananula, Clusij.</i>		<i>Coagulum terre, Plinij.</i>	1073	<i>Comphena, vel Cremphena, vel</i>	
<i>ibid.</i>		<i>Cobbam.</i>	1841	<i>Comphana.</i>	540

Condex



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM.

Condex Auicenne Thus. 1752	Corchorus Dalechampi.	565	Cotyledon secunda.	ibid.	
1753.	Coriandrum.	735	Cotyledon II. Matthioli.	ibid.	
Condurum Plinij.	515	Coriandrum alterum minus odorum, Lobel.	ibid.	Cracca.	479
Coferna Plinij & Lobellij.	1023	Coriandrum officinarum.	ibid.	Crambe.	519. 524
Conferua trichodes.	1022	Coriandrum sativum, Matthioli.	ibid.	Crapula.	73
Conferuatrichodes, siue Trichomanes aquaticum Dalechampi.	1023	Coriandrum sive stre Myconij.	736	Craſſiuenium Aceris genus.	94
Coniferae arbores.	35	Corion & Corianum.	715	Craſſula & Craſſula maior.	1315
Coniferae arbores sex generu facit Plinius.	48	Coris. 1158. Matthioli ibid. Montpellierensis Dalechampi.	ibid.	Craſſula minor, seu Vermicularis.	1130
Coniferae omnes arbores non bene notas habuit Plinius.	43.	Coru cerui Herbariorum.	668	Craſſula officinarum.	1128
Coni, Cedri fructus.	39	Coruus femina.	197	Crataegus, Sorbus torminalis Tra	
Conſilio.	1637. 1638	Coruus mas.	329	gi & Matthioli.	99
Conſilio altera.	1639	Corona Imperialis, Dodon.	1495	Crataegonum.	420
Conſolida aurea nemorum, Pena.	1271	Corona fratrum, Herbariorum.	1488	Crataegonum secundum quorundam.	1168
Conſolida maior officinaru.	4107	Corona Regis.	511. 628	Cremphena, vel Comphena.	546.
Conſolida media siue Symphytum.	1075	Corona Veneris.	676	Crepis Dalechampi.	562
Conſolida minor.	1310	Coronopus.	668	Crespina vna.	134. 135
Conſolida minor quorunda.	833	Coronopi Maſilienſiu Pena.	670	Criſpinum vinum.	134
Conſolida regalis, Fuchſij.	970	Coronopus Matthioli.	669	Creſſio hortenſis Herbariorum.	654
Conſolida Regia, siue Regalis, Herbariorum.	698	Coronopus quorundam.	1254	Creſſio noſter ſeu vulgaris.	638
Conſolida Sarracenica.	1270	Coronopus repens Lobellij.	671	Creta marina officinar.	767
Conſolida Sarracenica maior.	1271	Coronopus Ruellij ex Dodon.	670	Crias Apuleij.	1206
Conſolida Sarracenica tertia, Tra	ibid.	Coronopus ſylueſtris siue Serpen	669	Crinita.	1209
gi.	ibid.	na	669	Criſta gallinacea Dodonai.	1073
Conuoluulus. 1423. 1424. 1425.	ibid.	Corrago à Lucanis dicta, qua vulgo Borrage.	578	Criſta galli altera, seu Phthirion.	1074
maior, minorque.	ibid.	Corruda.	609. 1473	Criſthmij ſpecies Matthioli.	1379
Conuoluulus folio Althae Cluſij.	1426	Corruda altera Cluſij.	612. 611	Chriſthum Chryſanthemum Do	ibid.
Conuoluulus minimus Cluſij. ibid.	43. 52	Corruda tertia Cluſij.	ibid.	donej.	ibid.
Conus.	43. 52	Corruda Dodonai.	611	Chriſthum Dioſcoridis.	264
Conyza marina Dalechampi.	1366	Corruda Pena.	611	Chriſthum Matthioli.	767
Conyza montana Myconij.	1201	Corſum.	1077	Chriſthum Matthioli, Batis Plinij.	768
Conyza tertia quorundam.	1681	Cortex VVinteranus.	1858	Chriſthum II. Matthioli.	1396
Conyza. 1043. maior & minor, Matthioli 1044. media, eiufd.	1045. minima, Lobellij.	Cortices Roſarum quid.	125	Chriſthmus Dioſcoridis.	512
Conyza magna Pena 1046. minor vera, eiufdem.	ibid.	Cortuſa.	1269	Chriſthmus quartus Matthioli.	1460
Copal.	1791	Coru.	1862	Crocodilium.	1475
Copra.	1762	Corydalis Galeni.	1292	Crocus.	1531
Cor ndicum.	597	Corylus ſativa.	319	Crocus abſque flore Matth.	1532
Cor Oſmundae.	1225	Corylus ſylueſtris.	101	Crocus montanus, Cluſij.	1535
Cor v. Thome.	1905	Corymbe.	814	Crocus ſatiuus Matthioli.	1532
Corallina.	1367	Corymbi.	1416. 1417	Crocus ſerotinus cum flore, Lobel	1535
Corallina Britannica Pena.	1371	Coſtus hortenſis.	678	ly.	1535
Corallij frutex.	1374	Coſtus Illyricus.	758	Crocus ſylueſtris I. & II. Dalechampi.	1533. 111. eiufdem.
Corallij vires.	1376	Coſtus Indicus.	1817	Croc vernus maior Cluſij.	ibid.
Corallium vnde dictum.	1375	Coſtus Moluccenſis corticoſus.	1819	Crocus vernus minor I. & III.	Cluſij.
Corallium album & rubrum Lo	ibid.	Coſtus Syriacus & Arabicus.	1818	Crocodilium, Carlina caulem habens.	1476
bellij.	ibid.	Coſinus Plinij.	194	Crocodilium Monſpelienſium Da	ibid.
Coralloides siue Corallij albi varietas.	1576	Cotonea.	294	l. ch.	1630
Coralloides altera.	1140	Cotoneam Malum primum Carlini nominauit.	296	Crotora.	1630
Corchorus Lobellij.	555. 566	Cottana.	335	Cruciata alia.	1342. 1343
Corchorus. 1235.	1263	Cotula.	1395	Crupina Belgarum,	567
		Cotula ſetida.	954	Cruciata, siue Gentiana minor, Matthioli.	1259
		Cotula ſetida. 1144. Dodon.	1345	Cruciata, siue Gentiana minima, Matthioli.	ibid.
		Cotula non ſetida, seu inodora Buphthalmum Fuchſij.	ibid.	Cruciata	
		Cotyledon.	1321. 1608		
		Cotyledon aquatica.	1090		
		Cotyledon 3. Dalechampi.	1322		



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Cruciata minima</i> , Matth. 1260	<i>Cyclamen</i> , Officina. 1604	<i>des</i> , Gemme. 1564
<i>Cubebe</i> 242. 243. 1813	<i>Cyclaminus</i> . <i>ibid.</i>	<i>Cynoforchis palustris</i> platyphylla, 1562
<i>Cucubalus</i> Plinij. <i>sive</i> <i>Ocimoides</i>	<i>Cyclaminus altera</i> Dodonci. 1413	<i>Gemme</i> . 1584
<i>repens</i> . 1429	<i>Cyclaminus altera</i> orbicularis, Do	<i>Cyperus</i> <i>esculenti</i> . 991
<i>Cucu lata</i> . 1206	<i>donei</i> . 1606	<i>Cyperus</i> & <i>Cypirus</i> . 1822
<i>Cuculus</i> . 596	<i>Cyclaminus altera</i> <i>Hederaceis</i> fo-	<i>Cyperus Indicus</i> Dioscor. 1822
<i>Cucumer agrestis</i> Mathioli. 1672	<i>liis</i> , Lobellij. <i>ibid.</i>	<i>Cyperus longus</i> odorator, Lobellij
<i>Cucumer</i> , vel <i>Cucumis sativus</i> . 619	<i>Cyclaminus altera</i> Luca Ghiri.	992. <i>aquaticus</i> . <i>eiusd.</i> <i>rotundus</i>
<i>Cucumis anguinus</i> . 621	1429	<i>inodorus</i> , <i>eiusd.</i> <i>ibid.</i> <i>Grami-</i>
<i>Cucumis Indicus</i> . 614	<i>Cyclaminus prior</i> Matth. 1605	<i>neus seu Miliaceus</i> , Pene. 993
<i>Cucumis longus</i> . 621	<i>Cyclaminus tertius</i> Plinij quorun	<i>Cypressus</i> <i>Officinarum</i> . 57
<i>Cucumis puniceus</i> . 629	<i>dam</i> . 1738	<i>Cypria amygdala</i> . 316
<i>Cucumis sativi icon</i> . 620	<i>Cyclaminus vulgaris</i> Lob. 1604	<i>Cypirus arbuscula</i> , <i>eadem ne cum</i>
<i>Cucumis Turcicus</i> Fuch. 616. 617	<i>Cyma in Brasica</i> quid. 528	<i>Ligustro</i> . 252. 253
<i>Cucumis sylvestris</i> , <i>erraticus</i> , &	<i>Cymbalaria</i> Matth. 1322	<i>Cytinus</i> . 223. 224
<i>anguinus</i> , <i>affinis</i> <i>Officin.</i> 1672	<i>Cymbalion</i> . <i>ibid.</i>	<i>Cytinus</i> quid. 304. 305
<i>Cucurbita</i> . 614	<i>Cyminum</i> <i>Officinarum</i> . 696	<i>Cytini appellatio</i> quibus compe-
<i>Cucurbita cameraria longa</i> . 615	<i>Cynara</i> . <i>synonymi</i> 1399. 1436	<i>tar</i> . 327
<i>Cucurbita cameraria maior</i> . 616	<i>Cynara non aculeata</i> Matth. 1439	<i>Cytisus</i> . 258
<i>Cucurbita cameraria minor</i> . <i>ibid.</i>	<i>Dodonci</i> . <i>ibid.</i>	<i>Cytisi diversis</i> <i>diversis</i> <i>auctoribus</i> :
<i>Cucurbita Indica longa</i> , <i>Cucumis</i>	<i>Cynara vulgaris</i> Matth. <i>ibid.</i>	<i>Cyrtus</i> <i>Math. Tragi</i> , <i>Gesneri</i> ,
<i>Turcicus</i> Fuchij <i>ibid.</i> & 617	<i>Cynia</i> . <i>synonymi</i> 1399. 1628	<i>Alpinus</i> <i>Dalech. vnus</i> & <i>alter</i>
<i>Cucurbita Indica rotunda</i> . 616	<i>Cynocephalis</i> <i>Apuleij</i> . 1339	<i>Pene. primus</i> , <i>secundus</i> , <i>ter-</i>
<i>Cucurbita laciniata</i> . 618	<i>Cynocephalus</i> . 830	<i>tius</i> , <i>quartus</i> <i>Hispanus</i> <i>Clusij</i> ,
<i>Cucurbita sylvestris</i> . 1675	<i>Cynocrambe</i> . 1628	<i>Cytisi facie</i> <i>Abysson quorund-</i>
<i>Cucurbita verrucosa</i> . 617	<i>Cynocrambe</i> , Matth. <i>ibid.</i>	<i>dam</i> <i>Lobellij</i> 259. 260. 261.
<i>Cuminum sativum</i> . 696	<i>Cynoglossos</i> . 181	262. 263. 264
<i>Cuminum sativum</i> Matth. 697	<i>Cynoglossum</i> , <i>Officin.</i> <i>Cynoglossa</i> .	• • D
<i>Cuminum sylvestre</i> I. Matth. <i>ibid.</i>	1261	<i>Dactyli</i> . 362. 364
<i>Cuminum sylvestre alteru</i> , Mat-	<i>Cynoglossum pusillum</i> <i>Narbon-</i>	<i>Dalmatica maior</i> <i>Iris</i> . 1613
<i>thioli</i> 698	<i>se</i> . 1262	<i>Damaconium</i> . 1260. 1161
<i>Cuminum sylvestre siliquatum</i> ,	<i>Cynoglossum vulgare</i> <i>floridum</i>	<i>Damaconium</i> , <i>seu</i> <i>Alisma</i> <i>Dios-</i>
<i>Pene</i> . <i>ibid.</i>	<i>Matth. secundum</i> <i>Plinij. ibid.</i>	<i>coridis verum</i> , <i>quorundam</i> .
<i>Cunila</i> . 886	<i>Cynoglossum</i> <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>	1057
<i>Cunila bubula</i> . 744	<i>Cynoglossum vulgare</i> <i>Matthioli</i> ,	<i>Damaconium</i> , <i>seu</i> <i>Alisma</i> , <i>Mat-</i>
<i>Cunila</i> . 8. 6. <i>gallinacea</i> , <i>bubula</i> ,	<i>Lycopsis</i> <i>Lacuna</i> . 1263	<i>thioli. ibid.</i>
<i>cephalote</i> <i>seu</i> <i>capitata. ibid.</i>	<i>Cynomorion</i> . 485	<i>Damaconium stellatum</i> . 1058.
<i>Cunila</i> & <i>Cunilago</i> . 1044	<i>Cynomoron</i> . 1730	<i>Alpinum. ibid.</i>
<i>Cupressus</i> . 57	<i>Cynorrhodon</i> . 1492	<i>Daphnoides</i> . 210. <i>eius historia</i>
<i>Cupressus cariem non sentit</i> . 59	<i>Cynorrhodon Polyacanthos</i> <i>vina</i>	<i>obscura est. ibid.</i>
<i>Cupressus Cretica</i> . 182	<i>imagine expressa</i> . 127	<i>Daphnoides planta acerrima</i> &
<i>Cupressus humilis</i> <i>seu</i> <i>pumila</i> . 940	<i>Cynorrhodon vniversi</i> <i>Rosam o-</i>	<i>feruidissima</i> . 212
<i>Cupressus in Creta</i> <i>quocunque lo-</i>	<i>mnem sylvestrem</i> <i>Plinius ap-</i>	<i>Dardana</i> , <i>Apuleij</i> . 1054
<i>co terram mouerit quispiam,</i>	<i>pellat</i> . 125. 126	<i>Darian. Camalanga</i> . 1837
<i>n si seratur alia</i> , <i>gignitur</i> , <i>ac</i>	<i>Cynorrhodos quid</i> . 122	<i>Datura</i> , <i>Acoite</i> . 1913
<i>protinus emicat</i> . 58	<i>Cynorrhoda</i> <i>Rosa</i> <i>duo genera</i> , <i>syl-</i>	<i>Daucus</i> , <i>Daucum</i> , & <i>Daucium</i> .
<i>Cupressus pumila</i> , <i>sive</i> <i>hortensis</i> ,	<i>uestris</i> <i>Rosa vulgaris</i> , & <i>Cy-</i>	716
<i>Gallorum</i> . 938	<i>norrhodos</i> <i>Polyacanthos</i> . 125	<i>Dauci alterum</i> <i>genus</i> <i>Fuch</i> . 765
<i>Cupressus trifera</i> <i>est</i> . 58. <i>eius tem-</i>	<i>Cynosbati in re medica</i> <i>vires</i> . 123	<i>Daucus</i> <i>I. I. genus</i> <i>Dalech</i> . 717
<i>peramenta</i> & <i>vires. ibid.</i>	<i>Cynosbaton cum</i> <i>Chamabato con-</i>	<i>Daucus</i> <i>I. I. I. genus</i> <i>Dalech. ibid.</i>
<i>Curcuma</i> <i>Officinarum</i> . 1822	<i>fundis</i> <i>Plinius</i> . 122	<i>Daucus</i> <i>I. Matth.</i> 716
<i>Cusculum</i> . 27	<i>Cynosbaton quidam</i> <i>Capparin ap</i>	<i>Daucus</i> <i>I. I. Matth.</i> <i>ibid.</i>
<i>Cuscuta</i> <i>Herbariorum</i> & <i>Offici-</i>	<i>pellarunt</i> . 115	<i>Daucus</i> <i>Officinarum</i> . 719
<i>narum</i> . 1683	<i>Cynoforchis</i> . 1549	<i>Daucus</i> <i>pratensis</i> <i>Dalech</i> . 718
<i>Cyamos</i> . 460	<i>Cynoforchis</i> <i>Conopsea</i> . 1563	<i>Dolophium</i> <i>Plinij</i> . 866
<i>Cyamus</i> . 436	<i>Cynoforchis</i> <i>Dracotias</i> <i>Gema. ibi.</i>	<i>Dendrolibanus</i> . 36
<i>Cyanus maior</i> 437. <i>minor. ibid.</i>	<i>Cynoforchis leptophylla</i> <i>Gemme</i> .	<i>Dendromalache</i> . 588. 582
<i>Cyanus repens</i> . <i>ibid.</i>	1564	<i>Dens caninus</i> . 432. 434. 564
<i>Cyanus supinus</i> . <i>ibid.</i>	<i>Cynoforchis maior</i> <i>Label. Scapias</i>	<i>Dens caninus</i> <i>Belgarum</i> . 1567
<i>Cycas</i> <i>quid</i> <i>vocent</i> . 364	<i>Diafor Gemme</i> . 1566	<i>Dens leonis</i> . 559. 564
	<i>Cynoforchis palustris altera</i> <i>lopho</i>	<i>Dentaria</i>



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Dentaria maior Matth. 1296. minor. <i>ibid.</i> & 1297	Draba. 663, 664, 1182	Elemmi lacryma seu Gummi Ele- ni officinar. 153
Dentellaria 1045, 1139. Dalecham- pij. <i>ibid.</i> altera Dodonæi. <i>ibid.</i>	Draco arbor. 1847	Eleoselinum. 700, 701
Dentellaria, rubra Dalechampi. 1297	Draco hortensis. 685	Elisano. 1794
Dentellaria Rondeletij. <i>ibid.</i>	Dracanea minor. 1596	Elchrysium, & El. iochrysium. 775
Denticula canis. 1189	Dracunculus. <i>ibid.</i> & 1285	Elchrysium, Matthioli. 776 Itali- cum, eiusd. <i>ibid.</i>
Denticulata Dalecham. 1296	Dracunculus hortensis. 685	Eliphacos. 879
Desfructio Chirurgorum. 1916	Dracunculus, siue Serpētaria ma- ior Dodon. 1602	Elleboraster maximo flore & se- mine pragnans. 1638
Diapsensia, <i>ibid.</i> 1268	Dracunculus palustris. 1602	Elleboraster Belgarum, Lobeilij. 1639
Diastamni in Creta legendi cautio. 116	Drakenaradix. 1858	Elleborine. 1111
Diastannum. 168	Drosum Cordj. 1281	Elleborine ferruginea Dalecham- pij. 1146
Diastannum album. 872	Drupe olea quæ. 342. oleum ex his. 345	Elleborine Dioscoridis. 1126
Diastannum & Pseudodiastam- num. 892	Dryophoron Plinij. 664, 1226	Elleborine Dodonæj. 1312
Diastannum verum. 893	Dryopteris 1127. Matthioli. <i>ibid.</i>	Elleborine siue Epipactis, quorum dam. 828
Digitalis 831. purpurea. <i>ibid.</i> pur- purea aut alba Lobell. <i>ibid.</i>	Dryopteris Dalecham. 1228	Elleborine, Matthioli. 1312
lutea. <i>ibid.</i>	Dryopteris alta Dodon. 1227	Ell. borine Punicea. 146
Digitellus. 1128	Dryopteris nigra Dodon. 1228	Elleborine quorundam. 1260
Digitis citrini Auicenne. 1169	Drypis. 1479	Ellebori nigri vires. 1639
Dilegi siue Delegi Auicenne. 1687	Drypis Lonicerj. 1480	Elleborum vel Elleborine voca- tur in Aulicira quod aliàs Se- samoides. 1648
Diomphas. 1156	Dulcamara. 1338	Elleborum nigrum, Matth. flore purpureo. 1634
Diospyros siue Faba Græca, angu- stis folia seu Lor. Africana. 349	Dulcamara Cordi. 1605	Elleborum nigrum quorundam. 1268
Diospyros siue Faba Græca, lati- folia, Plendolotus Matth. <i>ibid.</i>	Dulcamara Herbariorum. 1407	Elleborus a'bus. 1631
Dipcadi candidus floribus Lobel- lij. 153	Dulciamara siue Vinis sylvestris Matthio. 1413	Elleborus albus, Matthioli. 1632
Dipcadi Chalcedonicum. Bulbus vomitorius Matthioli. <i>ibid.</i>	Dulcichinum. 1584	Elleborus niger. 1633
Dipsacus. 1447. Matthioli ibi sa- tinus a' ter, eiusd. <i>ibid.</i>	Dulcis radix. 247	Elleborus niger II. Dodonæj. 1646
Dipsacus dicontaphus dictus. 1471	Duraciria unde dicta. 293, 294	Elleborus niger III. Dodonæi. ibi. & 1637
Dipsacus sylvestris maior Fuch- sij. 1448	Duriones. 1869	Elleborus niger adulterinus si'ue stris, Fuchsij. 1637
Dipsacus sylvestris minor seu Vir- ga pastoris, Matthio. <i>ibid.</i>	E	Elleborus niger III. Matthioli. 1635
Dircea. 1338	Echium primū Plinij quorundam. 1327	Elleborus niger Matthioli, flo- re herbaceo. 1639
Dolichus. 473, 474	Echium Fuchsij. 580	Flymus. 411
Donax. 1002	Elaagnus Matth. III. 112	Embelgi. 1687
Dorea, siue Herba aurea Narbo- nensis, Pena. 1273	Elaagnus Salix Dalecham. 277. 278	Empetrum. III. 1671
Doripetron. 1344	Eleophyllum. 1194	Empetrum phacoides, Herba ter- ribilis Narbonensium. 1771
Doronicum. 1202	Elaphoboscus & Elaphoboscum. 476, 720	Empetrum Rondeletij. 767
Doronicum brachiata radice, Aco- nitum pardalianches Plinij & Matth. 1203	Elaphoboscum Dodon. seu Baucia, 721	Empetron quorundam. 1213
Doronicum minus Officinarum, Pena & Lobellij. 1202	Elaphoboscum Matth. <i>ibid.</i>	Empetrum Tragi. 1126
Doronicum Rom. Aconitū par da- lianthes antiquorū, Dod. 1737	Elaphoscorodon. 1545	Endiuia vulgarior officinarum. 546
Doronicum radice scorpij figura, Dalecham. 1203	Elase. 362	Endiuia Tragi. 564
Dorycnium cognepianta Clusij. 1724	Elatine. 1238	Enneaphyllum Plinij. 1140
Dorycnium Monspelienſe Dale- champi. <i>ibid.</i>	Elatine Dalecham. 1239	Ensis siue Ensculus. 1620
	Elatine tryphillos Dalech. 1240	Enula Campana, officinarū. 867
	Elatine prior, Dod. 1238	Ephemerum. 1570
	Elatine altera, Dod. 1239	Ephemerum non lethale, Matthi. 1574
	Elatine Matthi. 1238	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Ephedron.</i>	1069	<i>Eryngium aliud montanum, Da-</i>	tum in medicamentis. 453. 454.
<i>Epimedium.</i> 1094. <i>Dodonai.</i>	1095	lech.	1460
<i>Epimelis arbor.</i>	196	<i>Eryngium planum Matth. ibid.</i>	455
<i>Epimelis.</i>	198	<i>Eryngium pusillum planum Mu-</i>	<i>Fabis quare abstinendum consue-</i>
<i>Epimelis altera, Cotonafter Gesue</i>		<i>toni, Lobellj.</i>	1461
<i>ri.</i>	199	<i>Erysimum.</i>	652
<i>Epimelis, Mespile genus.</i>	333	<i>Erysimum Dodonai.</i>	542
<i>Epipactis.</i>	1311	<i>Erysimum Theophrasti.</i>	383
<i>Epipactis Anguillare.</i>	1126	<i>Erysimum verum.</i>	653
<i>Epipactis, quorundam.</i>	828	<i>Erysimum verum.</i>	1815
<i>Epipetron.</i>	912	<i>Erythrodanum.</i>	1329
<i>Epithymum.</i> 1681. <i>Matthio.</i>	1682	<i>Erythrodanum marinum.</i> 1385. &	
<i>Epithymum Græcorum &amp; Arabu</i>		1386	
<i>Lobellj.</i>	ibid.	<i>Esculum eandem cum Palypyl-</i>	<i>Faba Pontica.</i>
<i>Equapium Galæ.</i>	703	lo quidam faciunt, <i>Plinius tan-</i>	1315
<i>Equisetum, Equiseta, Equisetis,</i>		quâ diuersarum utriusque mi-	<i>Fabata seu Fabatapuls.</i>
<i>Equinatis.</i>	1069	minit.	8
<i>Equiseti asparagus, Dodo.</i>	1049	<i>Esculus mas &amp; samina. s. unde</i>	<i>Fabago Belarum, siue Peplus Pa-</i>
<i>Equisetum i.</i>	ibid.	dicatur. <i>ibid.</i> & 6	1315
<i>Equiseti minoris flores.</i>	1070	<i>Esula siue Ezula.</i>	1652
<i>Equisetum alterum siue minus</i>		<i>Esula maior Dodonai Hist. purg.</i>	1653
<i>Matth.</i>	ibid.	<i>Esula minor Dodon. Hist. purg.</i>	ibid.
<i>Equisetum tertium &amp; quartum,</i>		ibid.	
<i>Matthioli.</i>	1071	<i>Esula minor Italorum.</i>	1648
<i>Equisetum luncum Tragi. ibid.</i>		<i>Esula rotunda officinar.</i>	1648
<i>Franchemus.</i>	968. 969	<i>Esula maior Germanica, Pene.</i>	1654
<i>Ereuthedanum Theophrasti, quo-</i>		<i>Esularara Peme &amp; Lobellj.</i>	1655
<i>rundam.</i>	1062	<i>Esularara de Lio Venetorum Insu-</i>	388
<i>Erica.</i> 185 eius quindecim speciei.		la Pen. alia.	ibid.
<i>ibid.</i> & 186. 187. 188. 189. 190		<i>Esula dulcis, Tragi.</i>	1666
<i>Erica.</i>	1482	<i>Esula minima, Tragi.</i>	ibid.
<i>Erica Alexandrina Cortusi.</i>	1669	<i>Esula sylvestris Tragi.</i>	1655
<i>Erica prima &amp; quarta Clusij ica-</i>		<i>Etalch.</i>	1838
<i>nes.</i>	284	<i>Elmodrys Macedonum.</i>	4
<i>Erica prius genus.</i>	1200	<i>Euboica glandes.</i>	30
<i>Eruce que &amp; Myrice.</i>	181	<i>Eufasia.</i>	1166
<i>Erigeron, Lattus venetio.</i>	574	<i>Eufasia secunda Dodonai &amp; Lo-</i>	
<i>Erinacea Clusij.</i>	1485	bellj.	1167
<i>Erinus siue Erineos. 1086. Matth.</i>		<i>Eufasia Lacuna.</i>	422
<i>&amp; Dalech.</i>	1086	<i>Eufasia Matth.</i>	1167
<i>Eristihales.</i>	1128	<i>Euonymus.</i>	270
<i>Eristihales, Dalechampi.</i>	1094	<i>Eupatorium, siue Hepatoriū.</i>	1351
<i>Erithales.</i>	1128	<i>Eupatorium officinarum.</i>	1038
<i>Eruango.</i>	484	<i>Eupatorium vulgare.</i>	1063
<i>Eruca. 649. satiuā.</i>	ibid.	<i>Eupetalos.</i>	210
<i>Eruca cinerea.</i>	1383	<i>Euphorbium.</i> 1690. <i>Dodonai.</i>	1691
<i>Eru. a cinerea Dalechampi.</i>	651	<i>Euphrasia.</i>	1168
<i>Eruca maritima.</i>	1394	<i>Euphrosyon.</i>	578. 581
<i>Eruca muralis, Dalechampi.</i>	1134	<i>Euplea, vel rectius Euclea.</i>	1340
<i>Eruca palustris.</i>	650	<i>Exacon.</i>	1286
<i>Eruca peregrina Clusij.</i>	651		
<i>Eruca sylvestris.</i>	650		
<i>Eruca sylvestris angustifolia.</i>	651		
<i>Eruilia, siue Ochrus.</i>	465		
<i>Eruilia sylvestris Dodo.</i>	462		
<i>Eruum.</i>	468		
<i>Eruum sylvestre.</i>	469		
<i>Eryngium.</i>	1458		
<i>Eryngium, &amp; Eryngium luteum.</i>	1438		
<i>Eryngium pumilum Clusij.</i>	1461		

F

**F** *alim, Theveti.* 1910  
*Faba seu Fabulum.* 451  
*Faba diuersis in terris maiores &*  
*minores producuntur & alia*  
*atque alia forma.* 452  
*Faba vsus & vires, cum in cibis,*

337-338  
*Ficus qua arte paruule admo-*  
*dam sunt ut in vasculis super*  
*fenebris spectentur.* 540  
*Ficus Aegyptia.* 113. 340  
*Ficus Idæa.* 199  
*Ficus*



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Ficus indica</i> Theophrasti, Alexan- drina Plinij. 191	<i>Faniculum aquaticum</i> , Dalecha. 1023	<i>Fucus</i> siue <i>Alga</i> Intybacea. 1373
<i>Ficus Indica</i> . 1853	<i>Faniculum porcinum</i> . 745	<i>Fucus</i> siue <i>Phucus marinus</i> & <i>Al</i> <i>ga</i> . 1369
<i>Ficus Indica</i> siue <i>Opuntia</i> . 1795	<i>Faniculum torinosum</i> , Dalec. 749	<i>Fucus</i> siue <i>Alga marina</i> grami- <i>n</i> a. 173
<i>Ficus inferorum</i> . 1790	<i>Fanumgracum</i> . 480	<i>Fucus</i> , seu <i>Alga marina</i> , Lobellj. <i>ibid.</i>
<i>Ficus Negivarum</i> . 1842	<i>Fanumgracum alterum</i> Dodon. 481	<i>Fuci marini</i> temperamenta & <i>vi</i> <i>res</i> . <i>ibid.</i>
<i>Ficus noster</i> <i>la sativa</i> . 336	<i>Fanumgracum sativum</i> Matthi. 480	<i>Fucus</i> , siue <i>Alga viniferia</i> . 1372
<i>Ficus Pharaonis</i> . 1840	<i>Fanumgracum sylvestre</i> Dalech. 481	<i>Fucus capitatus</i> siue <i>Corallina</i> . 1371
<i>Filago</i> . 1115	<i>Fanumgracum sylvestre</i> Tragi. 250	<i>Fucus Ferulaceus</i> Lobellj. 1373
<i>Filicula</i> & <i>Felicula</i> . 1111 1229	<i>Folium arboris sanguinis</i> Draco- <i>nis</i> . 1447	<i>Fula</i> . 1762
<i>Filipendula</i> , <i>Cenanthe multorum</i> . 781	<i>Folium arboris Draconis</i> ex <i>In</i> - <i>dijs</i> delatum. 1848	<i>Fumaria</i> . 1191
<i>Filipendula Alpina</i> . 1138	<i>Folium opey</i> . 1850	<i>Fumaria bulbosa</i> Matthioli. 1192
<i>Filiquastrum</i> . 1225	<i>Folium dictum</i> <i>Higuero</i> . 1843	<i>Fumaria lutea</i> siue <i>montana</i> Co- <i>rdalis</i> Matthioli. 1211 1292
<i>Filius ante patrem</i> <i>fructus</i> <i>Lys-</i> <i>machij</i> purpurei <i>siliquati</i> . 1060 1069	<i>Folium &amp; folium Indicum</i> . 1776	<i>Fumaria phragmites</i> Dod. 1192
<i>Filix</i> . 1222	<i>Folium muspetum</i> . 717	<i>Fumaria species</i> <i>Aponi</i> . 1293. 1294
<i>Filix aquatica</i> , Dodon. 1225	<i>Folium odoratum</i> <i>quorundam</i> . 982	<i>Fumus terra</i> <i>stinarum</i> . 1291
<i>Filix arborea</i> , Tragi. <i>ibid.</i>	<i>Fraga</i> . 63	<i>Pungis quercu</i> . 10
<i>Filix florens</i> , Tragi. <i>ibid.</i>	<i>Fragaria</i> . <i>ibid.</i>	<i>Furci</i> & <i>Tabera</i> 1851 86 1587
<i>Filix mas</i> , <i>Matth.</i> 1222. <i>femi-</i> <i>na eiusdem</i> . <i>ibi.</i>	<i>Frangula</i> <i>Matthio</i> . 200	<i>Furcus</i> <i>desi</i> <i>que hypocistis</i> . 224
<i>Filix querna</i> & <i>Filix quercu</i> . 127	<i>Fraxinella</i> , seu <i>ictamnium abis</i> , <i>a quibus</i> <i>sa pumila</i> <i>Fraxinus</i> . 872	<i>Fusum</i> & <i>Fusara</i> . 170
<i>Filix saxatilis</i> , Tragi. 1226	<i>Fraxinus</i> & <i>eius genera</i> . 82	<i>Fuserna</i> <i>Abietis</i> <i>pars superior</i> . 1153.
<i>Fistic officinar</i> . 160	<i>Fraxini fructus</i> <i>in</i> & <i>pilule</i> . 84	<i>Fusus agrestis</i> . 1467
<i>Flammula</i> 171. <i>Dod.</i> <i>ibid.</i> <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Fraxinus</i> <i>quibus</i> <i>locis</i> <i>gaudeat</i> , <i>eiusque</i> <i>vires</i> <i>ibid.</i> & 85	
<i>Flammula aquatica</i> . 1041. 1042	<i>Fraxiniligni</i> <i>us</i> <i>us</i> <i>extrema</i> <i>pag.</i> 99	
<i>Flammula vulgi</i> . 1035	<i>Fraxinus bubula</i> . 99	
<i>de Floribus</i> & <i>Coronis</i> . 792	<i>Fritularia</i> . 1550	
<i>Flos amellus</i> , <i>regij</i> . 1048	<i>Fructus Balsami</i> <i>Peruvian</i> , <i>Mo-</i> <i>nardi</i> . 1775	
<i>Flos amoris</i> , <i>Herbariorum</i> . 870	<i>Fructus cholagogus</i> . 1789	
<i>Flos Aquilegie</i> . 1408	<i>Fructus &amp; cortex</i> <i>ad dysenteria</i> . 1788	
<i>Flos cancri</i> , <i>quorundam</i> . 1001	<i>Fructus higuero</i> <i>ex</i> <i>clauso</i> . 1844	
<i>Flos coccineus</i> . 876	<i>Fructus leucoma</i> <i>nucupatus</i> . 1877	
<i>Flos Constantinopolitanus</i> , <i>alij</i> <i>Creti</i> <i>Hierosolimitanus</i> , <i>alij</i> <i>Creti</i> <i>cus</i> . 819	<i>Fructus Sanguinis</i> <i>Draconis</i> . 1848	
<i>Flos coronarius</i> <i>Herbariorum</i> . 355	<i>Fructus sub terra</i> <i>nascens</i> . 1876	
<i>Flos cuculi</i> . 659	<i>Fructus varij peregrij</i> . 859. 860	
<i>Flos cuculi</i> <i>Tragi</i> . 1068	<i>Fruges quid</i> . 371	
<i>Flos Jacobi</i> , <i>Fuchsj</i> . 575	<i>Frugis nomen</i> <i>frumento</i> , <i>frumen-</i> <i>tum tritico</i> <i>atius</i> <i>pater</i> . 371	
<i>Flos Iouis</i> . 1408	<i>Frugum morbi</i> . 513	
<i>Flos Machiaca</i> , <i>Monardis</i> 1901	<i>Frugum morbi</i> <i>verius</i> <i>quam po-</i> <i>sites</i> , <i>que</i> . 47	
<i>Florum regum</i> <i>multis</i> <i>opinantur</i> <i>esse</i> <i>cephalinum</i> . 1743	<i>Frumentacea</i> <i>qua</i> <i>dicuntur</i> . 371	
<i>Flos sanguineus</i> . 1918	<i>Frumenti genera</i> . 372 373 374	
<i>Flos Solis</i> . 869	<i>Frumentum</i> <i>Canariense</i> . 415	
<i>Flos Solis</i> <i>minor</i> , <i>Lobell</i> . 874	<i>Frumentum</i> <i>Italicum</i> <i>ante</i> <i>cun-</i> <i>cti</i> <i>laudatum</i> . 373. <i>qua</i> <i>cui</i> <i>ob</i> <i>eo</i> <i>dotes</i> . <i>ibid.</i>	
<i>Flos solis</i> , <i>Matth.</i> 740	<i>Frumentum</i> <i>Seranicum</i> <i>Erysi-</i> <i>mum</i> <i>Theop.</i> & <i>Tris</i> <i>Plinij</i> . 83	
<i>Flos rigidi</i> . 1624		
<i>Flos riniatis</i> . 800		
<i>Flos Troilus</i> . 1034		
<i>Flos veri</i> . 970		
<i>Faniculum</i> . 668		
<i>Faniculum marinum</i> . 1671		
<i>Faniculum sylvestre</i> <i>Lonic</i> <i>i</i> . <i>es</i> . 689		
<i>Faniculum vulgare</i> . 689		

## G

<i>Galium</i> <i>quale</i> . 166	<i>Galeops</i> , <i>Fuchsj</i> <i>ordi</i> . 110. 1085
<i>Galacton</i> . 487	<i>Galeops</i> <i>lutea</i> <i>Dalechamp</i> . 1248
<i>Galanga</i> 1893. <i>maior</i> & <i>minor</i> , <i>Pena</i> . <i>ibid</i> <i>Acoffa</i> . 1894	<i>Galeops</i> , <i>vel</i> <i>Calops</i> . 1247. <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>
<i>Galaxias</i> . 1474	<i>Galeops</i> <i>purpurea</i> , <i>Lobell</i> . 1248
<i>Galbanifera</i> <i>Ferula</i> , <i>Lobell</i> . 754.	<i>Galium</i> . 1088. <i>luteum</i> , <i>Matthio</i> . <i>ibid</i> <i>album</i> , <i>quorundam</i> . <i>ibid.</i>
<i>Galbulus</i> , <i>ita</i> <i>vocatur</i> <i>Cupressi</i> <i>nux</i> . 171	<i>Gal</i> <i>a</i> . 15
<i>Galega</i> . 959 976	<i>Galla</i> <i>excrem</i> <i>ta</i> <i>quercus</i> <i>S.</i> & <i>9</i>
<i>Galega montana</i> <i>Dalecham</i> . 1139	<i>Galla</i> <i>quercu</i> <i>fructus</i> <i>a</i> <i>Dioscap</i> <i>pilatur</i> . 15
<i>Galeops</i> , <i>Fuchsj</i> <i>ordi</i> . 110. 1085	<i>Gallarum</i> <i>duo</i> <i>genera</i> , <i>Offharitis</i> <i>Chironius</i> . 15 16
<i>Galeops</i> <i>lutea</i> <i>Dalechamp</i> . 1248	<i>Galla</i> <i>animal</i> <i>ex</i> <i>se</i> <i>ignit</i> . 17
<i>Galeops</i> , <i>vel</i> <i>Calops</i> . 1247. <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>	<i>Ex</i> <i>Galla</i> <i>annonae</i> <i>pist</i> <i>lentis</i> <i>au-</i> <i>ra</i> <i>be</i> <i>lorum</i> , <i>hyemis</i> , <i>prae</i> <i>stia</i> <i>ducuntur</i> . <i>ibid.</i>
<i>Galeops</i> <i>purpurea</i> , <i>Lobell</i> . 1248	<i>Galla</i> <i>cus</i> <i>apulej</i> . 426
<i>Galium</i> . 1088. <i>luteum</i> , <i>Matthio</i> . <i>ibid</i> <i>album</i> , <i>quorundam</i> . <i>ibid.</i>	
<i>Gal</i> <i>a</i> . 15	
<i>Galla</i> <i>excrem</i> <i>ta</i> <i>quercus</i> <i>S.</i> & <i>9</i>	
<i>Galla</i> <i>quercu</i> <i>fructus</i> <i>a</i> <i>Dioscap</i> <i>pilatur</i> . 15	
<i>Gallarum</i> <i>duo</i> <i>genera</i> , <i>Offharitis</i> <i>Chironius</i> . 15 16	
<i>Galla</i> <i>animal</i> <i>ex</i> <i>se</i> <i>ignit</i> . 17	
<i>Ex</i> <i>Galla</i> <i>annonae</i> <i>pist</i> <i>lentis</i> <i>au-</i> <i>ra</i> <i>be</i> <i>lorum</i> , <i>hyemis</i> , <i>prae</i> <i>stia</i> <i>ducuntur</i> . <i>ibid.</i>	
<i>Galla</i> <i>cus</i> <i>apulej</i> . 426	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Gallitricum.	965	Glandes Platyphilli perfecta & imperfecta.	3	Gramen. 1002. aquaticum. ibid.	
Gallitricum siue Sclarea.	966	Glandes Sardiana. 30. Iouis. ibid.		aculeatum. ibid. Arundina-	
Garofam.	543	Enboice.	ibid.	ceum. 1004. nigrum ibid. rian-	
Garum olens.	ibid.	Glandifera quedam arbores Smi-		gulum. ibid. Parnasi 1005. Par-	
Gelofia Tragi.	540	laces appellata.	24	nasi duplicato flore, Lobellij.	
Gelseminum.	1430	Glandiferarum arborū varia ge-		ibid. aliud Parnasi.	
Geminialis.	964	nera.	1	Gramen aculeatum Matthio. 435	
Geniularis.	814	Glandis calix.	15	Gramen bulbosum, nodosum. 434	
Genipat.	1833	Glandis nomine latinis omnis		Gramen Cyperoides. 432. 433	
Genifla.	167	fructus coninetur.	1	Gramen anthoxanthum Dalech.	
Genifla nominis ratio.	168	Glandis nomine permulta fructuū		425. 426	
Genifla angulosa siue vulgaris.		genera comprehenduntur. 320		Gramen aureum Dalech. 430	
172		Glandium esus apud varias gen-		Gramen bulbosum Dalechampi.	
Genifla humilis, siue Tinctorius		tes.	13. & 14	427	
flos.	174	Glandium praeantissima Casta-		Gramen echinatum Dalechampi.	
Genifla minima.	173	nea.	32	432	
Genifla Iluensis.	174	Glans que proprie dicatur.	1	Gramen glumofum Dalechampi.	
Genifla spinosa.	164	Glans Cerri.	7	429	
Genifla tinctoria Clusij.	175	Glans Suberi pessima.	23	Gramen iuncum Dalechampi.	
Genifla in medic. correctio.	170	Glans vnguentaria. 365. 1684		424. 425	
Genifella.	173	Glandis vnguentaria siliqua cū		Gramen lanatum Dalechampi.	
Gentiana.	1158	fructu. Pen.	1685	ibid.	
Gentianella. 828. minima latifolia.		Glastum.	499. 500	Gramen leucanthemum Dalech.	
ibid. angustifolia.	829	Glastisatio & cultus.	500	425. 426	
Germanicum Echiorides.	1142	Glastum montanum, Dalech. 1203		Gramen minimum Dalechampi.	
Geranium.	1175	Glaucium Dioscoridis.	628	424	
Geranium batrachoides.	1179	Glaux.	487	Gramen murorum Dalechampi.	
Geranium batrachoides alterum		Glaux Clusij.	488	428	
longius radiculatum, Lobellij.		Glaux Dodonei.	487	Gramen nemorum Dalechampi.	
1280		Glaux vulgaris.	250	429	
Geranium l. quorundam, Dalech.		Glinon Aceris genus.	94	Gramen pinnatum Dalechampi.	
1275		Globularia.	865	431	
Geranium gruinale Dodon.	1278	Gluma quid.	377	Gramen pratense Dalechampi. 424.	
Geranium tuberosum Dodo.	1276	Gluten aibolin Auicenne, Resina		425	
Geranium hamatodes. 1278. 1279		Terebinthina.	62	Gramen spicatum Dalechampi. 427	
Geranium fuscum Lobellij.	1279	Glycyrrhiza seu Glycyrrhizon.		Gramen triglochis, seu vermicu-	
Geranium l. Matth.	1275	247		latum Dalechampi.	
Geranium aliud secundum, Matt.		Glycyrrhiza Echinata Dod. ibid.		431	
1277		Glycyrrhiza Echinata Matt. ibid.		Gramen exile.	
Geranium II. Dioscoridis, III.		Glycyrrhiza non Echinata, Scythi		432	
Matthioli. Pes columbinus.		ca herba.	248	Gramen filiceum, seu polianthes.	
1276		Glycyrrhiza a quibus locis vel plu-		428	
Geranium IIII. Matth.	1280	rima vel optima noscatur. 250.		Gramen hordeaceum, Holcus Pli-	
Geranium VI. M. Matthioli.	ibid.	vires.	251	nij.	
Geranium tertium Plinij, 806		Glycyrrhiza radix pro polu Scy-		Gramen Ischemon Plinij, siue Da-	
muscata.	1277	ris in aquarum penuria. 250		ctylon.	
Geronto pogon, siue Salsifica Italo		Glycyrrhiza siliustris. ibid. & 251		Gramen Iuncum vel Arundi-	
rum.	1079	Gnapthalium.	1115	naceum, quorundam.	
Gethyum.	1338	Gnapthalium, Matth.	ibid.	1001	
Geum alpinum Penn.	687	Gnapthalium marinum. 1187. Da-		Gramen Leucanthemum.	
Geum Plinij.	685	lech. ibid. tomentosum. ibid.		422	
Gingiber. 434. 1506.	1890	Gnapthalium montanū Dalech. 1116		Gramen Manne.	
Gingidium.	709	Gnapthalium vulgare, Fuchsj.		414	
Gingidium folijs Baucie, Syriaci		1115		Gramen Manne prius Matthio.	
Lobellij.	710	Gnapthalium, siue Linum pratense, Tragi.	1026	414	
Gingidium Matth.	ibid.	Gomphena.	540	Gramen Manne prius Dodonei.	
Gith.	444 812	Gor.	1838	ibid.	
Githago.	438	Gospion, seu Gossipium.	221	Gramen Manne secundum Do-	
Gladulus. 120. Matthioli. ibid.		Gramen.	420	don.	
Gladus species a nostrate diuersi.				432. 433	
1625				Gramen nodosum.	
				429	
				Gramen, Oxyagrostis maritima.	
				1391	
				Gramen panniculosum Phalaridis,	
				Lobellij.	
				432. 433	
				Gramen Parnasi.	
				423	
				Gramen	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Gramen Parnass. Cerdi & Loniceri.	1260	Gummi ex Rhu.	109	Helianthe.	ibi.
Gramen polyanthes, Aegilops Plinij.	428	Gupa'u.	1875	Helianthemum siue flos solis, Hys.	
Gramen tertium Plinianum.	1128	Gymnocrithon.	398	Helianthemum nemorense, Dodo.	869
Gramen tomentosum, Alopecuros vera Plin. & Theophrasti.	430	Gynecanthe.	1411	Helianthis species, Penn.	ibid.
Gramen vulgare Matth. Dalech.				Helicon Arcades quid vocet.	174.
Lobell. Dod.	421	H			
Gramen vulgatum pratense.	422	Acacia arbor Indica.	151		275
Gramen sulcatum.	434	Haldadh Serapioni & A.		Helicallia.	868
Gramen Typhinum.	432. 433	uicenna, Lycium.	151	Helicorhysum.	775
Granadille.	1918	Hairi.	1844	Helicorhysosylvestris Tragi.	1344
Grana Iuniperi.	66	Hamaderon Theophrasti.	485	Helion.	169
Grana tinctorum officinis quid.	27	Halicacabum.	596. 598	Heliotropium.	1349
Grana Paradisi.	1810	Halicacabum peregrinum, seu fescaria repens Fuchsij.	598	Heliotropium alacrum Mat.	1350
Grana tinctorum duo genera Monachis in Mesuem.	29	Halicacabum peregrinum, siue fescaria repens Matth.	ibid.	Heliotropium maius, Matthioli.	ibid.
Grana tinctorum vires & facultates.	30	Halicacabus.	1719	Heliotropium minus, Matth. ibid.	
Gramum.	27	Halimaria.	295	Heliotropium humi sparsum Clu.	1352.
Gramum quid.	377	Halimus. 294. eius historia controuersa.	ibid.	Heliotropium tricoceum, Clusij.	ibid.
Gramum Cnidium non est Chamæle fractus.	1666	Halimus verus Dalechamp.	265	Helixine.	1241
Gramum Cnidium perperam vocata Laureolabacce.	213	Halimus vulgaris Matth.	552	Helixine Cissampelos.	1423
Gramum Nil.	1425	Halimæos. & 7. unde dicta.	7	Matth. 1424. Dod.	ibid.
Gramum regium.	1610	Haliphleas Sequanorum.	ibid.	Hemeris Idaorum.	4
Gramum tinctorum, aut flauum.	151	Halmages Oliua quæcunq;.	344	Hemerocallis.	1497
Gratia Dei.	416 869. 1085	Halmamelis quæ sic dicta.	158	Hemerocallis Constantinopolitana phanicea unico flore.	1500
Gratia Dei Germanic.	1279. 1281	Halmamelis Athenæi.	202	Hemerocallis Herbariorum.	1493.
Gratiola, Matthio.	1085	Haounay arbor.	1846		1494
Gratiola, recentiorum.	869	Haplofiles Marcello qui dicitur.	528	Hemerocallis prior & altera Matthio.	1498
Gossularia, alba. 131. rubra. 132. nigra.	133	Harar seu Iuniperus, maior & minor.	184	Hemerocallis Valentina.	179
Grossius.	335	Harmala.	972	Hemerote.	1286
Gruiua & Gruiualis.	1175	Harmala Syriaca.	1669	Hemionitis.	165. 1217
Gruiualis, Dod.	1278	Hastula regia.	1588	Hemionitis altera Dalecha.	1218
Guacatan Monardis.	1906	Hastula Regia, siue Asphodelus, Matthio.	1588	Hemionitis minor Penn.	118
Guaiacum Paraisinum.	350	Hastula.	1687	Hemionium.	1215
Guaiacana.	1836	Hatilig, Serapioni.	1687	Hepatica.	1083
Guanabanus.	1835	Hedera tria genera Theophr.	221.	Hepatica aquatica, siue palustris.	1021
Guanabani fructus, Quiedo. ibid.		Hedera arborea Matthi.	1418	Hepatica, siue Hepaticum Trifolium.	1274
Guayacum seu Gaicum.	1749	Hedera Cilissa.	1421	Hepatica polyanthes Lobelij. ibi.	
Guabara Copey.	1850	Hedera Dionysias Dalecha.	1420	Hepatorium, & unde dictum.	1251
Gulioea, Feslo culeolus, in Nucis quid.	321	Hedera Helix Matth.	1419	Heraclea.	1241
Gummi ex Acacia electio.	162	Hedera mollis.	1310. 1424	Heracleotica nux.	30
Gummi Arabicum officinis dictum.	ibid.	Hedera terrestris.	1310	Heracleon.	1009
Gummi dragagani.	1477	Hedera terrestris Malacocifos, Matth.	1311	Herba alba.	42
Gummi Elemni officinarum.	153	Hedypnois siue Cichorium luteum Dodon.	562	Herba alba Plinij.	ibid.
Gummi Iuniperinum.	68. 69	Hedypnois Dalec.	564	Herba S. Antonij.	971 & 1359.
Gummi mastiches similitum in Chondrilla ramulis.	566	Hedysarum.	444	Herba aurea Narbonensium.	741
Gummi mulum igni liquatur, nisi additis alijs, sed visur.	153	Hedysarum Dod. I.	445	Herba aurea Narbonensium.	1273
Gummi optimum ex spina Ægyptia.	160	Hedysarum alterum Dodone. ibi.	ibid.	Herba aurea, Pennæ & Lobel. ibid.	
Gummi ad podagram.	1793	Hedysarum Dodon. III.	ibid.	Herba S. Barbara.	650
		Hedysarum alterum, Clypeatum Lobell.	446	Herba Belladonna dicta forma.	1721
		Hedysarum maius, siue Securidaca, Matth.	444	Herba cancri, recentiorum.	1349
		Hedysarum minus Matth.	445	Herba casta.	855
		Hedysarum minimum.	446	Herba Christi, aut natalitia.	1619
		Helennium. 867. minus Dioscori.	868	Herba cinerea.	651
				Herba felis, & at.	908



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Herba fortis.	1270	Herba venti.	841.849	Hirci Barbula.	224
Herba Hungarica.	497	Herba venti, Parietaria Cordi, Si-		Hirci spina.	1477
Herba S. Iacobi.	575	deritis genus.	1120	Hirculus.	925
Herba impia Plinij.	1115. 1125.	Hermodyctylus officinarum.	1573	Hirundinaria.	1062
1387		Hermodyctylus Italorum.	1567	Hirundinaria Herbajorum.	1144
Herba Ioannis infantis.	1906	Hermodyctylus quorundam.		Hirundinaria maior.	1249
Herba Iudaica.	1118	1612.		Hirundinaria minor.	148
Herba lutea, qui & Flos tinctorius.	174. 501	Hermodyctylus verus Matthio.		Hircus sine luca America.	737
Herba Malucana.	1916	1573		Holcus Plinij	427. 428
Herba maritima.	833	Herniaria, siue Herba Turca.		Holochamus. 987. altera.	ibid.
Herba D. Marie.	678	1126		Holostium. 1188. Matthioli.	ibid.
Herba omnes marine ob falsuginem insitam non tam refrigerare, quam adstringere cogere videntur.	1373	Hesperis Theophrasti quorundam		quorundam.	ibi.
Herba mimosa.	1916	1360		Holostium Loniceri.	1189
Herba familiaris.	412	Hetic Americum.	1907	Holostium Ruellij.	422
Herba mirabilis.	540	Hibiscus Pastinaca.	721	Holostium Salmanticense, Clusij.	
Herba de Monteferrato.	1608	Hierobotane.	1334	1189	
Herba mora.	1339	Hierobotane mas, & femina, Do-		Hordeolum, Monardis.	1906
Herba mortem aut vitam in morbis prænuncians.	1921	donai.	1337	Hordeum.	398
Herba muralis.	1241	Hieracium.	569	Hordeum distichum, ibid. polistichum.	399
Herba in Cannarijs insulis, Oricelle dicta.	175	Hieracium macrocaulon Dalech.		Hordeum in cibus antiquissimum.	
Herba paralytis & arthetica.	833	570		401	
Herba Paridis.	1737	Hieracium magnum Dalecham.		Hordeum mundum.	ibid.
Herba Paris.	1312	569		Hordeum murinum.	416
Herba pedicularis & punitaria.	1629	Hieracium minus Dalechampij.		Horminum. 964. sylvestre Matt.	
Herba S. Petri.	1671	maius Matthio.	ibid.	& Fuschij.	595
Herba Phænicea.	416	Hieracium Matthioli, Dodonai.		Hyacinthus.	254. 256. 1505
Herba pudica, Herba aschinomene.	1878	561		Hyacinthus albicans seu femina.	
Herba pulicaris.	172	Hieracium Narbonense falcata si-		Fuschij.	1515
Herba Regine.	1895	liqua Lobellij.	570	Hyacinthus autumnalis, Dodon.	
Herba ad renem morbos utilis.	199	Hieracium Sabaudum Petri & Lobellij.	570	1513	
Herba Roberti.	1120	Hilum in faba quid.	452	Hyacinthus autumnalis maior, Ti-	
Herba Roberti, Geranij III. genus Matthio.	1278	Hippia.	1232	phyum Theoph.	1514
Herba ad rupturas utilis.	1919	Hippia herba à Plinio ex Theophrasto pro Hippace hoc est ca-		Hyacinthus brumalis, Orientalis	
Herba sacra.	1314	seo equino, inepte conficta. 250		Gemma ex Lobellio.	1508
Herba sacra, Agrippæ.	881	Hippophaes. Hippobastum.	1485.	Hyacinthus ceruleus maior, Fuschij.	1511
Herba sacra quorundam.	1335	1705		Hyacinthus ceruleus mas minor	
Herba sanguinalis.	1334	Hippophaes Dioscoridis.	1367	Fuschij.	1515
Herba sancta.	1895	Hippophaes Dod. ex codice Casareo.	1705	Hyacinthus comosus albus, Lobe.	
Herba scelerata, Apulei.	1027	Hippophaestum quorundam, Dalechampij.	1486	1412	
Herba scripta Anguillare.	1273	Hippoglossum Matthioli.	205	Hyacinthi comosi maioris gemina effigies, Lob.	ibid.
Herba stellaris.	870	Hippoglossum Valentinum Clusij.	1681	Hyacinthus comosus minor Bulbine Plinij.	1511
Herba Symeonis.	593	Hippolapathum.	600	Hyacinthus Dioscorid. non scriptus, Dodonæo.	1507
Herba terribilis Narbonensium.	1611. 1680	Hippolapathum hortense.	607	Hyacinthus Dodon.	ibid.
Herba Trinitatis.	800	Hippolapathum rotundifolium, Lobellij.	606	Hyacinthus latifolius, Dalecha.	
Herba Trinitatis. Matthioli.	1274	Hippolapathum sativum latifolium, Lobellij.	ibid.	1516	
Herba Trinitatis, quorundam.	1095	Hippolapathum sylvestre Matth. ibid.		Hyacinthus Liliaceus Lob.	155
Herba Turca.	1126	Hippolapathorum vires & temperamenta.	907	Hyacinthus maior, Bulbus sylvestris.	1512
Herba vicia, Acoffa	1915	Hippomarathrum.	688. 690	Hyacinthus Orientalis Græcus, Lobellij.	1507
		Hippocelinum.	700. 706	Hyacinthus Orientalis maior polyanthes, Lobel.	1508
		Hippocelinum Matth. siue Leusticum vulgare.	703	Hyacinthus Orientalis I. Matt.	ibid.
		Hippuris.	1069	1509. II. eiusd.	
				Hyacinthus Ovidij.	1494
				Hyacinthus poetarum latifolius, Lob.	

Herba Rena apud  
Cesal. & singularem



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Lob.	1614.1615	Et Lobel.	936	Idea vitis.	191
Hyacinthus poetarū Hispanicus, Lobell.	1615	Hyssopus montana, Fuchsj.	934.	Iesceminum.	1430
Hyacinthus poeticus Hispanicus, Lob.	1580	Arabum flore rubro, Lobellj.	ibid.	Ilex Gallia Narbonensi & Provincia frequentissima.	21
Hyacinthus poeticus Pene & Lob.	1510	Hyssopus nemorensis. 869.1100	Hyssopus nemorensis & lutea.	Ilex maximè atatem fert ibid.	
Hyacinthus stellaris albicans Lobell.	1514	Hyssopus nemorensis quorundam.	1364	Ilex omnium sylvestrium profundissimas radices habet. ibid.	
Hyacinthus stellaris alius Lilifolius.	ibid.	Hyssopus sativus vulgaris. 931.	Hyssopus vulgaris ex codice Casareo.	Ilex vocatur huber semina.	23
Hydrolapathum.	600	ibid.	Hynourabe.	Ilex aquifolia.	27
Hydrolapathum maius Lobellj.	604			Illecebra.	1128.1130
Hydrolapathum minus Lobellj.	605	I		Imperatoria.	726
Hydropiper.	1038	I Ace in Persico mari vocatur Corallium.	1371	Imperatoria Matthioli.	727
Hydropiper Lanceolatum. ibid.		Iacea, Acoflea.	1898	Imperatrix.	758
Hydropiper, Matth. ibid. alterū, Dalechampi.	1039	Iacea 192. montana Dalechampi.	ibid. alba eiusdem. ibid. maior Lobellj.	Impia Plinij.	1125.1387
Ibid. aliud, Dalech.	1040	Iacea humilis, Hieracij folio, Pene.	1193	Ignave.	1909
Hyphear. & Arcadum.	17	Iacea incana, Dalech.	1194	Inguinalis.	859
Hypecaum.	1081.1715	Iacea incana folio Olea Lobellj.	1193	Intubus & Intubum.	554
Hypecaum Matth. 441. eiusdem non sine errore.	595	Iacea lutea Clusij.	1474	Intubum crispum.	557
Hypericum. 1153. Matthi. ibid.		Iacea maior lutea, Pene.	1193	Intubum sativum angustifolium Dodo.	556
Hypericum humi stratum, Clusij.	1154	Iacea montanea Narbonensis Lobellj.	1193	Intubum sativum angustifolium Matth.	ibid.
Hypericum Syriacum & Alexandrinum Lobellj. 1155.		Iacea nigra, Dodon.	1098	Intubum sativum latifolium. ibid.	
Hypericum tomentosum, Lobellj.	1154	Iacea rubra maior laciniosa. ibid.		Intubum sylvestre angustifolium Matthioli.	557
Hypnus.	1323	Iacobea, sine Senetio maior.	574. 575	Intubum sylvestre latifolium, Chorium sativum Matthioli, e ris sativa Lobellj.	ibid.
Hypocheris.	563	Iacobea marina Dodonai.	1384	Inturis Gazae.	155
Hypocistis. 223. unde dicitur. 224. eius genera ibid. Fungus non est ut quidam volunt ibid.		Iacobea mariima, Pene.	1483	Inula, & Inula Campana.	867
Hypocistis vulgaris adulterina est 224. Hypocistis irides.	206. 207	Iagra.	1762	Iouis Barba.	194.1128
Hypoglossum.	208	Iambolins.	1873	Iouis flos.	1408
Hypoglossa.	ibid.	Iambos Acoflea.	1872	Iouis glandes.	30
Hypoglossidion.	99	Iangomas. 1874. Iasion Plinij.	1426	Iophyrum Theophr.	806
Hypomeides.	1716	Iasme montana.	1204	Iringus officinarum.	1458
Hyoecyamus.	1716	Iasminum album Matthioli.	1430	Irio. 652. Matth.	653
Hyoecyamus peregrinus, Dalecha.	1718	Iasminum luteum.	1187	Irio altera Matthioli.	ibid.
Hyoecyamus, Mat.	1716	Iasminum puniceum Dalecham.	1431	Irio Plinij.	383
Hyoecyamus albus, Matthioli.	1717	Iasminum rubrum Dalechampi.	1432.1433	Iris.	254.1609
Hyoecyamus niger Matthioli luteus, Dodo.	ibid.	Iberis.	665	Iris & Ireos vulgaris Herbariorū distinctio inepta.	1611
Hyoecyamus III. Matthioli.	1718	Iberis, Fuchsf. & Dod. Nasturtium sylvestre.	655	Iris agrestis.	1570
Hyoecyamus Peruvianus.	628	Iberis, sine Lepidium Matthioli.	666	Iris angustifolia flore luteo, Clusij.	1615
Hyoeris Plinij.	1067	Ibiga.	1159	Iris biflora, Clusij & Dodonai.	162. 613
Hyssopus & Hyssopum vulgare.	933	Ibiscus.	589.591	Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clusij & Dodon.	1615
Hyssopus folio Origani, Dalecha.	933	Idea Ficus nostra, vulgo Frangula.	200	Iris bulbosa latifolia l. Clusij.	1613.
Hyssopus gemina Græcorum, Pene.		Idea radix.	192	Iris Palmatica maior.	ibid.
				Iris domestica Matthioli.	1610
				Iris flore ceruleo polyambes, Lobellj.	1613. 614
				Iris lutea variata.	1616
				Iris perpusilla & saxatilis.	1611



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Iris sylvestris</i> , Matthioli.	ibid.	<i>melco albus</i> , Mastichem fe-	<i>Lampfana</i> Dodon.	ibi
<i>Iris sylvestris altera</i> , Matthio.		rens,	<i>Lampfana</i> Matth.	ibid.
	ibid.		<i>Lampfana vera</i> , falso Theophr.	
<i>Iris tuberosa</i> .	1573	K	<i>sti Erysimum</i> Dodonai.	542
<i>Iris tuberosa</i> , Dod.	1612. 163		<i>Lana pratenfis</i> .	1116
<i>Isatis</i> .	499	<i>K</i> Alii 1377. magnū, Pene. ibi.	<i>Lana pratenfis</i> , Herbariorum.	
<i>Isatis sativa</i> .	ibid.	<i>masus</i> , eiusd.		1026
<i>Isatis sylvestris</i> Matthioli.	ibid.	<i>Kali Dalecha</i> .	<i>Lanaria</i> .	1298
<i>Isatis sylvestris</i> Lob. Vaccaria palli		<i>Kali geniculatum</i> Pena.	<i>Lanaria</i> , quorundam.	820
<i>da</i> .	500	<i>Kermes Arabum</i> .	<i>Lanaria herba</i> , Gazae.	822
<i>Isca in Quercu &amp; Nuce arbore</i>			<i>Lancea Ch isti</i> .	1047
<i>quid</i> .	324	L	<i>Lanceolata officinarum</i> , <i>Lanceola</i>	
<i>Ischemon</i> .	414	<i>Laburnum</i> .	<i>vulgi</i> .	1254
<i>Ischas</i> .	1595	<i>Laburnum alterum</i> .	<i>Lapathium acutum</i> Officinarum.	
<i>Ischias</i> .	1463	<i>Labrum veneris</i> . 1447. Matthi.		602
<i>Isidis plocamos</i> .	1371	<i>ibid</i> .	<i>Lapathi sylvestris secundum ge-</i>	
<i>Isoteles</i> .	1128	<i>Labrusca</i> .	<i>nus</i> .	602
<i>Isoi</i> , vel ut alij, Oefos. 131. 132.		<i>Lac Pinipinichi</i> .	<i>Lapathi sylvestris tertium genus</i> .	
	133		<i>ibid</i> & 603	
<i>Isoptum</i> , Dodon. 1920. Matthio.		<i>Lacca</i> .	<i>Lapathi sylvestris quartum genus</i>	
<i>ibid</i>		<i>Lacca cum suis bacillis</i> .	<i>Da'ech</i> .	603
<i>Iua arithetica</i> .	1159	<i>Lactaria herba</i> .	<i>Lapathum &amp; Lapathium</i> .	600
<i>Iua muscata</i> .	955	<i>Lactuca</i> . 545 eius genera.	<i>Lapathum sativum</i> .	601
<i>Iua moschata</i> Monspeliensium.	1148	<i>Lactuca crispa</i> Dod & Fuch.	<i>Lapathum sativum</i> Dioscoridi.	
<i>Iua moschata officinarum</i> .	159	<i>Lactuca crispa</i> Mat.		606
<i>Iucca</i> (sive <i>Huicra</i> America. 717		<i>Lactuca leporina</i> Apuleij.	<i>Lapathum sylvestre</i> .	600
<i>Iuglans &amp; Iuglandes</i> .	30. 320	<i>Lactuca marina</i> .	<i>Lapathus</i> , num Beta agrestis.	531
<i>Iuube officinar</i> .	356	<i>Lactuca marina</i> , & caprina. 1642	<i>Lapathorum vires &amp; temperamen-</i>	
<i>Iuncaria Sal'manticensis</i> , Clusij.			<i>ta</i> .	607
	1185	<i>Lactuca sativa</i> .	<i>Lappago</i> .	1485
<i>Iunci</i> .	983	<i>Lactuca sativa vires &amp; tempera-</i>	<i>Lappa Boaria</i> .	762
<i>Iuncus floridus</i> , Matth.	1019	<i>menta</i> .	<i>Lappa maior</i> , officinarum.	1054.
<i>Iuncus levis</i> 984. <i>levis &amp; oxy-</i>		<i>Lactuca sylvestris vera</i> Dalech.	<i>Matth</i> .	ibid.
<i>chanos</i> , Dodon. 1985. melan-			<i>Lappa minor</i> officin. <i>Lappa inner-</i>	
<i>cranis</i> ibid. <i>clauatus</i> , Dalech.		<i>Lactuca sylvestris facultates</i> .	<i>sa</i> .	1056
<i>986. latus</i> . 988. <i>floridus</i> Mat		<i>Lactuca sylvestris</i> Matth.	<i>Lappula rustica</i> , <i>Elatine</i> Tragi.	
<i>ibid</i> . 989. <i>asper</i> Dodo		<i>Lactuca sylvestris pumila</i> .		1240
<i>ibid</i> .		<i>Lactuca</i> .	<i>Lapfana</i> .	541
<i>Iuncus marinus</i> gramineus. 1397.		<i>Lacuturris</i> Brassica nostra.	<i>Laricem ignem non concipere</i> , fal	
	1396		<i>sum</i> .	56
<i>Iuncus odoratus</i> .	1884	<i>Lacryma</i> Iob seu Christi. 411. 178	<i>Larigna lacryma</i> .	54
<i>Iuncus odoratus</i> Matthioli.	1885	<i>Lada herba</i> in Cypro, ex qua <i>La-</i>	<i>Larix &amp; larex</i> .	55
<i>Iuncus quadratus</i> , Celsi, triangul-		<i>danum</i> .	<i>Larix ignota</i> Theophrasto.	43
<i>us &amp; angulosus</i> Plinij.	991	<i>Ladani loci natales</i> , electio, vires,	<i>Larix nusquam in Grecia nasci-</i>	
<i>Iuncum</i> partum Gracia non no-		<i>temperamenta</i> .	<i>tur</i> .	43
<i>uit</i> .	168	<i>Ladanum eiusque apud veteres</i>	<i>Larix unius tantum generis</i> est.	
<i>Iuniperus</i> eiusque genera. 38. 66.		<i>colligendi modi</i> . 227. <i>hodie in</i>		43
	67	<i>Creta</i> .	<i>Laser</i> , Silphij succus.	729. 732
<i>Iuniperi lacryma</i> , Vernix hodie.		<i>Ladanum segetum</i> .	<i>Laserpitium</i> .	727
	67.	<i>Ladum</i> .	<i>Laserpitium</i> Pena.	731
<i>Iuniperi locus</i> , tempus, vires.		<i>Lagopus</i> .	<i>Laserpitium</i> Pena.	678
	68. 69	<i>Lagopus altera angustifolia</i> .	<i>Lassulata</i> .	1657
<i>Iuniperinus</i> carbo accensus & suo			<i>Lathyrus</i> .	ibid.
<i>cinere obrutus</i> , igne integro an		<i>Lagopus maxima</i> .	<i>Lathyrus</i> Matthioli.	ibid.
<i>no fouet</i> .	69	<i>Lagopus vulgaris</i> Matthioli.	<i>Lathyrus minor</i> , Dalecha.	ibid.
<i>Iuonis Rosa</i> .	1491	<i>Fuchsj</i> .	<i>Lathyrus</i> .	470
<i>Iusquiamis</i> officinar.	1716	<i>Lale Chalcedonicum</i> .	<i>Lathyrus sativus angustifolius</i> .	
<i>Ixia</i> (alij <i>Ixone</i> ) <i>Chamaeleon</i> est al		<i>Lalifolia</i> Plinij.	<i>ibid</i> .	
<i>bus</i> .	1453	<i>Lama</i> , Mastich. species.	<i>Lathyrus sativus latifolius</i> , Cly-	
<i>Ixiis</i> .	1452. 1457. 1458	<i>Laminum</i> . 1246. Fuchsj.	<i>menum</i> Mart.	470
<i>Ixine</i> planta spinosa, qui & Cha-		<i>Lampfana</i> .	<i>Lathyrus sylvestris</i> Dodonai. <i>Fr-</i>	
			<i>uum sativum</i> Fuchsj.	471

Lauandula



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Lauandula</i> , siue <i>lauendula</i> . 919	<i>Lepidium Matthioli</i> . 666	<i>Lignum semp ruium</i> . 150
<i>Lauandula</i> , siue <i>Lauendula</i> . 919	<i>Lepidium Pauli &amp; Plinij</i> . <i>ibid.</i>	<i>Ligusticum Matth.</i> 744
<i>femina</i> <i>ibid.</i> <i>mis.</i> 920. <i>multi-</i>	<i>Leporis cuminum</i> . 441	<i>Ligusticum alterum, Lob.</i> <i>ibi.</i>
<i>fido folio Clusij</i> . <i>ibid.</i>	<i>Leporis palatum</i> . 571	<i>Ligustrum</i> , magnaue super ea
<i>Lauandula vulgo vocata</i> . 1365	<i>Leucacantha</i> . 1463	<i>&amp; Cypro siue eadem sint, siue</i>
<i>Laur.</i> 1091	<i>Leucacantha Monspeliensum, Da-</i>	<i>diuersa contentiones.</i> 252
<i>Laurcola</i> <i>fumina</i> , <i>Chamedaph-</i>	<i>lecham.</i> 1465	<i>Ligustrum nigrū Columelle.</i> 1425
<i>ne multorum</i> . 211	<i>Leucacantha quorundam</i> . 1464	<i>Lilac Matth.</i> 355
<i>Laureola</i> , aut <i>Laurago</i> . 832	<i>Leucanthemis &amp; Leucanthemus.</i>	<i>Lilionarciscus luteus Bononiensis</i>
<i>Laureola officin.</i> & <i>Herbarior.</i>	968	<i>Lob.</i> 150
219	<i>Leucas Plinij</i> . 679	<i>Lilionarcissus pelyanthis, Lobell.</i>
<i>Lauri multa genera</i> . 205	<i>Leucena</i> 30	1584
<i>Laurocerasus</i> . 348	<i>Leucoron</i> . 1344	<i>Lilium Aegyptium</i> . 457
<i>Laurus</i> . 351	<i>Leucographis</i> . 1474. 1475	<i>Lilium album Matthioli</i> . 1492
<i>Laurus Alexandrina</i> . 208	<i>Leucophragis Plinij</i> . 1273	<i>Lilium Alexandrinum</i> . 1184
<i>Laurus diuinatrix arbor</i> . 353	<i>Leucoij multa genera</i> . 271	<i>Lilium conuallium</i> . 838
<i>de Lauru Traxinea Manardi</i>	<i>Leucoium</i> . 801. 1309	<i>Lilium conuallium</i> . 1574
<i>quid senticendum</i> . 205	<i>Leucoium album</i> 802. <i>album &amp;</i>	<i>Lilium cruentum bulbos gerens,</i>
<i>Laurus sylvestris</i> . 210	<i>purpureum Matth. ibid. aureū</i>	<i>Lob. 149. a iudicium eiusd.</i>
<i>Laurus Taxa</i> . 205	<i>eiusdem.</i> <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Laurus Tinus</i> . 203. 204	<i>Leucoium bulbosum</i> . 1526	<i>Lilium inter spinas</i> . 1427
<i>Ledi species Baurtrini</i> . 231	<i>Leucoium bulbosum minus anti-</i>	<i>Lilium non bulbosum Hemerocal-</i>
<i>Ledum</i> . 227	<i>nale Dodonæi, &amp; Clusij.</i> 1517	<i>lis Dodonæi.</i> 1499
<i>Legumina quid</i> . 407	<i>Leucoium marinum</i> . 1183	<i>Lilij vires &amp; temperam.</i> 1496
<i>Legumina vnde dista</i> . 449	<i>Leucoium maritimum Dalecha.</i>	<i>Lilium versicum, Lobel.</i> 1495
<i>Legumina omnia spiritum &amp; hu-</i>	1160	<i>Lilium polyrhizon Aconiti, Pha-</i>
<i>morem impurum ingenerant</i>	<i>Leucoium maritimum minus. Da-</i>	<i>langum quorundam.</i> 1496
<i>corporibus, atque hanc ob cau-</i>	<i>lecham.</i> <i>ibid.</i>	<i>Lilium purpureum maius, Dodo.</i>
<i>sam ad venere incitant.</i> 454	<i>Leucoium maritimum alterum la-</i>	1493
<i>Lemna, Theophr.</i> 1014	<i>visolium, Lobellij.</i> <i>ibi.</i>	<i>Lilium rubens quod Greci Crinō.</i>
<i>Lens &amp; Lenticula</i> . 475	<i>Leucoium Patavinum marinum,</i>	1492
<i>Lenticula marina Serapionis.</i>	<i>Lobel.</i> 651	<i>Lilium rubrum, non bulbosum.</i>
1196	<i>Leucoium puniceum, Fuchsj.</i> 803	1499
<i>Lenticula marina Serapionis, &amp;</i>	<i>Leuconarcissolirion.</i> 1527	<i>Lilium sylvestre.</i> 1493. 1498
<i>ua marina quorundam.</i> 1397	<i>Leusticum vulgare.</i> 703	<i>Limeum Plinij.</i> 1736
<i>Lenticula marina serratis folijs</i>	<i>Libadion.</i> 1286	<i>Limeum pardalianchis genus v-</i>
<i>ob.</i> 1397. 198	<i>Libanotis.</i> 763	<i>no tantum folio Tach.</i> 3738
<i>Lenticula palustris, Lenticularia</i>	<i>Libanotis II. Dodonæi. Dauci III.</i>	<i>Limeum alterū triplicifolio.</i> 1739
<i>scu i Eriocaula officin</i> 1014	<i>Fuchsj.</i> 765	<i>Limnæum &amp; Limnæum.</i> 1286
<i>Matth. ibi. palustris altera e-</i>	<i>Libanotis III. Dodon.</i> <i>ibid.</i>	<i>Limnites.</i> 1286
<i>iufdem.</i> 1015	<i>Libanotis siue Rosmarinum Mat-</i>	<i>Limones.</i> 1838
<i>Lentisci baccae edules futura con-</i>	<i>thio.</i> 764	<i>Limonia Malus.</i> 301
<i>diuntur.</i> 66	<i>Libanotis Theophr. maior, Ligu-</i>	<i>Limonium.</i> 1417
<i>Lentiscina dentiscalpia.</i> 65	<i>sticum II. Mat.</i> 766	<i>Limonium. 1024. Matth. alterum</i>
<i>Lentiscus.</i> 63	<i>Libanotis minima.</i> <i>ibi.</i>	<i>eiusd. ibid. Narbonense parvū</i>
<i>Lentiscus frequens in Italia Nar-</i>	<i>Lichen seu limus morbus arborū.</i>	1025 aliud. <i>ibid.</i>
<i>bonens provincia maritima.</i> 64	112	<i>Limonium succus.</i> 302
<i>Lentiscus Xylolaljami</i> 1133	<i>Lichen. III. Matthioli, 184. Lobe.</i>	<i>Limus &amp; Lichen morbus arborū.</i>
<i>vo officinis.</i> 63	<i>II. &amp; III.</i> <i>ibid.</i>	152
<i>Leo, Carduus serax.</i> 1489	<i>Lichen primus.</i> 1196	<i>Linaria.</i> 1150
<i>Leontre.</i> 1308	<i>Ligna lapidea.</i> 1398	<i>Linaria.</i> 1332
<i>Leontopetalon.</i> 1608	<i>Lignum aloes.</i> 1799	<i>Linaria aurea Tragi.</i> 1152
<i>Leontopodium.</i> 1281. 142	<i>Lignum aromaticum, lignum ad</i>	<i>Linaria caerulea i. ale. b.</i> 1151
<i>Leontopodium Leoniceri.</i> 1143	<i>nephridium.</i> 1788	<i>Linaria magna Belueder.</i> 1333
<i>Leontopodium in Matth.</i> 1343	<i>Lignum Colubrinum. 1911. I. &amp; II</i>	<i>Linaria minor Dalecha.</i> 1151
<i>Leontopodium paruum Lobellij.</i>	<i>Acoffe.</i> <i>ibid.</i>	<i>Linaria odorata Dodon.</i> <i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>	<i>Lignum Indicum. 1649 sanctum</i>	<i>Linaria rubra.</i> 866
<i>Lepidium.</i> 665	1750	<i>Linaria tenuifolia Dalech.</i> 1151
<i>Lepidium Aeginete, quorundam.</i>	<i>Lignum Atoluccense.</i> 1864	<i>Linaria i. alicina Clusij.</i> 1333
1198	<i>Lignum nobis Sequanorum.</i> 214	<i>Lingua batis, seu Lingua bu-</i>
<i>Lepidium annuum, L. b.</i> 1297	<i>Lignum sancte crucis.</i> 19	<i>buli.</i> 578 579
		<i>Lingua</i>



## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Lingua canis.</i>	1104.1261	<i>Lotus urbana Dodon.</i>	506	85
<i>Lingua cervina.</i>	1217	<i>Lotus Aegyptia ex codice Casareo.</i>	1076	<i>Lychnis marina.</i> 1332
<i>Lingua cervina officinarum.</i>	1218	<i>Lotus Aegyptia Theophrasti.</i>	1077	<i>Lychnis marina Anglica, Pene.</i>
<i>Lingua, Plumij.</i>	1037	<i>Lotus sylvestris ex codice Casareo.</i>	1076	1351
<i>champs.</i>	ibid			<i>Lychnis multiflora Anglica, Pe-</i>
<i>Lingua serpentina, vulgo dicta.</i>	1016.1047	<i>Lotus herba.</i>	506	816
		<i>Lotus asperior fruticosa Lobellij.</i>	510	<i>Lychnis sylvestris coronaria.</i> 418
<i>Linum.</i>	1491	<i>herba.</i>	510	<i>Lychnis sylvestris purpurea, Do-</i>
<i>Linum album officina.</i>	ibid.	<i>Lotus Enneaphyllos Dalechamp.</i>		donci. 816
<i>Linum portum Theophrasti.</i>	177	<i>herba ibid.</i>		<i>Lychnidis sylvestris species Aegy-</i>
<i>Linum purpureum recentiorum Lob.</i>	1152	<i>Lotus lasifolia Dalechampij her-</i>		ni. 816
<i>Linum ostia.</i>	1626	<i>ba.</i>	509	<i>Lychnis sylvestris L. lufij, &amp; Be-</i>
<i>Linum.</i>	493	<i>Lotus tibica Dalechamp herba.</i>	508 509	hen album Salamanicam ibi.
<i>Linum perpusillum, sine Cham-</i>		<i>Lotus praensis purpurea herba.</i>	509	<i>Papaver spumum quorundam.</i>
<i>linum.</i>	495			ibid.
<i>Linum pratense.</i>	1116	<i>Lotus sativa Matth herba.</i>	507	<i>Lychnis sylvestris III. Clusij, cau-</i>
<i>Linum rutenense Tragi.</i>	1016	<i>Lotus (herba) sativa altera Matr.</i>		luculis striatis. 88
<i>Linum sylvestre primum, Linum</i>		<i>Melilotus officinarum ibid.</i>		<i>Lychnis sylvestris III. Clusij.</i>
<i>maximum Pene.</i>	494	<i>Lotus sylvestris Matthioli herba</i>	ibid.	ibid.
<i>Linum sylvestre secundum, flore</i>	ibi.	<i>Lotus sylvestris altera Matthioli,</i>		<i>Lychnis sylvestris minima. VI.</i>
<i>albo.</i>	495	<i>herba ibid.</i>		Clusij 89
<i>Linum sylvestre tertium.</i>	495	<i>Lotus sylvestris minor Dodonci,</i>		<i>Lychnis sylvestris quorundam.</i>
<i>Liparea Theophrasti seu Colutea</i>		<i>herba.</i>	ibid.	1319
<i>vesicaria.</i>	214.215	<i>Luccia.</i>	1047	<i>Lychnitis.</i> 1298
<i>Liquidambar eius oleum.</i>	792	<i>Luch Aucenne.</i>	178	<i>Lycotenum ceruleum flore Del-</i>
<i>Liquaria clypeatorum.</i>	247	<i>Lunaria sive Lunaria Graeca quo-</i>		phij Dodonci. 1742
<i>Liriodendylus phaeceus, Lobel.</i>	1192	<i>rundam.</i>	805	<i>Lycotenum ceruleum parvum.</i>
<i>Lirium maius, aut Lirium verum.</i>		<i>Lunaria Italica.</i>	1214	Dodon 1741
<i>Dod.</i>	1815	<i>Lunaria lutea Dalechampij ibid.</i>		<i>Lycopodium Galeni.</i> 628
<i>Lithospermum 1176. maius Mat.</i>		<i>Lunaria maior himistarium 125</i>		<i>Lycopodium Dodonci.</i> 1325
<i>ib. minus eiusd.</i>	ibid.	<i>Lunaria minor.</i>	1142	<i>Lycopis.</i> 1104
<i>Lith. stemum anchuza facie,</i>		<i>Lunaria minor.</i>	132	<i>Lycopis Anglica Lobellij.</i> 1263
<i>Lobel g.</i>	1178	<i>Lunaria alia minor cerulea, Da-</i>		<i>Lycopis angustata.</i> 579
<i>Lithospermum Arundinaceum,</i>		<i>lechamp.</i>	1314	<i>Lycopis Loniceri.</i> 1104
<i>Dalech.</i>	ibi.	<i>Lunaria quorundam.</i>	1735	<i>Lycos filiculis.</i> 1058
<i>Lithospermum maius Dodo.</i>	1177	<i>Lunaria filiquata.</i>	493	<i>Lysimachia.</i> 1058
<i>Lithospermum Faby, min. Dod.</i>		<i>Luparia, 1596.</i>	1633.1742	<i>Lysimachia, Matth 1058 altera</i>
<i>ibid.</i>		<i>Lupinus.</i>	456	ibid. pu parca l. Dodon.
<i>Lithospermum nigrum Dalecha.</i>		<i>Lupulus.</i>	144	<i>Lysimachia cerulea.</i> 1060
<i>ibid.</i>		<i>Lupulus repetitus.</i>	ibid.	<i>Lysimachia filiquata alia, Leb ibi.</i>
<i>Lithum.</i>	416	<i>Lupus salictarius.</i>	ibid.	galericulata, eiusdem. ibid.
<i>Lithum frugum morbus potius,</i>		<i>Lupinus sativus Matth.</i>	466	
<i>quam potius.</i>	417	<i>Lupinus sylvestris L edoi ibid.</i>		
<i>Lithum sylvestre.</i>	416	<i>Lut ola.</i>	501	
<i>Lomentum subaceum.</i>	456	<i>Lycium quod spumosa, apifsi-</i>		
<i>Lon-bitis.</i>	1185.1120	<i>mi in medicina.</i>	109	
<i>Lonchitis aspera Dodon.</i>	217.1121	<i>Lycium, alpinum, italicum, His-</i>		
<i>Lonchitis aspera ruensis Dalech.</i>		<i>panicum.</i>	1481.9	
		<i>Lycium quomodo adulteratur.</i>		
		<i>149 adulterinum a legitimo</i>		
		<i>quibus notis dignoscatur.</i>		
		<i>Lycium officinarum, adulterinum. ibi.</i>		
		<i>Lycij in medicam vires. ibid.</i>		
		<i>Lycium Dalechamp.</i>	151	
		<i>Lychnis.</i>	814	
		<i>Lychnis coronaria, Matthioli.</i>		



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Malinathalla.	1730	Manga Amba.	1835	Medica sylvestris prior, fructu tri-
Malum.	402	Mangas.	1870	plici & diverso. ibi.
Malua.	584	Manibot.	1908	Medica sylvestris altera lunata.
Malua arbor.	586	Manna Thuris.	1753.1755	503
Malua maior I. Matthioli.	585	Manzianion.	457	Medica sylvestris altera, lunata,
Malua maior II. Matthioli. ibid.		Maraka & Tamaraka.	1845	1214
Malua maior III. Matthioli. ibid.		Margarides.	364	Medium Dioscoridis.
586.		Mariscus iuncus.	988	825
Malua hortensis.	ibid.	Marmoraria.	1443	Mehenbe bene.
Malua palustris.	590	Maronion.	1286	1768
Malua Rajca simpliciore flore, Lo-		Marrubiastrum.	1252	Mebeceengi Auicennae.
belly.	587	Marrubium 960. album. 961. Cre-		1652
Malua Rosca multiplex, Lobellij.		ticum. Pene.	962	Mel Corsicum insuavequamo-bre.
588		Marrubium aquaticum. 1064.		166
Malua sativa laciniosa Cord.	585	1065		Mel frugum.
Malua sylvestris maior.	587	Marrubium Hispanicum odore		411
Malua sylvestris pumila repens.		Stoechadis, Lobel. j.	684	Mel Ponticum venenatum.
586. 587		Marrubium nigrum officinarum.		256
Malua sylvestris à Theophrasto		1252		Mel succus ex flore Lilij.
catur qua Althea suo nomine		Marrubium palustre, siue aquati-		1496
dicatur.	590	cum.	1119	Melampyrum.
Malua vulgaris, Matth.	585	Martagon, Matth.	1493	1136
Maluausculus.	590	Marum.	883	Melaprum perpusillam luteum.
Malucana, Acofse.	1917	Marum, quorundam.	885	420
Malus.	285	Marum Cyriacum, Lobellij. ibid.		Melampyrum Theophrasti.
Malorum genera prope infinita.		Marum verum, vulgo Mastice.		1178
285		ibid.		Melampyrum siue Triticum vac-
Malus Armenia.	297	Mastetum.	727	cinum.
Malus canina, aut terristris.	1725	Mastaris vna.	1405. 1047	419
Malus Citria seu Citrea.		Mastiche.	62	Melandryon Plinij.
Malus Cydonia, vel Cotonea.	290	Mastiche Acanthice.	64	1186
Malus Imonia.	301	Mastichos Chia pretium.	ibid.	Mcandryon Plinij, quorundam.
Malus Medica & Assyria.	298	Mastiche non solum Chia (quan-		1080
Malus Persica.	293	qua caprasiissima) verum		Melanium montanum.
Malus Punica. 301. eius genera		etiam Italica, atque adeo Aegyp-		1204
controversa. ibid. locus & vi-		tia, Indica, Arabica, Ponti. ibi.		812
res.	304	Mastiche quibus, ubi optima. &		Melanthemon.
Malum.	285	quomodo conficiatur.	63. 64	968
Mala Aethiopica.	1730	Mastiche nunquam liquida est.		812
Malum aureum quod & quare		sed semper in ipsa arbore spis-		Melanthium.
dictum.	299	satur.	69	812
Malus Epirotica, Latine orbicula.		Mastiches adulteratio.	64	Melanthium sativum, Matthioli.
289		Mastiche personata quare dicatur		812
Malus Indica, Acofse.	1873	Marcello Empirice.	65	Melanthium sylvestre.
Malum granatum.	303	Mastiches faciliates.	ibid.	458
Malum Hesperidum.	299	Mastierum.	727	Melanthium sylvestre prius, Mat-
Malapricipatum in Hetruria ob-		Mastos Plinij.	1065	thioli.
tinencia.	288	Mater Figularum, Dalech.	799	812
Malum Medicum & Persic.	298	Matricaria.	953. 1147	Melanthium sylvestre prius, Mat-
Malorum temperameta & quis		Matricaria, Parthenium Matth.		thio, secund. edition.
eorum usus.	288	954		813
Mambroni ini, radix apud Ca-		Mastisalia.	965	Melanthium sylvestre alterum,
rimos.	1702	Matrisalia, Herbariorum.	916	Matth.
Mambu, siue Arbor Tabaxir.		Matrisylua.	1427	ibid.
1863		Mechinum, Pene.	1892	Melcagris flos, Dodon.
Manei 1836. eius folium. ibid.		Mechioacan. 1901. Pene. 1902. Do-		1530
Mandrageras.	1725	don.	ibid.	1841
Mandrageras mas & semina.		Meconis lactuca.	545. 549	Melica.
1725		Meconium.	17. 11	410. 421
Mandrageras mas Theophrasti.		Medica.	502	Melilotus.
626		Medica sativa Dodon.	ibid.	511. Melilotus corona-
				ta Pene & Lob. 508. Melilotus
				Germanica Fuchsj.
				508
				Melilotus sine Sertula Campana.
				511
				Melilotus vulgaris, siue Trifolium
				odoratum Dod.
				ibid.
				Melilotus officinarum 507. 508
				Melimela unde dicta.
				287
				Melinum oleum.
				291. 292. 293
				Melissa Moldauica, Matthioli.
				960
				Melissa officinarum.
				957
				Melissa Turcica alia Dalech.
				960
				Melissophyllum.
				957. Matthioli
				ibid. Fuchsj. & Dodon.
				958
				Melissophyllum Constantinopoli-
				tanum Matth.
				959
				Melocardus echinatus, Pene.
				144. 144. 144.
				1837
				Melo Corcepa.
				Melones



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Melones.	622	Milium ad omnia Panico præstan	Moschatella pratensis.	1196
Melongenæ.	626.627	tius.	Mula.	1115
Melopepones.	622.623	Milium Solisvel Soler potius,	Multiradix.	1286
Memacylon.	196	1176	Mungo.	397
Menyanthes.	503	Millefolium.	Mugo similis fructus, Buna.	1794
Menianthes palustre, Theophrasti.	1019. & 1020. Dalecham. cum	Millegrana Cordi.	Muralium.	953
flore.	ibid.	Millemorbia.	Murex.	1435
Mentha.	671	Mirrhis vel Mirrhix.	Musa arbor.	1838
Mentha aquatica, siue Sifymbria,	809	Miscipula, siue Armeria altera.	Musa cum fructu.	1839
Lobellij.	676		Musa Pacouera Theueri.	1840
Mentha catti.	908	Mogli.	Muscaria plantæ, Penæ.	683.684
Mētha cattaria angustifolia, eius		Molle arbor.	Muscipula altera flore muscofo.	
dem.	909	Mollis Hedera.	Penæ.	684
Mentha cattaria peregrina latifolia, Lobellij.	ibid.	Mollugo.	Muscus.	1123
Mentha Græca.	672.678	Mollugo, Galium album quorundam.	Muscus arboreus.	ibid.
Mentha Romana siue crispa.	677	ibid.	Muscus clauatus Lobellij.	1324
Mentha Sarracenicæ species altera		Mollugo vulgarior, Herbariorum.	Muscus marinus.	1367
Myconi.	672	Molluscana.	Muscus marinus siue Corallina,	
Mentha sativa crispa Dod. prima	671	Molluscum.	Dodonæi.	1168
Mentha sativa quarta Dod.	673	Molochæ agria.	Muscus marinus Pliny, Matthio.	1368
Mentha sativa Matth. prima, Dodon. tertia.	671	Molochi, id est, Halimus.	Muscus marinus vulgarissimus.	
Mentha sativa altera Matth. 672		Molochia.	Muscus marinus candidus	
Mentha vires.	674	Molochia Serapionis quorundam.	Coralloides	1368
Menthastrum.	671	566	Muscus scoparius, Lob.	1366
Menthastrum niueum Anglicum		Molucca spinosa, Dodonæi.	Musci terrestris genus.	1364
Penæ & Lobellij.	674	Molucca siue Melissa Turcica, Dalech. ibid. alia eiusd.	Musci terrestris genus descriptum a Trago, nomine Sabina siluestris.	1200
Menthastrum Campense & Zauo		Moly.	Muscus terrestris Tragi.	1323
lense, Lobellij.	673	Moly indicum, Dodonæi.	Muscus terrestris 11. & 111. 1324	
Menthastrum minus spicatum, Lobellij.	674	Moly Liliflorum, Lob.	Muscus alius terrestris, Lycopodium Dodonæi.	1325
Menthastrum vulgare Matthio.	673	Moly Matt.	Muscus terrestris denticulatus Lobellij.	ibid.
Mercurialis.	1626	Moly folijs Narcissi, Lobellij. ibid.	Muscus terrestris denticulatus alter, Muscus terrestris repens	1326
Mercurialis mas Matth. 1627.		Moly serpentinum, Lobellij.	Clusij.	1326
famina, eiusd.	ibid.	Moly Theophrasti & Plinij.	Myacanthos.	1473
Mercurialis siluestris mas.	1628	1594	Myacanthos Theophrasti.	1473
Mercurialis vrraque.	1195	Moly Tragi perperam.		1474
Mespil. species secunda, siue Epimelis.	198	Molibdena, Plinij.	Myagræ.	419.106
Mesphilus & eius genera.	332	Molibdena Plinij, quorundam.	Myagræ aliud Thlaspi effig.	
Mesphilus Anthemois.	135.136	1198	Lob.	1117
Mesphilus Anthemois.	198	Momordica.	Myagræ alterum minus Dalech.	ibid.
Mesphilus Aronia.	135.136	629.1277	Myagræ Dioscor.	1178
Mesphilus Aronia.	333	Momordica nostra.	Myagræ Dodonæi.	1166
Mesphilus Setaria.	334	617	Myofotis.	1232.1233
Meteorana Carianæ.	31	Montium, ipentola.	Myofotis parua Dalech.	138
Meum.	758	80	Myofotis Tragi.	565
Meum Matthioli. 759. alterum spurium Italicum. ibi. aliud ibid.		Moringa, 1865. Acosta.	Myrobalani.	1687.1688
Mex vel mes.	1794	1866	Myrobalanos.	1684
Mezerion vulgare.	210.212	Morian.	Myrice seu Myrica.	179.185
Milaci vulgo Græcorum.	24	627.1725.1727	Myrica pro Galia omphacitide substitui potest.	181
Miliaria Oleæ.	343	Moriscos.	Myrice humiles quare Virgilio dicantur.	179
Militaris millefolia.	763	Morsus diaboli.	Myrica radices pro odorata Cassia venundata magna impetura.	182
Milium.	408	Morsus diaboli genus.		
Milium Indicum.	581	Morsus diaboli, vulgi.		
Milium Indicum, siue Melica.	410	Morsus gallina.		
		1232.1236.1239		
		Morsus Ranae Herbariorum. 1010		
		Morus. 325. sapientissima arborum dicta.		
		326		
		Mora.		
		120		
		Morus Aegyptia.		
		240		
		Mori loci natales, tempus, vires & temperam.		
		326.327.328		
		Mori succus.		
		327.318		
		Mora terrestria.		
		613		
		Moschatella cerulea.		
		1184		

Myriophyllum



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Myriophyllum prius &amp; alterum</i>	<i>Napus siluestris.</i>	541	<i>Nasturtium orientale Serapionis.</i>	
<i>Matthio.</i>	<i>Napus siluestris Dodonai.</i>	645		663
<i>Myrrha.</i>	<i>Napy Perficum.</i>	661	<i>Nasturtium peregrinum seu Peru-</i>	
<i>Myrrha aut Bdellium suo furculo</i>	<i>Narcissus.</i>	1492. 1516	<i>nianum, Mycony.</i>	656
<i>spinoso harenis, Pene.</i>	<i>Narcissus totus albus Dodonai.</i>		<i>Nasturtium siluestre Dalechamp.</i>	
<i>Myrrha teinaa vel Aminea.</i>		1519		655
1791	<i>Narcissus autumnalis minor, Do-</i>		<i>Nasturtium siluestre Valentinum</i>	
<i>Myrrhis.</i>	<i>don &amp; Clusij.</i>	1512	<i>Clusij.</i>	657
<i>Myrrhis Fuchsj 761. altera parua</i>	<i>Narcissus autumnalis quorundā</i>		<i>Nasturtium testorum.</i>	660
<i>Lobell ibid. Lappa Dalecham.</i>	<i>ex Clusio.</i>	ibid.	<i>Natrix Plinij Herbariorum.</i>	449
<i>ibid.</i>	<i>Narcissus Constantinop. I. Matt.</i>		<i>Nautea.</i>	105
<i>Myrra &amp; Murta.</i>		1523	<i>Nauségi, id est, Rhannus.</i>	295
<i>Myrtatum.</i>	<i>Narcissus II. &amp; III. Constantino</i>		<i>Naxia Amigdala veteribus Græ-</i>	
<i>Myrtidanum Piper aplerisque</i>	<i>politanus. III. F. VI. VII. VIII</i>		<i>cis commendata.</i>	316
<i>pellatur.</i>	<i>Matthi.</i>	1524. 1525	<i>Negundo. 866 mas. Acofta. ibid.</i>	
<i>Myrtidanum vinum.</i>	<i>Narcissus flore multiplici, Clusij.</i>		<i>femina eiusd ibid. &amp;</i>	1867
<i>Myrtilli.</i>		1520	<i>Nenufar officinarum.</i>	1008
<i>Myrtillus Germanica.</i>	<i>Narcissus Matth.</i>	1526	<i>Nepa Gaza, Scorpius Theopha-</i>	
<i>Myrtamelis Cordi.</i>	<i>Narcissus III. Matth.</i>	1583	<i>sti, planta.</i>	163
<i>Myrtus.</i>	<i>Narcissus luncifolius prior, Clusij</i>		<i>Nepeta III. Tragi. Calamintha</i>	
<i>Myrtus seu Murtus.</i>		1521	<i>Mentha tri folio, Pene.</i>	907
<i>Myrtus Betica latifolia dome-</i>	<i>Narcissus luncifolius, Dodonai.</i>		<i>Nery facie arbor, Pene.</i>	1831
<i>stica fecunda, Clusij.</i>		1510	<i>Nery filique.</i>	194
<i>Myrtus Betica siluestris, Clusij.</i>	<i>Narcissus luncifolius flore rotun-</i>		<i>Neris.</i>	244
	<i>do Rosæ Lob.</i>	1522	<i>Nerium siue Rhododendrum.</i>	
239	<i>Narcissus luteus multiplex Dod.</i>			244
<i>Myrtus Brabantica.</i>		1523	<i>Nerium Alpinum.</i>	270
<i>Myrtus exotica.</i>	<i>Narcissus luteus siluestris Dodon.</i>		<i>Nerium aliud flore albo, Lobellij</i>	
<i>ex Myrti floribus destillatur aqua</i>	<i>ibid.</i>		<i>&amp; Pene.</i>	246
<i>odoratissima.</i>	<i>Narcissus medioluteus Do. 1518.</i>		<i>Neslion.</i>	1286
<i>Myrtus minima angustifolia.</i>	<i>alter eiusdem.</i>	ibid.	<i>Neuras.</i>	1487
<i>Myrtus præter baccas Myrtidanū</i>	<i>Narcissus medio purpureus Do-</i>		<i>Nicolij. Nicolai.</i>	364
<i>producit.</i>	<i>don.</i>	1517	<i>Nicotiana.</i>	1895
<i>Myrti in alijs præterquam in</i>	<i>Narcissus montanus luncifolius</i>		<i>Nicotiana siue Tabacum.</i>	ibid.
<i>re medica vsus.</i>	<i>minimus, Lob.</i>	1521. 1522	<i>Nidus auis.</i>	1073
<i>Myrtus succorum natura præci-</i>	<i>Narcissus purpureus Plinij &amp; Vir-</i>		<i>Nigella.</i>	812
<i>pue admiranda.</i>	<i>giliy.</i>	1570	<i>Nigella Citrina, flore albo multi-</i>	
<i>Myrtus siluestris.</i>	<i>Nardus siue Nardum &amp; Nardi-</i>		<i>plici.</i>	ibid.
<i>Myrtus siluestris duplex.</i>	<i>spica.</i>	920	<i>Nigella foliosa.</i>	438
<i>Myrtus Tarentina.</i>	<i>Nardus Celtica. 923. Matthioli.</i>		<i>Nigella strum.</i>	ibid.
<i>Myrtus Tarentina.</i>	<i>924. altera, Pene.</i>	ibid.	<i>Nimbo. 867. Acofta.</i>	ibid.
<i>Myos.</i>	<i>Nardus Italica.</i>	919	<i>Nolime tangere, Herbariorum.</i>	
<i>Myxæ, Myxa, Myxaria.</i>	<i>Nardus montana. 926. Matthioli.</i>			1205
<i>Myxos arbor siue Sebestena no-</i>	<i>ibid.</i>		<i>Nuces Castaneaica.</i>	30
<i>stra.</i>	<i>Nardus spuria Narbonensis, Pe-</i>	922	<i>Nuces Cupressi.</i>	57
	<i>na.</i>	922	<i>Nuces Græcæ.</i>	316
N	<i>Nardus siluestris.</i>	927	<i>Nuce Pineæ Conus &amp; Strobilus</i>	
<i>N Achanis semen apud Indos.</i>	<i>Narthecium Theophrasti, Ferula</i>		<i>usurpatur.</i>	52
151	<i>go Gaza.</i>	754	<i>Nuces regie.</i>	30
<i>Nana. 1840. fructus, Vayama.</i>	<i>Nasturtium.</i>	654	<i>Nuces Tarentine.</i>	48
1841	<i>Nasturtium album Arabum.</i>	636	<i>Nucis inglandis temperamenta</i>	
<i>Napellus. 1745. Dodonai. ibid.</i>	<i>Nasturtium album Arabum.</i>	663	<i>&amp; vires in re medica, vsusque</i>	
<i>Napellus luteus, officinarum.</i>	<i>Nasturtium aquaticum officina-</i>		<i>in cibis varius. 322. 313. 324.</i>	
1742	<i>rum.</i>	658		325
<i>Napellus prior Matt.</i>	<i>Nasturtium aquaticum Tragi &amp;</i>		<i>Nucis nomine per multa fructuū</i>	
<i>Napellus racemosus, Dodo. 1747</i>	<i>Herbariorum.</i>	1094	<i>genera comprehenduntur. 320</i>	
<i>Napus.</i>	<i>Nasturtium Babylonicum.</i>	663	<i>Nucifolium.</i>	1758
<i>Napi Amitermini in magna lau-</i>	<i>Nasturtium hortenfe.</i>	655	<i>Nucipersica.</i>	294. 295. 358
<i>de.</i>	<i>Nasturtium Indicum Dodonai.</i>		<i>Nucipruna.</i>	313
<i>Napi.</i>		657	<i>Nuclei pinei caltharici.</i>	1789
<i>Napus sativus.</i>	<i>Nasturtium maritimum.</i>	1393	<i>Nucleus glandis &amp; chalybis Plinij</i>	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

nio quid.	16	Ocimum paruum.	680.681	Oleum Iuncinum.	990
Nucum inglandium & vinearū		Ocofol, arbor Americana.	1792	Oleum de Keyri, id est, ex floribus	
par fere prouentus.	312	Oculus.	1128	lutei Laucoy.	804
Nucum Pinearum vis.	51.53	Oculus bonis.	862	Oleum Laurinum.	353
Nummularia.	1062	Oculus Christi.	1349	Oleum lentissimum.	65
Nummularia an sit Elatine.	1239	Oculus Christi minor Herbariorū		Oleum ex Ligustri floribus.	255
Nursine pile.	645	1134. & 1135.		Oleum de Lilio.	1496. 1497
Nux Auellana.	30	Odonti's lutea.	1068	Oleum de Lini semine.	496
Nux Auellana, eadem quatenus		Oenanthe.	782. 1406	Oleum ex Liquidambar.	1792
sine parua Prænestina, Heracle		Oenanthe aquatica, Lobellij	1093	Oleum ex Malabathro.	1777
otica.	319	Oenanthe f. Malbio. 782. 11. 111.		Oleum ex nucleis Mali Persice.	
Nux Follicularis. & uepica.	102	1111. eiusdem.	783	298	
Nux Heracleotica.	30	Oenanthe, siue Filipendula altera		Oleum Masti binum	66
Nux indica. 766. Matthioli, ibi.		montana, Pena. 784. alia eius		Oleum ex Aelithy semine, vul	
Nux Indica officinar.	364	dem. Cicut. facie.	ibid.	go Nardinum.	814
Nux Ingland.	320	Oenanthos species, Isalecham	785	Oleum ex Myagro.	1137
Nux quibus locis gaudeat.	312	Oenanthe, Myconi. ibid. alia eius		Oleum ex Myro 241. 242. eius fa	
Nux Melbel.	618 629	dem.	786	ciundi ratio.	244
Nux moschata.	1760	Oenothera, & Oenotheris.	805	Oleum Narcissinum.	1526
Nux myrsica, Macis.	1760	Oenuris.	ibid	Oleum ex Nenufar.	1013
Nux Persica & Basilica, Auellana.	310	Oesof, vel. ut alij, 130. 131. 132. 133		Oleum ex Nimbo.	1867
Nux Pine.	43	Oesof Theophrasti an sit Americana		Olei duo genera ex Nuce Indica.	
Nux à Pomo quid differat.	285	salix cuius ille nusquam alio		1762	
Nux Pontica sylvestris.	101	quin meminit.	278	Oleum ex Nucibus inglandibus.	
Nux Vesicaria.	102	Officinarum Malix.	63	323. Carynum vocatum. 324.	
Nux Vomica & Melbel.	1763	Oleaga, vel Oleastellus.	1664	usuf & præstantia. ibid. &	
Nymphaea. 1008. maior alba ibid.		Olea etiam Viscum fert in Pale-		325	
lutea maior & minor. 1009.		stina.	18	Oleum ex Penobson arbore A-	
altera lutea minor. ibid. mi-		Oleasatina.	342	mericana.	1814
nor alba. 1010. alia minor al-		Oleorum genera varia.	342.	Oleum de Platani baccis.	94
ba.		343		Oleum ex Pyrethro.	1170
		Olea maior ad escam, minor oleo		Oleum ex Ricino.	1630. 1631
		est aptior.	343	Oleum ex Ricino Americo.	1790
		Olea synestris seu Aethiopica,		Oleum Rosaceum.	128 129 130
		151		Oleum ampuchinum siue Ama-	
		Oleaster.	ibid.	racinum.	883
		Ole. maris rubri lacrima.	133	Oleum ex Sefamo.	482. 483
		Oleum Olinae succus, eius cōfectio		Oleum Stachadis.	918
		& genera.	344 345	Oleum Syracinum.	117
		Oleum Asari.	914	Oleum miris virtutibus præditū	
		Oleum nucum Auellanae.	101	ex arbore tinctoria.	1832
		Oleum de Balano. 1484. 1685. 1686		Oleum ex Trifolio.	506
		Oleum de Ben.	1789	Oleum de Tritico.	381
		Oleum ex Canella arboris Theue		Oleum ex Vaccinio.	255
		ti fructus nucleis. 1805. aliud		Oleum optimum Venetianū.	343
		ex Canella baccis.	1806	Oleum ex vitica.	1245
		Oleum ex Castaneis apud Indos.		Oleum ex Xilo arbore.	1774
		33		Oleum zambacinum siue Samba-	
		Oleum Chal. f.	111	cinum.	1432
		Oleum factitium ex Chamelaa.		Olida.	543
		1664		Oliuarum genera tria.	342
		Oleum Chimisticum ex Iuniperi		Oliua Boemica, siue Tlaagnus	
		ligno.	69	Matib.	111
		Oleum ex Cydoneis Melinum vo		Oliua Phantia, qua & Regia, &	
		catum.	291. 292. 293	Maiorina.	143
		Oleum Cyprinum.	253. 254	Oliua tumore crescere oleum sal-	
		Oleum ex Flammula.	1172	so existimatur.	344
		Oleum ex arbore Gebuph.	1842	Olla.	1762
		Oleum ex glande.	14	Olus.	518
		Oleum Handacoche.	1078	Oleibus multū, quae nos negligi-	
		Oleum ex Hyperico.	1154	gimus, Graci & siculi valde	
				delectan	

**O**cellus & Ocellus Duma-  
 nus & Ocellus Barba-  
 rius.  
 806  
 Ocellus, Lychnis coronaria 85  
 Ocimastrum 682. 1765. 1356. 1356  
 Ocimastrum Fuchsj 982  
 Ocimastrum quorūdam. 912  
 Ocimastrum Valentinum, Clusij.  
 684  
 Ocimastrum Valerianæ. 1186  
 Ocimoides. 682. 930  
 Ocimoides Dioscoridis. 1186  
 Ocimoides Matthioli. 682  
 Ocimoides minus, siue albū. 683  
 Ocimoides minimum. ibid.  
 Ocimoides repens Polygoni folio.  
 1429. 1430  
 Ocimum. 679  
 Ocimum antiquorum. 384  
 Ocimum aquaticum, quorūdam.  
 1086  
 Ocimum Cariophyllatum. 80. 681  
 Ocimum maximum. 680  
 Ocimum medium Fuchsj. ibid.  
 Ocimum medium Matthioli. ibi.  
 Ocimum montanum. 1175



## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

	P	
Pal 1781		
P <sup>'cal.</sup>		1876
Padus Theophrasti.		310
Paonia.		855
Paonia femina polyanthes, Lob.		
8, 8		
Paonia mas Matt'lioli, femina		
Dalechamp 356 femina prior		
ibid. femina altera, Dodonai.		
857		
Pagana lingua.		205
Pala marina.		1364
Pa ex marina Montpellierensium.		
1372		
Paliurus.		139. 143
Palma.		362
Palma chamærops Plinij.		369
Palma Christi Herbariorum.		1561.
1630		
Palma Christi siue Satyrium Ba-		
silicum.		1565
Palma Christi minor Matthio. Sa-		
tyrium Basilicum minus, Dod.		
1569		
Palma Elæ.		363
Palma Indicam Nucem ferens,		



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

qua & Elephantis. 1761	Papauer nigrum satium flore	Pedicularis, seu Pedicularia. 1074
Palma sancta similis arbor. 1750	Malua hortensis, aut P. rosea. Pen. & Lob. 1710	Pedicularis maior, Alpina. 1138
Palma victoria symbolum. 369	Papauer Rhoeas maius & minus. 439	Pelaeus. 210
Palma vinifera. 1834	Papauer spontaneum sylvestre & hortense, Pen. & Lob. 1710	Pelethronia. 1285
Palmaacea, seu Arundinacea pin-nata spinosa. 1830. & 1831	Papauer spumeum. 1186	Penoabson. 1833
Palma pinus, sue Conifera. 1832.	Papauer spumeum Dioscoridis, Anguillare. 1085	Pentadactylon. 1630
sylvestris. ibid. Pene. ibid.	Papauer spumeum quorundam. 817	Pentadactylon gramin. 420
Palmule. 362	Papauer sylvestre sine nigrum, Do donat. 1710	Pentaphyllum. 1263
Paludispium Gaz. 701	Pappus. 574. 1440	Pentaphyllum flore albo & rubro, Lob. 1266
Panace Heraclia. 1117	Papyrus. 1878	Pentaphyllum supinum, Tormen-tilla facie, Lob. ibid.
Panaces & Panax. 718	Papyrus Aegyptia, Pene. 1883	Peplion, Dalech. 1659
Panaces Asclepium Matthio. 719	Paradisus Mahumetis. 1857	Peplis minor Dalecham. ibid.
Panaces Asclepium alterum, Da-lecham. 740	Paralytica Alpina angustifolia, Lobellj. 837. minor sine media eiusd. ibid.	Peplis, Matthioli. ibid.
Panaces Chironium. 603	Parietaria officinarum. 1241	Peplus Parisiensium. 456
Penaces Chironium, sue Flos so-lis Matth. 740	Parizataco. 1811	Pepones. 622. 623
Panaces Chironium quorundam, Dodon. 741	Paronychia alfine folia, Lobellj. 1214	Pepon latus Dodon. 617
Panaces Heraclum. 886	Paronychia altera, Rutaceo folio, Lobellj. ibid.	Pepon maximus Indicus Lobellj. 625
Panaces Herculeum Matthioli. 739	Paronychia altera Matthioli. 1213	Perceper Anglorum. 713
Panax Cavanion. 738	Parthenis. 949	Perdicium. 953. 1241. 1503
Panax Chironium, Dodonai. 741	Parthenium. 124. 1626	Perdicium secundum Plinij. 583
Panax Heraclum. 1278	Parthenium Dioscoridis, Dodo. 951	Perdicium 2 heophrasti. 1392
Panax Heraclum, Lobellj. Spho-dilium alterum. Dodon. 740	Parthenium leptophyllum. 1344. 1345	Perecennu. 1901
Pancratium. 1578. Dale. ha. 579	Parthenium maritimum mini-mum. 1395	Perfoliata & Perfoliatum. 1311
Clusij. ibid.	Parthenium pampidax, Myconi. 954	Perfoliata altera. 791
Pancratium maritimum. 1525	Pastinaca. 718	Perfoliata, Dodon. 1321
Pancratium quorundam. 1151	Pastinaca aquatica, Herbarioru. 1092	Perfoliata longifolia, Dalecham. 1321
Panicum. 411	Pastinaca marina. 1367	Perfoliata species, Bisfolium. 1260
Panicum indicum, aliis peregrinum ibid & 411	Pastinaca marina Pene & Lobel. Criethum II. Matth. 1396	Periclymenum. 1427
Panicum satium. 412	Pastinaca pratensis. 721	Periclymenum alterum quorum-dam. 1605
Panicum sylvestre Matthioli. ibi.	Pastinaca sativa vulgi, Matthio. 719	Periclymeni cretti duo genera Clusij. 273
Panicum sylvestre aliud Dalech. 413	Pastinaca sylvestris, Matthioli. 720	Periclymenum tertium Dod. 272
Panis cuculi, Herbariorum. 1354	Pata leonis. 1342	Periclymenum perfoliatu. 1427
Panis porcinus, & terra. 1604	Pater noster, vel radix S. Helene Monardi. 1816	Periclymenum non perfoliatum, Lob. 1428
Panis varia genera & confectio. 378. 179. 380. 381	Pateon tertium Caryota genus. 364	Periploca repens, & non repens. 1731. 1732
Papauer. 1707	Pauata. 1861. Acofte. 1863	Peristecom. 1314
Papaueris corniculati species, Do-donai. 1712	Pausie Olive unde dicantur. 343	Persea. 18. 6
Papauer corniculatum alteru, Clu-sij. 1713	Pavco. 1918	Persea America, Clusij, cum fru-ctu, Dalech. 1828
Papauer corniculatum violaceum Dod. ibid.	Pecten Veneris, Scandix quorum-dam 712. 713	Persea Malus & Persicus. 293
Papauer cornutum, Matthioli. 1712		Pescorum genera, & qua ex iis praestantiora. ibid.
Papauer fimbriatum, & cristatu album, & nigrum, Lobellj. 1709		Pescaria. 1040. Matthioli. 1041
Papauer fluidum, Erraticum, ru-brum. ibid.		pusilla Lob. ibid.
Papauer satium, Matthio. 1708		Pescaria non maculosa & Persi-caria vrens. 1038
Papauer satium rubrum fim-briatum, Dalech. 1709		Pescaria filiquata. 1055
		Perfolata, Vlinij. 1054
		Personata & Personatia. 1054
		Personata, sue Lappa maior, Mat. 1055. altera, eiusd. ibid. Peruina



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM.

<i>Peruina maior</i> , Lob.	833	<i>Phasolus</i> .	472	<i>Phyllitis</i> .	1218
<i>Peruina officinarum</i> .	832	<i>Phasolus sativus</i> , <i>sive albus</i> &		<i>Phyllitis laciniata</i> Clusj.	1218
<i>Peruiana alia facie arboribus</i>		<i>vulgaris</i> .	ibid.	<i>Phyllon</i> .	1463.
<i>idem innascens</i> .	1829	<i>Phasolus sylvarum</i> .	ibid.	<i>Phyllum</i> .	1194
<i>Pes anserinus</i> .	542	<i>Phasolus sylvestris</i> .	ibid.	<i>Phyllum arrhenogonum</i> , Dalech.	
<i>Pes asini</i> .	911	<i>Phellandrium</i> Plinij.	725		1196
<i>Pes columbinus</i> .	1176.1277	<i>Phellandrium</i> , Plinij.	1093	<i>Phyllum arrhenogonum maius</i> ,	
<i>Pes columbinus vulgaris</i> Herbariorum.	1815	<i>Phellodrys</i> , <i>cuiusque quinque genera</i> .	25	<i>Dalecham</i> .	1196
<i>Pes corvini</i> Herbariorum.	670	<i>Phellodrys Arcadum</i> , Doru, <i>Arp.</i>	146	<i>Phyllum arrhenogonum thelygonon</i> Theophrasti.	1197
<i>Pes corni</i> , & <i>Pes galli</i> , Herbariorum.	1027	<i>Phellodrys coccifera</i> .	27	<i>Phyllum thelygonum</i> , Dalecham.	
<i>Pesgalinaceum</i> Herbariorum.	670	<i>Philetaria</i> .	1186		1195
	714.1191	<i>Philantropos</i> Aparine.	1331	<i>Phyllum thelygonum</i> , Matthioli.	
<i>Pes gruis</i> .	814	<i>Philetarium Octinoides</i> à quibusdam cognominatur.	684		1196
<i>Pes Leonis &amp; leoninus</i> .	1175.	<i>Phillyra</i> Theophrasti à Dioscor.		<i>Phyteuma</i> .	1197
	1281.1324.1342	<i>Phillyrea plurimum</i> distat.	153	<i>Phyteuma Narbonensium</i> , Pena.	
<i>Pes leporis</i> .	441	<i>Phillyrea</i> Dioscor.	90		1198
<i>Pes lupinus</i> .	1325	<i>Phillyrea</i> & <i>eius varia icones</i> ,		<i>Phyt. uma quorundam</i> , Dalecha.	
<i>Pes viti</i> .	1596	<i>Marth. Serapionis</i> , Clusj.	153.		1198
<i>Petasites</i> .	1053	& 154		<i>Phyteuma quorundam</i> Herbariorum.	1342
<i>Petasita odorati flos</i> .	1054	<i>Phillyrea</i> Dioscoridis.	252	<i>Picata vina</i> . 76. <i>vua</i> .	77
<i>Petilius flos</i> Plinij.	840	<i>Philyca</i> .	257	<i>Picea nira</i> .	4349
<i>Petrapium</i> .	702	<i>Philyca tertia</i> Dalech.	258	<i>Picea resina</i> Galeni an <i>abiegnala</i>	
<i>Petroelinum</i> .	700.706	<i>Philyca</i> .	89	<i>cyma</i> .	54
<i>Petroelinum Alexandrinum</i> .	703	<i>Philyrea maior</i> Pena, <i>tertia</i> Clusj.		<i>Picea mon Creta Salonenfis</i> , Pena & Lob.	1456
<i>Petroelinum Dalechamp</i> .	701	<i>Philyca prima</i> .	258	<i>Picris Dalechampij</i> , Hieracium	
<i>Petroelinum Macedonicum</i> Mat.		<i>Philyca minor</i> Pena, <i>quarta</i> Clusj.		<i>Matth. Dodon</i> .	561
<i>ibid</i> .		<i>Philyca secunda</i> .	ibid.	<i>Pigamum</i> , Dodon.	180
<i>Petroelinum Macedonicum</i> Mat		<i>Phleas</i> . 1015 <i>mas</i> <i>sive</i> <i>stabe</i> Theophr.		<i>Pilosella</i> .	1098
<i>ibid</i> .	702.703	<i>phr. angustifolia</i> 1016 <i>mas</i> <i>la</i>		<i>Pilosella an Elatine</i> .	1239
<i>Petum</i> .	1893	<i>trifolia</i> , <i>sagitta maior</i> Matthi.		<i>Pilosella maior</i> Matth.	1098
<i>Peucedanum &amp; Peucedanum</i> .	745	<i>ibid</i> <i>famina</i> .	1017	<i>Pilosella minor</i> Fuchsij.	ibid.
<i>Peucedanum</i> Dod.	746	<i>Phlomis</i> .	1107	<i>Pilosella maxima</i> Syriaca Lobel.	
<i>Peucedanum maius</i> Italicum, Lob.		<i>Phlomis lychnitis</i> .	1303		1099
<i>belly</i> .	747	<i>Phlomis lychnitis</i> Clusj.	1304	<i>Pilula Cupressi</i> .	57
<i>Peucedanum</i> Matth.	746	<i>Phlomis lychnitis altera</i> Syriaca, Lob.	1304	<i>Pimpine</i> <i>la</i> , <i>seu</i> <i>Pimpinella</i> . 1087	
<i>Phacoides</i> .	1671	<i>Phlomis lychnitis</i> Pena.	1303	<i>Pimpinel a</i> <i>ansit</i> <i>Elatine</i> .	1219
<i>Phacoides</i> Oribasij.	1669	<i>Phlox</i> Theophrasti.	800	<i>Pimpinella nostra</i> .	1119
<i>Phanion</i> .	841	<i>Phlox</i> <i>sive</i> <i>Flamma</i> Theophr. An		<i>Pimpinella</i> , <i>sive</i> <i>Sanguisorba</i> <i>ma</i>	
<i>Phaeum</i> Pena & Lob. 1026. 1027		<i>guillare</i> .	871	<i>ior</i> , Fuchsij.	1088
<i>Phagus</i> .	5	<i>Pharicobalanus</i> .	365.366	<i>Pimpinella</i> <i>sive</i> <i>Sanguisorba</i> <i>ma</i>	
<i>Phagus Ideorum &amp; Macedo-</i>		<i>Phenix</i> .	416	<i>ior</i> , Matth. 1087. <i>minor</i> , <i>cuius</i> <i>ibi</i> .	
<i>num</i> .	6	<i>Photel arbor</i> Catayna.	1840	<i>Pimpinella saxifraga</i> .	786
<i>Phagus Theophrasti</i> <i>diversa</i> 4		<i>Phrinum</i> .	1487	<i>Pimpinella saxifraga maior</i> Mat	
<i>Phagostroma</i> .	5	<i>Phthirion</i> .	1074	<i>thiol</i> .	787
<i>Phagus valentius</i> <i>adstringit</i> .		<i>Phyllus</i> <i>Batanicus</i> <i>integer</i> , <i>cuius-</i>		<i>&amp;</i> <i>Lobel</i> .	78
	21	<i>que separata</i> <i>partes</i> .	1398	<i>Pinastellus</i> .	74
<i>Phalangius</i> .	851	<i>Phucus</i> <i>marinus</i> .	1369	<i>Pinaster</i> & <i>eius</i> <i>genera</i> .	44
<i>Phalangium</i> .	1496. 594	<i>Phu</i> . 927. <i>magnum</i> .	ibid	<i>Pinaster</i> Bellony, Teda Plinio.	
<i>Phalangium</i> , Matthioli. 852. <i>Dale-</i>		<i>Phu</i> <i>Grecum</i> , <i>sive</i> <i>peregrinum</i> .			46.47.
<i>champi</i> <i>ibid</i> . <i>ramosum</i> , Lob.			1043	<i>Pinaster</i> <i>seu</i> <i>pinus</i> <i>sylvestris</i> <i>qua-</i>	
<i>ibid</i> .		<i>Phu</i> <i>minimum</i> .	1127	<i>resterilis</i> <i>dicatur</i> .	45
<i>Phalaris</i> .	415	<i>Phu</i> <i>minimum</i> <i>alterum</i> Lobellij.		<i>Pinastrium</i> <i>aliud</i> <i>nunc</i> <i>male</i> <i>conner</i>	
<i>Phallus</i> <i>Hollandicus</i> .	1398	<i>ibid</i> .		<i>tit</i> <i>Plinius</i> .	43
<i>Pharmacum</i> .	1273	<i>Phu</i> <i>minimum</i> , Matth.	1043	<i>Pinea</i> <i>nux</i> .	43
<i>Phascolus</i> <i>Brasiliensis</i> , Clusj.		<i>Phu</i> <i>sylvestre</i> .	1042	<i>Pinea</i> <i>nucis</i> & <i>eorum</i> <i>vis</i> .	51
	1905	<i>Phyllice</i> an <i>meminerit</i> <i>Plinius</i> .		<i>Pinei</i> <i>nuclei</i> <i>Malucani</i> , Acoffa.	
<i>Phascolus</i> <i>alter</i> <i>Indicus</i> , Clusj.			1874		
<i>ibid</i> .					
<i>Phascoli</i> <i>parvi</i> <i>ex</i> <i>America</i> . 1906.	158				



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Pimpinella</i> iarbifcula. 1790	<i>Pityusa</i> fua <i>Efula</i> minor, Dodon. 1653	<i>rum.</i> 8
<i>Pinorum</i> in fua genera diftribu- tio ex quorundam fententia. 49	<i>Hift. fterp. Tithymalus</i> platy- phyllus. <i>Fachfy.</i> 1653	<i>Plumbago</i> , <i>Plinij.</i> 1041
<i>Pinorum</i> morbus. 49	<i>Pityusa</i> fua <i>Efula</i> minor altera floribus rubris. <i>Lob.</i> 1654	<i>Plumbago</i> <i>Plinij</i> quorundam. 1448
<i>Pinum</i> montanarum & mari- marum differentie. 45	<i>Pix</i> quid 73. ultima pag. unde & quomodo fiat. 74	<i>Podagra</i> <i>Lini.</i> 1683
<i>Pinus</i> <i>rubra</i> . 45	<i>Pix</i> <i>Brutia</i> . <i>ibid.</i>	<i>Pogonia</i> <i>caftanea</i> . 31
<i>Pinus</i> maritime duo genera, <i>fat.</i> 45	<i>Pix</i> <i>Brutia</i> , <i>Lycia</i> , <i>Idæa</i> , <i>Narycia</i> , feu <i>Laricia</i> , fua <i>Narycia</i> . 75.	<i>Polemonium</i> & <i>Polemonia</i> . 1186
<i>Pinus</i> <i>Tubulus</i> , <i>Mugoltalorum</i> . 47	<i>Nemeturica</i> , <i>Corticata</i> , <i>Rafilis</i> <i>Rabulana</i> , fua <i>Radulana</i> fua <i>Rafulana</i> fua <i>rb. rica</i> . 76	<i>Polemonij</i> alt. ra figura. 1187
<i>Piper</i> . 1807	<i>Pix</i> <i>Brutia</i> maxime probata. 76	<i>Polemonium</i> <i>Dodon.</i> 1187
<i>Piper</i> <i>Aethiopicum</i> , <i>Matth.</i> 1809	<i>Pix</i> & <i>Refina</i> & unde manent. 69 70.	<i>Polemonij</i> fpecies <i>Dodon.</i> 1187
<i>Piper</i> <i>arab.</i> 1617	<i>Pici</i> bona experimentum. 75	<i>Paeonia</i> <i>Monfpel.</i> <i>lafminum</i> lu- teum. 1187
<i>Piper</i> <i>aquaticum</i> . 1038	<i>Pici</i> facultates. 77. 78	<i>Polema</i> . 400. 401
<i>Piper</i> <i>Bresiliacum</i> , <i>Calocuthium</i> , <i>Hispanum</i> , <i>Indicum</i> . 631	<i>Pici</i> liquida genus <i>faridifimili</i> . 59	<i>Polum</i> . 1390
<i>Piper</i> <i>Guinea</i> . 632	<i>Pici</i> & <i>fus</i> <i>multiplex</i> . 76 77	<i>Polum</i> . 928. <i>Matth.</i> <i>ibid.</i> alterum eiusd. 929. <i>Luticum</i> , <i>Dalech.</i> <i>ib.</i> quartum, <i>Cluffij.</i> <i>ibid.</i> menta- num <i>fupinum</i> minimum <i>Lo-</i> <i>bell.</i> 930
<i>Piper</i> <i>longum</i> . 1810	<i>Plan</i> <i>leonis</i> . 128, 1342. 16, 6	<i>Pollen</i> fua <i>Pollin.</i> 379
<i>Piper</i> . <i>arab.</i> 1809	<i>Plan</i> <i>Cathartica</i> . 1616	<i>Polyacantha</i> <i>Cordi.</i> 1473
<i>Piper</i> <i>murinum</i> . 1128	<i>Plan</i> <i>congeneres</i> <i>agrefles</i> & <i>fa-</i> <i>rine</i> quò differant. 588	<i>Polyacanthos</i> <i>Theophrasti.</i> <i>ibid.</i>
<i>Piper</i> quidam vocat <i>Myrtidani</i> . 249	<i>Plan</i> <i>palufres</i> . 983	<i>Polyantherum</i> . 875
<i>Piper</i> <i>nigrum</i> & <i>album</i> 1808	<i>Plan</i> <i>peregine</i> . 1749	<i>Polyantherum</i> <i>multiplex</i> <i>Dod.</i> <i>ibid.</i>
<i>Piper</i> <i>ruficum</i> . feu <i>montanum</i> . 236 1666	<i>Plan</i> <i>pro folo</i> ac <i>celo</i> <i>vim</i> <i>no-</i> <i>xiam</i> aut <i>salutarem</i> habent. 1573	<i>Polyantherum</i> <i>simplex</i> <i>Dodon.</i> <i>Chryfanthemum</i> <i>Fachfy.</i> <i>ibid.</i>
<i>Piper</i> <i>cala</i> . 694	<i>Plan</i> <i>venenata</i> . 1707	<i>Polybidion</i> . 1286
<i>Piper</i> <i>ella</i> . 132. 898	<i>Plantarum</i> differentie ab earum facultatibus. 1626	<i>Polycarpum</i> . 444
<i>Piper</i> <i>fera</i> arbor <i>Theuci</i> . 1808	<i>Plantarum</i> differentie à partibus fumpte. 1489	<i>Polycnemom</i> . 896
<i>Piperis</i> <i>euem</i> apud antiquos ob- tinebant ante illius inuention- em <i>Myrti</i> <i>bacca</i> . 241	<i>Plantarum</i> <i>maritimarum</i> color. 1584	<i>Polycnemom</i> . 932. <i>Dalechampi.</i> & <i>ibid.</i> <i>Lob.</i>
<i>Piperitis</i> . 666	<i>Plantarum</i> mors. 1675	<i>Polygala</i> <i>multorum</i> , quibusdam <i>Onobrychis</i> . 488
<i>Piperitis</i> <i>Plinij</i> , <i>diuerfa</i> à <i>Piperi</i> <i>ti</i> <i>Herbariorum</i> . 631. eadem. 678. 679	<i>Plantarum</i> <i>multarum</i> <i>acrior</i> aut <i>mitior</i> <i>apor</i> , <i>agri</i> fequitur con- ditionem. 1048	<i>Polyga</i> <i>arepens</i> . 489
<i>Piftacia</i> & <i>Piftacea</i> , & <i>Piftacii</i> . 360	<i>Plantarum</i> <i>spinofarum</i> differen- tie. 1435	<i>Polygala</i> <i>valentina</i> . <i>ibid.</i>
<i>Piftaciam</i> . 102	<i>de</i> <i>Plantis</i> <i>coronarijs</i> . 877	<i>Polygalon</i> . 488
<i>Piftaciorum</i> arbor. 360. 361	<i>Plantago</i> . 1254	<i>Polygalon</i> <i>Cordi.</i> 210
<i>Piftolochia</i> . 591. 976. 977	<i>Plantago</i> <i>aquatica</i> . 1055. 1057	<i>Polygalon</i> <i>Matth.</i> <i>Afragaloides</i> <i>Lob.</i> 488
<i>Piftana</i> , <i>Magenis</i> . 1016	<i>Plantago</i> <i>maritima</i> . 1359	<i>Polygonaton</i> . 1463
<i>Piftolochia</i> <i>Cluffij</i> . 978. <i>Dodonæi.</i> <i>ibid.</i>	<i>Plantago</i> <i>minor</i> <i>Matth.</i> 1154	<i>Polygonatum</i> . 1621
<i>Piftolochia</i> <i>Plinij</i> . 1193	<i>Plantago</i> <i>minor</i> , <i>longa</i> <i>Matth.</i> 1255	<i>Polygonatum</i> <i>angustifolium</i> , <i>Fach-</i> <i>fy.</i> 1623
<i>Pift.</i> non meminit <i>Diofcorides</i> . 450	<i>Plantago</i> <i>minor</i> , <i>Dod.</i> <i>ibid.</i>	<i>Polygonatum</i> <i>maius</i> , <i>Matth.</i> <i>ibid.</i>
<i>Pifum</i> . 449	<i>Plantago</i> <i>Rofea</i> , <i>obellij.</i> 1256	<i>Polygonum</i> . 1105
<i>Pifum</i> <i>Americum</i> . 40	<i>Plantago</i> <i>rufea</i> , <i>Pena.</i> <i>ibid.</i>	<i>Polygonum</i> <i>alterum</i> <i>Serpilli</i> <i>fo-</i> <i>lio</i> , <i>Pena.</i> 1124
<i>Pifum</i> <i>cordatum</i> . 597	<i>Plantago</i> <i>vulgaris</i> <i>latifolia</i> , <i>Mat</i> <i>th.</i> 124	<i>Polygonum</i> <i>famina</i> . 1071
<i>Pi</i> <i>ydes</i> , <i>Pinorum</i> <i>Piceae</i> <i>que</i> <i>fru-</i> <i>ctus</i> qui in conis inueniuntur, & eorum <i>vis</i> . 51	<i>Platanus</i> . 93	<i>Polygonum</i> <i>Heruiaria</i> <i>foliis</i> . 1124
<i>Pitynnus</i> <i>Phyfeia</i> . 73	<i>Platani</i> <i>umbraculorum</i> <i>infignia</i> <i>exempla</i> . 93	<i>Polygoni</i> <i>Hispanici</i> <i>genus</i> <i>Cluffij.</i> 1115
<i>Pityusa</i> . 1652	<i>Platyphyllos</i> <i>mas</i> 2.3 <i>famina</i> 4.	<i>Polygonum</i> <i>marinum</i> . 1386
<i>Pityusa</i> <i>Matth.</i> fua <i>Efula</i> maior. <i>ibid.</i>	<i>Platyphyllos</i> <i>Gracorum</i> , quidam putant <i>efle</i> <i>Efculum</i> <i>Latino-</i> <i>rum.</i>	<i>Polygonum</i> <i>marinum</i> <i>prum</i> & <i>alterum</i> <i>Dalech.</i> <i>ibid.</i>
<i>Pityusa</i> fua <i>Efula</i> minor, <i>Dodo.</i> <i>Hiftor. fterp. Tithymalus</i> <i>Cypa-</i> <i>rrhæas</i> , <i>Fachfy.</i> 1654		<i>Polygonum</i> <i>mas</i> . 1123
		<i>Polygonum</i> <i>minus</i> <i>Matth.</i> 1126
		<i>Polygonum</i> <i>montanum</i> , <i>Pena</i> 1124
		<i>Polygonum</i> <i>fluafre</i> a <i>Plinio</i> <i>def-</i> <i>criptum</i> . 1386
		<i>Polyneu</i>



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Palmirena.</i>	1254	<i>Pothos ceruleus Theoph.</i>	1425	<i>Pseudomyagrurn.</i>	1138
<i>Polypodium.</i>	111229	<i>Præcoia vel Præcoqua mala.</i>	297.	<i>Pseudomyagrurn Matt.</i>	1137
<i>Polypodium liliense.</i>	1230	<i>unde dicta.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pseudomyrsine.</i>	110
<i>Polypodium primum Matth.</i>	1229	<i>Prasium officin.</i>	960	<i>Pseudonarcissus.</i>	1523
<i>Polypodium secundum Matthio.</i>	1230	<i>Prasium fatidum.</i>	1252	<i>Pseudonardus.</i>	919
<i>Polypremum.</i>	554	<i>Primula hortensis Anglica, Lo.</i>	834	<i>Pseudorchys bifolium.</i>	1260
<i>Polyrrhizon latifolia Dalechamp.</i>	1140	<i>&amp; Pena.</i>	834	<i>Pseudorhabbarum cecentiorum.</i>	606
<i>Polyrrhizon Plinij, Dalechampij.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Primula Veris minor, Dod.</i>	835	<i>Pseudoschananthum.</i>	1395
<i>Polysporon Cassiani.</i>	537	<i>Primula Veris prior, Matthioli.</i>	834	<i>Pseudosilachys, Matt.</i>	963
<i>Polysporum.</i>	444	<i>Primula Veris altera, Matthioli.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pseudostrobilium Matthio.</i>	822
<i>Polytrichon.</i>	1209	<i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pseudosycomorus.</i>	558
<i>Polytrichum aureum maius &amp;</i>	1212	<i>Primula Veris pachyphyllus, sine</i>	836	<i>Psidon officina, quid.</i>	304
<i>minus.</i>	1212	<i>Auricula vrsi, Matth.</i>	836	<i>Psilostrium.</i>	1409
<i>Polytrichum officinarum.</i>	1211	<i>Primula Veris sylvarum, flore mul</i>	835	<i>Psora.</i>	1065
<i>Poma Adami.</i>	301, 372	<i>tiplici.</i>	835	<i>Psicotrophum.</i>	1282
<i>Poma amoris.</i>	626	<i>Primula sylvarum, Lob.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Psyllium. 1172. Matth.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Poma ut servatur. 289. colligitur.</i>	290	<i>Primula sylvarum floris obscuri,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Psyllium alterum Matth.</i>	1173
<i>ibid. &amp;</i>	286	<i>Lob.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Parmica. 1168. Fuchsij.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Poma sylvestria, pessima.</i>	286	<i>Proserpinaca.</i>	1123	<i>Parmica altera Math.</i>	1169
<i>Pomi nomen apud Latinos Latè</i>	286	<i>Prosopis, sine Aristion.</i>	1055	<i>Parmicamontana Dalechampij.</i>	<i>ibid.</i>
<i>patet. 285. unde.</i>	286	<i>Pruna.</i>	313	<i>Pternis.</i>	1440
<i>Pomorum genera in Gallia propè</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pruna laudatissima.</i>	314	<i>Ptifana ex hordeo. 399. eius parâ</i>	<i>di modus ibi. &amp; 100. ex tritico</i>
<i>innumera.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Prunella.</i>	1075, 1310	<i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pomorum primum inuentor.</i>	287	<i>Prunella sue Consolida minor,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Ptifana pharmacopæorum potio.</i>	401
<i>Pomum amoris, sine aureum.</i>	628	<i>Matth.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pulegium.</i>	890
<i>Pomum Nicaragæ.</i>	1817	<i>Prunorum apud Gallos innume</i>	314	<i>Pulegium Regium. 891. cerninum.</i>	892
<i>Populi fructus feræ necne.</i>	87	<i>ra ferè differentia.</i>	314	<i>Pulegium sylvestre.</i>	676
<i>Populus quibus locis gaudeat &amp;</i>	87	<i>Prunorum vires. ibid. &amp;</i>	315	<i>Puls in maluar quid.</i>	1689
<i>eius vires.</i>	87, 88	<i>Prunus.</i>	33	<i>Pulicaris herba.</i>	1172
<i>Populus Alba, Nigra, Lybica, seu</i>	86, 87	<i>Prunus Sebestena Matth.</i>	359	<i>Pulmonaria.</i>	1326
<i>Alpina.</i>	210	<i>Prunus sylvestris.</i>	130	<i>Pulmonaria fungosa.</i>	1327
<i>Populus Alpina.</i>	1830	<i>Primula Veris.</i>	833	<i>Pulmonaria Gallorum, sue Auri</i>	<i>culamuris maior, Tragi 1328</i>
<i>Populus Americana.</i>	563	<i>Pseudanthusa.</i>	1101	<i>Pulmonaria maior.</i>	1327
<i>Porcellia.</i>	1503	<i>Pseudoacornus ceruleus Tragi.</i>	1619	<i>Pulmonaria minor Dalech.</i>	1328
<i>Porcion.</i>	1541	<i>Pseudocapion.</i>	1596	<i>Pulsatilla. 849. alba Lob.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Porrum.</i>	1542	<i>Pseudobunias.</i>	650	<i>Pulsatilla I. Alpina, Dalec. 850.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Porrum commune Matth.</i>	1541	<i>Pseudocapsicum.</i>	600	<i>Pulsatilla II. Alpina, Dalec. 851.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Porrum silvium Fuchsij.</i>	1541	<i>Pseudocassia.</i>	1796	<i>Pulsatilla III. Alpina, Dalec. ibi.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Porrum scitium &amp; capitatum</i>	1542	<i>Pseudochamæpitrys Dod.</i>	1161	<i>Pulsatilla altera, Dod.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Matth.</i>	1542	<i>Pseudocinnamum.</i>	1797	<i>Pulsatilla rubra, Lob.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Portulaca.</i>	550	<i>Pseudocoronopus Dod.</i>	670	<i>Pumilio.</i>	1560, 1561
<i>Portulaca agrestis.</i>	1128	<i>Pseudocostus Matth.</i>	757	<i>Punicum sylvestre.</i>	305
<i>Portulaca hortensis species Cepæa</i>	1346	<i>Pseudocrania Cordi.</i>	197	<i>Pycnitis.</i>	1298
<i>quibusdam.</i>	1346	<i>Pseudodictamnium. 892. 894.</i>	899	<i>Pycnocomum.</i>	1681
<i>Portulaca marina, Malimus vul</i>	582	<i>Matth. &amp; Dod.</i>	899	<i>Pyracantha.</i>	134
<i>garis Matth.</i>	551	<i>Pseudoellebormis sine Cofiligo Mat</i>	1638	<i>Pyra Cotonea.</i>	290
<i>Portulaca sativa.</i>	551	<i>thio.</i>	1638	<i>Pyramidalis Latetiana.</i>	828
<i>Portulaca sativæ cõdiendaratio.</i>	551	<i>Pseudoenopatorium.</i>	1063	<i>Pyrraria.</i>	1595
<i>Portulaca sylvestris. 551. 1128. 1658</i>	551	<i>Pseudohermoadactylus Itatorum.</i>	1567	<i>Pyrraster.</i>	134, 135
<i>Potamogeton. 1007. alcy. 1018</i>	1022	<i>Pseudohermoadactylus Matthio.</i>	1573	<i>Pyrethrum flore Anthemidis.</i>	1170
<i>Potamogeton, Castoris.</i>	1022	<i>1573.</i>	1573	<i>Pyrethrum Gesneri.</i>	1170
<i>Potentilla.</i>	1064	<i>Pseudoleontopodium Matthioli.</i>	1344	<i>Pyrethrum silvestre.</i>	1168
<i>Potentilla maior, Anguillare. 1081</i>	1478	<i>Pseudolanchitis aspera Mathio</i>	1221, 1125	<i>Pyrethrum verum Matt.</i>	1170
<i>Poterium Clusij.</i>	1488	<i>li, Lanchitis aspera Maranthæ.</i>	349	<i>Pyrethrum alterum Matth. ibid.</i>	841
<i>Poterrum. 1487. Matth. Pena &amp;</i>	1488	<i>1221. 1125.</i>	417, 438		
<i>Lob.</i>	1430	<i>Pseudolotus Matth.</i>	1594		
<i>Pothos ceruleus Matth.</i>	1430	<i>Pseudomelanthium.</i>	1594		



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

*Pyrus achne.* 1666  
*Pyrus* 306. unde sic dicta. ibi. eius  
genera apud veteres. ibid. &  
307. infinita hodie in Europa  
ibid.  
*Pyrus Carica.* 1595  
*Pyrus* quedam sativa. spinis arma-  
ta, in Lugdunensi. 136  
*Pyracantha.* 148  
*Pyracanthos* Chironium vocant  
Graeci Spinam ex qua Lycium  
fit. 149

2

**Q** *Vadrisolium*, *Pheum* *Pene*  
& *Lob.* 1027  
*Quebulgi.* 1687  
*Queiro.* 185  
*Quercula* minor. 1162  
*Quercus* modo pro genere, modo  
pro unica glandiferarum spe-  
cie capitur, & unde dicatur 1.  
*Quercus* genera quinque. 2. & 4.  
*Quercus* genus aliud à superiori-  
bus quinque in Sequanis. 8.  
*Quercus* genera Dalech. optime  
distribuit. ibid.  
*Quercus* marina Lusitane fabu-  
losa. ibid.  
*Quercus* peregrina siue Mauri-  
nica. ibid.  
*Quercus* que ferant præter glan-  
des. ibid. & 9. 10. & 11  
de *Quercu* dignissima cognitu. 11  
*Quercus* fructum & animal gi-  
gnit. 17  
*Quercus* species perpetuo vi-  
rens. 4  
*Quercus* sudor. 17  
*Quercus* vires & medicamenta.  
12. & 13  
*Querni* corticis usus ad coria. 14.  
*Quinquefolium.* 1263  
*Quinquefolium* album. 1265 ru-  
brum. ibid. album *Matth.* ibid.  
rubrum. *Dod.* ibid.  
*Quinquefolium* luteum maius. 126  
minus. ibid.  
*Quisquilium.* 27

R

**R** *Abich* *Arabum* *Aphricano-*  
rum. 145  
*Radix* contra venena, *Carto* san-  
cto, *Radix* S. Helena. 1823. 1826  
*Radix* Drakeana. 1858  
*Radix* Ideia. 192  
*Radix* Oliva unde dicantur. 343  
*Radix* sulphurea. 745

*Radix* Syriaca, *Columella.* 822  
*Ranunculus.* 1027  
*Ranunculus* aquaticus. 1021  
*Ranunculus* aquaticus angustifo-  
lius serratus, *Lob.* 1041  
*Ranunculus* Constantinopolitanus  
*Clusij.* 1034  
*Ranunculus* flore globoso. 1033  
tuberosus. 1034  
*Ranunculus* Hederaceus, *Dalech.*  
1031  
*Ranunculus* hortensis prior, *Dod.*  
1031. alter eiusdem. 1032  
*Ranunculus* hortensis I. *Fuch.* al-  
bus prior, siue echinatus, *Dod.*  
1030  
*Ranunculus* IIII. *Fuch.* lacteus, al-  
bus nemorensis, *Dod.* ibid.  
*Ranunculus* IIII. *Fuch.* luteus,  
luteus nemorensis, *Dod.* ibid.  
*Ranunculus* Illyricus. 1032. *Lusi-*  
tanicus. 1033  
*Ranunculus* I. *Matth.* 1027. II. III.  
eiusd. 1028. IIII. V. VI. eiusd.  
1029  
*Ranunculus* montanus albus, *Da-*  
lech. 1031  
*Ranunculus* niueus polyanthes,  
*Lob.* 1035. flammeus aquaticus  
angustifolius, eiusd. ibid.  
*Ranunculus* phœniceus, *Alyco-*  
ni. 1036  
*Ranunculus* purpureus. 1036 lati-  
folius. ibid.  
*Ranunculus* I. sylvestris *Fuch.* au-  
ricomus, *Dod.* 1029  
*Rapa*, quadraginta libras exce-  
dentia singula. 639  
*Raphani* generatris. 519  
*Raphanus.* 634  
*Raphanus* siue *Radicula* palustris.  
1090  
*Raphanus* purpureus minor, *Lo.*  
636  
*Raphanus* rusticus. 663  
*Raphanus* rusticus, *Matth.* 636  
*Raphanus* sativus, *Matth.* ibid.  
635  
*Raphanus* secundus, *Matth.* ibid.  
*Raphanus* sylvestris. — 1495  
*Raphanus* sylvestris *Dodonæi.*  
635  
*Raphanus* sylvestris officinarum.  
666  
*Rapheion.* 1608  
*Rapistrum.* 652. 653  
*Rapistrum* caruorum. 342  
*Rapistrum* campestre. 123  
*Rapistrum* colis *Catonis.* 522  
*Rapontium.* 641

*Rapum*, & *Rapa.* 639. 1604  
*Rapum* D. *Antonij.* 1034  
*Rapum* longum. 640  
*Rapum* sativum orbiculatum. ibi.  
*Rapum* sylvestre. ibid.  
*Rapunculi* pyramidalis genus, *Da-*  
lech. 641. 642  
*Rapunculus* maior *Dod.* 641  
*Rapunculus* minor *Dodon.* ibid.  
*Rapunculus* minor, *Matth.* ibid.  
640  
*Regina* prati, *Herbariorum.* 1080  
*Remedium* pauperum. 1916  
*Remora* aratri. 447  
*Reseda.* 1199  
*Reseda* lutea. ibid. candida. ibid.  
*Resina* Græcis quoniam dicitur. 63  
*Resina* Abiegna Indica 1783. *Car-*  
thaginensis. ibi.  
*Resina* ex *Abiete*, voluti ex *Pinu*,  
ac *Picea* sicca & candida, thus  
ementiens, & vulgo pro co-  
surpata. 55  
*Resina* Colophonia. 72  
*Resina* cretica ex *Lentisco.* 64  
*Resina* *Lentiscina*, vulgo *Mastic.*  
63. 96  
*Resina* liquida omnium præstan-  
tissima ex *Terebintho.* 62  
*Resinam* liquidam fundit *Larix.*  
56. 57  
*Resina* picea 54. *Idaides.* ibi.  
*Resina* unde manant. 69. 70  
*Resina* quoniam dicitur. 72  
*Resina*, *Spargas* dicta, *Epargos*, *Pse-*  
cas, *Stagonia* *Stalactis.* 71  
*Resina* *Strabilina*, *Abielina* *Cere-*  
binthina. 73  
*Resina* *Exodius* vel potius *Exod.*  
71  
*Resina* *Syria* vel potius *Phrygia.*  
ibid.  
*Resina* calida & sicca sunt. 57  
*Resina* coctura. 71  
*Resina* ex *Lentisco* vires. 64  
*Resina* usus varius. 73  
*Resinifera* arbores. 35  
*Reslabonis* *Herbariorum.* 447  
*Rhabarbarum.* 1699  
*Rhabarbarum* *Chagi* *Memet* &  
*Matth.* 1701  
*Rhabarbarum* Indicum. 1901  
*Rhabarbarum* spurium quorundam.  
1080  
*Rhabarbarum* mena horum 601  
606. vires 608  
*Rhapetum*, *Nelen* folio. 1700  
*Rhombus* vires. 142  
*Rhombus* vires. 142  
*Rhombus* vires. 142



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM.

controversa.	138.139	Rosariū genera, Prænestina, Campana, Milestia, Trachymia, Alabandica, Spineola, Centifolia, Græca seu Lychnis, Græcula, Muscheutos, Autumnalis seu Coroncola. icō. 124.125.126	Sagittaria aquatica, Plinij. 1016.
Rhamnus Canaricus.	142	Rosarum loci natales.	Sagitta vel Sagittalis, Herbariorum.
Rhamnus Catharticus.	145	Rosmarinum & Rosmarinum coronarium.	1016
Rhaponticum alterum angustiore folio Lobell.	1701	ronarium.	Sagitta maior, & minor, Matth.
Rhaponticum quarundam officinarum non sine errore.	1286	1365	ibid.
Rha Turcicum sive Poticum.	1600	Rosmarinum sylvestre, sive Bohe-	Sagminalis herba.
Rhexia.	1101	micum. Matth.	1334
Rhodacena mala.	293.294	Rosmaris aculeatus.	Salicaria.
Rhodia radix.	980.981	Rostrum ciconie & Rostrū gruis.	865.1058
Rhododaphne.	144	1275.1277	Salicastrum.
Rhododaphne parua.	192	Rostrum porcinum officinarum.	1419
Rhododendron.	270	564	Salicornia.
Rhododendrum.	244	Ruberta.	1377
Rhodora Gallica Plinij, quorundam.	1064	Rubia. 1329	Salicornia, sive Kali Matthioli.
Rhoë.	257	satina. ibi. sylvestris.	1378
Rhoistria genera Plinio.	107	ibid.	Salinaris.
Rhois multa nomina.	108	Rubia levis Taurinensium, Lobe.	1170
Rhois species Herbarij creditæ.	109	1330	Salunca.
Rhopalon.	1009	Rubia minima Lobellij.	923
Rhus vel Rhois.	106.107.416	ibi.	Salunca Neapolitana.
Rhus sylvestris Plinij, & altera ab illa.	110	Rubi mora.	982
Ribem rubrum male quidam Vnam vni esse putant.	134	Rubi vires ad medic.	Salix, eiusque apud veteres varia genera ex colore, usu, fructu, diate. 274. Matthioli quatuor.
Ribes Arabum.	132	Rubigo.	275
Ribes officinarum.	ibid.	Rubus, eiusque genera.	Salix alba pericalis vulgaris.
Ricinus. 630 Matth.	ibid.	Rubus, caninus, seu Canirubus.	275
Ricinus Americus.	1790	121.	Salix Amerina.
Rithrum.	1481	Rubus idæus spinosus.	111
Roboris appellatio. 1. & 4.		Rubus idæus non spinosus, Chame-	Salix Helice Theophrasti.
Robur ab Haliphloe Plinius distinguunt.	3.	batos Tragi.	277
Robus tritici genus. 374. pondere & nitore præstat.	ibid.	Rubus idæus spinosus, 600.601	Salix Homero & id est, giperda dicta.
Ros Solis & Rorella Herbariorum.	1212.	Rumex.	Salix humilis repens angustifolia.
Rose.	124	Rumex vinctuosus Tragi.	278
Rose temperamta & vires.	128.	Ruscus.	Salix marina.
129		Ruscum vel Ruscus.	279
Rosa Alpina.	270	Ruscum & Ruscum.	Salix phanicephlos, sive phænicea.
Rosa Damascena quæ & Moscha ta, & eius icon. 125. quando stlo ret.	128	Ruta. 72. satina. ibid. sylvestris, Matth.	277
Rosa Damascena & Mesue & veteribus tum Græcis tum Latinis incognita.	130	Ruta canina, Herba S. Antonij, Lob.	Salix platyphyllos lencophleas Matth. & Dalec. altera.
Rosa Græca.	815	973	276
Rosa de Hiericho. Loniceri.	1796	Ruta capraria.	Salix purpurea nigra viminalis.
Rosa Lutea, veteribus indita, & eius descriptio.	125.126	Ruta Harmala, Matth.	ibid.
Rosa Pestana bifida.	128	Ruta muraria.	Salicali.
Rosa Sylvestris multæ varietates.	127	Ruta muraria, paronychia.	1377
Rosa sylvestris Anglicana Pene.	ibid.	Rutula sylvestris, Pena & Matt.	Salvia. 879. maior. ibi. minor quæ & nobilis, ibid. sylvestris ibi.
Rosa sylvestris Pomifera.	ibid.	973	Salvia agrestis, sphaelus Dodon.
Rosa transmarina.	584	Ruthrum Theophrasti.	880
		1481	Salvia baccifera Cretensis. 879.880
			Salvia Romana.
			67.2.678
			Salvia vita.
			1209.1213
			Salutaris herba.
			139
			Samarra quid.
			80
			Sambucus. 266. eius genera. ibid.
			267.268
			Sambucus aquatica. Thraupalus Theophrasti.
			270
			Sambucus Sylvestris.
			98
			Sambucus Sylvestris pro Mandragora. si illa desit, usurpari potest. ibid.
			102
			Sambucus valida.
			102
			Samolium Plinij, quorundam.
			1090
			Sampsu hum.
			881
			Sanamunda.
			685
			Sanamunda prima, Clusij.
			1668
			Sanamunda secunda Clusij.
			1365
			Sanamunda tertia Clusij.
			1669
			Sana sancta sive Tabacum minimum, Lobellij.
			1895



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>S. n. ti spiritus radix.</i>	724	<i>Saxifraga.</i>	1111	1576 sine flore, eiusd.	1577
<i>Sandalides Pama.</i>	364	<i>Saxifraga alba, Fuchsj. seu Saxi</i>		<i>Scilla Matth.</i>	1576
<i>Sandalis.</i>	265	<i>fraga quarta Matthioli.</i>	1113	<i>Scilla pusilla.</i>	1578
<i>Sandaracha.</i>	67	<i>Saxifraga Alpina.</i>	1114	<i>Scirpus quid.</i>	988
<i>Sanguinalis &amp; Sanguinari.</i>	1113	<i>Saxifraga altera Matthioli</i>	1112	<i>Sciscima fagus.</i>	3435
<i>Sanguinaria &amp; Sanguinalis fe-</i>		<i>Saxifraga Anglica Pena.</i>	ibid.	<i>Sclarea.</i>	565
<i>mina.</i>	1072	<i>Saxifraga aurea Dodonai.</i>	1113	<i>Sclarea, sine Scarlea, Herbarioru.</i>	
<i>Sanguinariaradix.</i>	1281	<i>Saxifraga aurea, Lob.</i>	1114	916.	
<i>Sanguinella.</i>	414.423	<i>Saxifraga magna Matth.</i>	1113	<i>Scolecion granum.</i>	28.29
<i>Sanguisorba.</i>	1119	<i>Saxifraga III. Matth.</i>	1112	<i>Scolymus.</i>	1436
<i>Sanguisorba maior, &amp; minor.</i>	1087	<i>Saxifraga seu Saxifragia offici-</i>		<i>Scolymus Dioscoridis, Cynara, sy-</i>	
<i>Sanguis draconis.</i>	6.2	<i>nar.</i>	786	<i>uestris, Pene.</i>	1437
<i>Sanguis Herculis.</i>	1286	<i>Saxifraga Romanorum, Lob.</i>	1114	<i>Scolymus Theophrasti, Clusij.</i>	1438
<i>Sanicula.</i>	1295	<i>Saxifraga vera Dioscor.</i>	1111	<i>Scolopendrium.</i>	1215
<i>Sanicula. 1268 mas.</i>	ibid.	<i>Saxifraga umbellifera Angloru.</i>		<i>Scope regia.</i>	1117
<i>Sanicula femina Fuchsj. ibid. &amp;</i>		711		<i>Scoparia Belueder.</i>	1333
1269		<i>Saxifraga officinarum.</i>	1111	<i>Scordium, Scordolis Plinio.</i>	909
<i>Sanicula femina Fuchsj.</i>	1636	<i>Scabiosa.</i>	1065	<i>Scordium Matthioli.</i>	910
<i>Sanicula maior quorundam.</i>	1181	<i>Scabiosa Hispanica Clusij maior.</i>		<i>Scordolis altera Plinij.</i>	906
<i>Santa'um.</i>	1768	1110		<i>Scordoprasum Matth. 1549. alteru</i>	
<i>Santolina Dodonai, Santonicum</i>		<i>Scabiosa maior vulgaris Pena &amp;</i>		<i>duplex Lob.</i>	
<i>maius Cordi.</i>	945	<i>Lob.</i>	1108	<i>Scorpioides. 1333. Dod. Matth. ibi.</i>	
<i>Sapini nomine Bellonius Piceam</i>		<i>Scabiosa Matthioli maior.</i>	1066.	<i>Scorpioides leguminosa.</i>	493
<i>descripsit.</i>	49	<i>minor.</i>	ibid.	<i>Scorpioides montanum Dal.</i>	1191
<i>Sapinus, Abietis pars inferior.</i>		<i>Scabiosa media Lob.</i>	1110	<i>Scorpio.</i>	609.610
51.53		<i>Scabiosa montana.</i>	1107	<i>Scorpio maritimus.</i>	1387
<i>Saponaria 8.1 maior.</i>	822	<i>Scabiosa montana Dalech.</i>	1108	<i>Scorpiurus.</i>	1388
<i>Saponaria altera.</i>	1186	<i>Scabiosa montana calearum re-</i>		<i>Scorpius alter, primus Plinij, siue</i>	
<i>Saponaria minor, Dalechampi.</i>		<i>gionum, Lob. &amp; Pene.</i>	1110	<i>Gemista spinosa Vlex Plin. 164</i>	
823		<i>Scabiosa montana omnium mini</i>		<i>Scorpius alter quibusdam Aspara</i>	
<i>Saponaria suberu'a.</i>	1877	<i>ma, Pene.</i>	1108	<i>thus II. Hispanus.</i>	283
<i>Sardiana glandes.</i>	30	<i>Scabiosa peregrina Lobellij</i>	1108	<i>Scorpius Theophrasti.</i>	163.164
<i>Sardoa herba.</i>	1028	<i>Scabiosa, seu Stebe Salmantica</i>		<i>Scorzonera.</i>	1206
<i>Sarga. o.</i>	1917	<i>prior, Clusij.</i>	1109	<i>Scorzonera Boimica, Matt.</i>	1207
<i>Saxiphagox.</i>	1282	<i>Scalia</i>	1440	<i>Scorzonera Hispanica, Matt. ibid.</i>	
<i>Sarza parilla vera.</i>	979	<i>Scammonia.</i>	1662	<i>Scourgeon frumentum.</i>	394
<i>Sassafras arbor Monard.</i>	1786	<i>Scammonium.</i>	ibid.	<i>Scrophularia maior.</i>	1247
<i>Sassafras iterarium.</i>	1079	<i>Scammonia, Matthioli.</i>	1662	<i>Scrophularia maior, Matth.</i>	1085
<i>Satureia Dioscoridis &amp; Matthi.</i>		<i>Scammonia maritima Monspelie</i>		<i>Scrophularia minor, quorundam.</i>	
897		<i>sis.</i>	ibid.	1048.	
<i>Satureia durior, Dalechampi.</i>		<i>Scammonia succus, cuius usus est</i>		<i>Scrophularia secunda Dod.</i>	1356
<i>ibid.</i>		<i>quomodo colligendus, &amp; syn-</i>		<i>Scythica herba.</i>	249.250
<i>Satureia lutea, Dalechampi.</i>	899	<i>cerus ab adulterato discernen-</i>		<i>Sebesten officinar.</i>	359
<i>Satureia vulgaris, Matth.</i>	898	<i>dus.</i>	ibid.	<i>Secale.</i>	390.396
<i>Satyrus.</i>	1549	<i>Scammonia succi magnus de-</i>		<i>Securidaca.</i>	444
<i>Satyrum.</i>	1165	<i>lectus habendus, quia nullus</i>		<i>Securidaca montana Matt.</i>	492
<i>Satyrum Basilicum maius, Dod.</i>		<i>nisi varie adulteratus ad nos</i>		<i>Sedar.</i>	345
1568. alterum eiusdem.	1569	<i>affertur.</i>	1664	<i>Sedum.</i>	1128
<i>minus.</i>	ibid.	<i>Scammonij facultates.</i>	1663	<i>Sedum minimum arborescens,</i>	
<i>Satyrum castrum Gemme.</i>	1664	<i>Scammonium tenue Plinij quoru</i>		<i>Lobel.</i>	132
<i>Satyrum Dalechampi. forte Pseu-</i>		<i>dam.</i>	1426	<i>Sedum minimu tertiu, Lob.</i>	1133
<i>do hermodactylus. Matthioli.</i>		<i>Scanaria.</i>	712	<i>Segetalis.</i>	1520
1567		<i>Scandix, Pecten Veneris quorun-</i>		<i>Selago Plinij.</i>	1564
<i>Satyrum erythronium Matthioli</i>		<i>dam.</i>	ibid.	<i>Selago Plinij, siue Comphorata.</i>	
<i>ibid.</i>		<i>Scandulaceum.</i>	660	1200.1201	
<i>Satyrum primum Matthioli.</i>	1568	<i>Scariola.</i>	546.555.556	<i>Selago Plinij quorundam.</i>	1324
<i>Satyrum rubrum Dalecha.</i>	566	<i>Scutum celi, offi in.</i>	1091	<i>Selinas Brasica.</i>	519
<i>Satyrum trifolium, seu album,</i>		<i>Seeba, id est Absinthiu marin.</i>	184	<i>Semen.</i>	384
<i>Dalech.</i>	1567	<i>Schacanthi flores, Lob.</i>	1885	<i>Semen sanctum Matthioli.</i>	945
<i>Sauina officina.</i>	182	<i>Scilla.</i>	1519. 1575	<i>Semen sanctum, semen lumbri-</i>	
<i>Saurion.</i>	645	<i>Scilla Hispanica sine flore, Clusij.</i>		<i>rum, semen cotra officinarum.</i>	545



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM

941.944	unde dicta.	ibid.	to parent eius significatum.
Semina ut à vermiculis non e-	Servilla & Servillum.	722	375
rodantur.	Sesama vel Sesamum.	652	Siliqua. 480
Seminalis.	Sesamoides Cordi.	1639	Siliqua, & Siliqua dulcis. 112
Sempervium.	Sesamoides magnum & paruum.	1668	Siliqua Aegyptia. 113
Sempervium arborescens alterum	Sesamoides minus Dalechampi.	1670	Syliqua siue Cassia cathartica.
Matthioli.	1670	1905	ibid.
Sempervium marinum quorundam	Sesamoides minus Gesneri.	1638	Siliqua Phaeoli Brasiliensi, Lob.
am arum Columelle.	Sesamoides minus Matthio.	1670	bel. 1905
Sempervium montanum.	Sesamoides paruum siue Ocimoi	681	Siliqua. 473 474
Senetio.	des minimum.	482	Siliquearum vires. 113
137. Senetio furtidus Dalechampi.	Sesamum & Sesama.	482	Siliqueas in cibis damnat Galenus.
576	Sesamum verum.	482	ibid.
Senetio maior siue Flos S. Iacobi	Seseli.	748	Siliquastrum Plinij. 631
Fuchij.	Seseli.	748	Siliquastrum Plinij. 678. unde
Senetio maior siue Flos S. Iacobi	Seseli Aethiopicum Matthiol.	748	dictum. 679
Matth.	Seseli Aethiopicum verum.	750	Silybi succu controuersus. 730
Senetio Matth.	Seseli Masiliense.	744.749	Silybum. 1438 1465
Senetionis species Dodon.	Seseli Masiliense, Pena.	749	Silybum, siue Leucacantha Loni
Senetionis genus Myconi.	Seseli Peloponense, Matth.	750	ceri. 1446
Senna. 217. quare Alexandrina	Seseli Peloponense folio Cicuta,	ibid.	Simila. 376
dicta.	Pena.	ibid.	Similago. 379
Senna folij an folliculis maius par	Seseli Peloponense folio Cicuta,	750	Sinapi, & Sinapis. 645
get.	quorundam.	750	Sinapi album Dalechampi. 1168
Senna Mauritanorum.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi Alexandrinum probat
Sentis.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Galenus, sicut Plinius Aegyptium.
Sentis quid.	Seseli pratense, Lobelij.	752	648
Septifolium.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi amarum, Dalechampi.
Serapias candido flore, Lobelij.	Seseli pratense, Lobelij.	752	647
1562	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi echinatum, Dalechampi.
Serapias Dioscor. Gemma. Orchis	Seseli pratense, Lobelij.	752	ibid.
Basilica altera. Cynorchis al-	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi hortense. 646
tera maior Lobbell.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi Persicum 661
Serapias femina pratenfis, siue	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi Persicum quorundam 806
Palma Christi, atyrion basili-	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi rusticum. 651
cum alterum Dod.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi sativum. 646
Serapias minor rubra, Gemma.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi sylvestre. 642.646
1562	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sinapi & Thlaspi media Provin-
Serapias montana folio leui Gom	Seseli pratense, Lobelij.	752	cialis planta Pena. 1183
ma.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Singadi. 181
Serapias palustris altera leptophy	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sion. 658
la. Gemma.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sirium. 1496
Serapias palustris III. Gemma.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisara. 185. 1482
1563	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisarum. 722
Sericazihyptha 357 controuersum	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisarum maius, Matth.
an eadem.	Seseli pratense, Lobelij.	752	723
Seris.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisefios. 748
Seris sativa Lobelij.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Siser. 722
Serpentaria.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Siser palustre. 723
Serpentaria maior vulgo dicta.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sison. 708
ibid.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sison seu Petroselinum Macedo-
Serpentaria minor.	Seseli pratense, Lobelij.	752	nicum Dodon. 709
Serpentaria minor, Matth.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium. 676. unde dictum.
maior, eiusd.	Seseli pratense, Lobelij.	752	ibid.
Serpina omnium minima, Lobel.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium aquaticum, Matth.
669	Seseli pratense, Lobelij.	752	1094
Serpyllum 902. Matth. & Nar-	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium, Cardamine l. Cres-
bonense Lob.	Seseli pratense, Lobelij.	752	sio vulgaris Matth. 658
Serpyllum zygia Dioscor.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium, Cardamine l. Mat-
1152. 1282. 1357	Seseli pratense, Lobelij.	752	thioli. 1168
Serta vel Sertula Campana.	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium, Cardamine l. Do-
511.	Seseli pratense, Lobelij.	752	donat. 659
	Seseli pratense, Lobelij.	752	Sisymbrium



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Sisymbrium hortense.</i>	677	<i>Solea equina, siue Securidaca mō-</i>	<i>Spina quid.</i>	1435
<i>Sisymbrium silvestre.</i>	ibid.	<i>rana, Matth.</i>	<i>Spina unde nomen accepit.</i>	161
<i>Sisyrinchion Dodonæi.</i>	1579.1580	<i>Solidago.</i>	<i>Spina &amp; Spina Aegyptia.</i>	160
<i>minus Clusij.</i>	1580	<i>Solidago medica.</i>	<i>Spina acris.</i>	134
<i>Sisyrinchium quorundam.</i>	1625	<i>Solidago minor.</i>	<i>Spina alba.</i>	135.139.1462
<i>Sium.</i>	1091	<i>Solidago Sarracenica.</i>	<i>Spina alba Dalechampi.</i>	ibid.
<i>Sium alterum, Fruce folio.</i>	1094	<i>Solidago Sarracenica Fuchsj. ibi.</i>	<i>Spina alba hortensis Fuchsj. ibid.</i>	ibid.
<i>Sium non odoratum Tragi.</i>	1090	<i>Lob.</i>	<i>Spina alba altera Matthioli.</i>	1463
<i>Sium verum, Matthiol.</i>	1092. vul	<i>Solis flos, &amp; Sol Indianus.</i>	<i>Spina alba Matth.</i>	1462
<i>gare, eiusdem. ibid. Grateuæ,</i>		<i>Somphos.</i>	<i>Spina Appendix Plinij.</i>	135. 137.
<i>maius Dodonæi.</i>	ibid.	<i>Sonchus.</i>	<i>quare ita appellata.</i>	138
<i>Smilax.</i>	24.1421	<i>Sonchus asperior Lob.</i>	<i>Spina Arabica.</i>	160.1467
<i>Smilacis anceps &amp; multiplex si-</i>		<i>Sonchus asper Matth.</i>	<i>Spina Arabica &amp; Aegyptia.</i>	1466
<i>gnificatio errorem saepe inducit</i>		<i>Sonchus dendroides Dalechamp.</i>	<i>Spina infectoria.</i>	145
<i>in re herbaria.</i>	24		<i>Spina mollis,</i>	582
<i>Smilax Arcadum.</i>	ibid.		<i>Spina peregrina.</i>	1481.1482
<i>Smilax aspera Matthio.</i>	1422		<i>Spina purgatoria.</i>	1486
<i>Smilax hortensis, seu Dolichus.</i>			<i>Spina regia.</i>	1464
	473.474		<i>Spinacia, siue Spinachia, siue Spi-</i>	
<i>Smilax humilis angustifo. folio</i>			<i>nacem olus. 543. veteribus in</i>	
<i>non ferrato.</i>	25		<i>cognita.</i>	544
<i>Smilax leuis Matth.</i>	1423		<i>Spinuimera.</i>	134
<i>Smyrnium.</i>	706		<i>Spinus.</i>	130
<i>Smyrnium Creticum.</i>	707		<i>Spinus ceruinus.</i>	139
<i>Smyrnium Matth.</i>	ibid.		<i>Spica a Theoph.</i>	256
<i>Smyrnium verum Dioscoridis &amp;</i>			<i>Splith album quorundam.</i>	1294
<i>Dodon.</i>	ibid.		<i>Splith hylirorum.</i>	1292.1293
<i>Socotorina Aloë.</i>	1693.1695		<i>Spondylium.</i>	733
<i>Solanum.</i>	596.1719		<i>Spondylium alterum Dodon.</i>	739
<i>Solanum arborifcens.</i>	600		<i>Spögia in radicibus Asparagi.</i>	611
<i>Solanum Halicacabum, Matthio.</i>			<i>Spurry Belgarum &amp; Anglorum</i>	
	597			1331
<i>Solanum hortense.</i>	ibid.		<i>Squilla.</i>	1375
<i>Solanum hortense Grecorum</i>	1429		<i>Squinanthum officin.</i>	1884
<i>Solanum indicum, seu Americu,</i>			<i>Stachys. 962. Matthi. 963. Fuchsj.</i>	
<i>Dalechampi.</i>	99		<i>ibid.</i>	
<i>Solanum igneum, vel lignosum.</i>			<i>Stachys Lusitanica quorundam,</i>	
	1407.1413		<i>Lob.</i>	964
<i>Solanum lignosum quorundam</i>			<i>Statice.</i>	1755.1756
<i>Herbariorum.</i>	1338		<i>Staphis agria.</i>	1408
<i>Solani manici forma.</i>	1721		<i>Staphis agria. 1629. Matthio. ibid.</i>	
<i>Solanum monococon Gesneri.</i>	1372		<i>Staphyloendron.</i>	102
<i>Solanum pomiferum Herbarioru.</i>			<i>Statice Dalech.</i>	1190
	632		<i>Stella leguminosa Lobellij.</i>	493
<i>Solanum somnificum, Fuchsj.</i>			<i>Stellaria. 1175. 1281. 1342. 1384.</i>	
	1721			1473
<i>Solanum somnificum, Matthio.</i>			<i>Stelephuros.</i>	419
	1720		<i>Stelis Euboeorum.</i>	17
<i>Solanum somnificum alterum.</i>			<i>Stephanomelis, Plinij. quorundam.</i>	
<i>Matthioli.</i>	1720			1064
<i>Solanorum vires &amp; temperamen</i>			<i>Stephanos Alexandri.</i>	210
<i>ta.</i>	598		<i>Stergethrum.</i>	1128
<i>Solaris.</i>	1349		<i>Strobon, Ladanum quidam dixe</i>	
<i>Solatrium maius, Herbarior. mor</i>			<i>runt.</i>	227
<i>tale officinar. Solanum lethale,</i>			<i>Stachas viridis, Dalech.</i>	781
<i>quorundam.</i>	1721		<i>Stirpes plurime iisdem qualitati</i>	
<i>Solatrium officinarum.</i>	596		<i>bus, viribusque prædita. for</i>	
<i>Solbafrella.</i>	1087		<i>ma &amp; genere sunt diuersæ. 196</i>	
<i>Soldanella officinarum.</i>	526		<i>Stirpes multe heliotropie &amp; he</i>	
<i>Solea equina.</i>	492		<i>lioscopie.</i>	1349
<i>Solea equina, Dalechampi. ibid.</i>			<i>Stirpes quæ non nisi aliis innixæ</i>	
			<i>sciandun</i>	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

scandunt.	1401	Syagri.	364	Targon.	685
Stirpes Umbelliferæ.	688	Sycomotorus.	220. 340	Taurion.	815
in Stirpibus, ut in cæteris rebus,		Sycomotorus unde nomen habeat.		Taxus.	24
interdum aut monstrata existit		341. & 342		Taxus eiusque descriptio, ubi	
aut prodigiosa quædam, & digna		Sycomotorus, Aegypti peculiaris ar-		frequens nascatur & quo an-	
que literarum monumentis co-		bor.	342	ni tempore. 78. 79 quibus no-	
signentur.	522	Sycomeri succus.	327	cendi præcipue viribus. ibid. de	
Stirpis eiusdem non omnes partes		Syderitis quarta Plinij.	576	eius temperamento, quæst. ibi.	
ad idem utiles.	1596	Sylva mater.	1427	Taxi vel umbra let. l. 24. non	
Stirpium differentie aliquot	688	Symeonis herba.	593	ubique.	15
Sticas Citrina, sine Sticados		Symphonia vel Symphona, vel		Taxi umbra sub ea obdormienti-	
Citrinum officinarum.	779	Symphena Plinij.	540	bus letifera.	779
Stabe, Theophr.	1015. 1016	Symphytum magi. 1074. Mar-		Teda arbor, Cembro Italorū, eius	
Stabe Salmatia altera Clusij.	1109	thio ibid. tuberosum, Lobe l. j.		natales forma, & usus.	47. 48
Stachas & Stichas.	917	ibid.		Teda quid sit, quando id multos	
Stachas capitulis foliatis.	918	Symphytum petraeum.	1310	exercuit, diff. suis explicatum.	
Stachas Citrina.	775. 779	Symphytum petraeum, Matt.	1174		49
Stachas Citrina, Matth. Stachas		Lob. ibid.		Teda vocis multiplex significa-	
Citrina altera.	779	Symphytum pumilum repens Bor-		tio.	48
Stachas Matthioli.	918	raginis facie, Lob.	580	Tembul.	1777. 1778
Storax calamita offic.	115	Symphytum quorundam.	1205	Thecambrotum Persarum.	540
Strangulator L. opardi.	1203	Synanchia. 1. 85. Dalecham ibid.		Telephium.	551. 1315
Stratiotes aquaticus.	1061	Synanchia species. Luncaria Sal-		Telephium floribus purpureis, Lo-	
Stratiotes lutea Clusij.	771	manticensis, Clusij.	1185	bellij.	1315
Stratiotes millefolia.	768	Syringa.	355	Telephium Hispanicum, Clusij.	
Stratiotes millefolia maior, Matt.		Syringa ceruleo flore, Lilac. Mat.			136
769		355		Telephium minus semper virens	
Stratiotes millefolia minor, Matt.				Lob.	1316
769				Telephium purpurascens, Fuchsf.	
Stratiotes millefolium aquaticum,					1315
Matth.	770			Terra capillus.	1209
Strobilus.	4352			Terra corona.	1310
Strumaria quorundam.	1056			Terra merita.	1822
Strumea, Herbariorum.	1057			Terebintharia Dilfij.	5156
Strumus.	596. 599. 1429			Terebinthina Veneta & eius col-	
Struthia mala & Struthiomele.				ligende ratio.	54
290				Terebinthina Veneta que vulgo	
Struthium.	1186			dicunt, Venetias affertur ex	
Struthium Fuchfij.	823			Cypro.	62
Struthium quorundam.	820			Terebinthinum oleum ex fructu	
Strychnodendrum.	600			mature Terebinthi.	ibid
Strychnus.	526. 599. 1429			Terebinthus.	61
Stubulus.	47			Terebinthus apud Syros Picem	
Styrax. 1. eius vires.	116. 117			fundit.	74
Styrax ut adulteretur.	116			Terebinthus Indica Theophras-	
Styracis liquidi apud veteres nul-				sti. 361	
lamentio.	116			Testiculus canis.	1549
Suber. 22. eius duo genera. ibid.				Testiculi 11. species Matthioli.	
Suber detracto in orbem cortice e-					1551
tiam innatur, contra cæterarū				Testiculus morionis samina, Do-	
arborum naturam.	23			don.	1552
Suber tardissime cariem sentit.				Testiculus morionis mas, Dodon.	
ibid.				ibid.	
Suberia vires.	ibid.			Testiculus odoratus Dodonai.	
Succisa.	1066				1555
Succus ex Tribulo.	514			Testiculus vulpis Dodonai.	
Succus Auicenne.	1200				1556
Su plur Quittenf.	1793			Tetrahit Herbariorum & offi-	
Supercilium terra.	1209			narum.	1118
Sura.	1761			Tetrahit, Herba Iudaica, Sideri-	
Surungen Serapionis.	1572			tis prima, Fuchfij.	1119

## T

T	Abacū sine Nicotiana.	1895
T	Tacamahaca.	1792
Tagetes Indica Fuchfij.	840	
Tal.	1849	
Talcution.	1205	
Talisfar.	1776	
Tamalapatra cum suo ramusculo.		
	177	
Tamaraka & Maraka.	1845	
Tamarindi.	1889	
Tamarindi folia fructus, semina,		
Oxyphenicum perperam credi-		
tum, Lob.	1690	
Tamariscus officin.	179	
Tamarix seu Amarice.	179	
Tamaricis Matt. Germanica, Nar-		
bonensis icones. Tamaricis.	180	
Tanacetum.	955. 1147	
Tanacetum parvum Alpinum.	956	
lanuginosum. ibid. minus, can-		
didis floribus, Lobellij.	ibid.	
cristatum Anglicum, Lobellij.		
ibid.		
Tanacetum Peruvianum.	839	
Tapsus barbatus officin.	1298	
Taraxacon quidam vocant filue		
stre Cichorij genus, quod alij		
Hedypnoiden.	564	
Tarchon.	685	
Tarentine nuces.	31	
Tarentine nuces.	48	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Tetrabit. Sideritis Heraclea Dio-</i>	<i>Thora.</i>	1745	<i>tholi.</i>	1644
<i>scoridis. ibi.</i>	<i>Thora unde dicatur.</i>	1736	<i>Tithymalus Helioscopius, Dodon.</i>	
<i>Tetragonia Theophrasti.</i>	<i>Thorybetron.</i>	1344	1637	
<i>Tetralice.</i>	<i>Thua arbor, &amp; super ea varia</i>		<i>Tithymalus Helioscopius, Dod.</i>	
<i>Tetralix.</i>	<i>disfidentium opiniones.</i>	59	1648	
<i>Tetralix spinosa Tragi.</i>	<i>Thua genera quatuor. ibid. &amp;</i>		<i>Tithymalus Helioscopius Matth.</i>	
<i>Tetraphyllum.</i>	60.61		1644	
<i>Tetrorchis, vel Triorchis alba</i>	<i>Thua genus tertium, Arbor vi-</i>		<i>Tithymalus leptophyllos, Matth.</i>	
<i>Gemmae.</i>	<i>ta Gallia.</i>	60	1645	
<i>Teucrium.</i>	<i>Thua Massiliensis.</i>	183	<i>Tithymalus Myrsinites seu fe-</i>	
<i>Teucrium 1165 primum, Matth.</i>	<i>Thua odorata.</i>	110	<i>mina, Matth.</i>	1642
<i>ibid. alterum eiusdem.</i>	<i>Thuid quod apud Homerū, Citriū</i>		<i>Tithymalus Myrsinites melius</i>	
<i>Teucrium Babium Clusij. ibid.</i>	<i>interpretatur Macrobius.</i>	61	<i>expressus.</i>	1643
<i>Teucrium.</i>	<i>Thurifera arbor Theophrasti.</i>	174	<i>Tithymalus paralius, Do. ex hist.</i>	
<i>Thalictrum tenuifolium, Cordi.</i>	<i>Thurs adulteratio.</i>	71	<i>purgant.</i>	1647
1081	<i>Thus.</i>	1752	<i>Tithymalus paralius, Dod. &amp; Pe-</i>	
<i>Thalictrum Dod.</i>	<i>Thus terra.</i>	1159	<i>ne.</i>	1647
<i>Thalictrum magnum, Dod.</i>	<i>Thuris hypidi folium, Pene.</i>		<i>Tithymalus paralius, Matthioli.</i>	
1080	1754		1643	
<i>Thapsa.</i>	<i>Thura Massiliensis.</i>	40	<i>Tithymalus platyphyllos, Clus. &amp;</i>	
<i>Thapsia.</i>	<i>Thymbra &amp; Satureia.</i>	894	<i>Dod.</i>	1649
<i>Thapsia Matth.</i>	<i>Thymbra Dod.</i>	898	<i>Tithymalus ferratus Dale.</i>	1649
<i>Thapsia Pene vera.</i>	<i>Thymbra vera, Pene.</i>	897	<i>verrucosus, eiusd.</i>	1650
<i>ibid.</i>	<i>Thymelaea. 1666. Matth. ibi. Dod.</i>		<i>Tithimalus tuberosus sine Apios.</i>	
<i>Thapsia Tragi.</i>	<i>ibid.</i>		1751	
<i>Thapsia nux.</i>	<i>Thymelaea species Mycono.</i>	1668	<i>Tomentaria, seu Tomentaria.</i>	1115
<i>Thelyphonum.</i>	<i>Thymelaea vera Clusij, &amp; Dod.</i>		<i>Tora Valdensium, Aconitum l.</i>	
<i>Theriacaria.</i>	<i>histor. purgant.</i>	1657	<i>Diosc. Celsi.</i>	1735
<i>Therionarca Plinij.</i>	<i>Thymus &amp; Thymum.</i>	829. 1652	<i>Tordylium.</i>	748. 751
<i>Theron Daeb. Endivia Tragi.</i>	<i>Thymum Creticum.</i>	900	<i>Tordylium, Dod.</i>	751
564	<i>Thymum vulgare, sine durius,</i>		<i>Tordylium, selsi Creticum, Lo-</i>	
<i>Thlasia &amp; Thlaspe. 660. 1180.</i>	<i>Dod.</i>	901	<i>bellij.</i>	752
<i>Thlaspi angustifolium Dodo. &amp;</i>	<i>Thysellium Plinij.</i>	701	<i>Tordylium, sine selsi Creticum</i>	
<i>Fuchsij.</i>	<i>Tibulus.</i>	47	<i>maius. Lob.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Thlaspi angustifolium Fuchsij.</i>	<i>Tilephon.</i>	1128	<i>Tormentilla.</i>	1267
692	<i>Tilia.</i>	89	<i>Tormentilla candida.</i>	1175
<i>Thlaspi fruticosum, foliis Leucoj</i>	<i>Tilia locus, temperamenta, vires</i>		<i>Totabona vulgi.</i>	602
<i>marini maius.</i>	<i>&amp; v. sus.</i>	91	<i>Toxicon Ladanium in Africa.</i>	
<i>Thlaspi fruticosum spinosum Nar-</i>	<i>Tilium confundit Plinius cum</i>		230	
<i>b. mense.</i>	<i>Philyrea.</i>	90	<i>Trachelium 829. maius. ibid. mi-</i>	
<i>Thlaspi fruticosum alterum, Lob.</i>	<i>Tinearea.</i>	779	<i>mus.</i>	830
<i>ibid.</i>	<i>Tinctorium granum.</i>	151	<i>Trachelium maius, sine Funlla-</i>	
<i>Thlaspi Hederaceum Lobellij.</i>	<i>Tinctorius flos, sine Genista hu-</i>		<i>rea Dod.</i>	1197
1420	<i>mi's.</i>	174	<i>Trachelium montanum, Dalech.</i>	
<i>Thlaspi incanum Mechlentense,</i>	<i>Tipha &amp; Tiphe. 375. 389. 190. 92</i>		1202	
<i>Lob.</i>	<i>Tiphium.</i>	806. 1050	<i>Tragacantha.</i>	1477
<i>Thlaspi maius Cordi.</i>	<i>Tiphium Theophrasti. 1050. 1503</i>		<i>Tragacantha a'era sine Poterij.</i>	
<i>Thlaspi maritimum.</i>	<i>Tithyma.</i>	1642	<i>Clusij.</i>	1478
<i>Thlaspi l. Matth.</i>	<i>Tithymalus characias, Matth. se-</i>		<i>Tragacantha lacryma.</i>	1477
<i>Thlaspi l. Matth.</i>	<i>cundus, T. od.</i>	1642	<i>Tragacantha Matth.</i>	1478
<i>Thlaspi l. Matth.</i>	<i>Tithymalus characias primus,</i>		<i>Tragium secundum Dioscoridis</i>	
<i>Thlaspi l. Matth.</i>	<i>Dod.</i>	1645	<i>quorundam.</i>	1313
<i>Thlaspi minus clypeatum, Pene.</i>	<i>Tithymalus characias quartus,</i>		<i>Tragon Matthioli &amp; Lobellij.</i>	1388
1183	<i>T. od.</i>	1645	1389	
<i>Thlaspi montanum candidum.</i>	<i>Tithymalus Cyparissias, Dodon.</i>		<i>Tragopogon.</i>	712
1180	1648		<i>Tragopogon, Matth. 1078 alterū</i>	
<i>Thlaspi montanum minimū, Da-</i>	<i>Tithymalus Cyparissias, Matth.</i>		<i>eiusdem.</i>	1079
<i>leb.</i>	1644		<i>ibid.</i>	
<i>Thlaspi Narbonense Pene.</i>	<i>Tithymalus dendroides, Dodo-</i>		<i>Tragopogon spicatus.</i>	1550. 1553
<i>Thlaspi secundum sine Cratene.</i>	<i>nei, ex codic. e. Celsar. 1645</i>		<i>Tragorhis.</i>	
<i>quorundam.</i>	<i>Tithymalus dendroides, Mat-</i>		<i>Tragorhis minor &amp; verior, Gē-</i>	
826			<i>me.</i>	1557
<i>Thlaspi umbellatum, Pene. 1183</i>			<i>Trago</i>	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Tragoriganum.	888	Triphyllum.	1353	pina, Clusij. ibid. montana mi-	
Tragoriganum II. Clusij.	890	Tripolium Dodon.	1389	nima, Lob.	ibid.
Tragoriganum, Matth. 888. Dod.		Tripolium vulgare Lob. 1390. mi-		Typha palustris, 994. aquatica. ibi-	
ibid. Monspeliense, Dalecham.		nus eiusdem.	ibid.	minor, Pene.	995
889. notum eiusd.	ibid.	Trithales.	1128		
Tragus frumenti genus, Spica cæ-		Trisiana Brassica nostra.	521		
rulea.	376. 377. 391	Triticum ex Dalechampi sententia			
Tragus Matth.	1477	diuisio.	374		
Tragus, siue Scorpiomarinus.		Triticum vires & temperamenta.			
1387. Dalech.	1388	381			
Trasi. 1584. cum flore, Matt. ibid.		Triticum usus tum in alimentis,			
Tribulus.	512	tum in medicina.	378		
Tribulus aquaticus.	514	Triticum.	371		
Tribulus aquaticus, marinus of-		Triticum Boninum.	419		
ficin.	1082	Triticum candidum præstantius			
Tribulus marinus.	1367	rufo ad panificium.	374		
Tribulus minor rectus Dalecha.		Triticum indicum.	381		
513		Triticum indicum Matthioli.			
Tribulus terrestris.	512	382			
Tribulus terrestris Matth.	513	Triticum nigrum.	1136. 1137		
Tribulus terrestris minor repens.		Triticum ramosum. 376. Centigra-			
514		num.	376		
Trichomanes.	1209. 1211	Triticum rufum.	375		
Trichomanes aquaticum.	1022	Triticum Spica mutica.	378		
Tricoccum pomum Mespil.	334	Triticum Tetrinum.	393		
Trifolium.	503	Triticum Turcicum Fuchsj.	382		
Trifolium acetosum. 1354. 1355		Triticum vaccinum siue boui-			
Trifolium ex America, Dodon.		num.	136		
506		Triticum vaccinum, siue Melam-			
Trifolium Asphaltites logioribus		pyrum.	419		
folijs.	504	Triphago siue Tryxago.	1162		
Trifolium Asphaltites rotundis		Triphago palustris.	909		
folijs.	ibid.	Trychnus.	596		
Trifolium cochlearum.	503	Tuber.	1604		
Trifolium equinum.	259	Tubera & Fungi. 1585. 1586. 1587			
Trifolium Hepaticum.	1274	Tubera duo genera.	317		
Trifolium luteum minimum, Pe-		Tubera, Matth.	1585		
na & Lob.	1354	Tuberaria maior Myconi.	1099		
Trifolium minus.	1076	Tuberaria minor Myconi.	ibid.		
Trifolium odoratum alteru, siue		Tubuli ad asthma vitiles.	1922		
fatium.	506	Tubulus.	4752		
Trifolium pratense luteum, Fuch-		Tulipa 1493. 1528. maior Clusij.			
sj.	1155	1529. minor Dod.	ibid.		
Trifolium pratense I. Matth. 1354		Tulipa siue Lilionarcissus luteus			
alterum eiusdem.	ibid.	latifolius. Lob.	1530		
Trifolium pratense Salamanticu,		Tune Indorum.	1795		
Clusij.	1356	Tunica minima Dalechampi.			
Triorchis. 1286. vne dicta.	1287	1191			
Triorchis lutea, flore luteo Gem-		Tunica seu unice officin.	806		
ma. I. Lob.	1561	Turbith Alexandrinum, quorum-			
Triorchis lutea Gemma, Lobellij.		dam.	1646		
1561		Turbith nigrum quorumdam.			
Triorchis Serapias, Aegineta.		1655			
1569		Turfanum.	1495		
Triorchis Serapias mas, Fuchsj.		Turpetum nigrum Aëtuarij.	1653		
1554		Turpetum officin.	1680		
Triorchis Serapias secundus, Do-		Tusilago, siue Farfugium, Mat-			
donci, Matthioli Tyfticulus		thioli.	1049		
II.	1555	Tusilago. 1050. Matth.	1051		
Triorchis Serapias III. Dodonci.		Tusilago Alpina, siue montana,			
ibid.		Dalechampi. 1052. altera Al-			

V

Accaria rubra maior. 55  
Vaccaria rubra minor.  
ibid.  
Vaccinia nigra. 192. rubra. eodem  
fol.  
Vaccinium. 253. 254  
Vaccinium nigrum. 200  
Vaccinium palustre. 187  
Vaccinium Plinij, Lacatba Theo-  
phrast. 255  
Valeriana maior & hortensis.  
927  
Valeriana montana. 1127  
Valeriana rubra. 1186  
Valeriana sylvestris maior, Dodon.  
Phu parum, Matt. 1042  
Valeriana sylvestris minor, Phu-  
minum Dodon. 1042.  
814  
Vallaria.  
Vehna alba Auicenne. 1147  
Venis inter se plerumque con-  
traria natura. 505  
Veratrum album. 1631  
Venerea. 1617  
Veratrum nigrum. 1633  
Verbasculum minimum. 1304  
Verbasculus Alpinus, Dalecham-  
py. 1126  
Verbasculum quorundam. 1303  
Verbascum. 1298. eius genera.  
ibid.  
Verbascum album femina flore  
albo, Dod & Fuchsj. 1100  
Verbascum album mas, Fuch. &  
104. flore luteo. 1301  
Verbascum femina, Lobellij.  
1300  
Verbascum laciniatum, Matthiol.  
1301. 1302  
Verbascum I. Matthioli. 1298:  
II. & III. eiusdem. 1299  
Verbascum nigrum Salusfolium,  
Lob. 1299  
Verbascum sylvestre Dodonci.  
1301  
Verbascum sylvestre exoticum,  
Lob. 1301. 1302  
Verbascum sylvestre, folio Saluie  
tenuifolia. Lob. 1301  
Verbascum IIII. sylvestre, Mat-  
thioli. 1300  
Verbascum sylvestre Monspeliem-  
sium. 1304  
Verbena & Verbenaca. 1334  
2



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Verbena Perùana.</i>	1920	<i>Vinum ex Berberi.</i>	137	<i>Viscum apud Gallorum veterum</i>	
<i>Verbenaca recta Dod.</i>	1336	<i>Vinum ex Castaneis apud Indos,</i>		<i>Druydas in magna veneratio</i>	
<i>Verbenaca recta siue mas, Fuchsf.</i>	1335	<i>trad. nte Curtio.</i>	33	<i>ne.</i>	180
<i>Verbenaca supina &amp; tenuifolia,</i>	1337	<i>Vinum ex Cydonijs.</i>	291	<i>Viscum exitio est arboribus. ibid.</i>	
<i>Clusij.</i>	1337	<i>Vinum de Loto Celti.</i>	347.348.349	<i>Viscum Indicum.</i>	180
<i>Verbenaca vulgaris, Matthioli.</i>	1335	<i>Vinum emalis.</i>	289	<i>Viscum neotericeis quibusdam</i>	
<i>Veretrum.</i>	1505	<i>Vini myrtites. 241. obsoleuit.</i>	242	<i>quare Lignum sancta cecis</i>	
<i>Vermicularis siue Illecebra maior</i>		<i>Vinum de Pyris.</i>	308	<i>dictum.</i>	19
<i>Lobellij siue Semperuium mi</i>		<i>Vinum Rhoetes ex Punicis matu</i>		<i>Viscum inolea.</i>	18
<i>nus a terum Dod.</i>	1132	<i>ris.</i>	306	<i>Viscum de quercu.</i>	19
<i>Vermicularis officinarum.</i>	1128	<i>Viola alba.</i>	1526	<i>Viscum sine radice arboribus ad</i>	
<i>Vermiculatus frutex maior. Lo</i>		<i>Viola albulbosa. Fuchsf.</i>	1527	<i>nasctur, &amp; quibus.</i>	18
<i>bellij.</i>	1132	<i>Violabarbata maior. 810. latifolia</i>		<i>Viscum ad aucupia ex radicibus</i>	
<i>Vernicis fici vires.</i>	69	<i>&amp; angustifolia. ibid.</i>		<i>Viburni.</i>	257
<i>Vernix.</i>	39	<i>Viola flammica, siue tricolor. 800</i>		<i>Visnaga Gingidium Dod.</i>	711
<i>Vernix quid, &amp; unde fiat. 67. 68</i>		<i>maior Matth. ibid. minor, seu</i>		<i>Visnaga, Gingidium Matthioli.</i>	
<i>Vreco'aris.</i>	1241	<i>Iacea altera, eiusdem. ibid.</i>			710
<i>Vrinalis &amp; Vrinararia.</i>	1332	<i>Iacea.</i>	800	<i>Vitalba.</i>	1407. 1605
<i>Veronica fœmina. 1050. Dodon.</i>		<i>Viola latifolia, aut peregrina. 805</i>		<i>Vitalis Apuleij.</i>	1128
<i>&amp; Matth. ibi.</i>		<i>Viola lutea multiplex.</i>	803	<i>Vitex.</i>	280
<i>Veronica fœmina Fuchsf. 1139.</i>		<i>Viola Mariana, Medium Diofco</i>		<i>Vitex à Salice Amerina multum</i>	
<i>Veronica mas.</i>	1338	<i>rid.</i>	825	<i>differt.</i>	278
<i>Veronica mas Fuchsf. 1319. Matth.</i>		<i>Viola matronalis, vel Viola Da</i>		<i>Viticella vulgi.</i>	1409
<i>ibid.</i>		<i>masцена &amp; marina 804. alba</i>		<i>Vitis. 1401. vinifera. ibid. &amp;</i>	
<i>Veronica maxima. Dalech.</i>	1165	<i>&amp; purpurea. ibi.</i>			1402.
<i>Veronica recta minima, Lobellij.</i>	1319	<i>Viola palustris.</i>	1022	<i>Vitis alba.</i>	1409
<i>Verrucaria.</i>	134	<i>Viola purpurea.</i>	797	<i>Vitis Idea Theophrasti, Alexadri</i>	
<i>Verrucaria alia minor.</i>	1350	<i>Viola purpurea, Matth.</i>	798	<i>na Plinij.</i>	191
<i>Verrucaria Chondrilla prior.</i>	559	<i>Viperina. Vierna 1413</i>	1104	<i>Vitis insana.</i>	1406
<i>Vescaria. 596. 598. repens.</i>	597	<i>Virga aurea altera, Lob.</i>	1273	<i>Vitis nigra.</i>	1407
<i>Vetonica.</i>	1282	<i>Virga aurea. 1272. Matth. ibid.</i>		<i>Vitis nigra &amp; Vitis Chironia.</i>	
<i>Vetonica coronaria Fuchsf., alti</i>		<i>Dod.</i>	ibid.		1411. 1415
<i>lis &amp; coronaria Dodo. Canta</i>		<i>Virga lanalis Ouidij, Rhamnus</i>		<i>Vitis partium vires &amp; tempera</i>	
<i>brica Pene.</i>	8. 6	<i>seu spina alba, &amp; eius mire</i>		<i>menta.</i>	1402
<i>Vetonica sylvestris, Dodon.</i>	1068	<i>vires aduersus fascinum. 142</i>		<i>Vitis Precia.</i>	131
<i>Vgetal.</i>	1849	<i>Virga pastoris.</i>	1447	<i>Vitis sylvestris. 257. 1406. 1407.</i>	
<i>Vhebebason.</i>	1845	<i>Virga sanguinea Plinij.</i>	197		1629
<i>Viburnum, Spirea Theophr.</i>	256	<i>Virga sanguinea Plinij.</i>	270	<i>Vitis sylvestris, Dalech. Clematis</i>	
<i>Vicia.</i>	478	<i>Viscaria planta, Pene.</i>	683. 684	<i>III. Matth.</i>	1407. 1408
<i>Vicia sylvestris.</i>	479	<i>Visci confectio varia.</i>	19	<i>Vlex Plinij.</i>	164
<i>Vicia vera, Aphaca Matthioli.</i>	478	<i>Visci discrimina.</i>	18	<i>Vlmaria.</i>	1081
<i>Vinca peruinca.</i>	211. 832	<i>Visci planta descriptio. ibid.</i>		<i>Vlmi vires ad med.</i>	81
<i>Vincetoxicum siue Asclepias Fuch</i>		<i>Visci quercini ad superstitionem</i>		<i>Vlmus, eius genera, &amp; forma. 80</i>	
<i>sf.</i>	1144	<i>etiam inter Christianos abu</i>		<i>Vlmus Alnia siue montosa. 81</i>	
<i>Vincetoxicum Matth.</i>	ibid.	<i>sus.</i>	19	<i>Vlmus Samarā fert. prater quo</i>	
<i>Vincetoxicum officinarum. ibid.</i>		<i>Visci temperamenta &amp; vires. 18.</i>		<i>rundam sententiam 80. &amp; gu</i>	
<i>Vinteranus cortex.</i>	1858		19.20	<i>mi. 81. cachryn.</i>	688
<i>Vina picata.</i>	76	<i>Visci tria an plura genera. 17. 18</i>		<i>Vmbellifera plante.</i>	
<i>Vini medicina radix.</i>	1698	<i>Visci vsus.</i>	19	<i>Vmbilicus marinus Monspelien</i>	
<i>Vinis condiendis misceri solita à</i>		<i>de Visco per alium animum red</i>		<i>sum.</i>	1362
<i>veteribus.</i>	77	<i>dito animaduersione digna.</i>		<i>Vmbilicus terræ.</i>	1604
<i>Vinogalla, quæ à Grecis divouit.</i>	15		19.20	<i>Vmbilicus veneris aquaticus of</i>	
<i>Vinum acinaticum, seu Coquere</i>		<i>Visco arboreo carent Insu</i>		<i>ficinar.</i>	1091
<i>ticum.</i>	599	<i>res.</i>	19	<i>Vmbilicus Veneris alt. r</i>	1322
		<i>Viscum.</i>	17. 1457. 1458	<i>Vmbilicus Veneris. 1608. Matth.</i>	
		<i>Viscum ex Aquifolio.</i>	148	<i>ibid.</i>	
		<i>Viscum ex radice Chondrille.</i>	568		196. 198. 199
		<i>Viscum Damascenum, quod fit</i>		<i>Vnifra.</i>	1186
		<i>ex myxis, querno bonitate ce</i>		<i>Vngues Rosarum quid.</i>	116
		<i>dit.</i>	19	<i>Vngula caballina officinarum.</i>	
					1050
					Vnifolium



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

<i>Vnifolium.</i>	1260	<i>Vua marina quorundam.</i>	1397	<i>Tuca.</i>	1908
<i>Vnio Cape genus.</i>	1538	<i>Vua marina vulgaris, Clus.</i>	1070	<i>Z</i>	
<i>Volubilis aculeata.</i>	1421	<i>Vua passa.</i>	1404	<i>Z Acintha, siue Cichorium</i>	
<i>Volubilis maior Herbariorum.</i>	1423	<i>Vua taminia.</i>	1408	<i>verrucosum.</i>	359
		<i>Vua transmarina, Grossularia ru-</i>		<i>Zarza Parilla. 1898. Matth.</i>	1899
<i>Volubilis media. ibi. nigra.</i>	1424	<i>bra.</i>	131	<i>America.</i>	ibid.
<i>minor.</i>	ibid.	<i>Vua versa &amp; vulpina.</i>	1737	<i>Zea. 385. 384. duplex.</i>	385
<i>Volucrum maius.</i>	1427	<i>Vua viperina.</i>	155	<i>Zedoaria Auicenna.</i>	1748
<i>Volulus caruleus siue Campana</i>		<i>Vua vrsi.</i>	133. 192	<i>Zedoaria, Zerumbet.</i>	1820
<i>azura Lob.</i>	1425	<i>Vua vulpis.</i>	596	<i>Zecopyron.</i>	394
<i>Volulus terrestris.</i>	ibid.	<i>Vuularia Dod.</i>	1197	<i>Zecopyron Gymnocrithon.</i>	ibid.
<i>Vrtica.</i>	1243	<i>Vuularia Herbariorum.</i>	205	<i>Zerumbet Serapionis. &amp; Zedo-</i>	
<i>Vrtica canina Plinij.</i>	1244			<i>ria eiusdem radicis partes.</i>	1821
<i>Vrtica Hercules, Tragi.</i>	ibid.			<i>Zerumbet Serapionis, Clusio.</i>	
<i>Vrtica labeo &amp; Vrtica fetida.</i>	1247				1822
		<i>X</i>		<i>Zingiber. 1890. Acosta.</i>	1892
<i>Vrtica I. Matth. 1243. II. eius-</i>		<i>X Anthium.</i>	1056	<i>Zingiber caninum Auicenna.</i>	631.
<i>dem.</i>	ibid.	<i>Xilo, Indis dicta noua ar-</i>			633
<i>Vrtica III. Matth.</i>	1244	<i>bor in Hispania nascens.</i>	1774	<i>Ziziphus.</i>	144. 145
<i>Vrtica oligophyllos.</i>	ibid.	<i>Xylobalsamum.</i>	1773	<i>Ziziphus alba nostra.</i>	358
<i>Vsilago. Vol. 1. 1790. 913.</i>	418	<i>Xylocinnamomum.</i>	1797. 1798	<i>Ziziphus alba Matth. siue Psen</i>	
<i>Vuularia.</i>	543	<i>xylon.</i>	221	<i>dofycomorus.</i>	ibid.
<i>Vua Corinthia.</i>	1406	<i>Xylosteum alterum.</i>	201	<i>Ziziphus Cappadocica.</i>	110
<i>Vua Crispa siue Grossularia.</i>	139	<i>Xylosteum Dod.</i>	272	<i>Ziziphus Punicea.</i>	356
<i>Vua crispa, ab aliis marina, aliis</i>		<i>Xyphidion.</i>	1018	<i>Zoophthammum</i>	1128
<i>vero crepina, non nullis Gros-</i>		<i>Xyris. 1621. Lob. ibid. Matth.</i>	1622	<i>Zoophyta.</i>	1878
<i>sularia.</i>	131	<i>Xyris maritima.</i>	1392	<i>Zopyron.</i>	930
<i>Vua lupina.</i>	596			<i>Zoster.</i>	1371. 1372
<i>Vualupina siue Vua versa.</i>	1312	<i>Y</i>		<i>Zurumbet &amp; Zerumbet.</i>	1820
		<i>Y Ayama fructus. 1840. 1841</i>			
		<i>Yayagna.</i>	ibid		

FINIS INDICIS LATINI.





## INDEX GRÆCVS.



Βρότονον.	936	Ἀχάντα λαοκὴν.	1462	ἀναθήριον.	1764
Ἀγάλλοχον.		ἀχάντιον.	1445	ἀναβρίνον.	1339
fol. 1769		ἀχαντος καὶ ἀχαντα.	1442	ἀνδράχην.	550
Ἀγάρεμος, vel		ἀχαντάδην.	1436	ἀνδρείχην ἀγρία.	1128 1658
ἀγάρεχον.	1073	ἄκινος, vel ἄκινος.	912	ἀνδρόβειον.	1153 1155 1156
Ἀχάρεα recentioribus Græcis		ἀκόντιον.	1732	ἀνδρόβειος.	1361
Cucumeres.	619	ἄκορνα καὶ ἄχρνα.	1483	ἀνεμώνη.	841
Ἀγίαλον.	777	ἄκορον καὶ ἄκορος.	167	ἀνηθον.	691
Ἀγνέοκκος χαρπὸς.	133	ἀκρόδρυα.	1	ἀνηθν.	692
ἄγνος.	270	ἀκλή.	266	ἀνθεμῖς.	968
ἀγρία vox apud Theophrastū		ἀκνυοῖ quid.	20.21.24.26	ἀνθεμῖς vulgaris, sive sylue-	
non satis intellecta, multis		ἀκυλόνιον.	814	stis.	1344
in errorem induxit.	46	Ἀλδρον ἐρέγμνον.	454.456	ἀνθεμον φυλλῶδες.	438
ἀγρία.	146	ἀλγία.	589	ἀνθέοκος.	1588
ἀγρία διρῦς.	8	ἀλκίχρως.	1724	ἀνθη τῶν ῥόδων.	126
ἀγμελαία.	152	ἀλίξ.	385	ἀνθος καὶ ἀνθια.	792
ἀγροχάρδαμον.	665	ἀλίτωντα.	241	ἀνθρωπομορφος.	1723
ἀγροκοκκυμλία.	130	ἀλκία.	593	ἀνθυλλίς.	1380
ἀγρωφίς.	420	ἀλκισάδιον.	1104	ἀνηθν.	692
ἀγχα.	1100	ἀλκίσιον.	1104	ἀντίμαλον.	1715
ἀδράφαξις.	535	ἀλση.	1692	ἀντίρριζον.	1339
ἀδράφοξος.	535	ἀλσίνη.	1232	ἀντίρρινον.	ibid.
ἀεζών. 1128. μέγα, μικρόν,		ἀλυπον.	1680	ἀνωσίς.	447
τετταλές τριτον.	ibid.	ἀλυσον.	1141	Ἀπαλίξ καὶ παλίξ vulgo	
ἀγῆρος.	86	ἀλφιτον.	401	Græcorum hodie quid.	144
ἀγέριον oleum.	89	Ἀμμαλιάδες.	199	ἀπαρην.	1330
ἀγίλωψ.	405	ἀμμαηλῖς.	202	ἀπαιος καὶ ἀπια 306.1595.1654	
ἀγίς.	43.49 54	ἀμάραινον.	775	ἀπύκνον.	1730
ἀγόκερος.	480	ἀμβροσία.	1147	ἀπύρηνος.	203
ἀγιοπικὴ ἑλαία.	152	ἀμπελόπραθν.	1543	ἀπύρηνος vna.	1406
ἀγιοπίς.	1305	ἀμπέλος ἀγρία.	1406	Ἀραχος.	480
ἀγρ.	416	ἀμπέλος λευκή.	1409	ἀργεμώνη.	440
Ἀγκία.	160	ἀμπέλος μέλανα.	1411	ἀρεῖς καὶ ἀρεῖρον.	1599
ἀγκλύφην.	1245	ἀμπέλος οἰνοφόρος καὶ ἡμε-		ἀριστοσχία.	976
ἀχαντα ἀγρία.	1444	ρος.	1401	ἀρεῖτον.	1054
ἀχαντα καὶ ἀχαντα αἰγυπ-		ἀμπέλος χειρῶντα.	1411	ἀρεθίδες.	66
τία.	160	ἀμυγδαλήν.	316	ἀρεθίς καὶ ἀρεθός. ibid.	
ἀχαντα ἀραβικὴ καὶ αἰγυπ-		ἀμύδαλον.	ibid.	ἀρεθιον καὶ ἀρεθίρος.	1306
τία.	1466	ἀμιοιον.	1813	ἀρετὴ σαφυλή.	133
ἀχαντα βασιλικὴ Theophras-		ἀμωτα καὶ χαρῶντα.	30	ἀρόγλωσσον.	1254
sti.	1464	Ἀνάβασις.	1069	ἀρόγλωσσον θαλάσσιον.	1359
ἀχαντανὰ χαρῶντα vulgo		ἀνογάλλις.	1236	ἄρον.	1596
hodie Peloponnesiorum		ἀνάγυρις καὶ ἀνάγυρος.	106	ἀρεμυσία.	949
quid.	1705	ἀναδενδράδες ἀμπέλοι.	1401	ἀρετὴ κλιανῖται, sive κελαν-	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

νῆται, 380. ἰπνῆται. <i>ibid.</i>	Hippocrates. 12	Γ
ἄρτος ἐχθρίτης. 381. ὄλε- λίας. <i>ibid.</i>	Βαλάνης <i>nomen latè patet.</i> 320	Γ Αλφῆα. 1893
ἄρτος ἐπ'ἀνθράξ, ἐγκρυφίας, uel ἐγκρυπτός. 381	Βαλλέριον. 814	Γ Γάλαξ. 487
ἄρτυκῆ. 1436	Βαλλωτῆ. 1252	Γάλιον. 1088
Ἄβρον. 913	βάλανον. 1770	Γαλίον, uel γαλίον, καὶ γαλέβδολος. 1247
ἀσκληπιάς. 1144	βαρυκόκηλον. 628	Γατίρες Lacedemoniis <i>Rapa</i> , <i>Bacotis Brasica.</i> 639
ἀσκυροῖδες. 1155	βάρυθρον. 182	Γεϊλιανῆ. 1258
ἀσκυρον. <i>ibid.</i>	Βασιλικὸν ὠκίμον <i>quare di-</i> <i>ctum.</i> 679	Γεράνδριον. 1
ἀσπάλθος. 1815	βάτινα <i>more.</i> 120. 121	Γεράνιον. 1275
ἀσπαράγια, uel ἀσπαράγια <i>Theophrasto quid.</i> 610	βάτινα, καὶ βατίνα. 253	Γερανοπόδιον. 814
ἀσπάραγος uel ἀσφάραγος. 690	βάτος. 119	Γήθιον. 1538
ἀσπαράγος εἶδη, βασιλικός, ἐλκτος, ὀρμίνιος, μυάχαν- τος. 609	Βατράχιον. 1027	Γγγίβειον. 1890
ἄσπληνον. 1215	Βδέλλιον. 1782	Γηϊδριον. 709
ἀσπρίς. 1404	Βέτιον. 879	Γλῶξ καὶ Γλαύξ. 487
ἀσπρίς ἀγρία. 1629	Βήχιον. 899. 1050	Γλῆνος. 94
ἀστέριον. 496	Βίχιον. 478	Γλήχων. 890
ἀσὴρ ἀτρίκος. 859	Βιστάκια. 360	Γλήχων ἀγρία. 892
ἀσφράδατος. 1346	Βλάχον. 1222	Γλυκύπικρον καὶ γλυκυπι- κρίς. 1413
ἀσφόδελες. 1588	βλήθρον. 1222	Γλυκύριζα. 247
Ἄτραυλῖς. 1467	βλήθρον. 1222	Γλυκυσίδη καὶ γλυκυσίς. 585
ἀτράφαξ. 535	βλήθρον. 1222	Γογυλοκράμνη. 522
αὐτόπυρος ἄρτος. 378	βλήθρον. 1222	Γογυλὴ καὶ γογυλῖς. 639.
Ἀφαίρεμα. 386	Βολκοχόσανον. 773	ἔσ. 644
ἀφροδισία. 1617	Βολβός. 1500	Γοσπίον. 221
ἀφροσκόροdon. 1545	Βόλχον. 1782	Γυρῦτης ἄρτος. 379
ἀφύλλατες. 864	Βοσχος <i>Pix.</i> 75	Δ
ἄφυλλος. 1296	Βότρυν. 952	Δ Ακρύδιον. 1662
Ἀχερωὶς <i>populus quæ dicatur</i> <i>Homero.</i> 86	Βωάνιον. 859	Δ Δάκτυλοι. 362
ἀχιλλεῖος καὶ ἀχιλλεῖος σι- θηεῖς. 772	βόλγωσον καὶ βόλγωσσος. 578	Δας. 48
ἄχρως. 308	βόκκερος. 480	Δαδριον. <i>ibid.</i>
Ἀψίνθιον. 940	βόκκος. 82	Δαίχκος. 716
B	βωμελία. 644	Δάφνη. 351
Βαθύπικρον καὶ βαρύπι- κρον. 940	βωνίος. 774	Δαφνίδες. <i>ibid.</i>
Βάκχαρις. 914. 915	βόνιον καὶ βωνίος. 862	Δάφνη ἀγρία. 203. 245
Βαλαμνρά. 1	βόφθαλμον. 245	Δάφνη ἀλεξανδρεία καὶ ἐ- δάμα. 208
βάλανος μυρεψικῆ. 365	Βράθυ. 182	Δενδρίτιδες ἀμπελοι. 1401
βάλανος καὶ βάλανος μυρεψι- κῆ. 1684	Βράθυς. 1081	Δενδρομαλάχη. 586. 583
βάλανος ποσσὶ ἀνὶ δρυὸς <i>τυφύς</i>	Βρεζνικῆ. 1081	Δενδρόφλοιος. 23
	Βερίζα. 305	Δίκοκκος ξέα. 384
	Βρύον <i>τυφά Populi.</i> 88	Δίκοκκος καὶ δίκτυμος, uel δίκτυμος καὶ δίκτυμος. 892
	Βρύον. 1083. 1323	Διὸς ἄνθος. 815. 821
	Βρύον γαλφόνιον. 1367	Διὸς βάλανος. 30. 320
	Βρυονία. 1409. 1414	Διόστυρος. 346. 350
	Βρυονία μέλανα. 1411	Δ
	Βρύμος καὶ βρύμος. 403. 404	
	Βρύμος πύα. 404	
	Βρύζα <i>apud Thracas frugum</i> <i>genus.</i> 67	
	Βύνη. 401	



## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

[illegible]



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Ἰππόφαγον.	1485	χασύθα.	1683	κνίκος.	1449
Ἰς.	1609	χάπανα καὶ χαψάνετα.	30	κνίκος ἀρχία.	1467
Ἰς ἀρχία.	1570. 1621	χαψανική. κάρυα.	30	Κοῖξ.	1624
Ἰσάτι.	499	χαψανήκη.	1366	κόκχαλος.	44 52
Ἰσάτις ἀρχία.	ibid.	χαυλίας succus.	727	κόκκος βαφικῆ.	27. 29
Ἰσάτις ἡμερος.	ibid.	χαυχαλῖς.	714	κόκκος κνίδιος.	1666
Ἰσκα.	324	κάφρα.	1783	κόκκος φοινικῆς.	27
Ἰς.	133	Κεγχραμίδες.	336	κοκκύμηλα.	313
Ἰχάδες.	335. 1651	Κένυχρος.	408	κοκκυμηλέα.	193. 313
Ἰτέα.	274	κένυχρος.	ibid.	κοκκυμηλέα ἀρχία.	130
Ἰθυόδηρον.	1604	κεδρέα.	37	κολοιτία.	214
Ἰψος.	22	κεδρίς.	36. 39	κολοκάστον.	457
		κεδρία pro κεδρίς mendosè a pud Theophrastum quodā loco legitur.	36	κολοκωθα, κολοκυθή, κολό- κυθα.	614
K		κέδρος.	ibid.	κολοκωθα ἰδιώδης.	614
Καλύτας.	1683	κενταύρον.	1286	κολοκυνθῖς.	1675
Καρχαλία.	1308	κεντρομευρήνη.	242	κολοτῖα.	214
Καλαμίσκωσις.	420. 421.	κεραΐτης.	480	κολυβία.	25
Κ	1006	κεράσια.	309	κολυμὸν.	1570
καλαμίνθη.	904	κέρατς.	ibid.	κολωτῖα.	214
κάλυμπος.	995	κεράτιον.	112	κόμαρος.	195. 613
κάλυμπος ἀρωματισκός.	1888	κερκίς.	86. 87	κομβόεας.	1813
καλέα.	1724	κέσρον.	1182	κόμμη γηραιὸν Galeni.	162
καλκίσιος.	1480	κεφαλαίων ῥόδων.	126. 128	κόνηρα.	1043
καλλέστερον.	1491	Κηκίς.	15	κορέλλον.	1374
καμάσιος.	1309	Κήμος.	1342	κόρεον καὶ κορέανον.	735
καμπυλόανθη.	1436	κηπάνα.	1346	κορύμβιον.	814
κάνναβις.	496	κηπάνα μαλάχην.	584	κόρυχος.	1236
κάπνος, κάπνιον καὶ καπνί- της.	1191	Κιβώμα καὶ κιβώτια.	460	κότινος.	152
κάπνος φραγμῆτης.	1292	κίθαρον.	222	κοτυληδὼν.	1608
κάτωπαρις.	155	κίκι.	1630	κοτυληδὼν ἑτέρα.	1322
καπυρά Mastix.	65	κικωιδώλη.	554	Κράμβη.	518
κάρδαμον.	654	κινάρα.	1436	κράμβη ἀρχία.	524
καρδάμων.	1810	κίρχαία.	1338. 1725	κράμβη θαλασσία.	526
καρδία in arboribus.	74	κίρσιον.	582	κρανία.	329
καρίκη.	335	κίσθος.	222	κελτή.	398
κάρος καὶ κάρον καὶ καρών.	693	κίσσυρον.	ibid.	κρίθμον καὶ κρίθαμον.	767
καρύα ποντική.	100. 319	κίστιον.	1144	κρίνον.	376. 404
κάρυον μυελωδόν, vel κάρυον δρωμαλιδόν.	1760	κισός.	222. 223	κρινάνθεμον.	1491
καρύς nomen multa comple- ctitur. 320. unde Iuglan- dis significatione dicatur. ibidem.		κισόφυλλον.	1144	κρίνον.	1491
καρύοφυλλον καὶ καρύοφυ- λος.	1758	κίτος.	222	κροκίδες.	1531
καρυωτὸς φαίνιξ.	366	κιχώρη, κιχώρφα, κιχώρετον, κιχώριον.	555	κροκοδείλιον.	1475
καρσία.	1796	Κλήθρα.	95	κρόκος.	1531
καρσίη μέλαινα.	113	κλινοπόδιον.	930	κρόκος ὀρετίνος.	1535
		κλινότροχος.	94	κρόμμιον.	1536
		Κνάφον.	1485	κρότων.	1630
		κνήκος.	1449	κύαμος. 451. 478. prater fabā quid etiam significet.	454
		κνίδη.	1243	κύαμος ἀργύριος.	457
				κύαμον αἰθέρων.	454 456
				κύημα	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Κύμα seu κύμα, in Brassica quid.	528. 530	Λέπος.	30	Μαλακόκοστος.	1424
κυκλάμινος.	1604	Λεπτοκάρυα.	319	Μαλάχη.	584
κυμβάλιον.	1322	λεπτοφυλλον.	195	Μαλάχη ἀγρία.	589. 721
κύμιον.	696	λαδοχρύστα.	1463	Μάλακον.	1782
κυνάθεμις.	1344	λακκή.	86	Μαλίον.	815
κυνάρα.	1436	λακκία.	1309	Μανδραγόρας.	1725
κυνία.	1628	λακοίον καὶ λακκίον μήλι- νον.	801. 802	Μάραθρον.	688
κυνόβοτάνη.	1344	λακοφυλλον Verbaſcu mas.	1299	Μαραθρόφυλλον.	769
κυνόγλωσσον καὶ κυνόγλωσ- σος.	1261	Λήδον.	227	Μάρον.	883
κυνοκράμη.	1628 1730	Λιβανος καὶ λιβανώδης.	1752	Μαρόλιον.	545
κυνότρον.	1730	Λιβανωτίς. 763. καὶ λιβανωτίς		Μάσθιον.	727
κυνόστατος.	119. 121. 122	σεφρωματική. ibid.	967	Ματίον.	ibid.
κυνόςρχις.	1549	Λιευσικόν.	744	Ματιήν.	66
κυνάρεστος vel κυνάρετος, ἀπὸ τῆς κύβης παρίσχει τὴν ἀρετήν.	57	Λιγυσκόν.	ibid.	Μαχαμώνιον.	1620
κύπτερος siue κύπιρος.	991	Λιθόλενδρον.	1374	Μεθόν.	758
κύπτερος ἐδάδιμος Theophras- tus.	1584	Λιτόσπερμον.	1176	Μελεμπόδιον.	1633
κύπρος.	252	Λινύζωσις.	1626	Μελεμπυρον.	1136
κύτις.	258	Λινύζωσις ἀγρία ἄβρην.	1628	Μελέμφυλλος.	1442
κύτταρος.	50	Λίνον.	493	Μελάνθιον.	812
κωδία quid.	459	Λινόσπερμον.	177	Μελάνιον.	797
κωδέμα.	44	Λίνος σπέρμα, λινόσπερμα καὶ λινόσπερμον.	494	Μελανόβουλις Salix qua di- catur Theophrasto.	276
κώων.	788	Λιχίν.	131	Μέλαν πρῶσιον.	1252
κώωνος.	43. 44. 52	Λόβιον.	473	Μελανόσπερμον.	812
		Λοβὸς in Rosis quid.	126	Μελίαι.	82
		Λοβὸς quid.	144	Μελίλωτος.	511
		Λόβος.	473. 474	Μελίνη.	408
		Λογχιτίς.	1220	Μελίνη καὶ μέλιτος.	411
		Λοπίμας πώγων.	31	Μελισσόφυλλον, μελίφυλλον καὶ μελίταμα.	957
		Λόσον in Abiete quid.	54. 166	Μεμαίικυλον.	195
		Λύγος.	280	Μενάνθες.	504
		Λυκοπόδιον.	1325	Μέλα prima qua.	315
		Λύκοψις.	1104	Μέσον Galle apud Dioscori- dem quid.	16
		Λυσιμάχον, καὶ λυσιμάχιος.	1058	Μέσσιλος καὶ μεσσίλη.	332.
		Λωτὸς δένδρον.	346	Μέσσιλον.	ibid.
		Λωτὸς herba.	506	Μήδικη.	502
		Λωτὸς ἡμερος herba.	ibid.	Μυκονίδες Lactuce	545. 549
		Λωτὸς ἀγρία herba.	ibid.	Μήκων 1707 ἡμερος, καὶ πῶ- τῇ θυλακίτις, κερατίτις, ἀφρώδης. ibid. καὶ κερα- τίτις. 1712. ἀφρώδης.	1713
		Λωτὸς ἀγυπτιος.	1077	Μήκων ἀφρώδης.	1658
				Μήκων ροιᾶς.	439
				Μήλα.	293
				Μήλα ὀσμυριακά.	297
				Μηλιά.	285
				Μηλιά ὀσμυριακή.	297
				Μηλιά κυδωνία.	290
				Μηλιά.	

Λ

Λαγώσπιρος Hippocra- tis.	430
Λάβανον.	227
Λάβον.	ibid.
Λαγυρίς.	1657
Λαθυρος.	470
Λαμψάνη.	541
Λαπαθος καὶ λάπαθον.	600
Λαρεξ.	55
Λαψάνη.	541
Λαχανα.	518 560
Λεβέον.	1491. 1516
Λεχύν.	1083
Λέκυθος.	449
Λέκυθος κυαμίνη.	453
Λεονίκη.	1308
Λεοντοβοτάνη.	485
Λεοντοπέταλον.	1608
Λεοντοπόδιον.	1342
Λεπιδιον.	709

Μ

Μαγδαλιν.	727. 729
Μαγδάλιον.	545
Μακέρ.	1776
Μακροκύνον ἱεράκιον.	569
Μαλακάθρον.	1776
Μάλαθρον.	688



## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

[illegible]



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Πακέλιανος.	745	Πυξάχυνθα.	148	Σημύς.	92
Πάκη.	43	Πύξος.	165	σήριγ.	358
Πάκη Theophrasti, Latino-		πυρελίη, ὀξυάχυνθα Diosco-		σηγάμεσιδες μέγα καὶ μικρον.	
rum Pinus est.	43.46	ridi dicitur.	134	1668	
πάκη ἀγρία Theophr. Pinus		πυρὸς. 371. unde.	374	σήγμων.	482
sylostriae siue Pinaster est.		πώμα, Palma fructus imma-		σήγνιος πυρὸς qui dicitur.	
46		turus.	366	373	
Πήγανον.	972	P		Σίδην.	1011. 1012
Πίδος quid.	459	P'Αξ.	1727	σιδηρίτις.	1117
πιτφάλια.	360	P'αξ μέλας, πυρρὸς.	598	σιεύα.	614
πιττίς.	1652	P'αφανὶς ἀγριοτέρα.	636	σίκευος ἡμερος καὶ σίκευον.	619
πίττα καὶ πίττα. 73. 74. 75.		P'αφανὶς ἡμερος καὶ ἀγρία.	634	σικυοπέπων, σίκευος πίπων.	
76. 77		P'άφανος.	518	622	
πιτύλον φύσημα.	71	P'άφανος καὶ βραφανὶς, καὶ βρα-		σίκευος ἀγριος.	1672
πίτος.	43	φάνη.	634	σίλινον.	1465
πίτος Theophrasti, Picea.	50	P'άφανος ἀγρία.	638 1595	σίλινος.	378
πίτος φθιτροφόρος quæ Theo-		P'ητινή.	63 69	σίλινον.	727
phrasto.	51	P'ητινή τερμυθινή.	62	σίναπυ καὶ σίνηπι.	645
πλάτανος. 93. ἀμφιφύης		P'ίζιος succus.	727	σίνηπι ἀγριον.	660
dicta.	ibid.	P'ιτίνη χινίνη.	63	σίον.	1091
πλάμος.	1298	P'οδάχνη.	293. 294	σίλον.	722
Πότος, quorundam.	820	P'οδία ρίζα.	981	σίλον.	676
Πολεμόνιον.	1186	P'οδάχνη.	244	σίλον.	1579
πόλιον.	928	P'οδιδένδρον.	ibid.	σίλων.	708
πολύανθεμον.	875	P'όδον.	124	σίτος.	372
πολύγαλον, siue πολύγαλο.	488	P'οιά καὶ ροά.	303	Σχημυθία.	1662
πολυγόνατον.	1623	P'οὺς vel ρόος.	106	Σχημυθία.	712
πολύγονον ἀρβέν.	1123	ρῶς γυναικείος.	367	σκήλας.	1575
πολύγονον ἡλίον.	1072	P'οδάχνης affectus.	136	σκήπτρον.	815
πολύκνημον.	932	Σ		σκολοπένδρον.	1215
πολυπόδιον.	1229	Σ		σκόλυμος.	1436
ποταμογενέτων.	1097	Σ		σκόρδιον.	909
ποτήριον.	1487	Σ		σκόροδον.	1545
Πράσιον.	962	Σ		σκορπίον.	1349
Πράσον.	1541	Σ		Σμίλξ.	24. 678
Πρόνοι homines.	21	Σ		Σμίλξ κηπαία.	475
Πρόνος. 10. unde dicitur.		Σ		Σμίλξ τραχέα καὶ λευκή.	
ibid.	26	Σ		1421	
Πρόμαλον.	182	Σ		Σμίλξ.	78
Προσώπιον καὶ ἀφωσπίς.		Σ		Σμύρνα.	1755
1054		Σ		Σμύρνον.	706
Προτότοιμοι χαυλοί.	528	Σ		Σόγχος.	571
Πρέμνος.	130	Σ		Σόμφος.	617
Πρέμνα.	554	Σ		Σπανόχια.	543
Πτελέα.	80	Σ		Σπαργάνιον.	1018
Πτελέξ.	1215	Σ		Σπάρτα apud Homerū quid.	
Πτερίς καὶ πτέριον.	1222	Σ		170	
Πισάκη πυρρήνη.	386. 399	Σ		σώρος.	168
Πυκνόκομον.	1681	Σ		σώρον.	1323
		Σ		σώρον.	σώρον



# INDEX HISTORIAE PLANTARVM.

απλήνιον.	1215. 1217	Σχοῖνος καὶ χοῖνος ὄρωμα- τικός.	1884	Φαλκίς.	415
αποδῖς vel απονδῖς.	130			Φάσανον, vel φασγάνιον.	1056. 1620
Σταφυλίνος.	78	T		Φασόλος.	473
σαφίς.	1404	ΤΕρμυθος.	61	Φάσκον <i>quid Graeci dicāt.</i>	10
σαφίς ἀγρία.	1408. 1629	Τετραγύρα.	619	Φηγόπυρος.	383
σαφίς τρωκίη.	555	Τετράλιξ.	185. 1482	Φηγός.	534
σαχυίτης.	1007	Τάβριον.	928	Φιλανθρωπος.	1330
σαχυσ.	962	Τάκεμον vel τεύκεις.	1165	Φιλελαΐα <i>Pena, siue illa potius φιλλελαΐα dicenda est.</i>	153
Στέμφυλα.	113. 1403	Τάτλον.	531	Φιλελαΐμον καὶ φιλελαΐα.	1186
Σέρμηθρον.	1128	Τάλαφον.	533	Φιλός.	22
Σέφανος, Σέφος καὶ Σέμος.	796	Τήλις.	480	Φίλυρα.	89
Σοχάς καὶ Σοχάς.	917	Τιθύμαλος καὶ τιθύμαλον.	1642	Φιστίαια.	360
Σοφιστής ἐνυδρος, siue ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων φυόμενος, <i>quem ὁ ποταμὸν nunciu- runt.</i>	1061	Τίφη.	392	Φόμος.	1298
Σοφιστής ὁ χιλιόφυλλος.	768	Τραγάκινθα.	1477	Φλόξ <i>Thesophrasti.</i>	800 970
Σοφίδης <i>nux</i> πώδης.	43.	Τραγόστυρος.	383	Φοίνικες, καὶ φοινίξ.	362. 416
44 52		Τραγοπάγων.	224. 1078	Φοίνικες ἀνόρχοι, ἀνόςχοι, ἀπύρηντοι.	366
Σοφύχος.	596	Τραγοεργάνον.	888	Φόνος.	271
Σοφύχος ἀλκίφρατος.	596	Τράγος.	925	Φόνος <i>Spina quae nominata.</i>	1467
Σοφύχος κυπαῖος.	ibid.	Τελόλος ἐνυδρος.	1082	Φῶ.	927
Σοφύχος μανικός.	ibid.	Τελόλος χειμαῖος.	512	Φρυκτὴ <i>Resina.</i>	72
Σοφύχος ὑπνωτικός.	ibid.	Τελόλιον.	1389	Φύκος θαλάσσιον.	1369
Σύβον.	1485	Τείφυλλον.	503	Φυλάγεινθα.	1416
Σύραξ.	115	Τείφυλλον ἐκ χορτοκοπείας.	1353	Φυλλίτις.	1118
Συγκομιστὴς ἀβρός.	378	Τειχομανές.	1209. 1211	Φύλλον.	732. 1194. 1776
Συγκομιστὴς <i>mor.</i>	120	Τρύχος.	596	Φύλα.	82
Συγκομιστὴς καὶ συγκομιστὴς.	325.	Τρωλοδύται <i>unde dicti.</i>	1231	Φυλάς.	596
328. 340		Τρώξιμος.	514	Φύτλημα. 1197. <i>Marth. ibid.</i>	
Συκή.	335. 1658. 1660	Τύφη.	994	Φυτόν μανικόν, <i>Laurus.</i>	353
Συκή ἀγρία.	335	Υ		X	
Συκή ἡμερος.	ibid.	Υάκινθος.	1505	Χαμαίωλη.	269
Συκόμορος.	340	Υἷδα.	1585	Χαμαμβάλατος.	1596.
Σύκον.	335	Υἷδρηνον.	293	Ἔ.	1651
Σύκον ἐρεβ.	ibid.	Υἷδρηνον πέπελ.	1038	Χαμαίωτος.	119
Σύμφυτον μέγα.	1074	Υἷδρηνον.	1716	Χαμαίωτος καὶ χαμαίωτος.	1162
Σύμφυτον ὠτερόν.	1174	Υἷδρηνον.	1153	Χαμαίωτος λαός.	1451.
Σφακελισμός.	419	Υἷδρηνον.	1715	μέλας.	ibid.
Σφάκελος.	879	Υἷδρηνον.	1715	Χαμαίωτος.	968 1344
Σφένδαμνος.	94	Υἷδρηνον.	933	Χαμαίωτος.	1153 1159
Σφονδύλιον.	733	Φ		Χαμαίωτος.	176
Σχεδῖας μικρὰ καὶ μεγάλη.	1100	Φακοειδές.	1671	Χαμαίωτος.	1660
Σχινίδες, <i>Lentici fructus.</i>	63	Φακός καὶ φακὴ.	475.	Χαμαίωτος.	1664
χίος, <i>quasi</i> χιτὸς.	ibid.	Ἔ.	478	Χείροπα, ἔ.	449
χονότρονον.	1544	Φακός ὁ ἐπὶ τῶν τελευμάτων.	1014		
χονοτρόφον.	496	Φαλάγγιον καὶ Φαλαγγίτης.	851		
Σχοῖνος.	983				




## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Χελιδόνιον μέγα.	1149		Τ		Ω	
Χελιδόνιον μικρόν.	1048				Ω	Κημισθός. 682
Χερσίζα μελαγχρ.	584				Ω	Ωκιμιον. 679
Χιλιοδωΐαιμς.	1186	Ψ	Ευδοκραντία.	197		Ωλεσίχηρπος Salix a-
Χοϊροσσάλευρον.	1100		Υδωνάρδος.	919		πud Homerum quare di-
Χονδείλλη.	566		Υλώτρον.	1409		catur. 279
Χονδροπιωστήνη.	386.399		Υχιότφορον.	1182		Ωμη Pix. 74
Χόνδρος Gracorum Latino-			Υύλλιον.	1172		Ωμη λύσις vel αήλυσις.
rum Alica.	385		Υώρα morbus arborum.	152		402
Χρυσοδάχυνον.	535					Ωνυχισμός πόδια. 126
						Ωχρός. 466

F I N I S   I N D I C I S   G R Æ C I .



INDEX ARABICVS.

	Banus & Abe	Alharar.	182	Angiara.	1243
	nus. 1751	Alharamel.	972	Aniuden.	732
Abg.	1588	Alieumeiz.	340	Anlis.	ibid.
Abhel.	182	Alkali.	1377	Araba sine Bari.	892
Acha bengi.	596	Alkieran.	37	Archanas aut Avornas.	66
Achachie.	160	Alluf.	1601	Avornas. aut Archenas.	ibid.
Afin.	1423	Almacharam.	1707	Arz.	49
Adhar vel Adher.	1886	Almharut.	732	Arz. seu Arzi.	407
Adlen aut Adhlen.	499	Almezerion.	1664	As.	236
Adurion.	106	Alnam seu Alnegen.	890	Asahasafra.	1569
Aeliphacos.	879	Alfadar.	546	Afchl seu Alachil.	1575
Aes.	236	Alfcebaram.	1128	Afleugi.	823
Affinchium.	940	Alfcebaram.	1652	Asmeni iuni	1609
Agalugin seu Agalugen.	1769	Alfsegiem.	639	Aspinalfack.	763
Agileuz.	319	Altiith.	732	Asilis.	701
Aibeig.	1229	Alzarur.	332333	Asfochados.	917
Aierfa.	1609	Alzelin.	1585	Asbarnos.	461
Alas.	236	Alzir.	1500	Asbin.	1238
Alafce.	899	Ambela.	1875	Anas.	313
Alberas.	1629	Aminberim, seu Amyrbarim,	135	Aufel.	1775
Albotin.	61	seu Berberin.	166	Axeras.	1588
Alboucor.	1754	Amiron.	841	Axis.	1914
Alcanna.	252.253	Anaharnen.	313	Axnec.	1323
Alchamech.	1585	Anas.	694	Azadaracht.	358
Alchar.	490	Anazue.	1128	Azz Alfachel.	1083
Alcheiri.	801	Andrachahara.	892		
Alfahasat.	502	Anegen.	692		
Alfiscera.	1400	Anesum & Anexisum.	732		
Alfifere sefsera.	ibid.	Angeiden.			



A R A B I C V S.

Bache.	1866	C	Chastara.	1282	
Bachele alhanica.	550	Cafal, Cafil, seu Gafel.	Chafus.	229	
Bak'eancha.	ibid.	1251	Chare.	499	
Balador.	1764	Cafur.	1783	Chathe.	619
Balfem, balfema, belfan.	1770	Cahade, lahade, seu Gia-	Chatheh.	1477	
Barbes siue Carmas.		de.	928	Chatini & chatinie.	590
Basar.	1500	Calab.	1176	Chatis.	499
Basirahagi.	1123	Calamentum.	904	Chauch.	293
Bassad.	1374	Calchala.	763	Caum.	1545
Basil seu Bassal.	1536	Callidunium.	1249	Champs.	461
Bathec, seu Batheca.	625	Caluegiam.	1893. 1894	Cheiri.	801
Batheca alzachi.	625	Camum.	696	Cherbachem, seu Charbich	
Batheca filistin.	ibid.	Canab.	496	Abaid.	1631
Batheca Inda.	ibid.	Candaret, Candaron.	566	Cherbachem, seu Charbech	
Bath-ca viridis.	ibid.	Caphor seu Chafur.	1783	Afued.	1633
Baron.	61	Cappar.	155	Cherbas.	545
Bazara Chatona.	1172	Capur.	1783	Chermes.	29
Bazari chichen.	493	Carfa.	179	Chetaa'hamar.	1672
Bedarog.	679	Cardel.	645	Chethar.	619
Bedeguar.	1462 1474	Carh'mfel, & Carienfel.	1758	Chete allimar.	1672
Bederangie, bedaringi, bede-		Carmas, siue Farbes.		Cheunce.	1588
renzegum.	957	Caruia seu Carui.	693	Chiahas.	34
Bessaigi.	1229	Casab.	995	Chilodomontoma.	1249
Beiahahalalen.	1128	Casoras.	1621	Chinaos.	34
Benefefigi.	797	Castal.	31	Chini.	590
Bengi.	1716	Cathum.	936	Chirra.	1477
Bengiechest.	280	Cebat.	1693	Chubas.	584
Berbengine.	629	Celb.	531	Chubeze.	ibid.
Berberim.	135	Cembul & Cembul Indi.	920	Churtal.	403
Berendaros.	679	Chachile.	526	Chuxtaid.	1871
Bersaufan.	1209	Chairim.	1545	Cirmetre.	306
Bersegnafeen.	1209	Chalef.	111	Colt.	1176
Besd.	1374	Chalif.	274	Condes & Condisum.	823
Bezercothume.	1172	Chamadrios.	1162	Condisi.	820. 822
Bhulles.	74	Chamafithius.	1159	Cordumeni.	1810
Bhunte.	1588	Chandel.	1675	Corumb.	518
Biruch.	ibid.	Charba.	614	Costos siue Chost, Cost,	
Bisberg.	1229	Chardel.	645	Cast.	1817
Bothormarie.	1604	Chares.	700	Cot.	502
Boton & Botin.	61	Charsi.	ibid.	Cubebe.	242
Buchale.	451	Charmen.	27	Cubebe & Quabebe.	1813
Buchormarien.	1604	Charnub.	112	Culbare albir.	1209
Bulef.	274	Charß.	700	Cult.	176
Buleib.	119	Chartom.	1449	Curat.	1541
Bundurch.	319	Chas.	545	Cuscuth.	1683
Burdi, siue Berdi.	1878	Chasca.	1707	Cyse.	933
Buthermarien.	1604	Chasi alkes, seu Chasi al-			
Buzeiden, siue Buzidan.	1569	ch'ls.	1549		
		Chasi acraleb.	1565		
		Chassuth.	1683		

D

D  
Acu.  
Dalifit.



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

<i>Damedrios.</i>	1162	<b>G</b>	<i>Hara.</i>	614
<i>Darschichaham.</i>	1815	<b>G</b> <i>Afel.</i>	1251 <i>Haraba.</i>	ibid.
<i>Darseni.</i>	1796	<i>Gaiffum.</i>	936 <i>Harbatum.</i>	745
<i>Darsihahen.</i>	1803	<i>Galungen.</i>	1893 <i>Harin.</i>	1401
<i>Daru.</i>	63	<i>Garch.</i>	506 <i>Harmel.</i>	972
<i>Dasser.</i>	405	<i>Garichum siue Garicum.</i>	1703 <i>Haronigi.</i>	1202
<i>Dausfer.</i>	ibid.	<i>Gasi alchaleb.</i>	1565 <i>Hafce.</i>	899
<i>Dausfir.</i>	ibid.	<i>Gaufre.</i>	381 <i>Hafpel.</i>	1595
<i>Decka.</i>	531	<i>Gaur vel Gar.</i>	351 <i>Hatar.</i>	1586
<i>Desana.</i>	405	<i>Geguers.</i>	408 <i>Hafach.</i>	512
<i>Dhenbenalchail, Dembalchil</i>		<i>Gezar.</i>	716.718 <i>Haud.</i>	1769
<i>siue Danebalchil.</i>	1069	<i>Giaufir.</i>	738 <i>Haur.</i>	ibid.
<i>Didar.</i>	80	<i>Gianzi.</i>	320 <i>Haur romi.</i>	86
<i>Dileg.</i>	499	<i>Gianziban.</i>	1760 <i>Hemen.</i>	902
<i>Dili.</i>	ibid.	<i>Giargir.</i>	649 <i>Hencha.</i>	371
<i>Dindar.</i>	80	<i>Giauers.</i>	408 <i>Henne.</i>	252.253
<i>Dis.</i>	983	<i>Giezar.</i>	716.718 <i>Henta.</i>	371
<i>Dochon.</i>	411	<i>Gingibil.</i>	1890 <i>Hezarchasan.</i>	1409
<i>Doronigi.</i>	1202	<i>Giumeizi.</i>	340 <i>Hezargiesan.</i>	ibid.
<i>Driz.</i>	755	<i>Guart.</i>	1851 <i>Hyspanach.</i>	543
<i>Dulb.</i>	93		<i>Humaab.</i>	600
<i>Dullaha.</i>	625	<b>H</b>	<i>Humeche.</i>	306
<i>Dumbebe.</i>	554	<b>H</b> <i>Abatte.</i>	451 <i>Hundh.</i>	600
<i>Durungi.</i>	1202	<i>Habben seu Ben.</i>	1684 <i>Hundebe.</i>	554
		<i>Habebras.</i>	1629 <i>Huniure.</i>	1243
<b>E</b>		<i>Hachille.</i>	451 <i>Hunen.</i>	356
<b>E</b> <i>Erfi.</i>	74	<i>Hadad.</i>	148 <i>Hutiladib.</i>	195
<i>Elkiageber.</i>	967	<i>Hades.</i>	475	
<i>Epitimo.</i>	1681	<i>Hadbadh.</i>	148.151	<b>I</b>
<i>Erbum.</i>	468	<i>Haferk.</i>	512 <i>I</i> <i>Abes.</i>	933
<i>Ergir.</i>	649	<i>Hagias.</i>	313 <i>I</i> <i>laborose.</i>	1725
<i>Ethulia.</i>	1642	<i>Haialhalez.</i>	1128 <i>Iaca.</i>	1868
<i>Eudeba.</i>	554	<i>Hais.</i>	384 <i>Iackaiak.</i>	841
<i>Euforbium.</i>	1690	<i>Halalzelin.</i>	1585 <i>Iantum.</i>	755
		<i>Galeicho.</i>	119 <i>Iarrus.</i>	1596
		<i>Halion siue Helion.</i>	609 <i>Iasin.</i>	867
<b>F</b>		<i>Hamad.</i>	600 <i>Iaus.</i>	316
<b>F</b> <i>Ather.</i>	1586	<i>Hamama.</i>	1814 <i>Iebet.</i>	691
<i>Famanchest.</i>	280	<i>Hameb alchaich.</i>	596 <i>Iergir.</i>	649
<i>Faudenigi &amp; Faudenigi seu</i>		<i>Hameb alhomaleb.</i>	596 <i>Ieuers.</i>	408
<i>Fudenigi.</i>	886	<i>Hamefireos.</i>	1159 <i>Ieufir.</i>	738
<i>Fegiel.</i>	634	<i>Hamehauella.</i>	1091 <i>Ieuz.</i>	320
<i>Felzacarag.</i>	148	<i>Hamenus siue Hamana.</i>	<i>Ieuz bane.</i>	1760
<i>Feonia.</i>	855	1813	<i>Iezar.</i>	718
<i>Festich.</i>	360	<i>Hamos.</i>	461 <i>Imgu &amp; Imgara.</i>	731
<i>Fin.</i>	335	<i>Hanab.</i>	356 <i>Infacti.</i>	266
<i>Forbium.</i>	1690	<i>Hanab althaleb.</i>	596 <i>Inhamehauella.</i>	1091
<i>Fugel.</i>	634	<i>Handachocha.</i>	506.1077 <i>Itica.</i>	1477
<i>Fulsel &amp; Fulful.</i>	1807	<i>Handel siue Handal.</i>	1675 <i>Iufa.</i>	933
		<i>Hantha.</i>	371 <i>Iufbagua.</i>	1760
				<i>Kali.</i>







# INDEX HISTORIÆ PLANT. ARABICVS.

Scolofendrium, & Scolufen- drium	Sumach.	106	V		
Sebesten.	Sunis seu Sunizi.	812	V	Age, seu Vgi.	1617
Sebet.	Suro.	57	V	Vagen.	420
Sedab.	Sus.	247	V	Vard.	124
Seil.	Susen.	1491	V	Vesme.	429
Selgem.			V	Vraithlatum.	1243
Selicha, Seliche, siue Selih- cha.			V	Vnec.	1323
Seliem.			T		
Semsem.	Abaleb seu Thaleb.	1014	T		
Sena, Mauritanis.	Tamar.	362	X		
Senabar.	Tarsa.	179	X	Abaer.	398
Sene.	Tarinns seu Tormus.	466	X	Xaier Almeriem.	763
Seneffigi.	Tartarichi.	1565	X	Xanim.	812
Senfara.	Tatoula.	628	X	Xanxer.	1642
Sent.	Thahabel.	1367	X	Xeber.	691
Serbin.	Thaleb.	ibid.	Y		
Sereth.	Thaxthax.	1707	Y	Abrohac.	1725
Seru.	Thespic.	358	Z		
Shair.	Thum.	1545	Z		
Sim.	Thusf.	506	Z		
Sisalios.	Tilafon.	1128	Z		
Sonofrig.	Tin.	335	Z		
Stebulet.	Tufa & Tufaha.	285	Z		
Stensir.	Tumer.	1585	Z		
Sucaram.	Tupha.	1873	Z		
Suchaha.	Turbith.	1389	Z		
Suluc.	Turingem, siue Trugiam.	956	Z		
	Tut.	325	Z		
	Tuth.	ibid.	Z		


FINIS INDICIS ARABICI.

INDEX





# INDEX GALLICVS.

<b>A</b>		Aspie.	919	Blé rouge.	374
	Bricots. 297	Aspic d'outre mer.	920	Blé qui truche.	376
	gros Abricots.	Athanafie.	955	Blé Turquet.	ibid.
	ibid.	Aubeau.	86	Blé de Vache.	419
	petits Abricots.	Auberges.	295	Blete.	538
	ibid.	Aubepin.	136	Bluet.	436
Abfinse <i>sive</i> Abfinthe.	940	Aubifoin.	436	Bois gentil.	214
Ache.	701	Aueron <i>vel</i> Aueneron.	404	Bois à faire lardoires.	272
Agarie.	1703	Auet.	53	Bois puant.	105
Agnus Castus.	278	Aulbour.	103	Bonnes Dames.	535
Agourre de l'm.	1683	Aulne.	96	Borrage.	578
Agrimoine.	1251	Aulne noir.	97	Borrache sauua ge.	1104
Agripaume.	1249	Aunce.	867	Bouillon blanc masse.	1298
Agtron & Agreuo.	147	Auoine.	403	Bouillon blanc femelle.	ibi.
Aigrette.	605	Aurenges.	301	Bouillon noir.	ibi.
Aiguille de bergier.	710	Auriole.	1464	Bouillon sauua ge.	ibid.
Ail & Aux.	1545	Auronne.	937	Bouleau.	92
Ailpourreau.	1548	Auuia.	47	Bourgespine.	139.145.158
Airelles.	191			Bourache.	578
Alarders.	159.257	<b>B</b>		Bourse de berger.	1097
Albour.	103	Acille.	767	Bouys.	165
Alexandre.	703	Baguenaudier.	214.215	Bouys picquant.	242
Alisier.	202.203	Barbe de Cheure.	1080	Branche vrfin e.	1443
Aloë.	1692	Barbe de bouc.	1078	Bray <i>aut</i> Brac.	1369
Alquaquenge.	556	Barberenard.	1477	Brayes de cocu.	833
Aluync.	940	Barbotine.	945	Bredone.	540
Amalenchier.	202	grande Bardane.	1054	Bronde.	187
Amandrier & Amandes.	316	Basilic.	679	Brouchin.	96.166
Amartines.	274.278	Basilic sauua ge.	682.912	Bruiere.	185
Ambres.	ibid.	Basinet.	875.1027	Brulure.	418
Amourettes.	433	Basinetz.	794	Bugle.	1075
Ampes.	123.124	Bauhino.	8	Buglosse.	578
Ancolye.	820	Baume.	1770	<b>C</b>	
Anet.	691	Bec de grue.	1275	Abaret.	913
Angelique.	724	Bec de cigoigne.	ibid. & 277	Cade.	67
Anis.	692	Berle.	1091	Calamente.	904
Api.	701	Bes.	92	Cameline.	1136
Appetitz.	1539	Bete.	531	Camemine.	ibid.
Arboufier, <i>fructus</i> , Arboufes.	195	Bete rouge.	ibid.	grande Camomille.	940
Arbre du Bresil.	1846	Betoefne & Betoine.	1282	Camomille bleüe.	1389
Arbre de la graine d'escarlata.	27	Bierre.	402	Camomille vulgaire.	1344
Argentine.	1064	Binium.	50	Campanes blanches.	1526
Argouffes.	139	Bistorte.	1285	Camphre.	1783
Armegnes.	297	Blancheputain.	257.265	Canne.	995.999
Armoiries.	808	Blanchette.	554.1577	Cappres.	155
Armoiries sauua ges.	809	Blaut.	436	Cardons.	1439
Armoise.	49	Blé blanc.	374	Cardon lechal, ou lecher.	1438
Arrestebœuf.	447	Blé de Bœuf.	419	Carottes jaunes.	719
Arroches.	535	Blé Locar.	395	Carottes & Carottes rouges.	
Artichans.	1439	Blé motet.	374		
Asnes.	124	Blé noir.	419		
Asparge.	609	Blé riguet.	376		



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Carouges.	112	Coing & Pomme de Coing,	Drylie.	8
Carui.	693	Cognasses.	Dureines.	310
Casse.	113	Coingnier & Coignacier. ibid		
Ceboule.	1518	Coloquinte.	E	
Cedre.	36	Comin.		
petite Centauree.	1286	Concombre.	E Bene.	1751
Cerfueit.	710	Confanons.	Eglantier.	121.127
Cerifier, Cerifes.	309	grande Consolide.	Lut bore blanc.	1631
Ceterac.	1215	Consolde, & Consolide Sarra	Elle bore noir.	1633
Chamaraz.	909	zinc.	Encens.	1752
Champignons.	1586	Consyre.	Endiue.	554 555
Chanure.	496	Coq.	Englantier.	121
Chapperon ou Coqueluchon		Coques de Leuant. 1722. 1831	Eouise.	20
de moyne.	1745	Coqueliquoc.	Erable.	94
Charbon de quartier.	3	Coquelourde.	Erable madré,	ibid. & 95
Charbon de branche.	4	Coqueret.	Erable iaune.	94
Chardon à cent testes.	1458	Coral.	Erable mol.	95
Chardon argentin.	1445	Cormes.	Ers.	468
Chardon à carder <i>vel</i> Chardô		Cormier.	Escarlate.	27
à fouillon.	1447	Corne de Cerf.	Eschalette.	381
Chardon nostre Dame.	1474	Corneole.	Eschalottes.	1539
Chardonnette.	1437	Cornouilles.	petite Esclairc.	1048
Chardoufle.	1453	Cornouillier.	Eseuelles.	1608
Charme.	81	Corrigiole.	Espargoutte.	953
Charpene.	ibid.	Cotton.	Espeaute.	384
Chastaigne, Chastaigner.	31	Coucombre sauuaage.	Espi d'eau.	1007
Chausse trappe.	1473	Coucourde.	Espinars, & Espinoches.	543
Cheli joine.	1249	Couillon de Prestre.	Espine de bouc.	1477
Cheneue.	496	Couillon de chien.	Esvine vinette.	137
Chermillat.	5	Couldre.	Espurge.	1657
Cheruy.	722	Coleuuree.	Euforbe.	1690
Chefne.	2.8	Couleuuree noire.	Eufrafe.	1167
petit Chefne.	6	Couleuuree sauuaage.	Eupatoire.	1251
Chefne verd.	20	Courge.		
Chefnette.	1162	Courge sauuaage.	F	
Cheueux de Venus.	1209	Coulines.		
Cheure feuil.	1427	Coulines de marais.	F Au.	34
Chou.	518	Cramoisi.	Farigoule.	904
Chou capu.	521	Creneuse.	Feine.	34
Chou capu rouge.	513	Cresson de iardin & Cresson	Fenouil.	688
Chou-de-chien.	1628	alenois.	Fenouil marin.	787
Chou cresp noir.	523	petit Cresson aquatique.	Fenouil de pourceau.	745
Chou de Cypre.	521	Cresson d'eau.	Feugiere & Feuchiere.	1222
Chou fleuri.	ibid.	Cresson sauuaage.	Feugiere aquatique.	2225
Chou noir.	523	Crete marine.	Feugiere de chelin.	1227
Chou raue.	522	Croisette.	Feugiere femelle.	1222
Chou rouge.	523	Carage.	Feugiere masse.	ibid.
Chou de Sauoye.	521	Cuyderelles.	Feue.	451
Charles.	1581	Cypres.	Feue grasse, & Feue espaisse.	
Ciche.	461	Cyprez de iardin & petit Cy		
Cichoree de iardin.	515	prez.		
Cichoree sauuaage.	ibid.			
Cicistaire.	760	D		
Cidre.	289			
Ciguë & Cocue.	788	D Ates, & Da&ier.		
Cirier.	202	Dent de chien. 410. 411		
Citrouille.	625	431. 434		
Citrons.	298	D&tam.		
Cives & Ciuons.	1338	Digitale, & Doigtier.		
Codignat.	29	Double fucille.		
Clou de Gyrofle.	1738	Dragon.		



# GALLICVS.

Fouteau. 34.35  
Fraisier & Fraises. 613  
Framboisier & Framboises.  
123  
Franc-osier. 278  
Froument. 371  
Froument Locar. 395  
Froument rouge. ibid.  
Froument à six quarts. 376  
Froumentee. ibid.  
Fumeterre. 1291  
Fusain. 272  
Fustet. 194

## G

G'ainier. 210  
Galle ou Noix de Galle.

## H

Gantelee, ou Gans nostre Da-  
me. 829.831  
Gelee de Coing. 292  
Genest. 168 & Geneste. 172  
Genest d'Espagne. 168  
Genest de Florence. ibid.  
petite Geneste, petit Genest.  
173.174  
Geneure & Geneurier. 66  
Gentiane. 1258  
Germandree. 1162  
Gesses. 470  
Gingembre. 1830  
Glaieul puant. 1621  
Glaieul de marais. 1618  
Glaie & Glaitel. 1620  
Gland de terre. 1347  
Gloutteron aigu. 1056  
grand Gloutteron, & Glette-  
ron. 1054  
petit Gloutteron. 1056  
Goutte. 1683  
Grace de Dieu. 1085  
Graine d'escarlate. 27  
Graine. 29  
Graine jaune. 151  
Graine à rendre. ibid.  
Graine d'Auignon. ibid.  
Graine. 420  
Grande Escalire. 1249  
Grateron. 1330  
Gremil. 1176  
Grenadier. 303  
Grenouillette. 1027  
Griotes, Griotier. 310  
Groselier. 131  
Groselle. ibid.  
Groselier noir & Groselles  
noires. 132  
Groselier rouge & Groselier  
d'outre mer. 131.132  
Groselles rouges & Groselles  
d'outre mer. ibid.

Grosse Germandree. 1165  
Guede. 499  
Guimaue. 590  
Guimaue de Venise. 594  
Guimaue sauage. 593  
Guindoles. 310  
Guines. 309.310.311  
Gurguet. 428  
Guy. 17  
Gyrofle. 1758  
Gyroflee de Damas, ou des  
Dames. 804  
Gyrofrees. 806  
Gyroflee d'eau. 1022  
Gyrofliers jaunes. 801  
Gyroflee jaune. 802

## H

Hache Royale. 1588  
Hancabanc. 1716  
Hardeau. 257  
Hautains. 95  
Hepatique. 1083.274  
Helbre. 3435  
Hieble. 269  
Hislope. 233  
de l'Herbe. 422  
Herbe aux Aulx. 911  
Herbe S.Barbe. 650  
Herbe de Bouc. 543  
Herbe à cent maladies. 1062  
Herbe au chancre. 1349  
Herbe au Charpentier. 1310  
Herbe au chat. 908  
Herbe aux cloches bleues. 826  
Herbe de cœur. 673.1327  
Herbe à cotton. 1105  
Herbe aux cuilliers. 1320  
Herbe doree. 1273  
Herbe d'esperuier. 569  
Herbe de feu. 1041  
Herbe contre la grauelle. 1114  
Herbe S.lacques. 575  
Herbe à jaunir. 1742  
l'Herbe S.lean. 949  
Herbe au la. ct. 487.1642  
l'Herbe aux limassons. 502  
Herbe du masclou. 264.266  
Herbe militaire à millefeuille.  
les. 768  
Herbe aux perles. 1176  
Herbe du Perroquet. 1632  
Herbe aux pucies. 1172  
Herbe aux pouilleux. 1629  
Herbes aux poumons. 1326.1317  
Herbe du près. 422  
Herbe Robert. 1278  
Herbe aux tigneux. 1053  
Herbe aux viperes. 1104  
Huille de Cade. 39.59

Houbelon & Houblon. 1414  
Houx & Housson. 147  
Hyslope. 933

## I

I'Euise. 20  
I'f. 24.78  
Iosemin & Iasmin. 1430  
Iosmin rouge & Iosmin large.  
1431  
Ionc. 583  
Iote. 331  
Ioubarbe. 1128. grande Ioubar-  
be. ibid. petite Ioubarbe.  
ibid.  
Iue muscate & Artetique. 1159  
Iugioline. 482  
Iumbes. 356  
Iuraye. 416  
Iuraye sauage. ibid  
Iutquame. 1716

## L

L'Aisterons. 571  
Lactue. 545  
Lactue crespue. ibid.  
Lactue pommee. ibid.  
Lampe. 601  
Langue de cerf. 1218  
Langue de chien. 1261  
des Lans. 164.173  
Lapas, & du Lapais. 601.602  
Lauande. 919  
Lauande femelle. ibid.  
Laureole. 210  
Laurier. 351  
Lentille. 475  
Lentille d'eau. 1014  
Leauque. 63  
Leueche. 706  
Liege. 22  
Lierre. 1415  
Lierre terrestre. 1310  
Limons. 301  
Lin. 493  
Lis. 1491  
Lis d'estang. 1008  
Lis sauage. 1493.1497  
Liferon. 1421.1423  
petit Liferon. 1424  
Liferon de vigne. 1423  
grand Lifer. 1421  
Lifer piquant. ibid  
Long gran. 376  
Louchon. 54.166  
petite Lunaire. 1313  
Lupin. 466  
Lusse. 166  
Luzerne & Luzert. 503  
Mandra



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

<b>M</b>			
Andragore.	1725	Muguet.	870
Manternier.	202	grand Muguet.	838
Mariettes.	815	perit Muguet.	1088
Mariolaine.	881	Myrecolons.	295
Mariolaine menue & mus-		Myrte.	236
q iée.	882	Myrte petit.	238
Mariolaine d'Angleterre &		<b>N</b>	
grosse Mariolaine.	884	N Afitort.	614
Mariolaine bastarde.	886	Nauveau rond.	639
Magaritons.	855	Nauet & Nauveau.	644
Marguerites.	853	Nefflier. 332. Neffle.	ibid.
Marguerite bleüe.	1389	Nerprun.	145
Marrons.	31.32	Nielle.	812
Marrube & Marrubin.	960	Nielle vulgaire.	4.8
Marrube d'eau.	1064	Noiselier.	100
Marrube noir.	1252	Noix, Noyer.	320
Marrube puant.	ibid.	Noix de Galle.	15
Mauue.	584	Noix de la S. Jean.	321
Masses.	934	Noix muscade.	1760
Masfitre.	1637	petit Nombri de Venus.	1322
Mastic, ou Mastich.	66.868.	<b>O</b>	
884. 931		O Bier.	270
Matricaire.	953	Oeillet, & Oeillet Dieu.	815.
Menthe.	671	Oeillet d'Inde.	839
Menthe aquatique.	676	Oeillet sauuaige.	815
Menthe chevaline.	673	Oeilletz.	806
Menthe crespue.	672	Oignon.	1536
Menthe de nostre Dame.	ibid.	Oignon marin.	1575
Menthe Romaine.	ibid.	Oliues & Oliuier.	342
Menthe sauuaige.	673	Opier.	270
Melese.	55	Orcanette.	1100
Melisse.	957	Oreilles.	617
Mercuriale.	1626	Oreille d'asne.	1074
Mercuriale sauuaige.	1628	Orge.	398
Mesle.	393	gros Orge.	ibid.
Meslier.	332	Origan.	886
Mesle.	ibid.	Orme.	80
Mesplier. ibid. Mesple. ibid.		Orpin.	1315
Meteil.	393. 396	Ortie.	1243
Meurier, Meure.	325	Ortie morte.	1246
Meurte.	236	Ortie puante.	1247
Mezanes.	303	Orualle.	965
Micocoulter.	346	Osier.	133. 278
Micocoules.	ibid.	Osmunde.	1225
Migraine.	303	Ouchon.	54
Mil & Millet.	408	des Ourles.	271
Mil leucille.	768	Ozaille, ou Ozeille.	605
Mirthe.	1755	Ozeille menue & Ozeille de	ibid.
Monroyere.	1062	brebis.	ibid.
Morelle.	596	Ozeille ronde, Ozeille fran-	che, & Ozeille Romaine.
Morgeline.	1242	ibid.	
Morilles.	1588	<b>P</b>	
Mors de diable.	1066	Ain blanc & Pain de bou	che, ou Miche. 380
Mort-aux-chiens.	1570		
Mort aux porceaux.	542		
Mouron à fleurs rouges.	1236		
Mouron violet.	1339		
Mouffe.	1323		
Mouffe de mer.	1367		
Moustarde.	645		
		Pain bourgeois.	ibid.
		Pain cuit au four.	ibid.
		Pain cuit en la terrasse,	ibidem.
		Pain farin.	ibid.
		Pain de ménage.	ibid.
		Pain dit Oblies.	ibid.
		Pain à tour.	ibid.
		Pain de cocu.	1354
		Pain d'oiseau.	1128. 1130
		Pain de pourceau.	1604
		Palais au lieure.	571
		Palme & Palmier.	362
		Panetz.	719
		Panetz sauuaige.	721
		Panis & Panic.	411
		Parelle.	601
		Paritoire & Parietaire.	1241
		Pas de cheual, & Pas d'asne.	1050
		Pasquettes.	813
		Pastillage.	666
		Pastillage sauuaige.	658. 666
		Pastroses.	815
		Pastucelours.	870
		Pastenade.	718. 719. 721
		Pastel.	499
		Pasture de chameaux.	1884
		Patiencie.	606
		Pauue de Christ.	16.0
		Pauot.	17.7
		Pellebasse.	1018
		Pelofsier.	130
		Pensées & Menues pensées.	800
		Pepen.	622
		Percebasse.	1058
		Perseucille.	1321
		Perfes.	295
		Perficair.	1040
		Perfil.	700
		Perfil d'asne.	760
		Perfil de marez.	701
		Perfil de montagne.	ibid.
		Perfil sauuaige.	700
		Peruenche.	832
		Pesche.	293
		Pesche-noix.	286
		Peschier.	293
		Pesse.	49
		Pet d'asne.	1472
		Peuplier.	86
		Phasiols.	472. 473
		Pied d'Alexandre.	1170
		Pied d'Aloüette.	698
		Pied de geline.	1292
		Pied de lieure.	441
		Pied de lion.	181
		Pied de Loup, vel Pate de	
		Loup.	1325
		Pied d'Oye.	342
		Pied.	



G A L L I C V S.

Pied d'oiseau.	486	Pois ramé.	449	Q	Vêue de cheual.	1069
Pied de pigeon.	1276	Poiure.	1807	Q	êue de souris.	1118
Pied de veau.	1396	Poiure aquatic.	1038	Q	uatrefeuille.	1263
Pignons.	4452	Poiure d'Inde, & Poiure d'E-		R		
Pilofelle.	1098	spaigne.	631			
Piment Royal.	110	Poiurette.	812			
Pimpinelle sauuage, & culti-		Poiurier.	132			
uce.	1087	Poix fondue.	74	R	Abc.	639
Pin.	43	Poix refine.	6972		Racine sentant les Ro-	
Pins sauuages, ou Pinnateaux.		Poix seche.	75		les.	981
46		Polipode.	1229		Raisin de renard.	1312
Pirethre.	1170	Polytric.	1211.		Raiponce.	641
Pirole.	841	Polytric dore.	1212		grande Raiponce.	ibid.
Pissenlit.	564	Pomcires.	298		Ramebouc.	1477
Pistaches.	360	Pomier, & Pome.	285		Raued.	606
Piuoine.	855	Pomes d'Adam.	302		Rauenon.	541.640
Plane.	94.201.220	Pomme d'Amour.	626		Reclisse & Regalife.	247
Plantain d'eau.	1056	Pomme d'Amour, & Pomme			Reifort.	634
Plantain de mer.	1339	d'or.	628		Reifort sauuage.	636
Platane.	93	Pomme Apiole.	286		Reifort d'eau.	1090
Pocree.	531	Pommes de Capandu.	ibid.		Renouée femelle.	1072
Poirier, Poires.	306	Pommes Follanes.	ibid.		Renouée masse.	1123
Poire Acciple.	307	Pomme Girandete ou Pom-			Reperet.	828 829
Poire d'Angoisse.	ibid.	mepoire.	ibid.		Resine.	6369
Poire d'Argent.	306	Pome de Grenade.	303		Restinckle.	63
Poire Bergamote.	ibid. & 307	Pomme Grillote, & Pomme			Reuille matin.	1648
Poire Blanchete.	306	de Passepomme.	1286.287		Reuille matin des vignes.	
Poire Bon Chrestien.	ibid. &	Pomme de S. lean.	286			
307		Pomme de Merueille.	629		Rhu.	194
Poires de Cailloian.	ibid.	Pommes Panettes.	286		Riorre.	257
Poire d'ete Caluau Rofat.		Pomme de Paradis.	287		Romarin.	763.67
ibid.		Pomme du Perou.	628		Rompt pierre.	1112
Poire Carmagnole.	ibid.	Pommes de Pin.	44		Rompt pierre doree.	1114
Poire Certeau.	ibid.	Pomme Rembure.	287		Ronce.	119
Poire Chat.	ibid.	Pomme Rose.	285		Roquette.	649
Poires de Chio.	ibid.	grosses Pommes rouges.	ibi-		Rofage, & Refagine.	244
Poire Courle.	ibid.	dem			Rofeau.	995
Poire Cuiffe-madame.	ibid.	Pomme Suzine.	ibid.		Rose.	124
Poires d'eau Rose.	ibid.	Pomme Taponne.	280		Roses de Damas incarnates.	
Poitier d'Espine.	136	Pomole.	398		125	
Poire Espine.	137. & 307	Ponceau.	439		Roses de Damas rouges.	
Poires d'Estranguillon.	308	Porcellaine.	550		ibid.	
Poires de fin or.	307	Porreau.	1541		Roses incarnates.	ibid.
Poire Forest.	306	Porreau de chien.	1543		Roses Musques, & Muscadel	
Poire d'Hyuer.	307	Potirons.	1586		le.	ibid.
Poire de laloufie.	ibid.	Poule gra.	554		Rose d'oulremer.	584
Poire S. lean.	ibid.	Poullhor.	890		Roses de Prouins.	125
Poire de Laure.	ibid.	Poupom.	622		Roure.	4-6.
Poire S. Martin.	ibid.	Poupons succrins, & succre-			Roufee de Soleil.	1212
Poire grosse Muscadelle.	306	des.	623		Rue.	418.972
Poires Muscadelles.	ibid. &	Pourchailles, & Pourpier.			Rue de mur.	1212
307		550			Rys.	407
Poire Muffet.	306	Prelle.	1069.1070	S		
Poire Noitre Dame.	307	Presses.	205			
Poire Perle.	306	Primeuere.	833			
Poire Pomme.	307	Prunes, Prunier.	313	S	Affran.	1531
Poire Preuost.	306	Prunclier, & Prunier sauuage.	130		Saffran bastard.	1449
Poire, à deux Testes.	307	Prunelle.	130		Samet foin.	502
Pois.	449	Pudis.	105 312		Salette.	605
Poix bechu.	461	Pulier.	ibid.		Sallade de Chanoine.	1127
Poix ciche.	ibid.	Pyment.	952		Sanguins.	197
					Sanicle.	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM, GALLICVS.

Sanicle.	1268	Solane furieux.	ibid.	Trefle.	503
Sap & Sapin.	51. 53	Solane mortel.	1721	Trefle odoriferante.	506
Sarrasine.	976. 979	Sorbes & Sorbier.	330	Treffles des pres,	1333
Sarrazine.	1270	Souchet.	991	Trioler.	ibid.
Satyriou.	1549. 1565	Soude.	1377. 1378	Triguemadame.	1128
Satyriou Royal.	1565	Soulfi.	811	Troefne.	252
Sauge, grande Sauge, Sauge		Soulfi d'eau.	1058	Trufiles.	1585
franche, & Sauge menue.		Sparfe.	489	Tue-chien.	1570
879		Staphisagre.	1629		
Sauinier.	182	Stichedes.	917	V	
Saulx & Saule.	274	Stipoule.	1575	V Aciet.	256. 1506. 1512
Saunes blanches.	542	Sureau.	266	grande Valeriane.	927
Sauue vie.	1212	Suyer.	ibid.	grande Valeriane sauuage.	
Saxifrage.	786	Sycomore.	340	1042. petite.	ibid.
Saxifrage blanche.	1112			Velar.	653
Scabieufe.	1065	T		Veraire.	1631
Scammonee.	1661	T Abouret.	1097	Ver de vefcie.	146
Scariole.	555	Tamaris.	179	Verge d'or.	1272
Scordion.	909	Tanaifie.	955	Vermillon.	27
grande Scrofulaire.	1085	Targon.	781	Veronique femelle.	1050
Sebeltes.	319	Tarnottes.	1347	Veronique malle.	1315
Seclou Segle.	396	Tartouraire.	1669	Verucine.	1314
Semoule.	376	Teigne de Thym.	1681	Vefce.	478
Senelle vinum.	137	Terebinthe.	61	Vid de prestre.	1596
Senellon.	574	Terbentine de Venife.	54	Vigne.	1401
Seneue.	645	Tillet, Teilleus Teil.	89	Vigne sauuage.	1406
Seneue sauuage.	661	Thefe, ou Thie.	49	Vignoble.	1626
Serbin.	59. 183	Thym.	904	Vinette.	605
Serpentaire & Serpentine.	1601	Tifane.	401	Violette d'Automne.	824
Serpentaire d'eau, & aquati-		Tithymal.	1647	Violette de Damas ou des	
que.	ibid.	Tourmentille.	1267	Dames.	804
Serpollet.	902. 904	Tormigne.	99	Violette de Marie.	825
Siboule.	1538	Tortelle.	653	Violette de Mars & Violette	
Signet de nostre Dame.	1409	Toufelle.	376	de Mars double.	797
Signet de Salomon.	1623	Toutebonne.	602. 965	Violier iaunc.	802
Simoule.	379	Toutefaine.	1156	Viorne.	257. 1407. 1605
Soiffe.	49	Trèble, 86. petit Trèble. ibid.		Vnefeuille.	1260
Solane dormitif.	596				

FIN DE LA TABLE FRANCOISE.

INDEX



<b>A</b>		<b>Barazzo bianco.</b>	135	<b>Cauale.</b>	518
<b>Bete.</b>	53	<b>Barba di becco.</b>	1078	<b>Cauli fiori.</b>	521
<b>Abrotono.</b>	936	<b>Basilico.</b>	679	<b>Ceci.</b>	461
<b>Agarico.</b>	1703	<b>Basilico saluatico.</b>	679	<b>Cedri.</b>	298
<b>Aglio.</b>	1545	<b>Bedollo.</b>	92	<b>Cedriuolo.</b>	619
<b>Agno Casto.</b>	280	<b>Belvedere.</b>	826.1333	<b>Cedro.</b>	34
<b>Agretto.</b>	654	<b>Berbena.</b>	1334	<b>Cesaglione.</b>	369
<b>Agri folio.</b>	147	<b>Berula &amp; Bettola.</b>	92	<b>Cesaglioni.</b>	1762
<b>Alaterno.</b>	159	<b>Biada.</b>	384	<b>Celidonia.</b>	1249
<b>Albastro.</b>	195	<b>Bidone.</b>	264	<b>Celidonia minore.</b>	1048
<b>Albero da le Patenostri.</b>	358	<b>Bietola.</b>	531	<b>Centauræ minore.</b>	1286
<b>Albero del'vua.</b>	102	<b>Biondella.</b>	1286	<b>Centograna.</b>	1126
<b>Alga.</b>	384	<b>Bislingua.</b>	205	<b>Centone.</b>	122
<b>Amarella.</b>	953	<b>Bisinalua.</b>	523	<b>Coro.</b>	6
<b>Amor di donna.</b>	1561	<b>B'ito.</b>	538	<b>Chambrosena.</b>	252
<b>Amperlo.</b>	135	<b>Bonsfascia.</b>	205	<b>Chamedro.</b>	1162
<b>Ampomela.</b>	123	<b>Borragine.</b>	578	<b>Charnpitio.</b>	159
<b>Anagiri.</b>	105	<b>Bracche di cuculo.</b>	833	<b>Charantia.</b>	629
<b>Anrtho.</b>	691	<b>B'usandula.</b>	1414	<b>Chiona di loue.</b>	1164
<b>Aniso.</b>	692	<b>Buon vischio.</b>	593	<b>Chondrilla.</b>	563
<b>Anguria.</b>	625			<b>Ch'rtal.</b>	493
<b>Apio domestico.</b>	700	<b>C</b>		<b>Cicerbita.</b>	571
<b>Apio palustre.</b>	701	<b>Acapuzza.</b>	1637	<b>Ciclamino.</b>	1664
<b>Arabeia.</b>	465	<b>Calamandrina.</b>	1162	<b>Cipoll.</b>	1536
<b>Armeniache.</b>	297	<b>Calamento.</b>	904	<b>Ciregie.</b>	309
<b>Aro.</b>	1596	<b>Calami a far canoechie.</b>	999	<b>Ciregie Acqua'nole.</b>	310
<b>Asparago.</b>	609	<b>Camphora.</b>	1783	<b>Ciregie Amarine.</b>	ibid.
<b>Asperella.</b>	1069	<b>Canella.</b>	1796	<b>Ciregie Corbine.</b>	ibid.
<b>Asphodelo.</b>	1588	<b>Canape.</b>	486	<b>Ciregie Duracine.</b>	ibid.
<b>Auellano.</b>	310	<b>Cappellazi.</b>	1053	<b>Ciregie Marasche.</b>	ibid.
<b>Asenzo.</b>	940	<b>Capriola.</b>	670	<b>Ciregie Marine &amp; Marinete.</b>	ibid.
<b>Astoni.</b>	131	<b>Cardorello.</b>	574	<b>Ciregie Marobiane.</b>	ibid.
<b>Atriplice.</b>	535	<b>Cardo da Cardare.</b>	1447	<b>Ciregie verule.</b>	ibid.
<b>Aulno.</b>	96	<b>Cardo fiero Leone ditto.</b>	1491	<b>Ciregie Visciole.</b>	ibid.
<b>Azarolo.</b>	333	<b>Carduncello maggiore.</b>	575	<b>Cirmolo.</b>	48
		<b>Caro.</b>	693	<b>Cisto.</b>	222
<b>B</b>		<b>Carobe &amp; Carobole.</b>	112	<b>Citrani.</b>	298
<b>Arche.</b>	297	<b>Carofano.</b>	1718	<b>Cocomero.</b>	619
<b>Bagara.</b>	135	<b>Carrobaria.</b>	220	<b>Cocomero saluatico.</b>	1672
<b>Bagoiaro.</b>	346	<b>Castia.</b>	113	<b>Coda di cauallò.</b>	1069
<b>Balsamina.</b>	677	<b>Castagne.</b>	31	<b>Coda di leone.</b>	485
<b>Balsamo.</b>	1770	<b>Catapucia minore.</b>	1637	<b>Cologuinida.</b>	1675
<b>Bambagia.</b>	221				



## INDEX HISTORIÆ PLANTARVM.

Conastello.	252	Fauoscello.	1048	Grana de tintori.	27
Consolida maggiore.	1074	Felce.	1222	Granelliosa.	1128
Copertiuole.	1608	Fesire sentanim.	1411	Grano.	371
Corallo.	1374	Fichi.	335	Grafella.	1128
Cornioli.	329	Fico d'Egitto.	340	Grisomele.	297
Corniole.	ibid.	Finocchio.	688	Guado.	499
Corrigiola.	1123	Finocchio marino.	767	Gusfrico.	212
Corone.	221	Fior Campefe.	436		
Crepalo.	562	Fiore d'ogni mese.	574.811	H	
Cressina.	137	Fior di primavera.	833.813	H Alicacabo.	596
Cressione.	658	Fior raucio.	811	H Hedera.	1415
Cuculus de Leuante.	1722	Fior veluto.	870	Hedera spinosa.	1421
Cumino.	656	Fongino. 1586. Prignoli ibi. Pra		Herba Belladonna.	1721.1727
Cuneno.	414	taioli, Turini, Boleti, Orceje,		Herba Gatta.	508
Cypressso.	57	Cardarelle, Ordinoli, Parigioli, Vescie di Lupo.	1587	Herba Giulia.	777
D				Herba inoderata.	1215
D Attoli.	362	Formento.	371	Herba lupa.	485
Dittamo.	892	Formentone.	383	Herba de la marauiglia.	540
Dolzolini.	1584	Frasinella.	1623	Herba de la Milza.	1246
Dragoncello & Dragone.	685	Frafino.	82	Herba del moro.	672
Dragoncello.	781	Fusaro.	272	Herba di Sampetro.	767
Dragontea.	1601			Herba stella.	668
E				Herba tora.	485
		G		Hyacintho del pater nostro.	
Ebeno.	1751	G Alla.	15		
Ebulu.	269	G Garofoli.	806	Hydropepe.	1038
Echelo.	104	Gattaria.	908	Hissopo.	933
Egilopo.	405	Garzo.	1447	I	
Elice.	20	Gelsimino.	1430	I Nenso.	1752
Ellebora bianco.	1631	Genestra.	168.172	I Ingiolina.	482
Ellebora nero.	1633	Gengeuo.	1890	Iride.	1609
Endiuia.	554	Ghianda unguentaria.	1684	Ischia.	6
Enola & Enoa.	867	Gigaro.	1596	Iua.	1159
Erica.	185	Giglio.	1491	Iunco.	983
Erno.	468	Giglio azzurro.	1609	Iusquiamo.	1716
Esculo.	6	Giglio celeste.	ibid.	L	
Euforbio.	1690	Giglio matto.	1574		
Eufrazia.	1167	Giglio rosso.	1493	L Acca & Lachetta.	1780
F		Giglio saluatico.	1497	L Lagrimos.	54
		Ginepro.	66	Lambrusca.	1406
F Agia.	34	Ginochiato.	1623	Lantagine.	204
Fagioli.	472	Gioglio.	416	Lantana.	216
Fagiolo Turchesco.	473	Gioglio saluatico.	ibid.	Lapatio.	600
Farfara, Farfarella.	1050	Girasole.	1630	Lappola maggiore.	1054
Farnia.	27	Guttone.	438	Lappola minore.	1056
Farro.	388	Giuggiole.	356	Larice.	55
Faua.	451	Gladiolo.	1620	Lattaiuolo.	566
		Gorgolestro.	1091	Lattuca.	545
		Gramigna.	420	Lauandula.	919
				Lauaneje.	



ITALICVS.

<i>Lauanese.</i>	975	<i>Minutola.</i>	1424	<i>Pece secca.</i>	75
<i>Lauro.</i>	351	<i>Mirra.</i>	1715	<i>Penmachi Persiano.</i>	1494
<i>Lauro saluatico.</i>	204	<i>Monacucchie.</i>	1620	<i>Peonia.</i>	815
<i>Lella.</i>	867	<i>Moniache.</i>	297	<i>Pepe.</i>	1807
<i>Lente de i paludi.</i>	1014	<i>Moro.</i>	325	<i>Pepe aquatico.</i>	1038
<i>Lenticchia.</i>	475	<i>Mosco.</i>	1323	<i>Pere. 306. Campane, Carouelle,</i>	
<i>Lentisco.</i>	63	<i>Mugo.</i>	47	<i>Ciampoline, Durelle, Gentili,</i>	
<i>Licio.</i>	148	<i>Myrto.</i>	236	<i>Ghiaciuole, Giugnole, Mos</i>	
<i>Limon.</i>	301	<i>Myrto mortella.</i>	238	<i>chatelle, S. Nicolo, Papali,</i>	
<i>Linterno.</i>	159			<i>Porcine, Quadrane, Roggie</i>	
<i>Lithospermo.</i>	1176	N		<i>Sementine, Spinofo, Verna</i>	
<i>Lodano.</i>	229	<i>N Arcisso.</i>	1516	<i>recce, Zuccaie. 308. Mena-</i>	
<i>Loglio.</i>	416	<i>Nasso.</i>	24	<i>te.</i>	309
<i>Loto albero.</i>	346	<i>Nusturtio.</i>	654	<i>Perlato.</i>	346
<i>Loto domestico.</i>	506	<i>Nasturtio saluatico.</i>	666	<i>Perfa gentile.</i>	882
<i>Lupino.</i>	466	<i>Nauone.</i>	644	<i>Perfiche.</i>	293
M		<i>Nespoli.</i>	332	<i>Petra findula.</i>	786
<i>MAcerone.</i>	703-706	<i>Nocelle.</i>	319	<i>Petraciani.</i>	626
<i>MAiorana.</i>	881	<i>Noce moscada.</i>	1760	<i>Petrofello.</i>	700
<i>Malua.</i>	584	<i>Nociuole.</i>	319	<i>Petrofello, &amp; Petrofello salua</i>	
<i>Malua saluatica.</i>	593	<i>Noci.</i>	320	<i>tico.</i>	714
<i>Maluausco.</i>	590	O		<i>Pettimborsa.</i>	824
<i>Mandole.</i>	316	<i>ODano.</i>	229	<i>Perzo.</i>	49
<i>Mandragora.</i>	1725	<i>Oleandro.</i>	244	<i>Piantagine aquatica.</i>	1056
<i>Marrobastro.</i>	1252	<i>Olio d' Aucto.</i>	54	<i>Pie coruino.</i>	1027
<i>Marrobo.</i>	960	<i>Oliuella.</i>	210	<i>Pie d'oca.</i>	94
<i>Marrobo bastardo.</i>	1252	<i>Oliuella &amp; Oliuella.</i>	212	<i>Pignola.</i>	1128
<i>Mastiche.</i>	96	<i>Oliuo domestico.</i>	342	<i>Pino.</i>	43
<i>Matallo.</i>	202	<i>Olmo.</i>	80	<i>Pirra.</i>	384
<i>Matricaria.</i>	953	<i>Ombilico di Venere.</i>	1608	<i>Pirra farra.</i>	ibid.
<i>Mazza di caualliero.</i>	568	<i>Opolo.</i>	94	<i>Pistacchi.</i>	360
<i>Mazza ferrata.</i>	568	<i>Oreola.</i>	210	<i>Pistacio saluatico.</i>	102
<i>Mazza sorda.</i>	994	<i>Origano.</i>	886	<i>Piza gallina.</i>	1232
<i>Melagrano.</i>	303	<i>Orniello.</i>	82	<i>Platano.</i>	93
<i>Melanzana.</i>	626	<i>Ortica.</i>	1243	<i>Platano aquatico.</i>	94
<i>Mele.</i>	285	<i>Orzo.</i>	398	<i>Polenta.</i>	384
<i>Melega.</i>	410	<i>Ouio.</i>	96	<i>Polioigno maschion.</i>	1123
<i>Meliloto.</i>	511	P		<i>Polipodio.</i>	1229
<i>Melissa.</i>	957	<i>PAlma.</i>	362	<i>Pomi.</i>	285
<i>Melo Cotogno.</i>	290	<i>Panarina.</i>	1232	<i>Pomi d'oro.</i>	628
<i>Melospino.</i>	628	<i>Panico.</i>	411	<i>Pomogranato.</i>	303
<i>Mentha.</i>	671	<i>Pan d'orso.</i>	135	<i>Pomo di Ierusalem.</i>	629
<i>Mentha cresspa.</i>	673	<i>Pan porcino.</i>	1604	<i>Pomo spinoso.</i>	628
<i>Mentastro.</i>	ibid.	<i>Papanero.</i>	1707	<i>Ponguopi.</i>	42
<i>Mercorella.</i>	1626	<i>Papanero saluatico rosso.</i>	439	<i>Popolo bianco.</i>	86
<i>Mercorello bastarda.</i>	1628	<i>Parietaria.</i>	1241	<i>Popolo nero.</i>	ibid.
<i>Merenzana.</i>	626	<i>Patrusulo.</i>	1072	<i>Porcellana, Pncellina, Por-</i>	
<i>Milzatella.</i>	1246	<i>Pece liquida.</i>	74	<i>chella bid.</i>	550
<i>Miglio.</i>	408			<i>Porranallo.</i>	1543



## INDEX HISTORIÆ PLANT. ITALICVS.

Porro.		Sativio & Satirione.	1541	Taffo.	24-78
Porro faluatico.	1543	Scammoncea.	1661	Taffo Barbaffo.	1298
Primo fiore.	853	Schiaria.	965	Tartuffi.	1585
Prouenca.	832	Scolopendria.	1215	Terebintho.	618
Prune.	313	Scotano.	194	Terracrepolo.	563
Pffillio.	1172	Segala.	396	Testicolo dicane.	1549
Pulegio.	886	Semenzina.	945	Thymbra di S. Giuliano.	897
		Semperuino.	1128	Thimo.	899
		Semperuino maggiore.	ibid	Tilia.	8
		Semperuino minore.	ibid.	Tichimalo.	1642
		Sena.	217	Trafì docle.	1584
		Senape.	645	Tribolo.	508
		Sesamo.	482	Tribolo terreftre.	512
		Silio.	272	Trifoglio.	503
		Silla.	1575	Trifoglio Cauallino.	508.511
		Sinasbarium , feu Sinasbar.			
				V	
				Aldebona.	717
				Valeriana maggiore.	927
				Vena.	403
				Venauana.	404
				Verbaſco.	1298
				Verca.	518
				Verminacola.	1334
				Viburno.	216
				Vilucchio maggiore.	1421. 1423
				minore.	1424
				Vinciboſco.	1427
				Violla ialla.	802
				Viola porpurea, & Viola mam-	
				mola.	797
				Viſchio.	17
				Vite bianca.	1409
				Vite nera.	1411
				Viteruinifera.	1401
				Vitice.	289
				Viticella.	629
				Vitriola.	1241
				Vnghia di cauallo.	1050
				Vua d'India.	350
				Vua dell orfo.	191
				Z	
				Affarano.	1531
				Zaffarano ſaluatico.	1570
				Zaffarano Sarraſineſco.	1449
				Zucca.	615
				Zucca ſaluatica.	1409

FINIS INDICIS ITALICI. INDEX





## INDEX HISPANICVS.

### A



Beto, ar- bol. 53	Armoles. 535	Cerezo syluestre. 329
Abogalla. 15	Arroz. 407	Cerguacos. 222
Abrolhos. 512	Arruia. 972	Ceuadilla. 1906
Abrotono. 936	Arueria. 63	Ceuada. 398
Abroyos. 512	Aruga. 649	Cidras. 258
Acibar. 1693	Aselgas. 531	Ciegegato. 1668
Acoseifo. 356	Asprilla. 1125	Cipolle maligie. 1538
Adelfa. 244	Auellanas. 319	Clauo de especia. 1758
Agarico. 1703	Auellana dela India. 1684	Coda di mu'a. 1069
Alamo Blanco. 86	Auena & Auea. 403	Cogombrillos amaragos 1672
Alamo nigrillo. ibid.	Auz na. 20	Cogombro. 619
Albahara. 679	Auzinheira. ibid.	Cogomelos. 1586
Albarchigas. 297	Ayos. 1515	Cothes. 518
Albardin. 179	Azebo. 147	Colleion. 525
Albiricoques. 297	Azeure. 1693	Coloquintida. 1675
Albocigos. 360	Azeyruno. 342	Comino. 696
Alcaparas. 155	Azufecifa. 356	Contrayerua. 1825
Alcaranea. 693	Azumbar. 90	Corallo. 1374
Alcarobas. 112		Cornicabra. 61
Alcolcaz. 457	B	Cornizolos. 329
Alcornoque. 22	B Accarra. 913	Coronilla de Roy. 490
Alegria. 482	B Baldroegas. 550	Corregula mayor. 1912
Alfalfa, & Alfafa. 504	Batades. 1909	Cefloria. 20
Alfena, & Alhena. 252	Bexigo de perro. 526	Couues. 518
Alforuian. 1690	Bonnaron. 574	Coyon de perro. 1549
Algodon. 221	Borraia. 578	Cuentas. 1001
Allahaqua mote fina. 682	Box. 165	Culebras de Capillo. 185
Al Mastiga. 66	Brufalagam. 1663	Cul átrillo de pozo. 1209
Almendras. 316	la Builadora. 1913	Cy herquas. 1586
Almez 346. Alfalfa. 545	C	el Cypres. 57
Aluaricoques. 297	C Alabazza. 615	
Amapolas. 439	C Capanilla. 1426	D
Amapolas morades. 1713	Canas. 995	D Attr'es. 362
Ambaras. 1874	Camela. 113 1796	Daura. 1913
Amexias. 313	Caninero. 266	Doradilha. 125
Ananas brauo. 1871	Carumbolas. 1872	Dormidera. 1707
Andrinas. 313	Carca. 119	E
Anorca. 1409	Cardon. 1638	E Dera. 145
Arbol contra las erysip- las. 1862	Cebolla albatrana. 1575	E Encienfo. 752
	Cedro. 36	Indiuiua. 554
	Ceguda. 788	Enebro. 66
	Celiducnha. 1249	Eneldo. 691
	Centeno. 396	Enramcos. 466
	Cepolha. 1556	Euzia. 6
	Cerzas. 309	



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Enzo.	1485	Inucia odorosa.	992	Mostaza	645
Eruaye.	502	Ionquillos.	1520	Murta.	236
Efcudetes del rio.	1008	Iorgilin.	482	N	
Esparagos.	609	Iſopo.	933	N Abicas.	644
Epigafil.	920	Iua arthetica.	1159	Nabo redondo.	639
F		Iunco.	983	Naranzas.	302
F Abaras paparaz.	1629	Iunquiera.	568	Nasturcyo.	654
Fallado.	205	Iusbarba.	242	Neguillia.	812
Fauade Malaqua.	1764	L		Nelperas.	332
Feyones.	473	L Abaca.	600	Norchila.	1866
Figuera del infierno.	1630.	L Larice.	55	Nozelhas.	1580
	1790	Laurel seu Laureiro.	351	Nuxa.	1409
Fily Aguilla.	1698	Laureizo.	ibid.	Nuez de especie.	1760
Frailillos.	1600	Lechuga.	545	Nuezes.	320
Frefno.	82	Lengua de Cauallo.	205	O	
Frexo.	ibid.	Lenteias.	475	O Lioo.	342
Funcho.	688	Lenteyadellagoa.	1014	O Oregano.	886
G		Lentiucla.	490	Ortiga.	1243
G Amones & Gamoni		Liga mordago.	17	Oruga.	649
tes.	1588	Lino.	493	P	
Gatillo Caſto.	280	Lirio.	1580.1615	P Almeida.	362
Geneftra, Gieſteira, Gie-		Lirios azules.	ibid.	Palmitos.	1762
ſtra.	168.172	Lirio eſpadanal.	ibid.	Palomilla & Palomina.	
Gigante.	874	Lirio Illyrico.	ibid.		1294
Gingiure.	1890	Loreola.	210	Paniqueſo del flor blan-	
Giralda.	874	M		quo.	661
Grana en grano.	27	M Acucas.	1580	Paniſo & Panizo.	411
Grana para tegnir.	ibid.	M Madronho seu. Ma		Papolos.	439
Granadas.	303	dromeiro.	195	Parra & Parilla.	1898
Grauanços.	461	Maioſ flores.	1412	Pafteſ.	499
Gaindas de las Indias.	600	Malpica.	654	Paya de la Mequa, ſine Pa	
H		Maluas.	584	ya de Camelhios.	1884
H Aba de India muy		Malua de Vngria.	593	Pepitas del Peru.	1861
larga.	1892	Malua montefina.	ibi.	Perexil.	700
Haia.	34	Mãcanas de la India.	1873	Perexil de la mar.	767
Helechoyerua.	1222	Mandracola.	1725	Pexegos.	293
Hiezguos.	269	Manſanas.	285	Pex negra.	74
Higos.	335	Marmello.	290	Pie de Borro.	1535
Higos del rio.	1008	Marroio negro.	1452	Pimenta de Breſil.	633
Hinoio.	688	Marrones.	31	Pimienta.	1807
Hiſſopo.	933	Mata.	63	Pimienta del rabo.	1809
Hongos.	1586	Matuhalua.	692	Pinilho.	1159
I		Mechioacan.	1901	Pino.	43
I Ambeiro.	1873	Membrilho.	290	Pino negro.	49
I lambos.	ibid.	Merenderas.	1572	Pinones de Maluco.	1875
Iaro.	1600	Mierda-cruz.	1668	Pirlitero.	135
Ieruos.	468	Milho.	408	Porcellanes.	560
Igname.	457	Miyo.	ibid.	Prunas.	313
Igname cicorero.	1909	Moras del Moral.	335	Puerro.	1541
				Pyras	



# HISPANICVS.

Pyras.	306	Soagem.	1100	Violetas amarilhas.	801
<b>R</b>		Sombrereta.	1053	Vlmo.	80
Abacas.	1091	Sorbas.	330	Vua de Perro.	205
Rabo de mula.	1069	Sparto.	177.178	Vuero.	1850
Raiam.	236	Spelta.	384		X
Rapontis.	1288	Sumach.	106	Xara.	229
Rauano & Rauanillo.	634	Sumagro.	ibi.		Y
Regaliza.	247				
Reylla bucy.	1615	<b>T</b>		<b>Y</b>	
Romanas.	303	Abaco.	1895	Yerua de Baleste.	1630
Romero.	763.967	Tamaras.	362	Yerua belida.	1027
Rofas.	124	Tamarqueira.	179	Yerua buena.	671
Rosa albandeira.	855	Taxo.	24	Yerua Cidreira.	957
Rosa del monte.	ibid.	Teia.	89	Yerua dulce.	692
Rosella.	439	Texo.	78	Yerua di S.Gayteria.	568
Rosetta.	1713	Tomilho falso.	899	Yerua de las golaudri-	
Rucas de mar.	1324	Tonnanda.	1512	nas.	1249
<b>S</b>		Torongil.	957	Yerua de Monteferrato.	
Abina.	182	Treuol.	503		1668
Sabugo.	266	Trigo.	371	Yerua mora.	596
Sabugo pequenno.	269	Turmas de terra.	1585	Yerua del muro.	1241
Salce & Salgueiro.	274			Yerua Turmera.	1100
Sarza parilla.	980	<b>A</b>		Yerua Tuffera vel Pelu-	
Scorzonera.	806	Elenho.	1716	da.	838
Scorzonera, aut Scurzo-		Vellotas, <i>Hispane</i>		Yoio.	416
nera.	1206	<i>glandes Esculi vocant.</i>	6		Z
Scudetes.	1608	Verangenes.	626		
Sene d'Alexandria.	217	Verdezilla.	1426	<b>Z</b>	
Serpollo & Serpam.	202	Verdolagas.	550	Argatona.	1172
		Violeta.	797	Zarza parilla.	1898
				Zizania.	416

FINIS INDICIS HISPANICI.



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM, INDEX GERMANICVS.



**A**  
 Aibelbaum. 86  
 Abthorn. 111  
 Agley & Ageley. 820  
 Aker, aut Ackerwurz. 1347  
 Alant, aut Alantwurz; Alantwurz. 867  
 Amelkorn, aut Ammelmeel. 390  
 Ampfer. 600  
 Angelick. 724  
 Augenthrost. 1167  
 Anis. 792  
 Apffel. 285  
 Apostelkraut, aut Apostelenkraut. 1065  
 Aspen. 86  
 Attich. 269  
 Augentrostgras. 422

**B**  
 Bacchoder, & Bachmung. 270  
 Bachpunghe. 1090  
 Bacillen. 767  
 Balsamkraut. 673  
 Balsammung. 672  
 Basilgram. 679  
 Basilien. ibid.  
 Baummol. 221  
 Baumfarn. 1129  
 Bauernfens, aut Bauernsens. 661  
 Bauernreß, aut Brunkreß. ibid.  
 Becabunga. 1346  
 Becp. 74  
 Berclap. 1325  
 Bellere, aut Bellen. 86  
 Berwurz. 738  
 Berfuch, aut Bepfuch. 949  
 Bernstein. 67  
 Bernkraut. 1443  
 Bertam. 1170  
 Bertersleuff. 1056  
 Bernholglin, aut Weinwel. 212  
 Bibernell. 782  
 Biesloof. 1544  
 Bilsamkraut. 1716  
 Bingen. 983  
 Bingen helmer. 416  
 Birckenbaum. 92  
 Bijem. 1716  
 Bismuth. 1629  
 Bitterwurz. 1258  
 Blaterkaut. 1048  
 Blaw gillen. 1609  
 Blawlecken, aut Blaw violen.

Blaw. 826  
 Blaw R. 1609  
 Blaw. 395  
 Blaw woffen. 1745  
 Blutwurz. 1278  
 Boelbart. 1028  
 Bush weidt. 383  
 Bounen. 451  
 Borrescht. 73

Bramen. 119  
 Brant. 418  
 Brantlattich. 1050  
 Braunbetonik. 1282  
 Braunfleischblumen. 419  
 Braunrodel. 1074  
 Braumella. 1310  
 Braumwurz. 1085  
 Bremen. 119  
 Brinthongen. 272  
 Bromber. 119  
 Bruchwurz. 1251  
 Brunlingt. 1512  
 Brunnenkroß. 658  
 Brunnenlechtekraut, aut Brunnenlechtekraut. 1083  
 Bruch. 242  
 Brustbeertlin. 356  
 Bruchwurz. 724  
 Bruyenetekens. 969  
 Bubenstrel. 1447  
 Buckweyolt. 383  
 Buchbaum. 34  
 Buche. ibid.  
 Burellkraut. 550  
 Burbaum. 165  
 Bybaum. 306  
 Byre. 402  
 Byren, & Byr. 306  
 Bysentkraut, aut Bilsentkraut. 1181

**C**  
 Campher. 1783  
 Canariensack. 415  
 Castani, aut Castanienbaum. 31  
 Casteng. 886  
 Chamill & Chamillen. 1344  
 Chermosin. 28  
 Chirschen. 309  
 Chirschwurz. 1636  
 Citronapffel. 298  
 Citronaten. ibid.  
 Coloquint. 1675  
 Coraln. 1374  
 Cornelbaum. 329  
 Cornelein. ibid.  
 Creagbaum. 1630  
 Creesteruyt. 1349  
 Cren. 534  
 Creughlumen. 1565  
 Creugwurz. 574  
 Cucumern. 619  
 Cypressen. 57  
 garten Cypres. 937

**D**  
 Amenschwam. 1703  
 Dattelbaum. 362  
 Deichkraut. 1097  
 Des heiligen geists wurtz. 724  
 Depmont. 672  
 Dietem. 329  
 Dinkelkern, aut Dinkel. 384  
 Dolkraut. 1721, 1727

Dollopffel. 626  
 Dolkwurz. 1721, 1737  
 Dondelbar. 1128  
 Dondenegele. 803  
 Dort. 404  
 Drachemwurz. 1618  
 Drinkelkern, aut Dinkel. 394  
 Durchwachß. 1321  
 Dyllen. 691

**E**  
 Belkolen. 1041  
 Egelkraut. 1062  
 Eibenbaum. 78  
 Eichenbaum. 3  
 Eichenmüßel. 17  
 Eickenfarn. 1227  
 Eimblat. 1260  
 Eingattung. 20  
 Einkorn. 395  
 Eisentkraut. 1334  
 Eichenhart. ibid.  
 Ellerbaum. 96  
 Endinien. 554  
 Engelluß. 1229  
 Enuß. 692  
 Entzian. 1258  
 Epfich. 701  
 Ephem. 1415  
 Eppich. 701  
 Eraltbeer. 613  
 Erantkraut. 1291  
 Erbs. 449  
 Erseighen. 1588  
 Erpfrimmen. 173, 176  
 Erwurz. 1604  
 Ernuß. 1588  
 Erenbreißweiblin, aut Erenbreiß. 1050  
 Erenbreiß. 1318  
 Erica. 185  
 Erienbaum. 96  
 Eruen. 468  
 Eruoerßen. 465  
 Escherbaum. 82  
 Eschepern. 82  
 Eselz cacumern. 1672  
 Eybenbaum. 24  
 Eychoepffel. 15

**F**  
 Faulbaum. 97, 197  
 Faulbeerbaum. ibid.  
 Faulholz. ibid.  
 Feigbonen. 466  
 Feighen. 335  
 Feighenbaum. ibid.  
 Feigwartzen, aut Feigwartzen. 1048  
 Fraut. 174  
 Felbinger. 1503  
 Felswibel. 782  
 Feidmorem. 618  
 Fenchel. 132  
 Flandand



## GERMANICVS.

[illegible]



# INDEX HISTORIÆ PLANTARVM,

Deper.	538	Flaumenboen.	313	S. Johans Pfeffer.	293
Deysomen.	1707	Frin.	172	S. Johans treublin, oder beerlin.	
Deerhirs.	1176	Freymmen.	ibid.		
Deergwibel.	1575	Pieffen.	531	Sanctus Peters schlusfel.	833
Deienkraut.	1048	Pimpernugle.	101	Sanniler.	1268
Delangan.	616	Poley.	890	Sant Christoffelkraut.	479
Deltram.	913	Pomeranzen.	301	Santpeters Korn.	395
Deigelwurz.	602	Ponfelbeel.	137	Saurach.	137
Deusfortin.	1098	Poppelbaum.	86	Saurampffer.	605
Deernieff.	1367	Poppelweiden.	ibid.	Saurerker.	1354
Deerretich.	616	Porst.	179	Sautkraut.	1007
Deergnuolen.	797	Praumen.	313	Scastrupp.	768
Deysenbaum.	274	Plassenblat.	564	Scarlachber.	27
Deysenblumle.	838	Pstierling.	1586	Schaffbeere.	1721. 1717
Deysenriff.	ibid.	Pstienkraut.	1172	Schaffs mullem.	280
Deyseron. & Deysgram.	881	Pyholz.	43	Schalach.	28
Delchkraut.	487	Pyren.	306	Scharlach.	965
Delten.	535			Schelwurz.	1249
Delitkraut.	1221	Q. Elerdel.	902	Schirling.	788
Delthen.	1715	Quitten.	290	Schlaugonkraut.	1601
Delisel.	17	Quittenbaum.	ibid.	Schlehen.	130
Delittel windt.	1424	Quittenopffel.	ibid.	Schietkraut.	1249
Delten.	535			Schlingbaum.	256
Donkraut.	1313	R. Aoen.	438	Schmalzblum.	875
Doosf.	1313	Rapintzeln.	641	Schmerwurz.	1074
Dooschat nuss.	1760	Rappenblumen.	1745	Schwalbenwurz.	1144
Doosf.	994	Rauchopffel.	628	Schwarz hurgwurz.	764
Dattenblumen.	779	Rauten.	972	Schwarz Rommich, & Schwarz.	812
Duckenkraut.	1038	Reinsarn.	955	Sumel.	1424
Dumck cappen.	1745	Retich.	634	Schwarz windt.	542
Dumcholz.	252	Reysen.	1586	Schweinstod.	745
Daotterkraut.	953	Rheinblumen.	779	Schweinfenchelg.	1604
Dut villen.	808	Rhein weiden.	252	Schweimbrot.	1620
Dung.	671	Rheiff.	407	Schwertel.	182
		Rhemischguendel.	899	Sebenbaum.	1252
N. Aghschad.	596	Rhurkraut.	1115	Sehnuag Andorn.	645
Nagel.	1758	Riechenderdorn.	963	Seness & Senff.	217
Narrenfolben.	994	Ringelblumen.	811	Senet.	1721
Nattenwurz.	1282	Ringelkraut.	1616	Senkraut.	745
Nattenpanglin.	1047	Risinholz.	80	Senfenchel.	542
Negelblumen.	806	Ritterporn.	698	Seutod.	506
Neipel.	332	Rocken.	396	Sibengegil.	593
Neipelbaum.	ibid.	Roelen.	649	Sigmars.	1212
Nessel.	1243	Rotette.	ibid.	Sondau.	1648
Niederholdor.	269	Rooscheterwe.	393	Sonnenevnde wolkmell.	411
Nigellkraut.	1098	Rosambaum.	125	Sorgflamen.	609
Nussen, Nuss.	320	Rosen.	124	Spatgen.	1427
		Rosenwurz.	981	Speckgilgen.	384
O. Chsenbrech.	447	Rosmarin.	763	Speig.	415
Odermenig.	1211	Rosshuob.	1050	Spensichsaet.	330
Olbaum.	342	Rossumung.	673	Sperbieren.	ibid.
Opffel.	285	Rosshwang.	1069	Sperterling.	ibid.
Olander.	244	Rosmarin.	967	Sperwerbaum.	1221
Olusbaum.	342	Rotbustbeere.	356	Spicant.	272
Orant.	1319	Rosermangolt.	531	Spindelbaum.	543
Ostertucep.	976	Rothelwurz.	1267	Spinet, vel Spinnat.	1056
		Rotsteinbrech.	782	Spigletten.	330
P. Antosfelholz.	22	Rottrosfen.	886	Sporoeppfel.	1205
Pappel.	584	Rotzentreuble.	1128. 1130	Sprinkkraut.	1657
Pastney, & Pastnachen.	718	Roynette.	1080	Sprinkkraut.	937
Paeonienblum.	855	Rueben.	639	Stabwurz.	447
Pastischkraut.	1040	Ruprechtkraut.	1278	Stalkkraut.	1421
Pastengwurz.	1053	Rydel.	1347	Stechendbunt.	173
Pastel & Peterstien.	700			Stechende Wussf.	20
Pastellin.	1048	S. Affran.	1531	Stecheychen.	628
Pastellin.	1596	S. Salbaum.	86	Stechopffel.	644
Pastellin.	187	Salbey.	879	Stechrueben.	89
Pastellin.	187	Samatblum.	870	Steinlinden.	1213
Pastellin.	187	gros Sanikel.	1281	Steintrauten.	1176
Pastellin.	187	S. Barbara Kraut.	650	Steinsomen.	1555
Pastellin.	187	S. Jacobs Blum.	75	Stendehwurz.	82
Pastellin.	187	S. Joans brot.	112	Steinweichchen.	917
Pastellin.	187	S. Joans Bartel.	949	Stinkkraut.	Stickwurz



# GERMANICVS, ET BELGICVS.

Stückwurz.	1409	Quaſſerandorn.	1064	Wilden Saleguen.	991
Storkenſchnabole.	1275	Quaſſer Batenig.	909	Wildengarten ſaſſtan.	1449
Sereich.	174	Quaſſer linſen.	1014	Wilden baſſam.	673
Klein Streublumen.	176	Quaſſer mang.	676	Wilden berram.	1168
Suepholz.	247	Quaſſer peſſer.	1038	Wilden coſſel.	758
Synaw.	1281	Quaſſer wegrich.	1056	Wilden cucumern.	1672
		Quaſſer Betony.	1356	Wilden galgam.	991
		Quaſſer Varn.	1225	Wilden kreſſ.	659
T Ag vnd nacht.	1241	Quaſſen kraut.	955	Wilden rot.	1211
Tamarisſchen.	179	Quaſſen kraut.	1447	Wilden wicem.	479
Tanberfuß.	1276	Quaſſen karten.	145	Wilden ſenungen.	1104
Klein Tanſeudt.	1286	Quaſſen dornbeere.	1113	Wilden ſingelkraut.	1628
Taubneſſel.	1246	Quaſſen graß.	478	Wilden lauch.	1543
Tauſentblatt.	768	Quaſſen.	274	Wilden lauch.	1406
Tauſent Korn.	1328	Quaſſen.	972	Wilden lauch.	1737
Tetloſen.	1570	Quaſſen.	1752	Wilden lauch.	1298
Tetloſen.	1658	Quaſſen.	1444	Wilden lauch.	1421. 1423
Tetloſen.	1666	Quaſſen.	1631	Wilden lauch.	1424
Tetloſen.	49	Quaſſen.	960	Wilden lauch.	841
Tetloſen.	53	Quaſſen.	1465	Wilden lauch.	804
Tetloſen.	329	Quaſſen.	ibid.	Wilden lauch.	1544
Tetloſen.	899	Quaſſen.	1491	Wilden lauch.	1312
Tetloſen.	384	Quaſſen.	765	Wilden lauch.	1642
Tetloſen.	1246	Quaſſen.	833	Wilden lauch.	320
Tetloſen.	1267	Quaſſen.	1526	Wilden lauch.	1315
Tetloſen.	1349. & 1352	Quaſſen.	1445	Wilden lauch.	955
Tetloſen.	952	Quaſſen.	1623	Wilden lauch.	788
Tetloſen.	416	Quaſſen.	1401	Wilden lauch.	1091
		Quaſſen.	66	Wilden lauch.	1353
		Quaſſen.	473	Wilden lauch.	801
		Quaſſen.	333		
		Quaſſen.	215		
		Quaſſen.	360		
		Quaſſen.	1481		
		Quaſſen.	329		
		Quaſſen.	310		
		Quaſſen.	1146		
		Quaſſen.	941		
		Quaſſen.	940		
		Quaſſen.	788		
		Quaſſen.	499		
		Quaſſen.	371		
		Quaſſen.	503		
		Quaſſen.	1041		
		Quaſſen.	1675		
		Quaſſen.	815		

FINIS INDICIS  
GERMANICI.

## INDEX BELGICVS.

Arangie appel.	301	Baspeloren.	164	Zantusboom.	351
Betropen.	1127	Beelſich.	1618	Zepelkrayt.	1320
Blauwoh wortele.	1745	Beel ratelen.	1073	Zinden.	89
Boerbonen.	1019	Beiders Roofen.	279		
		Beneuerboom.	66		
Chriſtus ooghen.	815	Badiel.	269		
Citroenen.	298	Boenderbeet.	1219		
Cornolieboom.	329	Boenderene.	1239		
Cracyenbloemkens.	809	Boeplichkerſtruyt.	1636		
Croſ.	479	Boeyden.	185		
Croonkens cruyt.	1648	Bulſti.	147		
Dayeboom.	362	Genettekens.	815		
Dotterbloemen.	1013. 1049. 1052				
Drauch.	404				
Egelkoolen.	1035				
Eſchen.	82				
Fuquenboom.	335				



# INDEX BOEMICVS, ET ANGLICVS.

Phappelboom.	43	Roomschedistel.	1481	Viercrayt.	1636
Playnfens.	808				
Praynboom.	313	Saueboom.	182	Vilderbract.	788
		Sclardey.	965	Waverlych.	988. & 1018
Queperreboom.	290	Steenrapt.	1203	Wolot. & Wloid. & Wloito.	
				499	
Rietgras.	1018	Terve.	371	FINIS INDICIS	
Rogghe.	396	Thunisbloemen.	839	BELGICI.	

# INDEX BOEMICVS.

Bobel.	B	Blac.	235	Plactj.	251
Borowick.	351	Brusckp.	305		
Brja.	43			Ruoz.	114
	92	Janachleb.	112		
Canogka.	C			Sauatheo.	112
	182	Klasteroza.	182		
Dakyle.	D	Kzrbunp.	330	Todel.	86
Drac, u Drissal.	362				
Drinet.	127	LeKorice.	247	Woffne.	309
Drinsoay.	180	Lippa.	89	Wolde.	96
	329			Woreo Kistoonp.	319
Fylstepej.	F	Odoruse.	340	Warba.	274
	335				
Befen.	B	Nyspale.	332	Zob.	251
Bilin.	82				
	80	Pistacya.	360	FINIS INDICIS	
		Poffam.	165	BOEMICI.	

# INDEX ANGLICVS.

A Zmonatree.	316	Figge tree.	335		
Appel.	285			Otes.	403
Blaere.	82	Wafeltree.	319	Quatre.	342
Bjor Poplertre.	86	Wauer.	403	Orengetree.	302
		Wch.	185		
Herberts.	B	Wimp, & Wemp.	496	Paar.	306
Wloedmont.	137	Woly.	147	Pichetre.	49
Wramblebalhe.	269			Pistakes & Pistiles.	360
Wurs.	119	Junipetre.	66	Plumtree.	313
	105			Pomaranat tree.	303
Cheriff.	C	Keale.	518	Potades.	1909
Coorte.	309	Kuchull & Kuchulme.	242	Prynet.	252
Claes.	298			Pynetre.	43
Cole.	503	Laureorby tree.	351		
Corneltree.	518	Limontree.	301	Onintetra.	290
Cypress.	329	Lindentre.	89		
	57			Riff.	407
Dactre.	D	Oalaourt.	269		
Dau.	361	Oasietree.	63	Sauintre.	182
	53	Oastre.	53		
Eluttre.	E	Wodder.	322	Terpentine tree.	61
Les.	80	Wodrtre.	ibid.		
	403	Wollote.	511	Walnuttre.	320
Sidhe.	F	Wulbertytree.	325	Wvet.	371
	478			Wvode & Wvade.	499

FINIS INDICIS ANGLICI.



